This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 106 312 119

Bot Dict
H51

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Nomenclator botanicus hortensis

oder

alphabetische und synonymische Aufzählung

der

in den Gärten Europa's cultivirten Gewächse,

nebst Angabe

ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer Dauer und Cultur.

Bearbeitet

von

Gustav Heynhold.

Zweiter Band.

Dresden und Leipzig,
in der Arnoldischen Buchhandlung.
1846.

Digitized by Google

Alphabetische

und

synonymische Aufzählung

der

in den Jahren 1840 bis 1846

in

den europäischen Gärten

eingeführten Gewächse,

nebst Angabe

ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer Dauer und Cultur.

Ein Hilf- und Ergänzungbuch zu den Werken von Dietrich, Dumont-Courset, Loudon, Sweet, Steudel u. s. w.,

nach den

neuesten Quellen bearbeitet

von

Gustav Heynhold.

Dresden und Leipzig,
in der Arnoldischen Buchhandlung.
1846.

Digitized by Google

Bot. D.t.
H51
1846

Digitized by Google

Vorwort.

Seit der Herausgabe meines *Nomenclator botanicus hortensis*, also seit 5 Jahren bin ich unausgesetzt bemüht gewesen Nachträge dazu zu sammeln.

Die Anzahl der seit dieser Zeit in den Gärten eingeführten Gewächse, sowohl an Gattungen als Arten und Abarten, (der vielen künstlich gezogenen Hybriden oder Bastarde noch gar nicht zu gedenken), ist sehr ansehnlich, und so wird denn gegenwärtiges Supplement einen neuen Beleg von dem Aufschwung den die Blumistik in der neuern und neuesten Zeit immer mehr und mehr gewonnen hat, liefern.

Ebenso haben die wissenschaftlichen Untersuchungen manche andere Resultate und daraus hervorgegangene Namenveränderungen (die freilich leider die Synonymie — ein unvermeidbares Uebel — vervielfältigen), hervorgerufen.

Digitized by Google

Es schien sonach Bedürfnifs mit dem Erscheinen des längst versprochenen Nachtrags nicht länger anzustehen und den Besitzern des gröfsern Werkes dadurch eine Beihilfe und Ergänzung zu geben.

Die Masse des herangewachsenen Stoffes möge daher die Bogenzahl des gegenwärtigen Werkes, über dessen innere Einrichtung ich hier noch Einiges zu erwähnen habe, entschuldigen.

Bei Gattungen nämlich, die im Hauptwerke nicht vorkommen, ist wie früher die Linneische Klasse, sowie die natürliche Familie, zu der sie gehören, angegeben, bei solchen aber, die schon früher aufgeführt worden, um Raum zu ersparen, nur der deutsche Name so gut er sich allenfalls geben liefs, beigefügt. Wenn Arten, die in der neueren Zeit zu einer anderen Gattung gestellt worden, schon früher aufgenommen sind, aber denselben Bei- oder Trivialnamen behalten haben, so ist nur die Seite im Hauptwerke citirt und deutscher Name, Vaterland etc. zu nehmen und giltig, wie es daselbst gegeben ist; dasselbe gilt auch bei beigefügten neueren Varietäten zu den älteren Arten. Ist der Paginazahl eine II beigesetzt, so bezieht sich das auf gegenwärtigen Band.

Obgleich sonach beide Werke, das gegenwärtige wie das frühere, gegenseitig verglichen werden müssen und Hand in Hand gehen, so kann doch auch dieser Nachtrag den Besitzern anderer ähnlicher Werke und selbst des trefflichen Steudel'schen Nomenclator von Nutzen sein, da im letztgenannten Buche, z. B. die herrlichen Farrn-

Digitized by Google

kräuter, die jetzt mit vieler Vorliebe kultivirt werden, nicht enthalten sind, auch so Manches Neue hier vorkommt, was dort nicht zu finden ist; — wobei jedoch der Unterzeichnete das offene Bekenntnifs ausspricht, dafs er das vorzügliche Werk des verdienstvollen Herrn Dr. Steudel auch zur Vervollständigung gegenwärtiger Arbeit mit vielem Danke benutzt hat.

Es ist wohl möglich, dafs mir bei der Menge der Gegenstände auch noch hier und da Einiges entgangen ist, aber auf einen vollständigen Abschlufs läfst sich, wie der hochgeehrte Herr Verfasser in der Vorrede zum Hauptwerke, die sich auch über die eigentliche Tendenz der Herausgabe dieses Buches weiter verbreitet, schon angedeutet hat, nicht rechnen. Dasselbe ist auch auf die benutzten literarischen Hilfsmittel zu beziehen, die in diesem Fache zumal so kostbar als zahlreich sind; wird also hier und da etwas vermifst, so bitte ich um gütige Nachsicht und Berichtigung.

Indem ich sonach hiermit ein Versprechen (laut Vorrede und Nachschrift des Hauptwerkes) durch Herausgabe des gegenwärtigen Buches erfülle, so wie mehreren An- und Nachfragen wegen Erscheinen desselben entgegenkomme, übergebe ich es einem hochgeehrten Publikum in der Erwartung und Hoffnung, dafs es mit eben so viel Beifall und Nachsicht als sein älterer Stammgenosse aufgenommen werden möge.

Denjenigen hochgeehrten und hochgesinnten Männern aber, die mich bei dieser Ar-

Digitized by Google

beit in literarischer wie in anderer Hinsicht so vielfach unterstützt haben, meinen innigsten herzlichsten Dank hier darzubringen, halte ich für heiliges Pflichtgefühl; Ihnen möge, wenn auch ungenannt, das Buch, was unter so manchen hemmenden Verhältnissen bearbeitet wurde, gewidmet sein.

Dresden, im Monat Mai 1846.

Gustav Heynhold.

Digitized by Google

Ergänzendes Verzeichnifs der Autoren und jetzt lebenden oder kürzlich verstorbenen Botaniker.

Nach der Linnaea Band XIX. Heft II. u. IV.

Ackermann, Nicol. Med., Dr., Prof. in Stockholm.
Adler, W., Pastor in Wohlsdorf bei Zügenrück im Herzogthum Sachsen.
Ahlquist, Abr., Probst u. Pastor zu Runsten in Oeland.
Ahnfelt, N. C., Privatdocent zu Lund, † 1837.
Ainley, W., engl. Botaniker.
Amici, Ritter v., Prof. d. Naturwissenschaften in Florenz.
Amoreux, P. J., † zu Montpellier 1824.
Angelis zu Admont in Steyermark.
Arduino, Luigi, Prof. zu Padua, ein Sohn von Pietro Arduino, † 1834.
Arendt, J. J. F., Osnabrück.
Areschoug, J. E., Dr. zu Lund.
Armano, Mailand.
Arrhenius, Dr. u. Prof. zu Upsala.
Aucher, Eloy, Naturforscher u. Reisender in Aegypten u. dem Orient, † 1838 in Ispahan.
Ayres, Dr., England.

Bacle, ein Genfer, reiste am Senegal u. in Südamerika, † 1838 in Buenos Ayres an den Folgen seiner Gefangenschaft.
Backhouse, James, engl. Botaniker u. Reisender.
Badaro, ital. Botaniker, Schüler von Moretti, reiste in Brasilien, † daselbst 1831.
Bailey, J. W., Prof. zu West Point in Nordamerika.
Bainbridge, Fr., England.
Baldwin (*Baldwyn*), W., nordam. Botaniker, † zu Franklin am Missouri 1839 auf einer botanischen Reise.
Balfour, J. H., Prof. d. Botanik in Glasgow.
Balsamo-Crivelli, J., Dr. u. Prof. in Mailand.
Bunbury, Esq., engl. Naturforscher u. Reisend. in Südafrika.
Banks u. *Wallis*, Sammler des Herzogs von Devonshire, ertranken im Oregon 1838.
Barbouné, Prof. zu ? in Frankr.
Barnéoud, Marius, franz. Botan.
Battersby, R., Dr., England.
Baudo, Firmin, Frankreich.
Baudot, de, K. franz. Procurator.
Bauer, G. H., Apothek. in Berlin.
Baumann, J. et Napol., Gärtner zu Bolwiller im Elsafs.
Baumgarten, Dr., Arzt zu Schäsburg in Siebenbürgen, † 1843.
Bautier, Alex., zu Paris.
Baxter, W., Curator des botan. Garten zu Oxford.
Becquerel, ?
Beck, A. van, Mitglied d. Instituts d. Niederlande.
Beever, Miss, England.
Behlen, Steph., K. baier. Forstmeister zu Aschaffenburg.
Beilschmid, Apoth. zu Ohlau in Schlesien.
Bell, John, engl. Botaniker.
Bellani, Angelo.
Beneken, Fr., Apoth. in Naumburg a. d. Saale.
Bennet, J. J. Esq., London.
Bennett, William., England.
Bentall, Thomas, England.
Berard, Paris.
Berg, Ernst v., Gutsbesitzer zu Neuenkirchen.
Berger, F. X., Caplan, † 1834 auf d. Reise nach Griechenland.
Bergfeld, A., † 1839 zu Regensburg.
Bergsma, Dr. u. Prof. am botan. Garten in Utrecht.
Berlèse, L., Abbé, Secretair d. Gartenbaugesellschaft in Paris, Verfasser eines schätzbaren Werkes über Camellien.
Bernhardi J. J., Dr., Prof. der Botanik zu Erfurt *).
Besser, W. F. J. G. v., K. russ. Staatsrath, Prof. u. Director d. bot. Gartens in Kiew, † 1842.
Betke, F. F., Med., Dr. zu Malchin in Mecklenburg.
Beynon, W. L. ?
Bieberstein, Fr., Freih Marschall v., siehe M. B. p. XII. im ersten Band.
Biener, Dr. F. A., K. preuss. geheimer Justiz-Rath, lebt in Dresden, Besitzer eines reichen Herbars.

---

*) Ich bitte hiermit den p. VI. im I. Bd. begangenen Irrthum, wegen der angeblichen Todesanzeige dieses ausgezeichneten Botanikers, zu berichtigen, wobei ich wünsche und hoffe, dafs derselbe noch lange für die Wissenschaft wirken möge.

Digitized by Google

Biatzoosky, östr. Botaniker.
Billberg, J. G., Kammerrath zu Stockholm.
Billot, Profess. zu Hagenau im Elsafs.
Billotti, Tecofila (Tochter von Ad. Colla).
Birkell, ?
Bischoff, Dr. L. W. T., Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens zu Heidelberg.
Bischoff, T. G., Dr., Bonn.
Bladon, James, England.
Blanc, franz. Escadronchef b. d. Artillerie.
Blanchet, bereiste als Botaniker Brasilien.
Blanco, Don Emanuel, bearbeitete die Flora der Philippinen, † 1845 in Manila.
Bloxum, A., Geistlicher, Engl.
Blytt, Prof. d. Botanik zu Christiania in Norwegen.
Bock, ein fleifsiger u. kenntnifsreicher Botaniker (zumal tüchtiger Cryptogamolog), lebte in Bockau im sächs. Erzgebirge u. † daselbst 1820 in armen Umständen.
Boeckeler, Botaniker in Varel an der Jahde.
Boissier, Edmund, zu Genf, einer der kenntnifsreichsten u. thätigsten Botan. unserer Zeit, bereiste Spanien u. d. Orient.
Bojer, Wencesl., Prof. u. Direct. d. botan. Gartens zu Port Louis (Isle de France).
Bonafous, Matthieu, Dr., Direct. d. Landbaugartens in Turin.
Bonato, G. B., ehemal. Prof. d. Botanik zu Padua, † 1837.
Bongard, H. G., Dr., K. russ. Staatsrath, (Petersbg.), † 1839
Boot, Francis, M. Dr., England.
Boreau, A., Prof. zu Angers.
Bosch, van der, ?
Botta, aus Paris, reist in Arabien.
Botteri, Math., Lesina in Dalmat.
Bouché, Peter Carl, Institutsgärtner an der Gärtnerlehranstalt, Neuschöneberg bei Berlin
Bouché, Carl Dav., Inspector d. botan. Gartens in Schöneberg bei Berlin.
Boucher de Crevecoeur, J. A. G., † zu Abbeville 1844.
Bouchet, Dominique, † zu Montpellier 1845.
Bourdon, J., Paris.
Boussingault, Paris.
Bové, Nicolas, aus Luxemburg. Reisender in Syrien, Arabien, d. Berberei, † zu Algier 1841.
Bowman, John Eddowes, Esq., lebte in Manchester † 1841.
Boykin, Dr. zu Milledgeville in Georgia (Nordamerika)
Bracht, Albert, k. k. östreich. Hauptmann.
Brandt, J. F., Dr., k. russ. Staatsrath, (Petersburg).
Bravsai, Samuel, Prof. in Klausenburg.
Braun, Alex., Dr., Prof. d. Botanik etc. in Freiburg, Breisg.
Braun, Fr., Apoth. in Baireuth.
Braun, G. H., Apoth in Berlin.
Bravais, A. et L., franz. Botan.
Bredemeyer, k. k. Hofgarten-Direct. zu Schönbrunn b. Wien, †.
Brewer, W. T., Geistlicher, ?
Brichan, James B., ?
Brignoli v. *Brunhof*, Dr., Prof., Director d. botan. Gartens zu Modena.
Brinsley, Rich. Esq., England.
Brocchi, J., † 1826.
Brotero, Fel Avellar, † den 5. Aug. 1828.
Broomfield, W. Arnold, Med. Dr.
Brown, Georg, Kew.
Bruce, J. bereiste Abyssin. †.
Bruch, Philipp, Bryolog, † zu Zweibrücken, 11. Febr. 1828.
Brückner, G. A., Dr., Medicinalrath in Mecklenburg.
Brunner, Dr. u. Prof. in Bern.
Buch, Leop. v., k. preuss. Kammerherr, berühmter Geolog, bereiste d. canar. Inseln.
Buchinger, Dr., Ober-Schulinspector u. Prof. in Strafsburg.
Buckley, engl. Botaniker.
Buek, Medicinal-Assessor, zu Frankfurt a. d. Oder.
Buek, H. W., Dr. med., Physikus in Hamburg.
Buckman, James, ?
Bull, Henry, ?
Bürger, Dr. in Leyden.
Burkhardt, Fr., Apoth. zu Nieaky in der Lausitz, †.
Buquoy, Georg, Graf v. (Prag).

Cagniard-Latour, Frankreich.
Calvert, F. C., Frankreich.
Canal, Graf Malabaila v., Präsident d. k. k. ökonom. Gesellschaft zu Prag.
Candolle, A. P. et A. de *Candolle*, s. DC.
Carey, Mathew, Philadelphia, † 1838.
Carlisle, Anthony, geb. zu Stillingson (Durham), † 1840 zu London.
Carmigniani, Vinc. ?
Carreno, Schüler v. Lagasca, † zu Paris 1841, 23 Jahr alt.
Cassebeer, Dr., Senator u. Apotheker zu Gelnhausen.
Cassel, F. P., Dr., Prof. u. Director d. bot. Gartens zu Gent, †. 1821.
Cattaneo, Antonio, † zu Mailand 1845.
Caulini, (Cavolini), P.
Chaillet, J. F., aus Neuschatel, † daselbst 1839.
Champagneux, zu Lion.
Chantrans, Girod. ?
Chauvin, Professor in Caen.
Chav., Ed. Chavannes, in Lausanne.
Comolli, Antonio, Dr. u. Prof., Italien.

Digitized by Google

Chev., Dr. Chevallier, früher in Paris, † 1840 in Freiburg.
Chiaje s. Delle Chiaje.
Chisholm, ?
Choris, Maler a. d. Expedition des Kurik, † zu Veracruz 1828.
Christoforis, C., † zu Mailand.
Clementi, Dr., Assistent d. bot. Lehrkanzel zu Padua.
Colmeiro, spanisch. Botaniker.
Comolli, J., Prof. u Director d. Provin. Medic. Lyceums zu Como.
Comte, J. A., Prof zu Paris.
Cooley, nordam. Botaniker.
Corda, J. A., Custos am naturh. Museum in Prag
Corson, E., Dr. med. zu Paris
Corson, Sohn eines schottischen Gärtners, † 1841 zu Timor, 27 Jahre alt
Cotta, Heinr., Dir. d. k. sächs. Forstacademie zu Tharandt, † 20. Octbr. 1844.
Coquebert de Montbret, s. Montbret, p. XII. Ir Bd.
Coult, Thomas Coulter, Dr., ein Irländer, lebte in Genf, reiste in Mexico, † 1843
Courverchel, zu Paris.
Couteau Gartenbesitzer, Frankr.
Cristy, Will., Esq., † 1829.
Criscelli, s. Balsamo.
Croom, H. B. Esq., geb. in Lenoir County, Nordkarolina, 1799, ertrank mit seiner Familie a. d. Küste v. Nordkarolina 1837
Crosan, Gebrüder, Apotheker, Frankreich.
Crosier, Georges, England.
Cruckshanks, A. Esq., Edinburg
Cruickshank, J., England.
Cruse, W., Dr. u. Prof. zu Königsberg in Pr.
Cunn., Allan Cunnigham, nach seines Bruders Richard Tode Dir. d. bot. Gartens in Sydney, † daselbst 1839. 48 Jahre alt, vergl. p. VII. Ir Bd.
Curie, P. F., Lausitz.
Curnow, William, England.

Daveste, C., Frankreich.
Darlingt, W., Dr., New-Chester (Pensylvanien).
Davids., R. Davidson, Aufseher d. Gouvernem. Gartens in Hobartstown (Van Diemens Land).
Dawnay, W. H., England
Daws., W. Dawson, England.
Deakin, England
DC., A. Pyr. DeCandolle, geb. 4 Febr. 1778, † 9. Sept. 1841, vergl. p. VIII Ir Bd
Decker, starb auf der Reise in Palermo
Deisch, J. G., Augsburg.
De la Haye, Felix, Kunstgärtner, Versailles.
De la Rive, s. Rive
De la Vigne, G. F., Uebersetzer d. Schkuhrschen Rietgräser, † als Prof. d. Botan. in Charkow.
Delastre, Frankreich.
Delessert, Benj., Baron, Banquier in Paris, Besitzer eines der reichsten Herbarien, † 1847.
Delessert, Henri, Verwandt. des vorigen, † in der Havanna 1843, 28 Jahre alt
Delise, T., Bataillonschef, Vire in Frankreich, † 1843.
Delise, D. F., † zu Vire (Calvados) 1841.
Delle Chiaje, Stephan, Med. Dr., Neapel.
Dennes, G. E., Secretair d. bot. Gesellschaft in London.
Dennstädt, A. W., Dr. u. Prof. zu Belvedere bei Weimar †.
Desberger, ?
Desfardins, Julien, Stifter der Société d'histoire naturelle auf Mauritius, † 1839 od. 1840.
Desmazières, zu Vire. Herausgeb. schätzbarer getrockn. Pflanzen.
Desmarest, A., Prof. d. Naturgesch. a. d. Veterinärschule zu Alfort, † daselbst 1838.
Desmoulins, C., Prof. in Perigeux.
Despréaux, Reisender in Newfoundland, den Canarien und Antillen, † in Mexico.
Dierbach, J. H., † zu Heidelberg 1845.
Diesing, Dr., Assistent am k. k. Naturalienkabinet zu Wien.
Dietr., A. Albert Dietrich, Dr. u. Lehrer a. d. Gärtnerlehranstalt zu Berlin.
Dietr., D. Frdr. David Dietrich, Jena.
Dillon, Quartin, Reisender mit Petit in Abyssinien, † 1841 daselbst.
Ditmar, Dr. jur. und Syndicus in Rostock.
Doellinger, Ignaz, Dr. u. Hofrath in München, †. 1841.
Döll, J. C., Prof. u. Bibliothekar in Carlsruhe
Döllner, George, ?
Don, David, Secret. der Linnéischen Gesellschaft in London, † 8 Decbr. 1841.
Don, George, † ebendas. 1841.
Donné, A., Frankreich.
Doubleday, Eduard et Henry, England.
Drejer, S. T. N., Docent a. d. Veterinärschule zu Kopenhagen, † 1842.
Düben, Baron, geb. auf Schonen, † im Aug. 1845 zu Lund.
Düb, Dr. J. E. Düby, Pastor in Genf.
Duchartre, P., Dr., Frankreich.
Duckek, Dr. u. Prof. in Prag.
Duisburg, v., Prediger zu Rudau bei Königsberg in Pr.
Dumont de Courset, †. 1824.
Dunans, Phil., Genf.
Duncan, Robert. Dick.
Dunker, J. A. H., Prediger zu Rathenow, † 1843
Dupont, franz. Botaniker.
Durando, Cajetan, Lieutenant, Caraglio.

Digitized by Google

Durieu de Maisonneuve, Capit. d. Infanterie, Perigneux.
Dutrochet, Academiker zu Paris.
Duvernoy, G., Stuttgart.
Dwigoubsky, J. A., Prof. in Moskau, † 1839.

Ebel, W., Dr., Privatdocent zu Königsberg.
Echeverria, Maler, Mexico.
Edmonstone, Thomas, Verf. der Flor. d. Shettlandsinseln, † 1845.
Eichwald, Ed. M., Dr., Prof., Etatsrath, St. Petersburg.
Einsele, A., Dr. Med. ?
Eisengrein, G. A., Dr. u. Prof. zu Freiburg.
Ekart, T. P. Phil., Dr., Coburg.
Elkan, L., Dr. zu Königsberg.
Ellis, Daniel, Pflanzen-Physiolog zu London, †.
Elsmann, F., Provisor in Regensburg.
Emmerich, W. J, Canonicus u. Vorsteher d. bot. Gartens in Regensburg, † 1839.
Endress, bereiste als Botaniker die Pyrenäen etc.
Engelmann, C. W., K. r. Collegien-Assessor u. Gymnasial-Dir., Mitau.
Engelmann, G. M., Dr., St. Louis (Nordamerika).
Erdelyi, Mich. v., Prof zu Wien.
Esenbeck s. Nees.
Evans, John, England.
Eversmann, Eduard, Dr. u. Prof. zu Kasan.
Eysenhardt, C. W., Dr. u. Prof. d. Botanik zu Königsberg, †.

Fabre, Esprit, Gärtner zu Agde (Frankreich).
Fabriani, Giovanni, Prof. d. praktischen Botanik an d. Universität zu Modena, † 1843.
Facchini, Franz, Dr. zu Vigo in Südtyrol.
Fauché, Mitglied des Conseil de santé zu Paris.
Fée, A. L. A., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Strafsburg.
Felix, Legationsrath, Regensbg., † 1846.
Fellenberg, Emanuel.
Ferrand, E., Frankreich.
Férussac, *de*, Baron, zu Paris.
Fieber, F. X., zu Prag.
Fielding, H. B., England.
Fingerhuth, C. A. M., Dr. zu Esch bei Enskirchen.
Finlays., Finlayson, engl. Botaniker.
Fintelmann, C., Hofgärtner zu Charlottenburg bei Berlin.
Fischer, der II. Sohn, Garteninspector am botan. Garten zu Göttingen, † 1836.
Fitt, George, ?
Fleischer, Franz, Dr. zu Hofwyl (Schweiz).
Fleischmann, botan. Gärtner in Laibach.
Fleming, John, engl. Botaniker.
Flotow, J. v., Major a. D. zu Hirschberg (in Schlesien).
Flower, Thom. Bruges, England.
Focke, G. Woldemar, Med. Dr. zu Bremen.
Forb., Edward Forbes, Prof. am Kings-College in London.
Forb, J. Forbes, Reisender der Londoner Gartenbaugesellsch. in Afrika, † im Aug. 1823.
Forsander, J. P. Mag. Wesiöe.
Forselles, Jacq. Heinr. v., Bergwerksbeamter, Stockholm.
Forster, Edward, England.
Fortune, ein engl. Botaniker, bereiste in neuester Zeit China.
Fraes, Dr., früher Prof. d. Botan. u. Garteninspector, Athen.
Fradley, Nordamerika.
Frank, Jos. C. Dr. zu Heidelberg, reiste in Georgien u. Florida, † in Neuorleans 1835.
Fras., Charles Fraser, Colonie-Botanikus, Neusüdwallis.
Freemann, Samuel, England.
Fremery, Lüttich.
Freyer, Heinr., Custos am naturhistorisch. Museum z. Laibach.
Frisch, J., ?
Fritzsche, Jul. Ph., Dr. zu Casan, früher in Berlin.
Frol., J. A. Frölich, v., Dr. u. Medicinalrath zu Ellwangen, † 11. März 1841.
Frost, John, Prof., geb. 1803 in London, † 17. März 1840 in Berlin.
Funck, H C., Apoth. zu Gefrees in Franken, † 1839.
Fürnr., A. E. Phil. Fürnrohr, Dr. u. Prof. am Lyceum zu Regensburg.

Gachet, Dr. u. Prof. d. Botanik zu Bordeaux, † 1842.
Gaillon, Benj., zu Brest.
Gal, H. Galeotti (Galiotti), bereiste Mexico v. 1835—1840.
Gand, Gustav, Strafsburg.
Gardiner, W., Dundee in Schottl.
Gard., G. Gardner, Direct. d. k. bot. Gartens in Paradenia auf Ceylon.
Garovaglio, Santo, M. Dr. in Pavia.
Gaspar., Guglielmo Gasparrini, Dir. d. botan. Garten zu Boccadifalco bei Palermo.
Gay, Claude, Reisender in Chili u. Peru, v. 1828—31 und v. 1834—42.
Gay, Jacques, Secret. d. Pairskammer zu Paris.
Geiseler, Ed. Ferd., M. Dr. u. Medicinalrath, †. 1827.
Gellerstedt, Joh. Dan. Phil., Mag. zu Oerebroë.
Gellibrand, botanisch. Reisender, wurde 1837 mit seinem Begleiter Hesse in Neuholland von den Wilden erschlagen.
Gerhard, Legationsrath, Leipzig.
Germain, E, M. Dr. zu Paris.
Gever-Deynoot, P. M. E. Utrecht.

Digitized by Google

Gibson, George Stacey et Sam Esq., England.
Gilbert, David, † 1839.
Gilbert, ein Naturforscher, wurde 1846 in Südaustralien von den Wilden erschlagen.
Gilpin, William Sawrey, berühmt. Gründer von Parks u. Gärten in England, † 1843.
Giobert, Giovanni Antonio, † zu Turin 1834.
Girard, Fréderic de. ?
Girou, de, Buzareingues.
G. M. S. s. Flor. Wetter.
Godin, Lille.
Godron, Dr., Prof. med., Nancy.
Goldfuss, G. A., M. Dr., Prof. u. Geheimerath in Bonn.
Göppert, H. R., M. Dr. u. Prof. in Breslau.
Gorski, M. Dr. zu Wilna?
Gosse, L. André, M. Dr. in Genf.
Gottsche, C. M., Med. Dr. in Hamburg.
Goudot, Justin, (reiste in Südamerika?)
Graf, Siegm., Dr. in Laibach, † 30. Aug. 1838.
Graham, John, beim Gouvernement in Bombay angestellt, † 1839.
Graham, Robert, M. Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Edinburg, † 7. Aug. 1845.
Gray, Asa, Dr., Prof. u. Dir. des botanisch. Gartens an der Harward-Universität im Cambridge im Staate Massachusets in Nordamerika.
Gray, Peter, Esq., England.
Grenier Ch., Dr. u. Prof. der Medicin in Besançon.
Griesselich, L., M. Dr. in Carlsruhe.
Griff., Dr. Will. Griffith, Hilfswundarzt im Dienste d. engl. ostind. Compagnie u. Conservator d. botan. Gartens in Singapore, war bei d. Expedition nach Cabul, † 1845 zu Malacca oder nach Anderen zu Penang.
Grindon, Leo H., Esq. Bristol, England.
Grieseb, Dr. A. Grisebach, Prof. extraord. d. Bot. in Göttingen.
Guépin, J. P., Dr. Med. u. Prof. zu Angers.
Guill., J. P. A., Guillemin, Aide-Naturaliste zu Paris u. Custos d. Delessertschen Sammlungen, † 1842 zu Montpellier.
Guimpel, Fr., Prof. u. Maler zu Berlin.
Gümbel (d. ältere), Landau.
Gümbel (d. jüngere), München.
Gulch, J. W. G. Esq., England.
Gutheil, Herrm., Kreuznach.
Guthnik, Apoth., Thun b. Bern, (war auf den Azoren).

Hackl, Prof. d. Landwirthschaft zu Leitmeritz, †.
Haenseler, Felix, Apothek. etc., geb. zu Durrach b. Kempten in Baiern 1767, † zu Malaga d. 12. Aug 1841.
Hagenb., Hagenbach, Prof. der Botanik zu Basel, † 1844.
Hall, H. C. v., Dr. u. Prof. in Gröningen.
Hampe, E., Apoth. in Blankenburg.
Hamstroem, Nerike (Schweden).
Hanson, William. (England).
Harpe, J. J. C. de la, Dr. med. (Frankreich).
Hartig, Theod., Forstrath und Professor. (Braunschweig).
Hartinger, Anton, Wien.
Hartmann, Emanuel, Apoth. in Kork, † 1837 bei Neuorleans.
Hartweg, aus Carlsruhe, bereiste mehrere Provinzen Südamer. in bot. Hinsicht, sehr fleissiger u. kenntnifsreicher Sammler.
Harzer, C. A. F., Kupferstecher u. Naturaliensammler in Dresden, † 18. März 1846.
Harv., W. H. Harvey, Esq., M. Dr., Sommerville b. Limerick.
Hasselt, van, reiste 1820 mit Kuhl nach Java, wo er von den Hufen eines Rhinoceros zu Tode getreten wurde.
Hassk., Justus Carl, Hasskarl, Assistent-Gärtner des Gartens zu Buitenzorg auf Java.
Haw., Adrian Hardy Haworth, Esq. zu Little Chelsea, † 1833.
Heer, Oswald, Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Zürich.
Hegewisch, aus Hannover, † daselbst 1840, botan. in Mexico.
Heldr., Theod. v. Heldreich, Conservator von DC. Herbar., bereiste Sicilien etc.
Heim, Dr., k. preuss. Geh. Rath, † zu Berlin 1834.
Helfer, Dr. aus Prag, wurde von den Eingebornen d. Andaman- u. Nicobar-Inseln 1. Jan. 1841 ermordet.
Henfrey, Arthur, Esq., Curator der botanischen Gesellschaft zu London.
Henry, A., Dr., Besitz. d. akadem. lithogr. Instituts zu Bonn.
Henschel, A. W. E. Th., Med. Dr. u. Prof. zu Breslau.
Henze, Hofgarten-Director in Cassel.
Heppenstall, John, (England).
Hergt, J. L., Apoth., Hadamar.
Hering, Carl, Apoth. zu Stuttgart, † 1843.
Hess, J., Oberbaurath, Vorsteher d. botan. Gartens zu Darmstadt, † 1837.
Hesse s. Gellibrand.
Heudelot, Dir. d. k. Culturen am Senegal, reiste daselbst 1835 bis 37, † 1837.
Heufeler, Ludw., Ritter v., Dir. am Tyroler National-Museum.
Heyer, Dr., Forstmeister in Giesen.
* der Verfasser dieses Werkes.

Digitized by Google

Hibbert, George, Esq., Besitzer eines botan Gartens zu Clapham, † 1838.
Hildenbrand, Edler v., Polizeicommissar in Pavia, vorher in Triest.
Hinds, Esq. (England).
Hinterhuber, Vater u. Sohn. Apotheker u. Botan. in Salzburg.
Hirschfeld, W., Gros Nordsee in Holstein.
Hlad., Franz Hladnik, geb. 1773 zu Idria, † als Prof. zu Laibach 1844.
Hoare, Sir Rich. Colt, † 1838.
Hoeft, F. M. S. V., Dr. med., (? Archangel).
Hoffmann, J. F., Dr., Gouda, (Holland).
Hoffmann, Dr. u. Privatdocent in Giefsen.
Hofmann, J. V., Weltpriester u. Prof. in Brixen.
Holandre, J., Prof. in Metz.
Holl, Fr., Dr. u. Mitvorstand d. pharmac. Instituts zu Dresden, bereiste als Naturf. Madeira.
Hollengreen, zu Motala in Ostgothland.
Hollsey, Reisender in Nordam.
Homann, G. G. J., Prediger zu Budow bei Stolpe in Pommern.
Hoocker, Jos. Dalton, Dr. med., war bei der Südpolexpedition.
Hoppe, D. H., Dr. zu Regensburg, † 1. Aug. 1846.
Horkel, Joh., Dr. med. u. Prof. zu Berlin.
Hornemann, Prof. u. Dir. des botan. Gartens zu Kopenhagen, † 1841.
Hornung, Apoth. in Aschersleben.
Horsfield, Thom., Med. Dr. zu London.
Hosak, Dav., Elzin b. New-York.
Houlton, Prof. in London.
Houtte, Louis van, Besitzer eines reichen Pflanz.-Etablissements zu Gent, thätiger u. kenntnifsreicher Handelsgärtner etc.
Huber, François, zu Genf, † 1831.
Hübener, J. W. P., Dr. zu Mannheim.
Hübner, Wilh., Apoth. in Braunsberg (Ostpreufsen).
Hünefeld, F. R., Dr. u. Prof. d. Chemie in Greifswalde.
Hüguenin, A., zu Chambery, (Savoyen).
Hull, John, Arzt zu Manchester, † 1839.
Humble, A. Heinr., Med. Dr., (Schweden).
Hume, Sir Abraham, † 1837 od. Anfang 1838 im 89. Lebensjahr. Nach seiner Gemahlin ist die Gattung Humea benannt.
Hundeshagen, J. Ch., Prof. in Giefsen.
Hunnemann, J., † im April 1839.
Huss, Magnus, Philos. Mag., (Schweden).
Hussenot, Dr. med. zu Nancy.
Hutton, W., London?

Jablonsky, Paul Ernst, Med. Dr. in Berlin.
Jack, Will., Chirurg, im Dienste d. ostind. Compagnie, bereiste Ostindien, † 27 Jahre alt, nahe beim Vorgebirge d. g. Hoffn.
Jäger, Georg Frdr., Med. Dr. in Stuttgart.
Jäger, Dr., pract. Arzt in Ammeiler.
James., W. Jameson, Prof. der Chemie u. Naturgeschichte in Quito.
Jaub., Jaubert, M. le Comte.
Ibbotson, H., Esq., England.
Jenner, Henry, Lascelles, Engl.
Jepp, C. F. W, Hamburg?
Jlott, William, England.
John, J. F., Dr. u. Prof. in Berlin.
Johnsohn, Heinr. ?
Jordan, Robert, C. R., England.
Irmisch, Thilo, Lehrer in Sondershausen.
Isabelle, Montevideo.
Jürgens, G. H. B., Jever (Ostfriesland).
Jundzill, Prof, † (?) Wilna.
Jung, W., Apoth. in Hochheim.
Junghuhn, F., Dr., Gesundheits-Officier auf Java.
Jussieu, Adrian de, Prof. d. Botanik zu Paris.

Kachler, Joh., Wien.
Kämel, Pfarrer in Mintraching, † im Januar 1837.
Kastalsky, russ. Algolog, † vor 1840, wahrscheinlich bei der Lütkeschen Expedition.
Karel. et *Kiril*, Gr. Karelin, bereiste mit Kirilow Soongarien.
Keith, Patrik, † 1839.
Kennedy, Handelsgärtner in Hammersmith bei London.
Kerber, Dr. in Breslau.
Kickx, Joh., Prof. zu Gent.
Kiene, Jac., Dr. med. in Gastein.
Kielmeyer, C. F. v., Dr. med. u. Staatsrath in Stuttgart, (früher Tübingen), † 24. Oct. 1844.
Kieser, G. D, Dr., Prof. u. Geh. Hofrath in Jena.
King, Samuel, (England).
Kingston, J. F., (England).
Kirilow, (Karel. et Kiril.), Joh., geb. zu Irkutzk, bereiste die Ufer d. Baical-See's, dann mit Karelin Soongarien, †. d. 11. Septbr. 1842 zu Arsanas.
Kirschl, Kirschberger, Med. Dr. u. Prof zu Strafsburg.
Kittel, Martin Balduin, Dr. u. Prof. am Lyceum u Dir d. Gewerbsch. etc. zu Achaffenburg.
Knapp, J. L., † 1842 zu Alveston in Gloucestershire.
Knight, Sir Th. Andr (vergl. Kn. et Salisb.), Präsident der Lond. Gartenbau-Gesellschaft, † zu London 11. Mai 1838, 79 Jahre alt.
Koch, C., Prof. in Jena, bereiste den Caucasus.
Koch, H, Dr. zu Jever.

Digitized by Google

Köberlin, Dirkmeisterhaus. beim Memmingen.
Kölbing, F. W., Bischoff der mährischen Brüdergemeinde zu Herrnhut, † 1840.
König, C., Prof. in Mannheim.
Korthals, P. W., Dr. Philos.
Kostel., V. F. Kosteletzky, Dr. med., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Prag.
Kottmann, Dr., Prag.
Krause, Joh. W., Prediger zu Taupadel im Grossh. S. Weimar, †. 1842.
Krauss, Ferdin., Dr. in Stuttgart, reiste am Cap d. g. Hoffn.
Krebs, L., Apoth. in Grahamstown (Cap-Colonie).
Kreutzer, C. Jos., Wien.
Kreysig, F. L., Dr., k. s. Medicinalrathete, geb. 1779 zu Eilenburg, † 3. Juni 1839 in Dresd.
Kröber, Dr. med., Kaiserslautern.
Krombholz, J. V. v., Med. Dr. u. Prof. in Prag, † 2. Nov. 1843.
Krüger, J. F., Berlin.
Kuhl, reiste mit van Hasselt 1820 nach Java, starb dort in Buitenzorg.
Kurr, H., Med. Dr., Stuttgart.
Küsting, F. T., Dr. u. Prof. an d. Realschule in Nordhausen.

Lachmann, H. W. L. jun., Med. Dr. in Braunschweig.
Lafont, de Razon de Melicocq, (Frankreich).
Lagasca, † 26. Juni 1839 in Barcelona.
Laggen, Dr., Freiburg i. d Schw.
Lamb, Lambert, Esq, † 1842 zu Kew, 81 Jahre alt.
Lamberye, Graf L. de, (Frankr.).
Lang, C. H., Stadtpfarrer zu Mühlheim in Baden, †.
Langthorn, R., (England).
Lankester, Edwing, Med. Dr, (England).
Lapylaie (Bachelot de), (Normandie), bereiste Newfoundland.
Lasch, Fr., Apother in Driesen.
Lasègue, A., Conservator am bot. Museum d. Bar. Delessert.
Laterrade, J. F., (Bordeaux).
Laurent, Apotheker, (Frankr.).
Lauer, Fr., Dr. und Prof. in Greifswalde.
Lavie, George, Prof., Carlowitz in Syrmien.
Leach, William Elford, † 1836 an der Cholera.
Leavenworth, Melines Conklin, Dr. med. in Augusta (Nordam.).
Lechler, Willibald, (Würtemberg).
Lee, Edwin, (London).
Lefebure, L. F. H., Sous-Prefect zu Verdun bis 1814, † 1839.
Lehmann, Alex., geb. zu Dorpat 1814, reiste im nördl. Asien, † in Simbirsk 12. Sept. 1842.
Leiblein, Med. Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Würzburg.
Leibold, Naturalienhändler in Dresden, bereiste Cuba etc.
Le Lièvre de la Morinière, Dir. d. Posten zu Vannes, † 1845.
Lenormand, René, Adv. zu Vire im Departement Calvados.
Lenz, Harald Othm. (Schnepfenthal bei Gotha).
Leo, ehem. Pharmacien-Major, (Frankreich).
Lepriour, Pharmaceut d. Marine, (Frankreich), Reiste am Senegal. Vergl. Perrottet.
Leres, Prof. (Frankreich).
Lescboullet, Prof., (Frankreich).
Leresche, Geistlicher in St. Clerge sur-Moudon (südl Schweiz).
L'Hermenier, Felix Louis, † zu Paris 1833.
Lesplault, Maurice (Frankreich).
Letellier, Dr. med. in Paris.
Léveillé, Dr. med. in Paris.
Lhotzky, J., Dr. zu Wien, (erst in Brasilien, dann in Neuholland), jetzt in England.
Liebich, Christoph, Forstinspect. zu Prag.
Liebig, Prof. d. Chemie in Giefsen.
Liebmann, F., Dr., Prof u. Ass. am bot. Garten in Kopenhagen, reiste in Mexico.
Lièvre, Le, de la Morinière.
Lindemann, Emanuel, k. russ. Hofrath u Lehrer am Gymnasium zu Mitau, † 1845
Linden, J. J., aus Brüssel, bereise d Aequinoctialgegenden.
Lindenberg, J. B. Gr., Dr. jur. in Bergedorf
Linderholm, Magnus Gust., Med. Dr. u. Prof (Schweden).
Lindgren, Lehrer d. Naturgeschichte zu Degeberg in Westgothland.
Lincke, J. R., Dr. (? Leipzig).
Linné, Louise, d. Tochter Linné's des Vaters, † zu Upsala d. 81. März 1839 im Alter v. 90 Jahren.
Ljungberg, Nicol. Joh. Med. Dr. (Schweden).
Ljungstedt, G. C., Phil. mag. (Schweden).
Lloyd, G., † 19. Oct 1843 auf der Reise in Theben.
Loehr, Apotheker, ?
Lomler, G., Saalfeld.
Lorck, C. G., Dr. u. Lehrer zu Königsberg in Preufsen.
Lortet, Clemence, née Richard, † zu Lyon 1838.
London, Joh., Claudius, Esq., Bayswater in England, † 14. Decbr. 1843.
Lowe, (William T), Richard Thomas, Cambridge.
Lucae, Aug., Dr. u. Apotheker in Berlin.
Lüders, F. G. J., zu Hamburg, bereist Amerika.
Lundquist, Nicol. Wilh. Phil. Mag., Buchhändl in Stockholm.
Luschnath, Bernh., Kunstgärtner in Langfuhr b Danzig reiste früher in Brasilien für d. botan. Garten in St. Petersburg.

Digitized by Google

Lasfond, George, (England).
Lyngbye, Hans Christ, Prediger, † ? (Dänemark).

Macaire-Prinsep, Isaac, (Genf).
Macf., James Macfadyen, Med. Dr., (Jamaica).
Macklot, wurde auf Java erschlagen.
Maclure, Will., † in Mexico 1840.
Maerker, Apotheker, ?
Mahieu, J. N. ?
Malabaila v. *Canal*, Graf, Präsident d. k. k. ökonom. Gesellschaft in Prag.
Maly. Dr. u. Prof. in Grätz.
Mann, Wencesl., Prag?
Marcet, François, in Genf.
Marcet, Jeanne, Wittwe v. Alex Marcet, Prof d. Chemie in Genf.
Marchand, Ludw., Luxemburg.
Margot, ? Genf.
Martens, G. v., Legationsrath in Stuttgart.
Martens, Prof. der Botanik in Lüttich.
Martin, bereiste Spitzbergen.
Martinati. Dr. in Padua.
Martins, Ch. F., Dr. in Paris.
Masi, Ludw., Dr. in Perugia.
Massara, Giuseppe Filippo, Dr. u. Arzt zu Sondrio, geb. zu Pavia, † 1839.
Massas, de, Artillerie-Capitain, (Dauphiné).
Matthews, P., Reisender in Peru, † 1841.
Matike, J. G., Pastor in Brockwitz b. Meifsen, † 1840.
Mauksch, Thomas, Kaisermark in Ungarn, † 1831.
Mauri, E., Prof. d. Botanik zu Rom, † 1836.
Meigen, J. W., Dr. u. Secretair d. Handelskammer, † zu Stollberg b. Aachen 11. Jul. 1845.
Mercier, Philippe, (aus Martinique gebürtig). Genf. † 1831.
Meyen, F. J. F., Med. Dr. u. Prof. in Berlin, früher in Bonn, † 2. Sept. 1840.
Meyer, Bernh., Dr. u. Medicinalrath zu Offenbach, † 1836, Mitverf. d. Flora d. Wetterau. s. G. M. S. od Flor. Wetter.
Michahallis, aus Nürnberg, † im Aug. 1834 auf der Reise in Nauplia.
Michl, Pfarrer in Salzburg † 1843.
Middendorf, v., Prof. in Kiew. Reiste in Sibirien.
Mikan, J. C., Prof. d Naturg. zu Prag, † 1844. Sein Vater J. Mikan ebenf. Prof d. Botan. † daselbst 1814.
Milbert, J. G., Maler d Baudinschen Expedition, † 1840.
Minciotti, L. P., Prof. in Padua.
Miq., F. A. W. Miquel, Dr u. Prof. d. Botanik in Rotterdam.
Mitten, William, (England).
Mohl, Hugo v., Med. Dr., Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Tübingen.
Mohlenbrock, J. J. P., Dr. u. Prof. zu Kiel, † 1827.
Moll, C. E. Frhr. v., (ehemal. Kammerdirector in Salzburg), † 31. Jan. 1838, 78 J. alt.
Mondelli, F. u. P., Gebrüder.
Mons, J. B. van, † zu Löwen 1842.
Montagne, Camille, Med. Dr., ehemalig. Chirurgien-Major, (Frankreich).
Moritzi, Alex., Prof. d. Botan. in Chur.
Moser, Dr. H., geb. zu Wien, † zu Paris 1826.
Mougeot, J. B., Med. Dr., Bruyères (Lorraine Dép. des Vosges).
Mückusch, F. v., † zu Troppau 1847.
Mühlenbeck, H. G., Dr. med. zu Mühlhausen, † 1845.
Müller, Dr phil., Apoth. u. Medicinalrath in Emmerich a. Rh.
— — Decan in Odenbach (baiersche Pfalz).
— — Karl, Pharmaceut in Jever, (Oldenburg).
— — Apoth. in Urach, (Würtemberg).
Münter, Jul., Dr. med., Assistent bei d. k. Bibliothek in Berlin.
Mulder, Claas, Prof., Franeker.
Munby, G., (England).
Murray, Alex, Dr., † 1838.
Murray, John, Hull.
Myrin, Claës Gust., Magister u. Docent der Botanik, † 1835 zu Upsala.

Naccari, Fort. Luigi, Prof. und Vice-Consul zu Chioggia.
Nägeli, Carl, Dr. u. Privatdoc. in Zürich.
Nardo, Dr. med., pract. Arzt in Venedig.
Nathusius, Herrm., Gutsbesitzer in Hundisburg b. Magdeburg, † 1835.
Naudin, Ch, Frankreich.
Naumann, J. C., Gartendirector zu Schlukenau in Böhmen.
Neves-Mello, Don Antonio Jose das, † 1835 nachdem er im J. 1834 von seiner Stelle als Prof d Botanik zu Coimbra entsetzt worden war.
Neumann, Ferd., k preufs. Bataillons-Arzt in Erfurt.
Neumann, Obergärtner am jardin des plantes zu Paris.
Neumayer, Franz, Ragusa, † im Sept. 1840 im Dorfe Cunna auf der Insel Sabioncello.
Neuschild, Pastor in Grofsmellen (Pommern).
Newman, Christopher A. (Engl.)
Nicklès, Napol., Apoth. zu Bennfeld im Elsafs.
Nisson, Sveno, Ph. Mag. und Prof. in Lund.
Noé, Wilh., Dr. u. Pharmaceut, chem. in Fiume jetzt in Constantinopel.
Nordstedt, C. P. U., Med. Dr. (Schweden).

Digitized by Google

Normanzell, Harry Thomas, Dir. d. botan. Gartens in Paradenia auf Ceylon, † 1843.
Notaris, Giuseppe de, Dr., Prof. u. Dir. d. bot. Gard. in Genua.
Nouttett, W. L., (England).

Oakes, (Nordamerika).
Oersted, A. S., Dr. in Kopenhagen.
Oesterreicher, Med. Dr., ehem. Prof. d. Botan. in Krakau, †
Oken, L., Med. Dr. u. Prof. in Zürich.
Orbigny, A. d', Reisender in Südamerika.
Orsini, A., (Neapel ?)
Ortmann, Anton, Apotheker in Carlsbad.
Otth, A., Dr. med., geb. zu Bern, † zu Jerusalem im Juli 1839 an der Pest (n. a. Angaben am Sonnenstich).

Palm, Med. Dr., (Würtemberg).
Pamplin, William, Buchhändler in London.
Parlat., Philipp Parlatore, Dr. u. Prof. d. Botan. in Florenz.
Pappafava, Dominico, Dr., Wien, (früh. in Cattaro in Dalmatien).
Pauqy, ?
Payen, Mitglied des Instituts ?
Payer, ?
Peck, Prof. d. Cambridge-College zu Boston.
Pencati, Graf Gius. Mazari, ein Venezianer, † 1836.
Pépin, ?
Perleb, K. J., Dr. med. u. Prof. zu Freiburg im Breisg., † 1845.
Peschier, Jacques, Genf, †.
Petermann, W. L., Dr. Leipzig.
Petif, Dr. med. in Zweibrücken.
Petit, Felix, Botaniker in Paris.
Petit, Antoine, Reisender mit Dillon in Abyssinien, wurde 8. Juni 1843 von einem Crocodil beim Uebergang über den Nil gefressen.
Philippar, Aug., Chef am Jardin des plantes in Paris, † 1839.
Phoebus, P., Dr. med. u. Prof. zu Giefsen.
Piddington, ? (England).
Pittoni, J. C. Ritter v., Grätz.
Platt, Thomas, Adv. zu London, Mitherausgeber d. Fl. graeca, † 1842 in hohem Alter.
Pleete, William, (England).
Pocch, J., Dr. med. u. Assistent d. botan. Lehrkanzel zu Prag, † 1840.
Pouchet, ?
Preifs, Med. Dr. u. Prof., Regimentsarzt (in Böhmen).
Preifs, J. A. L., Phil. Dr. in Hamburg, bereiste Australien.
Preifsler, Fiscal-Adjunct in Prag.
Prescott, J., Dr. zu St. Petersburg, †.
Pritzel, G., Dr. in Leipzig, Verfasser einer Monographie der Anemonen.
Prolongo, Don Pablo, Apotheker zu Malaga.
Puccinelli, B. A., Lehrer der Botanik zu Lucca.
Puerari, M. N., in Genf.
Purdie, Sammler für d. k. botan. Garten zu Kew.
Purkinjie, J. E., Med. Dr. u. Prof. zu Breslau.
Putterl., A. Putterlick, Dr. med. u. Custos-Adjunct am k. k. bot. Museum zu Wien, † 1845.

Quartin-Dillon, Rich., Dr., Reisender in Abyssinien, † daselbst 1841.
Quekett, Edwin E., Esq., (England).
Quekett, John, (England).
Quistorp, J., Prof. in Greifswalde, † 1834.

Raab, Apotheker in Beyreuth. † im Decbr. 1835.
Rabenhorst, Dr. u. Apoth. in Dresden, früh. Luckau, bereist jetzt Italien u. Dalmatien.
Racchetti, Alex., Prof. in Padua.
Radius, J., Dr. med. u. Prof. in Leipzig.
Raffles, Sir Stamford, Gouvern. v. Java, verlor seine Sammlungen durch den Brand seines Schiffes b. Bencoulen u. † bald darauf selbst in Engl. 1826.
Rafinesque, C. S. (Schmaltz), † im Sept. 1840.
Rainer, M. v., in Mailand.
Ralfs, John, (England).
Rameaux, ?
Ramon de la Sagra, Don, Dir. d. botan. Gartens in Havanna.
Rapin, Daniel, Apoth. zu Rolle in der Schweiz.
Ratzeburg, J. Th. Ch., Dr. med. u. Prof. in Neustadt-Eberswalde.
Ré, Giov. Franc., Dr. u. Prof. zu Turin.
Redouté, † 19. Juni 1840.
Regel, Obergärtner am botan. Garten in Zürich.
Reichenbach, G. fil., (Dresden).
Rengger, J. R., Dr., ein Deutscher, reiste in Paraguay, † 1832.
Resmann, Klagenfurth.
Reum, J. A., Prof. a. d. Forstacademie zu Tharandt, † 1839.
Reufs, F. A., Dr. u. Privatdocent zu Würzburg.
Reuter, F. G., Conservator d. Boissierschen Herb. in Genf.
Riché, F. J., Oberaufseher am Jardin des plantes zu Paris, † 1838.
Richter, H. F. E., Dr. med. u. Prof. an der medic. chirurg. Academie in Dresden.
Ringier, ?
Ringius, H. H. Candid., Schweden. Herausgeber des Herbar. normale.
Ritgen, F. A., Med. Dr. u. Prof. in Giefsen.

Digitized by Google

Rion, Augustin-Arthur de la, Prof. d. Physik in Genf.
Robergé (Frankreich).
Robert, Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Toulon.
Robert, bereist Spitzbergen mit Bravais u. Martin.
Roches, J. J. de, Med. Dr. in Genf.
Rodig, L. sächs. pens. Justizamtmann, † 1844 in Dresden.
Römer, M., Landrichter zu Amb in Baiern.
Rollinson (Rollison), engl. Handelsgärtner.
Roques, J., Dr. med. zu Paris.
Rosenhäfsler, E. A., Prof. a. d. Forstacad. in Tharandt.
Roth, A. W., † zu Bremen d. 16. Octbr. 1834.
Rousel, F. (nach Quérard E.), Verfasser d. Flora du Nord de la France, lebte zu Alost, † im Jahre 1831, nach Morren.
Roussel, Henri François Anne de, zu Anfang dieses Jahrh. Prof. in Caen, später b. d. Armee in Italien. Todesjahr unbekannt.
Roux, Polidore, Conservator d. naturhist. Sammlung zu Marseille, ging 1831 nach Ostindien, um mit Boron v. Hügel zu reisen, † in Bombay 1832.
Rowland, John, (England).
Royer, Augustin le, in Genf.
Rudolphi, F. C. L., Dr. in Greifswalde.
Ruff, J. H., in Guben.
Rugel, F., Apoth. aus Würtemberg, bereist als Botan. Nordamerika.
Rumy, G. K., Dr. zu Gaen in Ungarn.
Runge, F., Dr. u. Prof. in Oranienburg, früher in Breslau.
Russegger, Bergrath, bereiste Griechenland u. Aegypten.
Russel, Duke of Bedford, John, † 1839.
[*Russel*, Dr. Patrik, war der Vorgänger Roxburgh's b. d. Expedition in Coromandel u. Bruder des Alex. Russel, ist längst gestorben].
Rutherford, Edinburg.
Rylands, Thos. G., England.

Sadler, Michael, Prof. d. Chemie in Pesth.
Säve, D., (Schweden), Verf. d. Synopsis Flor. Gothlandicae.
Saladin, Jean Louis, Genf.
Salis-Marschlins, Ulysses von, Graubündten.
Sartwell, (Nordamerika).
Saussure, N. Th. de, Prof. in Genf, †. 1845.
Sauter, v., in Wien.
— — A. E., Dr. in Mittersyl, (früher Kitzbühl).
— — Andr., Förster in Ziel bei Inspruck.
Savi, Gaetano, Dr. u. Prof. in Pisa, † 1844.
Savi, Pietro, Prof. der Botanik in Pisa.
Schäfer, Lehrer am Gymnas. in Lampertyl, Canton Bern.
Schäfer, M., Lehrer in Trier.
Schäffer, Superintend. zu Regensgensburg, berühmt durch sein Werk über d. Schwämme etc. †.
Schäffer, J. C. H. v., Dr. med., Geh. Rath u. Leibarzt in Regensburg, †.
Schaffner, Dr., Heerstein bei Obenstein.
Schagerström J. A. (Schweden).
Schärer, L. E., Pastor, (Schweiz), † 1844.
Scheuer, J. C., Dr. u. Prof. in Greifswald, früh in Breslau.
Schauer, Sebast., Breslau.
Scheele, A., Paster zu Heeraum bei Hildesheim.
Scheidweiler, J., Dr. u. Prof. in Brüssel.
Schenk, E., Dr. u. Professor in Würzburg.
Schinz, Med. Dr. in Zürich.
Schlechtendal, D. F. L. v. Schlechtendal, Oberlandesger.-Präsident zu Paderborn, † 1842, Vater d. Dr. u. Prof. d. Botanik v. Schlechtendal in Halle a. d. S., s. p. XVI.
Schleiden, Dr. u. Prof. in Jena.
Schmid, Bernhard, Missionär in Ostindien (Utacamund).
Schmidlin, Eduard, in Stuttgart.
Schmidt, E. L. W., Med. Dr. in Stettin, † 1843.
— — H. R., Philos. Dr. u. Oberlehrer in Danzig.
— — J. A. F., Diaconus in Ilmenau.
— — J. C., Dr. u. Lehrer zu Lenzburg in der Schweiz.
Schnitspahn, G. F., bot. Gärtner in Darmstadt.
Schmitz, Dr. u. Lehrer an der Ritter-Acad. zu Bedburg am Rhein, † 1845.
Schnitzlein, A., Dr. u. Apoth. in Windsheim, jetzt Privatdocent in Erlangen.
Schönheit, Pfarrer zu Singen, (Schwarzburg Rudolstadt).
Scholtz, H., Dr. med. in Breslau.
Schomburgk, Richard, Bruder d. Sir Robert Schomb., reist auf Kosten d. k. preuss. Regierung in Guiana etc.
Schouw, J. F., Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Kopenhagen.
Schrader, Dr. in Bonn.
Schram, Oeconom.-Commissionsrath zu Stargard in Pommern.
Schrenk, Al., (beschrieb d. Pflanzen d. Soongarey).
Schweinitz, L. D. v., † 1843.
Schubert, Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Warschau.
Schultz, C. H., Med. Dr. u. Prof. in Berlin.
Schultz, C. H., gen. Bipontianus, Dr. med. u. Hospitalarzt zu Deidesheim (Rheinpfalz).

Digitized by Google

Schrader, G. H., Hofrath u. Apotheker in Dessau.
Schuyhewsky, med. u. phil. Dr. in Petersburg, reist im Auslande
Scott, R. D., Dr. u. Prof. der Botanik zu Dublin.
Séchier, ?
Sehlmeyer, J. F., Apoth. in Cöln.
Seitz, C. S., Hofgärtner am bot. Garten zu München.
Semibritski, St. Petersburg.
Sesi, Dr. u. Prof. in Genua.
Seubert, Med. Dr. u. Prof. in Carlsruhe.
Shepherd, John, Curator d. botan. Gartens zu Liverpool, † 1836.
Short, Dr., Prof. d. Medic. und Bot. zu Lexington in Nordam.
Shuttleworth, ein reicher Engländer, lebt in Bern, thätiger Förderer d. Wissenschaft und Besitzer eines der reichsten Herbar.
Sickler, F. W., Dr. u. Dir. des Gymnasiums zu Hildburghausen, † 1836.
Sidebotham, Joseph, Manchester.
Sieber, F. W., d. berühmte Reisende, † 1844 zu Prag im Irrenhause.
Siemssen, Dr. in Rostock.
Sieurin, J., ein junger schwed. Botan., ertrank in der Nähe der Havanna 1846.
Silvin, M., Prof. in Lyon.
Simpton, Sam. (Lancaster).
Sinclair, Georg, Gärtner d Herzogs von Bedford zu Woburn Abbey, † 1834.
Skalnik, fürstl. Lobkowitzscher Hofgärtner in Prag.
Smith, Colin, Geistlicher, (Inverary).
— — J., (England).
— — W., † 1839.
Söderberg, C., Dr. u. Provinzialarzt, (Upland).
Sommerauer, Ignaz, Admont in Steyermark.
Sommerfelt, S. C., Pfarrer zu Ringebee b. Christiania, † 1838.
Sonder, W., Dr. u. Apotheker in Hamburg.
Sontheimer, J. v., Dr. u. königl. würtemberg. Generalstabsarzt, † 1846.
Soriano, Vine., Dr., (Madrid).
Spanoghe, J. B., † auf Timor.
Sparkes, G., England.
Spekmoser, A., Gymnasialpräfect zu Marburg in Steyermark, † 1845.
Spenner, Dr. u. Prof. zu Freiburg im Breisgau, † 1841.
Spieker, Prof. in Frankf. a. d. O.
Spitzgerber, F. L., geb zu Amsterdam, reiste in Guiana, † 1845.
Spring, A. F., Dr. u. Prof. d. Botanik in Lüttich.
Spruce, Richard, (York).
Sprunner, W v., in Ingolstadt, bereiste Griechenland.
Stein, J. C., Apoth. zu Frankfurt am M. † 1834.
Steinheil, A., Pharmaceut, starb als er schmolte früher in Algier, † 25. Mai 1839 auf der Ueberfahrt nach Caracas.
Stenhammar, C., Probst zu Stockholm.
Stephens, H. O., Bristol.
Stewart, (Edinburg).
Stockaar, v., Apoth. (Regensbg.).
Stratton, Robert J. N., D. med. (Worcester).
Strempel, C. T., Med. Dr. und Prof. in Rostock.
Stromeyer, F., Hofr. u. Prof. d. Chemie zu Göttingen, † 1835.
— — J. F., Hofr. u. Prof. der Medicin in Göttingen, † 1830.
Suard, V., Apoth. in Nancy.
Suffrian, Dr. u. Lehrer am Gymnasium in Dortmund.
Suhr, J. N. v., Lieutenant, (Schleswig).
Sullivant, Wm. S., Nordamer.

Taylor, Thos., Dr. med. (Engl.).
Telfair, Charles, Esq., geb. zu Belfast in Ireland um 1778, † zu Port Louis auf Mauritius im Jul. 1833 (Telfairia Hook.).
Tenscheck, k. sächs. Hofgärtner am Palaisgarten zu Dresden.
Thedenius, K. Fr., (Stockholm).
Théis, A. E., Präfect d. Departem. Haute Vienne, † 1842.
Thomä, C., Dr. u. Prof. ?
Thomas, Emanuel, Pflanzenhändler zu Bex.
— — Ludw. aus Bex, † im Jan. 1834 in Neapel.
— — Philipp, aus Bex, † zu Cagliari im Sept. 1831.
Thompson, Sylvanus, (York).
Thornton, Dr., (London), † 1833.
Thuret, Gustave, ?
Timanski, (Kasan).
Tittmann, Joh. Aug., Med. Dr. u. k. sächs. Bergrath, Dresden, † 1840.
Tommassini, Jos., Präsident des Magistrats zu Triest.
Towers, J. G. ?
Traunfellner, Apoth. in Klagenfurth, † 13. Oct. 1840.
Traunsteiner, Jos., Apoth. zu Kitzbühl in Tyrol.
Trautvetter, E. R. v., Prof. d. Botanik in Kiew, früher in Petersburg u. Derpat.
Trécul, Auguste. ?
Trevisan, Eugen, Custos des Landwirthschaftsg. in Padua.
Trevisan, Victor v., Gutsbesitzer zu Padua.
Trinius, C. B. v., k. russ. Staatsrath, †. 1844 in Petersburg.
Tristan, Graf de, ?
Trog, (Thun).
Tscherniaiew, Prof. d. Botanik in Charkow.
Tulasne, L. R. u. C., ?
Tully, Will., Med. Dr. u. Prof. d. Botanik, (Nordamerika).
Turner, Hy. John, (London).
Turpin, P. J. F., † 1840.

Digitized by Google

Uechtritz, Maxim. Freih. v., in Breslau.
Unger, F., Med. Dr., Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Grätz.

Vahl, d. Sohn, Dr. (Kopenhagen).
Valentine, Will., Esq. (England).
Valsecchi, A., Prof. in Padua
Vaucher, Jean Pierre-Etienne, Prof d. Kirchengeschichte in Genf, † 1841.
Venturi, A., Gutsbesitzer zu Brescia.
Vidovich, in Melada bei Zara.
Vigne, G. F. de la, s. de la Vigne.
Vincent, John, Advocat, (Insel Mauritius).
Virlet, (reiste in Morea und Kleinasien).
Viviani, Rob. v., Med. Dr, Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Padua.
Vittadini, C., Med. Dr, Mailand (?).
Vivian, Domin., Prof. d Botan in Genua, † 1840.
Vogel, Eduard, (Dresden).
Vogel, Theod., Dr. u. Privatdocent, † 17. Decbr. 1841 auf d. Insel Fernando-Po b. Guinea.
Voigt, F. S., Dr. med. u. Prof., Geh. Hofrath, Dir. d. botan. Gartens in Jena.
Voigt, J. O., in Serampore, Verf des Hortus suburbanus Calcuttensis, Calcutta 1845, 8. †.
Voith, v., Oberbergwerksdirector. (Regensburg).
Volz, Fr., Pharmazeut, (Stuttgart, sammelt in Nordamer.).
Vriese, U. H. van, Dr. u. Prof d. Botanik in Amsterdam.
Vrolik, W., Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Gröningen.

Wächter, J. K., Forstrath zu Hannover, †. 1846.
Wagner, Dan., Apoth. in Wien.
Waitz, Landkammerrath in Altenburg.
Walker, Richard, (Oxford).
Wallmann, J. H., Phil. Mag. u. Lector am Gymnasium zu Linköping.
Walpers, G. W., Dr. med. in Berlin.
Walser, E., Med. Dr. in Ulm.
Weniger, H. L., Sprachlehrer in Mühlheim am Rhein.
Westring, J. P., Med. Dr. in Lingköping.
Wesnen, J. C. (Schweden).
Wheeler, Daniel, (England).
Wied Neuwied s. Neuwied.
Wiegmann, A. F., Dr. u. Apoth. in Braunschweig.
Wiener, Dr. med., † zu Regensburg 1840.
Wierzb., P. Wierzbicki, Dr. in Orawicza im Banat, † 1847.
Wiest, † im Mai 1835 an der Pest in Kahiro.
Wilbrand, J. B., grofsherz. hess. Geh. Medic.-Rath, Dr., Prof. u. Dir. des botan. Gartens in Giefsen, † 1846.
Wild. Medic. Assessor u. Apotheker in Cassel.
Willkomm, H. M., Med. Bacc. in Leipzig, bereiste Spanien auf Kosten des H. v. Römer auf Löbnin und Neumark in botan. Hinsicht.
Wilson, Will., Esq. zu Warrington, (England).
Winch, Nathanael John, † zu Newcastle im Mai 1838.
Winckler, E., Philos. Dr. in Leipzig.
Wirtgen, Phil., Oberlehrer in Coblenz.
Wirzén, J. E. A., (Helsingfors).
Wolfgang, Prof. in Wilna.
Wollaston, T. V., (Cambridge).
Wood, J. B., Med. Dr. in Broughton bei Manchester.
Worsley, Anna, (Brislington).
Würschmidt, Canonic. in Speyer.

Zahlbruckner, J., Secretair Sr. kaiserl. Hoheit d. Erzhergogs Johann, (Wien).
Zanardini, Joh., Dr. und Prof. in Venedig.
Zani, ?
Zenker, J. C., Dr. u. Prof. in Jena, † 1837.
Zetterstedt, J. W., Professor in Lund.
Zeyher, J. M., Geh. Hofrath u. Garten-Dir. in Schwetzingen bei Mannheim, † 1843.
Zeyher, C. s. Ecklon.
Ziccardi, M. A., Dr. med., † 1845.
Zimmermann, F. J. v., Med. Dr. in Wien.
Zollinger, reiste in Java.

Da viele Botaniker und Beförderer dieser Wissenschaft hier noch aufgeführt worden, die bei den in diesem Werke verzeichneten Pflanzengattungen, Arten etc. hinsichtlich der Bestimmungen nicht betheiligt, daher nicht citirt sind, so blieben die gebräuchlichen Abkürzungen bei selbigen weg — Uebrigens bitte ich die hier noch nachträglich gegebenen Berichtigungen und Ergänzungen mit p. V – XIX. Band I. zu vergleichen und die Buchstaben der Vornamen zu beachten.

Digitized by Google

☞ Bei dem fortwährend sich mehrenden Stoff, der mit der alphabetischen Reihenfolge fortwuchs, und die früher berechnete Bogenzahl schon weit überschritten hat, war es leider nicht möglich, die versprochene Nachlese schon jetzt beizufügen, um die Herausgabe des Buches nicht länger zu verzögern. Der Unterzeichnete hat das während des Druckes ihm bekannt Gewordene und gütigst Mitgetheilte sorgfältig gesammelt, so dafs dieser Nachtrag, auf welchen mehrfach hingewiesen worden, in möglichst kurzer Zeit erscheinen wird.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Erklärung der gebräuchlichen Zeichen und Abkürzungen.

ħ. Bäume und Sträucher.

ħ. Kleine Sträucher.

24. Ausdauernde (Stauden-) Gewächse.

♂. Zweijährige Gewächse.

⊙. Jährige Gewächse.

Kn. Knollengewächse.

Sch. Schlingende, windende oder kletternde Gewächse.

Wa. Wassergewächse.

Zw. Zwiebelgewächse.

f. Gewächse, die im freien Lande ausdauern.

f. b. Dergl., die aber im Winter bedeckt werden müssen.

m. Dergl., die im Mistbeete gezogen werden.

m. f. Dergl., die anfänglich im Mistbeete gezogen, dann aber in's Freie gepflanzt werden.

k. Dergl., die im kalten oder Orangenhause überwintert werden.

t. Dergl. des temperirten oder Caphauses.

w. Dergl. des warmen Hauses.

Digitized by Google

Abelia floribunda Hort. belg. v. Vesalia floribunda.

Abelmoschus Medik., Moschuseibisch, XVI. VIII., Malvaceae.

divaricatus Grah., ausgespreitzter, ♄. w. t. Neuholland.

maculatus Bartl., gefleckter, ♄. w. Ostindien.

splendens (Fras. mss.) schimmernder, ♄. ♄. w. t. Neuholland.

esculentus Wight et Arn., (= *Hibiscus esculentus* L., = *Hib. Bammia* Targion.), ficulneus Wight et Arn., ficulnoides Walp., longifolius Endl., Manihot Endl., officinalis Endl. (= *moschatus* Mch., *Hibiscus Abelmoschus* L.) = *Hibiscus ficulneus* etc. etc. p. 395.

Abroma Jacq., Cacaomalve, Mariae Mart. Maria's, ♄. w. Brasilien.

Abrus minor Desv. et *pauciflorus* Desv. = Abrus precatorius p. I.

Abutilon Dill. G., Sammtmalve (pappel), XVI. VIII., Malvaceae.

atropurpureum G. Don (= *Sida atropurpurea* Blume), dunkelpupurfarbige, ♂. ♄. w. Java.

Bedfordianum Hort., angl. et belg. Bedfords, ♄. t. ?

esculentum Juss. (= *Sida esculenta* Steud.), geniessbare, ♄. ♄. w. Brasilien.

muticum Sweet (= *Sida mutica* Delil.), unbewehrte, ⊙. f. Oberaegypten.

paeoniflorum (*Sida paeoniß.* Hook.), pfingstrosenblumige, ♄. ♄. w. Brasilien.

striatum Dicks. Lindl., gestreifte, ♄. w. t. Brasilien.

venosum Hort., belg. aderige, ♄. w. ? Brasilien.

acerifolium Schltdl., albidum B. Webb, Schltdl., americanum G. Don, arboreum G. Don, asiaticum G. Don (= *hirsutissimum* Mch.), aureum G. Don, auritum G. Don, contractum Sweet, cornutum G. Don. crispum Medic., ferrugineum H. B., giganteum Sweet, glaucum G. Don, graveolens Wight Arn., hernandioides G. Don, hirtum G. Don, incanum Sweet, indicum G. Don (= *elongatum* Mch., *frutescens* Medic.), Leschenaultianum Sweet, Lucianum Sweet, mauritianum G. Don, molle Sweet, G. Don, (*grandifolium* Bot. reg.), mollicomum G. Don, mollissimum G. Don, nudiflorum G. Don, occidentale Medic., permolle G. Don, periplocifolium G. Don, polyanthum Sweet, populifolium G. Don, pulchellum G. Don, Sweet, pulchrum G. Don, Sweet, reflexum Presl, Sonneratianum G. Don, speciosum Sweet, tiliaefolium G. Don, triquetrum Presl., um-

Digitized by Google

Abutilon

bellatum G. Don, virgatum Sweet, vitifolium Presl, = *Sida acerifolia* p. 751, seq. A. Avicennae G., (= *pubescens* Mch., *Theophrasti* Medic., *vesicarium* Schltdl. = *Sida Abutilon*) p. 751.

Acacia T., Acacie.

acinacea Lindl., nadelähnliche, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

acuminata Benth., zugespitzte, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

β) ciliata Meisn. (= *A. Lehmanni* Preiss.).

alata R. Br., (p. 867), α) genuina Meisn., β) platyptera Meisn. (= platyptera Lindl.).

albicans van Houtte (= *superba* Hort.), weissliche, ħ. ħ. t. ? Neuholland.

armata R. Br., (p. 1.), (= *furcifera* Lindl.).

armatoides Hortul., wenig bewaffnete, ħ. ħ. k. t. ? Neuholland.

aureonitens Benth., goldschimmernde, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Baueri Benth., Bauer's, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Benthami* (= *diptera* Benth. non Humb.), Bentham's, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

α) latior Meisn. (*diptera* β. *crioptera* Benth., *crioptera* Grah., β) angustior Meisn. (= *diptera* Hook.).

Bonplandii Tenore. (nec Gill. et Hook.), Bonpland's. ħ. ħ. t. Bonaria.

bruniades A. Cunningh., bruniaähnliche, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

callosa Spgl., schwielige, ħ. ħ. w. Brasilien.

capensis Colla, capische. ħ. ħ. k. t. Cap. d. g. Hoffn.

cardiophylla Cunn., herzblätterige, ħ. ħ. k. t. N.-S.-Wales.

celastrifolia Benth., celasterblätterige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

chlorantha Zuccar., grünblumige, ħ. ħ. t. w. Mexico.

chrysobotrya Meisn., goldtraubige, ħ. ħ. k. t. ?

complanata A. Cunningh. (= *anceps* A. Cunningh. = *visneoides* Colla ? = *compressa* Auct.), verflachte, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Cunninghamii Hook, β) glabra v. p. 2.

cuspidata Cunningh., feinspitzige, ħ. ħ. k. t. N.-S.-Wales.

cyanophylla Lindl., Benth., blaublätterige ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

Cyclopis A. Cunningh., v. p. 2. ? varietas A. Melanoxyl.

Cygnorum Benth., Schwanenfluss. A. ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss. β) sedifolia Meisn. (= *sedifolia* Lehm.).

decipiens β) incrassata Hook., γ) elongata Benth., ? δ) trapezoidea DC. (= var. *praemorsa* Bot. mag.). Vergl. p. 2. et p. 867.

deltoidea A. Cunningh., deltaförmige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

β) pungens Benth.

densifolia Benth., (= *strigosa* Lindl. nec Lk., = ? *densa* van Houtte), dichtblätterige, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.

dentifera Benth., gezahnte, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

denudata Lehm., nackte, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

β) gracilis Meisn., γ) spinosissima Meisn.

distachya DC., zweiährige, ħ. ħ. w. Neuspanien.

dolabriformis Wendl., hobelblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland. Vergl ? A. Dolabella Rchb. Nachtrag p. 807.

Drummondii Benth., Drummond's, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

Digitized by Google

Acacia

dysophylla Benth., weichzottige, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
elata Cunningh., erhabene, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
Erythropus Tenore, rothstielige, ħ. ħ. k. t. ?
exsudans Lindl., ausschwitzende, ħ. ħ. k. t. N.-S.-Wales.
extensa Lindl., ausgedehnte, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.
fagonioides Benth., fagoniaähnliche, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.
farinosa Lindl., mehlige ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
filicoma Mart., fadenschopfige. ħ. ħ. w. Brasilien.
filifolia Benth., fadenblätterige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.
glaucescens W., var. cuneata, Hügelli et ovalifolia van Houtte.
graminea Lehm., grasblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
hakeoides A. Cunningh., hakeaähnliche, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
holosericea Cunningh., (= *neurocarpa* Cunn.), sammthaarige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
Hookeri Benth., Hooker's, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
hybrida Lodd., p. 3. (= *micracantha* A. Dietr.).
implexa Benth., verflochtene, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
incurva Benth., einwärtsgekrümmte, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
interexta Sbr. p. 3 (= *theconocarpa* Cunn.).
Kunthii Dehnh., Kunth's, ħ. ħ. w. Neugranada.
latifolia Benth., breitblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
linariodes Benth., leinkrautähnliche, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
micracantha Desv., kleinstachlige, ħ. ħ. w. Cayenne.
Mirbelii Dehnh., Mirbel's, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
nerüfolia Cunningh., oleanderblätterige, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
obscura DC. jun., dunkele, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
officinalis Dehnh., gebräuchliche, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
oleaefolia A. Cunningh. p. 4. (= *dealbata* Cunn. nec Lk., *furfuracea* G. Don), β) elegans, γ) glauca van Houtte.
oncinophylla Benth., widerhackenblätterige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.
piligera Cunn., haartragende, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
platyptera Lindl., breitflügelige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss. (Vergl. alata.)
podaliriaefolia A. Cunn., podalirienblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
polybotrya Benth., vieltraubige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
Preissiana Lehm. (= ? *obscura* var. Meisn.), Preiss's, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
pruinosa Cunn., bereifte, ħ. ħ. k. t. Neusüdwales.
pulchella RBr., α) glaberrima Meisn., β) hispidula Meisn., γ) hispidissima Meisn.
pulverulenta A. Cunn., bestäubte, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.
Raddiana Savi, Raddi's, ħ. ħ. w. Brasilien.
Riceana Henslow (= *setigera* Hook.), Riceane's, ħ. ħ. k. t. Van-Diemens-Land.
rotundifolia Hook., rundblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
rutaefolia Hort. non Lk., (*spectabilis* var. ?), rautenblätterige, ħ. ħ. k. t. ?
salicina Lindl. (? = *salicifolia* Hort.), weidenähnliche, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
scapuliformis A. Cunningh., plattförmige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
sclerophylla Lindl., knorpelblätterige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Acacia

semiverticillata Knowl. et Westk. (= ? *subverticillata* Hort.), halbwirtelförmige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

setosa Dehnh., borstige, ħ. ħ. k. t. ?

spathulata Tausch, spatelförmige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

spectabilis Cunningh. v. p. 5.

sphacelata Benth., brandfleckige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

squamata Lindl.. (= *deflorata* Herb. Preiss.), schuppige ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

stenoptera Benth., schmalflügelige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

subcoerulea Lindl., v. p. 5.

sublanata Benth., wenigwollige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

tortuosa W. (= *albida* Lindl.), v. p. 6.

translucens A. Cunningh., durchschimmernde, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

triangularis A. Cunningh., dreikantige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

trichandra Zuccar., haarfädige, ħ. ħ. t. Mexico.

trigona A. DC., dreiseitige, ħ. ħ. k. t. ?

undulata W., v. p. 6., γ) microphylla, δ) orithophora Swt.

urophylla Benth., schweifblätterige, ħ. ħ. k. t. Schwanenfluss.

velutina Bertol., DC., feinsamınthaarige, ħ. ħ. w. Antillen. Brasilien.

verniciflua Cunningh., v. p. 6. (= *graveolens* Lodd., = *virgata* Lodd.).

verticillata W., v. p. 6., β) latifolia DC. (= *rusci folia* A. Cunningh.).

xylocarpa A. Cunningh. nec W., holzfrüchtige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Noch werden nachstehende in den Pflanzenverzeichnissen aufgeführt:

asparagoides van Houtte, Bartheriana van Houtte, biloba Hort., bispinosa van Houtte, Brunonii van Houtte, candicans Hort., depressa Hort., lineata minor Hort., Mühlbeckii Hort. Vindob., ovata Hort., pinnata van Houtte (? *tamarindifolia* W.), polymorpha van Houtte, praemorsa van Houtte, respectabilis Hort., rigida van Houtte, rubicunda van Houtte, scabra van Houtte, Schottiana Hort., scolopendrioides Hort., tamariscifolia Hort. angl. tardiva elegans van Houtte etc.

A. alba Colla, *asplenioides* N. E. *caracasana* W. etc. v. Calliandra alba Benth. etc. *chrysostachys* Swt. v. Adenanthera chrysost.

A. amara W., *Lebbeck* W., *Nemu* W., *Neumanniana* H. Berol., *speciosa* W. etc. v. Albizzia amara Benth. etc.

A. Farnesiana W. (= *Mimosa Farnesiana* L.) v. Vachelia Farnesiana.

A. glauca W. (= *biceps* W. = *frondosa* W. = *leucocephala* Lk.), trichodes W. v. Leucaena glauca Benth. etc.

A. xylocarpa W. nec A. Cunningh., v. Xylia dolabriformis Benth.

Acaena L., Stachelnüsschen.

Berteriana Bernh. (= *argentea* Berter. = *pinnatifida* Hort. = *trifida* Steud. Hochst.), Bertero's, ♃. ħ. k. Chili.

pinnatifida R. et P., β) incisa Lindl.

trifida R. et P. (= *pinnatifida* Lindl.), dreispaltiges, ♃. k. Chili.

Acalypha L., Brennkraut, morifolia Brotero, maulbeerbaumblättereriges, ☉. ħ. w. ? Südamerica.

Digitized by Google

Acanthophippium Bl., p. 867., Stachelorche, javanicum Blume, javanische, 4. w. Java.

Acanthospermum Schrk., DC., Stachelsaame, XIX. IV., Compositae Corymbiferae.

hirsutum DC. (= *brasilum* Schrk.), rauhhaariger, ⊙. m. f. Brasilien.

hispidum DC., steifhaariger, ⊙. m. f. Brasilien.

humile DC. (= *Centrospermum humile* Less. = *Melampodium humile* Sw., v. p. 505).

xanthioides DC. (= *Centrospermum xanthioides* H. B. K. = *Melampodium australe* L.), spitzklettenähnlicher, ⊙. m. f. Südamerika.

Acanthostachys Lk., Kl., Otto, Stachelähre, VI. I., Bromeliaceae.

strobilacea Kl., zapfenähnliche, 4. w. Südbrasilien.

Acanthotheca DC., Stachelbüchschen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

dentata DC., gezahntes, ⊙. f. Südafrica.

integrifolia DC. ganzblätteriges, ⊙ f. Südafrica.

pinnatisecta DC., fiedertheiliges, ⊙. f. Südafrica.

Acanthus lusitanicus Hort. (? = *hispanicus* Hort.), v. A. niger. p. 7.

Acarna caespitosa W., *cancellata* W., p. 8. v. Atractylis caespitosa, cancellata.

Acer T. Ahorn.

Boscii Spach (= *lobatum* Bosc. Hortul.), Bosc's ♄ f.?

coriaceum Bosc, Tausch, lederartiger, ♄ f.?

glabrum Torrey, kahler, ♄. f. Nordamerika.

grandidentatum Nutt. (= *barbatum* Hook. nec Michx.), grosszahniger, ♄. f. Nordamerika.

heterophyllum W. (= *creticum* Hort, *sempervirens* L.), γ) *obtusifolium*, δ) nanum.

hybridum Bosc. (= *pensylvanicum* L. var.), Bastard, ♄. f. Nordamerika.

laetum C. A. Mey., freudiggrüner, ♄. f. Caucasus.

laurifolium D. Don (= *oblongum* Wall. p. 8).

marucum Guss., ♄. f. Unteritalien.

monspessulanum L. (= *trilobum* Mch. = *trilobatum* Lam.), β) commutatum Presl., γ) illyricum Jacq. fil.

obtusatum W. K. (= *opulifolium* β) Tausch.), β) neapolitanum Tenore.

opalifolium Tenor. Lk., ♄. f. Neapel.

Opalus Ait. (= *italum* Lauth = *rotundifolium* Lam. = *villosum* Presl.), rundblätteriger, ♄. f. Südeuropa.

opulifolium Vill. (= *hispanicum* Pourr., *vernum* Reynier).

parvifolium Tausch. (= *creticum* Schmidt), kleinblätteriger, ♄. f. Südeuropa.

platanoides L., ζ) palmatifidum Tausch.

polymorphum Spach (= *coriaceum* Lodd., *creticum* Tratt. non L.), vielgestaltiger, ♄. f. b. Orient.

sanguineum Spach (*coccineum* Hort., *glaucum* Hort., *rubrum* Wats.), blutrother, ♄. f. Nordamerika.

suberosum Dumort, korkiger, ♄. f. Belgien.

tripartitum Nutt., dreitheiliger, ♄. f. Nordamerika.

Noch kommen in den Pflanzenverzeichnissen folgende (ohne Angabe des Vaterlandes) vor:

affine Hffg., colchicum fol. rubris Mackoy. neglectum Hffg., recuvratum Hort., sylvestre Wender.

Aceranthus Morr. et Decaisn., Ohnhornblümchen, IV. I., Berberideae.

Digitized by Google

Aceranthus
diphyllus Morr. et Decaisn. (= *Epimedium diphyllum* Lodd. v. p. 290), zweiblätteriges, 4. k. f. b. Japan.
Aceras hircina Lindl., v. Himantoglossum hircinum Spgl. p. 879.

Aceratium DC., Ohnhörnchen. Tiliaceae-Elaeocarpeae.
Ginitri Hask., Ginitri-O., ♄. ♄. w. Java,
glaucum Hort. belg., blaugrünes, ♄. ♄. w. ? Java.

Achillea T., Garbe.
bicolor Wender, zweifarbige, 4. f. ?
sylvatica Tenore, Wald, 4. f. Calabrien.
teretifolia W. (= A. *santolina* C. A. Mey. non L.), stielrundblätterige, 4. f. Caucasus, Persien.
vermiculata Trin. (= *amoena* C. A. Mey.), wurmförmige, 4. f., Caucasus, Persien.
A. alpina L. etc. v. Ptarmica alpina etc.

Achimenes P. Brown, XIV. 11., Personatae-Gesnerieae.
Argyrostigma Hook. (= *Tetranema hirsutum* Hort.), silberpunktige, 4. w. Südamerika.
coccinea P. (= *ternifolia* Fisch. = *Trevirania coccinea* W. p. 816), scharlachfarbige, 4. w. Jamaica.
grandiflora DC. (= *Giesebrechtiana* Hort. Belg.), grossblumige, 4. w, Mexico.
hirsuta Lindl., rauhhaarige, 4. w. Guatimala.
longiflora DC. (= *grandiflora* Auct.), langblumige, 4. w. Mexico.
multiflora Gardn., vielblumige, ♂. 4. w. Brasilien.
pedunculata Benth. Lindl., gestielte, 4. w. Guatimala.
picta Benth. (= *zebrina* Hort.), bunte, 4. w. Mexico.
rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Brasilien.
rupestris Gardn., felsenliebende, 4. ♄. Brasilien.
? Hybriden: Achimenes ignea van Houtte, ilicifolia van Houtte et Liebmanni Hort.
Ob nachverzeichnete kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: A. comifera DC. (= *Trevirania discolor* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika. divaricata Walp. (= *Trevir. divaricata* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika. erinoides DC. 4. Südamerika., heterophylla DC. (= *Trevirania heterophylla* Mart.), 4. Brasil., maculata Walp. (*Trevir. maculata* Poepp. et Endl.), 4. Peru, Martensiana Walp. (= *Trevir. maculata* Mart.), 4. Mexico, mollis Walp. (= *Trevir. mollis* Poepp. et Endl. = *Episcia hispida* DC.), 4. Südamerika, scabra Walp. (= *Trevirania scabra* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika, tenella DC. (= *Gesneria acaulis* Moc. Sess.), 4. Mexico, tenerrima Walp. (= *Treviran. tenerrima* Poepp. et Endl.) 4. Peru, urticaefolia Walp. (*Trevir. urticaefolia* Poepp. et Endl.), 4. Peru.
alba Hort. = Niphaea alba.

Achyranthes L., Spreublume.
sanguinolenta Crantz, Lam. (= *Aerva sanguinolenta* Blume = *Illecebrum sanguinolentum* L.), blutfarbige, 4. w. Ostindien.
Achyranthes atropurpurea Lam. v. Desmochaeta atropurpurea p, 257, *Monsoniae* P. v. Aerva Monsoniae, *polygonoides* Retz v. Digera arvensis, *uncinata* W. (= *Desmochaeta uncinata* R. et S.), v. Pupalia densiflora.

Digitized by Google

Achyrocline Less. DC., Spreuhüllchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

celosioides DC. (= *Gnaphalium celosioides* H. B.), hahnenkammähnliche, ♄. k. t. Peru.

flaccida DC. (= *Gnaphalium flaccidum* Weinm., *Helichrysum flaccidum* Don, v. p. 385).

satureioides DC. (= *Gnaphal. saturej.* Lam.), saturey-ähnliche, ♄. k. t. Brasilien, Peru.

Achyrocome ambigua Schrank v. Elytropappus ambiguus.

Achyropappus Kunth, Spreukelch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae, schkuhrioides L. et Otto (= *Schkuhria senecioides* N. E.), schkuhriaähnlicher, ⊙. f. Mexico.

Achyrophorus Scop. DC., Spreuträger, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

ambiguus DC. (= *Crepis pinnatifida* Hort. p. 230 zu berichtigen), zweifelhafter, 4. fr. ?

apargioides DC. (= *Hypochaeris apargioides* Hook. Arn. = *Hypoch. Berterii* Colla. = *rupestris* Poepp. = *Oreophila apargioides* Don, = *Seriola apargioides* Hook. Arn.), apargiaähnlicher, 4. k. f. b. Chili.

aurantiacus DC. (= *Amblachaenium aurantiacum* Turcz. = *Hypochaeris aurant.* Turcz. = *Hypochaeris grandiflora* Ledeb.), orangefarbiger, 4. f. Dahurien, Sibirien.

helveticus Scop. (= *Hypochaeris helvetica* L. = *H. uniflora* Vill. v. p. 411).

hispidus DC. (= *Hypochaeris hispida* W. v. p. 411).

maculatus Scop. (= *Hypochaeris maculata* L. v. p. 411).

oxydontus DC. (= *Porcellites cretensis* Cass. = *Seriola cretensis* Dsf. Poir. non L.), schmalzahniger, 4. f. ?

pinnatifidus DC. (= ? *Hypochaeris corsica* Tausch. = ? *H. macrorrhiza* Spgl. = *H. pinnatifida* Cyrill. = *Robertia pinnatifida* Spgl. v. p. 689).

Aciotis aquatica D. Don v. Spennera aquatica.

Acmella Rich. p. 12, *biflora* Spgl. v. Wollastonia biflora p. 858, *brasiliensis* Spgl. v. Wedelia paludosa p. 856, *globosa* Spgl. v. Chiliophyllum globosum p. 190, *mauritiana* P. Rich. v. Spilanthes mauritiana, *repens* Rich. P. v. Spilanthes repens.

Acnida L., Virginischer Hanf, rhyssocarpa Mchx. (= *rusocarpa* Auct., *ruscocarpa* W.), runzelfrüchtiger, ⊙. f. Virginien.

Acnistus Schott, Acnistus, V. I., Solanaceae.

arborescens Schltdl. (= *cauliflorus* Schott = *Agnistus arborescens* G. Don, = *Atropa arborescens* L. (p. 106) = *Cestrum campanulatum* Lam. = *Cest. cauliflorum* Jacq. = *Lycium aggregatum* R. et P. = *Lycium arborescens* Spgl.), baumartiger, ♄. w. Jamaica.

Acocanthera lycioides Don, v. Lycium cinereum p. 483.

Acocanth. venenata Don, v. Cestrum venenatum p. 185.

Acoidium fuscum Lindl., v. Trichocentrum fuscum.

Aconitum T., Sturmhut.

elatum Wender, hoher, 4. f. ?

leucanthum Wender. (= album Mch.), weifsblumiger, 4. fr. ?

ovatum Lindl., eiförmiger, 4. k. f. b. Cashmire.

pallidum *β*) brachybotryum Fisch., v. p. 14.

tenuifolium Turcz (non Host.) feinblätteriger, 4. f. Dahurien.

Acontias Schott, Endl., XXI. IX., Aroideae.

hastifolius Schott (= *Arum sagittifolium* Hort. Angl. = *Caladium hastifolium* Steud.), spontonblätterige, 4. w. ? Südamerika.

Digitized by Google

Acontias
helleborifolius Schott (= *Arum helleborifolium* Jacq. = *Calladium helleborifolium* Vent. v. p. 143).
variegatus Kunth (= *Caladium variegatum* Desf.), bunte, 4, w, ?

Acorus gramineus Ait. fol. luteo-marginatis van Houtte. *Acratherum miliaceum* Lk. v. Arundinella Acratherum.

Acriopsis Reinw., Spitzorche, XX. 1., Orchideae.
javanica Reinw., javanische, 4. w. Java.
picta Hort. belg., bunte, 4. w. ? Java.

Acronychia Forst, Spitznägelein, VIII. 1., Tricoccae Rutaceae.
Baueri Schott, Bauer's, ħ. k. t. ? Neuholland.
Cunninghamii Hook, Cunningham's, ħ. k. t. Neuholland.
oblongifolia Endl. (= *Cyminosma oblongifolia* A. Cunningh Hook. v. p. 243).
ovata Endl. (= *Cyminosma ovata* Hort.), eiförmige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

Acropera Lindl., Spitzstendel.
fuscata Hort. belg. (= *luteola* Hort. = ? *sulphurea* Hort.), bräunlicher, 4. w. ? Mexico.
Loddigesii Lindl. p. 866. *β*) pallida Hort. et purpurea Hort. (= *atropurpurea* Hort.).
Acrophyllum verticillatum Hook. = *venosum* Benth. = *Calycomis verticillata* D. Don, v. Weinmannia venosa p. 856.

Acropteris Lk., Spitzfarrn, XXIV. 1., Pteroideae (Polypodiaceae) septentrionalis Lk., (= *Asplenium septentrionale* Sw., v. p. 93.).

Acroptilion Cass., DC., Spitzfederchen, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.
Picris DC. (= *Centaurea Picris* Pall. = *Serratula amara* Pall. = *Serratula Picris* M. B. p. 747) *β*) obtusifolium Cass., *γ*) angustifolium Cass., *δ*) subdentatum Cass., *ε*) serratum Cass.
repens DC. (? = *angustifolium* Cass. = *Centaurea repens* L.), kriechendes, 4. f. Orient.

Acrostichum L., Vollfarrn.
brevipes Kunze (= *callaefolium* Lk. non Blum.), kurzstieliger, 4. w. Java.
callaefolium Blume, schlangenkrautblätteriger, 4. w. Java.
crassinerve Kunze (= *conforme* Lk. non Sw.), dicknerviger, 4. w. Cap, Java.
flabellatum Humb., fächerförmiger, 4. w. Neugranada.
flabellifolium Lk., fächerblätteriger, 4. w. ?
flagelliferum Wall. Bl., peitschenförmiger, 4. w. Ostind.
repandum Blume, ausgeschweifter, 4. w. Java.
scandens L. (= *Lomaria scandens* W.), klimmender, 4. Sch. w. Ostindien, (Java).
scolopendrifolium Raddi (= *fimbriatum* Hort. Angl. p. 16), hirschzungenblätteriger, 4. w. Brasilien.
acuminatum Endl., *incisum* Endl., v. Polybotrya acuminata et incisa, *aloicorne* Sw. et *grande* All., Cuna. v. Platycerium aloicorne et grande, *conforme* Sw., *Olfersia* Endl., v. Olfersia conformis et corcovadensis.
Actaea dahurica Turcz. (*pterosperma* Turcz.), v. Actinospora dahurica p. 868, *palmata* DC. (= *Hydrastis carolinensis* Walt.), v. Trautvetteria palmata p. 816, *gyrostachya* Wender. et *orthostachya* Wender., v. Cimicifuga II. Botrophis Rafin.

Digitized by Google

Actinomeris Nutt.

alternifolia DC. (*squarrosa* Nutt. p. 17), wechselblätteriges, 4. f. Nordamerika.

tetraptera DC. (= *Coreopsis alata* Cav. non Pursh = *Helianthus tetrapterus* Ortega = *Pterophyton alatum* Cass.), vierflügeliges, 4. k. Mexico.

Actinostrobus Miquel, Strahlenzapfen, XXI. x., Coniferae.

pyramidalis Miq. (= ? *Callitris pyramidalis* Sweet), pyramidenförmiger, ♄. k. t. Neuholland.

Actinotus leucocephala Benth. v. Eriocalia leucocephala. A. *minor* DC. v. Eriocalia minor Sm. p. 308. Actisia florida Hort. Erfordt. ? ?

Acyntha guineensis Medic. = Sanseviera guineensis. *Adamsia anemonoides* Fisch., *glacialis* Fisch. etc. v. Sieversia anemonoides etc. p. 755.

Adectum pilosiusculum Lk., v. Dicksonia pilosiuscula p. 262.

Adenandra Ventenatiana Hort. v. Agathosma Ventenatiana p. 28.

Adenanthera L., Drüsenstaubbeutel, chrysostachys Benth. goldähriger ♄. ♄. w. t. Mauritius, Madagascar.

Adenanthos LaBill., Drüsenblume p. 18.

Meisneri Lehm., Meisner's, ♄. t. Neuholland.

Adenesma hyssopifolium G. Don, v. Hippion hyssopifolium p. 401.

Adenocarpus DC., Drüsenhülse (frucht).

Boissieri B. Webb. (= *decorticans* Boiss.), Boissier's, ♄. ♄. k. Spanien.

graecus Griseb. (= *Cytisus divaricatus* Sm. = *Ononis ramosissima* Friwaldsky), griechische, ♄. ♄. k. f. b. Rumelien.

telonensis DC., p. 18. (= *grandiflorus* Boiss.).

Adenogramma Rchb., Drüsenfruchtknoten.

galioides Fenzl (= *Pharnaceum Mollugo* L. spec. = *Mollugo glomerata* Sering. = *Steudelia galioides* Presl = *Pharnaceum glomeratum* Thbg., p. 713), labkrautähnlicher, ⊙. f. Cap. d. g. H.

Adenophora Fisch., Drüsenträger.

cordata Tausch., herzblätteriger, 4. f. ?

verbenaefolia Bunge (= *Campanula verbenaefolia* Sieb.), eisenkrautblätteriger, 4. f. Japan.

Adenorhopium Forskohlii Pohl, *gossypifolium* Pohl, *integerrimum* Pohl, *multifidum* Pohl, *pandurae folium* Pohl, *peltatum* Pohl, v. Jatropha glandulosa, gossypifolia etc., p. 430.

Adenostyles Cass., Drüsengriffel, XIX. i., Compositae-Corymbiferae, (vergl. p. 141 et p. 871).

glabra DC. (= *alpina* Bluff et Fingerh. = *viridis* Cass. = *Cacalia alliariaefolia* Lam. = *C. alpina* Jacq. L. = *C. glabra* Vill.), kahler, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

hybrida DC. (= *Cacalia tomentosa*, β) *hybrida* Vill.) Bastard-D., 4. f. Schweiz, Frankreich, Italien.

leucophylla Rchb. (= *candidissima* Cass. = *Cacalia alpina* var. *tomentosa* All. = *C. leucophylla* W. = *C. tomentosa* Vill.), weissblätteriger, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

Petasites Bluff et Fingerh. (= *albida* Cass. = *albifrons* Rchb. = *Cacalia hirsuta* Vill. = *C. alpina* Mill. =

Digitized by Google

Adenostyles

C. albifrons L. fil. = *C. Petasites* Lam. = *C. tomentosa* Jacq.), pestilenzwurzblätteriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Adesmia DC., Freifaden, angustifolia Hook. et Arn., schmalblätteriger, ⊙. w. m. f. Chili.

Loudonia Hook. et Arn. (= *Loudonia anthyllöides* Bertero), Loudon's, ♄. k. t. Chili.

Adhadota Vasica NE. (= *pubescens* Mch. = *Gendarussa Adhadota* Steud. = Justicia Adhadota L. p. 433).

Adiantum L., Frauenhaar.

aethiopicum L. (= *trigonum* LaBill. = *tenerum* Lk., Enum.), aethiopisches, 4. w. Cap. g. H. Brasilien.

assimile Sw. (= *tenerum* Lk.).

brasiliense Lk., brasilianisches, 4. w. Brasilien.

cardiochlaena Kunze (= *polyphyllum* Kunth ? non W.), 4. w. Südamerika.

chilense Kaulf., chilesisches, 4. w. Chili.

β) glanduliferum Kunze.

concinnum Humb., Kunth, nettes, 4. w. Südamerika.

curvatum Kaulf., gekrümmtes, 4. w. Brasilien.

intermedium Sw. (= *fovearum* Raddi, *triangulum* Kaulf.), mittleres, 4. w. Südamerika.

macrodus Kaulf., Kunze (= *lucidum* Anglor.), 4. w. ?

Moritzianum Lk., Moritz's, 4. w. Caracas (zu berichtigen p. 868).

pubescens Schk. (= *plicatum* Kaulf.).

rigidum Presl (= *fructuosum* Presl, = *pulverulentum* Raddi excl. Synon.), starres, 4. w. Chili.

sulfureum Kaulf., schwefelgelbes, 4. w. Chili.

tenerum Sw. (= *assimile* Lk., Hort., Berol.).

trapeziforme L. (= *rhomboideum* Schk.).

Adolphia Meissn., Adolphie, V. 1., Rhamneae.

infesta Meisn. (= *Ceanothus infestus* H. B. K. p. 173).

Adonis Rupp., Dill., Adonisröschen.

distorta Tenore, gedrehtes, 4. f. Neapel.

intermedia Webb, mittleres, ⊙. f. Spanien, Canar. Inseln.

ircutiana Fisch. v. *sibirica*, *chaerophylla* Fisch. (= *Marschalliana* Andrz.) v. volgensis p. 20.

Adorium crassifolium Rafin. v. Seseli divaricatum.

Adysetum alpestre Sweet, *altaicum* Sweet, *argenteum* Sweet etc., v. Alyssum alpestre etc., p. 41. *Fischerianum* Sweet (= *Alyssum sibiricum* Fisch. nec W. p. 42), v. Koniga sibirica.

Aechmea R. et P., Lanzenblatt, VI. 1., Bromeliaceae.

discolor Hort. Belg., verschiedenfarbiges, 4. w. Südamerika.

fulgens Brogn., funkelndes, 4. w. Südamerika (Cayenne, Pernambuco).

Mertensii Schult. (= *Bromelia Mertensii* Meyer), Mertens's, 4. ♄. w. Südamerika (Cayenne).

paniculata R. et P., rispiges, 4. w. Peru.

Aechmophora arduennensis Spgl. v. Bromus arduennesis.

Aegialitis tenuis Trin. v. Koeleria villosa.

Aegilops L., Hartgras, triticoides Req. Lk., queckenähnliches, ⊙. f. Südeuropa.

triuncialis L. (= *echinata* Presl), langähriges, ⊙. f. Süd- und Osteuropa.

β) glabriuscula Fisch. et Mey.

ventricosa Tausch (= squarrosa W. non L.), bauchiges, ⊙. f. Kleinasien.

Digitized by Google

Aegiphila Jacq., L., Geifsstrauch, glabrata Schott., glatter, ♄. w. Brasilien.

Aegochloa eryngioides Benth. etc., v. Navarretia eryngioides (= *pusilla* H. Par.) etc.

Aegopodium L., Giersch, alpestre Ledeb. Voralpen, 4. f. Altai.

Aeluropus Trin., Katzenfüschen. III. 11., Gramineae.

arabicus Steud. (= *Calotheca arabica* Spgl. = *Festuca mucronata* Forsk. = *F. pungens* Vahl = *Triodia pungens* R. et S. = *Uralepis pungens* R. et S.), arabisches, 4. k. Arabien.

laevis Trin. (= *Agrostis pungens* Pall. = *Calotheca littoralis* Spgl. = *Dactylis distichophylla* Brign. = *D. litoralis* W. p. 249. = *D. maritima* Schrad. = *Poa pungens* MB. = *P. littoralis* Gouan. = *Festuca procumbens* Gmel. = *Triticum supinum* Schrank.), glattes, 4. f. Süd- und Osteuropa, Nordafrika.

niliacus Steud. (= *Calotheca niliaca* Spgl., *Dactylis repens* Sieb. non Dsf.), Nilbewohnendes, 4. k. Aegypten.

Smithii Steud. (= *Dactylis canariensis* N. E. = *D. fasciculata* C. Sm. = *D. Smithii* Lk. = *Poa Smithii* Kunth), Smith's, 4. k. Canarische Inseln.

villosus Trin. (= *Calotheca repens* Spgl. = *Dactylis repens* Dsf., p. 249. = *Festuca littoralis* Sibth., Lam. = *Poa repens* MB. = *Poa tunetana* Spgl.), zottiges, 4. k. f. b. Nordafrika, Griechenland.

Aeonia Lindl., Aeonie, XX. 1., Orchideae.

volucris Lindl., (*Epidendrum volucre* Pet. Thouars), flügelförmige, 4. w. Madagascar, Mascarenas.

Aeonium B. Webb et Berthelot, Ewiggrün, XI. VII., Corniculatae - Crassulaceae.

cruentum B. Webb, blutrothes, 4. ♄. k. Canarische Inseln.

Youngianum B. Webb, Young's, 4. ♄. k. Canarische Inseln.

Aerides, Sw. Luftstendel.

Brockesii Lindl., Brockes's, 4. w. Ostindien.

crispum Wall. (*Brookeii* Hort.), krauser, 4. w. Ostindien.

maculosum Lindl., gefleckter, 4. w. Ostindien.

obtusum Lindl., stumpfer, 4. w. Java.

quinquevulnerum Hort., Belg. fünffleckiger, 4. w. Ostindien.

violaceum Hort., Belg. violetter, 4. w. Ostindien.

virens Lindl., grüner, 4. w. Ostindien (Java).

odoratum Lindl., ? = cornutum Roxb. p. 21, *tesselatum* Wight = Vanda Roxburghii p. 736.

Aërva Forsk., (arabischer Name), Monsonia Mart. (= *Achyranthes Monsonia* P. = *Achyr. pungens* Lam. = *Celosia Monsoniae* Retz. = *Illecebrum Monsoniae* L. fil.), Monson's, ⊙. m. w. Ostindien.

Aeschynanthus Jack., Schammaske, XIV. 11., Personatae - Cyrtandreae.

acuminatus Wall., zugespitzte, ♄. w. Ostindien.

Boschianus Hort., Belg. Boschian's, ♄. w. Ostindien.

grandiflorus Spgl., (= *parasiticus* Wall., *Incarvillea grandiflora* Hort. = *Incarvillea parasitica* Roxb. = *Trichosporum grandiflorum* Don), v. p. 868,

Horsfieldii RBr., Horsfield's, ♄. w. Java.

longicaulis Wall., langstengliche, ♄. w. Ostindien.

longiflorus Wall., langblumige, ♄ w. Ostindien.

maculatus Lindl., gefleckte, ♄. w. ? Ostindien.

radicans Jack., wurzelnde, ♄. w. Ostindien.

Digitized by Google

Aeschynanthus
ramosissimus Wall. (*parasiticus* Hort.), ästige, ħ. w Ostindien.
Roxburghii Wall. (*grandifolius* et *macrophyllus* Hort.), Roxburgh's, ħ. w. Ostindien.
volubilis Jack., windende, ħ. Sch. w. Sumatra.
oblongifolius G. Don, v. Babactes oblongifolia.

Aeschynomene L., Schampflanze.
rosea Brotero, rosafarbige, ⊙. ħ. w. Brasilien.
versicolor Wender, buntfarbige, ⊙. w. ? Mexico.
sericea Hort. = ? Sesbania sericea p. 749.

Aesculus L., Roßkastanie.
chinensis Bunge, chinesische, ħ. f. Nordchina.
carnea W. (= *rubicunda* Loisel. (= *Pavia carnea* Spach), p. 22).
Watsoniana Spach (= *carnea* Wats. = *rubicunda* Lindl., Lodd.), Watson's, ħ. f. Nordamerika.
humilis Lindl., v. Pavia humilis.

Aetheilema RBr., Aetheileme XIV. 11., Acanthaceae.
imbricatum RBr. (= *Phaylopsis imbricata* Swt. p. 614, = *Blechum anisophyllum* Juss. = *Ruellia dorsiflora* Retz. = *Ruellia imbricata* Forsk.).
rigidum Bartl., starre, ħ. w. Westindien.
Aetheorrhiza bulbosa Cass. (= *Hieracium bulbosum* W. = *Leontodon bulbosus* L. = *Prenanthes bulbosa* DC. = *Taraxacum bulbosum* Rchb.), v. Crepis bulbosa, p. 230.
Aetheria occulta Lindl., v. Goodyera occulta (= *Platylepis goodyeroides*).

Aethionema RBr., Steintäschel, heterocarpum Gay, verschiedenfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.
leptocarpum DC., schlankfrüchtiges, ⊙. f. ?
persicum Hort., persisches, ♂. f. Persien.
A. Diastrophis Bunge, v. Diastrophis cristata, p. 261.
Aethusa Ammi Spgl., v. Helosciadium leptophyllum.

Aganippea Moç., Sess., Aganippea, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
dentata DC, gezahnte, ⊙. f. Mexico.

Aganisia Lindl., Aganisie. XX. 1., Orchideae.
pulchella Lindl., schöne, 4. ħ. w. Demerara.
gladiifolia Hort., v. Angraecum gladiifolium.
Aganosma caryophyllata G. Don, v. Echites caryophyllata.

Agapanthus umbellatus L'Her., p. 22, var. *maximus* Hort. = umbell, β) multiflorus.

Agapetes G. Don, Agapete X. 1., Vaccinieae.
arborea DC. (= *Vaccinium arboreum* Leschen.), baumartige, ħ. t. Ostindien.
coriacea Don (= *Arbutus coriaceus* Blume, *Thibaudia coriacea* Blume), lederartige, ħ. ħ. t. Java.
lucida Don (*Thibaudia lucida* Blume), glänzende, ħ. ħ. t. Java.
setigera Don (= *Thibaudia setigera* Wall.), borstentragende, ħ. ħ. t. Ostindien.

Agarista DC., Agariste, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
calliopsidea DC., calliopsisähnliche, ☺. f. Californien.
Agarista buxifolia G. Don etc., v. Leucothoe buxifolia etc., p. 460 etc.
Agassizia cheiranthifolia Spach., v. ? Sphaerostigma cheirantifolium p. 777.

Digitized by Google

Agathaea Cass., Bläuling.

Bergiana DC. (= *Cineraria Bergiana* Spgl., *Detridium Bergianum* N. E., *Elphegea Bergiana* Less., *Kaulfussia amelloides* Eckl.), Bergin's, ⊙. f. Cap. der gut. Hoffn.

spathulata Kunze, spatelblätteriger, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

strigosa N. E. (= *Aster Charicis* Less., *Aster strigosus* Lichtenst. non Thbg.), *Kaulfussia strigosa* Spgl. fil. = *Leyssera ovata* Thbg.), striegeliger, k. k. Cap der guten Hoffnung.

tenera DC., zarter, ⊙. f. Cap der gut. Hoffn.

*tenella** v. Felicia tenella.

Agathelepis Choisy, Agathelepe H. r., Globularia-ceae-Selagineae.

angustifolia Choisy (= *Selago angustifolia* Thbg. p. 740, = *Eranthemum angustifolium* L.)

parvifolia Choisy (= *Eranthemum parvifolium* L. = *E. parviflorum* Berg.), kleinblätterige, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

Agathophytum bonus Henricus Moq. Tand., v. Chenopodium bonus Henricus.

Agathosma W., Wohlgeruch.

Bartlingiana Eckl. Zeyh. (*Thunbergiana* Bartl. et Wendl.), Bartlings, ♄. k. t. Cap der gut. Hoffn.

teretifolia G. Don (= ? *Diosma teretifolia* Lk. p. 267), stielrundblätteriger, ♄. k. t. Cap der g. Hoffn.

thyoides Eckl. Zeyh., G. Don, (*A. erecta, δ. glaberrima* Schltdl.), lebensbaumähnlicher, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Thunbergiana Schltdl. (nec Bartl. et Wendl.), (= *Diosma ciliata* Thbg. = *Diosma Thunbergiana* Spgl.), Thunberg's, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lasiophylla G. Don, v. A. villosa *p.* 23.

Agave L., Amerikanische Aloe.

1. **Agave.**

americana L., γ) foliis strictis.

atrovirens Karwinsky.

attenuata H. Berol., Salm Dyck, verschmälerte, 4. t. k. Mexico.

bromeliaefolia Salm Dyck, bromelienblätterige, 4. t. k. Mexico.

bulbifera Salm Dyck, zwiebeltragende, 4. t. k. Mexico.

chloracantha Hort., grünstachlige, 4. t. Südamerika.

Commelini Salm. Dyck, (*Aloe americana tuberosa minor* Commel.), Commelin's, 4. t. k. Mexico.

filifera Salm Dyck, fadentragende, 4. t. k. Mexico.

glabra Karwinsky, kahle, 4. t. k. Mexico.

heteracantha Zuccar., verschiedenstachlige, 4. t. k. Mexico.

hexapetala Jacq., sechskronenblätterige, 4. t. Südamerika.

Karwinskyi, Zuccar., Karwinsky's, 4. t. k. Mexico.

latifolia Karwinsky.

longifolia Hort., langblätterige, 4. t. Südamerika.

lophantha Schiede.

lurida Jacq., Ait. (= *mexicana major* H. Par. = *A. vera crux* Mill.).

macracantha Zuccar.

Martiana Zuccar., Martius's, 4. t. Südamerika.

mexicana Lam. (= ? *bulbifera* Bonpl. = ? *Mangui* Dsf.).

micracantha Hort., kleinstachlige, 4. t. Südamerika.

Milleri Haw. (= *virginica* Mill.).

polyanthoides Schiede, vielblumige, 4. t. k. Mexico.

Digitized by Google

Agave
potatorum Zuccar.
pugioniformis Zuccar. (= ? *Karwinskyi* Zuccar.), dolchförmige, 4. t. k. Mexico.
pulcherrima Otto, schönste, 4. t. k. Mexico.
pulchra Hort. Monac., schöne, 4. t. k. Südamerika.
punctata Hort. Berol., punktirte, 4. t. k. Mexico.
rubescens Salm Dyck (= *flaccida* Hort. Monac. = ? *bromeliaefolia* Salm), röthliche, 4. t. k. Mexico.
Scolymus Karwinsky, distelförmige, 4. t. k. Mexico.
serrulata Karwinsky, sägezähnige, 4. t. k. Mexico.
sobolifera Salm Dyck, sprossende, 4. t. Westindien, ? Mexico.
spicata Cavan., ährenförmige, 4. t. Havanna.
striata Zuccar. (= *Bonapartea juncea* Hort. non W.), gestreifte, 4. t. Mexico.
teoxomuliana Karwinsky, teoxomulianische, 4. t. k. Mexico.
vivipara L. (= *A. Theometel* Zuccar.).
xylinacantha Salm, 4. t. k. Mexico.
yuccaefolia Redout., W. (= *spicata* Guss.).
Yxtli Karwinsky, Yxtli-A, 4. t. k. Mexico.

II. **Littaea** Brignol. (Tagliab.).
brachystachys Cavan. (= *spicata* DC.), kurzährige, 4. t. k. Mexico.
geminiflora Brandes, Ker, (= *Bonapartea juncea* W. E., *B. flagelliformis* Henkel, *Dracaena Boscii* Hort. Cels., *Dracaena filamentosa* Scanagata, *Littaea geminiflora* Brign., *Yucca Boscii* Dsf.).

Agenora laevigata Don, v. Seriola laevigata.

Aglaonema Schott, Blume, Endl., Glanzfaden, XXI. IX., Aroideae.
princeps Kunth. (= *Caladium princeps* H. Berol.), fürstliche, 4. ♄. w. ?
simplex Blume (= *integrifolium* Schott. = ? *oblongifolium* Schott. = *Caladium simplex* Blume = *Arum integrifolium* Hort., Anglor., Hort., Berol., p. 85), einfacher, 4. ♄. w. Java.
marantaefolium Blume, oblongifolium Blume et pictum Blume et pygmaeum Hasskarl, in Ostindien heimisch, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Agnistus Auctor., v. Acnistus.

Agnostus Cunningh., p. 24.
heterophylla Hort., Belg., verschiedenblätterige, ♄. t. Neuholland.

Agonis flexuosa DC., *hypericifolia* Schauer, *linearifolia* DC., *marginata* DC., v. Billotia flexuosa etc. *Ageoseris cuspidata* Rafin. et *glauca* Rafin., v. Troximon glaucus et cuspidatus.

Agraphis Lk. (*Limonanthe* Lk.), Sternhyacinthe, VI. 1. Coronariae-Asphodeleae.
azurea (Goldb.), brevifolia (Ker.), campanulata Lk. (= *Scilla Jacquini* Gmel. = *S. hispanica* Mill.), cernua Rchb. (= *Scilla nutans* var. Sm., *S. non scripta, β. flore incarnato* Bot. Mag. = *Hyacinthus belgicus* Hort. = *cernuus* L. spec.), a) praecox, b) serotina F. et Mey., nutans Lk. (= *Scilla festalis* Salisb. = *Hyacinthus non scriptus* L. = *H. nutans* Hort. = *H. pratensis* Lam. = *Usteria hyacinthiflora* Medic. = *Endymion nutans* Dumort. = ? *Hyacinthus spicatus* Mch.), patula Rchb. (= *Hyacinthus patulus* Dsf. = *H. amethystinus* Lam. = *H. cernuus* var. *carneus*

Digitized by Google

Agraphis
Ait. = ? *H. spicatus* Mch. = *Endymion patulus* Dumort.) = *Scilla azurea* etc., p. 732 et p. 885.
Agretta crispa Eckl., v. Ixia crispa, *pentandra* Eckl. et *retusa* Steud., v. Ixia scillaris, retusa.
Agricolaea fragrans Schrk., v. Clerodendron fragrans.

Agrimonia L., Odermennig.
acutifolia Dumort., spitzblätteriger, 4. f. Belgien.
α) discolor, *β*) laevigata, *γ*) pallida.
canescens Dumort., grauer, 4. f. Belgien.
Eupatoria L. (= *grandis* Andrzy, *officinalis* Lam.), *α*) rotundifolia, *β*) longifolia (= *minor* Mill.).
gryposepala Wallr. (= *parviflora* Auct. nec Ait.), kleinkelchiger, 4. f. Pensylvanien.
humilis Wallr., niedriger, 4. f. Dalmatien.
incisa Torr. et Gr., schlitzblätteriger, 4. f. Carolina, Georgia, Florida.
leucantha Kunze (= *striata* Hort. Angl. non Mchx.), weifsblumiger, 4. f. ?
microcarpa Wallr. (= *parviflora* Auct.), kleinfrüchtiger, 4. f. Pensylvanien, Georgien.
nepalensis D. Don (= *lanata* Wall. = *Eupatoria* Thbg.).
odorata Camer., Mill. (= *suaveolens* Auct. nec Pursh ? = *elata* Mch.).
pilosa Ledeb. (= *dahurica* W. = *glabrata* Spgl. = *A. Gostetiana* Andrzy. = *conopsea* Tschernaj = *A. Eupatoria var. dahurica* Fisch.). „A Livonia usque ad Dahuriam" C. A. Mey.
platycarpa Wallr., breitfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.
procera Wallr. (= *repens* Mutel, = *odorata* Lej.), hoher, 4. f. Deutschland.
pubescens Wallr., feinhaariger, 4. f. Nordamerika.
rostellata Wallr., geschnäbelter, 4. f. Pensylvanien.
sessiliflora Dumort, stiellosblumiger, 4. f. Belgien.
sororia Fisch. et Mey., verschwisterter, 4. f. Iberien.
stipularis Dumort., zwischenblätteriger, 4. f. Belgien.
viscidula Bunge, schmieriger, 4. f. Nordchina, Nepal.
Nachverzeichnete werden wahrscheinlich nicht kultivirt, als: Blumei G. Don, Java Japan, bracteata E. Mey. (= ? *repens* Eckl. et Zeyh.), Cap der gut. Hoffn., caffra E. Mey., Cap. d. g. Hoffn., hirsuta Bongard, Brasilien.
serrifolia Wallr. = parviflora Ait., *striata* Mchx. = ? parviflora Ait.

Agriophyllum M. B., Wildblatt, I. 11., Aizoideae-Amarranthaceae.
pungens Lk. (= *arenarium* M. B. = *Corispermum pungens* Vahl, p. 219 = *squarrosum* Stev.).
Agrostemma apetala G. Don, *brachypetala* G. Don, *corsica* G. Don, *flos cuculi* G. Don, etc., v. Lychnis apetala etc., *A. Banksia* Meerb., v. Lychnis grandiflora, *parviflora* Hort. (*laeta* G. Don), v. Lychnis laeta, *perennans* Dens., v. Lychnis Densoni, p. 883.

Agrostis L., Straufsgras.
alpina Scop., *β*) flavescens Host (= *versicolor* Hoppe non Stev.).
Cornucopiae Fras. (= *anomala* W., p. 25 = *A. Michauxii* a Trin., *Trichodium decumbens* Mchx. = *Alopecurus carolinianus* Spgl.).
effusa Spgl. (= *alopecuroides* Lk. = *anemagrostoides* Trin. = *pallida* DC. = *Pourretii* W. = *Agrostis*

Digitized by Google

Agrostis

anemagrostoides Trin. = *Alopecurus effusus* Lk. = *Trichodium effusum* Lk.), weitschweifiges, ⊙. f. Italien, Frankreich, Portugal.

glaucina Bast. (= *Trichodium glaucinum* R. et S.), blaugrünes, 4. f. Frankreich.

lachnantha Nees. (= *Podosaemum lachnanthum* Nees.), Cap der guten Hoffnung, p. 25.

laxiflora Richards. (= *A. Cornucopiae* Lam., *laxa* Schrb. p. 25, *Michauxii*, *β*) Trin. = *scabra* W. = *Trichodium laxum* Schult., *T. laxiflorum* Mchx., *T. Mühlenbergianum* Schult., *T. scabrum* Mühlbg.).

maritima Lam. (= *alba* L., var. Trin., *arenaria* Gouan = *Milium maritimum* Clement. = *Vilfa maritima* P. B.), Meerstrand's, 4. f. Südfrankreich.

mucronata Presl, stachelspitziges, ⊙. f. ? Sicilien.

nitens Guss. (= *Lachnagrostis nitens* Trin. = *Triplachne nitens* Nees.).

salmantica Kunth. (*Trichodium salmanticum* Lagasc.), spanisches, ⊙. f. Spanien.

Schultesii Kunth. (= *canina* var. Trin. = *pannonica* Hort. = *Trich. neglectum* Schult.), Schultes's 4. f. Ungarn.

Tenorii Otto, Tenore's, 4. f. Italien.

verticillata Vill. p. 25, (*condensata* W. = ? *decumbens* Gaud. = *densa* M. B. = *refracta* Mch. = *Vilfa densa* P. B. = *V. stolonifera* et *verticillata* et *Villarsii* P. B.).

vulgaris Wither. (= *capillaris* Schkr., *tenella* Hoffm., *intermedia* Balb. = *pumila* L. = *versicolor* Hort.). *Cinna* Lam., v. Cinna arundinacea, *Cinna* Retz (= *mexicana* L.), v. Cinna mexicana, *dispar* Mchx., v. Sporobolus dispar, *dispar* Hort., Par., v. Piptatherum multiflorum, *gallica* Hort. (*gallecica* Hort.), v. Airopsis agrostidea, *glutinosa* Fisch., v. Melinis minutiflora p. 883, *latifolia* Otto = ? Agrostis alba, *β*) *Michauxii* Hort., (= *dubia* Hort., *longiseta* Hort. = *triflora* Hort., Hafn.), v. Chaeturus fasciculatus, *minima* L., v. Mibora verna, *monspeliensis* Auct., v. Polypogon monspeliensis, *pallida* Hoffm., Schkr. = cauina, *pallida* Wither. = alba, *paniculata* Hort. Madr. = Mühlenbergiae species, *pauciflora* Pursh (= *oligantha* R. et S.) = Mühlenbergia Willdenowii var., *retrofacta* W., v. Calamagrostis retrofracta, *suaveolens* Blytt, v. Blyttia s., *trichodes* R. et S., v. Sporobolus trichodes, *vernalis* Hort. Dorpat. = alba, *versicolor* Stev. = Colpodium Steveni, vinealis Schlchr. = canina, *vinealis* Schreb. = alba.

Aichrysum Webb et Berthel., Immergold, XI. VII., Corniculatae-Crassulaceae.

pulchellum C. A. Meyer, schönes, ♄. k. t. Canar. Inseln. *Aira atropurpurea* Wahlbg. (= *A. Pinkeneyi* Bigelow. = *Avena atropurpurea* Lk., p. 107), v. Vahlodea atropurpurea Fr.

Airopsis Desv., agrostidea DC. (= *A. Candollei* Desv., p. 26, = *Aira elegans* Vill. = *minuta* Loisel. = *Catabrosa agrostidea* Presl = *Milium galecicum* R. et S. = *Poa agrostidea* DC.), globosa Desv. (= *Agrostis tenella* Poir. = *Paspalum globosum* Rasp.).

Aizoon L., Zaserling.

secundum L., fil. einseitiger, 4. k. Cap der g. Hoffn.

Digitized by Google

Aizoon

stellatum Lam., sternförmiger, ♄. k. Cap der g. Hoffn.

tomentosum Lam. (= ? *rigidum* L. fil.), filziger, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

canariense Andr. non L., v. Sesuvium Portulacastrum, p. 750.

Ajax Salisb., Haw., v. Narcissus I. p. 539.

Ajuga L., Günsel.

acaulis Brocchi, (= *decumbens* Tenor., *Tenorii* Presl), stengelloser, 4. f. Süditalien.

alpina L., (*genevensis* var. Auct.), Alpen-G., 4. f. Nord- europäische Alpen[1]).

bracteosa Wall. (*hyoscyami* Wall. = *integrifolia* Don, p. 27).

glabra Presl, kahler, ☉. f. Sicilien, Syrien.

Laxmanni Benth. (= *Teucrium Laxmanni* Murr. p. 803, = *Phleobanthe Laxmanni* Tausch.).

oblongata M. B. (*salicifolia* Stev. non Schreb.).

Alaternus angustifolia Mill. (= *hispanica* et *rotundifolia* Hort.) = Rhamnus Clusii, *balearica* Duham. (= *latifolia* Mill. = *Phylica* Mill.) = Rhamnus Alaternus, p. 681.

Albersia Blitum Kunth, *oleracea* Endl., *polygonoides* Endl. (= *Roemeria polygonoides* Mch.), v. Amaranthus Blitum etc.

Albertinia Spgl. (v. Albertini, Mykolog.), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (Vernoniaceae).

brasiliensis Spgl., brasilianische, ♄. t. w. Brasilien.

capitata DC. (= *Conyza capitata* Spgl. = *Vernonia incanescens* Mart.), kopfförmige, ♄. t. w. Brasilien.

polycephala DC. (= *multiflora* Mart.), vielköpfige, ♄. t. w. Brasilien.

Albizzia Durazzini, Benth., (Albizzi italienischer Naturforscher), XVI. VII. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimos.

lebeckioides Benth. (= *Acacia lebeckioides* DC.), lebeckiaähnliche, ♄. w. Ins. Timor.

Neumanniana* (= *Acacia Neumanniana* H. Berol.), Neumann's, ♄ ♄. t. ?[2]) Neuholland.

amara Benth., fulgens Benth., granulosa Benth. (= *Acacia muricata* W. A., *granulosa* LaBill.), Julibrissin Durazzini, Benth., Lebbeck Benth., lophantha Benth., Nemu Benth., procera Benth., speciosa Benth., stipulata Benth. = *Acacia amara, fulgens, Julibrissin* etc. p. 1. seq.

Folgende neue Arten werden noch nicht kultivirt, als: A. elata Benth. (= *Acacia elata* Grah.), Isembergiana Benth., marginata Benth. (= *Acacia marg.* Hamilt.), mollis Benth. ♄. Ostind., myriophylla Benth. (= *Acacia myriph.* Grah.), Smithiana Benth. (Wall.), Wightii Benth. (= *Acacia Wightiana* Grah. = *A. amara* Wight. = *A. Wightii* Wight, Arn. = *Mimosa pulchella* Roxb.), ♄. Ostindien.

Albuca L., Weissblume (Stiftblume).

cornuta Dsf., Redout. (= ? *alba* Lam.), gehörnte, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

longifolia Fisch., langblätterige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

---

1) Nach Fries v. A. genevensis L. verschieden.

2) Wahrscheinlich Varietät oder Hybride von Albizzia (*Acacia*) lophantha.

Digitized by Google

Albuca

maxima Don, gröfste, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

parviflora Don, kleinblumige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

exuviata Ker (= *Anthericum exuviatum* Jacq.), *filifolia* Ker (= *Anthericum filifolium* Jacq.), *fugax* Ker (= *Anthericum fragrans* Jacq.), v. Ornithogalum exuviatum, filifolium et fragrans, *nematodes* Sweet (= *Anthericum filifolium* Thbg.), v. Ornithogal. Thunbergii, *vittata* Ker, v. Ornithogalum vittatum.

Albucea nutans Rchb. = Ornithogalum II. nutans, p. 569.

Alcanna spinosa G. = Lawsonia spinosa, p. 450.

Alchemilla Löwenfufs, Frauenmantel.

fissa Schum., Günth. (= *hybrida* Schleich. = *minor* Host., *palmatifida* Tausch, *pyrenaica* Duf., *vulgaris glabra* DC. = *conjuncta* Babingt.).

vulgaris L. (= *glaberrima* Schmidt = *glabrata* Tausch = *multicaulis* Tausch = *palmata* Gilib. = *pratensis* Schmidt = *sylvestris* Schmidt = *truncata* Tausch.), δ) iberica Fisch. et Mey. Vergl. p. 28.

Alectorolophus Hall., Klaffer.

buccalis* (= ? *Reichenbachii* Drejer = *Rhinanthus buccalis* Wallr.), aufgeblähter, ⊙. f. Deutschland.

hirsutus All. (= *Rhinanthus Alectorolophus* Poll. = *hirsutus* Lam. = *villosus* P. = *grandiflorus*, *β*) *pubens* Wallr. = *Crista galli*, *γ*) L. spec.).

major Rchb. (= *glaber* All. = *Rhinanthus glaber* Lam., *R. Crista galli* L. var.), *β*) alpestris Wahlbg. (= *pulcher* Schummel).

Aletris L., Hyacinthaloe.

farinosa L. (= *alba* Mchx. = ? *Wurmbea bullata* W.), mehlige, 4. k. f. b. Nordamerika.

japonica Lamb. (= *farinosa* Thbg. = *Hypoxis spicata* Thbg.), japanische, 4. k. Japan.

pumila Ait., *sarmentosa* Andr., *Uvaria* L. v. Kniphofia pumila, sarmentosa et aloides.

Aleurites Forst., Mehlbaum.

laccifera W. (= *Croton lacciferum* L. = ? *Croton aromaticum* var. L.), milchender, ħ. w. Ostindien.

moluccana W. (= *Jatropha moluccana* L.) = triloba p. 28[1]).

Alfredia cernua Cass. = *Silybum cernuum* G., p. 760.

Algarobia Benth., Algarobie X. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

juliflora Benth. (= *Prosopis juliflora* DC., p. 658. = *Acacia juliflora* W. = *Mimosa piliflora* Sw.).

Alhagi T., Mannapflanze.

kirgisorum Schrenk, C. A. Mey., Kirgisen-M., 4. ħ. k. Asiat. Rufsland.

camelorum Fisch. et Mey. (= *A. Pseudalhagi* Desv. = *Hedysarum Pseudalhagi* MB. = *Manna caspica* Don).

A. maurorum T. DC. (= *mannifera* Desv. = *Hedysarum Alhagi* L. = *Manna hebraica* Don), v. p. 29.

Alicteres carthagenensis Schott., v. Helicteris carthagenensis.

---

1) Alexandra Imperatricis Sohomburgk (zu Ehren Ihrer Majestät der Kaiserin von Russland benannt), Papilionaceae. Grosser schöner Baum aus Guiana, wird noch nicht kultivirt.

Digitized by Google

Alipea foliosa Hoffmsg., v. Sturmia foliosa.
Alkanna tinctoria Tausch, v. Anchusa tinctoria p. 53.
Alkekengi fissum Mch. = Physalis viscosa, *A. officinarum* Mch. = Phys. Alkekengi, *A. procumbens* Mch. = *villosa* Mch. = Physalis pubescens p. 621.
Allaganthera Forskohlei Mart. = Alternanthera sessilis.
Allagopappus dichotomus Cass., v. Jasonia dichotoma, p. 880.

Allamanda L., Aubletii Pohl (= *cathartica* plur. Auctor. = *grandiflora* Lam. = Echites *salicifolia* R. et S. = *Orelia grandiflora* Aubl.), Aublet's, ħ. w. Guiana.
Linnaei Pohl, (= *cathartica* L. non Auct.), Linné's, ħ. w. Brasilien.
Schottii Pohl (= *brasiliensis* Schott = *cathartica* Schrad.), Schott's, ħ. w. Brasilien.

Allionia L.
albida Walt. (= *aggregata* Spgl. = *Calymenia aggregata* P. = *C. albida* Nutt. = *Calyxhymenia aggregata* Orteg.), weifsliche, ⊙. f. Carolina, Neuspanien. Vergl. p. 28.
Cervantesii Steud. (= *Calyxhymenia Cervantesii* Dsf.), Cervante's, 4. ħ. k. ?
cucullata C. A. Mey., kappenförmige, 4. f. k. ?

Allium T. L. Lauch.
acre Presl, scharfer, 4. Zw. Sicilien.
acuminatum Hort., zugespitzter, 4. Zw. f. ?
acutangulum Schrad. (= *angulosum* plur. auct. = *triquetrum* Hort.) b. flore albo.
adscendens Tenore, aufsteigender, 4. Zw. f. Neapel.
amethystinum Tausch, amethystfarbiger, 4. Zw. f. Dalmatien.
Ampeloprasum L., β) margaritaceum Mch. ? (= *neglectum* Wender.), p. 29.
arvense Guss. (= *candidum* Presl), Acker, 4. Zw. f. Sicilien.
atrosanguineum Karelin et Kirilow, blutrother, 4. Zw. f. Asiat. Rufsland.
azureum Ledeb. (= *coeruleum* Auct.), azurblauer, 4. Zw. f. Altai.
caespitosum Sievers, rasenartiger, 4. Zw. f. Sibirien.
cardiostemon Fisch. et Mey., herzfadiger, 4. Zw. f. Armenien.
caricifolium Karelin et Kirilow, seggenblätteriger, 4. Zw. f. Asiat. Rufsland.
caucasicum M. B. (= *globosum* Redout. = *savranicum* Bess.), caucasischer, 4. Zw. f. Caucasus.
coeruleum Pall.[1]), (*coerulescens* Don), blauer, 4. Zw. f. Sibirien.
collinum Guss., Hügel-L., 4. Zw. f. Calabrien.
Coppoleri Tineo (= *parviflorum* Guss. nec L. = *australe* Guss.), Coppoleri's, 4. Zw. f. Calabrien, Sicilien.
cornutum Clementi, gehörnter, 4. Zw. f. Dalmatien.
crinitum Tausch, bemähnter, 4. Zw. f. Oesterreich.
Cupani Rafin. (= *moschatum* L. var. Jan. ? = *tenuiflorum* Tenor.), Cupani's, 4. Zw. f. Sicilien.

---

1) Vergl. Endlicher Catalogus horti academici Vindobonensis. Vol. I. p. 137. Nach andern Schriftstellern wird A. coeruleum Pall., zu A. azureum Ledeb., citirt.

Digitized by Google

Allium

Cyrilli Tenore (= *fragrans* Cyrill.), Cyrillo's, 4. Zw f. Neapel.

declinatum Rchb., niedergebogener, 4. Zw. f. ?

denudatum Redout., nackter, 4. Zw. f. ?

Erdelii Zuccar., Erdel's, 4. Zw. k. Palästina.

fallax Don, Schult. (= *anguloscum* All. et *senescens* auct. non L. = *narcissifolium* Vill. = *montanum* Schm. = *serotinum* Schleich. = *acutangulum*, β) *montanum* M. et K. et γ) *calcareum* M. et K.), trügerischer, 4. Zw. f. Mitteleuropa.

Fischerii Sweet (non Bess.), Fischer's, 4. Zw. f. Sibirien.

fissile G. Don, Sweet, gespaltener, 4. Zw. f. Kleinasien.

fistulosum L., β) ceratophyllum Ledeb., Fisch. et Mey., Bess. (p. 30), γ) altaicum Pall., Fisch. et Mey.

flavescens Bess. (= *albidum* MB. non Fisch. = *ammophilum* Heuff.), gelblicher, 4. Zw. f. Taurien, Volhyn.

flavum L., β) ruthenicum Lang (= var. *tauricum* Rchb.), (p. 30).

Frivaldszkyanum Kunze (= *margaritaceum* Frivalds. nec Sm.), Frivaldsky's, 4. Zw. f. Macedonien.

galanthum Karel. et Kiril., milchweifsblumiger, 4. Zw. f. Asiat. Rufsland.

glandulosum Lk. et Otto (= *longifolium* Lindl. non Humb. Boupl.), drüsiger, 4. Zw. k. Mexico.

globosum MB. (= *tauricum* Pall.).

graminifolium Loisel., grasblätteriger, 4. Zw. f. Corsica.

hirsutum Zuccar. (non Lam.), rauhhaariger, 4. Zw. k. f. b. Palästina.

indoriense Fisch., uralischer, 4. Zw. f. Ural.

infestum Brotero, unangenehmer, 4. Zw. f. ?

kermesinum Rchb., kermesinfarbiger, 4. Zw. f. Oberkrain.

laxiflorum Tausch, lockerblumiger, 4. Zw. f. Böhmen.

Ledebourianum R. et S. (= *uliginosum* Ledeb., p. 32, non Don), Ledebour's, 4. Zw. f. Rufsland.

lepidum Hort., Berol., (= *saxatile* Hohenack. non MB.), schilferiger, 4. Zw. f. Altai.

longicaule Hornem., langstenglicher, 4. Zw. f. Nordamerika.

longispathum Redout. (= *pallens* Ker, = *fuscum* et *paniculatum* Auct.), langscheidiger, 4. Zw. f. Frankreich, Ungarn, Podolien.

macrostemon Bunge, grofsfadiger, 4. Zw. f. b. Nordchina.

margaritaceum Sibth., Sm. (= *stenopetalum* Guss.), perlfarbiger, 4. Zw. f. Griechenland, Süditalien, Dalmatien.

monadelphum Turcz., einbrüderiger, 4. Zw. f. Sibirien.

moschatum L., β) majus (= *setaceum* W. K.).

neapolitanum Cyrill. (= *album* Savi = *candidissimum* Cav., *lacteum* Sib. Sm., *liliifolium* Zeyh. = *amblyopetalum* Lk.), p. 30.

nebrodense Guss., nebrodischer, 4. Zw. f. Sicilien.

oreophilum C. A. Mey., steinliebender, 4. Zw. f. Caucasus.

permixtum Guss., gemischter, 4. Zw. f. Sicilien.

persicum Fischer, persischer, 4. Zw. f. Persien.

petraeum Karelin et Kirilow, felsenliebender, 4. Zw. f. Asiat. Rufsland.

polyanthum Schult. (= *multiflorum* Lam.), reichlichblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich.

polyphyllum Karel. et Kiril., vielblätteriger, 4. Zw. f. Asiat. Rufsland.

polyrrhizon Turcz., vielwurzeliger, 4. Zw. f. Sibirien.

Digitized by Google

Allium

praescissum Rchb., abgestutzter, 4. Zw. f. Sibirien.

prostratum Trevir. (= *cernuum* Hort. = *Fischeri* Bess. = *deflexum* Fisch.), p. 31.

pulchellum G. Don (= *carinatum papuliferum* Jan. = *coloratum* Spr. = *paniculatum* Redout.), p. 31.

Purshii G. Don (= *vineale* Pursh = *canadense* Hortul.), p. 31.

pusillum Cyrill. (= *capillare* Dsf. = *maritimum* Rafin.).

pylium H., Genuens. Pforten-L., 4. Zw. f. ?

robustum Karel. et Kiril., kräftiger, 4. Zw. f. Songaria.

Rothii Zuccar., Roth's, 4. Zw. k. f. b. Palästina.

rotundum L., β) Waldsteinianum G. Don, R. et S., p. 32, (= *Ampeloprasum* W. K. = *A. Ampeloprasum*, β) *latifolium* Bess.), γ) tauricum, δ) scariosum, Jan.

rubens Schrad. (= *bisulcum* Redout., p. 29, = *Stellerianum* Ledeb. = *Fischeri* H. Berol.), röthlicher, 4. Zw. f. Altai.

sativum L., p. 31, β) kirghisorum Hort. Dorpat.

Schmidtianum Tausch, Schmidt's, 4. Zw. f. ? Böhmen.

Schoenoprasum L., p. 31, (= *riparium* Opitz = ? *tenuifolium* Salisb.), γ) reflexum Dietr.

segetum Jan., Saat-L., 4. Zw. f. Sicilien.

senescens L., p. 31, (= *glaucum* Schrad., *canescens* Hort., *baicalense* W. E. = *illyricum* Lk. et Otto = *purpureum* Salisb. = *spurium* Hort. = *narcissifolium* Scopol. = *longicaule* et *trisculcum* Hort.).

sphaerocephalum L., p. 31, (= *descendens* Bot. Mag. = *atroviolaceum* Hornem. = *lineare* Tenor. = *veronense* Poll.).

Stellerianum W., Steller's, 4. Zw. f. Sibirien.

sulcatum DC., gefurchter, 4. Zw. f. ?

tenuiflorum Tenore, dünnblumiger, 4. Zw. f. Neapel.

β) major Kunth (= *paniculatum* Tenore).

tenuissimum W., dünnster, 4. Zw. f. Sibirien.

Tineï Presl, Tineo's 4. Zw. f. Sicilien.

triste Kunth et Bouché, trauernder, 4. Zw. f. ? Orient.

tulipaefolium Ledeb. (= *decipiens* Fisch. = *nigrum* MB.), tulpenblätteriger, 4. Zw. f. Altai.

uliginosum G. Don (= *angulosum* Lour. = *senescens* Thbg.), Sumpf-L., 4. Zw. k. Japan, China.

vernale Tineo, Frühling's, 4. Zw. f. Sicilien.

violaceum Willd. suppl. (= *flexum* Rchb.), violetter, 4. Zw. f. Croatien.

viridulum Ledeb., grünlicher, 4. Zw. f. Sibirien.

Wierzbickii Heuffel (= *hirsutum banaticum* Wierzb.), Wierzbicki's, 4. Zw. f. Banat.

Willdenowii Lk. (= *pusillum* W. E. suppl. ?), Willdenow's. 4. Zw. f. ? Sibirien.

brachystemon Redout., v. roseum, *bracteatum* Hort. (= ?), *consentinum* Hort. Belv. (= ?), *incarnatum* Hornem. = intermedium, *luteum* Hort. Angl., v. obliquum, *nemorale*, Salisb., v. ursinum, *nitidulum* Hornem. (= ?), *ochraceum* Hort. (= ?), *Oroprasum* Hort. Gorenk. (= ?), *pratense* Schlch., v. vineale, *punctatum* Hort. (= ?), *sioulum* Ucria (= *Dioscoridis* Sibth.), v. Nectaroscordum siculum, *tataricum* Hort. (= *undulatum* Auct.), v. nutans, *virescens* DC., v. oleraceum.

A. evosmum Lk. et Otto (= *nudicaule* Lelm., p. 30),

Digitized by Google

Allium

flavescens Poepp., *fragrans* Vent. et *β) gracile* Dryand., Ait., *γ) nepalense* Bot. reg., *ornithogaloides* Bosc., *striatellum* Lindl., p. 31, *striatum* Jacq. (= *canadense* Mchx.), v. Nothoscordum evosmum, fragrans etc.

Allobrogia Tratt., v. Czackia Liliastrum.

Allojozonium Kunze, Verschiedengürtel, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

arctotideum Kunze, bärenohrähnlicher, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Allophyllus Cominia Sw., *racemosus* Sw., v. Schmidelia Cominia, occidentalis, p. 730.

Alloplectus Mart. (*Besleria* Auct. p. 119), XIV. II., Personatae Gesnerieae.

bicolor Mart. (= *dichrous* DC. = *Schottii* G. Don = *Besleria bicolor* Schott. = *dichrus* Spgl.).

circinnatus Mart. (= *Besleria hirtella* Schott).

coccineus Mart., G. Don (= *Besleria coccinea* Aubl.).

cristatus Mart. (= *Besleria cristata* L., *Lophia phoenicea* Desv.).

sparsiflorus Mart., zerstreutblumiger, ♄. w. Brasilien.

Ob nachstehende kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: angustifolius DC., ♄. Brasil., glaber DC. (= *Besleria cristata* Moç. Sess.), hispidus Mart. (= *Besleria hispida* H. B. K.), ♄. Südamerika, Patrisii DC., ♄. Guiana.

sanguineus Mart. (= *Besleria sanguinea* P. = *Dalbergaria sanguinea* Tuss., Juss. = *Vireya sanguinolenta* Rafin.), v. Tussacia sanguinea.

Allosorus Bernh., Krausfarrn.

a) Cryptogramme RBr.

angustifolius Kunze (*Cheilanthes angust.* H. B. K. p. 187, = *Cheil. marginata* Lk. excl. Syn.).

auratus Presl (= *Pteris chrysocarpa* Hook. et Grevill.), goldfarbiger, 4. t. w. Nepal.

auriculatus Presl (= *Cheilanthes auriculata* Lk. = *Pteris auriculata* Sw. = *Adiantum auriculatum* Thbg.), geöhrter, 4. t. w. Cap der guten Hoffnung.

caespitosus Presl (= *Cheilanthes crenulata* Lk.), rasenartiger, 4. w. Südamerika.

ciliatus Presl (= *Cheilanthes rufescens* Lk.), p. 188, gewimperter, 4. w. ? Mexico.

crispus Bernh. (= *Phorobolus crispus* Desv.), p. 32.

hirsutus* (= *Cheilanthes hirsuta* Lk., p. 188, var. von A. caespitosus?).

b) Platyloma Kunze.

atropurpureus Kunze, Presl, (= *Pteris atropurpurea* L. p. 663, *Pellaea* atrop. Lk.).

Calomelanos Presl (= *Pteris Calomelanos* Sw., p. 663, *Pt. hastata* Thbg. = *Pellaea Calom.* Lk.).

flexuosus Kaulf., Kunze (= *Pteris flexuosa* Hook., Lk., p. 664, = *Pt. cordata* Cav., Lk. = *Pellaea flexuosa* Lk.).

intramarginalis Presl (= *Pteris intr.* Kaulf.), p. 664.

hastatus Presl (= *Adiantum hastatum* L. suppl. = *Pteris hastata* Sw., p. 664, = *Pellaea hastata* Lk.).

sagittatus Presl, Kunze (= *Pteris sagittata* Cav. p. 664, = *Pellaea sagittata* Lk.).

Digitized by Google

Allosorus
ternifolius Kunze (= *subverticillatus* Presl = *Pteris peruviana* Poir., p. 664, = *subverticillata* Sw. = *P. ternifolia* Cav.).
Almyra stellaris Salisb., v. Pancratium illyricum.

Alnus T., Erle.
autumnalis Loddig., Herbst, ħ. f. ?
denticulata C. A. Mey., gezähnelte, ħ. f. Caucasus.
latifolia Dsf., breitblätterige, ħ. f. ?
obcordata C. A. Mey., verkehrtherzblätterige, ħ. f. Caucasus.
orientalis Decaisn., (= *longifolia* Bové), morgenländische, ħ. f. Syrien.
pubescens Tausch (A. glutinosa et incana var. hybrida), weichhaarige, ħ. f. ?
sibirica Fisch., sibirische, ħ. f. Sibirien.
alpina Borckh. = incana, *cordata* Dsf. = cordifolia, *ovata* Hort. = viridis, *rubra* Hort. (= ?)
Alocasia cucullata Sweet, *macrorrhiza* Sweet, v. Colocasia cucullata, macrorrhiza.

Aloe T. L., p. 33. seq.
I. Haworthia Duv. Haw. (= *Apicra* W.).
altilinea Haw., R. et S., β) denticulata Haw., R. et S.
aristata Haw., R. et S. (= *arachnoides* var. auct.), begrannte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
brevis Haw. (*margaritifera*, γ) *minima* Bot. Mag., *margarit. brevis* Haw.), kurze, 4. k. t. Cap d. g. H.
cuspidata Haw., R. et S. (= *translucens* Haw. var. Spgl.), langespitzige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
cymbifolia Schrad. (= *cymbaeformis* Curt. = *cymbiformis* Haw. = *Haworthia concava* Haw.).
erecta R. et S., Haw. (= *margaritifera* DC., *margaritifera* β) Willd. Enum.), aufrechte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
glabrata Salm Dyck, glatte, 4. k. t. Cap. d. g. Hoffn.
granata Haw., R. et S. (*Apicra granata* W., *Aloe margaritifera var. mimina* DC., Salm Dyck, *margaritifera minor* Ait.), geperlte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
β) laetevirens Salm Dyck nec Haw., Link, γ) minor (H. granata, β) *polyphylla* Haw.)
parva Haw., R. et. S., kleine, 4. k. t. Cap d. g. H.
retusa L. (= *Catevala retusa* Medik.), β) mutica R. et S., Haw.
rugosa Salm Dyck (= *Radula*, γ) *minor* Salm Dyck, Haw., *Radula asperior* Haw.), runzelige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
β) perviridis Salm Dyck.
semimargaritifera Salm Dyck, Haw.
α) maxima Salm Dyck, R. et S., (*A. margaritifera maxima* Haw., Haworthia *maxima* Haw., *A. africana* Commel.), β) major Salm Dyck, γ) minor Salm Dyck (= *A. glabrata* Hortul.), δ) multiperlata Haw., Salm Dyck (= *A. media* Hortul.).
setosa Haw., R. et S. (= *arachnoides minor* Haw.), borstige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
α) setis niveis tenuissimis numerosis, β) nigricans Haw, γ) media Haw., δ) major Haw.
subattenuata Salm Dyck (= Haw. *Radula*, δ) *magniperlata* Haw. = *A. Radula*, δ) *margaritacea* Salm Dyck), wenigverdünnte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
subfasciata Salm Dyck (= *fasciata*, β) *major* Salm Dyck,

Digitized by Google

Aloe

= *subulata* Salm Dyck, observ. 1822), wenigquerbänderige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subrigida R. et S. (= *pseudorigida* Haw., Salm Dyck = *Apicra rigida* W.), wenigstarre, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subtortuosa R. et S. (= *Apicra tortuosa* W., Aloe *pseudo tortuosa* Salm Dyck, H. *pseudo tortuosa* Haw.).

subulata Salm Dyck (*A. Radula*, *α*) *major* Salm Dyck, H. *Radula laevior* Haw.), pfriemenförmige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

tortuosa Haw. (*tortella* Haw.), *β*) major Salm Dyck.

translucens Ait. (= *pellucens* Haw., *A. arachnoides*, *δ*) *translucens* Bot. mag.).

turgida Haw., R. et S., aufgeschwollene, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

venosa Lam. (= *tricolor* Haw., *Apicra tricolor* W.).

viscosa L. (= *triangularis* Lam.), *β*) indurata Haw. *Bradleyana* Jacq. = atrovirens, *clariperla* Haw. = attenuata *β*) *concinna* Haw. = viscosa, *fasciata* Haw. non Salm = Reinwardti, *Hebes* R. et S. = obtusa, *herbacea* DC. = reticulata, *herbacea* Mill. = atrovirens, *Radula* Ker = attenuata, *stenophylla* R. et S. = angustifolia.

II. Apicra Haw. (*Haworthia* Salm Dyck).

pentagona Haw., Jacq. (*A. spiralis*, *β*) *pentagona* Ait., W.), fünfkantige, 4. ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

quinquangularis R. et S. (= *pentagona* Salm Dyck, *pentagona*, *β*) *torulosa* Haw.), fünfeckige, 4. ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

spiralis Haw., R. et S. (*A. pentagona*, *β*) *spiralis* Salm Dyck).

spirella Haw., R. et S.

III. Gasteria Haw. (Curviflorae Salm Dyck).

angulata W. (= *Lingua*, *β*) *latifolia* Willd. Enum. = *Lingua longifolia* Haw. = *linguaeformis* Mill. = *Gasteria longifolia* Haw.), *α*) vulgaris W., *β*) unilateralis W., *γ*) truncata W.

angustifolia Haw., Salm Dyck, (= *conspurcata*, *α*) *unilateralis* S. Dyck = *Lingua angustifolia* Haw. = *linguaeformis*, *β*) Lam. = *linguaeformis verrucosa* DC.), schmalblätterige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Bayfieldii Salm Dyck, Bayfield's, 4. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.

brachyphylla Salm Dyck (= *brevifolia* Haw., R. et S. *nigricans*, *γ*) *denticulata* Salm Dyck), kurzblätterige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

carinata Mill (= *disticha*, *β*) L. = *distícha triangularis* H. Par.).

conspurcata Haw. Salm Dyck (= *conspurcata*, *β*) *truncata* Salm Dyck).

decipiens Haw., R. et S. (= *Haworthia nigricans* Haw.), täuschende, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

disticha Haw., R. et S. (= *Lingua* Salm Dyck, *α*) *angustifolia* S. Dyck = Gasteria *denticulata* Haw.).

elongata Salm Dyck (= *G. trigona* Haw. = *A. acinacifolia*, *γ*) *angustifolia* S. Dyck = *acinacifolia*, *δ*) *laetovirens* Salm Dyck), verlängerte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Aloe

excavata W. (= *obscura* W., *obscura* α) et β) Salm Dyck, *Lingua* α) *angustifolia* W., Gasteria *latifolia* Haw., *A. disticha* δ) L. spec. = *A. Lingua* Bot. mag. = *A. Lingua multifaria* Haw.).

glabra Haw., Salm Dyck, α) major, β) minor Haw. (glabra β) *brevifolia* Salm Dyck).

guttata Salm Dyck, getüpfelte, 4. k. t. Cap d. g. H. α) angustifolia (= *G. subnigricans*, β) *glabrior* Haw. = *nigricans*, γ) *denticulata* Hort.), β) latifolia Salm Dyck.

laevis Haw., Salm Dyck, (= *angustifolia*, β) *laevis* Salm Dyck).

nigricans Haw., α) latifolia (= *Lingua*, β) *crassifolia* Ait. = *obliqua* Jacq.), β) crassifolia Haw., γ) marmorata Haw., Salm Dyck.

picta Haw. (= *Bowieana* R. et S), bemahlte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pusilla R. et S. (= Gasteria *parva* Haw.), niedrige, 4. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.

scaberrima Salm Dyck (= *intermedia*, β) *asperrima* Haw.), scharfste, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subcarinata Haw., Salm Dyck (= *pseudo-angulata* Salm Dyck), β) striata Salm Dyck (= *pseudoangulata* Salm Dyck) = *angulata striata* W.).

subnigricans Haw., Spgl., α) planifolia (= *speudonigricans* Salm Dyck), β) canaliculata.

sulcata Haw., Salm Dyck (= *obscura*, γ) *truncata* Salm Dyck = *linguaeformis* Lam., DC. = *Lingua*, β) *angulata* Haw. = Gasteria *angulata* Haw.).

trigona Haw., Salm Dyck (= Gasteria *obtusa* Haw. = *nitida*, γ) *obtusa* Salm Dyck).

verrucosa Ait. (= *carinata*, β) *ensiformis* DC. = *A. Serra* β) *verrucosa* P.).

vittata R. et S. (= *fasciata* Haw. = *nigricans*, γ) *fasciata* Salm, Haw.), bandstreifige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) laxa Haw.

dichotoma R. et S. = retata, *Lingua*, γ) *brevifolia* = obtusifolia, *maculata* Curt. (= *maculata*, α) *pulchra* Ait. = *obliqua* DC. non Haw. Salm) = pulchra, *marmorata* Hort. = formosa.

IV. Bowiea Haw.

africana Haw. (= Aloe *Bowiea* R. et S.).

V. Grandiflorae Salm Dyck.

a) Aloe Haw.

barbadensis Mill. (= *perfoliata barbadensis* Ait. = *vulgaris* barbadensis DC. = *vulgaris* Lam.).

β) elongata Murr., R. et S. (*vulgaris* W. Enum.), γ) chinensis Salm Dyck, R. et S.

caesia Salm Dyck, α) patula S. Dyck, β) elatior S. Dyck, γ) disticha van Marum.

echinata W., β) minor S. Dyck = tuberculata Haw.

glauca Mill., α) elatior S. Dyck (= *major*), β) minor (= *rhodacantha* Bot. mag), γ) humilior Salm Dyck (= *rhodacantha* DC.), δ) spinosior Haw., R. et S. (= *muricata* Schult.).

grandidentata S. Dyck, grofszahnige, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

latifolia Haw., S. Dyck (*A. Saponaria latifolia* Haw.

Digitized by Google

Aloe

= *A. Saponaria major* Bot. mag. = *umbellata*, *α*) *major* DC.).

longiaristata R. et S. (= *aristata* Haw. non Haworthia aristata Haw.), langgrannige, ♄. k. t. Cap d. g. H.

obscura Mill. (= *maculata* Dsf. = *maculosa* Lam. = *perfoliata obscura* Ait. = *picta* Thbg., *A. Saponaria obscura* Thbg.), dunkelfarbige, ♄. k. t. Cap d. g. H.

purpurascens Haw. (= *perfoliata*, *ε*) *purpurascens* Ait. = *barbadensis* Ait = *ramosa* Haw.), purpurfarbige, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung [1]).

Saponaria Haw. (= *maculata* Lam.), Seifen-A., ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

α) minor Haw. (= *umbellata* DC. = *picta β*) Ait.), *β*) picta Salm Dyck (= *A. S. luteostriata* Haw. = *umbellata striata* Hort. = *africana* Hort. Lombard.).

soccotrina Lam. (= *sinuata* Thbg. = *vera* Mill.).

spinulosa S. Dyck, stachlige, ♄. k. t. Cap d. g. H.

tenuifolia Lam.

postgenita R. et S. = prolifera Haw. = prolifera major S. Dyck.

b) Pachydendron Haw. (= *Agriodendron* Haw.).

africana Mill., *α*) latifolia, *β*) angustior Haw. (= *pseudoafricana* S. Dyck).

angusta R. et S. (= *P. angustifolium* Haw.), schmale, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

distans Haw., *α*) brevifolia S. Dyck (= *mitraeformis humilior* W. = *mitraeformis brevifolia* Bot. mag. = *mitraeformis*, *β*) *angustior* Lam.), *β*) reflexa S. Dyck, *γ*) depressa Haw.

ferox Mill., Lam. (= *P. ferox* Haw. = *A. horrida* et *muricata* Haw. in Linn. Trans., *A. perfoliata*, *δ*) *ferox* Ait.).

mitraeformis W., S. Dyck, Haw, R. et S.

Principis Endl. (*A. Salm Dyckiana* R. et S., *A. africana* S. Dyck = *P. Principis* Haw.).

subferox Spgl. (= *pseudoferox* S. Dyck = *ferox β*) Haw. = *P. pseudoferox* Haw.).

supralaevis Haw. (= *P. supralaeve* Haw.).

xanthacantha W. (= *A. mitraeformis patula* Hort.).

c) Rhipidodendron W.

dichotoma L., suppl.

plicatilis Mill., Ait. (= *A. disticha*, *ε*) *plicatilis* L. spec. = *Kumara disticha* Medik = *Rhipidodendron distichum* W. = *R. plicatile* Haw.), *β*) major S. Dyck (*A. plicatilis* Jacq.).

A. pertusa Haw. = Pyrgosea corymbosula.

Alona Lindl. (Anagramm v. Nolana), V. 1., Solanaceae.

coelestis Lindl., himmelblaue, ♄. k. t. Coquimbo [2]).

Alonsoa R. et P.

parviflora Steud. (= *Hemimeris parviflora* H. B.), kleinblumige, 4. ♄. k. t. Caracas.

urticaefolia Steud. (= *Celsia urticaefolia* Curt. = *Hemimeris urticaefolia* W.), nesselblätterige, ♂. ♄. k. t. Südamerika.

---

1) „Ab A. rubescente DC. toto caelo recedit S. Dyck."

2) Herr Professor Lindley stellt zu dieser Gattung noch folgende Arten: rostrata Lindl., obtusa Lindl., glandulosa Lindl., carnosa Lindl., sämmtlich von Coquimbo; tomentosa Lindl. (= *crassiuscula* Poepp.), von Valparaiso, dann noch: revoluta Lindl., baccata Lindl., longifolia Lindl.

Digitized by Google

Aloysia Ortega.
chamaedryfolia Chamiss. (= *Lippia chamaedryfolia* Steud. = ? *Verbena* dentata Visiani), gamanderblätterige, ♄. t. Brasilien.
citriodora Ortega (= *Lippia citriodora* Kunth = *Verbena triphylla* L'Her.).

Alsevosmia Cunningh., Alsevosmie V. 1., Caprifoliaceae.
Banksii Cunningh., Banks's, ♄. k. t. Neuholland.
bupleurifolia Cunningh., hasenohrblätterige, ♄. k. t. Neuholland.
Alsinanthe biflora Fenzl, *stricta* Fenzl = Alsine biflora et stricta p. 38 et 39.

Alsine L., Wahlenb., Miere.
filiformis Fenzl (= *Spergula* Hochst. et Steud.), fadenförmige, ⊙. f. Mittelasien.
formosa Fenzl, schöne, ⊙. f. Kurdistan.
globulosa C. A. Mey. (= *Arenaria globulosa* LaBill. = *globosa* Spgl.), kugelige, ⊙. f. Syrien, Caucasus.
juniperina Fenzl (= *Arenaria juniperina* L. p. 75).
pharnaceoides Fenzl (= *Arenaria pharnaceoides* Sering.), pharnaceumähnliche, ⊙. f. Orient.
procumbens Fenzl (= *Arenaria procumbens* Vahl, p. 75, = *geniculata* Poir.).
campestris Fenzl, *dichotoma* Fenzl, *montana* Fenzl, v. Minuartia campestris etc., p. 527.
Alsinella erecta Mch., v. Moenchia erecta, p. 527.

Alsophila R. B. Hainfarrn.
elegans Mart., zierlicher, 4. w. Brasilien.
paleolata Mart. (= *Polypodium alsophilum* H. Berol.), spelzentragender, 4. w. Brasilien.

Alstroemeria L.
aurea Grah. (*aurantiaca* D. Don, p. 39, *flava* Hort.).
brasiliensis Sellow, Spgl., brasilianische, 4. Kn. k. t. Brasilien.
Bredemeyeriana W., Bredemeyer's, 4. Kn. k. t. Südamerika.
caryophyllea Jacq., nelkenähnliche, 4. Kn. k. t. ?
Cummingiana Herbich, Cumming's, 4. Kn. k. t. Chili.
Curtisiana Meyer (= *A. Ligtu* L. fil. Curt.), Curtis's, 4. Kn. k. t. Brasilien.
formosissima R. et P. (= *formosa* P.), schönste, 4. Kn. k. t. Peru.
gloriosa Chamiss., Schltdl., prächtige, 4. Kn. k. t. Chili.
Hookeriana Schult. (= *rosea* Hook. non R. et Pav. = *Simsii* Sweet non Spgl.), Hooker's, 4. Kn. k. t. Chili.
Jacquesii Hort., Jaques's, 4. Kn. k. t. Südamerika.
nemorosa Hort. belg. Hain-A., 4. Kn. k. t. Südamerika.
oculata Lodd. (= *Salsilla* Hort. Anglor. non L.), geäugelte, 4. Kn. k. t. Chili.
pulchra Sims (= *A. flos Martini* Ker = *tricolor* Hook.), schöne, 4. Kn. k. t. Chili.
Riedeliana Hort. belg. Riedel's, 4. Kn. k. t. Südamerika.
Simsii Spgl. (= ? *Hookeri* Lodd., Sweet non Schult. = A. Ligtu var. *β*) Spgl. = *pulchella* Sims), Sims's, 4. Kn. t. Chili.
Feuilleana Meyer. = *Ligtu, montana* Ker, v. Ixiolirion montanum.

Alternanthera Forsk., RBr., Wechselstaubbeutel.
diffusa Hort. Berol., weitschweifiger, ⊙. f. m. w. Brasilien.
echinata Hort. Bonn., Fisch. et Mey., igelstacheliger, ⊙. f. m. w. ?

Digitized by Google

Alternanthera
sessilis R. Br. var. caspica Fisch. et Mey.
strigosa Hassk., striegelicher, ☉. f. m. w. Java.
tenella Colla (= *Illecebrum tenellum* Hort. = *Paronychia tenella* Dsf.), zarter, ♂. 4. w. ?
Althaea L. Eibisch, Wintermalve.
I. Althaeastrum.
cretica Weinm., cretische, ♂. f. k. Creta.
kurdica Schltdl., kurdische, 4. f. Kurdistan.
macrantha Hort. (= ? *taurinensis* H. Erlang.), grofsblumige, 4. f. ?
meonantha Link, schmalblumige, ♂. f. Griechenland.
multiflora Rchb., vielblumige, 4. f. Südeuropa.
II. Alcea.
leucantha Fisch. (= *nudiflora* Lindl.).
III. Sectio dubia.
armeniaca Tenore, armenische, ♂. f. Armenien.
speciosa Visiani, prächtige, ♂. f. ?
sylvestris Briganti, wilde, ♂. 4. f. Neapel.
Alyssum T. L., Steinkraut, p. 41.
I. Alyssum C. A. Mey.
altaicum C. A. Mey. (= *Adyseium altaicum* Sweet.), altaisches, 4. ♄. Altai.
confertum Hort., gedrängtes, ⊙. f. ?
filifolium Wahlbg., fadenblätteriges, ⊙. f. Kleinasien.
gemonense Wulff. (= *medium* Host = *petraeum* Arduin.).
minutum Schltdl., niedriges, ⊙. f. Sibirien.
parvulum Schrad., kleines, ⊙. f. ?
Scovitzianum Fisch. et Mey. (*strictum* C. A. Mey.), Scovitz's, ⊙. f. Ararat, Caucasus.
II. Aurinia.
obcordatum DC., verkehrtherzförmiges, 4. ♄. f. ?
saxatile L.
III. Odontarrhena C. A. Mey.
alpestre L., δ) savranicum Andrzy.
argenteum Vitm.
Marschallianum Andrzy.
microphyllum (C. A. Mey.), (= *alpestre* var. Spach), kleinblätteriges, 4. ♄. f. Altai.
murale W. Kit., Mauer-St., 4. ♄. f. Banat, Siebenbürgen.
obovatum Turcsch. (C. A. Mey.), (= ? *sibiricum* W.), verkehrteiförmiges, 4. f. Altai.
obtusifolium Stev. (= *murale* MB., *spathulatum* Adam), stumpfblätteriges, 4. ♄. f. Taurien, Sibirien.
tortuosum W. K. (= *alpestre β) majus* K. = *serpyllifolium* M. B. = *subalpinum* Pall.), gedrehtes, 4. ♄. f. Ungarn, Taurien.
Wierzbickii Heuff, Roch.
IV. Psilonema C. A. Mey.
calycinum L.
dasycarpum Stephan. (= *sibiricum* Trevir.), wollfrüchtiges, ⊙. f. Sibirien.
homalocarpum (Fisch. et Mey.), flachfrüchtiges, ⊙. ♂. f. k. Steiniges Arabien.
A. canescens DC., v. Ptilotrichum canescens.
Hiernach zu berichtigen, p. 41 seq., wo die übrigen verzeichnet sind.
Alyxia Banks, p. 42.
actinophylla Cunningh., strahlenblätterige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Alyxia

scandens R. et S. (= *Gynopogon scandens* Forst.), klimmende, ħ. Sch. t. Societätsinseln.

A. Gynopogon R. Br. = A. Forsteri.

Amalia Rchb. (= *Amalias* Hoffmsg. = *Laelia* Lindl. nec Adans.), (Prinzessin Amalie, Herzogin zu Sachsen, kgl. Hoheit), XX. 1, Orchideae.

acuminata* (= *Laelia acuminata* Hort. belg.), zugespitzte, 4. w. Mexico.

aurantiaca* (= *Laelia aurantiaca* Lindl.), orangenfarbige, 4. w. Mexico.

flava* (= *Laelia flava* Lindl.), hellgelbe, 4. w. Brasilien.

fulva* (= *Laelia fulva* Lindl.), rothbraune, 4. w. Mexico.

furfuracea* (= *Laelia furfuracea* Lindl., Karwinsky), kleiige, 4. w. Mexico.

Galeottiana* (= *Laelia Galeottiana* ? Lindl.), Galeotti's, 4. w. Mexico.

gigantea* (= *Laelia gigantea* Hort. Booths.), riesige, 4. w. Mexico.

majalis* (*Laelia majalis* Lindl. = *Cattleya Grahami* Lindl.), Maiblühende, 4. w. Oaxaca.

pedunculatis* (= *Laelia pedunculatis* Lindl.), gestielte, 4. w. Guatimala.

purpurea* (= *Laelia purpurea* Hort.), purpurfarbige, 4. w. Mexico.

rubescens* (Lindl.), röthliche, 4. w. Mexico.

superbiens* (= *Laelia superbiens* Lindl.), stolze, 4. w. Guatimala.

albida*, anceps Hoffmsg., autumnalis*, cinnabarina*, grandiflora*, Perrinii* = *Laelia albida, anceps, autumnalis, cinnabarina, grandiflora* et *Perrinii* p. 442.

Amalia aeria incola Hort. hisp. = Tillandsia dianthoides.

Amaracus Mch., Sträucheldosten, XIV. 1., Labiatae.

Dictamnus Benth. (= *tomentosus* Mch. = *Origanum Dictamnus* L. p. 567).

Tournefortii Benth. (= *Origanum Tournefortii* Ait. p. 567, = *calcaratum* Juss.).

Amaranthus T., Amaranth (Fuchsschwanz),

altissimus Riddell, höchster, ⊙. f. Nordamerica.

Arardhanus Sweet, Arardhan's, ⊙. f. Ostindien.

aureus Dietr., goldfarbiger, ⊙. f. Nepal.

bahiensis Schrad., Ledeb., Bahia-F., ⊙. f. m. Bahia.

miamensis Riddell, miamischer, ⊙. f. Nordamerika.

pallidus M. B., bleicher, ⊙. f. Taurien.

parisiensis Schkr. (= ? *pachystachys* Rchb.), parisischer, ⊙. f. ?

patulus Bertol., abstehender, ⊙. f. Neapel.

quitensis H. B., Quito-A., ⊙. f. Peru.

recurvatus Dsf. (= ? *hybridus* L. var.), zurückgekrümmter, ⊙. f. ?

rhombeus R. Br., rautenförmiger, ⊙. f. Neuholland.

rigidus Schult., starrer, ⊙. f. ?

rubricaulis Page, Hort. anglor., rothstengeliger, ⊙. f. m. Ostindien.

spicatus Lam. (= *viridis* All.), ähriger, ⊙. f. Südeuropa.

undulatus R. Br., wellenblätteriger, ⊙. f. Neuholland.

Zweifelhaftere Arten: caesius Dietr., circinnatus Dsf., coracanus Mart., Cururu Tenor., dubius Mart., esculentus H. Patav., Fatine Mart., glomeratus Otto,

Digitized by Google

Amaranthus

laxifolius Otto, **littoralis** Otto, **luteus** Mart., **macrocaulos** Poir., **monstrosus** Hort., **pendulus** Hort., **purpurascens** Schrad., Otto, **sanguinolentus** Schrad., **tenuiflorus** Fisch., **tortuosus** Hornem., **zanensis** Hornem.

nepalensis Hornem. = ? Acroglochin chenopodioides, p. 16.

Amarenus agrarius Presl, ***badius*** Presl, ***filiformis*** Presl, ***patens*** Presl, ***procumbens*** Presl, ***Sebastiani*** Presl, ***spadiceus*** Presl, ***speciosus*** Presl, v. Trifolium agrarium etc., p. 818 seq.

Amaryllis L., Amaryllenschwertel.

bahiensis DC., Bahia-A., 4. Zw. w. Bahia.

chilensis L'Her. (= ***coccinea*** Molina = ***linearifolia*** Molina), chilesischer, 4. Zw. w. Chili.

fulvovirens Schott (= ***calyptrata*** Ker var. ?), rothbraungrüner, 4. Zw. w. Brasilien.

glaucescens Mart., blaugrünlicher, 4. Zw. w. Brasilien.

hemerocallidiflora Hort. (= ? ***hemerocalloides*** Broter.), taglilienblumiger, 4. Zw. w. ? Südamerika.

Karwinskyi Zuccar., Karwinsky's, 4. Zw. w. Brasilien.

leonensis van Houtte, Löwen-A., 4. Zw. w. Sierra Leone.

maculata L'Her., gefleckte, 4. Zw. w. Chili.

nivea Schult., schneeweiße, 4. Zw. w. Peru.

Principis Salm Dyck (= ***Carolinae*** Hort., Monac. et Nymph. = ***striatifolia*** Sweet).

pulverulenta Herbert (non Lodd.), bestaubte, 4. Zw. w. Brasilien.

retinervia Sweet, netznervige, 4. Zw. w. Westindien.

vittata Ait., *β*) Gravinae Melazzo, *γ*) superba Hort.

Hybriden:

affinis Sweet (= ***canaliculata*** Sweet), *β*) membranacea Sweet, *γ*) latifida Sweet, *δ*) purpureo-striata Sweet, aloides Hort., altissima Hort., Amaliae Sterler, amplexicaulis Lodd., anceps Herb., angustifolia Hort., augusta Sweet (= ***Johnsoniana-rutila***), ardens Herb. (= ***crocato-reginae***), attenuata Sweet, augusta Sweet, aurantiaca Herb. (= ***Reginae-acuminata***), *β*) amabilis Sweet, *γ*) Camillus Herb., *δ*) fulva Sweet, *ε*) Gustavus Herb., Beatum Herb. (= ***Johnsoni-acuminata***), *β*) Beatrice Herb., *γ*) crispata Sweet, *δ*) macrantha Sweet, *ε*) tricolor Sweet, *ζ*) tricuspis Sweet, bella Herb. (= ***Sweetii-Carnarvoni***), Brokesii Herb. (= ***crocato-Johnsonii***), *β*) Creusa Herb., crocea Hort. angl., cruciata Hort. angl., discolor Herb. (= ***Johnsonii-tristis***), Drapiezii Hort., elegans Herb. (= ***formosovittata***), exaltata Hort., eximia Herb. (= ***Gowenii-Highleriana***), expansa Herb. (= ***equestri-florida***), florida Herb. (= ***fulgido-rutila***), formosa Herb. (= ***Principis s. striatifolia-reginae***), Gowenii Herb. (= ***Principis s. striatifolia-acuminata***), Griffini Herb. (= ***psittacino-Johnsonii***), *α*) Napoleoniana Herb., *β*) albocincta Herb., *γ*) Alompsa Herb., *δ*) campanulata Sweet, *ε*) quadricolor Sweet, *ζ*) quadrilineata Sweet, *η*) retinervia Sweet, *ϑ*) recurviflora Sweet, *ι*) Victor Sweet, Harrisonii Herb. (= ***Principis s. striatifolia-stylosa***), Haylockii Herb. (= ***solandriflora-acaminata***), Herberti Sweet (= ***solandriflora-stylosa***), *α*) carnella Sweet, *β*) longa Sweet, *δ*) magnifica Sweet, Higheleriana Herb. (= ***stylosa-solandriflora***), *β*) Domine Sweet, *γ*) picta Sweet, Hoodii Sweet (= ***Reginae fulgida***), Jacobaea Hort., inclinata

Digitized by Google

Amaryllis
Herb. (= *fulgida-vittata*), inconstans Sweet (= *acuminata Johnsonii*), α) basiflora Sweet, β) breviflora Sweet, γ) concolor Sweet, δ) crispiflora Sweet, ε) delicata Sweet, ζ) dilecta Sweet, η) flexuosa Sweet, ϑ) fulvocincta Sweet, ι) glaucescens Sweet, κ) imperialis Sweet, λ) lateritia Sweet, μ) lineolata Sweet, ν) punctulosa Sweet, ξ) purpureo-rubens Sweet, ο) postulosa Sweet, π) tortuliflora Sweet, ρ) uniparvula Sweet, σ) varia Sweet, τ) venosa Sweet, υ) veniflora Sweet, intermedia Sweet (= *Reginae-equestris*), intertexta Colvill. (= *equestri-reginae*), inversa Herb. (= *Johnsoni-vittata*), β) Andromache Herb., γ) Pluto Herb., δ) Saturn Herb., Johnsonii Sweet (= *Reginae-vittata*, *brasiliensis* Redout. = *spectabilis* Lodd.), β) barbe blanche Herb., γ) mater Herb., δ) pendula Herb., ε) Ponceaunelta Herb., ζ) quarta Herb., η) Scaramouch Herb., ϑ) Sorella Herb., liturata Rchb., lugubris Herb. (= *stylosa Johnsonii*), β) griselina Herb., γ) porporina Herb., δ) sumbrella Herb., magnifica Sweet (= *striatifolia-vittata*), major Herb. (= *acuminata-rutila*) micans Herb. (= *rutila-crocata*), minor Hort. Nymphenb., multistriata Sweet (= *psittacino-Valleti*), mutabilis Sweet, nobilis Herb. (= *acuminata-striatifolia*), praeclara Herb. (= *Johnsoni-striatifolia*), β) Colvilliana Sweet, γ) decora Sweet, δ) patens Sweet, pretiosa Herb. (= *psittacina-Griffini*), princeps Sweet, pulcherrima Herb. (= *Swettii-pulverulenta*), β) Amorosetta Sweet, γ) Calisto Sweet, δ) Gratian Sweet, ε) Salamander Sweet, ζ) Vezzosa Sweet, pumila Spin., punctata Sweet, quintuplex Herb. (= *Harrisoni-tristis*), rigida Sweet (= *crocato-rutila*), sanguinea Herb. (= *rutila-vittata*), Sideriea Herb. (= *sanguinea-subbarbata*), sinistra Herb. (= *Griffini-vittata*), sororia Hort., speciosa Hort., splendens Herb. (= *rutilo-equestri-vittata*), β) alta Herb., γ) Bellona Herb., δ) ignescens Sweet, ε) Mars, ζ) Vesta, spuria Sweet (= *acuminata-reginae*), β) carinata Sweet, γ) sordida Sweet, stellata Herb. (= *subbarbata-sanguinea*), striatiflora Sweet (= *acuminata-Swettii*), β) conobrina Sweet, γ) diversicolor Sweet, sulphurea Hort., Sweetii Herb. (= *striata Johnsonii*), α) affinis Sweet, β) Annesleyana Sweet, γ) amoena Sweet, δ) bistriata Sweet, ε) brevifolia Colvill., ζ) discolor Sweet, η) expansa Sweet, ϑ) ligulaeflora Sweet, ι) lineata Sweet, κ) modesta Sweet, λ) notha Sweet, μ) obscura Colvill., ν) palliiflora Sweet, ξ) patentissima Sweet, ο) recurvata Colvil., π) rugosa Colvil., ρ) salmonea Sweet, σ) superba Sweet, τ) undulaeflora Sweet, υ) Valleti Sweet, φ) variegata Colvil., ψ) versicolor Sweet, χ) Wellsiana Colvil., tabulata Hort., tortuosa Sweet (= *psittacina-equestris*), triplex Herb. (= *Gowenii-vittata*), tristis Herb. (= *Johnsoni stylosa*), variabilis Sweet, variata Herb. (= *formosa-inversa*), venosa Herb. (= *vittata Johnsonii*), venusta Herb. (= *fulgida-striatifolia*), Weldenii Hort. etc. Darnach zu ergänzen p. 44 seq.

Amberboa Vaill., DC. (*Amberboi* Adans), Ambraflockenblume, XIX. III., Compositae Cynarocephalae, vergl. p. 175 Centaurea.
carthamoides DC. (= *Psephellus carthamoides* Fisch. et Mey.), saflorähnliche, 4. fr. Persien.
crupinoides DC. (= *Centaurea crupinoides* Dsf.).

Digitized by Google

Amberboa
erucæfolia DC. (= *sinaica* DC. ? = *Volutarella erucaefolia* Cass. = *Centaurea erucaefolia* L.).
Lippii DC. (= *Centaurea Lippii* L., *Volutarella Lippii* Cass.)
moschata DC. (= *Centaurea moschata* L. = *Chryseis moschata* Cass.).
muricata DC. (*Centaurea muricata* L. = *C. pubigera* DC. = *Cyanopsis radiatissima* Cass.).
odorata DC. (= *Centaurea ambracea* Schkr. = *glauca* W. = *C. moschata* β) L. = *suaveolens* W. = *Chryseis odorata* Cass. = *C. glauca* Cass.).
phaeopappa DC. (= *Psephellus phaeopappus* Fisch. et Mey.), braunfederige, 4. fr. Persien.
spectabilis DC. (= *Centaurea Balsamita* Don = *Psephellus spectabilis* Fisch. et Mey.).
suaveolens W. = odorata.
Amblachaerium aurantiacum Turcz., v. Achyrophorus aurantiacus.
Amblirium album Sweet, *camtschaticense* Sweet, *lanceolatum* Sweet, *pudicum* Sweet = Fritillaria alba, camtschatcensis, lanceolata et pudica p. 338 seq.
Ambyglottis flava Blume = Calanthe bicolor p. 145.
Ambrina ambrosioides Spach, *anthelmintica* Spach, *chilensis* Spach, *pinnatisecta* Spach = Chenopodium ambrosioides, anthelminticum, chilense et multifidum, p. 169.
Ambrosia T., Götterspeise (Traubenkraut).
bipinnata Cervant., Tenor., doppeltgefiederte, ☉ f. ? Mexico.
Ambrosinia Bass. L., Ambrosinie, XXI. IX., Aroideae.
Bassii L. (= *nervosa* Lam.), Bassi's, 4. k. Sardinien, Sicilien, Nordafrika.
velutina Blume (= *maculata* Tenor.), sammthaarige, 4. k. Sardinien, Neapel.
Amelanchier Med., Beermispel.
cretica Lindl. (= *orbicularis* Borkhaus. = *Aronia cretica* P. = *Crataegus cretica* Dsf. = *Pyrus cretica* W.), cretische, ♄. f. Creta.
intermedia Spach, mittlere, ♄. f. Nordamerika.
alnifolia Nutt. = florida.
canadensis Med. = Botryapium, p. 46.
Amellus L., Sternbläuling.
strigosus Less. (= *Aster strigosus* Thbg.), striegeliger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.
Amicia H. B. K.
affinis Hort., ähnelnde, ♄. Sch. w. t. ? Mexico.
Amirola glandulosa Hook., v. Llagunoa glandulosa.
Ammannia Houst., p. 47.
auriculata W., β) hyrcanica Fisch. et Mey.
humilis Mchx. (= *catholica* Cham. et Schltdt. = *occidentalis* DC. = *Peplis occidentalis* Spgl.), β) ramosior Mchx. non L.
purpurea Lam. (= *ramosior* Auct. non L. = *latifolia* Hort.), purpurfarbige, ☉. f. Nordamerika.
robusta Heer, starke, ☉. f. Brasilien.
senegalensis Lam., α) brasiliensis St. Hil., β) auriculata H. Berol., γ) racemosa Poir., δ) auriculata DC.
stylosa Fisch. et Mey., langgriffelige, ☉. f. Neu-Orleans.
undulata C. A. Mey., wellenförmige, ☉. f. Nubien.
Wormskioldii Fisch. et Mey. (Hort. Berol.), Wormskiold's, ☉. f. Brasilien.

Digitized by Google

Ammi L., Sanddolde.
anethifolium Lam. (= *meoides* P. = *Daucus meoides* Dsf. ? *Daucus crinitus* Dsf.), dillblätterige, 4. f. Orient, Sibirien.
Broussonetii DC., Broussonet's, ⊙. f. ?
crinitum Guss., bemähnte, ♂. f. Calabrien, Sicilien.
glaucifolium L. (= *majus* L. var. ? Sm.), blaugrünblätterige, ♂. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland.
intermedium DC. (= *glaucifolium* Lapeyr.), mittlere, ♂. f. Pyrenäen, Neapel.
rubricaule Hornem., rothstengelige, ⊙. f. Nordamerika.
acaule Spgl. = Bunium acaule, *capillaceum* Mchx. *costatum* Ell. = Discopleura capillacea et costata. Hieraach zu berichtigen p. 49.

Ammodendron Fisch., Sandstrauch, p. 868.
Eichwaldii Ledeb., Eichwald's, ♄. f. b. k. Caucasus.
Amomum compactum R. et S. (= *racemosum* Lam. non R. et P.) = A. Cardamomum.
Amoria angulata Presl, *caespitosa* Presl, *elegans* Presl, *hybrida* Presl, *Micheliana* Presl, *pallescens* Presl, *repens* Presl, *reflexa* Presl = Trifolium angulatum etc., p. 818.

Amorpha L., Unform.
humilis Tausch, niedrige, ♄. ♄. fr. ?
nana Nutt. = *fragrans* Swt.

Amorphophallus Blume, Decaisne, Endl. (= *Candarum* Rchb. = *Pythion* Mart.), Schlangenkraut, XXI. IX., Aroideae.
bulbifer Blume (= *Pythonium bulbiferum* Schott. = *Arum bulbiferum* Roxb., p. 85).
campanulatus Blume (= *Candarum Roxburghii* et *Hookeri* Schott. = *Arum campanulatum* Roxb., p. 85).
dubius Blume (= *Dracontium polyphyllum* Dennst. non L. = ? *Arum polyphyllum* Hort. anglor. Lk. Enum.), zweifelhaftes, 4. w. Ostindien.
giganteus Blume (= *Dracontium paeonifolium* Dennst. = *D. polyphyllum* Houtt.), riesenhaftes, 4. w. Ostindien.
leonensis van Houtte, Löwen-S., 4 w. Sierra Leone.

Ampelopsis Mchx., wilder Wein.
latifolia Tausch, breitblätteriger, ♄ Sch. f. ?
Ampelosycios scandens Pet. Thouars = Jolifia africana, p. 430.
Ampelygonum chinense Lindl. et *tinctorium* Lindl. = Polygonum chinense et tinctorium, p. 643 et 644.
Amphibecis violacea Schrank = Ampherephis intermedia, p. 49.

Amphicome Royle, Rundschopf, arguta Royle, Lindl. (= *Inearvillea arguta* Royle), p. 49.
Emodii Royle et Lindl. (*Inearvillea Emodii* Wall.), Himalaja-R., 4. Sch. f. b. Himalaja.

Amphirapis DC., Amphirapis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
pubescens DC. (= *Solidago pubescens* Wall. = *Solidago nepalensis* D. Don, p. 770), weichhaarige. 4. f. Nepal.

Amphithalea Eckl., Zeyh., Amphithalea, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Papilionaceae.
ericaefolia Eckl., Zeyh. (= *Priestleya ericaefolia* DC., p. 655).
Amphylmenium Rohrii H. B. = Pterocarpus Rohrii, p. 664.

Digitized by Google

Amygdalus T. L., Mandel.
frutescens Wender., strauchige, ħ. fr. ?
georgica Dsf. (= *nana* β) *georgica* Sering), georgische, ħ. f. Georgien.
glandulosa Siebold, Pierrot, drüsige, ħ. f. Japan.
nana L., β) biserrata, γ) angustifolia, δ) latifolia (= *sibirica* Tausch, Lodd.).
pedunculata Pall. (= *Pallasii* Turcz.), gestielte, ħ. f. Sibirien.
pilosa Turcz., behaarte, ħ. f. Mongolei.
tomentosula Hort., wenigfilzige, ħ. f. ?

Amyris L., Balsambaum.
decandra Brotero, zehnmännige, ħ. w. Brasilien.
heptaphylla Roxb. et *punctata* Roxb., v. Clausena heptaphylla et punctata.

Anacampseros Sims, Fettblatt.
trigona DC., dreiseitiges, ħ. t. Cap der gut. Hoffn.
rotundifolia Sweet = *telephiastrum* DC.
Anacamptis quadripunctata Sweet = Orchis quadripunctata (= *O. Brancifortii* Biv.), p. 566.

Anacyclus L., Ringblume.
inflatus Lehm., aufgeblasene, ⊙. f. Sibirien.
radiatus Loisel., γ) sulfureus.
valentinus L., β) purpurascens P.
divaricatus Cav., Balb. = clavatus, *hirsutus* Lam. = valentinus, *mucronulatus* Hort. = tomentosus.
Anadenia ilicifolia RBr. et *triternata* Cunningh., v. Grevillea ilicifolia et triternata, *Manglesii* Grah. (= *Grevillea Manglessii* Hort., p. 368), v. Manglesia cuneata.

Anagallis T., Gauchheil.
coerulea Schreb. var. corolla glanduloso-crenulata H. Heidelb.
Hybriden: Brewerl, coccinea, coerulea grandiflora, elegans, grandiflora, maxima, Parksii, Philippsii, Rosaliae.
Anagyris neapolitana Tenore = ? A. foetida, β) glauca, p. 52.

Ananassa sativa Lindl. var. polystrobila Haaskarl.
Anandria radiata Less. = A. Bellidiastrum, p. 84.

Anarrhinum Dsf., Lochschlund.
pubescens Fresen. (= *Cardiotheca pubescens* Ehbg.), weichhaariger, ⊙. f. Arabien.
Anaxetum crassifolium Schott = Polypodium crassifolium, p. 645.

Ancathia DC., Feuerdistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.
igniaria DC. (= *Onopyxus igniarius* Hort. = *Carthamus igniarius* Pall. = *Cirsium elegans* W. = *igniarium* Spgl.), altaische, 4. f. Altai.

Anchusa L., Ochsenzunge.
bifida Hort, zweispaltige, 4. f. ?
officinalis L., δ) micrantha Fisch. et Mey.
zeylanica Jacq. (= *tenella* Auct. non Hornem. = *Myosotis zeylanica* Jacq.), zeylonische, ⊙. f. m. Ceylon.
Ungewiss: dentata Hort.
saxatilis Pall., v. Stenosolenium saxatile.
sempervirens L. (= *Omphalodes sempervirens* D. Don, p. 557), v. *Caryolopha sempervirens*.
Ancistrocarpus Schrankii Ledeb. = Microtea debilis
Anda brasiliensis Radd. (= *Pisonis* Mart.) = Gomesii Juss., p. 869.

Digitized by Google

Andersonia R. B.

aristata Lindl., begrannte, ♄. t. Neuholland (Schwanenfl.).

gracilis DC., schlanke, ♄. t. Neuholland.

lanuginosa Cunningh., wollige, ♄. t. Neuholland.

Andrachne L., Andrachne.

aspera Spgl., rauhe, 4. k. Aegypten.

Andrographis echioides N. E., *paniculata* Wall., v. Justicia Sect. II. p. 434.

Andromeda L., Andromede.

Drummondii Hort. belg., Drummond's, ♄. ♄. k. f. b. Nordamerika.

phillyreaefolia Hook. = Pieridia, v. Pieris phillyreaefolia.

Watsoniana Steud. (= *salicifolia* Wats.), v. Lyonia salicifolia.

Andropogon L., Bartgras.

abyssinicus R. Br., Fres., abyssinisches, 4 k. Abyssinien.

altissimus Hochst., höchstes, 4. k. Abyssinien.

avenaceus Mchx. (= *ciliatus* Ell. = *nutans* Mühlbg. = *stipoides* H. B. = *Trachypogon stipoides* N. E.), haferähnliches, 4. f. b. k. Nord- u. Südamerika.

lanceolatus Roxb. (= *Batratherum lanceolatum* N. E.), lanzettliches, 4. w. Ostindien.

Nardus L. (= ? *citriodorus* Desf.), Narden-B., 4. w. Ostindien.

nutans L., nickendes, 4. f. b. k. Nordamerika, Jamaica.

pertusus W. (= *Holcus pertusus* L.), durchbohrtes, 4. w. Ostindien, Neuholland.

caffrorum Kunth, *cernuus* Roxb., *elongatus* Spgl., *rubens* Kunth, *saccharatus* Roxb., *Sorghum* Brot., v. Sorghum caffrorum, cernuum, elongatum, rubens, saccharatum et vulgare, p. 883. = *hispidus* W. (= *virens* Spgl.) = Arundinella Mikanf.

Androsace T., Mannschild, sect. II.

lanuginosa Wall., Hook., wolliges, 4. k. f. b. Nepal.

β) glabrior Wall.

Androsaemum hircinum Spach, *pyramidale* Spach, *Webbianum* Spach = Hypericum hircinum, elatum et grandifolium, p. 409 seq.

Androtrichum Brogn., Mannshaar, III. 1., Cyperaceae.

polycephalum Brogn. (= *Abildgardia polycephala* Brogn. = *Cyperus prolifer* N. E. = *C. triguus* Spgl. = *Eriophorum montevidense* Lk. p. 309), vielköpfiges, 4. w. Montevideo.

Aneilema RBr., Aneilema.

spirata RBr. (= *Commelyna spirata* L. mant.), wellenblätterige, ☉. f. m. w. Ostindien.

Aneimia Sw., Nacktähre.

cheilanthoides Kaulf., schuppenfarrnähnliche, 4 w. Brasilien.

cordifolia Presl, herzblätterige, 4. w. Brasilien, Westindien.

densa Lk. (= A. *Phyllitidis* Sw. var. = *fraxinifolia* Raddi), dichte, 4. w. Brasilien.

Dregeana Kunze, Dregé's, 4. w. ? Südafrika.

hirta Sw., rauhe, 4. w. Westindien.

laciniata Lk., schlitzwedelige, 4. w. ? Brasilien.

longifolia Raddi var. undulata Kunze (= *oblongifolia* Hort. Angl.).

mandiocana Raddi, mandiocaische, 4. w. Brasilien.

media Lk., mittlere, 4. w. ?

Digitized by Google

Aneimia
Phyllitidis Sw. (= *longifolia laevis* Raddi = *Anemidictyon*).
Raddiana Lk. = flexuosa Sw., Zweifelhaft: coccinea Hort.
Anemagrostis interrupta Trin., *spica venti* Trin. = Apera interrupta et spica venti, p. 68.

Anemarrhena Bunge, Windlilie, VI. 1., Liliaceae-Asphodeleae.
asphodeloides Bunge, affodilähnliche, 4. k. f. b. Nord-China.

Anemone T., Windblume.
multifida Poir. (= *Hudsoniana* Richards.), β) sanguinea Pursh.
nemorosa L., a) alba, b) flore pleno, β) rubra (*rosea*), b) flore pleno, γ) coerulea, δ) sulphurea Kunze, Pritzel, ε) biflora Hoppe, ζ) parviflora Schltdl., η) hirsuta Wierzb., ϑ) semiplena.
obtusiloba D. Don (= *Govaniana* Wall.).
parviflora Mchx. (= *cuneifolia* Juss. = *cuneata* Schltdl. = *tenella* Banks, Herb. nec Pursh. = *borealis* Richards. = *sylvestris* β) *alba minor* Schrank).
Richardsonii Hook. (= *arctica* Fisch. = Vahlii Hornem.).
Zweifelhaft: acanthifolia Rich.
semperflorens Hort. (= *chinensis* et *sempervirens* Hort.) = coronaria, *uniflora* Pursh = Thalictrum anemonoides p. 805, *uralensis* Fisch. = coerulea, *versicolor* Salisb. = hortensis.

Anethum T. Dill.
cymbocarpum DC., cymbelfrüchtige, ⊙. f. Caucasus, Persien.
segetum d'Urville, v. Ridolfia segetum.

Angelica L., Angelica.
anomala Lallem. (= *Peucedanum angelicaefolium* Hort.), abweichende, ♂, f. Sibirien.
dura C. Koch, harte, ♂. f. Nordarmenien.
laevis Gay., glatte, 4. f. Spanien.
lucida L. (? = *lobata* Walt. = *Imperatoria lucida* Spgl. = *I. verticillaris* Hort.), glänzende, 4. f. Nordamerika.
atropurpurea L., *sativa* Mill. (= *officinalis* Mch. = *Archangelica* L.) = Archangelica atropurpurea et officinalis, p. 72.

Angelonia H. B. K., Angelonie, p. 869.
cornigera Hook. (= *ciliata* Gardn.), hörnertragende, ☺ ♂. w. Brasilien.
Gardneri Hook. (*Gardneriana*, *grandiflora* Hortul.), Gardner's, 4. ♄. w. Brasilien.
procumbens Nees, Mart. (= *Physidium procumbens* Schrad. = *Schelveria argula* Nees), niederliegende, 4. w. Brasilien.
pubescens van Houtte, weichhaarige, 4. ♄. w, Brasilien.
Angostura Cupare R. et S. = Galipea trifoliata, p. 343.

Angraecum A. P. Th. (= *Aërobion* Spgl.), p. 869.
apiculatum Hook., kurzspitziges, 4. w. Sierra Leone.
armeniacum Lindl., armenisches, 4. w. Sierra Leone.
ashantense Lindl., ashantisches, 4. w. Sierra Leone.
bilobum Lindl., zweilappiges, 4. w. Sierra Leone.
clandestinum Lodd., heimlichblühendes, 4. w. Sierra L.

Digitized by Google

Angraecum
gladiifolium Pet. Thouars., degenblätteriges, 4 w. Mascarenas, Madagascar.
pellucidum Lindl., durchschimmerndes, 4. w. Sierra Leone.
teretifolium Lindl., stielrundblätteriges, 4. w. Sierra Leone.

Anguloa R. et P., p. 60.
Clowesii Lindl., Clowes's. 4. w. Columbia.
superba H. B., stolze, 4. w. Peru.
uniflora R. et P., einblumige, 4. w. Columbia.

Anguria L., Birnengurke.
pedatisecta N. E. Mart. (= *Momordica pedata* L.); fußförmiggespaltene, ☉. m. f. w. Peru.

Anhalonium Lem. (= *Ariocarpus* Scheidw.), v. Cacteae.

Ania Lindl., Anie, XX. 1., Orchideae.
angustifolia Lindl., schmalblätterige, 4. w. Ostindien.
bicornis Lindl., zweihörnige, 4. w. Ceylon.
latifolia Lindl., breitblätterige, 4. w. Ostindien.

Anigozanthos LaBill., Röhrenschwertel.
glauca Hort. belg., blaugrüner, 4. t. k. Neuholland.
humilis Hort. belg., niedriger, 4. t. k. Neuholland.
pulcherrima Hook., schönster, 4. t. k. Neuholland (Schwanenfluss).
viridis Hort. belg., grüner. 4. t. k. Neuholland.
Anisacanthus quadrifidus N. E. = Justicia quadrifida, p. 435.

Aniseja Choisy, Aniseja, V. 1., Convolvulaceae.
biflora Choisy (= *Convolvulus biflorus* L. = *Ipomoea biflora* P.), zweiblumige, ☉. Sch. f. China.
calystegioides Choisy (= *Ipomoea crassipes* Hook.), dickstielige, 4. ♄. Sch. w. Südafrika.
uniflora Choisy (= *Convolvulus Bentira* Hamilt. = *C. emarginatus* Vahl, = *C. Rheedii* Wall. = *C. uniflorus* Burm. = *Ipomoea uniflora* R. et S.), einblumige, 4. Sch. w. Ostindien, Java.

Anisochilus carnosus Wall., Benth. (= *Plectranthus carnosus* Sm. = *P. strobiliferus* Roxb. = *crassifolius* Hortul.), β) purpurascens, γ) glaber Schrad.
Anisoderis foetida Cass., *rhoeadifolia* Fisch. et Mey. = Barkhausia foetida et rhoeadifolia, p. 113.
Anisum officinale Mch. (= *vulgare* G.) = Tragium Anisum, p. 814.

Annesorrhiza Chamiss., Schltdt., Zahlwurz, V. 1., Umbelliferae.
capensis Schltdl. (= ? *Oenothera interrupta* Thbg., p. 554), capische, 4. k. Cap der guten Hoffnung.
montana Eckl., Zeyh. (= ? *Oenothera interrupta* Thbg. l. c.), Berg, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.
Annesleia falcifolia Salisb. (= *Houstoni* Sweet) et *grandiflora* Sweet = Inga anomala et Houstoni, p. 416 et 417.

Anoda Cav., Sommermalve.
amplissima Hort. Amstelodam. (var. acerifol. ?), weitästige, ☉. f. ?
cristata Schltdl. (= *Dilleniana* Cav. = *lavateroides* Medic. = *triloba* Cav. = *Sida cristata* α) L. = *S. Dilleniana* W.), kammförmige, ☉. f. Mexico.
hastata Cav. (= *Dilleniana* Schltdl. = *Sida cristata* β) L. = *S. hastata* W. = *S. centrata* Spgl. = *acerifolia* Zucc. et *Zuccagnii* Spgl.).

Digitized by Google

Anoda
pubescens Schltdl., weichhaarige, ⊙. f. Mexico.
triangularis DC. (= *Sida deltoidea* Hornem. = *S. suberosa* Hortul. = *S. incarnata* Spgl. = *S. triangularis* W.).
β) brachyantha Rchb.
Anoectochilus argenteus Hort. belg., v. Spiranthes argentea.
Anogra Douglassiana Spach, *Nuttalliana* Spach = Oenothera pallida et albicaulis.
Anogramma chaerophylla Lk. et *leptophylla* Lk. = Gymnogramma chaerophylla et leptophylla, p. 371.
Anomatheca xanthospila Ker = Waitzia xanthospila Rchb., p. 855.

Anona L., Flaschenbaum.
squamosa L., schuppiger, ♄. w. Ostindien.

Antelaea G. ? ?
canescens Cels., graugrüne, ♄. k. t. ? ?
Antennaria Leontopodium G. = Leontopodium alpinum, p. 453.

Anthemis L., Chamille.
arvensis L., γ) incrassata Loisel., δ) granatensis Boissi.
chrysoleuca Gay, goldfarbigweifse, ⊙. f. Oran.
suaveolens Schwägr., gutriechende, 4. f. ?
suffruticosa Lehm., halbstrauchige, ♄. f. ?
Ungewifs: senecioides Hortul.

Anthericum L. (*Phalangium* Lam.), Zaunlilie.
albucoides Ait. (= *Albuca anthericoides* Sweet = *Ornithogalum albucoides* Thbg. = *Phalangium albucoides* Poir.), weifsblumenähnliche, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
scilloides Schult., meerzwiebelähnliche, 4. k. t. Buenos Ayres.
Unbestimmtere: cernuum Hornem. 4., Renardii Hort., sibiricum Hortor. 4.
comosum Stbg. (= *Sternbergianum* Schult. fil.), v. Chlorophytum Sternbergianum, *Jacquinianum* Schult. (= *flexifolium* Jacq. non L.), *muricatum* L. suppl. Thbg., v. Trachyandra Jacquini etc. *A. blepharophorum* R. et S. (= *ciliatum* Jacq.), *divaricatum* Jacq., *elongatum* W., *falcatum* Thbg., *filiforme* Ait., *flexifolium* L., *floribundum* Ait., *hirsutum* Thbg., *longifolium* Jacq., gehören ebenfalls zur Gattung Trachyandra.

Anthocercis LaBill., Strahlenblume, floribunda Hort. belg., blüthenreiche, ♄. t. Neuholland.

Anthochlamys Fenzl., Blüthenhüllchen, I. II., Aizoideae-Chenopodeae (Oleraceae).
polygaloides Fenzl (= *Corispermum polygaloides* Fisch. et Mey.).

Anthoxanthum L., Ruchgras.
angustifolium Hort., schmalblätteriges, 4. f. ?
Carrenianum Parlatore, Careno's, 4. f. Spanien.

Anthriscus P., Klettenkörbel.
Cicutaria Duby (= *humilis* Bess., *sylvestris* Hoffm. var. K. = *Chaerophyllum Cicutaria* Vill.), Wasserschierlingähnlicher, 4. f. Mitteleuropa.
nitens Bernh. (= *Chaerophyllum nitens* Turcz.), schimmernder, 4. f. Rufsland.
sylvestris Hoffm., β) daucifolium Dsf.

Digitized by Google

Anthurium Schott, Endl. (*Pothos* Auct., p. 683), Blüthenschwanz.

acaule Schott (*Pothos acaulis* Jacq. = *P. Scolopendrium* Spgl. = *P. longifolius* H. Berol.).

amplum Kunth (*Pothos macrophylla* Hort. Berol.), umfassender, 4. w. ?

Beyrichianum Kunth, Beyrich's, 4. ħ. w. Brasilien.

cartilagineum Kunth (= *P. cartilaginea* Dsf.), knorpelblätteriger, 4. w. ?

caudatum Kunth (= *P. caudata* Hort.), schwänziger, ħ. Sch. w. ?

cordifolium Kunth (= *Pothos cordata* W. E. = *macrophylla* Hook. excl. Synon.).

coriaceum Endl. (= *Pothos coriacea* Grah.), lederartiger, 4. w. Brasilien.

crassinervium Schott (= *Pothos crassinervia* Jacq.).
β) maximum (= *Pothos maxima* Dsf.).

digitatum Schott (= *Pothos digitata* Jacq.).

glaucescens Kunth (= *Pothos glauca* Schott = *reflexa* Hffmg.).

gracile Lindl. (= *Pothos gracilis* Rudge).

grandifolium Kunth (= *P. grandifolia* Jacq.), großblätteriger, 4. w. Caracas.

Harrisii Endl. (= *P. Harrisii* Grah.).

Hookeri Kunth (= *P. acaulis* H. Berol. = *P. crassinervia* Hook. = ? *P. acaulis* Lodd.), Hooker's, 4. w. Demerara.

indecorum Schott (= *P. indecora* Hort.), unzierlicher, 4. w. Brasilien.

intermedium Kunth, mittlerer, 4. ħ. w. ?

lanceolatum Kunth (= *P. lanceolata*).

leptostachyum Schott (*P. leptostachya* Hort.), schlankähriger, 4. w. Brasilien.

longifolium Kunth (= *P. longifolia* Hffg. = *P. elongella* H. Berol.).

lucidum Kunth (*P. lucida* Hort. Berol.), glänzender, 4. ħ. Brasilien.

macrophyllum Kunth (= *P. macrophylla* Sw. excl. Synon. Jacq. = *Dracontium cordatum* Aubl.).

microphyllum Endl. (= *P. microphylla* Hook.).

obtusifolium Kunth (= *P. obtusifolia* Ait.).

Olfersianum Kunth (= *P. lucida* H. Berol.), Olfer's, 4. ħ. w. Brasilien.

Ottonianum Kunth, Otto's, 4. ħ. Sch. w. Brasilien.

palmatum Kunth (= *P. palmata* L.).

pedatum Endl. (= *P. pedata* H. B. K.).

pentaphyllum Endl. (= *P. pentaphylla* Curt.).

rubricaule Kunth (*P. rubricaulis* H. Berol. = *P. rubescens* Hort.), rothstengeliger, 4. ħ. w. Brasilien.

rubrinervium Kunth (= *P. rubrinervia* Lk. = *P. suaveolens* Dsf.), rothnerviger, 4. ħ. w. Guiana.

sagittatum Kunth (= *P. sagittata* Sims.).

Sellowianum Kunth, Sellow's, 4. w. Brasilien.

subsagittatum Kunth (= *P. subsagittata* H. B. K.), wenigpfeilblätteriger, 4. w. Neu-Andalusien.

trinervium Kunth, dreinerviger, 4. w. Brasilien.

undulatum Schott (= *P. undulata* H. Berol.), wellenblätteriger, 4. w. Brasilien.

variabile Kunth (= *P. ennaphylla* et *heptaphylla* Flor. Flumin. ?) veränderlicher, 4. ħ. Sch. w. Brasilien.

Digitized by Google

Anthurium

violaceum Schott, α) latifolium (= *P. violacea* Sw.), β) angustifolium (= *P. leuvocarpa* H. Berol.).

Willdenowii Kunth (= *P. lanceolata* W.), Willdenow's, 4. w. ?

Anthyllis L., Wollblume.

macrocarpa Wender. (? var. A. Vulnerar.), grofsfrüchtige, 4. f. ?

quadricolor Hort. belg., vierfarbige, 4. f. ?

Weldepiana Rchb., Welden's, ♂. f. Dalmatien.

rustica Mill. = Vulneraria.

Anticlea Kunth (Anticlea, Mutter des Ulysses), VI. III., Colchicaceae (*Melanthaceae*), (Juncaceae, b) Veratreae Rchb.).

glauca Kunth (= *Zygadenus glaucus* Nutt. = *glaberrimus* H. Berol. = *commutatus* R. et S. = *Helonias glaberrima* Sims excl. Synon.), blaugrüne, 4. f. b. k. Nordamerika.

sibirica Kunth (= *Melanthium sibiricum* L. p. 506 = *Leimanthium sibiricum* R. et S. = *Zygadenus sibiricus* Endl.).

Antidesma L.

Bunius Spgl. (*A. alexiteria* var. Auct. = *A. Stilago* Poir. = *Stilago Bunius* L.), dreimännige, ħ. w. Amboina.

Antirrhinum T., Löwenmaul.

angustifolium Poir. (= *jamaicense* Fisch.), schmalblätteriges, ☉. ħ. m. f. k. Jamaica.

majus L., var. quadricolor Paxton, var. ? eximium Hort.

ryditospermum Fisch. et Mey. (= *ryditocarpum* G. Don), grubigsamiges, ☉. f. Sibirien. (Zu berichtigen p. 869).

Anurus Nissolia E. Mey. (*linifolius* Presl.) = Lathyrus Nissolia, p. 448.

Aotus Sm., Haarkelch.

cordifolia Benth., herzblätteriger, ħ. t. Neuholland.

ferruginea LaBill. (*villosa* β DC.), rostfarbiger, ħ. t. Neuholland.

gracillima Meisn., schlankster, ħ. t. Schwanenfluss.

lanigera Cunningh., wolliger, ħ. t. Neuholland.

villosa Sm. (= *Pultenaea ericoides* Vent. = *rosmarinifolia* Sieb.), zottiger, ħ. Neuholland.

Aphelandra RBr., Aphelandra.

aurantiaca Lindl. (= *ignea* N. E. = *Hemisandra aurantiaca* Hort.), orangenfarbige, ħ. w. Mexico.

Apium chilense Hort. Par. v. Wydleria chilensis.

Aplectrum hyemale Sweet = Corallorrhiza hyemalis.

Apollonias canariensis N. E. = Laurus canariensis, p. 449.

Apteranthes Mik., Flügellosblümchen, V. II., Asclepiadeae.

Gussoneana Mik. (= *Stapelia Gussoneana* Jacq. fil. p. 782 = *europaea* Guss. = *Piaranthus Gussoneanus* G. Don).

Aptosimum Burchel, Aptosimie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

depressum Burch., niedergedrückte, ħ. k. t. Südafrika.

procumbens Burch. (= *Ohlendorfia procumbens* Lehm.), niederliegende, ħ. k. t. Südafrika.

Aquilegia T., Ackelei.

glandulosa Fisch., var. major, gigantea, rubra Hort.

Digitized by Google

Aquilegia
glauca Lindl., blaugrüne, 4. k. f. b. Himalaya.
sinensis van Houtte, chinesische, 4. k. f. b. China.
Skinneri Hook., Skinner's, 4. f. Nordamerika.
Gartenvarietäten: non plus ultra, pulchervima.
hybrida Sims = bicolor Rhrh.

Arabis L., Gänsekraut.
colorata Tausch, farbiges, ? 4. f. ?
declinata Schrd. (? Turritis Grahami Lehm.), niedergebeugtes, ♂. 4. f. Nordamerika.
fruticulosa C. A. Mey, strauchiges, 4. ħ. f. Altai.
heteromalla Schrad., verschiedenwendiges, ♂. f. Nördlichstes Amerika.
incana Roth non W. (= *minor* H. Berol.), weifsgraues, ♂. f. Schweiz, Frankreich.
Ludoviciana Fisch. et Mey. (= *Cardamine Ludoviciana* Hook. = *Cardamine Engelmanniana* H. Berol. = *Sisymbrium Ludovicianum* Nutt.), Ludovicisches, ⊙. ♂. f. Neu-Orleans.
sibirica Hort. angl., sibirisches, 4. f. Sibirien.
Sieberi Tausch (= *stricta* Sieb.), Sieber's, ♂. 4. f. Oesterreichische Alpen.
sudetica Tausch (= *ciliata* Tausch), Riesengebirgs-G., 4. f. Sudeten.
Marschalliana Hort. = hirsuta, *Thaliana* L. = Sisymbrium Thalianum, p. 762.
Arachnites alpina Schm. = Chamaerepes (Chamorchis) alpina, p. 187, *antropophora* Schm. = Aceras antherpophora, p. 9, *fuciflora* et *muscifloro* Schmidt = Ophrys arachnites et myodes, p. 562, Monorchis Hoffm. = Herminium Monorchis, p. 392.
Arachnopogon heterospermum Hort. = Hypochaeris Salzmanniana, p. 880.

Aralia L., Aralie, Bergangelika.
ciliata van Houtte, gewimperte, ħ. w. ? Ostindien.
crassifolia Soland., Hook. (= *heterophylla* Soland.), dickblätterige, ħ t. k. Neuzeeland.
Hügelii Hort., Hügel's, ħ. t. k. Neuholland.
insignis Hort., ausgezeichnete, ħ. t. k. ?
longifolia Reinwardt (= *Paratropia longifolia* DC. = *Sciadophyllum longifolium* Blume), langblätterige, ħ. w. Java.
pinnata Hort. belg., gefiederte, ħ. w. ? Ostindien.
Scheffleva Spgl. (= *Schefflera digitata* Forst.), Scheffler's ħ. t. k. Neuzeeland.
trifoliata Meyen, dreiblätterige, ħ. k. t. China.
? *chinensis* L., *cordata* Thbg., *japonica* Thbg., v. Dimorphanthus elatus, edulis et japonicus.

Araucaria Juss., Schmucktanne.
Bidwilli Hook.[1]), Bidwill's, ħ. t. k. Moreton Bai in Australien.
gracilis Mack. Catal., schlanke, ħ. t. k. ?
Dombeyi Rich. = imbricata.
glauca Mack. Catal. = ? Cunninghamia lanceolata glauca.

Arauja Broter., Arauja, V. II., Asclepiadeae.
albens G. Don (= *Physianthus albens* Mart., p. 621).
sericifera, Seidetragende. ħ. w. Peru.

---

1) Banza-tanza oder Banyatunya der Eingebornen, 1843 von Bidwill in England eingeführt.

Digitized by Google

Arbutus T., Erdbeerbaum.

Andrachne L., β) lucida Hort., γ) serratifolia Hort., δ) with large oblong fruit Hort. angl., ε) with large compressed fruit Hort. angl.

cassinifolia Hort. angl., Cassineblätteriger, ħ. k. t. Madeira.

chinensis Hort. belg., chinesischer, ħ k. t. China.

farinosa van Houtte, mehliger, ħ. k. t. ?

procera Dougl. (non Soland.), hoher, ħ. k. Nordamerika.

punctata Hook., Arn., punktirter, ħ. k. Californien.

turbinata P. (= *andrachneides* Lk. = *hybrida* Ker = *serratifolia* Lodd.), aufgetriebener, ħ k. Südeuropa.

β) Milleri Sweet.

arguta Zucc. = Arctostaphylos arguta, *Cummingii* Hort. = Pernettya Cummingii, *discolor* Hook. (= *nitida* Hort.) = Arctostaphylos discolor.

Arceuthobium Oxycedri MB. = Viscum Oxycedri, p. 852.

Archangelica officinalis Hoffm., α) sativa, β) discocarpa γ) decurrens Lallem. (Ledeb.).

Die letztere von Ledebour als eigne Art aufgenommen, ist im altaischen Sibirien heimisch. Vergl. p. 72.

Archemora DC., Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

rigida DC. (= *Oenanthe rigida* Nutt. = *Oxypolis rigida* Rafin. = *Pastinaca rigida* Spgl. p. 591 = *Sison marginatum* Mchx. = *Sium rigidius* L.), starre, 4. Wa. f. Nordamerika.

tricuspidata DC. (= *Oxypolis triouspidata* Rafin. = *Sium rigidius* Walt. non L. = *Sium triouspidatum* Ell.), dreispitzige, 4. Wa. f. Carolina.

Arctogeron DC., Bärling, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

gramineum DC. (= *Erigeron gramineus* L., p. 308).

Arctostaphylos Adans., Bärentraube.

arguta Zuccar. (= *Comarostaphylis arguta* Zuccar.), spitzzähnige, ħ. k. t. Mexico.

discolor DC., verschiedenfarbige, ħ. k. t. Mexico.

nitida Benth., glänzende, ħ. k. t. Mexico.

pungens H. B. K. (tomentosa β Lindl.), stechende, ħ. k. t. Mexico.

*pilosa** p. 73 = Pernettya pilosa, p. 608.

Arctotheca Wendl., Bärenbüchse.

hirta Schrad, kurzhaarige, 4. k. Cap der g. Hoffn.

Arctotis L., Bärenohr.

flammea Jacq. fil., feuerfarbiges, ħ. k. t. Cap d. g. H.

grandiflora Jacq. (= *laevis* Thbg. var.), großblumiges, ħ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

maculata Jacq. (= *arborescens* W. = *aspera* DC. ε = *scabra* Berg.), gefleckte, ħ. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Massoniana Spr. (= *grandiflora* Spgl.), Masson's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pusilla DC., niedrigstes, ⊙. f. Cap der gut. Hoffn.

speciosa Jacq. (*acaulis* L. δ DC. = *breviscapa* Thbg. = ? *grandiflora* Ait. non Jacq.), prächtiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Jacq. (= *laevis* Thbg. var. Less. DC.), sparriges, ħ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

tricolor Jacq. (= *acaulis* β DC.), dreifarbiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

undulata Jacq. (= *acaulis* γ DC. = *lanata* Thbg.), wellenblätteriges, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Digitized by Google

nodosa Thbg. = Chrysanthemum nodosum.
Arcyphyllum erectum Nutt. et *simplicifolium* Ell.) = Rhynchosia erecta et reniformis, p. 688.

Ardisia Sw., Spitzblume.

anceps Wall., zweischneidige, ħ. w. Silhet.
attenuata Wall. (= *alternata* DC.), verdünnte, ħ. w. Ostindien.
crispa A. DC. (= *Bladhia crispa* Thbg. = *Ard. crenulata* Lodd. non Vent. = *crenata* Bot. mag. = *lentiginosa* Ker = *glandulosa* Blume), krause, ħ. w. Japan, China, Ostindien.
β) elegans Andr. (= *A. crenata* Roxb. Wall.).
glabra A. DC. (= *Bladhia glabra* Thbg.), kahle, ħ. t. Japan.
humilis Vahl (= *solanacea* Roxb. = *littoralis* Andr. = *A. Doma* Wall. = *oleracea* Wall. = *umbellata* Roxb. Lodd. = *Anguillaria solanacea* Poir. = *zeylanica* G.), *β*) solanacea Wall., *γ*) grandiflora Wall., *δ*) Wightiana Wall.
japonica Hornst. (= *Bladhia japonica* Thbg.), japanische, ħ. t. Japan.
β) Belgorum A. DC. (japonica Morr., et Decaisne, *odontophylla* Lindl. non Wall.).
mexicana van Houtte, mexicanische, ħ. t. Mexico.
pentagona DC. (= *quinquegona* Blume), fünfkantige, ħ. w. Java, China.
racemosa Spgl., traubige, ħ. w. Brasilien.
speciosa Blume, prächtige, ħ. ħ. w. Java.
latifolia R. et S. v. Badula Lamarckiana = *Lindleyana* Dietr. = punctata.
Arduina bispinosa L. mant. = Carissa Arduina, *bispinosa* Lodd., Hortul. = Carissa ferox.

Areca L., Arecapalme.

alba Bory, weifse, ħ. w. Mascarenas.
aurea Makoy Catal., goldfarbige, ħ. w. ?
Dicksonii Makoy Catal., Dickson's, ħ. w. ?
madagascariensis Mart., madagascarische, ħ. w. Madagascar.
Nenga Blume, Nenga-A., ħ. w. Java.
pumila Blume, kleine, ħ. w. Java.
sapida Forst., Soland., wohlschmeckende, ħ. w. Neuzeeland.
lutescens Bory = Hyophorbe indica.

Arenaria L., Sandmiere.

gothica Fr. (= *ciliata β* Wahlbg.), gothische 4. f. Schweden.
tenuiflora Schrad., dünnblumige, ⊙. f. ?
cephalotes MB., *procera* Spgl. = Eremogone cephalotes et E. procera, *muralis* Sieber = Stellaria muralis, p. 786.
Arenga saccharifera LaBill. (= Gomutus saccharifer Spgl. p. 364 = *G. Rumphii* Correa = *Borassus* Gomutus Lour. = *Saguerus Rumphii* Roxb. = *Saguerus Gomuto* Houtt.).

Argemone T., Stachelmohn.

mexicana L., *β*) floribus ochroleucis (= ? *ochroleuca* Sweet), *γ*) flor. albis (= *alba* Rafin = ? *albiflora* Hornem.).
rosea Hook., rosafarbiger, ⊙. f. Chili.

Argyreia Lour., Silberwinde.

argentea Arn. Choisy (= *Convolvulus argenteus* Wall.

Digitized by Google

Argyreia
= *Lettsomia argentea* Roxb.), wahre, ♄. Sch. w. Ostindien.
capitata Arn. Chois. (= *Convolvulus capitatus* Vahl = *Convolvulus strigosus* Roxb. = *Ipomoea capitata* R. et S. p. 410 = *Lettsomia strigosa* Roxb.).
cuneata Ker (= *Convolvulus cuneatus* W. = *Lettsomia cuneata* Roxb. = *Ipomoea atrosanguinea* Sims).
elliptica Arn. Chois. (= *Convolvulus ellipticus* Heyne, Roth = *C. laurifolius* Roxb. = *C. peduncularis* Wall. = *Ipomoea elliptica* Roth = *I. laurifolia* Sweet, p. 419), elliptische, ♄. Sch. w. Ostindien.
Guichenotii Chois. (= *Convolvulus Reinwardtianus* Dietr. = *Ipomoea asclepiadea* Chois. = *I. pulchra* et *Reinwardtiana* Blum.), Guichenot's, ♄. Sch. w. Java, Timor.
malabarica Arn. Chois. (= *Convolvulus malabaricus* L. = *Ipomoea malabarica* R. et S., p. 420).
mollis Chois. (= ? *Convolvulus gracilis* Salisb. = *C. mollis* Burm. = *C. sericeus* L. mant. = *Ipomoea sericea* Blume = *Lettsomia hispida* Hook.), weiche ♄. Sch. w. Ostindien.
pomacea Chois. (= *Convolvulus Choisyanus* Wall. = *C. Rottleri* Spgl. = *Ipomoea zeylanica* G. = *Lettsomia pomacea* et *strigosa* Roxb.).
Roxburghii Arn. Chois. (= *Convolvulus Roxburghii* Wall. = *Ipomoea amoena* Blume = *multiflora* Roxb. = *Roxburghii* Sweet, p. 420).
setosa Arn. Chois (= *Convolvulus confertus* H. Hamb. = *C. setosus* Roxb. = *C. strigosus* Spgl. = *Ipomoea strigosa* Roth, p. 421 = *Lettsomia setosa* Roxb.), borstige, ♄. Sch. w. Ostindien.
speciosa Sweet (= *Convolvulus nervosus* Burm. = *C. speciosus* L. fil. = *Ipomoea speciosa* P. = *Lettsomia nervosa* Roxb.).
splendens Sweet (= *Convolvulus splendens* Hornem. = *Lettsomia splendens* Roxb. = *Ipomoea splendens* Bot. mag.).
bona nox Sweet, *ornata* Sweet, *uniflora* Sweet, v. Rivea bona nox, R. ornata et R. hypocrateriformis.
Argyrocome ferruginea Schrk. et *Staehelina* Schrk. = Helipterum speciosissimum et ferrugineum.

Argyrolobium Eckl. Zeyh., Silberblatt, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Papilionaceae.
argenteum Eckl. et Zeyh. (= *Crotalaria argentea* Jacq. p. 234).
gracile Fenzl, schlankes, ♄. k. Aleppo.
Linnaeanum Walp. (= *Cajanus argenteus* Spgl. = *Genista argentea* Noulet = *Chusmone argentea* E. Mey. = *Cytisus argenteus*, L. p. 248).
Andrewsianum Steud., *calycinum* Jaub. et Spach, v. Trichasma ciliatum et calycinum.
Aria Hostii Jacq. fil. et *A. nivea* Hort. = Sorbus scandiaca Fr. var. et Sorbus Aria, p. 773.
Ariocarpus Scheidw., v. Cactéae, p. 872.

Arisaema Mart., Schott, Arisaema, XXI. IX., Aroideae.
atrorubens Blume (= *Arum atrorubens* Ait., p. 85 = *Arum triphyllum* L. = *A. triphyllum* var. *Zebrinum* Bot mag., p. 86).
Boscii Blume (= *Arum Dracontium* Bosc non L.), Bosc's, 4. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Arisaema
brasilianum Blume (= *Arum triphyllum* L. spec.), brasilianisches, 4. w. Brasilien.
costatum Mart. (= *Arum costatum* Wall., p. 87).
Dracontium Schott (= *Arum Dracontium* L., p. 85).
filiforme Blume, (= *Arum filiforme* Reinwardt, p. 85), 4. w. Java.
nepenthoides Mart. (= *Arum nepenthoides* Wall. p. 85).
pentaphyllum Schott (= *Arum pentaphyllum* L., p. 86).
ringens Schott (= *Arum ringens* Thbg., p. 86).
speciosum Mart. (= *Arum speciosum* Wall., p. 86).

Arisarum T., Kugelwurz.
proboscideum Schott (= *Arum proboscideum* L., p. 86).
vulgare Targion., Tozzetti (= *australe* Rich.).

Aristea Soland., Borstenlilie.
dichotoma A. Dietr. (= *Moraea dichotoma* Thbg.), zweizinkige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
melaleuca Ker (= *lugens* Hort. = *Moraea lugens* L., *M. melaleuca* Thbg.).
repens. A. Dietr. (= *Moraea repens* Schrk.), kriechende 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
spathacea Spgl. (= *Bobartia juncea* Salisb. = *Moraea spathacea* Thbg.), scheidige, 4. k. t. Cap d. g. H.
umbellata Spgl. (= *Moraea umbellata* Thbg. = *M. corniculata* Lam.), doldige, 4. k. t. Cap d. g. H.

Aristida coerulescens Dsf. (= *canariensis* W. = *gigantea* Hort. = *nutans* Hort. Berol. = *setacea* Hort.).

Aristolochia T., Osterluzei.
arkansana Lodd. (= *Arkansa*, p. 78).
Bonplandii Tenore, Bonpland's, 4. Sch. w. Buenos Ayres.
Gigas Hartw. et Skinner, riesenblumige, ħ. Sch. w. Guatemala.
hyperborea Paxt., Sweet, nördliche, ħ. Sch. w, t. Ostindien.
Kämpferi W., Kämpfer's, ħ. Sch. k. t. Japan.
ornithocephala Hook. (= ? *brasiliensis* Mart. = *ringens* Lk. et Otto), vogelköpfige, ħ. Sch. w. Brasilien.
Ottonis Hort., Otto's, ħ. Sch. w. ? Südamerika.
pedatinervia Brotero, fufsförmignervige, ħ. Sch. w. ? Südamerika.

Armeria W., Grasnelke.
alpina W., b) alba.
Oran H. Hafn. (= *Statice Oran* H. Par.), afrikanische, 4. f. b. k. Nordafrika.
splendens Webb (= *Statice splendens* Lagasc.), schimmernde, 4. f. b. k. Spanien.
? Gartenhybriden: formosa, intermedia, superba, ? = *arborescens* Hort. = fasciculata.

Arnebia Forsk., Arnebie, V. 1., Asperifoliaceae.
cornuta Fisch. et Mey., gehörnte, ⊙. f. Sibirien.
guttata Bunge, betropfte, ⊙. f. Sibirien.

Aronicum Doronicum Rchb. (= *Clusii* K.), β) longifolium Rchb., γ) Bauhini Rchb. (= *scorpioides* δ DC.), δ) glaciale Rchb., (*scorpioides* γ DC.), vergl. p. 80.
Arpitium simplex G. Don = Gaya simplex.

Arnophyllum La Llave, Sichellblatt.
coccineum Hort. belg., scharlachfarbiges, 4. w. ? Mexico

Arracacha Bancroft,
moschata DC. (= *Conium moschatum* H. B. K., p. 214).
xanthorrhiza Bancroft (= *esculenta*, p. 80).

Digitized by Google

Arrudea Cambess., St. Hil., Arrudea, ? XIII. 1., Guttiferae.
clusioides St. Hil., Clusiaähnliche, ħ. w. Brasilien.

Arthrolobium Desv. (= *Astrolobium* Auct. = *Ornithopus* II. p. 570), Gelenkhülschen XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
durum DC. (= *Ornithopus durus* Cav.).
ebracteatum DC. (= *Ornithopus ebracteatus* Brot.).
repandum DC. (= *Ornithopus repandus* Poir.).
scorpioides DC. (= *Ornithopus scorpioides* L.).

Arthropodium RBr., Gliederlilie.
Lindleyi Kunth (= *minus* Lindl. excl. syn.), Lindley's, 4. t. k. Neuholland.
fimbriatum RBr., v. Dichopogon setosus.

Arthrostemma Pav., Gliederfaden.
Humboldtianum Kunth et Bouché, Humboldt's, ħ. w. Caracas.
paniculatum D. Don, v. Oxyspora paniculata.

Artocarpus Forst., Brodfruchtbaum.
longifolia Hort., Cels., langblätteriger, ħ. w. ? Ostindien.
Locucha Roxb., Locucha-B., ħ. w. Ostindien.
parvifolia Voigt, kleinblätteriger, ħ. w. ? ?
pubescens W. (= *hirsuta* Lam.), weichhaariger, ħ. w. Ostindien.
rigida Blume, Sieboldt, starrer, w. Java.

Arum T. L., Schott, Kunth, Endl., Zehrwurz.
Dioscoridis Sibth., Sm., Dioscorides-Z., 4. f. h. k. Kleinasien.
italicum Mill., L., β) immaculatum.
orientale M. B.
pictum L. suppl. (= *corsicum* Loisel. = *balearicum* Buchoz.).
Rauwolfii Blume, (= *intortum* Russel), Rauwolf's, 4. k. Aleppo.
syriacum Blume non Spgl.
vulgare Lam. (= *maculatum* L. = *pyrenaeum* Lapeyr.), β) maculatum, γ) albo-venosum.
A. Arisarum L. et *proboscideum* L. = Arisarum vulgare et proboscideum, *A. atrorubens* Ait. (= *triphyllum* L.), *costatum* Mart., *Dracontium* L. etc. = Arisaema atrorubens costatum Dracontium etc., *arborescens* L., *grandifolium* Jacq., *hederaceum* L., *lacerum* Jacq., *pinnatifidum* Jacq., *punctatum* Dsf., *tripartitum* Jacq. = Philodendron arborescens, grandifolium etc., *A. auritum* L. (= *Caladium auritum* Vent.), = Syngonium auritum, *A. bicolor* Ait. et *pellucidum* Fulchir. et *pictum* Fulchir. = Caladium bicolor cum var., *A. colocasioides* Dsf. = Caladium colocasioides, *A. bulbiferum* Roxb. (= *spectabile* Zippl.), *campanulatum* Roxb. = Amorphophallus bulbifer et campanulatus, *A. clavatum* Dsf. (= *pedatum* W. E.), *guttatum* Wall. *sessiliflorum* Roxb., *venosum* Ait. = Sauromatum pedatum, guttatum, etc., *A. Colocasia* L., *cordifolium* Bory, Dsf., *cucullatum* Lour., *esculentum* L. (= *Caladium esculentum* Vent.), *indicum* Lour., *macrorrhizum* L., *nymphaeifolium* Roxb. (= *Caladium nymph.* Vent., p. 143), *odoratum* Roxb. (= *Caladium odor.* Bot. reg.) = Colocasia antiquorum, C. Boryi, cucullata etc., *A. crinitum* Ait. (= *mus-*

Digitized by Google

Arum

civorum L. suppl.) et *Dracunculus* L. = Dracunculus crinitus et vulgaris, *A. cuspidatum* Blume, *divaricatum* L. (= *crinosus* RBr.), *flagelliforme* Lodd., *minutum* W. (= *mucronatum* Spgl.), *crinosus* Roxb. (= *trilobatum* L. spec.) = Typhonium cuspidatum, divaricatum, flagelliforme, minutum et trilobatum, *A. graminoeum* Lam. et *tenuifolium* L. = Biarum gramineum et tenuifolium, *integrifolium* Hort. anglor. Lk. = Aglaonema simplex., *lingulatum* L. et ? *cannaefolium* L. suppl. = Monstera lingulata et cannaefolia, *ovatum* L. (= *Caladium ovatum* Vent.) et *spirale* Retz = Cryptocoryne ovata et spiralis, *A. sagittifolium* Hort. angl., Lk. = Acontias hastifolius, *A. sagittifolium* L. (= *Caladium sagittif.* Vent.) et xanthorrhizon Jacq. (= *Caladium xanthorr.* W.) = Xanthosoma sagittifolium et Jacquini, *A. seguinum* L. (= *Caladium seg.* Vent.) = Dieffenbachia Seguine, *A. ternatum* Thbg. (= *atrorubens* Spgl. = *fornicatum* Roth = *subulatum* Dsf. = *triphyllum* Houtt.) = Atherurus ternatus, *virginicum* L. (= *Caladium virginicum* Hook.) = Peltandra virginica, *A. viviparum* Roxb. (= *Caladium viviparum* N. E.) = Remusatia vivipara.

Zu welchen Gattungen nachstehende gehören, ist ungewifs, als: betaefolium Mill., Nordamerika, discolor Voigt, haematophyllum, marginatum, palmatum Lodd., polyphyllum Hort. anglor. Lk., ramosum Lk., ventricosum Hffg.

Arundina Lindl., Blume, Rohrstendel.

chinensis Blume, chinesischer, 4. w. China.

densa Hort. belg., dichter, 4. w. ? Java

Arundinaria glaucescens P. Beauv. et *macrosperma* Mchx. = Ludolfia glaucescens et macrosperma, p. 479.

Arundinella Raddi, Rohrmilisgras, III. II., Gramineae.

Acratherum N. E. (= ? *Acratherum miliaceum* Lk., p. 16), ostindisches, 4. w. Ostindien.

Mikani N. E. (= *brasiliensis* Raddi = *Aira brasiliensis* Spgl. = *Ischaemum hispidum* H. B. K.), Mikan's (brasilianisches), 4. w. Brasilien, Neuandalusien.

nepalensis Trin. (= *Acratherum miliaceum* Lk., p. 16, = *Orthopogon agrostoides* Trevir. hort. Wratisl.), nepalsches, 4. w. Nepal.

Arundo altissima Benth. = Phragmites communis, var. p. 618.

Asagraea caricifolia Kunth et *officinalis* Lindl. = Schoenocaulon caricifolium et officinale.

Asarca Lindl., Magerstendel, XX. I., Orchideae.

auraptiaca Lindl., orangenfarbiger, 4. w. Chili.

speciosa Lindl. (= *Serapias Gavila* Pav.), prächtiger, 4. w. Chili.

Asarum T., Haselwurz.

virginicum L. (non Thbg.), virginische, 4. f. Nordamerika.

virginicum Thbg. (= *japonicum* Hort.) = Heterotropa asaroides, p. 394.

Ascaridia triplinervis G. Don = Polypappus triplinervis.

Digitized by Google

Ascium anomalum Spgl. et *Aubletii* Spgl. (= *violaceum*) Vahl = Norantea brasiliensis et guianensis, p. 550.

Asclepias T. L., Schwalbenwurz.

acuminata Pursh (= *cordata* Walt. = *laurifolia* Auct. non Mchx. = *periplocaefolia* Nutt.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

consanguinea Kunze (= *obtusifolia* H. Prag. non Mchx.), verwandte, 4. f. Nordamerika.

Cornuti Decaisne (= *syriaca* L.), Cornut's, 4. f. Nordamerika.

cubensis Wender., cubaische, ♄. w. Cuba.

Greeniana Nutt., Green's, 4. f. Nordamerika.

Michauxii Decaisne (= *angustifolia* Ell.), Michaux's, 4. f. Nordamerika.

princeps Bartl., fürstliche, 4. f. Nordamerika.

verticillatta L, *α*) galioides H. B. K., *β*) linifolia Kunth (= *virgata* Lagasc., Sweet = *mexicana* Cav. = *parviflora* Lecont. = *angustifolia* H. Berol.).

americana Hort. = variegata.

Aspalathus L. Witschen.

pineus Thbg. (= ? *uniflorus* Thbg.), kiefernähnlicher, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

laricifolius Berg. = laricinus.

Asparagus T., Spargel.

caspius Hort, Vindob., caspischer, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

officinalis L., *β*) maritimus Sm.

trichophyllus Bong. et C. A. Mey. (= *A. neglectus* Kar. et Kir.), haarblätteriger, 4. f. Asiatisches Rußland.

Asperula L., Waldmeister.

canescens Visian., graulicher, 4. f. Dalmatien.

ciliata Rochel, gewimperter, 4. f. Banat.

littoralis Sibth., Sm., Strand-W., 4. f. Türkei.

suavis Fisch., Mey. et Lallem., feinrichender, 4. f. Natolien.

trichodes Gay., haarähnlicher, ☉. f. Persien.

tyraica Bess. (= *galioides* MB. var. Lang), tyraischer, 4. f. Volhynien.

glauca Bess. = galioides.

Asphodeline Rchb., Asphodeline, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

capillaris Endl., Kunth (= *Asphodelus capillaris* Redout. = *Asphodelus luteus* var. *angustifolia* Ker), haarförmige, 4. f. ?

cretica Visiani Endl. (= *Asphodelus creticus* Lam.).

β) liburnica Rchb. (= *Asphod. liburnicus* Scop.).

lutea Rchb. (= *Asphodelus luteus* L.).

prolifera Kunth (= *Asphodelus prolifer* M. B. = *Anthericum dendroides*, Stev., Fisch.), sprossende, ☉. f. Iberien, Armenien.

taurica Endl., Kunth (= *Asphod. tauricus* MB.).

Asphodelus T., Affodillilie.

asiaticus Haw., asiatische, 4. k. f. b. ? Asien.

intermedius Hornem. (= ? *aestivus* Auct. ? *canariensis* Smith), 4. k. Canarische Inseln.

ramosus L., b) flore pleno.

regius Hort. = ? Eremurus spectabilis.

Aspidistra elatior Morren et Decaisn., p. 91.

Digitized by Google

Aspidium Sw., Schildfarrn [1]).

I. Bathmium Lk. (= *Aspidium* Endl.).

fraxinifolium Schrd. (= *macrophyllum* Hort.), eschenblätteriger, 4. w. Brasilien, Westindien.

cicutarium Sw., longifolium Desv., macrophyllum Sw. (= *fraxinifolium* Hort.), trifoliatum Sw.

II. Cyclosorus Lk.

gongylodes Schk. (= *contiguum* Kaulf.), kreissaamiger, 4. w. Surinam.

propinquum RBr., Kaulf., unitum Sw.

III. Aspidium Lk. (= *Nephrodium* L. C. Rich., Endl.).

affine Fisch. et Mey., ähnelnder, 4. k. f. b. Südöstl. Asien, Süddalmatien.

augescens Lk. (= *Ottonianum* Hort.), wachernder, 4. w. Caracas.

chrysolobum Kaulf., Lk. (= *Lastraea chrysoloba* Presl), goldlappiger, 4. w. Brasilien.

concinnum Lk. (= *conterminum* W.), netter, 4. w. Brasilien, Martinique.

contractum Lk., zusammengezogener, 4. w. ?

Ctenitis Lk., kammähnlicher, 4. w. Brasilien.

Foenisecii Lowe, Heu-S., 4. t. Madeira.

Kaulfussii Lk. (= *Nephrodium Kaulfussii* Endl. = *Lastraea Kaulfussii* Presl), Kaulfuss's, 4. w. Brasilien.

pallidum Lk. (= *Nephrodium pallidum* Bory), bleicher, 4. k. f. b. Morea, Calabrien, Sicilien.

rivulorum Lk. (*Polypodium rivulorum* Raddi), Bach-S., 4. w. Brasilien.

Sprengelii Kaulf. (= *Polypodium Balbisii* Spgl.), Sprengel's, 4. w. Westindien, Brasilien.

violascens Lk. (= *Nephrodium violascens* Schott = *Polypodium molle* Jacq.), violetter, 4. w. Brasilien.

cordifolium Sw., crinitum Boj., cristatum Sw., Cunninghamii J. Sm., decompositum Spgl., dilatatum Sw. (= *Polypodium aristatum* Vill.), ? dumetorum Sm., elongatum Sw., Filix mas Sw., Goldianum Hook., Hippocrepis Sw., intermedium Mühlbg., invisum Sw., ? irriguum Sm., laetevirens Bevis, lucens Bojer, marginale Sw., molle Sw., mucronatum Sw., noveboracense Sw., Oreopteris Sw., parasiticum Sw., patens Sw., pennigerum Sw., pubescens Sw., Serra Sw. (= *Nephrodium Serra* Endl. = *Lastraea Serra* Presl), spinulosum Sw., Thelypteris Sw., villosum Sw.

IV. Nephrodium Lk.

Schkuhrii Lk. (= *pectinatum* H. Berol. = *pectinatum* W. = *trapezoides* Schkh.), Schkuhr's, 4. w. ? Brasilien.

tuberosum Bory W., knolliges, 4. w. Mascarenas.

exaltatum Sw., trapezoides Sw.

V. Polystichum Lk., Schott.

acrostichoides Sw., aculeatum Sw., angulare Kit., auriculatum Sw., drepanum Sw., fragrans Sw., lobatum Sw., Lonchitis Sw., proliferum RBr., pungens Kaulf., rhizophyllum Sw., rigidum Sw.

---

1) Die unter die Untergattungen (zum Theil muthmaßlich) gehörigen, schon p. 91 und 92 verzeichneten Arten, werden hier der Uebersicht wegen noch einmal aufgeführt.

Digitized by Google

Aspidium

VI. Cyrtomium Presl.

falcatum Sw. (= *Polypodium falcatum* Thbg. = *Polypodium japonicum* Houtt.), sichelförmiger, 4. k. Japan.

VII. Tectaria Cav.

coriaceum Sw. (= *T. coriacea* Lk. = *T. Colahuala* Cav. = *Rumohrea aspidioides* Raddi = *Polystichum coriaceum* Schott., = *A. capense* Sw. = *A. discolor* Langsd. et Fisch. = *Polypodium coriaceum* Sw. = *P. adiantiforme* Forst. = *P. argentatum* Jacq.).

Unter welche Gattungen oder Untergattungen nachstehende gehören, ist mir eben so wie ihr Vaterland unbekannt, als: ephebum van Houtte, 4. w., ocellatum van Houtte, 4. k. t., uliginosum van Houtte, 4. w. t. Java.

Barometz W., v. Cibotium glaucescens, *crenatum* Sommerf., v. Cystopteris crenata.

Asplenium L., Strichfarn.

I. Acropteris Lk., p. 8 II.

II. Asplenium Lk.

affine Lk., ähnlicher, 4. w. ?

auriculatum Desv. (= *brasiliense* Lk.), öhriger, 4. w. Brasilien.

crenulatum Presl (= *Nidus* Raddi non L. = *serratum* Lk. = *crassifolium* Hoffmsg.), gekerbter, 4. w. Brasilien.

decurtatum Lk., abgekürzter, 4. w. ? Brasilien.

elatius Lk., hoher, 4. f. Nordamerika.

foecundum Kunze (= *viviparum* Hort. anglor. non Presl), fruchtbarer, 4. w. Mauritiusinsel.

japonicum Kunze (= *Caenopteris japonica* Thbg.), japanischer, 4. t. w. Japan.

marinum Huds., *α*) major, *β*) minor.

obovatum Vivian., (*Forsteri* Sadler), verkehrteiförmiger, 4. f. b. k. Ungern, Corsica, Sardinien, Calabrien.

obtusifolium L., stumpfblätteriger, 4 w. Westindien.

oligophyllum Kaulf., wenigblätteriger, 4. w. Brasilien.

Otites Lk., Ohr-St., 4. w. Brasilien.

repandulum Kunze, ausgeschweifter, 4. w. ?

Serra Langsd. et Fisch., sägezähniger, 4. w. Brasilien.

triste Kaulf., trauriger, 4. w. Brasilien.

III. Camptosorus Lk.

rhizophyllum L., p. 93.

rumicifolium (Camptosorus rumicifolius Lk.), ampferblätteriger, 4. f. b. k. ?

assimile Endl. = Allantodia australis, p. 29.

dissectum H. Berol = cicutarium, *Hemionitis* Brotero = palmatum, *pulchellum* Hort. = Otites, *praemorsum* Hort. = furcatum, *striatum* Hortul (= *ambiguum* Raddi) = Diplazium Shepherdi, *trichomanoides* Mchx. (= *polypodioides* Sw.) = ebenum, *Virgilii* Bory = acutum.

Asprella major Fresen. = Gymnostichum majus, p. 371.

Astartea DC., Astartea VII. 1., Myrtaceae.

Endlicheriana Schauer (= *Leptospermum dubium* Spgl. = *Baeckea affinis* Endl. = *frutescens* Otto et Dietr., Hort. non L.), Endlicher's, ♄. k. t. Neuholland.

laricifolia (= *Leptospermum laricifolium* A. Cunningh.), lerchenblätterige, ♄. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Astelia Banks, Soland., Astelie, VI. 1., Juncaceae.
Banksii RBr. (= *Richardi* Endl. = *Hamelinia veratroides* A. Rich.), p. 94.

Aster T., Sternblume.

I. Aster N. E., DC.

deflexus Tausch. (= ? *concinnus* Colla non W. = *Tradescanti* Hort.), herabgebogene, 4. f. ?

Richardsonii Spgl. (= *giganteus* Hook.), Richardson's, 4. f. Nordamerika.

III. Calimeris N. E.

altaica N. E., α) subincana Fisch., Mey. et Lallem. (= *canescens* N. E. = *Aster pumilus* Fisch. = *altaicus* W. E.), β) subviridis Fisch., Mey. et Lallem. (= *Cal. altaica* N. E. = *Aster distortus* Turcz.), γ) scabra Fisch., Mey. et Lallem., δ) viridis Fisch., Mey. et Lallem., ε) arbusculiformis Fisch. Mey. et Lallem., Dahurien, Nordchina, Altai, vergl. p. 97.

VIII. Felicia Cass.

tenellus Thbg. L. fil. (= *Felicia tenella* N. E. = *F. fragilis* Cass. = *Agathaea tenella** p. 22 = *Cineraria tenella* Lk. = *Kaulfussia ciliata* Spgl. fil.).

IX. Galatella Cass.

Hauptii Lindl., α) grandiflora Fisch., Mey. et Lallem. (= *G. fastigiata* N. E. = *A. fastigiatus* Ledeb. = *A. Hauptii* Fisch.), β) squamosa DC. (= ? *leptophylla* N. E. = ? *nudiflora* Lindl.), γ) tenuifolia Lindl. (= *A. leptophyllus* Fisch.).

punctata Lindl. (= *Aster acris* L. = *Chrysocoma biflora* L.), α) Neesiana Fisch., Mey., Lallem. (= *G. punctata* N. E. = *Aster punctatus* W. K.), β) grandiflora Fisch., Mey., Lallem. (= *G. insculpta* N. E. = *A. hyssopifolius* Cav. non L., *A. punctatus*, β) *latifolius* Roch.), γ) squamosa Fisch., Mey., Lallem., (= *A. acris* MB.), δ) densiflora Fisch., Mey., Lallem. (= *A. trinervifolius* Lessing), ε) hyssopifolia Fisch., Mey., Lallem. (= *G. hyssopifolia* N. E. = *A. hyssopifolius* L. mant.), ζ) dracunculoides Fisch., Mey. et Lallem. (= G. dracunculoides N. E., α) radiata DC. = *G. pauciflora* Cass. = *A. dracunculoides* Lam., α) *radiatus* Ledeb.), η) discoidea Fisch., Mey. et Lallem. (= *G. biflora* N. E., *G. dracunculoides*, β) discoidea DC. = *Chrysocoma dracunculoides* Lam. = *Crinitaria biflora* Less. Cass. = *Linosyris punctata* DC. = *Aster dracunculoides*, β) *discoidens*, α) *major* Ledeb.), vergl. p. 99.

Xb. Homostylium N. E.

cabulicus Lindl., cabulische, ♃. k. t. Kabul.

Unbestimmtere: A. formosissimus Hort., inuloides Brotero, lusitanicus Brotero.

Asteriscium Chamiss. et Schltdl., Doldensternchen, V. 11. Umbelliferae.

chilense Cham. et Schltdl. (= *A. Poeppigii* DC. = *Cassidocarpus chilensis* Presl), chilesisches, ☉. 4. k. f. Chili.

Asteriscus T. Mönch, *A. aquaticus* DC. (= *sessilis* Mch. etc.), v. Buphthalmum I. p. 138.

? *Asteridia pulverulenta* Lindl. = Athrixia australis.

Asterocarpus tricuspidatus Eckl., Zeyh. (= *Celastrus tricuspidatus* Lam. p. 174), v. Pterocelastrus tricuspidatus.

Digitized by Google

Asterolinon Lk., Sternlein.

adoënse Kunze (= *Lysimachia adoënsis* Hochst. et Steud.), abyssinisches, ⊙. f. Abyssinien.

Asteromyrtus Schauer, Sternmyrte, XVIII. 1. Myrtaceae.

Gärtneri Schauer (= *Melaleuca angustifolia* G.), Gärtner's, ♄. t. Neuholland.

Asterotrichion Lk., Kl., Sternmalve, ? XVI. VII., Malvaceae-Sterculiaceae.

sidoides Lk., Kl., Otto, sammetpappelähnliche, ♄. t. Neuholl.

Astilbe decandra D. Don = Hoteja biternata.

Astiria Lindl., Astirie, XVI. VIII., Malvaceae-Dombeyaceae.

rosea Lindl., rosafarbige, ♄. w. Bourbon.

Astorganthus Hügelii Endl. = Melicope simplex.

Astraea Kl., Astraea, XXI. X., Tricoccae-Euphorbiaceae.

lobata Kl. (= *Croton lobatum* L., p. 235), gelappte, ⊙. w. Südamerika.

Astraea saxicola Schauer (= *Baeckea saxicola* Cunn., p. 110), v. Bucheria saxicola.

Astragalus T., Tragant.

agrestis Dougl., Acker, 4. f. Nordamerika.

albicans Bong. et C. A. Mey., weifslicher, 4. f. Asiatisches Rufsland.

Arbuscula Pall., baumähnlicher, ♄. f. b. Sibirien.

Arnacantha MB. (= *compactus* γ Lam. = *Poterium* Pall.), dorniger, ♄. k, f. b. Taurien, Caucasus.

Asterias Steven, sternfrüchtiger, ⊙. f. ? Caucasus.

aureus W., goldfarbiger, ♄. k. f. b. Armenien.

brachybotrys Bunge, kurztraubiger, 4. f. Altai.

Cicer L. (= *A. Pattersonii* H. Tübing. = *A. Pseudocicer* Opitz).

γ) ciceriformis Bernh., Armenien.

collinus Dougl, Hügel, 4. f. Nordamerika.

cruciatus Lk. (= *Stella* MB.), kreuzförmiger, ⊙. f. Aegypten, Iberien.

cylindraceus DC. (= *cylindricus* Spgl.), cylinderförmiger, 4. f. b. Armenien.

dilutus Bunge, hellfarbiger, 4. f. Asiat. Rufsland.

diphtherites Fenzl, häutiger, ♄. k. Am Tigris.

dorycnioides Dougl., Dorycniumähnlicher, 4. f. Nordamerika.

flexuosus Dougl., gebogener, 4. f. Nordamerika.

Gebleri Bong. et C. A. Mey., Gebler's, 4. f. Sibirien.

Grahami Steud. (= *vicioides* Grah. non Ledeb. = *himalayensis* Hort.), Graham's, 4. k. f. b. Himalaya.

hamosus L. var. δ) minor Hort. Petropolit., ⊙. f. Arabien.

himalayensis Jacquemont, Himalaya-T., 4. k. f. b. Himalaya.

hyrcanus Pall., hyrcanischer, 4. ♄. k. f. b. Gegend des kaspischen Meeres.

illyricus Bernh. (= *monspessulanus* Auct.), illyrischer, 4. f. Illyrien, Dalmatien.

inflexus Dougl., eingebogener, 4. f. Nordamerika.

lasiopetalus Bunge, wollkroniger, 4. f. Asiat. Rufsland.

lentiginosus Dougl., 4. f. Nordamerika.

olopterus DC. (= *austriacus altaicus* Fisch.), ganzflügeliger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Onobrychis L., β) latifolius, γ) major, δ) microphyllus, ε) sibiricus.

pectinatus Dougl. (= *Phaca pectinata* Hook.), kammförmiger, 4. f. Nordamerika.

pictus Steud. (= *bicolor* Dsf.), bemahlter, 4. k. Chili.

Digitized by Google

Astragalus
podocarpus C. A. Mey. (non Grah.), fufsfrüchtiger, 4. f. Caucasus.
refractus C. A. Mey., zurückgebogener, 4. f. Caucasus.
strobiliferus Lindl., zapfenähnlicher, ♄. k. f. b. Erzerum.
vicioides Ledeb. (non Grah.), wickenähnlicher, 4. f. Altaisch. Sibirien.
aegyptiacus Mill. (= *biflorus* Vivian., *maculatus* Lam. = *subulatus* Dsf.) = annularis, *eriocephalus* W. = breviflorus, p. 101, *odessanus* Bess. (= *cornutus* Pall.) = viminetus, p. 103.

Astrantia T., Sterndolde.
elatior Frivald., hohe, 4. f. Rumelien.
gracilis Bartl., schlanke, 4. f. Krain.
major L., γ) involucrata, δ) fol. variegatis.
pauciflora Bertol. = minor, = *speciosa* Hort. = heterophylla W. (= *helleborifolia* Salisb.), *trifida* Hoffm. = caucasica, p. 104.

Astrapaea Lindl., Prachtmalve.
penduliflora DC. (= *Wallichii* Ker. non Lindl.), hängendblumige, ♄. w. Madagascar.
viscosa Sweet, v. Dombeya Amelia.
mollis Hort. (= *tomentosa* Hort.) = ?

Astrocarpus Neck., Sternkapsel, XI. III., Resedaceae.
purpurascens DC. (= *Reseda sesamoides* β DC. fl. fr. = *Sesamella spathulata* Rchb.), purpurfarbige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
sesamoides DC. (= *Reseda Clusii* Spgl. = *R. stellata* Lam. = *Sesamella Tournefortii* Rchb.), Sesamähnliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

Astrocaryum W. Mey., Sternnufs.
Ayri Mart., Ayri-S., ♄. w, Brasilien.
Murumuru Mart., p. 104.

Astronium Jacq., Astronium, V. (XXII.) III., Terebinthaceae.
graveolens Jacq., starkriechendes, ♄. w. Neugranada.
Ob A. concinnum Schott und fraxinifolium Schott, beide in Brasilien heimisch, und ♄ kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.
Astrophytum Lemaire, v. Cacteae, p. 873.

Ataccia J. S. Presl, Ataccie, VI. I., Aroideae-Taccaceae.
integrifolia Presl (= *Tacca integrifolia* Ker, p. 794).

Atalantia Correa, Atalantie.
capitellata Lindl., kopfförmige, ♄. w. Ostindien.

Athamanta L., Hirschwurz.
cervariaefolia DC. (= *Seseli cervariaefolium* DC. p. 749).
crinita Ledeb. (= *Sison crinitum* Pall. = *Schultzia crinita* Spgl., p. 731).
macedonica Spgl. (= *Seseli macedonic.** = *Bubon macedonicum* L., p. 749).
ramosissima Pórtenschl. (= *verticillata* Unio-itin.), ästige, 4. f. Dalmatien.
stricta Ledeb., steife, 4. f. Sibirien.
Cervaria L., *Oreoselinum* L. = Peucedanum Cervaria et P. Oreoselinum, p. 616, *cervariaefolia* Schrad. (= *rigida* Hornem.), *condensata* L., *Libanotis* L. = Libanotis buchtormensis (= *Seseli buchtorm.* p. 749), condensata et montana, p. 461, *Golaka* Hacq., v. Malabaila Hacquetii Tausch (= *Hladnikia golacensis* K., p. 880), *Matthioli* Wulf., v. Turbith Matthioli, *Meum*

Digitized by Google

Athamanta
L. = Meum athamanticum, p. 522, *panacifolia* Spgl., v. Magydaris panacina, *tortuosa* Spgl., v. Deverra tortuosa.

Atherurus Blume, Schweifarum (= *Pinellia* Tenore, *Hemicarpurus* N. E.), XXI. IX. Aroideae.
ternatus Blume (= *Arum bulbosum* P. = *atrorubens* Spgl. etc., = *Pinellia tuberifera* Denhardt. = *Hemicarpurus fornicatus* N. E.), dreiblätteriger, 4. Kn. w. Japan, Ostindien.

Athlianthus Endl., Athlianthus, ? II. I., Acanthaceae-Russeggereae.
spiciflorus Endl., ährenblüthiger, ☉. w. f. m. Tropisches Afrika.

Athrixia Ker, Athrixia.
australis Seetz, neuholländische, ♄. t. Neuholland.

Atractylis L., Spindelkraut.
caespitosa Dsf. (= *Acarna caespitosa* W., p. 8).
cancellata L. (= *Acarna cancellata* All. W, p. 8).

Atraphaxis L., Strauchmelde.
canescens Bunge, graulichе, ♄. k. Asiat. Rufsland.

Atriplex T., Melde.
crassifolia C. A. Mey., Altaisches Sibirien, p. 105.
Gmelini C. A. Mey., Gmelin's, ☉. f. Camtschatka, Insel Sitcha.
graeca W., griechische, ♄. k. f. b. Archipelagus.
hastata L., *β*) calotheca Rafn, Hornem. (= *macrotheca* Hort.).
Hermanni Willem. (*nitens* Schk. = *lucida* Dsf. = *viridis* Ehrh. = *acuminata* W. K. = *sagittata* Borkh.).
laciniata L. (= *albicans* Bess. = *astracanica* Ball. = *diffusa* Tenore = *sinuata* Hoffm.), *β*) abbreviata Opitz.
latifolia Whlbg. (= *hastata* Auct. = *patula* Sm.), *β*) microsperma W. K. (= *ruderalis* Wallr.), *γ*) salina Wallr., K.
littoralis L., *β*) marina L. (*serrata* Huds.), *γ*) sulcata Hort., Goett. [1]).
multifida Dsf. (= *laciera* Dsf.), vielspaltige, ☉. f. ?
parviflora H. B. K. (= *parvifolia* Auct. non Lowe).
procumbens Less., niederliegende, ☉. f. Altaisch. Sibirien.
? sinensis Juss., Hort., chinesiche, ? ☉. f. China.
tatarica L. (? = *diffusa* Tenore), *β*) oblongifolia W. K. *benghalensis* Hort. (= ? *acuminata* M. B.) = hortensis, *lucida* Mch. (non Dsf.) = sibirica, *campestris* K. = tatarica *β*) oblongifolia, *polysperma* Tenore = rosea.

Atropa L., Tollkirsche.
pubescens Brotero, weichhaarige, ? ? ?
Aubletia trifoliata = Monniera trifolia., p. 529.
Aubletia aspera Willd., *laevis* Willd. etc. = Apeiba aspera, laevis etc., p. 68.

Aubrietia Adans., Columnae Gusson., Columna's, 4. f. b. k. Unteritalien.
lepidioides Spgl. = Heliophila lepidioides, p. 386.

Audibertia Benth., p. 106.
polystachya Benth., vielährige, 4. k. Nördl. Californien.
pusilla Benth. = Mentha Requieni, p. 511.

---

1) Die unter A. littoralis L. p. 105 aufgeführten Abarten, gehören zu A. latifolia Whlbg.

Digitized by Google

Aulacospermum Ledeb., Furchensaame, V. II., Umbelliferae.

anomalum Ledeb., abweichender, 4. f. Altai.

cuneatum Ledeb., keilförmiger, 4. f. Altai.

Aurinia saxatilis Desv. = Alyssum saxatile, p. 42.

Avellinia Parlatore, Avellinie, III. II., Gramineae.

Michelii Parlatore (= *Bromus Michelii* Savi = *Festuca Michelii* Kunth = *Koeleria macilenta* DC. = *Vulpia Michelii* Rchb. etc.), Michelis, ☉. f. Frankreich, Spanien, Italien.

Avena T., Hafer.

I. Avena genuina.

orientalis Schreb., var. albida aristata, albida mutica, fuscescens submutica Hort. Petropolit.

sativa L., var. albida acuta, albida anglica, brachystachya, Dun-Oats, Hopetown-Oats, Kartoffelhafer, Macbiehill-Oats, norwegica, philadelphica, polonica, Potato-Oats, praecox, praegrandis, praegravis, pyramidalis, Reykliffe, sibirica, Sovereign-Oats, subaristata, tatarica, flavescens praecox, fusca mutica, fusca praecox, fusca subaristata etc. Vergl. Index septimus seminum horti botan. imper. Petropolit., benghalensis Hort., peruviana Hort.

II. Avenaira Rchb.

pulchella Lk. (= *Aira Tenorei* Guss.).

atropurpurea Lk., v. Vahlodea atropurpurea.

III. Arenastrum Koch.

amethystina Clarion, DC. (? = *bromoides* L.), amethystfarbiger, 4. f. Frankreich, südl. Tyrol.

Thorei DC. (= *longifolia* Thore = *sempervirens* L., var. Trin.), Thores, 4. f. Frankreich.

IV. Trisetum P., R. et S.

carpathica Host (= *fusca* Schult. = *flavescens* var. Spgl.).

micrantha R. et S. (= *Avena parviflora* W. non Dsf.), kleinspelziger, ☉. f. Südeuropa.

myriantha Bertol., vielblumiger, ☉. f. Italien.

palustris Mchx. (= *caroliniana* Walt.), Sumpfliebender-H., 4. f. Nordamerika.

pumila Dsf. (= *Trisetum aureum* Tenor.), niedriger, ☉. f. Nordafrika.

uniflora Parlatore (non Trisetum uniflorum Meyer), einblumiger, ☉. f. Teneriffa.

cristata Auct. (= *panicea* Lam. = *pauciflora* Auct.) = neglecta, *Wilhelmsii* (Ledeb.), Spgl. = rigida.

muricata Spgl., v. Pentameris papillosa.

Axyris L., Amaranthmelde.

sphaerosperma Fisch. et Mey., kugelsaamige, ☉. f. α) humilis, β) elatior. Altai.

Aydendron N. E. et Mart. Aybaum, IX. I., Laurineae.

salicifolium N. E. (= *Laurus salicifolia* Sw., p. 449, = L. *hexandra* Rich. non Sw.).

Azadirachta L., A. Juss., Azadirachta, XVI. VI. (XI.), Hesperideae Meliaceae.

indica A. Juss. (= *Melia Azadirachta* L., p. 506), ostindische, ħ. w. Ostindien.

Azalea L., Felsenstrauch.

bicolor Pursh (= *nudiflora bicolor* Ait.).

glauca Lam. (= *scabra* Hort. = *viscosa glauca* Mchx.).

nudiflora L., Variet. und Hybrid. aurantia, caroliniana, Cartoni, Coburghii, corymbosa, crispa, cumulata, cuprea, discolor, fastigiata, flammea, flava, florida, glo-

Digitized by Google

Azalea

bosa, glomerata, incana, incarnata, lutea, magnifica, mirabilis, montana, paludosa, prolifera, pumila, purpurascens, purpurea, Rawsonii, rosea, ruberrima, rubescens, rubicunda, rubra, ruffa, semiduplex, staminea, stellata, thyrsiflora Lindl., tricolor, variabilis, variegata, versicolor, villosa, violacea etc.

Ausserdem kommen noch zahlreiche Varietäten und Hybriden (von Azalea calendulacea, glauca, nudiflora, pontica, speciosa etc.), in den Gärten vor, als: Adelaïde, aeretincta, albo-flavescens rosacea, amoenissima, aurotincta, Aurora, atrorubens, basilissa, Buckinghamii, calantha, calacoryphe, calodendron, calostephane, carnea partita et plena, chariessa, corusca, cramoisi flamboyant, cruenta, cuprea splendens, decus hortorum, delicata, dictatryx, electa, elegans Mortieri et tardiva, elegantissima, erythraea, eudaemon, eugenes, euprepes, gloria mundi, habrantha, habropis, helvola, Herbertiana, hilaris, hilarissima, honesta, hybrida decorata et punicea, imperatrix, inclita, jasminiflora, jucundissima, Laetitiae Hort. angl.[1]), lepida, mirabilis, mixta triumphans, notabilis, ochroleuca, optima, ornata, perfecta, phoenicea, pictura subtilissima, placida, pockila, polyantha, praestantissima, pretiosa, regia, reginae belgica, rigida incarnata, robusta, roseoflava, rubra fulgens, rubro-fusco-flavescens, sanguinea, sulphurea, superbissima, triumphalis serotina, triumphans gandavensis, variegata, venustissima, viola odorata u. s. w. u. s. w.

A. citrina Hassk., v. Rhododendron citrinum.

Babactes DC., XIV. 11., Personatae-Cyrtandreae.

oblongifolia DC. länglichblätterige, ♄. w. Ostindien.

Babiana Ker, Babiane.

atrocyanea Eckl., schwarzblaue, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

coerulescens Eckl., bläuliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

fragrans Ker, wohlriechende, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

ochroleuca Sweet, weifsgelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

stellata Eckl., sternförmige, 4. Zw. k. Cap d g. H.

villosula Ker (= *Gladiolus villosulus* Jacq. = *Ixia villosa* Jacq. = *Ixia villosula* Gmel.), wenigzottige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

longiflora Hort. (= *Gladiolus longiflorus* Andr. = *G. polystachyus* Redout. = *G. tubatus* Jacq.) = B. tubata.

Bei den übrigen p. 109 verzeichneten, ist noch das Culturzeichen k. beizufügen.

Babingtonia Lindl. (C. C. Babington, engl. Botaniker), X. 1., Myrtaceae.

Camforosma Lindl. (= *Baeckea Camforosma* Endl.), Kampfer-B., ♄. k. t. Südwestneuholland.

Baccharis L., Baccharis.

Chilquilla DC. (= *confertifolia* Colla), dichtblätterige, ♄. t. Chili.

denticulata Don, gezähnelte, ♄. k. Patagonien.

Feuillei DC. (= *ivaefolia* = *peruviana* Auct. = *striata* R. et P.), Feuille's, ♄. k. t. Peru.

---

1) Hybride von Rhododendron ponticum und einer Azalea.

Digitized by Google

Baccharis

genistelloides P. (= *alata* Hort. = *Conyza genistelloides* Lam. = *Molina reticulata* Less. = *Pterocladis genistelloides* Lamb.), ginsterähnliche, ♄. k. t. Peru.

juncea Dsf. (= *Arrhenachne juncea* Cass. = *Stephananthus junceus* Lehm.), simsenähnliche, 4. w. Brasilien.

marginalis DC. (= *parviflora* P. non Poir., = *Molina parviflora* R. et P.), berandete, 4. ♄. t. k. Peru, Chili.

Pingraea DC. (= *angustifolia* Dsf. non Mchx. = *linearis* Poepp. = *Pingraea angustifolia* Cass. = *Molina linearis* Less.), Pingraea-B., ♄. t. k. Chili, Brasilien, Californien.

sagittalis DC. (= *geniştelloides* Poepp. = *reticulata* P. = *Molina reticulata* R. et P. = *M. sagittalis* Less.), pfeilförmige, ♄. t. k. Chili.

trinervis P. (= *Conyza trinervis*, Lam.), dreinervige, ♄. w. Brasilien.

Wendlandii Steud. (= *cuneifolia* Wendl. non DC.), Wendland's, ♄. k. Cap der gut. Hoffn.

adnata H. B. K., *Dioscoridis* L., *indica* L., v. Pluchea subdecurrens, Dioscoridis et indica, *Dioscoridis* Bové, *ivaefolia* L. = Conyza aegyptiaca et ivaefolia, p. 216.

Backhousia Hook. et Harvey (James Backhouse, Entdecker dieser Gattung), XII. 1., Myrtaceae.

myrtifolia Hook. et Harvey, myrtenblätterige, ♄. ♄ t. k. Neusüdwales.

riparia Hook. et Harvey, Ufer-B., ♄. ♄. t. k. Neuholland.

Bactris Jacq., Bactris.

flavispina Hort. belg., hellgelbdornige, ♄. w. Südamerika.

latispina Hort. belg., breitdornige, ♄. w. Südamerika.

minor Jacq. (= *minima* G. = *Cocos guineensis* L. = *Palma gracilis* Mill. = *spinosa* Mill.).

setosa Mart., borstige, ♄. w. Brasilien.

Ob von nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: acanthocarpa Mart. Bahia, aristata Mart. (= ? *major* Jacq.), Brasil., bifida Mart. Brasil., campestris Mart. Brasilien, chaetospatha Mart. Brasil., ciliata Mart. (= *Martinezia ciliata* R. et P.), Peru, chloracantha Poeppig, Peru, concinna Mart., Brasil., fissifrons Mart., Brasil., hirta Mart., Brasil., longifrons Mart., Brasil., longipes Poeppig., Südamerika, Maraja Mart., Bahia, mitis Mart., Brasil., riparia Mart., Brasilien, simplicifrons Mart., Brasilien.

Ungewifs: B. Neromanni Voigt.

Bactyrilobium Fistula W. etc. = Cathartocarpus Fistula etc., p. 172, *latifolium* W. = Anagyris latifolia, p. 52.

Badaroa bryoniaefolia Bertero, v. Sycios bryonaefolius.

Badula Juss., Badula, V. 1., Myrsineae.

insularis A. DC. (= *Myrsine insularis* Dietr. = *B. Barthesia* Boj. non A. DC.), Insel-B., ♄. w. Mauritius.

Lamarckiana A. DC. (= *Anguillaria laurifolia* Lam. = *Ardisia latifolia* R. et S., p. 74), Lamarck's, ♄. w. Antillen.

Baeckea L., Baeckie.

brevifolia DC. (= *carnosula* Sbr. = *Leptospermum brevifolium* Rudge), kurzblätterige, ♄. k. t. Neuholland.

crassifolia Lindl., dickblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

Digitized by Google

Baekea

frutescens L. non Hort. (= *chinensis* G.).
leptocaulis Hook., schlankstengelige, ħ. t. k. Neuholland.
pendula Hort., hängende, ħ. t. k. Neuholland.
phylicoides A. Cunn., phylicaähnliche, ħ. ħ. k. Neuholl. = *affinis* Endl. (= *frutescens* Otto, Dietr., Hortul. non L.) = Astartea Endlicheriana, *affinis* Hook. (= *prostrata* Hook. = *diffusa* Sbr.), *thymifolia* Hook., v. Euryomyrtus diffusa et thymifolia, *Camforosma* Endl., v. Babingtonia Camforosma, *camphorata* RBr. v. Camphoromyrtus Brownii, *crenulata* DC., *diosmaefolia* Rudge, *gracilis* Cunn. (= *microphylla* Sbr.), v. Schidiomyrtus crenulata, diosmaefolia et tenella, *obovata* DC. (= *involucrata* Endl.), v. Scholtzia obovata, *saxicola* A. Cunning., v. Bucheria saxicola, *speciosa* A. Cunningh., v. Hypocalymma Cunninghami, *virgata* Andr. etc., v. Harmogia virgata.

Baeobotrys Forst., Traubenmyrte.

angustifolia Hort., schmalblätterige, ħ. w. ? ?
Baeometra columellaris Salisb., v. Kolbea Breyniana Schltdl., p. 439.

Bahia Lag., Bahia (Wollblatt), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

arachnoidea Fisch., Lallem., spinnengewebige, 4. ħ. k. Neucalifornien.
lanata DC. (= *Actinella lanata* Pursh = *Eriophyllum caespitosum* Dougl., p. 310).
leucophylla DC., weifsblätterige, ☉. f. Nootkasund.
oppositifolia DC. (*Eriophyllum oppositifolium* Nutt., p. 310).

Balantium Kaulf., Beutelfarrn.

antarcticum Presl (= *Cibotium Billardieri* Kaulf. = *Dicksonia antarctica* LaBill.), südlicher, 4. w. Neuholland.
arborescens Lk. (= *auricomum* Kaulf. = *Dicksonia arborescens* L'Her., p. 262 = *D. integra* Sw.).
glaucescens Lk. (= *glaucophyllum* Presl), v. Cibotium glaucescens.
Ballota acetabulosa Benth., *africana* Benth. etc., v. Beringeria acetabulosa, africana etc., p. 119.
disticha L., v. Anisomeles ovata, p. 61, suaveolens L., Jacq., v. Hyptis suaveolens.

Balsamina Riv., Balsamine.

fasciculata Lam., DC. (= *B. heterophylla* G. Don = *Impatiens heterophylla* W. = *oppositifolia* Rottl.), büschelförmige, ☉. f. m. Ostindien.
labiata Lk., Kl., Otto, lippenförmige, ☉. f. m. Ostindien.
Mastersiana Paxt., Masters's, ☉. f. m. Ostindien.
oppositifolia DC., gegenblätterige, ☉. f. m. Ostindien.
scabriuscula G. Don, schärfliche, ☉. f. m. Ostindien.
Balsamita ageratifolia Dsf. (= *corymbosa* Salzm. = *flosculosa* Hort.) et *virgata* Dsf., v. Plagius ageratifolius et virgatus, *annua* DC., v. Tanacetum annuum, *flabelliformis* P., v. Pentzia flabelliformis, p. 606, *vulgaris* W., v. Pyrethrum Tanacetum.

Balsamodendron Kunth, Balsambaum.

acuminatum Hort. belg., zugespitzter, ħ. w. Ostindien.
Camphora Hort. belg., Kampfer-B., ħ. w. Ostindien.
zeylanicum Kunth, v. Canarium commune.

Digitized by Google

Banisteria L., Banisterie.

argyrophylla Hort, silberblätterige, ♄. w. ?
bonariensis Hook., Arn., bonarische, ♄. w. Bonaria.
splendens DC. (= *fulgens* Cav. non L. = *heterophylla* W.).
tiliaefolia Vent., lindenblätterige, ♄. w. Java
tomentosa Dsf. (= *emarginata* Cav.).
volubilis Endl. (= *Malpighia volubilis* Sims = *Byrsonima volubilis* DC., p. 141).

angulosa L., *auriculata* L., v. Stigmaphyllum angulosum, auriculatum, p. 789, *appendiculata* Lam., *argentea* Spgl., *brachiata* L., *chrysophylla* Lam., *coerulea* Lam., *nitida* Lam., *parvifolia* Lam., *purpurea* L., v. Heteropteris appendiculata etc., p. 394.

Banksia L. fil. Drathblume (Banksie).

augusta Hort., herrliche, ♄. t. k. Neuholland.
bruniades Hort., bruniaähnliche, ♄. t. k. Neuholland.
calophylla H. Hügel., schönblätterige, ♄. t. k. Neuholland.
cuneifolia Wendl. fil., keilblätterige, ♄. t. k. Neuholland.
cylindrostachya Lindl., walzenährige, ♄. t. k. Neuholland.
denticulata Dum. Cours., weniggezähnelte, ♄. t. k. Neuholland.
Drummondii Hort., Drummond's, ♄. t. k. Neuholland.
foliosa Hort., blattreiche, ♄. t. k. Neuholland.
formosa Hort., liebliche, ♄. t. k. Neuholland.
Meisneri Lehm., Meisner's, ♄. t. k. Neuholland.
microstachya Cav., Lk. (= *marginata* β RBr.), = *praemorsa* Hort.), kleinährige, ♄. t. k. Neuholland.
mimosoides Hort., Sinnpflanzenähnliche, ♄. t. k. Neuholland.
patula RBr., ausgebreitete, ♄. t. k. Neuholland.
phylicaefolia H. Hügel., phylicablätterige, ♄. t. k. Neuholland.
plumosa Hort., federförmige, ♄. t. k. Neuholland.
prionotes Lindl, sägeblätter., ♄. t. k. Neuholland.
pubescens Don, feinhaarige, ♄. t. k. Neuholland.
reticulata Wendl. fil., netzblätterige, ♄. t. k. Neuholland.
rubra Don, rothe, ♄. t. k. Neuholland.
villosa Hort., zottige, ♄. t. k. Neuholland.
virens Don, grünliche, ♄. t. k. Neuholland.

Aquifolium Lindl. = ilicifolia, *asplenifolia* Kngt. et Salisb. = marcescens, *conchifera* G. (= *mitis* Kngt. et Salisb. = *undulata* Lindl.), = serrata, *dilleniaefolia* Kngt. et Salisb. (= *longifolia* Cav. = *uncigera* Kngt. et Salisb.) = latifolia, *glauca* Cav. (? = *macrophylla* Lk.) = integrifolia, *grandidentata* Dum. Cours. = speciosa, *littoralis* Grah. = Cunninghamii, *longifolia* Hort. (= ? *salicifolia* Cav.) = oblongifolia, *marcescens* Hook. = australis, *nivea* LaBill., v. Dryandra nivea, p. 276, *polypodiifolia* Kngt. et Salisb. = repens, *pyrifomis* G. v. Xylomelum pyriforme, p. 861, *serraefolia* (= *serratifolia*) Kngt. et Salisb. = aemula, *tenuifolia* Salisb., v. Hakea acicularis, p. 374, *tomentosa* Hort. = littoralis.

Baphorrhiza tinctoria Lk., v. Anchusa tinctoria, p. 53.

Baptisia Vent., Baptisie.

confusa Sweet, verwechselte, 4. f. Nordamerika.
bracteata Ell., 4. Nordamerika, leucophaea Nutt., 4. Nordamerika, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Digitized by Google

Barbacenia Vand., Barbacenie.
squamata Paxt., Hook., schuppige, 4. w. Brasilien.
Außerdem kommen noch folgende in Brasilien vor, die bis jetzt soviel mir bekannt ist, noch nicht kultivirt werden, als: bicolor Mart., coccinea Mart., ensifolia Mart., exscapa Mart., flava Mart., glauca Mart., ignea Mart., longiflora Mart., luzulaefolia Mart., rubro-virens Mart., tomentosa Mart., tricolor Mart., Vandelli Roem. (= *brasiliensis* W.), Alexandrina Schomb. Guiana. Sämmtlich 4.

Barbarea RBr., Barbernkraut.
angustana Boiss., piemontesisches, 4. f. Piemont.
orthoceras Ledeb. (= ? *sricta* Andrzy.), geradschotiges, 4. f. Gegend des Baicalsseees.
prostrata Gay, gestrecktes, 4. f. Frankreich.
vulgaris RBr., γ) fol. variegat.
altaica Andrzy (= ? *hirsuta* Weihe) = arcuata Rchb. *Barbellina sericea* Cass., v. Staehelina arborescens, p. 781.

Barkeria Knowl. et Westc., Barkeria.
spectabilis Bateman, ansehnliche, 4. w. Guatimala.

Barkhausia Mch., Barkhausie.
Balbisiana DC., Balbis's, ♂. f. Sicilien.
foetida DC., δ) prostrata Dumort.
juvenalis Delil., jugendliche, ☉. f. Südfrankreich.
nana DC. (= *Crepis nana* Richards. = *racemosa* Tausch), zwergige, ☉. f. Sibirien, nördliches Amerika.
porrifolia DC., porreeblätterige, ☉. f. Neapel.
recognita DC. (= *praecox* Balb.), wiedererkannte, ☉. f. Schweiz.
rhoeadifolia MB., mohnblätterige, ☉. f. Iberien, Caucasus, Oestreich etc.
tenuifolia DC. (= *Crepis tenuifolia*, p. 230).
amygdalina Lag. = foetida, *canescens* Spgl. = bursifolia, *caroliniana* Nutt. = Pyrrhopappus carolinianus, *Leontodon* DC. (= *tenerrima* Tenor.), = leontodontoides, *raphanifolia* Chev. non Spgl. = taraxacifolia, *versicolor* Spgl. = Ixeris versicolor, p. 426.

Barleria L., Barlerie.
obovata Hamilt. (= *buxifolia* Roxb. non L. = *cristata* β Lam.), verkehrteiförmige, ħ. w. Ostindien.
tomentosa Heyne (= *acuminata* Wight), filzige, ħ. w. Ostindien.
gentianoides Dsf. (= *oenotherbides* Dum. Cours.) = flava, *lactea* Dsf. = alba, *pyramidalis* Lam., v. Blechum Brownei, p. 125.

Barnadesia Mutis, L. fil. Barnadesie, XIX. 11., Compositae-Eupatorieae (Perdicieae).
rosea Lindl., rosafarbige, 4. ħ. t. Südamerika.

Barnardia Lindl., Barnardie.
japonica Schult. (= *Ornithogalum japonicum* Thbg.), japanische, 4. Zw. k. t. Japan.

Barosma apiculata Eckl., Zeyh. (= *Agathosma apiculata*, p. 23).

Barringtonia Forst., Barringtonie.
acutangula G. (= *Eugenia acutangula* L. = *racemosa* Roxb. = *Stravadium rubrum* P. = *coccineum* DC. = *acutangulum* Juss., Loud., p. 790), spitzkantige, ħ. w. Ostindien.

Digitized by Google

Barringtonia
racemosa Blume (= *Eugenia racemosa* L. = *Stravadium racemosum* Sweet, p. 790 = *Stravad. alb.* P. = = *Butonica sylvestris* Rumpf.).
Bartholina pectinata RBr., p. 114 (*B. Burmanniana* Ker).
Bartlingia Brogn. (F. G. Bartling, Prof. der Botanik zu Göttingen), ? V. 1., Myrtaceae-Chamaelaucieae.
obovata Brogn. (= *Cryptandra obovata* Sbr., p. 237).
Barysoma Bunge, Barysoma, V. 11., Umbelliferae.
villosum Bunge (= ? *Heracleum villosum* Hoffm. Fisch.), zottige, ♂. 4. f. Caucasus.
Basella L., Baselle.
japonica Burm., japanische, ⊙. ♂. Sch. w. t. Japan.
obovata H. B. K., verkehrteiförmige, ♂. 4. w. Neugranada.
Bastardia H. B. K. (Bastard oder Batard, französischer Botaniker).
foetida Sweet (= *Sida foetida* Cav., p. 752).
Batatas Rumph, Choisy, Batate, V. 1., Convolvulaceae.
acetosaefolia Chois. (= *Convolvulus acetosaefolius* Vahl = *C. repens* Sw. = *Ipomoea acetosaefolia* Vahl), ampferblätterige, 4. w. Südamerika.
betacea Lindl. (= *Ipomoea Humboldtii* Hort.), mangoldartige, 4. w. Demerara (engl. Guiana).
bonariensis Lindl., bonarische, 4. Sch. w. Buenos Ayres.
cissoides Choisy (= *Convolvulus calycimus* H. B. K. = *C. cissoides* Vahl), Klimmenähnliche, ⊙. Sch. w. f. m. Südamerika.
edulis Chois. (= *Convolvul. edulis* Thbg. = *C. Batatas* L. = *C. esculentus* Spgl. = *Ipomoea Batatas* Poir., p. 418), geniefsbare (ächte), 4. Kn. w. t. Ostindien, Japan, Südamerika etc.
β xanthorrhiza (Patate jaune) Mauritius, *γ*) platanifolia, Guiana.
glaucifolia G. Don (= *Convolvulus glaucifolius* Spgl. = *Ipomoea glaucifolia* L., p. 419).
Jalapa Chois. (= *Convolv. Jalapa* L. = *Ipomoea Jalapa* Bot. mag., p. 419.
β) Purshii G. Don (= *Ipomoea Michauxii* Sweet, p. 420, = *I. Jalapa* Pursh).
insignis G. Don (= *paniculata* Chois. = *Ipomoea gossypifolia* W., p. 419 = *I. insignis* Ait., Ker).
littoralis Choisy (= *Convolvulus littoralis* L. = *C. arenarius* Vahl = *C. dianthus* Gmel. = *C. biflorus* Forsk. = *C. Imperati* Vahl, p. 215 = *C. obtusilobus* Mchx. = *C. sinuatus* Petagna = *C. stoloniferus* Cyrill. = *Ipomoea arenaria* R. et S. = *I. stolonifera* Poir.), Ufer-B., 4. f. Südeuropa, Nordafrika etc.
paniculata Chois. (= *Convolv. paniculatus* L. = *C. roseus* H. B. K. = *Ipomoea eriosperma* P. B. = *I. mauritiana* Jacq. = *I. pentaloba* R. et S. = *I. paniculata* RBr., p. 420).
pentaphylla Choisy (= *Convolvulus hirsutus* Roxb. = *pentaphyllus* L. = *Ipomoea pentaphylla* Jacq., p. 420, *I. polytricha* G. Don).
quinquefolia Chois. (= *Convolv. palmatus* Mill. = *C. pentaphyllus β* L. = *C. quinquefolius* L., p. 216).
ternata G. Don (= *Ipomoea ternata* Jacq., p. 421).
triloba Choisy, dreilappige, ⊙. f. m. w. Brasilien.
heterophylla G. Don (et = *Willdenowii* G. Don = *Ipomoea heterophylla* Ortega Jacq. non RBr., p. 419),

Digitized by Google

Batatas

v. Pharbitis heterophylla, *ternata* G. Don = Ipomoea ternata, *venosa* Boj., G. Don = Ipomoea venosa, q. 421.

Bathmium fraxinifolium Lk., *macrophyllum* Lk., *trifoliatum* Lk., v. Aspidium 1.

Batodendron arboreum Nutt., v. Vaccinium arboreum, p. 833.

Batis L., Batis, XXII. IV., Urticaceae-Batideae (? Coniferae).

aurantiaca, Mackoy, orangenfarbige, ♄. w. ?

Batschia Gmel., Mchx. (Batsch, Professor der Naturgeschichte zu Jena, † 1802), V. I., Asperifoliaceae.

canescens Mchx. (= *Lithospermum canescens* Lehm., p. 468).

caroliniana Gmel. (*Gmelini* Mchx. = *Lithospermum hirtum*, p. 469), longiflora Pursh (= *Lithospermum longiflorum*, p. 469), *Batschia nivea* Mch. = Eupatorium ageratoides, p. 319.

Bauera Kennedy Andr., Bauera.

juncea Sm., simsenförmige, ♄. t. k. Neuholland.

Bauhinia Plum., Bauhinie.

aculeata L. (= *fragrans* Hort.).

americana DC.

bahiensis Bong., Bahia-B., ♄. Sch. w. Brasilien.

corymbosa Roxb. (= *scandens* Burm. non L.), traubendoldige, ♄. Sch. w. Ostindien.

eriophora Tenore (? Caulotretus), wolltragende, ♄. Sch. w. ?

Finlaysoniana Grah., Finlayson's, ♄. Sch. w. Ostindien.

reticulata DC. (= *inermis* Forsk. = *platysiliqua* Perrot. = *tamarindacea* Delil. = *Thonningii* Schum.), netzförmige, ♄. w. Aegypten, Senegal.

rotundata Mill. (= *aculeata* L. var. ? DC.), rundliche, ♄. w. Carthagena.

divaricata Hort. = Inga forficata, *speciosa* Hort. = tomentosa.

Baumannia DC. (Gebrüder Baumann, Gartenbesitzer zu Bollwyller), V. I., Rubiaceae-Guettardaceae.

geminiflora DC. (= *Bridelia spinosa* Baum, H. Bollw.), doppeltblüthige, ♄. ♄. t. ?

Baumannia Douglassiana Spach, *Nuttalliana* Spach, *pinnatifida* Spach, v. Oenothera pallida, albicaulis p. 554 et Purshiana.

Baumgartia scandens Mch., v. Cocculus carolinus, p. 209.

Baxtera Rchb. (W. Baxter, engl. Botaniker), V. II., Asclepiadeae.

loniceroides Steud. (= *Harrisonia loniceroides*, p. 377).

Beatsonia Herb., Beatsonie ? III. I. (XVI. I.), Irideae.

atrata Herb., schwärzliche, 4. Zw. t. Mexico.

Beaufortia RBr., Beaufortie.

empetrifolia Schauer (= *Melaleuca empetrifolia* Rchb.), rauschbeerenblätterige, ♄. ♄. t. Südwestl. Neuholland.

rotundifolia Hort., rundblätterige, ♄. ♄. t. Neuholland.

Dampieri A. Cunningh., *macrostemma* Lindl., v. Schizopleura Dampieri et macrostemma, *glauca* Hort. anglor. (= ?), *pinifolia* Cels. = Calothamnus quadrifida, p. 149, *splendens* Baxter = sparsa.

Digitized by Google

Beckea africana Burm., *cordata* Burm. (= *racemosa* Eckl. et Zeyh.) = Phylica pinifolia et racemosa, p. 619.

Beckeria Fresen. (O. Becker, Botaniker in Frankfurt a. m. †), III. 11., Gramineae.

dioica N. E. (= *Gymnothrix uniseta* N. E. = *Setaria dioica* et *macrochaeta* Hochst. = *Panicum adoense* Steud.), zweihäusige, ⊙. ♂. f. w. Abyssinien.

polystachya Fresen., vieljährige, ⊙. ♂. f. w. Abyssinien.

Beckeria Bernh. = Melica ciliata, p. 507.

Becium Lindl., XIV. 1., Labiatae.

bicolor Lindl. (= *Ocymum grandiflorum* L'Her. p. 552 = *O. abyssinicum* Hort. Par.), zweifarbiges, ♄. w. t. Abyssinien, Arabien.

Refaria L., v. Bejaria.

Begonia L., Begonie, Schiefblatt.

albo-coccinea Hook., weifs- und scharlachfarbiges, 4. w. Ostindien.

Barkeri Knowl. et Westc., Barker's, 4. ♄. w. Mexico.

besleriaefolia Schott, besleriablätteriges, ♄. w. Brasilien.

bulbillifera Lk. et Otto, zwiebeltragendes, 4. Kn. w. Mexico.

caffra Meisn. (= *sinuata* E. Mey., Otto et Dietr.), kaffersches, ♄. w. t. Cap der guten Hoffnung.

coccinea Hook., scharlachfarbiges, ♄. w. Brasilien.

crassicaulis Lindl., dickstengliches, ♄. w. Guatimala.

cucullata W., kappenförmiges, ♄. w. Brasilien.

fagifolia Fisch., Brasilien.

gracilis H. B., schlankes, ⊙. ♄. w. Mexico.

heracleifolia Cham. et Schltdl., β) radiata Grah. (= *tanacetifolia* Hort.).

hirtella Lk., Antillen.

homonyma Steud. (= *sinuata* Bot. mag. Grah. non Wall.), gleichnamiges, ♄. w. Brasilien.

Hookeri Sweet (= *semperflorens* Hook.), Hooker's, ♄. w. ?

hydrocotylefolia Hook. (= ? *manicata* Hort.), wassernabelblätteriges, ♄. w. ?

incana Lindl., weifsgraues, ♄. ♄. w. Mexico.

incarnata Lk. et Otto (= *insignis* Grah. = *ciliata* Hort.).

Lindleyana Walpers (= *vitifolia* Lindl. non Schott.), Lindley's, ♄. ♄. w. Guatimala.

manicata Visiani, ärmelartiges, ♄. w. Südamerika.

β) hybrida.

parviflora E. Mey., kleinblumiges, ⊙. ♄. w. t. Cap der guten Hoffnung.

peltata Otto et Dietr., schildförmiges, ♄. ♄. w. Mexico.

pentaphylla Walpers (= *muricata* Scheidw.), fünfblätteriges, ♄. ♄. w. Brasilien.

Porteriana Fisch., Mey. et Lallem., Porter's, ⊙. w. Brasilien.

punctata Klotzsch non Hort., punktirtes, 4. w. Mexico.

rhizocarpa Fisch., wurzelfrüchtiges, ⊙. 4. w. Südamerika.

suffruticosa Meisn., halbstrauchiges, ♄. w. t. Cap der guten Hoffnung.

suaveolens Haw. (= *odorata* W. E. = *humilis* Lindl.).

vitifolia Schott (= *grandis* Otto = *reniformis* Hook. = *truncata* Vellozo).

Walpersii* (= *Ottonis* Walpers), Walpers's, ♄. ♄. w. Caracas.

Digitized by Google

Von nachstehenden ist mir Autor und Vaterland unbekannt, als: hernandiaefolia, jatrophaefolia, rubricaulis, rupestris, zebrina, zebrina purpurea.

Hybriden: caulostigma purpurea et viridis, laetevirens, acuminata, argyrocelis van Houtte, erythrophylla van Houtte.

elatior Hort., v. reniformis et vitifolia, *eriocaulis* Visian. = Meyeri, *nervosa* Hort. (= ?), *parvifolia* Hort. = Dregei, *peponifolia* Hort. = macrophylla, *populifolia* Schott. = scandens, *suaveolens* Hort. = diptera.

Beilia spicata Eckl., v. Watsonia spicata, p. 856.

Bejaria Mutis, Bejarie (= *Befaria* Auct. p. 116).

glauca Humb. B. et var. Makoyi.

ledifolia Humb. B., porstblätterige, ♄. t. Neugranada.

mexicana Benth., mexicanische, ♄. t. Mexico.

racemosa Vent. (= *paniculata* Mchx.).

Belladonna blanda Sweet, *pudica* Sweet, *purpurascens* Sweet, v. Amaryllis blanda, pudica et Belladonna, p. 44 et 45.

Bellevalia Lapeyr., Bellevalie.

ciliata N. E. (= *Hyacinthus ciliatus* Cyrill. = *sarmaticus* Pall. = *Muscari ciliatum* Ker, p. 534).

comosa Kunth (= *Hyacinthus comosus* L. = *Muscari comosum* Mill., p. 534, β) monstrosa Kunth (= *Hyac. monstros* L. = *Muscari paniculatum* Medic.), γ) fuliginosa Kunth (= *Hyac. fuliginosus* Pall.), δ) flore albo, ε) flore carneo.

dubia Rchb. (= *Hyacinthus dubius* Guss.).

glauca Kunth (= *Muscari glaucum* Lindl., p. 534).

lineata Kunth (= *Hyacinthus ciliatus* Fleisch. = *H. lineatus* Steud.), linirte, 4. Zw. f. b. Smyrna.

maritima Kunth (= *Hyacinthus maritimus* L. = *Muscari maritimum* Dsf., p. 535).

romana Rchb. (= *appendiculata* et *operculata* Lapeyr.), = *Hyacinthus romanus* L. = *Scilla romana* Ker).

sessiliflora Kunth (= *Hyac. sessiliflr.* Vivian. = *Muscari sessiliflorum* Spgl.), stiellosblumige, 4. Zw. f. b. Aegypten, Syrien.

trifoliata Kunth (= *Hyacinthus trifoliatus* Tenore), dreiblätterige, 4. Zw. f. b. Apulien, Persien, Cypern.

Bellis T., Gänseblümchen.

dentata DC. (= *annua* L. var. Spgl. = *Bellium bellidioides* Dsf. non L. = *Bellium dentatum* Vivian.), gezahntes, ⊙. f. Südeuropa.

Bellium L., Massliebe.

rotundifolium DC. (= *giganteum* Cass. = *Doronicum rotundifolium* Dsf.), rundblätterige, 4. k. Atlas.

annuum Less = Bellis annua.

Belmontia E. Mey., Belmontie, IV. 1., Contortae-Gentianeae.

cordata E. Mey. (= *Sebaea cordata* RBr., p. 737 = *Exacum cordatum* L. suppl.).

Ohlendorffii Griseb. (= *Sebaea Ohlendorffiana* Eckl.), Ohlendorff's, ⊙. f. m. Cap der gut. Hoffn.

Beloperone N. E., v. Justicia II. p. 434.

Belvisia coerulea Desv., v. Napoleona imperialis.

Bembycodium Kunze, Bembycodie, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae),

Athanasiae Kunze, Athanasiaähnliche, ♄, k. Cap d. g. H.

Digitized by Google

Benthamia Lindl., Benthamie.
japonica Sieb. et Zuccar., japanische, ♄. k. Japan.

Benzoin N. E., Benzoinlorbeer, XI. 1., Laurineae.
aestivale N. E. (= *Laurus aestivalis* Wangenh., p. 448 = *Evosmus aestivalis* Nutt. = *Laurus Benzoin* W. et Hort. non L.), Sommer-B., ♄. f. Carolina, Virginien.
melissaefolium N. E. (= *B. Diospyros* Sw. = *Evosmus Diospyros* Nutt. = *Laurus Diospyros* Pursh, p. 449 = *Tetranthera Diospyros* Spgl.), melissenblätterige, ♄. f. b. Carolina, Virginien.
odoriferum N. E. (= *Evosmus Benzoin* Nutt. = *Laurus Benzoin* L., p. 448 = *L. Pseudo-Benzoin* Mchx.), ächter, ♄. f. Nordamerika.
Benzoin officinale Heyne, v. Styrax Benzoin.

Berardia Brogn. (= *Nebelia* Sweet), Berardie, V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.
affinis Brogn., ähnelnde, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.
fragarioides Schltdl. (= *Brunia fragarioides* W., p. 134 = *Heterodon fragarioides* Meisn.).
paleacea Brogn. (= *Brunia paleacea* Thbg.), spreuige, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.
phylicoides Brogn. (= *Brunia phylicoides* Thbg.), phylicaähnliche, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

Berberis T., Sauerdorn.
actinacantha Mart., strahlendorniger, ♄. k. f. b. Chili.
aristata DC. (= *Chitria* Hamilt., p. 118 = *angustifolia* Roxb. = *floribunda* Wall. = *petiolaris* Wall.).
articulata Loisel. (= *provincialis* Audib.?) gegliederter, ♄. f. Südfrankreich.
asiatica Roxb. (= *ilicifolia* Roxb. non Forst.).
chilensis Gill., chilesischer, ♄. f. b. k. Chili.
dentata Tausch, gezahnter, ♄. f. ?
β) latifolia, *γ*) capitata.
integerrima Bunge, ganzblätteriger, ♄. f. Samarkand.
nitens Schrad. (= *β cretica* Sieb.), Griechenland.
Nummularia Bunge, rundblätteriger, ♄. f. Samarkand.
spathulata Schrad. (= *canadensis* Lk. Hayne), spatelblätteriger, ♄. f. Nordamerika.
umbellata Wall. (= *angulosa* Wall. = *Wallichiana* et *floribunda* Auct. et Hort.), doldiger, ♄. k. f. b. Nepal.
vulgaris L., *η*) alba Mill., *ϑ*) dulcis Hort., *ι*) macrocantha Schrad. (= *sicula* Jan. = *aetnensis* Presl), *κ*) innominata Fisch. (= *aurea* Tausch = *sibirica* Hort.), asperma Clus. = *apyrena*, lutea L'Her. = *flava*.
altaica Pall., sibirica, *amricana* Lodd. (= ?), *atroviridis* Wall. = Wallichiana DC., *Bigelowii* Schrad. = crenulata, *ilicifolia* Booth = crataegina, *ilicifolia* Hort. = heterophylla, *pauciflora* Salisb. = cretica. Die übrigen s. Mahonia.
Berckheya cernua RBr., v. Didelta cernuum, p. 262.
B. fruticosa Ehrh. = incana.

Bergia L., Bergie.
ammannioides Roth (= *pentandra* Guillem.), Ammanniaähnliche, ⊙. f. m. Senegambien, Ostindien.
aquatica Roxb. (= *verticillata* W. non Lam. = *capensis* L. mant. = *Elatine luxurians* Delil. = *B. verticillata* Wight, Arn.), Wasserliebende, ⊙. Wa. f. Aegypten, ? Cap, Ostindien.
trimera Fisch. et Mey. (= *Lechea verticillata* W. =

Digitized by Google

Bergia

B. ammannioides Wight non Roth.), dreizählige, ☉. f. Ostindien.

Beringeria Neck., Beringerie.

frutescens Rchb. (= *Ballota spinosa* Lk. = *Molucella frutescens* L.), strauchige, ♄. f. b. Frankreich.

mollissima Benth., (= *Ballota mollissima* Benth.) = *Marrubium cinereum* et *scrophulariaefolium* Hortul.), weichblätterige, 4. f. Spanien.

rugosa Benth. (= *Ballota rugosa* Benth. = *Marrubium rugosum* Dsf.), runzelige, 4. f. Orient.

Bernhardia W., Bernhardie.

complanata W. (= *Psilotum complanatum* Sw. = *P. dichotomum* Hort.), verflachte, 4. w. Westindien.

Berteroa DC., Berteroa.

adscendens C. Koch, aufsteigende, ♂. f. Iberien, Mingrelien.

orbiculata DC., kreisförmige, ♂. ♄. f. b. k. Griechenland.

procumbens Portenschlag, niederliegende, ♂. f. Dalmatien.

Bertiera Aubl., Bertiera, V. r., Rubiaceae.

coccinea G. Don, scharlachfarbige, ♄. w. Sierra-Leone.

Bertolonia glandulosa Spin., v. Myoporum viscosum, p. 536.

Berula angustifolia K. et *lancifolia* Bess., v. Sium angustifolium et lancifolium, p. 763.

Berzelia Brogn., Berzelie.

arachnoidea Eckl. et Zeyh. (= *Brunia arachnoidea* Wendl.), spinnengewebige, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.

comosa Eckl., Zeyh. (= *Brunia comosa* Thbg., p. 134).

ericoides Eckl., Zeyh. (= *Brunia ericoides* Wendl., p. 134).

formosa Eckl., Zeyh. (= *Brunia formosa* D. Dietr. non Dum. Cours.), schöne, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.

rubra Schltdl. (= *Brunia rubra* W. = ? *Brunia squarrosa* Thbg.), rothe, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.

superba Eckl., Zeyh. (= *Brunia speciosa* Hort. = *Brunia superba* Don, p. 134 = *Heterodon superbus* Meisn.).

Wendlandiana Eckl., Zeyh. (= *Brunia paleacea* Wendl., non Thbg.), Wendland's, ♄. t. Cap d. g. H.

Besleria Plum, L., Beslerie.

flavo-virens Mart. (= *luteo-virens* N. E.), gelbgrüne, ♄. w. Brasilien.

Noch kommen in den Gärten, ohne nähere Angabe des Autors und Vaterlandes, folgende vor: B. pubescens, purpurea et semialata.

B. bicolor Schott (= *dichrus* Spgl.), *coccinea* Aubl., *cristata* L., v. Alloplectus bicolor etc., *Drymonia* Steud., *grandiflora* H. B., *serrulata* Jacq., v. Drymonia calcarata etc., p. 277, *melittifolia* L., v. Episcia melittifolia, sanguinea P., v. Tussacia sanguinea, *scandens* Moç., Sess., v. Lophospermum scandens, *splendens* Hort., v. Drymonia speciabilis.

Bessera Schult. fil. (S. J. G. v. Besser, kaiserl. russ. Staatsrath und Prof. d. Botanik zu Kiew, †), VI. r., Coronariae- (Liliaceae) Asphodeleae.

elegans Schult. fil. (= *Herberti* G. Don = *Pharium fistulosum* Herb., p. 612), zierliche, 4. Zw. k. t. Mexico.

Digitized by Google

Betonica L., Zehrkraut.

hirsuta L., b) flore albo.

Gartenvarietäten oder Hybriden: alba pura Hort., macrostachys Wender., rosea Hort., rubicunda Wender., superba Hort., *affinis* Wender. = officinalis γ stricta, *lutea* Mill. = Alopecuros.

Ungewifs: Morisonii et tenuifolia Hort.

Betula T., Birke.

humilis Schrank. (= *fruticosa* Auct. non Pall.), niedrige, ħ. f. Mittel- und Norddeutschland, Ukraine.

β) oycoviensis Bess. (= Sokolowii Jacq.), p. 870[1]).

microphylla Bunge, kleinblätterige, ħ. f. Altai.

nana L., β) major Hort., Vindob., γ) stricta Lodd.

papyracea Ait., var. undulata Hort., Vindob.

Varietäten und Hybriden (?): glauca Wender., intermedia Thom., juncea Hort., myrsinoides Tausch, rhombifolia Tausch, urticaefolia Court.

Beureria Jacq., Beurerie.

aspera G. Don (= *Ehretia aspera* Roxb., p. 283 = *E. tomentosa* Heyne).

cestroides Spgl. (= *Freylinia cestroides* Colla non Benth.), Hammerstrauchähnliche, ħ. w. Südamerika.

divaricata G. Don (= *Ehretia divaricata* DC., p. 283).

laevis G. Don (= *Ehretia laevis* Roxb., p. 283).

laxa G. Don (= *Ehretia laxa* Jacq., p. 283).

Biarum Schott, Endl., Doppelzehrwurz, XXI. IX., Aroideae.

Bowei Decaisne (= *Caladium Bowei* Steud., Bowei's, 4. f. b, k. Syrien.

gramineum Schott (= *Arum gramineum* Lam., p. 85), Südeuropa.

tenuifolium Schott (= *Arum tenuifolium*, p. 87).

Biasolettia nodosa Bertol., v. Chaerophyllum nodosum, p. 186.

B. tuberosa K., v. Freyera Biasolettiana.

Bidens T., Zweizahn.

affinis Kl. et Otto, ähnlicher, ☉. f. Cuba.

anthriscoides DC., klettenkörbelähnlicher, ☉. f. Mexico.

californica DC., californischer, ☉. f. Californien.

carnea Heer, fleischfarbiger, 4. ħ. w. Guiana.

caucalidea DC., Haftdoldenähnlicher, ☉. f. Mexico.

chilensis DC. (= *bipinnata* Hook. non L. = *valparadisiaca* Colla), chilesischer, ☉. f. Chili.

ciliata Hoffmeg., gefranzter, ☉. f. Brasilien.

Coreopsidis DC. (= *Coreopsis chrysantha* Spgl. non L.), wanzenblumenähnlicher, 4. w. Jamaika.

β) Coreopsis reptans L., γ) incisa Ker. Vergl. p. 218 et 219.

dichotoma Dsf., P. (= ? *reflexa* Lk.), gabelästiger, ☉. f. w. Brasilien.

ferulaefolia DC. (= *Coreopsis ferulaefolia* Jacq., p. 218 = ? *Coreopsis incurva* Mch. = *Kerneria ferulaefolia* Cassin.).

fruticosa DC. (= *Coreopsis fruticosa* Vest.), strauchiger, ħ. k. ?

grandiflora (= *diversifolia* W. et Hort. = *odorata* Hort. = *quinqueradiata* Zea, *serrulata* Dsf. = *Coreopsis diversifolia* Jacq. et *serrulata* Poir., *Cosmea lutea* Sims, *Kerneria serrulata* Cassin).

1) Ist p. 121 als Synonym zu streichen.

Digitized by Google

Bidens
hispida H. B. K. (= *decussata* Pavon. et Hort. = *leucantha* Auct.), steifhaariger, ⊙. f. Venezuela.
paleacea Visian., spreuiger, ⊙. f. Nubien.
parviflora W. (= *macrosperma* Fisch. = *multifida* Dsf. = *pauciflora* Poir.).
quadrangularis DC., vierkantiger, ⊙. f. Brasilien.
quadriaristata DC. (= *chrysanthemoides* Pursh, Bigel. non Mchx.), viergranniger, ⊙. f. Nordamerika.
striata Sweet, gestreifter, ⊙. f. Mexico.
tenella L., zarter, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.
Gartenerzeugnisse: cicutaefolia Tausch (= *bipinnata* Hort.), ⊙., elongata Tausch, ⊙., myrrhidifolia Tausch, ⊙., tenuifolia Tausch (= *bipinnata* var. Hort.), ⊙.
apiifolia L., v. Chrysanthellum procumbens, p. 192, *fusca* Lam., *oleracea* Cav., v. Spilanthes oleracea et var. fusca.

Bifrenaria Lindl., Doppelstendel.
atropurpurea Lindl. (= *Maxillaria atropurpurea* Lodd., p. 500).
longicornis Lindl., Demerara p. 121.
vitellina Lindl., dottergelbe, 4. w. Südamerika.

Bigelowia DC. (Bigelow, Prof. d. Botanik in Boston), XIX. i. (II.), Compositae-Corymbiferae.
dracunculoides DC. (= *Chrysocoma dracunculoides* Pursh.).
missouriensis DC. (= *Chrysocoma nauseosa* Pursh.).
nudata DC. (= *Chrysocoma nudata* Mchx.).
uniligulata DC. (= *Solidago pauciflosculosa* Mchx., p. 771).
virgata DC. (= *Chrysocoma virgata* Nutt.)
viscidiflora DC. (= *Crinitaria viscidiflora* Hook.), schmierigblumige, 4. ♄. f. k. Nordwestl. Amerika.
Vergl. p. 194 uud daselbst zu berichtigen.
Bigelowia porulosa Sm., v. Borya porulosa, p. 128.
Bigelowia commutata Spgl. etc., p. 121, v. Borreria verticillata etc.

Bignonia T., Juss., Bignonie.
aequinoctialis L., *β)* spectabilis Vahl, Spgl.
Carolinae Lindl., Carolina's, ♄. t. w. ? Buenos Ayres.
fallax Cham. (= *Amphilophium pubescens* Spgl., p. 49), trügerische, ♄. Sch. w. Brasilien.
Lindleyi DC. (= *picta* Lindl. non Humb.. Bonpl.), Lindley's, ♄ Sch. w. Bonaria.
speciosa Hook., prächtige, ♄. Sch. w. Bonaria.
Tweedieana Lindl., Tweedie's, ♄. Sch. w. Bonaria.
Unbestimmtere:
fraxinea Dsf., eschenähnliche, ♄. ? w. ?
hirtella Brotero (? = *hirta* Velloz.), kurzhaarige, ♄. w. Brasilien.
lucida Lodd., glänzende, ♄. w. Südamerika.
(Dahin gehören auch: crenata Lodd., multifida Lodd., purpurea Lodd., quadrangularis Lockhart, vgl. p. 122).
adenophylla Wall. = Spathodea stipulata, *aesculifolia* H. B. = Tecoma aesculifolia, *Aesculus* Dsf. = *Tecoma Aesculus*, *alba* Aubl. = Spathodea bracteosa, *amoena* Wall. = Spathodea ? amoena, *articulata* Dsf. = Phyllarthron Noronhianum, *australis* Ait. (= *Pandorana* Andr.), *chinensis* Lam. (= *glauca* Decaisn. = *grandiflora* Thbg.), *chrysantha* Jacq., *incisa* Lodd.

Digitized by Google

Bignonia

etc., v. Tecoma australis, grandiflora, chrysantha, incisa etc., *Catalpa* L. = Catalpa bignonioides Walt. (= *cordifolia* Mch., *syringaefolia* Sims, p. 172), chelonioides L. fil. = Stereospermum chelonioides, *Colei* Boj. (= *mauritiana* Hort.) et *Telfairiae* Boj., v. Colea mauritiana et Telfairiae, *cordata* Velloz., v. Lundia cordata, *filicifolia* Anders., v. Jacaranda filicifolia p. 428, *fluviatilis* Aubl. = Tabebuia fluviatilis, *frutescens* Mill. (= *stans* L.) = Tecoma stans p. 800, *jasminoides* Cunn. et *floribunda* Hort. = Tecoma jasminoides et floribunda, *lactiflora* Vahl = Distictis lactiflora, *latifolia* Rich. = Tabebuia latifolia, *Leucoxylon* L., v. Tecoma Leucoxylon, *Manglesii* Hort. = ? Tecoma, *meonantha* Lk. = Tecoma australis β s. meonantha p. 799, *Pareira* Hort. (?), *rigescens* Jacq. = Distictis rigescens, *rivularis* Hort. Kew. (= *viridiflora* Lodd. = *antisyphilitica* Mart.) = Cystibax antisyphilitica, *serratifolia* Vahl = Tecoma serratifolia, *serrulata* Wall. = Spathodea serrulata, *suberosa* Roxb. = Millingtonia hortensis, *triphylla* L. = Tabebuia triphylla, *tuberculata* Roxb. (= *pentandra* Lour. = *indica* var. α Blume), v. Calosanthes indica, *uncinata* G. F. W., Mey., v. Macfadyena uncinata.

Billardiera Sm., Billardiere.

scandens Sm. (= *canariensis* Hort.), klimmende, ♄. Sch. t. Neuholland.

Unbestimmtere:

melocarpa Hort., melonenfrüchtige, ♄. Sch. t. Neuholland.

purpurea Hort., purpurfarbige, ♄. Sch. t. Neuholland.

grandiflora Putterl. und latifolia Putterl., beide ♄. und in Neuholland heimisch, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt; *angustifolia* DC. (*salicifolia* Hort.) et *fusiformis* Labiilard, v. Sollya angustifolia et heterophylla, p. 771, *rosmarinifolia* DC. = ? Pronaya speciosa, *variifolia* DC. = Marianthus coelestis.

Billbergia Holm et Thbg., Billbergie.

acaulis Hort. belg., stengellose, 4. w. Brasilien.

α) foliis fusco-variegatis (= *zebrina* Lindl.), β) foliis luteo variegat. Hort. belg.

bicolor Schult. fil. (= *Bromelia bicolor* Molin.), zweifarbige, 4. w. t. Chili.

Loddigesii Steud. (= *bicolor* Lodd. non Schult.), Loddige's, 4. w. Brasilien.

Quesneliana Hort. belg., Quesnel's, 4. w. Südamerika.

speciosa Holm et Thbg., prächtige, 4. w. Brasilien.

Unbestimmtere: farinosa Hort., pulverulenta Hort. *discolor* Hort. belg. = Bromelia discolor, p. 132, *fasciata* Lindl., v. Hohenbergia fasciata, *latifolia* Hort. belg, v. Bromelia latifolia.

Billiotia RBr., G. Don (= *Agonis* DC.), Billiotie, XII. 1., Myrtaceae.

elliptica Sweet (= *Leptospermum ellipticum* ? Endl.), elliptische, ♄. t. k. Neuholland.

flexuosa RBr., G. Don, Endl. (= *Leptospermum flexuosum*, p. 456 = *L. resiniferum* Bertol. = *glomeratum* Wendl. = *Metrosideros flexuosa* W.).

hypericifolia* (= *theaeformis* C. Schauer = *Leptospermum hypericifolium* Otto et Dietr. = *L. theae-*

Digitized by Google

Billiotia

forme, *A. Cunningh. Agonis hypericifolia* Schauer), johanniskrautblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

linearifolia G. Don, C. Schauer (= *Leptospermum linearifolium* DC.), gleichbreitblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

marginata RBr., G. Don (= *ovatifolia* Sweet = *Leptospermum marginatum* LaBill., p. 455 = *L. ovatifolium* Sweet = *Fabricia myrtifolia* Hort. non G.).

β) angustifolia (= *Fabricia angustifolia* Otto).

saligna Sweet (= *Leptospermum salignum* Steud.), weidenähnliche, ♄. t. k. Neuholland.

Billotia acerosa Colla, p. 123 = Calothamnus quadrifida, p. 149.

Birnbaumia quadrifida Kosteletzky, v. Justicia quadrifida, p. 435.

Biscutella L., Brillenschote (Doppelschild).

dilatata Visian. (= *hispida* var.), verbreiterte, ⊙. f. Dalmatien.

erucifolia Rchb., rankenblätterige, ⊙. f. ?

incana Tenore, weifsgraue, 4. ♄. f. Neapel.

leiocarpa DC. (= *apula* G. *orientalis* Dsf.), glattfrüchtige, ⊙. f. Orient.

obovata DC., verkehrteiförmige, ⊙. f. ?

ambigua Wallr. non DC. (= *varia* Dumort. *α foliosa* et *β scaposa*) = laevigata, *intermedia* Gouan (= *variabilis* Loisel.) = saxatilis, *laciniata* W. (= *maxima* Pall. = *megalocarpa* Fisch.) = Megacarpaea laciniata, *macrocarpa* Hort. = hispida, *major* Sckk. = auriculata *β*, *marginata* Tenor. = lyrata, *pumila* Balb. = maritima, *stenophylla* Dufour = coronopifolia, *tumidula* Lagasca = Columnae *β*.

Bismalva Alcea Medic. et *moschata* Medic., v. Malva Alcea et moschata, p. 490 et 491.

Bistella geminiflora Caill. et Delil., v. Vahlia Weldenii.

Blabcropus A., DC., Giftsäftler, V. 1., Contortae-Apocyneae.

neriifolius A. DC. (= *Alstonia neriifolia* Wall., Don, p. 39).

venenatus A. DC. (= *Echites venenata* Roxb. = *Alstonia venenata* RBr.), ächter, ♄. w. Ostindien.

Bladhia crispa Thbg., *glabra* Thbg., *japonica* Hornst., *villosa* Thbg., v. Ardisia crispa, glabra, japonica et pusilla.

Blackwellia Commers., Blackwellie.

pubiflora Lindl., behaartblumige, ♄. t. China.

tomentosa Vent., filzige, ♄. w. Java.

fugifolia Lindl. = padifolia.

Blaeria L., Blaerie.

barbigera D. Don (= *revoluta* Bartl. = *Erica barbigera* Salisb.), bärtige, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.

ericoides L. (= *rubra* Hort.).

purpurea L. (= *dumosa* Wendl., Don = *equisetifolia* Don = *jucunda* Rchb. = *Erica dumosa* Salisb. = *E. equisetifolia* Salisb. = *E. purpurea* Thbg.

articulata L. (= *eriantha* W.), *fasciculata* W. et *scabra* W. = Syndesmanthus articulatus etc., p. 795, *bracteata* Wendl. (= *articulata* W.) = Sympieza capitellata, p. 795, *bicolor* Kl. = *de-*

Digitized by Google

Blaeria
pressa Lichtenst. et *glabella* W. = Simocheilus bicolor etc., p. 885, *ciliaris* L. fil. = Griesebach. ciliaris, p. 307, *muscosa* Ait., v. Scyphogyne inconspicua, *nodiflora* Don = Grisebachia plumosa, p. 307, *ptilota* Drege = Grisebachia hispida, p. 307, *paucifolia* Wendl., v. Syndesmanthus paucifolius.

Blainvillea Cass., DC., (Blainville, franz. Naturforscher).
biaristata DC., zweigrannige, ⊙. f. Rio grande.
latifolia DC. (= *Eclipta latifolia* L. suppl., p. 283 = *Verbesina Lavenia* Roxb. non L.).
rhomboidea Cass. (= *Verbesina dichotoma* Murray, p. 840 = *Verbes. lanceolata* Poir.), rautenförmige, ⊙. f. m. Brasilien.
Blakea triplinervia L. fil. = B. quinquenervia, p. 124.

Blandfordia Sm., Blandfordie.
punicea G. Don, Sweet (= *marginata* Herb. = *Aletris punicea* LaBill.), dunkelrothe, 4. t. Neuholland.
speciosa H. Anglor., prächtige, 4. t. ?
Blaxium decumbens Cass., v. Dimorphotheca fruticosa, p. 265.

Blechnum L., Rippenfarrn.
brasiliense Desv. (= *nitidum* Presl = *corcovadense* Raddi = *campestre* Hort.).
glandulosum Kaulf. non Lk.
intermedium Lk. (excl. synon. Kaulf.), mittlerer, 4. w. Brasilien.
serrulatum Mchx., β) angustifolium W., γ) calophyllum Langsd. et Fisch. (= *stagnisum* Raddi).
triangulare Lk., dreiwinkeliger, 4. w. Mexico.
auriculatum Endl. (= *punctulatum* Sw.) = Lomaria punctulata, *australe* L. mant. (= *rigidum* W. = *auriculatum* L. spec.) = Lomaria australis, *glandulosum* Lk. = polypodioides Raddi.

Blepharacanthus N. E. Kelchklau, XIV. II., Acanthaceae.
capensis N. E. (= *Blepharis capensis* P., p. 125).
carduifolius N. E. (= *Acanthus carduifolius* Thbg., p. 7).
furcatus N. E. (= *Blepharis furcata* P., p. 125).
integrifolius N. E. (= *Blepharis saturejaefolia* Juss., p. 125).
procumbens N. E. (= *Blepharis procumbens* P., p. 125).

Blepharipappus Hook., DC. (= *Eriopappus* Arn. non Dumort.), Kelchfederchen (Wollfederchen), XIX. II., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae).
glandulosus Hook., drüsiges, ⊙. f. Columbia.
scaber Hook., scharfes, ⊙. f. Columbia.
Blepharis capensis P. etc., p. 125, v. Blepharacanthus capensis etc.

Blephilia Rafin., Blephilie, II. I., Labiatae.
ciliata Rafin. (= *Monarda ciliata*, p. 528).
hirsuta Benth. (= *nepetoides* Rafin. = *Monarda hirsuta*, p. 529).

Bletia R. et P., Bletie.
atropurpurea H. Berol., schwarzpurpurrothe, 4. Kn. w. ? Südamerika.
campanulata Llave, glockige, 4. Kn. w. Mexico.
coccinea Llave, scharlachfarbige, 4. Kn. w. Mexico.
humilis Lk. et Otto, niedrige, 4. Kn. w. Mexico.

Digitized by Google

Bletia

obcordata Lindl., verkehrtherzförmige, 4. Kn. w. Ostindien.
Parkinsonii Bot. mag., Parkinson's, 4. Kn. w. Mexico.
punctata Llave, punktirte, 4. Kn. w. Mexico.
purpurea DC. hort. Genev., pupurfarbige, 4. Kn. w. ? Südamerika.
alta Hort. = verecunda, *autumnalis* Llave = Amalia (= *Laelia*) autumnalis, *flava* Wall. (= *Woodfordii* Hook.) = Phajus maculatus, *grandiflora* Llave = Amalia (= *Laelia*) grandiflora, *Tankervilliae* RBr., v. Phajus grandifolius.
Blighia sapida Koen, v. Cupania Akeesia.
Blitanthus nepalensis Rchb. = Aeroglochin chenopodioides, p. 16.

Blitum L., Erdbeerspinat.

chenopodioides Lam. (= *tataricum* Mill.).
Nuttallianum Nutt. (= *chenopodioides* Nutt. non Lam.), Nuttall's, ☉. f. Missouri.
petiolare Lk. (= *chenopodioides* Bernh. non Lam.), gestielter, ☉. f. ?
crassifolium Rchb. et *polymorphum* C. A. Mey., v. Chenopodium crassifolium et astracanicum, *minus* Hort (? =).

Blumea DC., Blumea.

Dregeana DC. (= *Conyza amoena* Lk., p. 216), Dreges, 4. w. Südl. Afrika, Congo.
Blumia Candollei N. E. = Talauma Candollii, p. 797.

Blyttia Fr. (Blytt, Prof. der Botanik in Christiania), III. II., Gramineae.

suaveolens Fr. (= *Agrostis suaveolens* Blytt), gutriechende, 4. f. Norwegen.

Boisduvalia Spach, Boisduvalie, VIII. I., Onagrariae.

concinna Spach (= *Oenothera concinna* D Don = *O. humifusa* Lindl., p. 555 = *subulata* Hook.).
Douglasii Spach (= *Oenothera densiflora* Lindl., p. 554).

Boissiera Hochst., (E. Boissier, franz. Botaniker und Reisender), III. II., Gramineae.

bromoides Hochst. (= *Pappophorum sinaicum* Trin.), trespenähnliche, ☉. f. Sinai.
Bolbophyllum v. Bulbophyllum.

Boldoa Juss. (D. Boldo, span. Botaniker), XXII. XI., Monimieae.

fragrans Endl. (= *Peumus fragrans* P., p. 611 = *Boldu chilanum* N. E. = *P. Boldus* Molina = *Ruizia fragrans* Pavon).
Boldoa lanceolata Lagasc. et *purpurascens* Cav., v. Salpianthus arenarius et purpurascens.

Boltonia L'Her., Boltonie.

diffusa Ell. (= *asteroides* Bot. mag. non L'Her.) = *Anonymus asteroides* Mchx.), weitschweifige, 4. f. Nordamerika.
Bomarea Mirb.
acutifolia Hook., *edulis* Hook., *hirtella* Hook., *ovata* Mirb., *Salsilla* Mirb. = Alstroemeria acutifolia etc., p. 39 et 40.

Bombax L., Wollblume.

microphyllum H. belg., kleinblätterige, ♄. w. ? Ostindien.
insigne Wall. et *malabaricum* DC. (= *heptaphyllum* Cav. = *Ceiba* Burm. = *Gossampinus rubra* Hamilt.), v. Salmalia insignis et malabarica, *parviflorum*

Digitized by Google

Bombax

Mart. et pubescens Mart., v. Eriotheca parviflora et pubescens.

Bombyx phoenicea Mch., v. Hibiscus phoeniceus, p. 396.

Bonannia dissecta Presl et *officinalis* Presl, v. Sinapis dissecta et alba, p. 760.

Bonannia nitida Rafin., v. Cupania Akeesia.

Bonapartia v. Buonapartea, p. 138.

Bonatea W., Bonatea.

Bilabrella (= *Bilabrella falcicornis* Lindl.), zweilippige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

foliosa Lindl. (= *Orchis foliosa* Sw.), blattreiche, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

Bonaveria Scop., securigera Endl. (= *Securigera Coronilla* DC., p. 738).

Bonelia Cavanillesii Bertero, v. Jacquinia macrocarpa, p. 428.

Bongardia Bongardie.

Olivieri C. A. Mey. (= *Leontice Olivieri* Steud. = *L. altaica* Pall.), Olivier's, 4. Kn. f. b. Sibirien, Bessarabien, Insel Chio.

Rauwolfii C. A. Mey. (= *Leontice Chrysogonum* L., p. 452).

Bonjeanea Rchb., Bonjeanea, p. 871.

microphylla Rchb. (= *Lotus microphyllus* Hook., p. 478).

recta Rchb. (= *Lotus rectus* L. = *Dorycnium rectum* Sering., p. 272).

Booram G. Don, v. Rhododendron I. p. 684.

Borago L., v. Borrago.

Borbonia L., Bourbonie.

Candolleana Eckl., Zeyh. (= *ciliata* DC. non W.), Candolle's, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

villosa Thbg., zottige, ♄. t. Cap der gut. Hoffn.

capitata Poir., *laevigata* Poir., *myrtifolia* Poir. etc., v. Priestleya capitata etc., p. 655, *cordata* Andr. non L., v. Rafnia triflora, p. 675, *ericaefolia*, v. Amphithalea ericaefolia.

Borckhausenia lucida Roth, v. Teedia lucida, p. 800.

Borkhausia Lk., Spgl., v. Barkhausia.

Boronia Sm., Boronie.

anethifolia A. Cunningh., dillblätterige, ♄. t. Neuholland.

cymosa Endl., afterdoldige, ♄. t. Neuholland.

dichotoma Lindl., zweizinkige, ♄. t. Neuholland.

Fraseri Hook. (= *anemonifolia* Paxton, nec All. Cunn.), Fraser's, ♄. t. Neuholland.

lanuginosa Endl., wollige, ♄. t. Neuholland.

mollis A. Cunningh., weiche, ♄. t. Neuholland.

nana Hook., zwergige, ♄. t. Neuholland.

ovata Lindl., eiförmige, ♄. t. Neuholland.

paleifolia A. Cunningh., spreublätterige, ♄. t. Neuholland.

Rinzii Hügel, Rinz's, ♄. t. Neuholland.

rosmarinifolia A. Cunningh., rosmarinblätterige, ♄. t. Neuholland.

rubiginosa All. Cunningh., rostfarbige, ♄. t. Neuholland.

salicifolia A. Cunningh., weidenblätterige, ♄. t. Neuholl.

scabra Lindl., scharfe, ♄. t. Neuholland.

spathulata Lindl., spatelblätterige, ♄. t. Neuholland.

teretifolia Lindl., stielrundblätterige, ♄. t. Neuholland.

ternata Endl., dreizählige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Boronia

triphylla Sieber, dreiblätterige, ♄. t. Neuholland.
α) foliolis linearibus, *β*) foliolis ovalibus, s. latifolia Lindl.

variabilis Hook., veränderliche, ♄. t. Van Diemens Land.

viminea Lindl., ruthenartige, ♄. t. Neuholland.

Borrago orientalis L., v. Trachystemon orientales.

Borreria G. F. W. Meyer, DC. (*Bigelowia* Spgl., p. 121).

advena Fisch. (= *verticillata*, *spinosa*, *capitata*, *capitellata* Autor), ⊙. ♂. f. w.

affinis DC. (= *Spermacoce affinis* Pohl), ähnelnde, ⊙. ♄. f. w. Brasilien.

asperula DC., rauhe, ⊙. f. Bahia.

cornifolia DC. (= *Bigelowia cornifol.* p. 121 = *Spermacoce cornifolia* Fisch.).

crassifolia C. A. Mey., dickblätterige, ⊙. f. ? Südamerika.

gracillima DC. (= *Spermacoce gracillima* Pohl), schlanke, ⊙. f. Südamerika.

Kohautiana Cham. et Schltdl., Kohaut's, ⊙. ♄. f. m. w. Südamerika.

parviflora Meyer (= *Bigelowia parviflora* Spgl., p. 122).

pumila DC. (= *Spermacoce pumila* Pohl), kleine, ⊙. f. Brasilien.

stricta Meyer (= *Bigelowia stricta* Spgl., p. 122).

tenera DC. (= *Bigelowia tenera*, p. 122).

tenuis DC. (= *Bigelowia tenuis*, p. 122 = *Spermacoce tenuis* Pohl).

vaginata Chamiss., Schltdl. (= *Bigelowia vaginata* Spgl., p. 122).

verticillata Meyer (= *Bigelowia commutata* et *verticillata* Spgl., p. 121 et 122 = *Spermacoce verticillata* Sw. = *S. hyssopifolia* P. = *S. mucronata* N. E. = *S. stellata* W.).

Borrichia Adans., DC., Borrichie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

arborescens DC. (= *Buphthalmum aborescens* L. = *Diomedea glabrata* H. B. K. = *D. unidentata* Cass.), baumartige, ♄. w. Westindien.

argentea DC. (= *Buphthalmum canum* L'Her. = *Diomedea argentea* H. B. K., p. 265.

frutescens DC. (= *Buphthalmum frutescens* L. = *incanum* Mill. = *Diomedea bidentata* Cass., p. 265), strauchige, ♄. k. Nordamerika, Westindien.

Borya LaBill. non W. (= *Baumgartenia* Spgl.), (Bory de St. Vincent, berühmter franz. Naturforscher), VI. I., Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae. (Juncaceae, Commelinaceae Rchb.).

scirpoides Lindl., binsenähnliche, 4. k. t. Schwanenfluſs, (Ob kultivirt ?)
B. acuminata W. (= *nitida* W.), *porulosa* W. etc., v. Forestiera acuminata etc., *prinoides* W. = ? Adelia ovata, p. 17.

Bossiaea Vent., Bossiaea.

biloba Benth., zweilappige, ♄. t. Südwestl. Neuholland.

Colvillii Hort., Anglor., Colvill's, ♄. t. Neuholland.

disticha Lindl., zweizeilige, ♄. t. Neuholland.

Endlicheri Meisn., Endlicher's, ♄. t. Neuholland.
α) ovalifolia (Endl.), *β*) angustifolia Meisn., *γ*) minor Meisn.

linnaeoides G. Don, Linnaeaähnliche, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Bossiaea

microphylla Sm. (= *obcordata* Hort. = *Platylobium microphyllum* Sims = *Platylobium obcordatum* Vent.).

Nummularia Endl., pfennigkrautblätterige, ♄. t. Ostl. Neuholland.

ovata Sm., G. Don (= *Platylobium ovatum* Andr.), eiförmige, ♄. t. Neuholland.

paucifolia Benth. (= *virgata* Hook.), wenigblätterige, Schwanenfluss.

rosmarinifolia Lindl., rosmarinblätterige, ♄. t. Schwanenfl.

spinescens Meisn. (= *paucifolia* Lindl. non Benth.), stachelige, ♄. t. Neuholland.

tenuicaulis Grah., dünnstengelige, ♄. t. Neuholland.

thymifolia Hort., thymianblätterige, ♄. t. Neuholland.

diversifolia Hort. = heterophylla, *lenticularis* Lodd. non Sbr. = rhombifolia, *rufa* Lodd. non RBr. = ensata.

Bothriospermum Bunge, Traubensaame, p. 129.

bicarunculatum Fisch. et Mey. (= *chinense* Bunge).

chinense Fisch. et Mey. non Bunge (= *Kusnetzowii* Bunge), chinesischer, ☉. f. Südl. Mongolei.

tenellum Fisch. et Mey. (= *Anchusa tenella* Hornem. = *A. zeylanica* Jacq. fil. [1]).

Botryanthus Kunth, Traubenhyacinthe, VI. 1., Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae.

autumnalis (= *Muscari autumnale* Guss.), Herbst-T., 4. Zw. f. Sicilien.

commutatus Kunth (= *Muscari commutatum* Gussone = *Hyacinthus commutatus* Tenore), verwechselte, 4. Zw. f. Sicilien, Apulien.

odorus Kunth (= *Muscari racemosum* W., p. 535 = *Hyacinthus racemosus* L.).

pallens Kunth (= *Muscari pallens* Fisch., p. 535 = *Hyacinthus pallens* MB.).

? paradoxus Kunth (= *Hyacinthus paradoxus* Hort. Petropol.), wunderbare, 4. Zw. f. Kleinasien (Guriel).

parviflorus Kunth (= *Muscari parviflorum* Dsf., p. 535).

Strangwaysii Kunth (= *Muscari Strangwaysii* Tenore), Strangway's, 4. Zw. f. Byzanz.

vulgaris Kunth (= *Hyacinthus botryoides* L. = *Muscari botryoides* W., p. 534).

Botrychium Sw., Traubenfarrn.

obliquum Mühlbg. (var. B. fumarioid.?), schiefer, 4. k. t. Carolina.

Botrydium aromaticum Spach et *Schraderianum* Spach, v. Chenopodium Botrys et foetidum, p. 189.

Botryocarpum nigrum Rich. = Ribes nigrum, p. 689.

Botryodendron Endl., Traubenbaum, V. 1., Araliaceae.

capitatum Endl. (= *Aralia capitata* Jacq., p. 71 = *Hedera capitata* Sm.).

angustifolium Endl. et latifolium Endl., beide ♄. und auf der Norfolk-Insel heimisch, werden wohl nicht kultivirt.

Bottlanaea Colla = Trichopetalum gracile, p. 817.

Bouteloua gracilis Lagasc. etc., v. Chondrosium gracile etc.

Boutonia pomifera Hort. v. Goodenia paniculata p. 865.

---

1) p. 84 dieses Nachtrags. Gehört aber nach Endlicher zu Bothriospermum tenellum.

Digitized by Google

Bouvardia Salisb., Spgl., Bouvardie.
crocata Hort, safranfarbige, ♄. k. t. ? Mexico.
flava van Houtte, hellgelbe, ♄. k. t. Mexico.
linearis H. B. K., gleichbreite, ♄. k. t. Mexico.
mexicana Hort., mexicanische, ♄. k. t. Mexico.
quinqueflora Dehnh., fünfblumige, ♄. k. t. Mexico.
splendens Hook., schimmernde, ♄. k. t. ? Mexico.
strigosa van Houtte, striegeliche, ♄. k. t. Mexico.

Bowlesia R. et P., Bowlesie.
incana R. et P., weifsgraue, ⊙. f. Peru.
tenera Spgl. (= *nodiflora* Presl. = *incana* H. Par. = *geraniifolia* Chamiss. et Schltdt.).

Brachycome DC., Kurzschopf.
diversifolia Fisch. et Mey., ⊙. f. p. 129.
iberidifolia Benth. (= *capillacea* Walp.), schleifenblumenblätterige, ⊙. f. Neuholland.
Brachycoris parviflora Schrad., v. Lindenbergia urticaefolia, p. 882.
Brachyderea rigida Cass., v. Crepis rigida, p. 229.
Brachyelytrum aristatum R. et S. (= *erectum* P. Beauv.), v. Mühlenbergia aristata, p. 533.
Brachyolobus amphibius All. etc., v. Nasturtium amphibium RBr. etc., p. 543.

Brachypterum Benth., Kurzflügler, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.
scandens Benth. (= *Dalbergia scandens* Roxb., p. 250).

Brachyramphus DC., Kurzschnäbelchen, XIX. I., Compositae Cichoriaceae.
caribaeus DC. (= *Sonchus taraxacifolius* Spgl. p. 772), caribäisches, ⊙. f. m. Westindien.
goraeensis DC. (= *Sonchus ciliatus* Perrot. = *S. goraeensis* Lam.), goraeisches, ⊙. f. m. Guinea.
intybaceus DC. (= *Cicerbita intybacea* Wallr. = *Lactuca intybacea* Jacq., p. 492 = *Phoenixopus intybaceus* Less.), cichorienblätteriges, ⊙. f. m. Insel St. Thomas.

Brachysema RBr., Kurzfahne.
hybridum Hort., Bastard-K., ♄. Sch. t. Neuholland.
platypterum Hort. (= *Pontania Celsiana* Hort.), breitflügelige, ♄. Schl. t. Neuholland.
praemorsum Meisn., abgebissene, ♄. Sch. t. Neuholland.
villosum Hort., zottige, ♄. Sch. t. Neuholland.
Brachystemum lanceolatum W., *linifolium* W., *verticillatum* W., v. Pycnanthemum lanceolatum etc., p. 668.
Brachystephium leucanthemoides Less., v. Brachycome diversifolia, p. 129.
Bradleja laurifolia H. Cels. = ? Glochidion spec.

Brahea Mart. (Brahe, berühmter Astronom), VI. III., Palmae.
dulcis Mart (= *Corypha dulcis* H. B. K.), süsse, ♄. w. Peru.
Brandesia porrigens Mart. (= *Achyranthes porrigens* Jacq., p. 11), v. Teleianthera porrigens.
Brasenia peltata Pursh (= *Schreberi* Gmel.), v. Hydropeltis purpurea, p. 407.

Brassavolea RBr., Lindl.
cuspidata Lindl., feinspitzige, 4. w. Trinidad.
elegans Lindl., zierliche, 4. w. Antigua.
glauca Lindl., blaugrüne, 4. w. Mexico.
Sloanei Lindl., Sloane's, 4. w. Jamaica.

Digitized by Google

Brassavolea
subulifolia Lindl., pfriemenblätterige. 4. w. Ins. Nevis.
tuberculata Hook., höckerige, 4. w. Brasilien.
venosa Lindl., aderige, 4. w. Honduras.

Brassia RBr., Brassie.
guttata Lindl. (= *Corvani* Hort.), getüpfelte, 4. w. ?
Henchmanni Hort., Hechmann's, 4. w. ? Südamerika.
Lanceana Lindl., var. purpurea et var. viridiflora Hook.
maculata RBr., var. major.
odorata Hort., wohlriechende, 4. w. ? Südamerika.
verrucosa Hort. belg., warzige, 4. w. ? Südamerika.
Wrayae Hook., Wraya's 4. w. Guatimala.
Auch eine B. cuspidata kommt in den Pflanzencatalogen vor.

Brassica T., Kohl.
carinata Alex. Braun (= *Melanosinapis abyssinica* Hort. Carlsruh.), kielförmiger, ⊙. f. Abyssinien.
mesopotamica Bernh. (= *Sinapis mesopotamica* Spgl.), mesopotamischer, ⊙. f. Mesopotamien.
nigra K. (= B. *Melanosinapis* Endl. = *Sinapis nigra* L. = *Melanosinapis communis* Spena. et Schimp.), var. abyssinica Alex. Braun.
sempervirens Schrk.; Tenor., immergrüner, ♂. f. k. Südeuropa.
Tournefortii Gouan, β) sisymbrioides Fisch.
Unbestimmtere: hirta Mch., odorata Schrk., — elongata Ehrh. (= *nova* Winterl), *Erucastrum* L., *obtusangula* Schuttl., *ochroleuca* Soyer Willem. (= *Pollichii* Schuttl.) *Schimperi* Boiss., v. Erucastrum elongatum, Lamarckii, obtusangulum, inodorum et arabicum, p. 312, *erucoides* Hornem., v. Eruca sativa, p. 312, *fimbriata* Hort. = oleracea var., *lucida* Hort. = ? *muscovita* Mill. = oleracea var., *peregrina* Mill. = oleracea var., *pyramidalis* Hort. = oleracea var., *suffruticosa* Dsf. = ? Moricandia arvensis, p. 531, *villosa* Biv. = incana.
Brathydium grandiflorum Spach, v. Hypericum procumbens.

Bravaisia DC. (Gebrüder Ch. et F. Bravae's, franz. Botaniker), XIV. 11., Bignoniaceae.
floribunda DC. (= *Bignonia bibracteata* Bertero = *Amazonia integerrima* Spgl.), blüthenreiche, ♄. w. t. Caracas, Mexico.

Bravoa Llav. et Lexar. VI. 1., Narsisseae Amaryllideae Endl., (Liliaceae s. Coronariae Alstroemerieae Rchb.).
geminiflora Llav. et Lexar. (= *Coelocapnia geminiflora*, s. *Zetocapnia geminiflora* Lk. et Otto). Zu ergänzen p. 131.

Braya Stbg. et Hoppe, Braya.
aenea Bunge, kupferfarbige, ♂. f. Altai.
glabella Richards., Bunge, glatte, ♂4. f. Melville, Nowaja Semlia.
Limosella Bunge (= *limosellvides* Bunge), Limosellablätterige, ♂. 4. f. Altai.
rosea Bunge (= *pilosa* Hook. = *Platypetalum capitatum* Turcz. = *dubium* RBr. = *Draba rosea* Turcz.), rosafarbige, ♂. 4. f. Insel Melville.
siliquosa Bunge, langschotige, ♂. 4. f. Altai.
Meyeri Bunge, v. Pachyneurum grandiflorum, *pinnatifida* K. et *supina* K., v. Sisymbrium pinnatifidum et supinum, p. 762.

Digitized by Google

Brebissonia microphylla Spach, et *thymifolia* Spach; v. Fuchsia microphylla et thymifolia, p. 340.

Breweria RBr., Brewerie, V. 1., Convolvulaceae.

Roxburghii Arn., Choisy (= *Convolvulus semidigynus* Roxb. = *Ipomoea semidigyna* Sweet), Roxburgh's, ♄. Sch. w. Ostindien.

spectabilis Choisy (= *Ipomoea spectabilis* Bojer), ansehnliche, ♄. Sch. w. Madagascar.

Bridelia spinosa Hort., v. Baumannia geminiflora.

Bridgesia spicata Hook., Arn., v. Ericilla volubilis.

Brignolia pastinacifolia Bertol., v. Kundmannia sicula.

Brindonia indica Pet. Thouars, v. Garcinia Cowa, p. 345.

Briza auriculata Trevir., v. Chascolythrum trilobum β N. E., *barbata* Trin. (= *Calotheca barbata* N. E.), v. Chascolytrum barbatum, *erecta* Lam. (= *montevidensis* Spgl.), v. Calotheca brizoidea, p. 150, *Lamarckiana* N. E., v. Calotheca dilatata, p. 150, *triloba* N. E. (= *Calotheca triloba* Kunth), v. Chascolythrum trilobum.

Bromelia L., Bromelie.

antiacantha Bertol., Colla., 4. w. Brasilien.

Commeliniana de Vriese, Commelin's, 4. w. ?

latifolia W., breitblätterige, 4. ♄. w. Antigua.

mexicana Noisett., mexicanische, 4. w. Mexico.

Unbestimmtere: elegans Hort., gigantea Hort., laevis Hort., pumila Hort., sepiaria Hort.

= *Aquilega* Salisb. = bracteata, *cruenta* Grah., *farinosa* Hort. (= Billbergia spec.?) *iridifolia* N. E. Mart., *melanantha* Ker, *nudicaulis* L., *pallida* Ker, *pyramidalis* Sims (= *nudicaulis* Ker), zebrina Herbert., v. Billbergia cruenta, iridifolia, clavata, nudicaulis, amoena, pyramidalis et zebrina, p. 123, *glabra* Mill. (= *inermis* P. = *semiserrata* W.), v. Ananassa semiserrata, *lucida* Mill., v. Ananassa lucida, *rubra* Hort., *violacea* Hort. et *viridis* Hort., v. Ananassa sativa var., ? *sylvestris* Arrabida, v. Ananassa bracteata, p. 52, *Mertensii* Meyer, v. Aechmea Mertensii, p. 10, II.

Bromheadia Lindl., Hook. (Sir Edward French Bromhead engl. Naturforscher), XX. 1., Orchideae.

palustris Lindl., Hook. (= *Grammathophyllum Finlaysonianum* Lindl., Hort.), Sumpf-B., 4. w. Malayischer Archipel.

Bromus L., Trespe.

A. Genuini (Annui).

adoënsis Hochst., adoënsische, ⊙. f. Abyssinien.

asperrimus Tenor., scharfste, ⊙. f. Neapel.

fasciculatus Presl (= ? *rubens* L.), büschelförmige, ⊙. f. Sicilien.

Gussoni Parlatore (= *maximus* Gussone), Gussone's, ⊙. f. Sicilien.

intermedius Gussone (= *alopecuroides* Moris, *commutatus* β *nanus* Tenor.), mittlere, ⊙. f. Sardinien, Neapel.

madritensis L. (= *diandrus* Curt., Sm. = *scaberrimus* Tenore).

maximus Dsf. (= *madritensis* Gussone).

scoparius L. (= *contortus* Dsf.),

sterilis L. (= *jubatus* Tenore).

Digitized by Google

Bromus

B. Ceratochloa P. B.

arduennensis Kunth (= *auriculatus* Lej. = *platystachys* Dsf. = *Calotheca bromoidea* Dsf. = *Libertia arduennensis* Lej. = *Michelaria* bromoidea Dumort.).

C. Festucacei.

exaltatus Bunge, höchste, 4. f. k. Mexico.

Michelii Savi, v. Avellinia Michelii, *paeviflorus* Dsf. var. patul. [1]), *tenuis* Tineo (= *sabulosus* Gusson. = *Sardous* Spgl. = *Brachypod tenue* Tineo = *Festuca incrassata* Bertol. non Salzm.), v. Vulpia tenuis, *wolgensis* Spgl. var. squarros.

Broteroa Cav. (Brotera Auct.), (P. A. Brotero, portugiesischer Botaniker), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae (Geraniaceae Sterculiariae Rchb.).

ovata Cav. (= *Pentapetes ovata* DC., p. 605).

B. Contrayerva Spgl. (= *Sprengelli* Cass. = *trinervata* P., v. Flaveria repanda, p. 335, *B. corymbosa* W., v. Cardopatium corymbosum.

Broussonetia papyrifera Vent., *δ*) macrophylla Hort.

Browallia L. Browallie.

cordata G. Don (= *grandiflora* Lindl. nec Grah.), herzblätterige, ⊙. f. Peru.

Linnaeana Spgl. = demissa et elata.

Brownea Jacq., Brownea.

grandiceps Jacq., grofsköpfige, ♄. w. Caracas, Cumana.

erecta Hort. = ? Theophrasta pinnata Jacq.

Brucea Mill., L'Her., Brucea.

antidysenterica Mill. (= *ferruginea* L'Her.), ruhrstillende, ♄. w. Abyssinien.

guineensis G. Don, guineaische, ♄. w. Sierra Leone.

Bruchmansia erucaeformis Nutt., v. Beckmannia erucoeformis, p. 116.

Brugmansia P. ist nur als Section von Datura anzusehen, vergl. diese.

Brunfelsia Plum., L. Brunfelsie.

gracilis Hort. belg., schlanke, ♄. w. Südamerika.

Lockharti Hort. belg., Lockhart's, ♄. w. Südamerika.

Brunia L., Brunie.

candicans Hort. anglor., weifsliche, ♄. t. Cap d. g. H.

formosa D. Dietr., v. Berzelia formosa etc., *Levisanus* L., v. Leucadendron Levisanus, p. 458, *superba* Don (= *speciosa* Hort.), v. Berzelia superba, *tenuifolia* W. = alopecuroides.

Bryocles ventricosa Salisb., v. Funkia ovata, p. 340.

Bryonia T., Zaunrübe.

hederaefolia Jacq., epheublätterige, 4. Sch. k. Teneriffa.

? vitifolia Hort. belg., weinblätterige, 4. Sch. w. ?

grandis L. mant., v. Coscinia indica, *maderaspatana* Berg. = scabrella *quinqueloba* Thbg., v. Cephalandra quinqueloba, *triloba* Thbg., v. Cyrtonema triloba.

Bubon buchtormensis Fisch., v. Libanotis buchtormensis, *cuneifolius* Spgl., dichotomus Spgl. etc., v. Seseli cuneifolium, dichotomum etc., p. 749, *roseum* Hort. = ? *tortuosum* Dsf., v. Deverra tortuosa.

---

1) hordeaceus L., pratensis Ehrh. et racemosus L., werden neuerlich von Fries als verschiedene Arten angesehen.

Digitized by Google

Bucerosia Wight, Arn. (Boucerosia Auct.), Bucerosia, V. II., Asclepiadeae.

Decaisniana Lemaire, Decaisne's, ♄. w. Senegal.

umbellata Wight, Arn. (= *Caralluma umbellata* Haw., p. 159).

Buchanania oppositifolia Sm., v. Colebrockea oppositifolia, p. 211.

Bucheria* (Bucher, Verfasser eines Nomenclator botanicus florae Dresdensis), VIII. I., Myrtaceae.

saxicola* (= *Astraea saxicola* Schauer = *Baeckea saxicola* A. Cunningh., p. 110).

Buchholzia axillaris Mart., v. Alternanthera spinosa, s. axillaris, p. 40, *brachiata* Schrad. et *frutescens* Mart., v. Teleianthera brachiata et frutescens.

Buddlea (= Buddleja Auct.), Buddlea.

Lindleyana Hort., Angl., Lindl., ♄. k. f. b. ? Mittägl. Amerika.

salicifolia Jacq. (= *saligna* W.), v. Nuxia saligna. *Buechnera aethiopica* L. et foetida Andr., v. Chaenostoma aethiopicum et foetidum.

Buettneria Loeffl., L., Buettneria.

corylifolia W., H. B. K., haselnufsblätterige, ♄. w. Südamerika.

heterophylla Hook. (= *Heterophyllum ramosum* Bojer, = *Telfairia volubilis* Neum.), verschiedenblätterige, ♄. Sch. w. Madagascar.

ovata Lam. (= *Ayenia spinosa* H. Par.), eiförmige, ♄. w. Peru.

*corylifolia**, *hermanniaefolia* Gay et *pannosa* DC., v. Rulingia corylifolia, hermanniaefol. et pannosa.

Buginvillea Commers. (= Bougainvillea G. Don), Bougainvillea.

peruviana H. B. K. (= *brasiliensis* Neuwied = *spectabilis* W.), peruvianische, ♄. Sch. w. Peru.

rubicunda Schott, röthliche, ♄. Sch. w. Brasilien.

spectabilis Juss. (= *bracteata* P. = *brasiliensis* Räusch. = *Josepha augusta* Arrabida).

Buglossum Adans. B., *coeruleum* Presl (*amoenum* G.) etc., v. Anchusa paniculata etc., p. 53.

Bulbine W., Bulbine.

Fraseri Kunth (= *Anthericum bulbosum* Hook. excl. synon.), Fraser's, 4. Zw. t. k. Neuholland.

Hookeri Kunth (= *barbata* Hort. = *semibarbata* Schult. fil. = *Anthericum semibarbatum* Loddig), Hooker's, 4. t. k. Van Diemens Land.

macrophylla Salm Dyck, grofsblätterige, 4. t. k. ?

narcissifolia Salm Dyck, narcissenblätterige, 4. k. t. ?

semibarbata Haw. (= *floribunda* Schrad.).

brevifolia R. et S. et *triquetra* Spgl., R. et S., v. Bulbinella brevifolia et triquetra, *planifolia* R. et S., v. Simethis bicolor.

Bulbinella Kunth, Bulbinella, VI. I., Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae.

? brevifolia Kunth (= *Anthericum brevifolium* Thbg), kurzblätterige, 4. t. k. Cap der gut. Hoffn.

? filiformis Kunth (= *Anthericum filiforme* Ait. non Thbg., p. 63).

? squamea Kunth (= *Anthericum squameum* L., Suppl. p. 64).

Digitized by Google

Bulbinella
? triquetra Kunth (= *Anthericum triquetrum* L. suppl., p. 137), [1]).

Bulbocodium L., Lichtblume.
I. Merendera Ram., DC., p. 512.
caucasicum Endl. (= *trigynum* Adam = *Merend. caucasica* MB. = *Colchicum caucasicum* Spgl.).
Fontanesii* (= *vernum* Dsf. excl. Synon. = *Merend. filifolia* Cambessed.), Desfontaine's, 4. Zw. f. b. k. Majorka, Algier.
lusitanicum* (= *Merendera bulbocodioides* Steud. = *Colchicum bulbocodioides* Brotero), portugiesische, 4. Zw. f. b. k. Portugal.
montanum* (= *autumnale* Lapey. = *Merend. Bulbocodium* Ramond = *Colchicum montanum* L. spec., p. 210 excl. Synon.).
soboliferum (Fisch. et Mey.).
II. Eubulbocodium Endl.
ruthenicum Bunge, Fisch. et Mey., Ukraine, Caucasus.
vernum L.
versicolor Spgl. (= *Colchicum versicolor* Ker = *Amaryllis colchicifolia* H. Monspel).
alpinum Mill., v. Lloydia serotina, p. 470.

Bulbophyllum A. P. Th., (Bolbophyllum), Zwiebelblatt,
affine Lindl., ähnelndes, 4. w. Nepal.
angustifolium Lindl. (= *Diphyes angustifolia* Blume), schmalblätteriges, 4. w. Java.
Calamaria Lindl., rohrähnliches, 4. w. Sierra Leone.
fuscum Lindl., braunes, 4. w. Sierra Leone.
galeatum Lindl. (= *Dendrobium galeatum* Sw.), helmartiges, 4. w. Sierra Leone.
macranthum Lindl., grofsblumiges, 4. w. Sincapore.
odoratum Lindl. (= *Diphyes odorata* Blume), wohlriechendes, 4. w. Java.
pendulum A. P. Thouars (= *recurvum* Lk., Otto ? Lindl.), überhängendes, 4. w. Mascarenas, ? Senegambien.
pileatum Lindl., pilzhutähnliches, 4. w. Sincapore.
pumilum Lindl. (= *Dendrobium pumilum* Sw.), kleines, 4. w. Sierra Leone.
variegatum Pet. Thouars (= *nutans* Rich.), buntes, 4. w. Bourbon.
violaceum Lindl. (= *Diphyes violacea* Blume), violettes, 4. w. Nepal.
Carrenanum Spgl., v. Tribrachia purpurea, *longiflorum* Pet. Thouars., v. Cirrhopetalum Thouarsii.

Bulbostylis DC., v. Eupatorium II. p. 320.
Bulbostylis palustris Stev., v. Heleocharis palustris, p. 380.
Bumalda trifolia Thbg., v. Staphylea Bumalda.
Bumelia argentea R. et S., v. Heeria argentea, *nervosa* Vahl, v. Lucuma Rivicoa, *salicifolia* Sw., v. Dipholis salicifolia, *serrata* Pursh, v. Prunus caroliniana.

Bungea C. A. Mey., (Alex. v. Bunge, k. russ. Staatsrath, Prof. u. Director d. botan. Gartens zu Dorpat), XIV. 11., Personatae Rhinantheae.
trifida C. A. Mey. (= *Rhinanthus trifidus* Vahl = *Bartsia trifida* Spgl.). dreitheilige, ⊙. f. Caucasus.

[1]) Die hier verzeichneten Arten sind vom H Prof. etc. Kunth nur fraglich zu dieser Gattung gestellt worden.

Digitized by Google

Bunias L., Zackenschote.

cochlearioides Murray [1]), löffelkrautähnliche, ♂. f. Altaisch. Sibirien.

cristata Desv. = B. Erucago β aspera, *Cakile* L., v. Cakile maritima, p. 143, *orientalis* L. (= *perennis* Mch.), v. Laelia orientalis, *paniculata* L'Her., v. Neslia paniculata, *verrucosa* Mch. (= *raphanifolia* Sm.), v. Rapistrum orientale, p. 679, vulgaris Andrz. = Erucago.

Bunium L., Erdknoten.

alpinum W. K. (= *Ligusticum alpinum* Spgl., p. 462 = *Wallrothia tuberosa* Spgl.).

β) petraeum Tenore (= ? *saxatile* Mill. = *Wallrothia divaricata* Presl).

carvifolium DC. (= *Sison carvifolium* Bertol. = *flexuosum* Tenor. 761 = *Sison prolifer* Brochi), karbenblätteriger, ♂. 4. f. Italien.

ferulaefolium Dsf. (= *Sison ferulaefolium* Spgl., p. 763).

flexuosum Wither., Sm. (= *Bulbocastanum* Huds. = *majus* Gouan = *denudatum* DC. = *Conopodium denudatum* K., p. 240).

β) pyrenaeum Lois. (= *pilosum* W.), γ) ammoides Lk.

peucedanoides MB. (= *Sium peucedanoides* Spgl., p. 763 = *Peucedanum carvifolia* MB. = *Silaus carvifolius* C. A. Mey.).

virescens DC. (= *Sium virescens* Spgl. = *S. Cordienii* Loisel. = *Gasparrinia virescens* Bertol. = *Peucedanum alpestre* Stev. = *Peucedanum tauricum* H. Par.), grünlicher, 4. f. Burgund, ? Caucasus.

acaule MB., v. Chamaesciadium acaule, *ammoides* Cesati non Lk. = ? *Carvi* MB. et *divaricatum* Cesati = Carum Carvi et divaricatum, p. 167, *Falcaria* MB. = Falcaria Rivini, p. 329, *rigens* Spgl., v. Trachyspermum rigens, p. 814.

Buphane Herb. (*Boophane*) ciliaris Herb. etc., v. Brunsvigia ciliaris etc., p. 135.

Buphthalmum L., Rindsauge.

I. Asteriscus Mch., DC.

imbricatum Cav. (A. imbricatus DC.), (= *B. elegans* Brouss. (= *chrysanthemoides* Poir.).

maritimum L. (A. maritimus DC.), (= *Nauplius maritimus* Cass.), β) sessile Mill.

II. Bupthalm. genuin.

sagittatum Pursh, pfeilförmiges, 4. f. Nordamerika.

lanceolatum Hort. = ?

III. Pallenis Cass.

spinosum L. (Pallenis spinosa Cass.), (= *B. aureum* Salzm. = *asteroideum* Vivian.).

arborescens L., *frutescens* L. (= *incanum* Mill.) etc., v. Borrichia arborescens etc., *asperum* Hornem., v. Wedelia hispida, p. 856, *heterophyllum* W., v. Acmella brasiliensis, p. 12, *laevigatum* Brouss. (= *coriaceum* Hort.), v. Jasonia laevigata, *silphioides* Hornem., v. Heliopsis scabra, p. 387.

Bupleurum T., Hasenöhrchen.

affine Rchb., ähnelndes, ⊙. f. Ungarn.

---

1) Calepina Corvini Desv., p. 147, ist nach C. A. Meyer davon verschieden.

Digitized by Google

Bupleurum
chinense DC., chinesisches, ⊙. f. China.
gracile MB. (= *Marschallianum* C. A. Mey. (= *Odontites gracilis* M. B.), schlankes, ⊙. f. Taurien.
junceum L. (= *badium* Rochel = *baldense* W. K. = *Gerardi* Sibth., Sm.), ⊙. ♂. Süd- und Osteuropa.
trifidum Tenor., dreispaltiges, 4. f. Calabrien.
amplexicaule Clairv. = pyrenaicum, *apiculatum* Friwalds. (= *cuspidatum* Rchb.) = aristatum, *arborescens* Jacq. (= *gibraltaricum* Lam. = *obliquum* Vahl = *verticale* Ortega) = coriaceum, *diversifolium* Rochel (= *heterophyllum* Roch.) = ranunculoides β caricifolium, *denticulatum* Bellard. = graminifolium, *Fontanesii* Guss. = Odontites, *fruticans* Thbg. = difforme, *Gerardi* fl. Wett. (= *Pollichii* Gmel.) = tenuissimum, *lancifolium* Hornem. (= *panacifolium* Hornem.) = ? heterophyllum, *marsoticum* Del. (= *minimum* Clarke) = nodiflorum, *mucronatum* W. = frutescens, *obtusifolium* Tenore = cernuum, *trifoliatum* Wendl. = Heteromorpha trifoliata.

Burchardia RBr., Burkhardie.
congesta Lindl., gedrängte, 4. t. Neuholland.

Burchellia RBr., Burchellie.
major Hort. (? = *speciosa* Hort.), grofse, ♄. t. ? Cap der guten Hoffnung.
Burglaria lucida Wendl., v. Ilex salicifolia, p. 414.
Burgsdorfia romana Hffg. Lk. (= *rigida* Mch.), v. Sideritis romana, p. 754.

Burkea Hook., (Joseph Burke ward vom Grafen Derby in das Innere Südafrikas geschickt, um Thiere und Pflanzen zu sammeln), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
africana Hook., afrikanische, ♄. w. Südafrika [1]).

Burlingtonia Lindl., Burlingtonie.
maculata Lindl., gefleckte, 4. w. Brasilien.
rigida Lindl., starre, 4. w. Brasilien.
venusta Lindl., liebliche, 4. w. Brasilien.

Burmannia L., Burmannie.
alba Mart. (= *Tripterella alba* Schult.), weifse, 4. w. Brasilien.
bicolor Mart. (= *Tripterella bicolor* Schult.), zweifarbige, 4. w. Brasilien.
dasyantha Mart. (= *Tripterella dasyantha* Schult.), wollblumige, ⊙. f. Brasilien.
(Ob kultivirt?)
Burrielia chrysostoma Torr. et Gr., v. Baeria chrysostoma, p. 109.

Bursaria Cav., Beutelblume.
procumbens Putterl. (= *Pittosporum procumbens* Hook.), niederliegende, ♄. k. t. Van Diemens Land.
Bursera paniculata Lam., v. Canarium commune.

Burtonia RBr., Burtonie.
bruniades Hort. angl., bruniaähnliche, ♄. t. Neuholland.
solanacea Hort. angl., Page, nachtschattenähnliche, ♄. t. Neuholland.
violacea Hort. = ? conferta.
Burtonia grossulariaefolia Salisb., v. Hibbertia grossulariaefolia, p. 395.

1) Wird im Kew-Garten kultivirt.

Digitized by Google

Buxus sempervirens L., α) arborescens Mill., d) olivaeformis H. Vindob.

B. sempervirens gigantea Duham. = balearica.

Byrsonima Rich., Byrsonima.

Clausseniana Hort. belg., Claussen's, ♄. w. Südamerika. *Bystropogon coarctatus* Schum. (= *pectinatus* L'Her.), *sidaefolius* L'Her., *suaveolens* L'Her. (= *graveolens* Blum.), v. Hyptis pectinata, polyanthos et suaveolens, p. 412, *marifolius* Juss, v. Micromeria marifolia (= *Calamintha fruticosa* P., *marifolia* P., p. 144).

Cacalia L., Cacalie (Pestwurz).

flexuosa Wall. (= *Eupatorium flexuosum* Lam. = *Senecio flexuosus* Less.), gebogene, 4. w. Mauritius.

gigantea Jacq. fil., riesenhafte, 4. f. Nordamerika, (Neu-Orleans).

suaveolens L. (= *Senecio suaveolens* Ell. = *Synosma suaveolens* Rafin.), b) foliis variegatis.

Die übrigen s. die Gattungen Adenostylis, Emilia, Kleinia, Psacalium, vergl. p. 871.

Cachrys T., Nufsdolde.

crispa P. (= *nudicaulis* Godet, = *longiloba* DC. = *Hippomarathrum crispum* K.), krause, 4. f. b. Palästina, Ost-Caucasus.

hirta Bertol., rauhhaarige, 4. f. ? Italien.

pungens Jan. (= *sicula* Guss., Tenore), stechende, 4. f. b. Calabrien, Sicilien.

sicula L. (= *pterochlaena* DC.), sicilianische, 4. f. b. Spanien, Sicilien, Griechenland.

alata MB., v. Prangos foeniculacea, *athamantoides* MB. etc., v. Rumia athamantoides etc., *callosperma* Pall. = odontalgica, *decursiva* Hornem. (= *latifolia* M. B.), v. Agasyllis caucasica, *dichotoma* Spgl. (= *peregrina* Spgl.), v. Ulospermum dichotomum Lk., p. 830, *hungarica* Mill., *tomentosa* Dsf. (= *panacifolia* Vahl), v. Magydaris panacina et tomentosa, *lanata* Hort., v. Athamanta panacifolia, p. 104, *triquetra* Spgl., v. Colladonia triquetra.

Cacteae [1]).

§. 1. Cacteae tubulosae Miq., Endl.

I. Mammillaria Haw.

1. Homoeacanthae Pfeiff.

* Tenues ramosae.

echinata DC. (= *echinaria* DC.), β densa Lk. et Otto (= *caespitosa* Hort.). Mexico.

---

1) Bei den Cacteen hielt ich es für nothwendig von der alphabetischen Ordnung abzugehen, da selbige ohnedem in den meisten Pflanzen-Catalogen in wissenschaftlicher Reihe (wie ich schon p. 872 bemerkte), aufgeführt werden, eine alphabetische Einreihung und Nachweisung der fehlenden und neuen Arten zu p. 182, p. 278 etc., so wie p. 872 nicht gut möglich war, indem dadurch die wissenschaftliche Uebersicht der etwa bis jetzt bekannten Gattungen, Arten und Abarten dieser Familie, welche hier nach Walper's Repertorium botan. folgt, und mehrern Cactussammlern willkommen sein wird, nicht erreicht werden konnte.

Das Werk: Cacteae in horto Dyckensi anno 1844 additis, tribuum, generumque charact. emendatis etc., a Principe Jos. de Salm Dyck, Paris 1845, habe ich dazu leider nicht benutzen können.

Digitized by Google

Cacteae

elongata DC. Mexico.
tenuis DC. Mexico.
subcrocea DC. Mexico.
intertexta DC. Mexico.
sphacelata Mart. Mexico.

** Conothelae.

polythele Mart. Mexico.
quadrispina Mart. Mexico.
columnaris Mart. Mexico.
parvimamma Haw. (= *microthele* Spgl. = *Cactus prolifer* W. = *M. prolifera* Hort.). Westindien.
simplex Haw. (= *C. mammillaris* L.). Westindien, Südamerika, Missouri.
flavescens DC. (= *straminea* Haw.). Südamerika.
prolifera Haw. (= *C. mammillaris prolifer* Ait. = *M. Parmentieri* H. Angl.). Südamerika.
nivosa Lk. (= *tortolensis* H. Berol.). Insel Tortola.
irregularis DC. Mexico.
Wegenerii C. Ehrenb. Mexico.

*** Brachythelae.

affinis DC. (= *cataphracta* Mart.). Mexico.
angularis H. Berol. (= *compressa* DC.). Mexico.
triacantha DC. Mexico.
divergens DC. Mexico.
cirrhifera Mart. Mexico.
subangularis DC. (= *cirrhifera spinis fuscis* H. Monac.). Mexico.
loricata Mart. (= *heteracantha* H. Berol.). Mexico.
radians DC. (= *impexicoma* Lem.), *β*) globosa Scheidw. Mexico.
gladiata Mart. Mexico.
magnimamma Haw. (= *ceratophora* Lehm. = *Schiedeana* Hort.). Mexico.
recurva Lehm. (= *Lehmanni* Hort.). Mexico.
exsudans Zucc. (= *curvata* H. Berol.). Mexico.
pycnacantha Mart. Mexico.
latimamma DC. Mexico.
acanthostephis Lehm. Mexico.

**** Polyëdrae.

polyedra Mart. Mexico.
subpolyedra S. Dyck (= *polygona* Zucc. = *anisacantha*, = *xalapensis* Hort.). Mexico.
Seitziana Mart. Mexico.
tetracantha Salm Dyck. Mexico.
villifera Otto (= *Mystax* Hort.), Mexico.
carnea Zucc. Mexico.
Karwinskiana Mart. Mexico.
centrispina Pfeiff. Mexico.
Zuccariniana Mart. (= *macracantha* DC.). Mexico.
Fischeri Pfeiff. Mexico.
Hystrix Mart. Mexico.
Mystax Mart. Mexico.
Caput medusae Otto (= *M. Sempervivi* DC.). Mexico.
disciformis DC. Mexico.
longimamma DC., *β*) hexacentra Berg in Otto et D. GZtg. Mexico.
uberiformis Zucc. Mexico.

Digitized by Google

Cacteae

Lehmannni H. Berol. (= *octacantha* et *leucacantha* DC.). Mexico.
macrothele Mart. Mexico.
Plaschnickii Otto. Mexico.

§. 2. Heteracanthae.

* Microthelae.

crucigera Mart. Mexico.
supertexta Mart. Mexico. β) mammillis longioribus Scheidw. Mexico.
elegans DC. (= *intertexta* Hort.). Mexico. β) minor DC., γ) globosa Hort.
Haageana Pfeiff. (= *diacantha nigra* Haage). Mexico.
acanthophlegma Lehm. (= *geminispina* DC.). Mexico.
Dyckiana Zucc. et Pfeiff. Mexico.
bicolor Lehm. (= *geminispina* Haw.). Mexico.
nivea Wendl. (= *Toaldoae* Lehm.). Mexico.

** Conothelae.

discolor Haw. (= *depressa* DC. = *Cactus Spinii* Colla = *M. pulchella* H. Berol, = *M. canescens* Hort.). Mexico, Südamerika.
β) prolifera (= *C. pseudomammillaris* S. Dyck).
albida Haage (= *confinis* Haage). Mexico.
chrysacantha Otto. Mexico.
fuscata H. Berol. Mexico.
rutila Zucc., β) octospina Scheidw. Mexico.
aciculata Otto. Mexico.
tentaculata Otto (= *pulchra* Haw.). Mexico.
fulvispina Haw. Brasilia, Mexico.
hexacantha S. Dyck. Mexico.
setosa Pfeiff. Mexico.
rhodantha Lk. et Otto (= *atrata* = *aurata* = *hybrida* Hort.). Mexico. β) prolifera, γ) Andreae Otto (= *inuncta* Hffg.), δ) Wendlandii (= *erinacea* Wendl.), ε) neglecta H. Berol., ζ) rubens (= *pyramidalis* H. Berol.).
eriacantha Otto (=*cylindrica* = *eriantha* Hort.). Mexico.
cylindracea DC. Mexico.
vetula Mart. Mexico.
vivipara Haw. (= *Cact. viviparus* Nutt.). Louisiana, Missouri.

*** Brachythelae.

grandiflora Otto (= *canescens* H. Berol.). Mexico.
coronaria Haw. (= *Cactus coronatus* W. E. Suppl. = *C. cylindricus* Otto). Mexico, Guatimala.
hamata Lehm. Mexico.
cornifera DC. (= *daimonoceras* Lem.). Mexico.
uncinata Zucc. Mexico.
brevimamma Zucc. Mexico.
conoidea DC. Mexico.
crebispina DC. Mexico.
caespiticia DC. Mexico.

**** Stylothelae.

pusilla DC. (= *Cact. pusillus* DC. Catal. = *stellatus* Lodd. = *C. stellaris* L. = *Mamm. stellaris* Hort.), β) major. Westindien.
glochidiata Mart. (= *ancistroides* Lehm. = *crinifomis* DC.). Mexico. β) purpurea Scheidw., γ) sericata Lem.

Digitized by Google

Cacteae

Wildiana Otto (= *glochidiata* var. *aurea* Hort.). Mexico.
crinita DC. Mexico.

***** Gibbosae ?

? gibbosa Salm Dyck. (= ? *Echinocatus exsculptus* Otto).

§. 3. Nicht hinlänglich bekannte Arten.

conica Haw. ?
lanifera Haw. (= *C. canescens* Flor. mex. ined.). Mexico.
Helicteris DC. (= *C. Helicteres* Moçino). Mexico.
glomerata DC. (= *C. glomeratus* Lam.). Domingo.
nuda DC. (= *C. nudus* Flor. mex. ined.). Mexico.
mitis Mill., species indescripta.

Species addendae.

I. Aculeis centralibus nullis.

α) globosae.

subtetragona A. Dietr. Mexico.
Bergii Miq. (= *Seitziana* Miq. nec Mart.). Mexico.
sulco-lanata Lem. (= *retusa* Scheidw.). ?
microceras Lem. Mexico.
Webbiana Lem. Mexico.
retusa H. Belg. Mexico.
Ehrenbergii Pfeiff. Mexico.
stella aurata Mart. (= *tenuis* var. β Pfeiff.). Mexico.
elephantidens Lem. ?

β) cylindraceae.

pallescens Scheidw. Mexico.
stenocephala Scheidw. Mexico.
virens Scheidw. Mexico.
sericata Lem. Mexico.
Humboldtii Ehrbg. Mexico.
Schlechtendalii Ehrbg. Mexico.
micracantha Miq. ?
atrata H. Mack, ex Hook. Bot. mag. Chili.
floribunda Hook. Bot. mag. Chili.
thelocamptos Lehm. Mexico.

II. Aculeis centralibus heteromorphis.

§. 1. Mammillis sulcatis.

α) globosae.

Ottonis Pfeiff. Mexic.
scolymoides Scheidw. Mexico.
phymatothele Berg, in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.

β) pyramidato-cylindraceae.

rhaphidacantha Lem. Cact. nov. gen. et spec. ?
ancistracantha Lem. ?
clava Pfeiff. Mexico.

§. 2. Mammillis ovatis v. cylindraceis.

α) globosae.

Fennelii Hopfer in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.
Schelhasii Pfeiff. Mexico.
sphaerotricha Lem. ?
ancistroides Lem. ?
ancistria Lem. ?
phaeacantha Lem. Mexico.
Oothele Lem. (= ? *echinops* ? *roseu*). ?
ovimamma Lem. ?

Digitized by Google

β) pyramidatae v. cylindricae.

clavata Scheidw. Mexico.
decipiens Scheidw. Mexico.
candida Scheidw. Mexico.
zephyranthoides Scheidw. Mexico.
nitida Scheidw. Mexico.
leucocentra Berg, in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.
polycentra Berg l. c. Mexico.
crassispina Pfeiff. Mexico.

§. 3. Mammillis pyramidato-polyedris.

α) globosae.

centricirrha Lem., β) macrothele ?
Neumanniana Lem. ?
deflexispina Lem. Mexico.
crocidata Lem. Mexico.
bihamata Pfeiff. Mexico.
Funkii Scheidw. Mexico.
mutabilis Scheidw. Mexico.
pentacantha Pfeiff. Mexico.
xanthotricha Scheidw. ? β) aculeis axillaribus robustioribus.
aeruginosa Scheidw. ?
Ludwigii Ehbg., β) clavata. Mexico.

β) pyramidatae v. cylindraceae.

versicolor Scheidw. Mexico.
conopsea Scheidw. Mexico. β) longispina Scheidw.
formosa Galeotti. Mexico.
pyrrhocephala Scheidw. Mexico.
geminata Scheidw. Mexico.
leucotricha Scheidw. ?
echinocactoides Pfeiff. Mexico.
Parkinsonii C. Ehbg. Mexico.

§. 4. Mammillis conicis.

α) globosae.

dolichocentra Lem. Mexico.
aureiceps Lem. Mexico.
pyrrhochracantha Lem. ?
rhodocentra Lem. ?
scepontocentra Lem. (= *sulcolanata* var. ?) ?
acicularis Lem. ?
ruficeps Lem. ?
Guilleminiana Lem. ?
Odieriana Lem. Mexico.
longispina Rchb. Suppl. zu Terscheck's Cact. (= *Galeotti* Otto mss.). Mexico.
minima Terscheck Suppl. ? stellata var. Mexico.
Seidelii Tersch. Mexico.
recurvispina Vriese. Mexico.

β) pyramidatae vel cylindraceae.

Celsiana Lem. ?
depressa Scheidw. Mexico.
inconspicua Scheidw. (= *M. conoidea* DC. = *diphacanthacantha* Lem.). Mexico.
stipitata Scheidw. Mexico.
ceratocentra Berg in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.
coronata Scheidw. ?
erecta Lem. Mexico.

Digitized by Google

Cacteae

spinosissima Lem. ?
aulacothele Lem. Mexico. β) sulcimamma Pfeiff. (= *aulac.* var. *multispina* Scheidw.). Mexico.
biglandulosa Pfeiff. Mexico.
gracilis Pfeiff. Mexico.
nobilis Pfeiff. Mexico.
Pfeifferiana Vriese. Mexico. α) fulvispina Scheidw., β) dichotoma Scheidw., γ) altissima Scheidw., δ) flaviceps Scheidw., ε) variabilis Scheidw.
speciosa Vriese. Mexico.
tecta Miquel ?
Martiana Pfeiff. ?
turbinata Hook. Bot. mag. t. 3984.

Nicht hinlänglich bekannt:

[d. h. deren Stellung unter die Abtheilungen (Gruppen) noch nicht genau ermittelt worden.]

imbricata Wegener. Mexico.
Zesschwitzii Terscheck Suppl. (= *monoacantha* ?). ?
obconella Scheidw. Bonaria.
incurva Scheidw. Mexico.
polytricha S. Dyck, α) hexacantha, β) tetracantha. ?
Scheidweileriana Otto (= *glochidiata* var. *purpurea* Scheidw. = *gloch.* var. *sericata* Lem.)
Hoffmannseggiana Hffmsg. Nachtrag zu d. Verz. VI. 33—35 (= *inuncta* Hffmsg. [1]).

II. Melocactus DC.

goniodacanthus Lem. ?
violaceus Pfeiff. (= *Parthoni* Hort.). Brasilia.
depressus Hook. Bot. mag. Brasilia.
Besleri Lk. et Otto excl. Syn. Lehm. Brasilia.
Monvillianus Miquel. ?
curvispinus Pfeiff. Mexico.
obtusipetalus Lem., β) crassicostatus Lem. Santa Fe de Bogota.
Hystrix Parment. ?
communis DC. (= *Cact. Melocact.* L.), β) macrocephalus Lk. et Otto, St. Domingo, St. Thomas. γ) oblongus Pfeiff., St. Domingo. δ) laniferus Pfeiff. Westind. ε) Grengelii H., Dresd. ζ) conicus Pfeiff. ?
havannensis Miquel (= *M. communis* var. *havannensis* Pfeiff.). Havanna.
amoenus Hffmg. (= *M. communis* var. *Jördensii* Otto = *rubens* Hort.). Columbia.
rubens Pfeiff. Westindien.
Wendlandii Miquel (= *Cact. Melocactus* Wendl. = *Meloc. cummunis* var. *viridis* Otto).
dichroacanthus Miquel. Insel St. Thomas.
Brogniartii Lem. ?
Miquelii Lehm. Insel St. Crucis.
meonacanthus Lk. et Otto. Jamaica.
spatangus Pfeiff. Curaçao.
Lehmanni Miquel. Curaçao.

---

1) Es mögen allerdings, wie dieſs auch bei den folgenden Gattungen der Fall sein mag, manche Arten doppelt, d h. unter verschiedenen Namen eine und dieselbe Art (vielleicht im jüngern Zustande beobachtet) vorkommen, was fernern Beobachtungen zur Berichtigung überlassen bleibt.

Digitized by Google

Cacteae

microcephalus Miquel. Curaçao, Brasilien.
Salmianus Otto mss. in Salm Dyck hort. (= *Echinocactus Salmianus* Lk. et Otto). Curaçao.
atrosanguineus Pfeiff., Insel St. Thomas.
pyramidalis S. Dyck, β) carneus Miquel. ?
Zuccarinii Miquel. Curaçao.
xanthacanthus Miq. (= *Echinoc. xanth.* Miq.). St. Thomas.
macracanthus S. Dyck. St. Domingo, Curaçao.
macracanthoides Miquel. St. Thomas.
caesius H. L. Wendl. mss., apud Miquel, Columbia.
griseus H. L. Wendl. l. c. Columbia.
pentacentrus Lem. Brasilien.
Lemairii Miquel. St. Domingo.
Oreas Miquel. Bahia.
crassispinus S. Dyck (= *Echinocact. Lemairii* Monv. ex Lem. Cact.). ?

Species vix-nota.

Leucaster Hffmsg. (= *communis* var. *spinis breviorib. albis*). ?

III. Anhalonium prismaticum Lem. (= *Ariocarpus retusus* Scheidw.). St. Louis, Potosi.

IV. Echinocactus Lk. et Otto.

§. 1. Costati.

* costis rotundis.

Ottonis Lehm. (= *Cereus Otto.* Lehm.). Mexico. β) tenuispinus Lk. et Otto. Brasilien.
Linkii Lehm. Mexico.
tortuosus Lk. et Otto (= *muricatus* Hort.). Brasilien.
muricatus Otto. Brasilien.
formosus Pfeiff. (= *Meloc. Gilliesii* Hort.). Mendoza.
rhodacanthus S. Dyck (= *coccineus* H. Berol.). Mendoza.
Karwinskii Zucc. Mexico.
Ceratistes Otto (an Meloc spec. ?). Chili.
acicularis Salm Dyck. Brasilien.
gladiatus Lk. et Otto. Mexico.

** costis obtuse angulatis.

Langsdorfii Lehm. (= *Meloc. Langsd.* DC.). Brasil.
polyacanthus Lk. et Otto (= *Cact. erinaceus* Haw.). Brasilien.
parvispinus (= *Cact. parvisp.* Haw.), DC. Südamerika, Westindien.
tephracanthus Lk. et Otto. Brasilien.
intricatus Lk. et Otto. Montevideo.
orthocanthus Lk et Otto. Montevideo.
oligacanthus Mart. Mexico.
ingens Zuccar. Mexico.
pruinosus Otto (= *Cereus roridus* H. Berol.). Mexico.

*** costis acuatis.

acuatus Lk. et Otto. Montevideo.
corynodes Otto (= *acutangulus* Zucc. = *rosaceus* et *Sellowianus* Hort.). Montevideo, Mexico.
Sellowianus Lk et Otto. Montevideo.
sessiliflorus Pfeiff. ?
cornigerus DC. (= *Cact. latispinus* Haw. = *Melocact. latispin.* Hort.). Mexico, Guatimala.
recurvus Lk. et Otto (= *Cact. recurv.* Haw. = *C. no-*

Digitized by Google

Cacteae

bilis W. Ait. = *Cact. multangularis* Voigt = *Echinocactus glaucus* Karw.). Peru, Mexico.
Echidne DC. Mexico.
oxypterus Zucc. (= *Hystrix* DC.). Mexico.
glaucescens DC. Mexico.
Pfeifferi Zucc. Mexico.
platyacanthus Lk. et Otto. Mexico.
macrodiscus Mart. Mexico.
Spina christi Zucc. (= *Fischerii* H. Berol.). Mexico.
tuberculatus Lk. et Otto. Mexico.
spiralis Karw. (= *robustus* Karw. = *agglomeratus* Hort.). Mexico.
robustus Otto (= *spectabilis* = *subuliferus* Hort.), β) prolifer (= *agglomeratus* Karw.), γ) monstrosus. Mexico.
armatus Salm Dyck. ?
ornatus DC. Mexico.

**** Costis compressissimis, crispatis.

crispatus DC., β) horridus DC. Mexico, Guatimala.
dichroacanthus Mart. Mexico.
anfractuosus Mart. Mexico.
obvallatus DC. Mexico.
phyllacanthus Mart. Mexico. β) spinis foliaceis tribus Scheidw., γ) spina foliacea unica Scheidw. Mexico. (beide var.)

§. 2. Tuberculati.

Scopa Lk. et Otto (= *Cereus* S. DC.), β) candidus. Brasilien.
acutissimus Otto et Dietr. Chili.
exsculptus Otto (= *subgibbosus* Haw. = *Acanthion* et *interruptus* H. Berol. = *Cer. montevidensis* Hort.). Chili, Montevideo, Mexico.
hypocentrus Lehm. Brasilien.
centeterius Lehm., Hook. Bot. mag. t. 3972. Brasil.
pachycentrus Lehm. Brasilien.
leucacanthus Zuccar. Mexico.
subuliferus Lk. et Otto. Mexico.

Species parum notae.

intortus DC., (*Cactus* Mill. Dict.). Antigua. β) purpureus Plum. (= *Cactus nobilis* Lam.). St. Domingo.
depressus DC., (*Cact.* Haw.). Südamerika.
melocactiformis DC. Mexico.
? aureus Meyen (Cact. aur. Meyen). Peru.
? cereiformis DC. An Cereus quidam junior? Mexico.

Species addendae.

Sect. I. Macrogoni Lehm.

Angulis validis.

melocactoides Lem. ?
curvicornis Miquel. ?
Terscheckii Rchb. Montevideo.
Vanderaeyi Lem. Mexico.
electracanthus Lem. ?
dolichacanthus Lem. Mexico.
helophorus Lem. ?
aulacogonus Lem., β) diacopaulax. ?
pycnoxiphos Lem. ?

Digitized by Google

Cacteae

hyctrichacanthus Lem. ?
horizonthalonius Lem. ?
Cumingii Hopffer, in Otto et Dtr. GZtg. Peru.

Sect. II. Crateranthi Lem.

Floribus in craterem explicatis.

sessiliflorus H. Mack. et Hook. Bot. mag. t. 3569.
mammillarioides Hook. Bot. mag. Chili.
mammillifer Miquel. ?
araneolarius Rchb., in Tersch. Suppl. Montevideo.
Jenischianus Pfeiff. Südamerika.
erinaceus Lem. Montevideo.
Courantii Lem. ?
submammulosus Lem. ?
tetracanthus Lem. Montevideo.
hypocrateriformis Otto et Dietr. Montevideo.
acanthoides Lem. ?

Sect. III. Stenogoni Lem.

Angulis compressis.

arrigens Lk. mss. Mexico.
campulacanthus Scheidw. ?
stellatus Scheidw. ?
debilispinus Berg, in Otto et Dietr. GZtg. Mexico.
hystrichocentrus Berg, l. c. Mexico.
flavovirens Scheidw. Mexico.
solenacanthus Scheidw. Mexico.
corynacanthus Scheidw. Mexico.
Galeottii Scheidw. Mexico.
tortus Scheidw. (= *ornatus* DC. = *holopterus* Miq. = *Mirbelii* Lem.). Mexico.
Forbesii F. A. Lehm., in Tersch. Suppl. ?
lancifer Rchb., in Tersch. Suppl. var. oxypteri? Mexico.
Reichenbachii Terscheck. Mexico.
macracanthus Vriese. Mexico.
phyllacanthoides Lem. ?
grandicornis Lem. Mexico.
tetracentrus Lem. Mexico.
pentacanthus Lem. Mexico.
ensiferus Lem. Mexico.
xiphacanthus Miq. ?
irroratus Scheidw. Mexico.
Dietrichii* (*lancifer* A. Dtr. = *obvallatus* Pf.). Mexico.
Melmsianas Wegener. Mexico.
spinosus Wegener. Mexico.
quadrinatus Wegener. Mexico.

Sect. IV. Phymatogoni Lem.

Costis tuberculatis.

pectinatus Scheidw. (= *pectiniferus* Lem.). Mexico.
Mackieanus Hook. Bot, mag. Chili.
scelothrix Lehm. Mexico.
fossulatus Scheidw. Mexico.
Ehrenbergii Pfeiff. (= *porrectus* Lem. = *subporrectus* Lem.). Mexico.
turbiniformis Pfeiff. (= *Mammillaria turbinata* Hook. Bot. mag. t. 3984). Mexico.
Monvilli Lem. Paraguai.
pumilus Lem. ?
? hyptiacanthus Lem. ?

Digitized by Google

Cacteae

thrincogonus Lem., β) elatior. ?
gracillimus Lem. ?
pectiniferus Lem., β) laevior. ?
hexaedrophorus Lem., Iconogr. d. Cactées. Mexico.
equitans Scheidw. Mexico.
insculptus Scheidw. Mexico.
hexaedrus Scheidw. Mexico.
arachnoideus Scheidw. Mexico.

---

gilvus Dietr. Mexico.
macracanthus de Vriese. ?
sulphureus Dietr. Mexico.
concinnus Lem. ?

V. Discocactus Pfeiff.

insignis Pfeiff. Westindien.
Lehmanni Pfeiff. (= *Cact. placentiformis* Lehm.). ?
Linkii Pfeiff. (= *Melocactus Besleri* Otto). ?

VI. Astrophytum Lem. nov. Cact. gen. et spec. 3 et 105.

A. Myriostigma Lem. ?

VII. Echinopsis Zucc.

I. Macracanthae.

multiplex Pfeiff. et Otto (= *Cereus m.* Pfeiff. Enumer. = *Echinoc. multiplex* H. Berol. = *sulcatus* Hort. = *Echinonyctanthus multiplex* Lem.). Brasil.
Zuccarinii Pfeiff. (= *Cereus tubiflorus* Pfeiff. = *Echinocactus tubiflorus* Hort. = *Echinonyct. tub.* Lem.).
nigrispina Walp. (= *Echinonyct. nigrisp.* Lem.).
leucantha Walp., Lindl. Bot. reg. XIII. t. 13 (= *Cereus leuc.* Pfeiff. = *Echinonyct. leuc.* Lem. = *Echinoc. leucanthus* Gill. = *Melocactus ambiguus, elegans* Hort. = *Cereus incurvispinus* H. Darmst.). Chili.

II. Micracanthae.

Decaisniana Walp. (= *Ehinonyct. D.* Lem.). ?
turbinata Pfeiff. (= *Cereus t.* Pfeiff. = *Echinonyct. t.* Lem.). ?
picta Walp. (= *Echinonycth. pictus* Lem.). ?
Eyriesii Pfeiff. et Otto (= *Echinocactus* Turp. = *Cereus Eyriesii* Otto = *Echinonyctanthus* Lem.). Bonaria.
Schelhasii Pfeiff. et Otto (= *Echinonyctanthus* S. Lem. = *Cereus S.* Pfeiff. = *Echinoc. Boutillieri* Parm.). ?
oxygona Pfeiff. et Otto (= *Cereus* Lem. et Otto = *Echinocactus* Lk. = *Echinonyctanthus* Lem.). Brasil.
campylacantha Pfeiff. et Otto (= *Cereus leucanthus* Pfeiff. = *Echinocat. leuc.* Gill. = *Melocact. ambiguus, elegans* Hort.[1]). Chili.

VIII. Cereus Haw.

Sect. I. Cephalophorus Miq.

senilis DC. (= *bradypus* Lehm. = *Pilocereus senilis* Lem.). Mexico, Guatimala, Brasilien.
Columna Trajani Karw. (= *Pilocereus C. T.* Lem.). Mexico.

---

1) Schon bei Echinopsis leucantha citirt; auch ein Cereus curvispinus H. Darmst. wird wiederum dazu citirt.

Digitized by Google

Sect. II. Eucereus Miq.

§. 1. Globosi.

denudatus Otto (= *Echinocact. denud.* Lk. et Otto). Brasilien.

pulchellus Pfeiff. (= *E. pulch.* Mart.). Mexico.

gibbosus Salm Dyck (= *Cactus* Haw. = *Echin. gibbosus* DC.). Jamaica.

§. 2. Cereastri.

a) robusti.

reductus DC. (= *Cact. red.* Lk. = *nobilis* Haw.). Mexico, Guatimala.

dichroacanthus Mart. Mexico.

polylophus DC. (= *Cer. Columna Trajani* Karw ?). Mexico.

foveolatus Haage mss. ex Pfeiff. ?

multangularis Haw. suppl. (= *Kageneckii* Gmel. hort. Carls.), β) pallidior (= *multangularis spinis albis* = *ochracanthus* Hort.). Südamerika.

strigosus Salm Dyck (? = *myriophyllus* Gill. ?) Chili.

Lecchii Colla Hort. Ripul. (= *lanuginosus aureus* H. Medion.). ?

lanatus DC. Quito.

magnus Haw. (= *E. Eyriesii* ?). St. Domingo.

b) tenues.

parvisetus Otto. Brasilien.

flavescens Otto. ?

micracanthus DC. Mexico.

lanuginosus Haw. (L.) (= *repandus* Mill., β) glaucescens (= *C. Royeni* H. Goetting.).

Royeni Haw. (L.) (= *lanuginosus* Mill. = *gloriosus* Hort.). Caribäen, Antillen.

floccosus Otto. St. Thomas.

armatus Otto. St. Thomas.

Curtisii Otto (= *Royeni* Bot. mag. = *Cer. octogonus* H. Anglor.). Granada.

fulvispinus Haw. (= *Royeni* Mill. Dict.).

flavispinus Salm Dyck. Südamerika.

Haworthii DC. (Spgl.) (= *nobilis* Haw.). Caribäen.

strictus DC. (W. E.) (= *Cereus mollis, nigricans, repandus spinis aureis* Hort.). Südamerika.

niger S. Dyck (Spgl.), β) gracilior Salm Dyck. Südamerika.

aureus S. Dyck. ?

lutescens S. Dyck (= *aureus* β *pallidior* H. Dyck). ?

Moritzianus Otto. La Guayra.

crenulatus S. Dyck (= *Cact. Royeni* W. = *Cer. acromelas* H. Berol.), β) griseus S. Dyck. Curaçao.

albispinus S. Dyck (= *elongatus, decagonus* Hort.). Mittägl. Amer.

coerulescens S. Dyck (= *Aethiops* Haw. = *Mendory* Hortul.). Brasilien.

azureus Parm. Brasilien.

spinibarbis Otto. Chili.

β) glabri areolis nudis tomentosis, lanugine nulla.

α) robusti.

chilensis Colla (= *Coquimbanus* Hort. non Molin = *Quintero* H. Goett. = *Echinoc. pyramidalis, elegans, subrepandus* Hort.). Chili.

Digitized by Google

Cacteae

stellatus Pfeiff. Mexico.
Dyckii Mart. Mexico.
alacriportanus Mart. Brasilien.
peruvianus Tabernaem. DC. (= ? *Cact. peruvianus, heptagonus, hexagonus* et *pentagonus* L. = *Cereus heptagonus* et *hexagonus* Hort.). Peru. β) monstrosus DC. (= *abnormis* W. E. = *Cereus monstrosus* Hort.). Peru.
monoclonos DC. (= *Cact. hexagonus* Lam. = *Cereus surinamensis* Auct.). Surinam, Caribaeen.
calvescens DC. Mexico.
candelaris Meyen. Peru.
arequipensis Meyen. Arequipa.
curvispinus Bertero mss. in Meyens Reise. Peru.
caesius Salm Dyck (= *glaucus* Hort.). ?
geometrizans Mart. (= *Aquicaulensis* Hort.). Mexico.
eburneus S. Dyck (= *Cactus eburn.* Lk. E. = *Coquimbanus* Molin. = *C. peruvianus* W. E. suppl. nec L., β) polygonus (= *griseus* Haw. = *polygonatus* Hort.), γ) monstrosus S. Dyck, δ) monstrosus ramosus. Chili.
Hystrix S. Dyck. Antillen.
candicans Gill. (= *Echinocact. candicans* Hort. = *C. gladiatus* Lem.), β) tenuispinus (= *Montezumae* Hort.). Mendoza.
regalis Haw. Südamerika.
euphorbioides Haw. Südamerika.
serruliflorus Haw. (= *fimbriatus* DC.). Westindien.
grandispinus Haw. Westindien. (Hierzu citirt Walpers auch C. fimbriatus DC. (Lam.).

β) Attenuati.

repandus Haw. (= *Cactus* L. = *Cer. gracilis* Mill. = *Cactus Royeni* DC. pl. gr.). Antillen, Caribäen.
subrepandus Haw. (= *imbricatus* Hort.). Caribäen.
eriophorus Otto (= *cubensis* Zucc. = *subrepandus* Hort.), β) laetevirens S. Dyck. Cuba.
undatus Otto. ?
divergens Otto. St. Domingo.
divaricatus DC. (= *fimbriatus* Hort.). St. Domingo.
erectus Karw. Mexico.
chlorocarpus DC. (H. B. K.) Quito.

γ) gemmati: areolis gemmaeformibus approximatis, interdum confluentibus.

gemmatus Zucc. Mexico.
anisacanthus DC., β) ortholophus (= ? *gemmatus* Zucc.), γ) subspiralis. Mexico.
marginatus DC. (= *incrustatus* H. Berol. = *cupulatus* Hort. = *Mirbelii* H. Belg.). Mexico.
Olfersii Otto. Brasilien.
conicus Otto. Mexico.
Jamacaru S. Dyck (= *glaucus* Hort.). Brasilien.
glaucus Salm Dyck. ?
lividus Pfeiff. (= *Perotettii* Hort.). Brasil., la Guayra.
laetevirens Otto nec S. Dyck. ?
grandis Haw. Brasilien.
tetragonus Haw. (L.), β) minor Salm Dyck (= *pentagonus* W.). Südamerika.
virens DC. (= *exserens* Lk. = *affinis* H. Berol.). Mexico.
sublanatus S. Dyck. ?
tilophorus Pfeiff. (= *retroflexus* Hort.). ?

Digitized by Google

Cacteae

§. 3. Polylophi caule humili carnoso etc. etc.

cinerascens DC. (= *Deppei* H. Berol., H. Dyck = *Jamacaru* Piso.). Mexico. β) crassior DC. (= *acinaciformis* H. Berol.), γ) tenuior DC.

pentalophus DC., α) simplex (= *propinquus* DC.), β) subarticulatus (= *leptacanthus* DC.). Mexico.

tuberosus Pfeiff. Mexico.

§. 4. Opuntiacei Pfeiff.

moniliformis DC. (L.) St. Domingo.

ovatus Pfeiff. (= *Opuntia Gilliesii* H. Berol. = *Op. ovata* H. Angl.). Mendoza.

articulatus Otto et Dietr. (= *Opuntia articulata* Otto = *Op. polymorpha* H. Angl.). Mendoza.

syringacanthus Pfeiff. (= *Opuntia platyacantha* H. Angl.). Mendoza.

? serpens DC. prdr. (H. B. K.). Quito.

? nanus DC. (H. B. K.). Quito.

§. 5. Protracti.

serpentinus Lagasc., Lk et Otto, Hook. Bot. mag. Mexico.

ambiguus DC. (Bonpl.) ?

polygonus DC. (Lam.). St. Domingo.

obtusus Haw. Brasilien.

variabilis Pfeiff. (= *Pitajaya* DC. (Jacq.) = *undulosus* DC. = *laetevirens* Salm Dyck = *quadrangularis, trigonus, prismatiformis, hexangularis, cognatus, affinis, glaucus, speciosus* Hort.). Mexico, Peru, Brasilien, Westindien.

validus Haw. Südamerika.

laetus Salm Dyck (= *formosus* Hort.). Montevideo.

paniculatus DC. (Lam.) ?

laetus DC. (H. B. K.). Quito.

acutangulus Otto (= *undulatus* H. Dresd.). Mexico.

pellucidus Otto. Cuba.

princeps H. Würzb. ex Pfeiff. ?

Bonplandii Parm. Brasilien.

ramosus Karw. Mexico.

baxaniensis Karw. Mexico.

pentagonus Haw. (L.) (= *Cact. prismaticus* et *reptans* W. = *Cereus prism.* et *rept.* Haw.). Südamerika.

tenellus S. Dyck. Brasilien.

§. 6. Repentes.

Martianus Zucc. Mexico.

flagelliformis Mill. (L.), β) minor S. Dyck. Südamerika.

Smithii H. Angl. (= *Cer. crimson creeping* Bot. Reg. t. 1565 = *Cer. Mullisoni* Hort.). ?

flagriformis Zucc. Mexico.

leptophis DC. Mexico.

Humboldtii DC. Quito.

icosigonus DC. (H. B. K.). Quito.

sepium DC. (H. B. K.). Quito.

grandiflorus Mill., β) speciosissimus. Carib. Antill.

nycticalus Lk. (= *pteranthus* Lk. = *brevispinulus* S. Dyck = *Antoini* H. Vindob. = *obtusus, rosaceus* Hort.). Mexico.

garipensis DC. (H. B. K.) (= *quadrangularis* Haw.). Neuandalusien.

Digitized by Google

Cacteae

radicans DC. (= *reptans* S. Dyck nec W. = *biformis* Hort.).
spinulosus DC. Mexico.
albisetosus Haw. St. Domingo.
humilis DC. (= *gracilis* S. Dyck), β) minor (= *myriocaulon* Mart. = *Mariculi* Hort.). Südamerika.
setiger Haw. Brasilien.
inermis Otto. La Guayra.
triangularis Haw. (L.) (= *compressus* Mill.), β) major (*undatus* Haw.), γ) pictus, s. variegatus. Mexico, Caribaeen.
Napoleonis Grah., Bot mag. t. 3458 (= *triangularis major* S. Dyck). Westindien.
triqueter Haw. (= *Cact. prismaticus* Dsf.). Südamerika.
trigonus Haw. (= *Cact. triangularis foliosus* Jacq.), β) quadrangularis Haw. Carib.
tripteris S. Dyck. ?
prismaticus S. Dyck. Südamerika.
extensus S. Dyck (= *subsquamatus* Pfeiff. = *horridus* Hort. ?). ?
setaceus S. Dyck, β) viridior S. Dyck (= *coccineus* DC.). Brasilien.

b) Speciosi.

speciosissimus DC. (= *Cact. spec.* Dsf. = *speciosus* W.), β) lateritius Bot. reg. (= *hybridus* H. Berol. = *Epiphyll. hybrid.* Hort.), γ) Jenkinsonii H. Angl., δ) Vandesii H. Angl., ε) ignescens H. Dr., ζ) Guillardieri, η) Curtisii, ϑ) Roythi, ι) Devauxii, κ) Lothii, λ) Kiardi, μ) coccineus grandiflorus, ν) unduliflorus, ξ) Eugenia, ο) Mayfly, η) Makoyi, ϱ) aurantiacus, σ) albiflorus ?, τ) grandiflorus etc. Andere Hybriden: Hansii Baumann, formosus Bosse, nothus Bosse, Selloi etc.
Schrankii Zucc. (= *formosus* H. Monac.). Mexico.
coccineus S. Dyck (? = *bifrons* Haw.). Mexico.

Species addendae.

callicoche Scheidw. (= *inermis* Scheidw.). Mexico.
Dumortieri Scheidw. Bonaria.
polyptychus Lem. ?
nigricans Lem. ?
violaceus Lem. ?
fernambucensis Lem. ?
Terscheckii Parm. Buenos Ayres.
Pfeifferi Parm. Buenos Ayres.
horridus Otto. La Guyara.
hamatus Scheidw. (= *rostratus* Lem.). Mexico.
rostratus Lem. (= *hamatus* Scheidw. ?). Mexico.
Maelenii Pfeiff. Mexico.
fulvibarbis Otto et Dietr. (= *chilensis* Hort.). Chili.
deficiens Otto et Dietr. Caracas.
resispinatus S. Dyck. ?
eriocomus Rchb., in Terscheck Suppl. Brasilia.
geminisetus Rchb. ?
xanthochaetus Rchb. ?
polychaetus Rchb. l. c. (= *chalybaeus* Otto mss.) ?
horridus Otto et Dietr. Curaçao.
thalassinus Otto et Dietr. La Guayra.
gladiator Otto et Dietr. (= *pugioniformis* Lem.). Mexico.

Digitized by Google

Cacteae

tortuosus Forbes in Otto et Dietr. Gtzg. Buenos Ayres.
lamprochlorus Lem. ?
fluminensis Miquel. Brasilien.
tenuis Pfeiff. ?
Ehrenbergii Pfeiff. Mexico.
cometes Scheidw. ?
pterogonus Lem. Mexico.
lumbricoides Lem. Montevideo.

IX. Phyllocactus Lk. (= *Phyllanthus* Miq. = *Cerei* §. 7. *alati* Pfeiff., Enumer. Cactear.).

Ackermanni Lk. (= *Cer. A.* Otto = *Epiphyll. A.* Haw.). Mexico.
phyllanthoides Lk. (= *Cer. phyll.* DC. = *Cact. phyllanthoides* DC. = *C. speciosus* Bonpl. = *alatus* W. E. Suppl. = *Epiphyllum speciosum* Haw. = *Cact. elegans* Lk. Enum. = *Epiphyll. phyllanthoides* Hort.), β) albiflorus. Mexico.
oxypetalus Lk. (= *Cer. oxypetalus* DC. = *Epiphyll. oxypetalum* Hort. = *Cact. oxypet.* Moc. et Sess.). Mexico et Guatimala.
latifrons Lk. (= *Cer.* (= *Epiphyll.* Zucc.), *latifrons* Pfeiff.). Mexico.
Hookeri Lk. mss. (= *Cereus Hookeri* Otto = *Epiphyll. Hookeri* Haw. = *C. Phyllanthus* Hook. = *C. marginatus* S. Dyck). Brasil., Demerary.
Phyllanthus Lk. (= *Cer. Phyllanthus* DC. = *Epip. Phyllanthus* Haw. = *Cact. Phyllanthus* L. = *Opuntia Phyllanthus* Mill.). Brasil., Surinam, Guadeloupe.

X. Epiphyllum Pfeiff.

truncatum Haw. (= *Cereus truncatus* DC. = *Cactus truncatus* Lk. En.), β) coccineum, γ) aurantiacum Hort. Brasilien.
Altensteinii Pfeiff. (= *Cereus truncatus Altensteinii* H. Berol. = *Epiphyll. truncatum multiflorum* Hort.). Brasilien.
Russelianum Hook. Bot. mag. t. 3717 (= *Cereus Russelianus* Gardn.). Brasilien.

§. 2. Cacteae rotatae Miq., Endl.

XI. Rhipsalis.

Subgenus I. Rhipsalis Pfeiff.

1) Alatae.

crispata Pfeiff. (= *Epiphyllum crispatum* Haw. = *Cer. crispatus* H. Berol.). ?
rhombea Pfeiff. (= *Cer. rhombeus* S. Dyck = *Cer. crispatus crenulatus* H. Berol. = *Cactus torquatus* H. Lugdb. = *Epiphyll. crenulatum, rhombeum* Hort.). ?
ramulosa Pfeiff. (= *Cer. ramulosus* S. Dyck = *Epiphyll. ramulosum, ciliare, ciliatum* Hort.). ?
platycarpa Pfeiff. (= *Epiphyll. platycarpum* Zucc.). Brasilien.
Swartziana Pfeiff. (= *Cactus alatus* Sw. = *Cereus alatus* DC. = *Epiphyll. alatum* Haw.). Jamaica.
pachyptera Pfeiff. (= *Cereus alatus* Lk. et Otto = *Ep. alatum* Haw. suppl. = *Cactus alatus* Bot. mag.), β) crassior S. Dyck Westindien.

Digitized by Google

Cacteae

2) Angulosae.

pentaptera Pfeiff. Brasilien.
trigona Pfeiff. Brasilien.
micrantha DC. Pfeiff. (= *Cact. micranthus* Kunth). Quito.

3) Teretes.

Cassytha G. (= *Cact. pendulus* Sw. = *Cassytha baccifera* Mill. = *Rhipsalis pendula* Hort.). Jamaica. Hispaniola α) Swartziana DC. Antill., β) Hookeriana DC. Mexico, γ) Mociniana DC. Mexico, δ) dichotoma DC. (= *Cact. pendulus* H. B. K.), Neu-Andalus. & Neu-Granada, ε) mauritiana DC. (= *Cact. pendulinus* Sbr.), Mascarenas, ζ) pendula S. Dyck). ?
floccosa S. Dyck (= *Rh. Cassytha β major* S. Dyck). ?
funalis S. Dyck (= *Cactus funalis* Spgl. = *Rh. grandiflorus* Haw., Lk. et Otto = *Rh. calamiformis* Hort. = *Cactus cylindricus* Velloz. Flor. Flumin.). Südamer. β) minor (= *Rh. Cassytha δ pilosiuscula* S. Dyck).
fasciculata Haw. (= *Cactus parasiticus* L. = *Cact. fasciculatus* W. E. Suppl. = *Rh. parasiticus* Haw. = *Cact. teres* Vellozo Flor. Flum.). Brasil., Carib.
undulata Pfeiff. (= *parasitica* DC. prodr.). Caribäen.

4) Articuliferae.

mesembrianthemoides Haw. (= *R. salicornioides β* Haw. = *R. echinata* Hort.). Südamerika.
cereuscula Haw. Brasilien.

Species addendae.

macrocarpa Miq. (= *Cactus phyllanthus* Vellozo Flor. Flum.). Brasilien.
sarmentacea Otto et Dietr. Bonaria.

Subgenus II. Lepismium Pfeiff.

commune Pfeiff. (= *Cer. squamulosus* S. Dyck = *Cer. elegans* Hort.). Brasilien.
Myosuros Pfeiff. (= *Cer. Myosurus* S. Dyck = *Cactus tenuis* Schott. = *Cer. tenuispinus* Haw.).
Knightii Pfeiff. (= *Cer. Knightii* Parment.). Brasilien.
paradoxum S. Dyck (= *Cer. pterocaulis* Hort.). Brasil.

Species addendae.

cruciforme Miq. (= *Cact. cruciformis* Vellozo Flor. Flum.). Brasilien.
fluminense Miq. (= *Cact. triqueter* Vellozo, l. c.). Brasil.

Subgenus III. Hariota DC. Mem. (nec. Adans.).

salicornioides DC. (= *Cactus lyratus* Vellozo = *Opuntia salicornioides* Spgl. = *Rhipsalis salicornioides* Haw., Lk. et Otto). Brasilien, β) ramosior S. Dyck, Brasilien.

Species addendae.

Saglionis Lem. (= *Rh. Saglionis* Otto = *Rh. brachiata* Hook. Bot. mag. t. 4039). Bonaria.

XII. Opuntia T.

1. Caule articulato.

a) Glomeratae.

sulphurea Gill. Chili.
ovata Pfeiff. Mendoza.
corrugata H. angl. Hort., Dyck. Pfeiff. ?
pusilla Salm Dyck. Südamerika.

Digitized by Google

Cacteae

longispina Haw. Chili (Mendoza).
glomerata Haw. Chili (Mendoza).
andicola H. Angl., Pfeiff. (= *horizontalis* Gill.). Chili (Mendoza).
tuberosa H. Angl., Pfeiff. (= *O. alpina* Gill.), β) spinosa (= *platyacantha* H. Angl.). Chili (Mendoza).
mesacantha Nutt., Pfeiff. Kentuky.
caespitosa Nutt. ex Sering. Bull. 1831. Pfeiff. Kentuky.
humifusa Nutt. Pfeiff. „Num uni praecedentium aequalis?"

b) Divaricatae.

fragilis Haw. (= *Cactus fragilis* Nutt. = *Op. Sabinii* Hort.). Nordamerika (in sterilibus Missouriensibus).
aurantiaca Gill. Bot. reg. t. 1606. Pfeiff. Chili.
extensa S. Dyck mss. ?
foliosa S. Dyck, DC. prodr. (= *Cact. foliosus* W. E. Suppl. = *Op.* (*Cact.*) *pusilla* Haw. nec S. Dyck = *Op. Hystrix* Hort.). Südamerika.
curassavica Mill. Dict. (*Cact.* c. L.). Curaçao, St. Thomas. β) media Haw., γ) minor Haw., δ) longa Haw., Brasilien.
pubescens Wendl., Cat. hort. Herrenh. Pfeifl. Mexico.

c) Compresso articulatae.

vulgaris Mill. (= *Cact. Opuntia* L. = *C. Opuntia vulgaris* et *nana* DC. pl. grass. = *Op. italica* Tenore?), β) media S. Dyck. Peru, Mexico.
intermedia S. Dyck (= *O. vulgaris γ major* S. Dyck). ? Südl. Europa, Dalmatien.
coccinellifera Mill. Dict. (= *Cact. coccinell.* L. = *O. mexicana* Hortor.). Südamerika.
tuberculata Haw. Suppl. (= *Cact. tuberculat.* W. E. Suppl.). Südamerika.
stricta Haw. (= *Cact. strictus* Haw. = *Opuntia inermis* DC.). Südamerika.
lanceolata Haw. (= *Cact.* l. Haw.). Mittelamerika.
decumana Haw. (= *Cact. decumanus* W. E. Suppl. et *C. elongatus* W. l. c. = *Op. maxima* Mill. Dict.).
elata Otto. Brasilien, Curaçao.
Ficus indica Mill. (= *Cact. F.* i. L. = *Op. vulgaris* Tenor. = *Cact. Opuntia* Gussone). Mittelamerika, Sicilien, Süditalien.
crassa Haw., β) major (= *glaberrima* H. Berol.). Mexico.
parvula S. Dyck (= *glauca* Hort.). Chili.
Hernandezii DC. (= *C. cochenillifer* Flor. mexic. ined.). Mexico.
microdasys Lehm., β) minor S. Dyck (= *pulvinata* DC.). Mexico.
decumbens S. Dyck (= *repens* Karw. = *irrorata* Mart.). Mexico.
glaucescens Otto. Mexico.
grandis H. Angl. Pfeiff. (= *glaucescens* Hort.). Mexico.
albicans S. Dyck (= *Prate* Sabin.). Mexico.
sericea Don mss., in Salm Dyck hort. (= *coerulea* Gill.). Chili.
orbiculata S. Dyck (= *sericea β longispina* Hort. Dyck. = *longispina* Hort.). ? Chili.
puberula Dieffenb. Mexico.
leucotricha DC. Mexico.
crinifera S. Dyck (= *senilis* Parm), β lanigera. Brasil.

Digitized by Google

Cacteae

spinulifer S. Dyck (= *oligacantha* H. Vindob.). Mexico.
missouriensis DC. (= *Cact. ferox* Nutt. = *Op. polyacantha* Haw.). Nordamerika.
media Haw. Nordamerika (Missouri).
splendens H. Angl. ?
amyclaea Tenore (= *maxima* S. Dyck). „In rupibus calcareis prope Amyclas veterum" (Monticelli).
dejecta S. Dyck (= *diffusa* = *horizontalis* Hort.). Havanna.
candelabriformis Mart. Mexico.
lasiacantha Dieffenb. (= *leucacantha* S. Dyck). ?
megacantha S. Dyck (= *mexicana* Hort.). Mexico.
tomentosa S. Dyck (= *Cact. tomentosus* Lk. E.). Südamerika.
oblongata Wendl. Mexico.
Tuna Mill. (= *O. coccinellifera* DC. pl. gr. = *Cact. Bonplandii* H. B. K. = *O. coccinea* Hort.). Quito, Mexico, β) laevior S. Dyck (= *flexibilis* = *Bonplandii* Hort.).
pseudo-Tuna S. Dyck, β) spinosior S. Dyck, γ) elongata S. Dyck. Südamerika.
glaucophylla Wendl. ?
horrida S. Dyck (= *humilis* Haw.). Südamerika.
Dillenii DC. (= *Cact. Dill.* Bot. reg. = *Op. Tuna* β Haw.). Südamerika.
polyantha Haw. (= *Cact. polyantha* B. mag.). Südamer.
triacantha DC. (= *Catt. triac.* W. E. Suppl. = *C. Urumbeba* Vell.). Südamerika.
fulvispina S. Dyck (= *elongata* Haw. Suppl.), β) laevior S. Dyck. ?
monacantha Haw. (W. E. Suppl.) (= *Cactus Opuntia Tuna* DC. pl. gr.). Brasilien.
nigricans Haw. (= *Cact. Tuna* β *nigricans* Bot. mag. *Opunt. coccinellifera* DC. pl. gr. = *Cact. pseudococcinellifer* Bert.). Südamerika.
elatior Mill. (= *Cact. Tuna* β W.). Südamerika.
robusta Wendl. Mexico.

d) Cruciatae.

rubescens S. Dyck. Brasilien.
catocantha Otto. St. Thomas.
spinosissima Mill. (= *Cact. sp.* Lam.). Jamaica, Antillen.
ferox Haw. (W. E. Suppl.) (= *cruciata, delabriformis* Hort.). Südamerika.
leucacantha Otto, (non S. Dyck) (= *subferox* Schott.). Mexico.
leucosticta Wendl. Mexico.

e) Paradoxae.

brasiliensis Haw. (W. E. Suppl.) (= *Cact. paradoxus* Hornem.), β) spinosior H. Berol., γ) minor S. Dyck (= *C. arboreus* Vellozo fl. Flum.). Brasilien.

f) Cylindraceae.

cylindrica DC. (Lam.) (= *Cereus cylind.* Haw.). Peru.
imbricata DC. (= *Cereus imbric*, Haw.). Mexico.
exuviata DC. (= *undulata* Hort. = *decipiens major* H. Vindob., β) angustior DC., γ) spinosior DC. Mexico.
tunicata Otto (= *Cer. tunicatus* Lehm. = *O. furiosa* Wendl.). Mexico, Brasilien.

Digitized by Google

Cacteae

rosea DC. (= *Cact. subquadriflorus* Flor. Mexic. ined.). Mexico.
Stapelia DC. Mexico.
Kleiniae DC. Mexico.
decipiens DC., β) minor H. Dyck. Mexico.
gracilis Mart. (Num forsan O. decipiens minor?). Mexico.
Salmiana Parm. Brasilien.
leptocaulis DC. (= *virgata* H. Berol.). Mexico.
ramulifera S. Dyck. Mexico.
clavarioides Otto (= *Cer. clavarioides* H. Berol. = *Cer. sericeus* = *Opuntia microthele* Hort.). Mexico.
Poeppigii Otto. Chili.

Species addendae.

1. caule non articulato.

platyacantha S. Dyck. Chili.
pulverulenta Pfeiff. Südamerika.

2. articulis compressis.

Galapageia Henslow. James's Island.
Auberi Pfeiff. Cuba.
flavicans Lem. ?
streptacantha Lem. ?

3. articulis teretibus aut teretiusculis.

Darwinii Henslow. Südamerica.
fragilis Haw. ?
Parmentieri Pfeiff. Paraguay.
retrospinosa Lem. ?
acracantha Lem. ?
diademata Lem. ?
Turpinii Lem. (= *Cereus articulatus* Pfeiff. = ? *O. polymorpha* H. Angl.). Chili.
eburnea Lem. ?

XIII. Pereskia Plum.

aculeata Plum. (= *Cactus Pereskia* L.). Westindien. β) rubescens, γ) rotundifolia H. Dyck. (= *acardia* Parm.), δ) lanceolata (= *P. brasiliensis* H. Hamb. = *P. longispina* Haw.).
spathulata Otto (= *crassicaulis* Zucc.). Mexico.
Pititache Karw. Mexico.
Bleo DC. (H. B. K.) (= *cruenta* Hort.). Mexico, Neugranata.
grandifolia Haw. (= *Cact. grandifol.* Lk. E. = *P. grandiflora* Hort.). Brasilien.
zinniaeflora DC. (= *Cact. zinniaeflorus* Flor. Mex. ined.). Mexico.
lychnidiflora DC. (= *Cact. fimbriatus* Flor. Mex. ined.). Mexico.
opuntiaeflora DC. (= *Cact. opuntiaefl.* Flor. Mex. ined.). Mexico.
rotundifolia DC. (= *Cact. frutescens* Flor, Mex.). Mexico.
portulacaefolia DC. (L.). Caribaeen.
horrida DC. (H. B. K.). Brasilien.
glomerata Pfeiff. Peru.
? plantaginea H. Götting.

Species addendae.

ochnacarpa Miquel (= *Cact. Rosa* Vellozo Flor. Flum.).

Digitized by Google

Cacteae

Neue Gattungen.

XIV. Pelecyphora C. Ehrenb. (Beilträger).

aselliformis C. Ehrbg., kellerwurmähnlicher, 4. w. Mexico.

XV. Gymnocalycium Pfeiffer.

denudatum Pfeiff. (= *Echinocactus denudatus* Lk. Otto).
gibbosum Pfeiff. (= *Cactus gibbosus* Haw.).
reductum Pfeiff. (= *Cactus* (= *Cereus*) *reductus* Lk.).

XVI. Disisocactus (*Distocactus*) Lindl. emend.

biformis Lindl. (= *Cereus biformis* Bot. reg.).

Sehr zweifelhafte:

Cactus neglectus Denh. ?
— verticillatus Brotero. ?

Caelia G. Don, v. Coelia.
Caelogyne Wall., v. Coelogyne, p. 210.
Caeloglossum Lindl., v. Coeloglossum.
Caenopteris Cicutaria Sw. (= *dissecta* H. Berol.), *japonica* Thbg., *vivipara* Hort., v. Asplenium cicutarium p. 92, japonicum et foecundum p. 50 II.

Caesalpinia Plum., Caesalpinie.

ferox Hassk., starkbewehrte, ħ. w. Java.
laxa Benth., lockere, ħ. w. Mexico.
obcordata Van Houtte, verkehrtherzförmige, ħ. w. ?
paigag Hort. Madrit., paipag-C., ħ. w. Südamerika.
digyna Rottl. = oleosperma, *enneaphylla* Roxb., v. Mezoneuron enneaphyllum, *Gillisiei* Wall., v. Poinciania Gilliesii, p. 639.

Caesia R. Br., Caesie.

asparagoides Eckl., H. Dyck., spargelähnliche, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
Helleri Hügel msc., Endl., Heller's, 4. k. t. Neuholl.

Caesulia Roxb., DC., Caesulie.

lancifolia G. Don, lanzettblätterige, ♂. 4. w. Ostindien.
Cajanus indicus Spgl. = C. bicolor et flavus, *suaveolens* Grah., v. Rhynchosia suaveolens, p. 688, *wolgaricus* Spgl., v. Calophaca wolgarica, p. 149.

Cajophora Presl, Cajophora, XVIII. 11., Loasaceae.

lateritia Kl. (= *Loasa lateritia* Gill., in Hook. Bot. mag., p. 470 = *L. aurantiaca* Hort. = *Raphisanthe lateritia* Lilja).

Caladium Vent., Caladium.

argyrostigma Schott, silberfleckiges, 4. w. ?
bicolor Vent., p. 143 (= *Arum bicolor* Ait.).
β) pellucidum DC. (= *Arum pellucidum* Fulchèr.),
γ) pictum DC. (= *Arum pictum* Fulchèr. nec Auct.),
δ) haematostigma H. Berol.
colocasioides Brogn. (= *Arum colocasioides* Dsf.), Colocasiaähnliches, 4. w. ?
poecile Schott, 4. w. ?
reticulatum Dsf., netzförmiges, 4. w. ?
violaceum Dsf., violettes, 4. w. Antillen.
zamiaefolium Lodd., keulpalmenähnliches, 4. w. Brasilien.
arborescens Vent., *Bauersia* Rchb., *brasiliense* Dsf., *crassipes* Hortul. (= *macropus* Hort. Petropol.), *fragrantissimum* Hook., *grandifolium* W., *grandifolium* Sims (= *Simsii* Hook.), Imbé Hort. Berol., *lacerum* W., *lacerum* Hort., *luridum* Lodd., *pedatum* Hook.,

Digitized by Google

Caladium

pinnatifidum W., *tripartitum* W., v. Philodendron arborescens, crassinervium, Fontanesii, cannaefolium, fragrantissimum, grandifolium, Simsii, Imbé, lacerum, incisocrenatum, luridum, pedatum, pinnatifidum, tripartitum, *auritum* Vent., v. Syngonium auritum, *belophyllum* W. (= *acuminatum* Dietr.), *edule* Meyer, *livide-vaginatum* Hortor., *xanthorrhizon* W., v. Xanthosoma belophyllum, edule, lividum et Jacquini, *cucullatum* P., *esculentum* Vent., *nymphaeifolium* Vent., *odorum* Lodd., v. Colocasia cucullata, esculenta, nymphaeifolia et odora, *hastifolium* Steud., *helleborifolium* Vent., *variegatum* Dsf., v. Acontias hastifolius, helleborifolius, variegatus p. 7, 8, II., *peltolatum* Hook., v. Pythonium Hookeri, *sarmentosum* H. Berol., v. Gonatanthus sarmentosus, *scandens* W., v. Culcasia scandens, *seguinum* Vent. et *maculatum* Lodd., v. Dieffenbachia Seguine et var. β) maculata, *simplex* Blume, *princeps* H. Berol., v. Aglaonema simplex et princeps p. 14, II., *viviparum* N. E., v. Remusatia vivipara. — Noch kommen in den Verzeichnissen ein C. macrophyllum, pedatifidum (? pinnatifidum) quercifolium versicolor etc. vor, deren Autorität etc. mir unbekannt ist.

Calamagrostis Adans., Roth, (= *Arundo* plur. auct.), Schilfrohr.

glauca R. et S. (Hornem., non MB.), blaugrünes, 4. f. Nordamerika.

lanceolata Roth, β) ? lithuanica Bess. (= *vilnensis* Bess.). *aemula* Steud., *Billardieri* Steud., *Forsteri* Steud., *retrofracta* Lk. (= *Agrostis retrofracta* W.), v. Lachnagrostis aemula, Billardieri, Forsteri et plebeja s. retrofracta, p. 881.

Calamintha T., Bergmünze.

I. Acynos Mch., P.

annua Schrenk, jährige, ⊙. f. Asiat. Rufsland.

umbrosa Fisch. et Mey. (= *Melissa umbrosa* MB.), schattenliebende, 4. f. Mittelasien, Ostindien.

β) nepalensis Hort. Berol.

II. Calamintha genuina.

thymifolia Host. (non Rchb.), thymianblätterige, 4. f. Krain. *cana* Auct. = graveolens, *cretica* Lam. (= *fruticosa* P. = *marifolia* P.), *croatica* Host, *subnuda* Host (W. K.) (= *origanifolia* Host), *thymifolia* Rchb. et var. *alba* Lk. (W. K.), v. Micromeria marifolia, Piperella, Pulegium et Satureja rupestris.

Calamus L., Rotang.

equestris W., Ritter-R., ♄. w. Moluccen.

Neumanni Hort. angl., Neumann's, ♄. w. Madagascar.

oblongus Reinw., länglicher, ♄. w. Java.

β) latifolius Rumpf.

rhomboideus Blume, rautenförmiger, ♄. w. Java.

viminalis W. (= *Reinwardtii* Mart.), ruthenartiger, ♄. w. Moluccen.

Calanchoe Adans., v. Kalanchoe.

Calandrinia H. B. K., Calandrinie.

amoena Visiani (= *caulescens* Hort.), liebliche, ⊙. f. Südamerika.

Andrewsii G. Don (= *Talinum Andrewsii* Swt. = *patens* Andr., p. 797).

Digitized by Google

Calandrinia

arenaria Chamiss. (= *venulosa* Hook.), Sand-C., 4. w. Chili.
capitata Hook., Arn., kopfförmige, ⊙. f. Chili.
Cumingii Hook., Arn., Cuming's, ⊙. f. Chili.
denticulata Gill., gezähnelte, 4. ♄. t. Chili.
discolor Schrad. (= *speciosa* Lehm., non Lindl. = *Cistanthe discolor* Spach).
elegans Hort. Lugd. Batav., zierliche, ⊙. f. ? Südamerika.
Gilliesii Hook., Arn., Gillie's, 4. t. Chili.
glauca Schrad. (= ? *Cistanthe glauca* Spach), blaugrüne, 4. t. Chili.
Lindleyana Walp. (= *discolor* Lindl., nec Schrad.), Lindley's, 4. t. Chili.
lingulata DC. (non Hort.), zungenförmige, ⊙. f. Peru.
Lockharti G. Don (= *Talinum grandiflorum* Lk.), Lockhart's, 4. t. w. Trinidad.
Phacosperma DC. (= *Phacosperma peruviana* Haw., p. 611 = *Tetragonia peruviana* Hort.).
racemosa Bot. mag. (= *arenaria* Hook., Arn. = *picta* Gill.), traubige, ⊙. f. Chili.
speciosa Lindl. (= *spectabilis* Otto et Dietr. = *grandiflora* Hort. = *Cistanthe speciosa* Lilja).
umbellata DC. (= *Portulaca prostrata* Dombey = *Talinum umbellatum* R. et P.), doldige, ⊙. f. Chili.
curvifolia Hort. = procumbens.

Calanthe RBr., Schönstendel.

Jebine Siebold, Jebine-S., 4. t. k. f. b. Japan.
Masuca Lindl. (= *Bletia Masuca* Don fl. nepal. = ? *Amblyglottis veratrifolia* Blume = *Zeduba Masuca* Hamilt.), Masuca-S., 4. w. Ostindien.
pulchra Lindl. (= *Amblyglottis pulchra* Blum.), schöne, 4. w. Java.
purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Ostindien.
Sieboldii H. Hügel., Siebold's, 4. w. China.
speciosa Lindl. (= *Amblyglottis speciosa* Blume), prächtiges, 4. w. Java.
striata RBr. (= *Limodorum* Sw. = *L.* ? *unguiculatum* LaBill.), gestreifter, 4. w. China. Japan.
sulphurea H. Hügel. (= *Amblyglottis sulph.* Bl.), schwefelgelber, 4. w. Ostindien.
sylvestris Lindl. (= *sylvatica* Lindl. = *Bletia sylvatica* Spgl. = *Alismorchis Centrosis* A. P. Th. = *Centrosia Aubertii* Rich.).
tricarinata Lindl., dreikieliger, 4. w. Ostindien.
tricolor H. Hügel., dreifarbiger, 4. w. China.
versicolor Lindl., buntfarbiger, 4. w. Ostindien.
Calathiana nivalis Delarbr. = Gentiana nivalis, p. 351.

Calceolaria L., Pantoffelblume.

alba R. et P., weifse, ♄. k. t. Chili.
diffusa Lindl. (= *bicolor* Grah., non R. et P.), weitschweifige, ♄. k. t. Chili.
excelsa Grah., hohe, ♄. k. t. Chili.
floribunda H. B. K. (= *paniculata* W.), blüthenreiche, ♄. k. t. Quito.
hyssopifolia H. B. K. (= *linifolia* W), ysopblätterige, ♄. k. t. Chimboraco.
mollissima Walp., weichste, ♄. k. t. Chili.

Digitized by Google

Calceolaria

Morisii Walp. (= *salicifolia* Moris), Moris's, ♄. k. t. Chili.

petiolaris Cavan. (= *connata* Hook. = *floribunda* Lindl.).

Hybriden: Atkinsoniana D. Don, exoniensis, Jupiter Paxton, Pluto H. Anglor., Talisman Paxton etc.

biflora Lam. = plantaginea, *Cavanillesii* P. = Neeana, *pinnata* R. et P. (non L.) = scabiosaefolia, *tinctoria* Gill. = arachnoidea.

Caldasia Lagasc. (non Willd. nec Mutis), Caldasie, V. II., Umbelliferae.

eriopoda DC. (= *Oreomyrrhis eriopoda* Endl.), wollstieliger, ♂. 4. k. Neuholland.

Calea urticaefolia Banks, v. Caleacte urticaefolia.

Caleana RBr., v. Caleya.

Calectasia R. B., Calectasie, VI. I., Juncaceae.

cyanea R. B., himmelblaue, ♄. k. t. Neuholland.

Calendula L., Neck., Ringelblume.

americana Mill., amerikanische, ☉. f. Vera Crux.

decumbens Mill., niederliegende, ☉. f. Vera Crux.

echinata DC., igelstachelige, ☉. f. Mogador.

maderensis DC. (= *maritima* Lowe, non Guss.), madeirische, ☉. f. Madeira.

maritima Guss. (= *stellata* ?), Meerstrand's, ☉. f. Sicilien.

Ungewissere oder Gartenvarietäten: anemoneflora Hort., aurea Hort., grandiflora Hort., incanescens Schrad., linifolia Wendl., speciosa Hort.

crista galli Vivian = ? stellata, *Dalgesirum* Hort. = marginata, *dentata* Hort. = denticulata, *hispanica* Tenore (non Hort.) = incana, *arborescens* Jacq. (= *rigida* Ait. = *muricata* Thbg.), v. Tripteris arborescens.

Calimeris Nutt., v. Aster, Sect. III., p. 97. C. *platycephala* Nutt. = incisa, l. c.

Calla aromatica Roxb. (= *occulta* Lodd. vix Lourr.), v. Homalonema aromaticum, *Dracontium* Mey. (= *pertusa* Kunth), v. Monstera Adansonii.

Calliandra Benth., Schönfaden, XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimosaceae.

alba Benth. (= *Acacia alba* Colla, non Willd. = *A. Collaeana* Presl.), weifser, ♄. w. ?

asplenioides Benth. (= *Acacia asplenioides* N. E. = *Inga mertensioides* N. et Mart.), strichfarrnblätteriger, ♄. w. Brasilien.

caracasana Benth. (= *Acacia carac.* W., p. 2), formosa Benth. (= *Acacia formosa* Kunth., p. 3), grandiflora Benth. (= *Mimosa grandiflora* L'Her. = *Acacia grandiflora* W., p. 3), Houstoni Benth. (= *Inga Houstoni* DC., p. 417 = *Acacia Houstoni* W. = *Mimosa Houstoni* L'Her.), Kunthii Benth. (= *Inga anomala* H. B. K., p. 416), laxa Benth. (= *Acacia laxa* W., p. 3), Lambertiana Benth. (= *Acacia Lambertiana* Ker), portoricensis Benth. (= *Acacia portoricensis*), quadrangularis Benth. (= *Acacia quadrangularis* Lk., ? = *tetragona* W.)

Callianthemum C. A. Mey., Schönblümchen, XIII. VI.

anemonoides Endl. (= *rutaefolium* Rchb. = *Ranunculus anemonoides* Zahlbr., p. 675).

Digitized by Google

Callianthemum
rutaefolium C. A. Mey. (= *coriandrifolium* Rchb. = *Ranunculus rutaefolius* L., p. 678).
Callicarpa discolor W., v. Aegiphila arborescens, p. 20, *sinensis* Hort. = cana.
Callichroa Douglasii Torr. et Grey., v. Calliglossa Douglasii, p. 875).

Calligonum L., Schönknöterig, (Flügelnufs).
crispum Bunge, krauser, ħ. f. k. Asiat. Rufsland.
flavidum Bunge, gelblicher, ħ. f. k. Asiat. Rufsland.
mongolicum Turcz., mongolischer, ħ. f. k. Mongolei.
Panderi Fisch., Pander's, ħ. f. k. Gegend des caspischen Meeres.
rubicundum Bunge, röthlicher, ħ. f. k. Asiat. Rufsland.
C. Calliphysa Steud., v. Calliphysa juncea, p. 148.

Calliopsis Rchb., Schöngesicht.
Atkinsoniana Hook. (= *Coreopsis Atkinsoniana* Dougl.).
basalis Otto et Dietr., ♂. f. Missouri.
cardaminefolia DC., schaumkrautblätteriges, ☉. f. Mexico.
Drummondii Don, v. Coreopsis diversifolia, p. 218, *tinctoria* DC. = bicolor.

Callipeltis Steven, Schönschildchen, VI. 1., Rubiaceae-Stellatae.
Cucullaria Stev. (= *Galium Cucullaria* R. et S., p. 344).

Calliprora Lindl., *flava* Hort. = lutea.
Callisace ruthenica Fisch. et *Schieverekii* Hoffm., v. Peucedanum ruthenicum, p. 610 et Thysselinum palustre, p. 810.

Callisia Loefll., L., Callisie.
delicatula Kunth, zarte, 4. w. ?
Callistachya sibirica Rafin., *virginica* Rafin., v. Veronica sibirica et virginica, p. 844.

Callistachys Vent., Schönähre.
carinata Meisn., kielförmige, ħ. t. k. Neuholl. ob kultiv.?
linearis Benth., gleichbreite, ħ. t. k. Neuholland.
lineariaefolia Don (= *longifolia* Hort. = *lancifolia* Hort. = *angustifolia* Hort. = *Chorizema lancifolia* et *longifolia* Hort.).
oxylobioides Meisn., schmalblattähnliche, ħ. t. k. Neuholland, ob kultivirt?
parviflora Benth., kleinblumige, ħ. t. k. Neuholland.
purpurea van Houtte, purpurfarbige, ħ. t. k. Neuholl.
elliptica Vent., *sparsa* Cunningh., v. Oxylobium ellipticum et Pultenaea, p. 578.

Callistemon RBr. (= *Metrosideros* Auct.), Schönfaden, (Bürstenblume).
acerosus Tausch, nadelholzblätteriger, ħ. t. k. Neuholl.
hybridus DC., Bastard-S., ħ. t. k. Neuholland.
intermedius H. Berol., mittlerer, ħ. t. k. Neuholland.
lanceolatus DC. (= *Metrosideros lanceolata* Sm. = *M. citrina* Curt.), β) lophanthus Sweet (= *Metrosideros decora* Salisb. = *M. lophantha* Vent.), γ) latifolius (Hffg.), δ) semperflorens Lodd., ε) myrtifolius (Hffg.).
lilacinus Makoy, lilafarbiger, ħ. t. k. Neuholland.
linearifolius DC. (= *Metrosideros linearifolia* Sims = *rigidifolia* Hffg.).
linearis DC. (= *Melaleuca linearis* Schrad., Wendl. = *Metros. linearis* Sm.), β) brachyphyllus H. Vratisl.
microstachyus Lindl. (= *Calothamnus Baueri* H. Angl. = *Pentagonaster Baueri* Klotzsch).

Digitized by Google

Callistemon

pallidus DC. (= *Metrosideros pallida* Bonpl. = *australis* RBr.), bleicher, ♄. t. k. Neuholland.

phoeniceus Lindl., hochrother, ♄. t. k. Neuholland (Schwanenfluſs).

pinifolius DC. (= *Metr. pinifol.* Wendl. = *M. viridiflora* Cels Nois., non Spgl.).

rigidus RBr. (= *Metrosideros linearis* W. Enum. = *viminalis* Hort.).

rugulosus DC. (= *Metrosideros aspera* Hffg. = *M. glandulosa* Dsf. = *M. macropunctata* Dum. Cours., = *M. rigida* Hort. = *M. rugulosa* W. = *scabra* Colla).

Sieberi DC., Sieber's, ♄. t. k. Neuholland.

viridiflorus DC. (= *C. ruscifolius* Colvill. = *Metrosid. viridiflora* Sm.), β) purpureus Hort. Vratislav.

Callistephus chinensis Nees (= *hortensis* Cass.), Heyneanus DC. (= *Aster indicus* Heyne). Vergl. Aster Sect. IV. p. 98.

Callisthene grandiflora Auct., v. ? Qualea grandifl.

Callithauma Herb., Schönschwertel, Vl. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

angustifolium Hort. belg., schmalblätteriger, 4. Zw. t. w. Südamerika.

Hartwegianum van Houtte, Hartweg's, 4. Zw. t. w. Südamerika.

spathulatum Herb., spatelförmiger, 4. Zw. t. w. Truxillo.

viridiflorum van Houtte, grünblumiger, 4. Zw. t. w. Südamerika.

Callitris Vent., Schmuckcypresse.

arenosa Sweet, Sandliebende, ♄. t. k. Neuholland.

australis Sweet (= *Cupressus australis* P.), neuholländische, ♄. t. k. Neuholland.

cupressiformis Sweet (= ? *australis* Sbr.), cypressenförmige, ♄. t. k. Neuholland.

Preissii Miquel, Preis's, ♄. t. k. Neuholland.

pyramidalis Sweet, pyramidenförmige, ♄. t. k. Neuholl.

quadrivalvis Vent. (= *Fothergilli* Hort. = *macrostachya* Hort. = *triquetra* Hort. = *Cupressus triquetra* Lodd. p. 240, = *Cupressus Fothergillii* Hort. = *Fresnelia Fontanesii* Mirb. = *Thuja articulata* Vahl, Dsf.),

Callotropis tricolor G. Don, v. Galega tricolor, p. 342.

Calobotra cytisoides Eckl., Zeyh., v. Lebeckia cytisoides, p. 450, *C. pulchella* Eckl., Zeyh., v. Crotalaria purpurea, p. 235.

Calochortus Pursh, Benth., Dougl., Graslilie.

Barnardi Dougl., Barnard's, 4. Zw. k. f. b. Californien.

vestitus Benth., bekleidete, 4. Zw. k. f. b. ? Californien.

Douglasianus Schult. fil. 4. Columbia, ist nach Kunth eine nicht hinlänglich bekannte Art.

Bonplandianus Schult. fil., *elegans* Pursh, *flavus* Schult. fil., *fuscus* Schult. fil., *pallidus* Schult. fil., v. Cyclobothra purpurea, elegans etc.

Calonyction Choisy, Nachtwinde, V. 1., Convolvulaceae.

grandiflorum Choisy (= *Jacquinii* Don = *Convolvulus grandiflorus* Desr., Jacq., non L. = *C. Tuba* Schltdl. = *Ipomoea latiflora* R. et S.), groſsblumige, ♂. ♄. Sch. w. Ost- und Westindien.

Digitized by Google

Calonyction
speciosum Choisy[1]), prächtige, ⊙. Sch. w. m. Japan, Ostindien, Südamerika.
α) vulgare (= *Ipomoea bona nox* L., p. 418 = *I. longiflora* W. E. = *I. latiflora* Bot. reg. excl. Synon. = *I. Roxburghii* Steud. = *Quamoclit longiflora* Don = *Convolvulus macrosolen* Spgl.).
β) muricatum Choisy (= *Convolvulus muricatus* L. = *Ipomoea muricata* Jacq., p. 420 = *I. turbinata* Lagasca = *I. bona nox* β) bot. reg.
γ) pubescens Choisy (= *pseudomuricat.* Don = *Rheedii* Colla = *Convolvulus grandiflorus* L. Suppl., W., non Jacq. = *Ipomoea grandiflora* Lam. = *Ipomoea pseudomuricata* Lk.).
δ) laeve Choisy (= *Ipomoea longiflora* RBr. = *I. macrantha* R. et S. = *Convol. longiflorus* Spgl.).
ε) macrantholeucum Colla.

Calophaca Fisch., Schönlinse.
Hovenii Schrenk, C. A. Mey., Hoven's, 4. ♄. f. Asiat. Rufsland.
juncea Fisch. et Mey., simsenförmige, 4. ♄. f. Sibirien.

Calophyllum L., Schönblatt.
spurium Chois., DC. (= *apetalum* W., *Calaba* L., non Jacq. = *calabioides* Don = *Inophyllum* var. Wall. = *Wightianum* Wall.).

Calosanthes Blume, Prachtbignonie, XIV. II., Bignoniaceae.
indica Blume (= *Bignonia indica* L. var. α Blume = *B. pentandra* Lour. = *B. tuberculata* Roxb. = *Spathodea indica* P. = *S. pentandra* Hook., p. 775), indische, ♄. w.

Calostemma aureum Lk. = luteum.

Calothamnus LaBill., Schönstrauch.
eriocarpa Lindl., wollfrüchtiger, ♄. t. k. Neuholland.
Hügelii Schauer (= *quadrifida* Endl., non RBr.), Hügel's, ♄. t. k. Neuholland.
lateralis Lindley (= *longifolia* Lehm., *longissima* Hort.), seitenblumiger, ♄. t. k. Neuholland.
planifolia Lehm., flachblätteriger, ♄. t. k. Südwestl. Neuholland.
α) angustifolia, β) latifolia.
quadrifida RBr. (= *purpurea* Endl. = *Billotia acerosa* Colla).
robusta Schauer (= *Knightii* Hort.), starker, ♄. t. k. Neuholland.
Schaueri Lehm., Schauer's, ♄. t. k. Mittägl.-westl. Neuh.
Calotheca arabica Spgl. etc., v. Aeluropus arabicus etc., p. 11. 11.
Calpurnia aurea Benth., *capensis* Benth., *intrusa* E. Mey., *robinoides* E. Mey., *sylvatica* E. Mey., v. Virgilia aurea, capensis etc., p. 852.

Caltha L., Dotterblume, XIII. VI., Ranunculaceae.
sagittata Cav. (= *multicapsularis* Soland.), pfeilblätterige, 4. f. Falklandsinseln.

Calycanthus L., Gewürzstrauch (Kelchblume).
philadelphicus Noisett., philadelphischer, ♄. f. Nordamerika.
prunifolius Sweet (= *carolinianus* Hort.).

1) „Species mirifice varians" Choisy.

Digitized by Google

Camellia

Ramelina (= *Semmelliana*), Empereur Alexandre Sloane, Emperor Davies, erecta, Esperia, Estheri, Exquisite Hugh Low [1]), exultans, Fabio Massimo, Fairleyi, Fanny Esler, fasciculata, fasciculata venosa, fastuosa d'Italie, faustina, Feastii, Felicita, fimbriata alba et rubra, flammea, Florentina nova Sloane et superba, foliosa, Forbesii Low., Foordii (= *decoonien-sis*), formosa, fornarina, fortuita, francofurtensis, Fré-déric le grand (= *Fleyi Leddig.*), Frostii Buist., fulgens plenissima (= *fulgens d'Italie, Plutonis, ful-gens nova*). Futtung (= *Reevesiana*, = *speciosa*, = *Bozzata*, = *Parksii vera*), Galathea, Gallesii, Gal-luppi Caracciolo, Garnieri, Général Washington, geome-trica, Ghittina, Gielsii (= *Nancy Dawson*, = *Dark opcinea*, = *Dark crimson*, = *Reevesii carminea*), Giulio d'Italie, Gioberti Carraccioli, Giocanda, globe crimson Sloane, globosa cucchea et rosea, Gloria delle Isole Borromee, Gloria del Verbano, gubernа-tiva, Goffredo, Gozzi, Grand Caldesera, Grande Du-chessa d'Etruria, Grand Napoléon Sloane, Gregorii, Greppo di Salomona, Grossii, Grumelli, Gionone, Gu-thriana, guttata (= *Sabiniana*), Hamptonii, Hannah Moore, Harrisonii, Haylockii, Hebé, Hélène, Hench-manniana, Hendersonii (= *Lomberdii*), Henri Favre, heteropetala alba (= *British queen* Young) et rubra, hibisciflora, Hookerii Low, Horsfalliae, Hosackii, Houdii, Humboldtiana, Husseissoni, Icaro, imbricata alba, mag-na et tricolor, Imperatrix, imperialis, incomparabilis Chandler, incomparabilis de Nantes s. vera, innocenza, insubria, Isabelle Moens, Jarba, Jaffersonii Buist., Jenny, Jubilee Hugh Low, Juliana (= *Tottediana superba*), Jupiter Smith, Jussieni. (= *Emma Robin*), Kenny, King of the Camellia's (= *spectabilis maculata, Clusii, Linkii*), Kettly nobilis, lactea elegans, lactea nova, Lady Grafton (= *Lady Prettosa*), Lady Henriette, Lady Hill, lainatensis, Lambertii, Landrethii (= *Jacksonii*), Lariense, latifolia, Lawrenceand d'Ame-rique, Lawrenceana d'Italie, Leda, Leeana superba (= *Pulvars Boali des Anglais, coccinea magna* = *Sieboldtii*), Lefebvriana, Leonardii d'Italie, Leonidas, Leopoldina d'Italie, Licenza, lilliflora, lineata, superba, Lord Byron, Louckiana, Loudoni, lovely rose, Lowii Hugh Low, Luizia, luteo-alba, Bot. reg., Madame Harrison, Maddalena (= *Magdaleine*), d'Italie, Ma-donna, Maekeni, magnifica (= *alba superba*) et rosea (= *Tancredi*), Maidenblush, Makoyi Hugh Low, Ma-netti, Manzoni d'Italie, Maometto, Marchioness of Exeter, Marco Paolo, Marguerite Gouillon, Maria Do-rothea, Maria Elisa Buist., Maria Luigia di Parma, Maria Padilla, Maria Teresa, marmorata grandiflora, Marshall Wilder Baumann, Martheri, Marthii Buist., Mazuchelli, Medicea nova, Melinda, Melineti de Nan-tes, Mérope d'Italie, Meteor Harrison, Metrohesson, mignons, Mile End, Milleni, minieta striata, minuta, Mira d'Italia, Mistriss Uboldi, modesta rosea et rubra Grü-neberg, Moensii, Monterchi, John Hallay, monstrosa Low, Montblanc Boddaert, Montii nova, Montironi,

1) Hybryde von Camellia Sasanqua et japonica imbricata.

Camellia

Muller d'Italie, Murrayana vera, mutabilis Cunningh., mutabilis Traversi, myrtifolia alba (= *albicans*), Napoléon de Fresne, Napoleone d'Italia, Nassiniana, Negrii, Nemesis, neoboracensis, Nettuno, nitida Chandler, nivalis, nivea Loddig (= *lactea* de Young = *delectabilis*), nobilissima et simplex, ochroleuca, odorata novissima, Orfeo, Orlando, ornata coccinea, Orsolini, osburnea, Palagii, Palatinus hungaricus, Palladio, papilionacea, Paride, Parinii de Casoretti et Parinii de Mariani, Parkeri, Parthoniana, Pavolini, Pawlikowskii (= *rosea plenissima*), Paxtonii, Peintres, pendula, penicillata, peregrina, Perfection Palmer, Perpentii d'Italie, personata, philadelphica, pictorum coccinea (= *Jamma*) et rosea, picturata, Pinetti, Pirzio, Pisani, Pizzato, platypetala, plicatilis, Pluto, pomponia aurea d'Italie et grandiflora, Porta Casoretti, Powhattan Floy, Pratti, praeclara, praeexcellentissima, Press Eclipse (= *regina gallicarum*), Preston's Eclipse, Prince Albert Chandler (= *Altertii*) [1]), Prince of Wales, Princesse Baciochi, Princesse Marie van Houtte, Princess royal Low, Princess Sophie de Caters, Proserpina, Pulaski, pulcherrima striata, punctata (= *imperialis* Grays, = *invincible* = *splendida*), punicaeflora, purpurea nova, Queen of England Filder, Queen of great britain, Queen Victoria Priestley, Rachel Ruisch, radiata Sloane, Ralemona d'Italie, ranunculiflora striata, Rapallino, Redaellii, Redii, regalis, Regina d'Inghilterra, Reginae, reine de Fleurs Donkelaar, resplendens, Rhadamante, Richardii, Ridente, Ridolfii Marchese, Rising sun Mourant, Ristori, Rival, Robertsoni, Romagnesi, rosa punctata, Rosea Denholm, elegans et nova, Rosetta, Rothschildiana Gruneberg, Rubens Moens, rubescens Low, rubescens striata, rubina, rubra venusta, rugosissima major (= *graciosa*), Saccoli et nova, Saffo, salicifolia Floy (= *crassiflora*), Santiniana et speciosa, Sarah Frost, sarniensis vera Mourant, Schachkoenigin (= *Princesse royal* Grüneberg), Scilla, scintillans, semiduplex Andr., serratifolia, Servii d'Jtalie, Sherwoodii, Sophia d'Italie, Soulangiana plenissima d'Italie, Sovereign Hugh Low, spectabilis, spiralis, splendidissima alba, Spofforthii alba, squamosa, staminea, Sterope, Strassaldo, striata (= *variegata*), striped major, Strombio, sulcata, superba Palmer (= *Vandesiana carnea*, *Palmers carnea*, *Palmers superba*, *dulcis major*, *agathiflora*, *Chandlers magnificent*), Susanna (= *Nicholsii*, = *pictorum striata*), Swertii, Sylvia d'Italie, symmetrica, Tamponeana, Therpsicore, Tercii (= *Terziana*), Teutonia Grüneberg, theophylla striatiflora, Theresiana, Thompsoni superba, Tommasinii, Tornielli d'Italie, Tosi, Tourresiana, Traversii et plenissima, triphosa, Trotti, Tsubachii, tumida, (= *Carswelliana alba*), Turnbullii, Ugoni d'Italie, unica, Valeriana, Vaulini d'Italie, Vaticchii (= *General Zucchi*), Vauxii, venera, venosa, (= *Theresiana*, = *pompon-gris* = *pasoniflora aurea*), verecunda, Verger d'Italie, Vespuzio, vestalis, Vesuvio, Vesillo di Flora, Victoria Antwerpiensis, Victor

[1]) Aus China eingeführt.

Camellia

Hugo, Villageoise (= *Agenorea*), violacea superba (= *exuberans*), virginalis Sloane, virginalis miniata, Virginia d'Italie, virginica Floy, Visconti nova, Visiani d'Italie, Wallichii, waltoniensis, Wardii Floy (= *Floyi* de Brougham), Washingtoniana, Washingtonii, Watsoniana, Wilbrahamii, Wildiana, Wilhelmshöhe, William de IV., Woodsii alba, Youngii, Zeffiro, Zoli (= *Zali*), etc. etc. [1]).

laxa Hort., Hamburg., lockere, ħ. t. k. ?

nepalensis Hort., nepalsche, ħ. t. w. Nepal.

Noch nicht eingeführte:

caudata Wall., geschweifte, ħ. t Ostindien.

drupifera Lour. (= *Mesua bracteata* Spgl.), steinfrüchtige, ħ. t. Cochinchina.

Scottiana Wall., Scotts, ħ. t. Ostindien.

Campanula T., Glockenblume.

alaris H. Berol., geflügelte, 4. Nordamerika.

azurea Soland, himmelblaue, 4. f. Südeuropa.

Barrelieri Marnock (non Presl), Barrelier's, 4 f. Italien.

cana Wall., graue, ♂. 4. k. t. Ostindien.

eximia Wender., ausgezeichnete, 4. f. ?

Hohenackeri Fisch., Mey. et Lallem., Hohenacker's, 4. f. Caucasus.

laniflora Hornem., wollblumige, 4. f. ?

latifolia L., δ) natolica Fisch., Mey. et Lallem.

Lostritti Tenore, Lostrittis, 4. f. Campania.

plicatula Dumort., faltige, 4. f. Belgien.

rubra J. Booth, rothblumige, 4. f. ?

Stevensi MB. var. altaica Fisch. et Mey.

alburnica Brigant. = trichocalycina, *hispida* Fisch. = lactiflora, *hispida* Portensch. = Morettiana, *hortensis* Meerb. = ? rapunculoides, *muralis* Portenschl. = Portenschlagiana, *Perpentiae* Mor. Trevir. = Rainerii. *Campanuloides subulata* H. Kew., v. Lightfootia subulata, p. 462.

Campderia sicula Lagasc., v. Kundmannia sicula.

Campelia L. C. Rich., Campelia.

Boucheana Schult. fil. (= *Tradescantia marginata* Bouché (non Blume). Bouché's, 4, w. ?

glabrata Kunth, kahle, 4. w. ? Südamerika.

mexicana Mart., mexicanische, 4. w. Mexico.

Pseudo-Zanonia Kunth, (var. Zanoniae ?) unächte, 4. w. ?

Zanonia L. C. Rich. (= *Zanonia bibracteata* Sthg. = *Commelina Zanonia* L. = *Tradescantia Zanonia* Sw.).

marginata Blume et mollissima Blume, 4. Java, werden wahrscheinlich nicht kultivirt.

Campella caespitosa Lk. et *media* Lk., v. Aira caespitosa et media, p. 26.

Camphora N. E., Kampherbaum, IX. 1.

chinensis N. E. (= *Laurus chinensis* H. Berol.), chinesischer, ħ. k. China.

officinarum Bauh. (= *officinalis* N. E. = *Cinnamomum Camphora* Sweet, Fr., N. E. jun., p. 197 = *Persea Camphora* Spgl. = *Laurus Camphora* L.), gebräuchlicher, ħ. k. Japan, China.

β) gracilis (= *Cinnamomum gracile* Sweet, p. 197 = *Laurus gracilis* H. Berol.).

---

1) Bei mehren ist auch der Name des Autors und Züchters, als Caraccioli, Grüneberg, van Houtte, Lecchi etc. angegeben.

Digitized by Google

Champhoromyrtus Schauer, Camphermyrte, VIII. 1., Myrtaceae.

Brownii Schauer (= *Baeckea camphorata* B. Br. p. 109), Brown's, ħ. t. k. Neuholland.

Champhoreama acuta L., v. Halicmocnemis juniperina.
Camptosorus Lk., v. Asplenium Sect. III. p. 50. II.

Campuloclinium DC., Nesseldost, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

macrocephalum DC. (= *Eupatorium macrocephalum* Less.), grofsköpfiger, 4. w. Brasilien, Mexico.

urticaefolium DC. (= *Eupatorium urticaefolium* Mut. L. fil., p. 320).

viridiflorum Bartl., grünblumiger. 4. ħ. w. Brasilien.

Campulosus falcatus P. B., v. Harpochloa capensis.
Campylia blattaria Sweet, *cana* Sweet, *carinata* Sweet, *coronopifolia* Sweet, *elata* Eckl. Zeyh., *elegans* Sweet, *holosericea* Sweet, *laciniata* Sweet, *Oenothera* Sweet, *tricolor* Eckl., Zeyh., *verbasciflora* Sweet, v. Pelargonium blattarium, canum etc., *variegata* Sweet = Pelargonium marginatum.
Campyloneuron Presl, *brevifolium* Lk., *caespitosum* Lk., *decurrens* Lk., *Phyllitidis* Presl, v. Polypodium, Sect. III.
Camutia perfoliata Bonato, v. Melampodium perfoliatum, p. 505.

Canarium L., Canarium, VI. 1., Terebinthaceae.

commune L. (= *C. Mehenbethene* G. = *zephyricum* W. = *Amyris zeylanica* Retz = *Balsamodendron zeylanicum* Kunth, p. 110 = *Bursera paniculata* Lam. = *Calophonia mauritiana* DC.), gebräuchliches, ħ. w. Molucken.

Canavalia DC., Canavalie.

Gaudichaudiana Hort. belg. (= *bonariensis* Hort.), Gaudichaud's, ħ. Sch. w. Ostindien.

obtusifolia DC. (= *emarginata* G. Don = *Bauerlana* Endl. = *maritima* A. Pet. Th. = *miniata* DC. = *rosea* DC. = *rutilans* DC.).

paranensis Hook. Arn. (= ? *bonariensis* Lindl.), paranische, ħ. Sch. w. Chili, Brasilien.

Candarum Rchb., *C. Roxburghii* et *Hookeri* Schott, v. Amorphophallus campanulatus, p. 33. II.

Candollea LaBill., Candollea.

Brunonis Benth.

Cunninghami Benth. (= *Hibbertia Cunninghami* Hook. p. 394).

racemosa Endl., traubige, ħ. t. Neuholland.

tetrandra Lindl. (= *cuneiformis* Hort.), viermännige, ħ. t. Neuholland (Schwanenfluſs).

Candollea setacea LaBill., v. Stylidium graminifolium, p. 792.

Canna L., Blumenrohr [1]).

I. Eurystylus Bouché.

flaccida (Salisb. Roscoe), (= *glauca β flaccida* W.).

Reevesii (Lindl.).

II. Canna Bouché.

cinnabarina Bouché, hellrothfarbiges, 4. w. Mexico.

concinna Bouché, nettes, 4. w. ?

1) Nach P. C. Bouché.

Digitized by Google

Canna
densifolia Bouché (= *densiflora* Hort.), dichtblätteriges, 4. w. China.
exigua Bouché, kleines, 4. w. Nepal.
Fintelmanni Bouché, Fintelmann's, 4. w. ?
flavescens Lk. (= *orientalis* var. *flava* Rosc.).
floribunda Bouché, blüthenreiches, 4. w. ?
formosa Bouché, schönes, 4. w. Brasilien.
fulgida Bouché, leuchtendes, 4. w. Insel St. Bartholom.
gigantea Dsf. (= *latifolia* Rosc. = *iridiflora* W. Enum. Suppl. non R. et P.).
laeta Bouché, freudiges, 4. w. ?
leucocarpa Bouché, weifsfrüchtiges, 4. w. Mittägl. Amer.
longifolia Bouché, langblätteriges, 4. w. Mexico.
maculata Lk. (= *pallida* var. Rosc.).
Moritziana Bouché, Moritz's, 4. w. Caracas.
nepalensis Wall.
orientalis Rosc. (= *chinensis* W. = *indica* Roxb.).
pallida Rosc. (= *communata* Bouché).
paniculata R. et P., rispiges, 4. w. Peru.
pedunculata Sims (= *Buechii* Weinm. = *reflexa* N. E. Mart.).
Poeppigii Bouché, Poeppig's, 4. w. Südamerika.
portoricensis Bouché, portoricensisches, 4. w. Portorico.
pulchra Bouché, (= *orientalis* Bouché), hübsches, 4. w. Ostindien.
recurvata Bouché, zurückgekrümmtes, 4. w. ?
Schlechtendaliana Bouché, Schlechtendal's, 4. w. ?
spectabilis Bouché, ansehnliches, 4. w. ?
stricta Bouché, steifes, 4. w. ?
surinamensis Bouché, surinamisches, 4. w. Surinam.
variabilis W. (= *carnea* Rosc.).
variegata Bouché, buntes, 4. w. ?
ventricosa Bouché, bauchiges, 4. w. ?
Zweifelhafte oder von H. Bouché nicht beobachtete Arten: angustifolia L., divaricata Klotzsch, Brasil., esculenta Lodd, Südamerika, excelsa Loddig., Brasilien, juncea Retz, lanceolata Lodd., Brasil., liturata Lk., montana Blume, Java, nudata Lodd., pedicellata Presl, Chili. Die übrigen s. p. 156 u. 157 mit Ausschlufs der zur folgenden Abtheilung gehörigen Arten.

III. Distemon Bouché.

brasiliensis Bouché (Rosc.), (= *denudata* var. *brasiliensis* Rosc.).
Jacquinii Bouché (= *C. brasiliensis* H. Vindob.), Jacquin's, 4. w. Brasilien.
Kunzii Bouché, Kunze's, 4. w. Brasilien.
Linkii Bouché.
miniata Bouché.
Ottonis Bouché, Otto's, 4. w. Caracas.
Roscoeana Bouché (= *C. denudata* Rosc.), Roscoe's, 4. w. Brasilien.

Cannabis sativa L. var. gigantea Hort.

Canthium dubium Lindl., v. Diplospora viridiflora.
Capnogorium nobile Bernh., v. Corydalis nobilis, p. 221.
Capnoides albida Bernh., *cava* Mch., *lutea* G., *glauca* Mch., *nobilis* Mch., *rigidula* Bernh., *sempervirens* Borckh., *solida* Mch., v. Corydalis capnoides, bulbosa, lutea, sempervirens et solida, p. 221, *soundens* Mch., v. Adlumia cirrhosa, p. 20.

Digitized by Google

Capnophyllum G., Erdrauchdolde.

africanum G. (= *simplex* Lagasc. = *Cicuta africana* Lam. = *Conium africanum* L., non Jacq.).

Jacquini DC. (= *Conium africanum* Jacq., non L. = ? *Conium rugosum* Thbg.), Jacquin's, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Capnorchis spectabilis Borekh. = Dielytra spectabilis.

Capparis T., Kaper.

acutifolia Sweet (= *acuminata* Lindl. = *chinensis* G. Don), spitzblätterige, ♄. w. t. China.

carissoides Hort. Mackoy, Carissaähnliche, ♄. w. ?

comosa Jacq., schopfige, ♄. w. Domingo.

conferta Mill., gedrängte, ♄. w. Carthagena.

elaeagnifolia Hort. anglor., Oleasterblätterige, ♄. w. t. China.

Loddigesii Steud. (= *undulata* Lodd., non Zeyh.), Loddige's, ♄. w. ?

peduncularis Presl, langstielige, ♄. k. t. Sicilien.

puberula DC., feinhaarige, ♄. w. Südafrika.

racemosa Mill., traubige, ♄. w. Südamerika.

undulata Zeyh., (non Loddig.), wellenblätterige, ♄. w. t. Cap der guten Hoffnung.

viridiflora H. B. K., grünblumige, ♄. w. Cumana.

Unbestimmtere: arborea Hort., inermis H. Cels., latifolia Hort. Nymphenb., *aculeata* L. (= *sativa* P.), = *spinosa*, *aegyptiaca* Sieb. (= ? *rupestris* Sibth. Sm.) = Fontanesii, *capensis* Thbg. = citrifolia, *cordifolia* Lam. = *mariana*, *ferruginea* Sieb. = amygdalina, *siliquosa* L. = Breynia.

Capraria lanceolata L. Suppl. (= *salicifolia* Lk. et Otto) et *undulata* L. Suppl., v. Freylinia cestroides et undulata.

Capsicum T., Beifsbeere, (spanischer Pfeffer).

angulosum Mill. (= *Tournefortii* Bess., *annuum* δ Mart.), β) conicum Auct. (= *africanum* Mill.), γ) ovale Auct.

annuum L., β) rugulosum, γ) acuminatum, δ) subangulosum, ε) cerasiforme, ζ) abbreviatum, η) olivaeforme Mill., ϑ) fructibus abbreviatis rubris Hort. Petropol. ι) fructib. fuscescentibus, κ) fructib. nigro-luteoque variegatis H. Petropol.

baccatum L., β) microcarpum DC. (= *ciliare* W. E.), γ) darfuricum H. Genev.

bicolor Jacq. (= *violaceum* Hort. Madrit. = *nigrum* W. E.), β) purpureum Hornem.

cerasiforme W. E., β) minus Bess. Cat. Hort. Kazm.

ceratocarpum Fingerh., hornfrüchtige, ♂. ♄. w. ?

cereolum Bertol., brasilianische, ♂. ♄. w. Brasilien.

Chamaecerasus N. E. (= *cerasiforme* Poir. nec W. = *purpureum* Wall.), kirschfruchtähnliche, ♂. ♄. w. Ostindien.

conicum Mey., kegelfrüchtige, ☉. f. m. Essequebo.

conoideum Mill. (= *conicum* Lam. non Mey. = *annuum* var. *erectum* Mart. = ? *cerasiforme macrocarpum* Bess.), kegelähnliche, ☉. ♂. w. m. Ost- und Westindien.

β) sulcatum, γ) chordale.

cordiforme Mill. (= *cordatum* Camerar.), β) subangulosum, γ) majus, δ) minus, ε) olivaeforme, ζ) globosum (et var. fruct. conicis flavis et rubris, et fruct. subglobosis flavis et rubris H. Petropol).

cumanense Fingerh. (= *baccatum* H. B. K. non L.), cumanischer, ♂. ♄. w. Cumana.

Digitized by Google

Capsicum

fastigiatum Blume (= *minimum* Roxb. = *frutescens* L. Spec. pro parte), gipfelständige, ♄. w. Ostindien.

frutescens L. H. Cliff. W. E., strauchige, Ost- u. Westind. *β*) minus.

globiferum Mey. (= *baccatum* Rodschied, non L.).

grossum W. E., *α*) pomiforme, (= grossum *a globosum* Bess.), *β*) ovatum (non DC.) (= gr. *β luteum* Bess.), *γ*) cordatum, *δ*) angulosum.

Hamiltonii G. Don (= *violaceum* Dsf. Cat. hort. Par., nec H. B. K.), Hamilton's, ♂. ♄. w. Ostindien.

longum DC. H. Monspel. (= *annuum* W. Hort.), *β*) incrassatum, *γ*) latum, *δ*) rectum et varietates H. Petropolit.: fructibus breviorib. atroviolaceis, aurantiacis, flavis, fuscescentibus, nigris, rubris, fructib. gracilibus flavis et rubris (= *C. tereticulum* Savi); fruct. incrassatis flavis et miniatis; fructib. incurvatis flavis; fruct. rectis luteis.

pendulum W. E., *β*) minus (= *havanense* H. B. K.), Cuba, *γ*) torulosum, Amboina.

pubescens A. Braun, weifshaarige, ☉. m. f. Abyssinien.

pyramidale Mill., *β*) torulosum Hort.

sinense Jacq., sinesische, ♄. w. China.

strictum Fingerh., steife, ☉. m. f. ? Südamerika.

tetragonum Mill. (= *annuum γ* Martyn = *cydoniaeforme* Hort.).

violaceum H. B. K. (= *quitense* W. Herb.), violette, ♂. ♄. w. Quito.

zeylanicum H. Bot. = ? *pruniforme* Brot. = ?

Caragana Lam., Erbsenbaum.

Bungei Ledeb., Bunge's, ♄. f. Altai.

mongolica Fisch., mongolischer, ♄. f. Tatarei.

tragacantheides Poir. (= *macroacantha* Lodd.), *α*) Pallasiana Fisch. et Mey. (= *Robinia tragacanthoides* Pall.), *β*) Bongardiana Fisch. et Mey., *γ*) leucophylla Fisch. et Mey.

Ungewisse Arten (? Gartenhybriden): gracilis Hort., glomerata Hort., parvifolia Hffg., sophoraefolia Fausch, sylvatica Hffg., tenuis Hffg.

Caralluma RBr., Caralluma.

fimbriata Wall., gewimperte, ♄. 4. w. Ostindien.

umbellata Haw., v. Bucerosia umbellata, p. 80, II.

Cardamine T., Schaumkraut.

chenopodiifolia Juss. P., gänsefufsblätteriges, ☉. f. Südamerika.

dasyloba Turcz., Bernh. (= *macrophylla* var. Auct.), haarzipfelige, 4. f. Sibirien.

dentata Schult. (= *uliginosa* MB. = *sylvatica* Bess. = *buchtormensis* W.), gezahnte, ♂. 4. f. Osteuropa, Sibirien.

flaccida Chamiss. Schltdl., schlaffe, 4. k. Chili.

Engelmanniana H. Berol. (= *Ludoviciana* Hook.), v. Arabis Ludoviciana, p. 41, II.

Cardaminum Nasturtium Mch., v. Nasturtium officinale, p. 543.

Cardaria amplexicaulis Desv., *crassifolia* Spach, *Draba* Desv. (= *Cochlearia* Spach), *latifolia* Spach, v. Lepidium amplexicaule etc., p. 454.

Cardiaca arvensis Lam., v. Stachys arvensis, p. 780, *crispa* Mch., *Marrubiastrum* Schreb., *vulgaris* Mch.

Digitized by Google

(= *Stachys* Medic.), v. Leonurus crispus, Marrubiastrum et Cardiaca, p. 453.
Cardiolepis dentata Wallr., v. Lepidium Draba, p. 454.

Cardiospermum L., Herzsaame.
corycodes Kunze, helmähnlicher, ⊙. Sch. w. Cuba.
molle H. B. K. = pubescens Lagasca.
Cardiotheca pubescens Ehbg., v. Anarrhinum pubescens, p. 34, II.

Carduus T. G., Distel.
acanthocephalus C. A. Mey., bärenklaublätterige, ♂. f. Caucasus.
acanthoides L. (= *axillaris* Gaud. = *crispus* Huds. = *polyacanthus* Curt. Schreb.), β) squarrosus Rchb., γ) collaris Rchb., δ) horridus Rchb.
acicularis Bertol., nadelähnliche, ⊙. f. Italien.
adpressus C. A. Mey., angedrückte, ♂. f. Caucasus.
albidus MB. (= *argentatus* W. Herb. = *pycnocephalus* Pall. = *tenuiflorus* β DC.), weifsliche, ⊙. f. Taurien, Caucasus.
Barrelieri H. Par. (= *Cnicus Barrelieri* Zeyh.), Barrelieri's, 4. f. ? Südeuropa.
callosus Steud. (= *Cnicus callosus* Roth et *discolor* Roth), schwielige, ⊙. f. ?
Candollei Moretti (= *arenarius* DC. fl. fr. = *litigiosus* Nocca et Balbis = *montanus* Suffr.), Candolles, ♂. f. Frankreich, Italien.
cephalanthus Moris, Visian. (= *congestus* Gussone = *pycnocephalus* Spgl.), dichtköpfige, ♂. f. Sardinien.
confertus Moris, gedrängte, ♂. f. Sardinien, Spanien.
β) purpureus DC.
desertorum Fisch., Wüsten-D., ♂. 4. ? Sibirien.
fasciculiflorus Vivian (= *Morisii* Balb.), büschelblumige, ♂. f. Corsica, Sardinien.
laxiflorus Tausch (= *defloratus* L. var. Rchb.), lockerblumige, 4. f. Oestreich.
multiflorus Gaud. (= *nutans* β DC. = *polyanthemos* Schlchr.), vielblumige, ♂. f. Schweiz.
myriacanthos Salzm., tausendstachelige, ⊙. ♂. f. Nordafrika.
sardous DC, (= *litigiosus* Moris), sardinische, ♂. f. Sardinien.
sibiricus Hort., sibirische, ⊙. f. Sibirien.
tenuiflorus Curt. Sm., α) acanthifolius DC., γ) pycnocephalus DC. Jacq. hort. Vindob. ? L. (= *microcephalus* Gaud.) [1]).
Thoermeri Weinm., Thoermer's, ♂. f. Rufsland.

Carex Michel. Dillen, Segge, Rietgras.
atrofusca Steven, schwarzbraune, 4. f. Caucasus.
Bastardiana DC. (= *alba* Bast.), Bastard's, 4. f. Frankreich.
Blyttii Fr., Blytt's, 4. f. Norwegen.
borealis Lang, nördliche, 4. f. Norwegen.
caespitosa L. (= *stricta* Gooden).
camtschatcensis Kunth (= *longerostrata* C. A. Mey.), kamtschatkaische, 4. f. Kamtschatka.
caucasica Steven, caucasische, 4. f. Caucasus.

---

1) p. 161 sind daher bei C. tenuifolius die Var. β et γ zu streichen.

Digitized by Google

cherokcensis Swein. Torrey (= *recurva* Mühlbg., non Steven), cherokcische, 4. f. Nordamerika.
commutata Gay (= *acuta* Mühbg. = *verrucosa* Schweinitz, Torrey), verwechselte, 4. f. Nordamerika.
coriophora Fisch. et Mey. (= *maculata* Turcz. = *astulata* γ Ledeb.), wanzentragende, 4. f. Dahurien.
costata Presl, gerippte, 4. f. Böhmen.
cristata Schweinitz (= *lagopodioides* Schk.), kammähnähnliche, 4. f. Nordamerika.
cuspidata Wahlbg., langspitzige, 4. f. Norwegen, Schweden.
decipiens Gay (= *macrostyla* Lapeyr.), täuschende, 4. f. Pyrenäen.
Deweyana Schweinitz (= *remota* Richards.), Dewey's, 4. f. Nordamerika.
diluta MB. (= *axillaris* H. Berol. = *extensa* C. A. Mey.), hellgrüne, 4. f. Iberien, Caucasus.
Drejeri Lang (= *pacifica* Drejer = homalocarpa Peterm.), Drejer's, 4. f. Deutschland, Dänemark.
b) neglecta Peterm.
duriuscula C. A. Mey. (= *stenophylla* Less.), härtliche, 4. f. Sibirien, Kamtschatka.
emarginata Schk. (= *caryophyllata* Gmel. ? = *praecox* Poll. = *montana* L. var. Spgl.), ausgerandete, 4. f. Ungarn.
enervis C. A. Mey., nervenlose, 4. f. Altai.
eriophora Fisch., wolltragende, 4. f. Dahurien.
erythrostachys Hoppe, rothährige, 4. f. Litorale.
filipendula Drej., fadighängende, 4. f. Island.
β) variegata Drej., γ) concolor Drej.
fimbriata Schkhr. (= *fuliginosa* Host, = *hispidula* Gaud.), gewimperte, 4. f. Oestreich, Schweiz.
folliculata L., balgfrüchtige, 4. f. Nordamerika.
Fraseri Andr. (= *Frasseriana* Ker, Nutt. = *Lagopus* Mühlbg. ? = *Mapania sylvatica* Pursh.).
genuensis DC., genuesische, 4. f. Genua.
glaucescens Elliot (= *inundata* W. Herb. = *semperviren* Schweinitz = *verrucosa* Mühlb.), blaugrünliche, 4. f. Carolina, Georgien.
Goodenovii Gay. (= *caespitosa* Good. Auct., nec L. = *vulgaris* Fr.), Goodenough's, 4. f. Europa.
Grahami F. Boot, Graham's, 4. f. Schottland.
guestphalica Bönningh. (= *divulsa* Good. var.), westphälische, 4. f. Deutschland.
haematolepis Drej., blutschuppige, 4. f. Grönland.
hordeiformis Whlbg. nec Host. (= *hordeistichos* Vill. = *secalina* W. non Wahlbg.), 4. f. Frankreich, Caucasus.
Hosteana DC. (= *fulva* Host = ? *Hornschuchiana* Auct.), Host's. 4. f. Oestreich.
leiorrhyncha C. A. Mey. (= *nemorosa* H. Berol.), glattschnäbelige, 4. f. Dahurien.
lepidocarpa Tausch (= *lipsiensis* Peterm.), schuppenfrüchtige, 4. f. Deutschland.
macrolepis DC. (= *platystachya* Tenore), grofsschuppige, 4. f. Italien.
Mairii Germ. et Coss., Maire's, 4. f. Frankreich.
marginata Mühlbg. (= *pensylvanica* Lam.), berandete, 4. f. Nordamerika.

Digitized by Google

melanantha C. A. Mey., schwarzblumige, 4. f. Altai.
microstyla Gay. (= *lobata* Schlchr. Th.), kleingriffelige, 4. f. Schweiz.
Moenchiana Wender. (= *ambigua* Mch.), Mönch's, 4. f. Deutschland.
multiflora Mühlbg. (= *bracteosa* Schweinitz = *microsperma* Wahlbg. = *polymorpha* Swtz.).
nardina Fr., borstengrasähnliche, 4. f. Grönland.
nubigena Don, nepalsche, 4. k. f. b. Nepal.
obtusata Liljebl. (= *affinis* Dewey, non RBr. = *microcephala* C. A. Mey.), stumpfe, 4. f. Oeland.
Ohmülleriana O. F. Lang, Ohmüller's, 4. f. Baiern.
pariflora C. A. Mey. (= *melanocephala* Turcz.), 4. f. Caucasus, Sibirien.
pedata L. (non Auct.), fufsförmige, 4. f. Lappland.
pediformis C. A. Mey., fufsähnliche, 4. f. Sibirien, Kamtschatka, Nordchina.
pubescens Mühlbg. Schk., weichhaarige, 4. f. Nordamer.
punctata Gaud. (= *Balbisii* Spgl. = *corsicana* Lk. = *helvetica* Schlchr.).
pyrenaica Wahlbg. (excl. Synon. Schk.) (= *acutissima* Degl. = *Davalliana* Dewey = *densata* Lapeyr. = *Fontanesia* DC. = *Marschandiana* Lapeyr. = *pulicarioides* Ramond = *Ramondiana* DC.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen, Nordamerika.
repens Bellardi (= *arenaria β repens* Wahlbg.), kriechende, 4. f. Italien, Wallis, ? Deutschland.
retroflexa Schkhr. Mühlbg., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.
rhynchocarpa Heuff., schnabelfrüchtige, 4. f. Ungarn.
rhynchophysa Fisch., Mey. et Lallem., schnabelblasige, 4. f. Dahurien, Caucasus, Norwegen.
rostrata Mühlbg. (= *tentaculata* Mühlbg.).
scoparia Sck. W. (= *arida* Schweinitz et Torrey = *ovalis* W. Herbar. = *leporina* Mchx. = *muskirguinensis* Schweinitz = *viridula* Mchx.).
secalina Wahlbg. (= *hordeiformis* Host, non Wahlbg.), Mähren, Unteröstreich, Ungarn, Litorale.
sparganioides Mühlbg., igelskopfähnliche, 4. f. Nordamerika.
sparsiflora Liljebl. (= *panicea β sparsiflora* Wahlbg.), zerstreutblumige, 4. f. Grönland, Schweden, Norddeutschland.
spectabilis Dewey, ansehnliche, 4. f. Nordamerika.
spicata Schk. (= *pyrenaica* Auct. non Wahlbg.), ährige, 4. f. Sachsen.
squarrosa L. (= *typhina* Mchx. = *typhinoides* Schweinitz), sparrige, 4. f. Nordamerika.
triceps Mchx. (= *hirsuta* W. = *viridula* Schweinitz Torrey.), dreiköpfige, 4. f. Nordamerika.
tristis MB. (= *ferruginea* Steven = *stenocarpa* Turcz. = *frigida* All. var.), traurige, 4. f. Caucasus.
umbellata Schkhr., doldige, 4. f. Nordamerika.
Willdenowii Schkhr. (= *Jamesii* Schweinitz), Willdenow's, 4. f. Nordamerika.
xanthophysa Wahlbg. (= *rostrata* Mchx. = *folliculata β xanthophysa* Mühlbg. = *longocarpa* W. Herbar.), gelbblasige, 4. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Carica digitata Spgl. (= *spinosa* Aubl. = *heptaphylla* Arrabida = *Papaya spinosa* Poir.).

Carissa L., Carissa.

Arduina Lam. (= *Arduina bispinosa* L., p. 75.)

ferox E. Mey. (= *Arduina bispinosa* Lodd. et Hortul., non L.), starkbewehrte, ♄. t. w. Cap d. g. Hoffn.

myrtoides Dsf. (? = *ferox* E. Mey.), myrtenähnliche, ♄. t. w. Cap der guten Hoffnung.

spinarum Lodd. non L., v. Baumannia geminiflora, p. 62, II.

Carlina T., Eberwurz.

Biebersteiniana Hornem. Bernh. (= *nebrodensis* β DC.?), Bieberstein's, 4. f. ? Caucasus.

Carludovica R. et S.

Plumieri Kunth (= *palmaefolia* Sweet = *Salmia palmaefolia* W.), Plumier's, ♄. w. Martinique, St. Domingo.

Carolinea L. fil., Carolinea.

fastuosa Sessé, prächtige, ♄. w. Südamerika.

grandiflora Spach (= *Pachira grandiflora* Tussac.), grofsblumige, ♄. w. Antillen.

robusta Lodd., starke, ♄. w. Südamerika.

tomentosa Mart. (= *alba* Lodd. sec. Spach = *villosa* Mart.), filzige, ♄. w. Brasilien.

Carpesium L., Kragenblume.

abrotanoides L., β) Wulfenianum Schreb. Oestr. Litorale.

Carpinus T., Hainbuche.

Betulus L., d. Carpinizza Host. Siebenbürgen.

edentula Kit., zahnlose, ♄. f. Banat.

Carpoceros longiflora Rich., v. Martynia longiflora, p. 498.

Carpodinus RBr., Rundfrucht, p. 167.

acida G. Don, saure, ♄. ♄. Sch. w. Sierra Leone.

dulcis G. Don [1]), süsse, ♄. ♄. Sch. w. Sierra Leone.

Carpolyza Salisb. (*Hessea* Berg.), Carpolyza VI. 1., Nascisseae-Amaryllideae.

spiralis Salisb. (= *Amaryllis spiralis* L'Her. = *Crinum spirale* Andr. = *C. tenellum* Jacq. = *Haemanthus spiralis* Ait. = *H. tenellus* Steud. = *Strumaria spiralis* Ker, p. 791 = *Hessea spiralis* Berg.).

stellaris* (= *Amaryllis stellaris* Jacq. = *Strumaria stellaris* Ker, p. 791 = *Hessea stellaris* Herb.).

Carponema filiformis Eckl. Zeyh., v. Heliophila filiformis, p. 386.

Carpopodium cleomoides Eckl. Zeyh., v. Heliophila cleomoides, p. 386.

Carum L. Spr., Kümmel (Karbe).

burjacticum Turcz., burjactischer, ☉. ♂. f. Sibirien.

hispanicum Mill., spanischer, ♂. f. Spanien.

rigidum K. (= *Selinum appuanum* Vivian. = *rigidulum* Vivian. = ? *Seseli pimpinelloides* L.), starrer, ♂. 4. Italien.

Carya Nutt., Hickorynufs.

porcina Nutt., α) obcordata Sweet, β) ficiformis Mchx. (= *pyriformis* Hort. = *Juglans glabra* Mühlbg.), vergl. p. 168.

---

1) Von den nordamerikanischen Colonisten zu Freetown Sweet pishamin (Diospyros virginica dulcis) genannt.

Digitized by Google

Caryolopha Fisch. et Mey., Trautvett., Kuhzunge, V. i. Asperifoliaceae.

sempervirens Fisch. et Mey. (= *Anchusa sempervirens* L. = *Omphalodes sempervirens* D. Don, p. 557 = *Buglossum sempervirens* All. G.).

Caryopteris Bunge, Flügelkörnchen, XIV. II., Verbenaceae.

mongolica Bunge, mongolisches, 4. ♄. k. Nordchina.

Caryota L., Brennpalme.

Cummingii van Houtte, Cumming's, ♄. w. Ostindien.

Rumphiana Mart. (= *urens* Giesecke), Rumph's, ♄. w. Ostindien.

soholifera Wall. (= *urens* Jacq. nec L.), sprossentreibende, ♄. w. Ostindien.

Casparea Kunth, Casparea, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

acuminata Kunth (= *Bauhinia acuminata* L. p. 115).

porrecta Kunth (= *Bauhinia porrecta* Ait., p. 115).

Casselia N. E., Mart., (F. P. Cassel, deutscher Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.

serrata N. E., Mart., sägezähnige, ♄. w. Brasilien.

Cassella Dumort (= *Platynema* Schrad., p. 634 = *Steenkammera* Rchb.), *C. davurica* Dumort, *denticulata* Dumort, *maritima* Dumort, *paniculata* Dumort, *virginica* Dumort, v. Hippoglossum dahuricum etc.

Cassia T., Cassie.

Absus L. (= *viscosa* Vahl, Roxb. = *Thonningii* DC.).

acutifolia Delil., Heyn. (= *elongata* Lemery = *lanceolata* Wight et Arn. = *ligustrinoides* Schrk.), spitzblätterige, ♄. ♄. t. w. Aegypten, Ostindien.

alata L. (= *bracteata* L. fil. = *herpetica* Jacq. fil.).

angustifolia Lam. (= *amoena* Hamilt. = *mimosoides* β Vogel = *Roxburghii* Grah. = *sensitiva* Roxb.).

arborescens Mill., baumartige, ♄. w. Südamerika.

australis Sims (= *umbellata* Rchb. = *Fraseri* Cunn.).

Barclayana Swt. (= *schinifolia* A. DC.).

Barrenfieldii Colla (= *Fieldii* Steud.), Barrenfield's, ♄. t. Neuholland.

bicapsularis L. (= *sennoides* Jacq. = *limensis* Lam. = *Alcaparillo* H. B. K. = *inflata* Spgl. = *pentagona* Mill.), β) aristata DC. (= *Berteri* Colla = *Collae* G. Don = *Chamaefistula inflata* G. Don).

biflora L. (= *aversiflora* Hook. = *Marimari* Aubl. = *galegifolia* L. = *semperflorens* DC.).

bifoliolata DC. (= *monophylla* Arrabida = *nummularia* Vahl = *pentandra* Radd. = *roduntifolia* P. = *Grimaldia bifolialata* Schrank.).

calliantha W. Mey. (= *Selloi* G. Don = *magnifica* Mart. = *fulgens* Wall. = *multijuga* Wall. = *semifalcata* Vellozo), schönblumige, ♄. w. Brasilien.

Chamaecrista L. (= *pulchella* Salisb.), β) stricta Schrk.

chinensis Lam. (= *grandiflora* P. = *Sophora* L. var. ? Vogel = *Chamaefistula chinensis* G. Don).

chrysoloma Notaris H. Genuens., goldsaumige, 4. Sch. 4. f. b. k. ?

chrysotricha Collad. (= *chrysocarpa* Desv. = *virgata* Rich.), goldhaarige, ♄. t. w. Guiana.

cordistipula Mart., herzafterblätterige, ♄. w. Brasilien.

corymbosa Lam. (= *crassifolia* Ortega = *falcata* Dum.

Digitized by Google

Cassia

Cours. = *bonariensis* Hortul. = *Chamaefistula corymbosa* G. Don).

discolor Desv. (= *oxyadena* DC. = ? *frutescens* Mill.), verschiedenfarbige, ħ. ħ. w. Antillen.

Ehrenbergii G. Bischoff. (= *acutifolia* Fr. N. E.), Ehrenberg's, ħ. w. Aegypten.

floribunda Cavan. (= *corymbosa* Ortega nec Lam. = *Chamaefistula florib.* G. Don), β) elegans H. B. K., γ) Herbertiana Lindl.

florida Vahl (= *sumatrana* Roxb. = *gigantea* Bertero = *Chamaefistula gigantea* G. Don = *Senna sumatrana* Roxb.).

foliolosa G. Don, blattreiche, ħ. ħ. w. Peru.

fraxinifolia H. B. K. (= *cuspidata* W. E.), eschenblätterige, ħ. w. Südamerika.

frondosa Ait. (= *biflora* δ Vogel = *geminiflora* Schrk. = *Crista* Jacq.).

fruticosa Mill., strauchige, ħ. ħ. w. Vera Cruz.

glandulosa L. (= *acuminata* Mch. = *parvifolia* Wend. = *virgata* Sieb.).

glauca Lam. (= *arborescens* Vahl = ? *coluteoides* Colla = *enneaphylla* Koen. = *planisiliqua* Burm. = *sulphurea* DC.).

geminiflora Collad., paarblumige, ħ. ħ. w. Mexico.

glaucescens Hoffg., blaugrünliche, ħ. ħ. w. Cuba.

graveolens Colla (= *emarginata* Bertero, non L.), starkriechende, ħ. ħ. w. Westindien.

hispida Collad. (= *Absus* Aubl. = *hispidula* Vahl).

humilis Collad. (= *obtusifolia* L. var. β Vahl = *Tala* Desv. = *Tora* β L.).

indecora H. B. K. (= *Chamaefistula indecora* G. Don), wenigzierliche, ħ. ħ. w. Südamerika.

β) pendula W. E. (= *Chamaefistula pendula* G. Don = *Reinwardtii* Hort. Bogor.)

laevigata W. E. (= *tropica* Vellozo = *septentrionalis* Zucc. = *grandiflora* Daf. nec P. = *Chamaefistula laevigata* G. Don).

lanceolata Forsk. (= *orientalis* P. = *Senna officinalis* G. = *S. alexandrina* Mill.).

ligustrina L. (= *aegyptiaca* W. E. = *robinoides* W. E. = *bahamensis* Mill. = *marylandica* Mch. non L.).

linearifolia G. Don, gleichbreitblätterige, ħ. w. Brasilien.

macrophylla Kunth, großblätterige, ħ. w. Neugranada.

monantha DC. (= *uniflora* Mill., non Spgl.), einblumige, ☉. m. w. Südamerika.

obliquifolia Schrank, schiefblätterige, ☉. f. Brasilien.

occidentalis L. (= *planisiliqua* L. = ? *caroliniana* Walt. = ? *ciliata* Rafin. = *foetida* Roxb.), α) Sophora L. (= *coromandelina* Jacq. = *chinensis* Jacq. = *torosa* Cav. = *torulosa* et *indica* Poir. = *sophoroides* Collad. = *purpurea* et *esculenta* Roxb. = *Chamaefistula coromandelina*, *Sophora* et *torosa* G. Don = *Senna esculenta*, *purpurea* et *Sophora* Roxb.), β) glabra Vog. (? = *geminiflora* Schrk. H. Monac., vergl. C. frondosa).

polyphylla Jacq. (= *marginata* W. E.).

pulchra H. B. K. (= *Deswauxii* Collad. = *tetraphylla* Desv.), hübsche, ħ. w. Südamerika.

pumila Lam. (= *prostrata* Roxb.).

Digitized by Google

Cassia

racemosa Mill., traubige, ♄. w. Carthagena.
reticulata W. E. (= *dumetorum* Bertero = *strobilacea* H. B. K.).
rostrata Mart., schnabelförmige, ♄. w. Brasilien.
rugosa G. Don, runzelige, ♄. w. Brasilien.
Schimperi Steud. (= *sana* Wender. = *obtusata* Hochst. et Steud.), Schimper's, ♄. w. t. Arabien.
Schultesii Colla, Schultes's, ♄. t. Neuholland.
sericea Sw, (= *sensitiva* Jacq. = *ornithopodioides* Lam.), β) ciliata Nffmg.
speciosa Schrad. (= *micans* W. E.).
stipulacea Ait. (= ? *mexicana* Auct. = *opaca* Grah.).
suffruticosa Koen. (= *speciosa* Roxb.).
tetraphylla Collad. (= *procumbens* Mill., non L.), vierblätterige, ⊙. m. w. Neuspanien.
tomentosa L. (= *cana* Schrk. = *lutescens* G. Don = *multiglandulosa* Jacq. = *pubescens* R. et P. = *Wightiana* Grah.).
Tora L. (= *foetida* Salisb. = *Gallinaria* Collad. = *inodora* Grah. = *obtusifolia* Burm. = *Senna Tora* Roxb.).
venosa Castigl. (= *chamaecristа* L. var. = *triflora* Jacq.), aderige, ⊙. m. w. Westindien.
Vogeliana Schltdl., Vogel's, ♄. t. w. Mexico.
vulgaris Roxb., Fisch., gemeine, ⊙. w. m. Ostindien.
Wallichiana DC. (= *dimidiata* Roxb. = *Lechenaultii* Wall. = *mimosoides* L. var. Vogel) [1].
Unbestimmtere: acisperma Schrk., ♄. ?, amoena Bertero, ♄., chamaecristoides Collad. (= *chamaecristа* Mill., non L.), ♄. Veracruz, eglandulosa Dum. Cours., ♄. ?, elegans Voigt (= *pinnata* Hortul.), ♄. ?, graveolens Colla, ♄. ♄. Guadeloup, hirta W., ♄. ?, homophylla Hffg., ♄. ?, Hornemanni DC. (= *ovata* Hornem. H. Hafn. nec Castigl.), ⊙. ?, Houstoniana Colla (= *biflora* Mill.), ♄. Jamaica, juglandifolia Brotero, ?, Milleri Colladon (= *emarginata* Mill. non L. = *pilosa* L.), ♄. Jamaica, myrtifolia Brotero ?, papulosa Hffg., ♄. Brasil., pulcherrima Dehnh. ♄. Surinam, subpubescens Brotero, torosa Brotero, villosa Mill., ♄. Campech.

Cassine L., Cassine.
oppositifolia Mill., gegenblätterige, ♄. k. ?
carolinіana Lam. (= ? *corymbosa* Mill. = *Peragua* Mill.), v. Ilex vomitoria, p. 414, *humilis* Host., *oleifolia* P. (= *oleoides* Lam.), v. Celastrus lucidus et oleoides, p. 174, *laevigata* Lam., v. Pterocelastrus tricuspidatus, sphaerocarpa Cels = *C. Capoon.*

Cassinia RBr., Cassinie.
aculeata RBr. (= *Calea aculeata* LaBill.), stachelige, ♄. t. k. Van Diemens Land.

Castanea T. G., Kastanie.
chrysophylla Hook., goldblätterige, ♄. k. Columbia.

Castilleja Mutis, Castilleja.
coccinea Spgl. (= *Bartsia coccinea* L. = *Euchroma coccinea* Nutt., p. 318).
grandiflora Spgl. (= *sessiliflora* Pursh, = *Bartsia grandiflora* Spgl. = *Euchroma grandiflora* Nutt., p. 318.

1) Zur Ergänzung und Berichtigung der Synonyme p. 168—170.

Digitized by Google

Castilleja
lithospermoides H. B. K. (= *hyssopifolia* W. Herb.), steinsamenähnliche, ♄. k. Mexico.
longiflora Kunze, langblumige, ♄. k. Mexico.

Casuarina Rumph, Keulenbaum (Casuarstrauch).
Hügeliana Miquel, Hügel's, ♄. t. k. Neuholland.
Lehmanniana Miquel, Lehmann's, ♄. t. k. Neuholland.
repens Sieber, kriechender, ♄. t. k. Neuholland.
Ob von nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: C. microstachya Miquel, obesa Miquel, Preissiana Miquel, selaginoides Miquel, thuyoides Miquel, trichodon Miquel. Sämmtlich ♄. und in Neuholland heimisch. — Unbestimmtere: litoralis Salisb., sparsa Tausch, *excelsa* Salisb. = stricta, *quadridentata* Def. = quadrivalvis, *suberosa* Hort. = torulosa, *verticillata* Lam. = nodiflora.
Catabrosa aquatica B. P., *distans* Lk., *Engelmanni* Lk. etc., v. Glyceria aquatica etc., p. 360.

Catachaetum Hffg. emend. (= *Catasetum* Rich.), Faden- (Borstenstendel), p. 172.
craniomorphum Hoffmg., veränderlicher, 4. Brasilien.
integerrimum Hook., ganzer, 4. w. Guatimala.
lituratum Hffg., bandstreifiger, 4. w. Brasilien.
macrocarpum H. B. K. (= *tridentatum* Hook.), grofsfrüchtiger, 4. w. Cayenne.
maculatum H. B. K., β) viride.
planiceps Lindl., flachköpfiger, 4. w. Südamerika.
purpurascens Hffg., purpurfarbiger, 4. w. Brasilien.
recurvatum Lk. Kl., zurückgekrümmter, 4. w. Südamer.
Russelianum Hook., Russel's, 4. w. Guatimala.
squalidum Hffg., dunkelfarbiger, 4. w. Brasilien.
tridentatum Hook., β) Claveringii Lindl., γ) floribundum Hook., δ) viridiflorum Hook., ε) maximum Hort., ζ) pallidum Hort., η) reflexum Hort.
turbinatum Hffg., aufgetriebener, 4. w. Brasilien.
Noch kommen in den Pflanzen-Catalogen vor: barbatum, Calceolus, ciliare, laminatum.

Catalpa Scop. Juss., Catalpabaum.
bignonioides Scop. (= *cordifolia* Duham. Mch. = *syringaefolia* Sims = *communis* Dum. Cours.).
β) ? Kaempferi DC. (= *ovata* G. Don), γ) pumila.
Bungei C. A. Mey., Bunges, ♄. f. b. China.

Cathartocarpus P., Purgirfrucht [1]).
bacillaris P. (= *Bacillus* Lindl. = *Cassia bacillaris* L., p. 169).
brasilianus Loud. (= *Cassia braciliana* Lam. = *grandis* L. Suppl. = *C. javanica* Aubl. = *mollis* Vahl = *Bactyrilobium grande* Hornem. Lk.), β) ferrugineus G. Don (= *Bactyrilobium ferrugineum* Schrad.).
Fistula P., β) rhombifolius G. Don (= *Cassia rhombifolia* Roxb.).

Cattleya Lindl., Cattleya.
Arembergii Scheidw., Aremberg's, 4. w. Brasilien.
Aucklandiae Lindl., Auckland's, 4. w. Brasilien.
aurea H. Belg., goldfarbige, 4. w. Südamerika.
citrina Lindl. (= *Sobralia citrina* Llave).
crispa Lindl., b) purpurea.
domingensis Lindl, domingoische, 4. w. Domingo.

1) Nach Vogel u. a. nur Unterabtheilung von Cassia.

Digitized by Google

Cattleya
Forbesii (= *isopetala* Hort.), b) pallida.
granulosa Lindl. (= *guttata* β Russeliana Hook.), körnige, 4. w. Brasilien.
guttata Lindl. (= *elatior* Lodd.).
Harrisoniana Batem. Paxton, Harrison's, 4. w. Brasil.
Karwinskii Mart., Karwinsky's, 4. w. Brasilien.
labiata Lindl., b) atropurpurea, β) Mossiae Hook., (= *labiata grandiflora* Hort.).
Loddigesii Lindl. (= *Epidendron violaceum* Lodd.). β) floribus pallidioribus (= *intermedia* Graham.), b) variegata Hook., γ) floribus subalbis (= *intermedia pallida* Lindl. = ? *vestalis* Hffg.).
marginata Lodd., berandete, 4. w. Südamerika.
maritima Lindl. (= *Loddigesii* var. ?), Meerstrand's, 4. w. Südamerika.
maxima Lindl., gröfste, 4. w. Peru.
Perrinii Lindl., Perrini's, 4. w. Brasilien.
Pinellii Hort., Pinelli's, 4. w. Südamerika.
pumila Hook. (= *marginata* Hort. = ? Lodd.).
superba Lindl. (= *Schomburghii* Lodd.), stolze, 4. w. Guiana.
Walkeriana Gardn., Walker's, 4. w. Brasilien.
Noch kommen nachstehende in den Pflanzenverzeichnissen vor: alba, candida, concolor, epidendroides, gigantea, purpurea Lowii.

Caucalis T., Haftdolde.
abyssinica Hochst., abyssinische, ⊙. f. Taurien.
muricata Bischoff, weichstachelige, ⊙. f. Taurien.
Ungewisse: elongata Lk., Gerardi Schwägr., macrocarpa Hort. Turin.
glabra Forsk., v. Daucus pubescens, *nodosa* Crtz., v. Chaerophyllum nodosum, p. 187.
Caulinia fragilis W. (= *Ittnera minor* Gmel.), v. Najas minor, p. 539.
Caulinia rubicunda Moh., v. Kennedya rubicunda, p. 435.

Caulotretus Tenore, Caulotretus, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
eriophorus Tenore (vergl. = Bauhinia eriophora, p. 62, II.), wolltragender, ħ. Sch. w. Mittägl. Amerika.
Cavallium urens Schott, Endl., v. Sterculia urens, p. 787.
Cavanillea philippensis Lam., v. Diospyros Embryopteris, p. 267 [1]).

Caylusea St. Hil., (Graf Caylus franz. Gelehrter), XI. 11., Resedaceae.
abyssinica Fisch. et Mey. (= *Reseda abyss.* Fresen, p. 680).
canescens St. Hil. (= *Reseda canescens* L., p. 680).

Ceanothus L., Säckelbaum.
albiflorus Hort. belg., weifsblumiger, ħ. k. ?
americanus L., β) decumbens Hort. (*macrocarpus* Hort.).
Burmannianus Spach, Burmann's, ħ. k. f. b. ?
buxifolius W., buchsbaumblätteriger, ħ. k. t. Mexico.
collinus Dougl., Hügel-S., ħ. k. f. b. Columbia.
Delilianus Spach, Delil's, ħ. k. f. b. ?
divaricatus Nutt., ausgespreizter, ħ. f. Nordamerika.

1) Cavendishia nobilis Lindl., Vaccinieae, ħ. aus Südamerika, wird wohl kaum kultivirt.

Digitized by Google

Ceanothus

glaber Spach (= *americanus* pl. Autct.), kahler, ħ. f. ? Nordamerika.

Hartwegii ? Hook., Hartweg's, ħ. k. Mexico.

Milleri Tausch (= *americanus* Mill., non L.), Miller's, ħ. f. Nordamerika.

Neumanni Tausch, Neumann's, ħ. f. Nordamerika.

ovatus Dsf. (= *Fontanesianus* Spach = *? perennis* Pursh).

perennis Pursh (= *herbaceus* Raf. = *reclinatus* Pursh).

thyrsiflorus Eschw. (= *divaricatus* Hort., nec Nutt.), straußblumiger, ħ. k. & b. Californien.

Unbestimmtere: macrophyllus Dsf., *dealbatus* Wender. *africanus* L. Mill. (= *Hollia africana* *, p. 280), v. Noltea africana, *globulosus* LaBill. et *spathulatus* LaBill., v. Trymalium globulosum et Billardieri, *Hügelii* Hort., v. Pomaderris Hügelii, *capensis* DC., *paniculatus* Heyne et *zeylanicus* Roth., v. Scutia capensis, paniculata et indica.

Cecropia L., Hohlschaft (Kanonenbaum).

digitata Tenore, fingerförmiger, ħ. w. ? Südamerika.

Cedrela P. Br., Cedrela.

febrifuga Blume (= *C. Toona* Roxb. = *Swietenia Sureni* Blum.), fiebervertreibende, ħ. w. Java.

Cedronella Mönch, Benth., Cedronella.

triphylla Mch. (= *Dracocephalum canariense* L., p. 274), dreiblätterige, ħ. k. Canarische Inseln.

Celastrus L., Celaster.

cassinoides L'Her., *β)* lycioides W.

edulis Vahl (= *Catha edulis* Forsk.), genießbarer, ħ. ħ. w. t. Arabien, Abyssinien.

heterophyllus Savi, verschiedenblätteriger, ħ. k. ?

humilis Eckl. Zeyh., niedriger, ħ. t. k. Cap d. g. H.

lanceolatus Brotero, lanzettblätteriger, ħ. t. k. Madeira.

lucidus L. (= *concavus* Lam. = *Cassine concava* Lam. = *C. humilis* Hort.).

microphyllus L. fil., kleinblätteriger, ħ. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Wallichianus Spgl. (= *buxifolius* Roxb. = *rigidus* Wall. = *Catha Wallichii* G. Don), Wallich's, ħ. w. Ostindien.

europaeus Boiss., ħ. Spanien, wird wahrscheinlich nicht kultivirt. C. Hamelii Spgl. (= *Rhamnus racemosus* Duham.), ohne Angabe des Vaterlandes, scheint eine unsichere Art.

hispanicus Hort. = *cympsus*, *laurinus* Thbg. et *oleoides* Lam., v. Scytophyllum laurinum et oleoides, *nutans* Roxb. (= *paniculatus* W.) et *zeylanicus* Roth), v. Scutia paniculata et indica, *pterocarpus* DC. et *tricuspidatus* Lam. (= *Asterocarpus typicus* DC.), v. Pterocelastrus typicus et tricuspidatus, *pyracanthus* L. (= *bullatus* Hort. = *Colpoon* Hort. = *octogonus* Hort.), v. Putterlickja pyracantha, *verticillatus* R. et P., *Maytenus* W. et *octogonus* L'Her., v. Maytenus verticillatus, chilensis et octogonus, p. 501.

Celosia L., Hahnenkamm.

aspera Roth, rauher, ⊙. w. m. Ostindien.

exstipulata Schrank., zwischenblattloser, ⊙. w. m. ?

longifolia Mart., langblätteriger, ħ. w. Brasilien.

Digitized by Google

Celosia

melanocarpos Poir., schwarzfrüchtiger, ⊙. w. m. Senegambien, Senaar.

sanguinea Hffg., blutrother, ⊙. w. m. Ostindien.

stricta Fisch., steifer, ♄. w. Brasilien.

axillaris Mart., v. Alternanthera axillaris, *diffusa* Hffg., v. Mogiphanes diffusa, *lanata* L., *Monocniae* L., v. Acrva lanata, p. 20 et A. Monocnia, p. 11, II. *muricata* Spgl., v. Cladostachys frutescens, p. 892, *pallida* Hort. = pyramidalis.

Celsia L., Celsie.

acaulis Bory et Chaub., stengellose, ♂. 4. k. f. b. Griechenland.

brachysepala Fisch. et Trautv., kurzkelchige, ♂. 4. f. b. Natolien.

glandulosa Bouché (= *Arctarus plus.* Hort., non L.), drüsige, ♂. k. f. b. Candia.

persica C. A. Meyer, persische, ♂. 4. k. f. b. Persien, Caucasus.

sinuata Tenore (= *Verbascum orientale* All.), buchtigblättrige, 4. f. Italien.

sublanata Jacq, Ker, wenigwollige, ♂. k. f. b. ?

tomentosa Zuccar., filzige, ♂. k. f. b. Griechenland.

viscosa Roth, N. E., schmierige, 4. t. w. Ostindien.

Unbestimmtere Arten oder Gardenhybriden: australis Hort., erecta Fisch., glabrata Roth, grandiflora Hort., incarnata Rchb., striatiflora Hort. ♂.

caduca Mch. = orientalis, *dentata* Mch. = coromandelina, *horizontalis* Mch. = Arcturus, *urticaefolia* Curt., v. Alonsoa urticaefolia, p. 26. II.

Celtis T., Zuergelbaum.

aspera Dsf. (= *occidentalis γ scabriuscula* Loud.), rauhblätteriger, ♄. f. Nordamerika.

Audibertiana Spach, Audibert's, ♄. f. Orient.

canescens H. B. K. (= *ulbicans* W. Herb. = *Sponia canescens* G. Don), graulicher, ♄. w. t. Mexico.

missisippensis Bosc. Dsf., Missisippi's, ♄. f. Nordamer.

occidentalis L. (= *obliqua* Mch. = *tenuifolia* Lam. = *Sponia occidentalis* G. Don), β) latifolia (= ? *cordata* Hort.).

rhamnoides W. (= *Rhamnus iguaneus* Cavanill.), wegdornähnlicher, ♄. t. w. Neuspanien.

spinosa Spgl., dorniger, ♄. w. Brasilien.

Cenchrus L., Stachelgras.

I. Genuin.

Cavanillesii Tausch (= *echinatus* Cavan., non L.), Cavanille's, 4. m. f. Brasilien.

flagelliformis Höchst. et Steud. (= ? *bulbosus* Fresen. = *echinoides* Wight), federborstenähnliches, 4. w. Arabien.

pilosus H. B. K., behaartes, ⊙. m. f. Südamerika.

II. Trachyozus Rchb. (= *Trachys* P. Trin.).

muricatus L. (= *mucronatus* Auct. = *Punicum centroides* Lam. = *P. dimidiatum* Burm. = *Trachys muricata* Trin. = *T. mucronata* P.), weichstacheliges, ⊙. m. f. Ostindien.

Cenia Commers. P. Juss, Cenie.

anthemoides DC., Chamillenähnliche, ⊙. f. Cap d. g. H.

floseulosa DC., mehrblüthige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

microcephala E. Mey. (= *Cotula microcephala*, p. 876).

Digitized by Google

Cenia
- nudicaulis E. Mey. (= *discoidea* Less. = *Cotula nudicaulis* Thbg., p. 223).
- subheterocarpa Less. (= *Cotula pumila* Houtt.), verschiedenfrüchtige, ☉ f. Cap d. g. Hoffn.
- turbinata P. (= *Cotula turbinata* L. = *Lidbeckia turbinata* Thbg.).
- villosa* (= *Cotula villosa* DC.), zottige, ☉ f. Cap der guten Hoffnung.

Cenocline C. Koch, Cenocline, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
- aurea C. Koch (= *Cotula aurea* L., p. 223).
- chamaemelifolia C. Koch (= *Cotula chamaemelifolia* Ehbg.), stinkchamillenähnliche, ☉ f. Aegypten.
- cinerea C. Koch (= *Tanacetum cinereum* DC. = *Brocchia cinerea* Visian. = *Cotula cinerea* Delil. = *Grangea cinerea* Loud., p. 367).
- globifera C. Koch (= *Cotula globifera* Thbg. = *Tanacetum globiferum* DC. = *obtusum* Thbg., p. 798).
- pauciflora C. Koch (= *Cotula matricarioides* Berg. = *Tanacetum pauciflorum* Richards., p. 798).

Außerdem stellt Herr Prof. C. Koch noch folgende wahrscheinlich nicht kultivirte Arten zu dieser Gattung: acutiloba C. Koch (= *Tanacetum acutilobum* DC.), ♄. Cap d. g. Hoffn. ? albida C. Koch (= *Tanacetum albidum* DC.), ☉. Cap d. g. Hoffn. und ist auch der Meinung Matricaria corymbifera DC. et discoidea DC., p. 499, hierher zu ziehen.

Cenolophium DC. K., s. Coenolophium p. 876.

Centaurea L. Less., Flockenblume.
- ammophila Bess. (= *diffusa* γ DC.), sandliebende, 4. Südpodolien.
- coelolepis Fisch. et Mey., hohlschuppige, 4. f. Asiat. Rußland.
- cuspidata Visian., langspitzige, 4. f. Dalmatien.
- Gmelini Steud. (= *integrifolia* Tausch, non Mey.), Gmelin's, 4. f. Sibirien.
- gymnocarpa Moris et Notaris, nacktsaamige, 4. Insel Caprea.
- Hladnickiana Fisch., Hladnick's, 4. f. Krain.
- integrifolia C. A. Mey., ganzblätterige, 4. f. Caucasus.
- Kotschyana Heuff., Kotschy's, 4. f. Ungarn.
- laciniata Guss. (= *ambigua* Tenore), schlitzblätterige, 4. f. Neapel.
- latisquama DC. (= *centauroides* β MB. = ? *tatarica* W.). β) salonitana Visiani.
- Ledebouri Steud. (= *cana* Meyer (non Sib. Sm.) = *Stoebe* Ledeb.), Ledebour's, 4. f. Altai.
- melitensis L. (= ? *lappacea* Tenore = *Calcitrapa conferta* Mch. = *Calcitrapa melit.* Dum. Cours. = *Triplocentron melitense* Cass.).
- montana L. [1]), β) angustifolia Mill.
- nigrescens W. (= *bracteata* Balb. = *denticulata* Lejeune = *dubia* Suter = *schemnitzensis* Hort. etc.).

1) Nach Endlicher Catal. horti academici Vindobon. I. p. 395 mit den Abarten folgendermassen geordnet: a) cyanea, aa) montana Jacq., bb) axillaris W., cc) stricta W. K., dd) carniolica Host, β) purpurascens (= *Fischeri* W. E. Suppl.), γ) albida (= *ochroleuca* W. = *leucantha* Web. et Mohr. = *caucasica* MB.), δ) citrina (= *cheiranthifolia* W. = *ochroleuca* Sims).

Digitized by Google

Centaurea

orientalis L. (= *thessalica* Spgl.), β) brachylepis Fisch. et Mey., γ) macrolepis Fisch. et Mey. (= *tatarica* Rchb.).

ovina Pall. (= *ciliata* Frivaldsk.).

Parlatoris v. Heldr., Parlatores, 4. f. Sicilien.

parviflora Dsf. (= *spinosa* Frivaldsk.).

Pestalotti Notaris, Pestalotti's, ? ⊙ f. Italien.

phrygia L., β) ? nervosa W. (= *Berisii* Sieb.), γ) ambigua Thomas.

polyacantha W. (= *hystrix* Boiss.).

procera Fisch., Mey., Lallem., hohe, 4. f. Natolien.

pullata L. (= *Melanoloma humilis* Cass. = *pullata* Cass.), β) excelsior Cass.

punctata Vivian. (= *glaberrima* Tausch), punktirte, ⊙. f. Dalmatien.

pusilla Thuill., niedrigste, ⊙. f. Aegypten.

rhizantha C. A. Mey., wurzelblumige, 4. f. Caucasus.

rigens Lagasc. (= *Stoebe* L.), starre, 4. f. Spanien.

rigidifolia Bess. (= *versicolor* Fisch. = *sulphurea* Lagasca, non W.), 4. f. Nordcaucasus.

rupestris L. (= *arachnoidea* Vivian. = *cerinthoides* Tenore, non L. = *collina* Scopol., non L. = *variabilis* α *rupestris* Bartl.), β) adonidifolia Rchb.

saxicola Lagasca, Steinliebende, 4. f. Spanien.

Scabiosa L., ε) tenuifolia Schlch., ζ) badensis Trattin.

sicula L. (= *Pottii* Hort. = *scabra* Presl), β) multiflora P.

sordida W. (= *collino-scabiosa* Schied. = *pubescens* W. Herb. = *variabilis* γ *sordida* Bartl.), schmuziggelbe. 4. f. Oestr. Litorale.

sulphurea W. (= ? *Pottii* Hort. = *sicula* Hort. = *Triplocentron sulphureum* Webb.)

Torreana Tenore, Torrea's, ♂. f. Neapel.

trichocephala MB. (= *capillata* L. var.), β) latifolia Lallem.

Unbestimmtere: acrolepis Hffg., acromaura Hffg., chrysanthemifolia Tausch, eriophylla Spgl., fistulosa Wender., Forardi Hornem., 4. ? Ital., inusta Hoffg., leucocephala Hort., macrophylla Hort., multifida P. (= ? *pubescens* P.), orthacantha Tausch, ramosissima Tausch (= ? *nitens* MB.), ⊙., rhaetica Moritzi (= ? *Phrygia* var.), 4. f. Rhaetien, sanguinea Spgl., Schmidtiana Tausch, Stoebe Hort. (? L.), ucranica H. Berol.

III. Microlonchus Cass., DC.

salmantica L., b. foliata.

IV. Crupina P., Cassin.

Crupinastrum Moris., bartblumenähnliche, ⊙. f. Sardinien.

Centaurella Mchx., Rich., Centaurella, IV. 1., Contortae-Gentianeae.

autumnalis Pursh (= *paniculata* Mchx. = *Andrewsia autumnalis* Spgl. = *A. paniculata* Bartl. = *Bartonia tenella* Mühlbg. = *Sagina virginica* L.), Herbst-C., ⊙. f. Georgia, Carolina.

vernalis Pursh (= *verna* Mchx. = *Andrewsia verna* Spgl.), Frühlings-C, ⊙. f. Virginien, Georgien.

Centaurium Erythraea (= *vulgare*) Borckh. Rafn., v. Erythraea Centaurium, p. 314. — *Centaurium autumnale* P. et *vernum* P., v. Centaurella autum-

Digitized by Google

nalis et verna. — *Centaurium africanum* Cass., *officinale* Cass. et *ruthenicum* Cass., v. Centaurea africana, Centaurium et ruthenica, p. 176 etc. — *Centhriscus fumarioides* Spgl. et *nemorosus* Spgl., v. Anthriscus fumarioides et nemorosa, p. 65.

Centotheca lappacea Desv. (= *latifolia* Trin.).

Centrachaena viscida Schott msc., v. Chrysanthemum viscosum, p. 193.

Centradenia G. Don, Centradenie, VIII. 1., Lythrarieae-Melastomaceae.

grandifolia Lemaire (= *Rhexia grandifolia* Schltdl. = *Plagiophyllum grandifolium* Schltdl.), grofsblätterige, 4, ħ. w. Mexico.

inaequilateralis G. Don (= *Rhexia inaequilateralis* Chamiss. Schltdl.), ungleichseitige, ⊙. ? ħ. w. Mexico.

rosea Lindl. (= *Donkelaaria diversifolia* H. belg. = *Arthrostemma Parietaria* Hort. belg. = *Plagiophyllum parvifolium* Schltdl.), rosafarbige, 4. ħ. w. Mexico.

Centranthus Neck. DC., Spornbaldrian.

longiflorus Steven (= *angustifolius* MB., non DC.), langblumiger, 4. f. Armenien, Caucasus.

nervosus Moris (= *Valeriana trinervis* Vivian.), nerviger, 4. f. Corsica, Sardinien.

Centratherum intermedium Less. (= *brevispinum* Cass.), *muticum* Less., *punctatum* Less. (= *longispinum* Cass.), v. Amphereplis intermedia, mutica et aristata, p. 49.

Centrophyllum Auct. v. Kentrophyllum.

Centropogon Andropogon DC., *fastuosus* Scheidw., *grandis* Presl etc., v. Lobelia Sect. I.

Centrosema DC., Benth., Centrosema XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

brasilianum Benth. (= *Clitoria* ? *amoena* Roth. = *Clit. brasiliana* L., p. 206 = *Cl. formosa* H. B. K. = *Vexillaria brasiliana* Hffg.).

conjugatum Benth. (= *Steganotropis conjugata* Lehm.), verbundenblätteriges, ⊙. Sch. w. Südamerika.

Plumieri Benth. (= *Clitoria calcarata* L'Her. = *Cl. fluminensis* Arrabida = *Cl. mexicana* Moçin. = *Cl. Plumieri* Turp., p. 206).

virginianum Benth. (= *Clitoria amoena* Roth = *Clit. calcarigera* Salish. = *Cl. mierantha* Sm. = *Cl. virginiana* L., p. 207).

Cepa angulosa Bernh., *cernua* Mch. etc. etc., *vulgaris* Bernh., v. Allium angulosum etc. etc., p. 29 etc. et A. Cepa.

Cephaelis Sw., Kopfbeere.

Ipecachuanha Rich. (= *emetica* P. = *Callicocca Ipecachuanha* Brotero = *Ipechahuaneha officinalis* et *pseta* Arruda), Brech-K., ħ. w. Brasilien.

Swartzii DC. (= *violacea* Sw., non W.), Swartz's, ħ. w. Caribäen, Westindien.

violacea W. (non Sw.).

Cephalandra Schrad., Kopfmännlein, XXI. x., Cucurbitaceae.

quinqueloba Schrad. (= *Bryonia quinqueloba* Thbg., p. 135 = *Melothria quinqueloba* Eckl. Zeyh.).

Cephalanthus L., Knopfbaum.

floribundus H. Berol., blüthenreicher, ħ. f. ? Nordamerika.

Digitized by Google

Cephalopappus N. E. Mart., Kopffederchen, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).

sonchifolius N. E. Mart. (= *Sparganophorus sonchifolius* Spr.), gänsedistelblätteriges, 4. w. Brasilien. Ob kultivirt?

Cephalophora Cavan., Köpfchenträger.

aromatica Schrad. (= *tenera* Cav. = *Grassia* (= *Grahamia*) *aromatica* Hook.).

decurrens Less. (? = *Helenium pubescens* Ait.), herablaufende, 4. f. Californien.

Doniana Hook. et Arn. (= *suffruticosa* et *elongata* Don), Don's, ħ. 4. k. Chili.

Ceramia blenna G. Don = Erica Vernix, *calathiflora* G. Don = Erica bicolor, *cordata* G. Don = Erica cordata, *helianthemifolia* G. Don = Erica ingrifolia, *humifusa* G. Don, *latifolia* G. Don, *marifolia* G. Don, *obliqua* G. Don, *oxycoccifolia* G. Don, *planifolia* G. Don = Erica humifusa etc., *serpyllifolia* G. Don = Erica hispidula, *teucriifolia* G. Don et *urceolaris* G. Don, v. Erica teucriifolia et urceolaris.

Cerastium Hornkraut.

alsinefolium Tausch, mierenblätteriges, 4. f. Deutschl.

arabicum Fisch. et Mey., arabisches, ⊙. f. Arabien.

Bieberszteinii DC. (= *repens* MB. = *tomentosum* α L.), Bieberstein's, 4. f. Taurien.

falcatum Bunge (= *lithospermifolium* Ledeb.), sichelförmiges, 4. f. Sibirien.

Fischerianum Seringe (= *hirsutum* Fisch. = ? *pauciflorum* Turczan. = ? *pilosum* Ledeb.), Fischer's, 4. f. Kamtschatka.

gracile Dufour (= ? *semidecandrum* L.), schlankes, ⊙. f. Spanien.

inflatum Lk., aufgeblasenes, ⊙. f. Persien.

macranthum C. A. Mey., grofsblumiges, 4. f. Rufsland.

micranthum C. A. Mey., kleinblumiges, ⊙. f. Rufsland.

pumilum Curt. (= *Grenieri* γ Schulz).

Samnianum Sering. (= *longifolium* Tenor.), neapolitanisches, 4. f. Neapel.

Sprengelii Sering. (= *tenuifolium* Spgl.), Sprengel's, ♂. f. ?

tomentosum L. (= *Columnae* Tenore).

anomalum W. K., v. Stellaria viscida, p. 786.

manticum L., v. Mönchia mantica, *umbellatum* Huds., v. Holosteum umbellatum.

Cerbera L., Schellenbaum.

laurifolia Lodd. (= *Tanghinia laurifolia* G. Don).

Odollam Hamilt. G. (= *C. Manghas* Sims, nec L. = *Tanghinia Odollam* G. Don).

Unbestimmtere: dichotoma Hort., longifolia Hortor.

Cercis L., Judasbaum.

chinensis Bunge, chinesischer, ħ. f. b. k. China.

Cereus Juss. Haw., v. Cacteae, p. 872 et p. 84. II.

Cerinthe /T., Wachsblume.

auriculata Tenore, geöhrte, ⊙. f. Neapel.

gymnandra Gasparini, nacktmännige, ⊙. f. Neapel.

longiflora Viviani, langblumige, ⊙. f. Corsica.

purpurea Vis. = retorta.

Cerionanthus alpinus Schott etc., v. Succisa alpina etc., p. 793.

Digitized by Google

Ceropegia L., Leuchterblume.
bulbosa Roxb. (= *edulis* Hort.).
oculata Hook., geäugelte, 4. Sch. w. Bombay.
vincaeflora Hook., singrünblumige, 4. w. Südafrika.

Ceropteris Lk., *calomelaena* Lk., *chrysophylla* Lk., *distans* Lk. etc., v. Gymnogramma Sect. II.
Cervaria nigra Bernh. (= *rigida* Mch.), v. Peucedanum Cervaria, *Rivini* G., v. Libanotis montana, p. 461.

Cestrum L., Hammerstrauch.
aurantiacum Lindl., orangefarbiger, ħ. w. Guatimala.
candidum Seemann et J. Schmidt (= *elongatum* Hort.), weifslicher, ħ. t. Mexico.
citrifolium Retz (= *fasciculare* Otto = *venenatum* Auct.).
hirsutum Jacq., rauhhaariger, ħ. w. ?
laurifolium L'Her. (= *grandiflorum* Hort. = *venenatum* Lam. (non Thbg.).
pallidum Lam. (= ? *diurnum* Auct. = *venenatum* Mill.).
roseum H. B. K. (= *Habrothamnus fasciculatis* Hort.), rosafarbiger, ħ. t. w. Mexico.
subpulverulentum Mart., wenigbestaubter, ħ. w. Brasil.
venenatum Thbg. (= *Acocanthera venenata* G. Don).
viridiflorum Hook., grünblumiger, ħ. w. Südbrasilien.
Unbestimmtere: dubium Steud. (= *racemosum* Tausch), magnoliaefolium Hort., parviflorum W., Plucknetii Tausch, ramosissimum Nocca (= *undulatum* Auct., non R. et P.), spicatum Mill., Carthagena, viridipurpureum Hort.

Ceterach W., Milzfarrn.
capense Kunze, capischer, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

Chabraea DC. (Chabraeus, alter deutscher Botaniker), XIX. IV., Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).
cinerea DC. (= *Lasiorrhiza cinerea* Less. = *Leuceria cinerea* Don = *Leuchaeria Gilliesii* Hook. Arn. = *Leuchaeria hieracioides* Gill. et Don), aschgraufarbige, ⊙. f. Chili.
glandulosa Don (= *Leuchaeria Cummingii* Hook. Arn.), drüsige, ⊙. f. Chili.
runcinata Hook. (= *rosea* DC. = *Perdicium roseum* Poeppig = *Lasiorrhiza rosea* Poepp. = *Leuchaeria runcinata* Gill. et Don.), schrotsägenförmige, ⊙. ♂. f. k. Chili.
tomentosa DC. (= *Lasiorrhiza tomentosa* Less. = *Homoeanthus tomentosus* Less. = *Leuchaeria Bridgesii* Hook. Arn.), filzige, ⊙. f. Chili.
Chaenomeles japonica Lindl., v. Cydonia japonica, p. 242.

Chaenostoma Benth., Mundblümchen, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.
aethiopicum Benth. (= *Buchnera aethiopica* L. = *Manulea aethiopica* Thbg., p. 495).
foetidum Benth. (= *Buchnera foetida* Andr. = *Sutera foetida* Roth = *Manulea foetida* P., p. 495).
linifolium Benth. (= *Manulea linifolia* Thbg., p. 496).
pedunculosum Benth. (= *Manulea pedunculata* Andr., p. 496).
polyanthum Benth. (= *orchioides* Hortul.), vielblumiges, ♂. 4. ħ. k. Cap. der gut. Hoffn.
β) adscendens Kunze, γ) macranthum.

Digitized by Google

Chaerophyllum T., Kälberkropf.
hirsutum L., β magellense Tenore.
hybridum Tenore, Bastard-K., 4. f. Neapel.
Hladnikianum Rchb., Hladnik's, 4. f. Krain.
millefolium DC. (= *brachycarpum* MB. = *myrrhidifolium* Hort.), garbenblätteriger, 4. f. Caucasus.
Prescottii DC. (= *bulbosum* Ledeb., non L.), Prescott's, ♂. Sibirien.
canadense P., v. Cryptotaenia canadensis, *Claytoni* P., v. Osmorrhiza longistylis, *daucifolium* Dsf., v. Anthriscus sylvestris β p. 38, II., *odoratum* Lam., v. Myrrhis odorata, p. 538.

Chaetocapnia Sweet, Schweiflilie, VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae,
geminiflora Sweet, paarblumige, 4. k. Mexico.

Chaetogastra DC., Schweifschlund.
canescens DC. (= *Rhexia canescens* Bonpl.), graulicher, ♄. w. Südamerika.
cardinalis DC. (= *Melastoma cardinalis* Spgl. = *Rhexia cardinalis* Bonpl.), scharlachfarbiger, ♄. w. Brasilien.
ciliaris DC. (= *Meriana ciliaris* Vent. = *Osbeckia ciliaris* Seringe), gewimperter, 4. w. Bogota.
hirsuta DC., rauhhaariger, 4. w. Brasilien.
hypericoides DC. (= *Melastoma villosa* Aubl. = *Rhexia hypericoides* W., p. 683).
Chaiturus Marrubiastrum Ehrh. (= *leonuroides* Mch.), v. Leonurus Marrubiastrum, p. 452.
Chamaecrista nictitans Mch. etc., v. Cassia nictitans, p. 170 etc.
Chamaedaphne calyculata Mch., v. Cassandra calyculata, p. 168.

Chamaedorea W., Bergpalme.
elatior Mart., hohe, ♄. w. Mexico.
elegans Mart. (= *Kunthia Deppei* Hortul.), zierliche, ♄. w. Mexico.
gracilis W. (= *Borassus pinnatifrons* Jacq. H. Schönbr. = *lanceolata* Kunth = *Martinezia lanceolata* R. et P.).
Lindeniana Hort. belg., Linden's, ♄. w. Südamerika.
mexicana Hort. belg., mexicanische, ♄. w. Mexico.
oblongata Mart., verlängerte, ♄. w. Mexico.
Schiedeana Mart. (= *Kunthia xalapensis* Otto et Dietr.).
simplicifrons Hort. belg., einfachwedelige, ♄. w. Südamerika.
Ob nachstehende kultivirt werden ist mir unbekannt, als: C. concolor Mart. ♄ Mexico, linearis Mart. (= *Martinezia linearis* R. et P.) ♄ Peru, pauciflora Mart. ♄ Brasilien.
Chamaefistula corymbosa G. Don etc., v. Cassia corymbosa etc., p. 169 etc.

Chamaelaucium Dsf., Chamaelaucie, X. 1., Myrtaceae-Chamaelaucieae.
albiflorum Hort. belg., weifsblumige, ♄. k. t. Neuholl.
C. ciliatum Dsf. und virgatum Endl., beide ♄ und in Neuholland heimisch, werden wohl kaum kultivirt.
Chamaeledon procumbens Lk., v. Loiseleuria procumbens, p. 474.

Digitized by Google

Chamaemeles Lindl., Zwergmispel, XII. n., Rosaceae-Pomaceae.

coriacea Lindl. (= *Crataegus coriacea* Soland.), lederartige, ħ. k. Madeira.

Chamaemelum arvense G., *austriacum* Presl etc., v. Anthemis arvensis etc., p. 62, *C. Cotula* Presl (= *fuelidum* Baumg.), v. Maruta Cotula, p. 498, *proliferum* Mch., v. Cladanthus arabicus, p. 202.

Chamaemyrrhis eriopoda Endl., v. Caldasia eriopoda, p. 106, II.

Chamaepitys vulgaris Lk. (*trifida* Dumort.), v. Ajuga Chamaepitys, p. 26.

Chamaeplium officinale Wallr., v. Sisymbrium officinale, p. 762, II.

Chamaerhodos Bunge, Zwergröschen, V. v., Rosaceae-Pomaceae.

altaica Bunge (= *Sibbaldia altaica* L.), altaisches, 4. f. Altai.

erecta Bunge (= *Sibbaldia erecta* L., p. 751).

grandiflora Bunge (= *Sibbaldia grandiflora* Pall.), grofsblumiges, 4. f. Altai.

Chamaerops L. Mart. Endl., Zwergpalme.

Birro Siebold, Birro, Zw. ħ. t. w. Japan.

excelsa Thbg. (excl. Synon.), hohe, ħ. t. w. Mittel- und Südchina.

Hystrix Fras. (= *arundinacea* Sm. = *Corypha repens* Bartram = *Rhapis arundinacea* Ait., p. 683).

Martiana Wall. (= ? *excelsa* Wall. = *Lowdonia excelsa* H. Angl.), Martius's, ħ. w. Nepal.

stauracantha Hort. belg., starkstachelige, ħ. w. ?

acaulis Mchx. (= *glabra* Mill.), v. Sabal Adansonii, p. 709, *cochinchinensis* Mart., v. Rhapis cochinchinensis, *Palmetto* Mchx., v. Sabal Palmetto.

Chamaesciadium C. A. Mey., Zwergdolde, V. II., Umbelliferae.

acaule C. A. Mey. (= *Bunium acaule* Hoffm. = *Ammi acaule* Spgl., p. 48), stengellose, ♂. 4. f. Caucasus.

Chamissoa albida Mart., *nodiflora* Mart., v. Celosia argentea et nodiflora, *arabica* Spgl., v. Cladostachys alternifolia, p. 202.

Chamomilla Hall. C. Koch, Chamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

inodora C. Koch (= *Matricaria inodora* L. fl. suec. et DC. prodr. = *Pyrethrum inodorum* Sm., p. 669, = *Chrysanthemum inodorum* L. spec.), β) salinum Wallr.

meridionalis C. Koch (= *Matricaria pusilla* W., p. 499), mittägliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Georgien, Armenien.

officinalis C. Koch (= *Matricaria Chamomilla* L., p. 499).

praecox C. Koch (= *Matricaria praecox* DC. = *Pyrethrum praecox* MB., p. 670).

Chaptalia Vent., Chaptalie.

lyrata Don, (non Vent. Spgl.) (= *Hieracium stipitatum* Moç. Sess.), leyerförmige, 4. k. Mexico.

integrifolia Vent. = tomentosa, p. 187.

Charieis Cass. DC., Charieis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

heterophylla Cass., verschiedenblätterige, ☉. ♂. m. f. Cap der guten Hoffnung.

β) coerulea Cass., γ) Neesii Cassin. (= *Koelfussia amelloides* N. E., p. 436).

Digitized by Google

Charlwoodia australis G. Don, *congesta* Swt., *indivisa* G. Don, *stricta* Swt., v. Cordyline australis, p. 218 etc.

Chartolepis glastifolia Cass., v. Centaurea glastifolia, p. 177.

Chastolema platycarpum Bunge, v. Isatis platycarpa.

Chaseanum E. Mey., Chaseanum, XIV. m., Personatae-Antirrhineae.

cuneifolium E. Mey. (= *Buchnera cuneifolia* Thbg., p. 136).

pinnatifidum E. Mey. (= *Buchnera pinnatifida* Thbg.), fiederspaltiges, 4. h. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Chascolytrum Desv., Oehrchengras, III. m., Gramineae.

barbatum Kunth, N. E. (= *Calotheca barbata* N. E. = *Briza barbata* Trin.), bärtiges, ☉. m. f. Brasilien.

nutans Lindl., N. E., nickendes, 4. w. Valparaiso.

trilobum N. E. (= *Briza triloba* N. E. = *Calotheca triloba* Lk. H. Berol.), dreilappiges, 4. w. Montevideo.

β) panicula angustiori (= *Calotheca dilatata* Lk. = *Briza auriculata* Trevir., p. 131).

Chasmanthium gracile v. Uniola gracilis, p. 830.

Chasmone Andrewsiana E. Mey. et *calycina* E. Mey., v. Trichasma ciliatum et calycinum, *argentea* E. Mey., v. Argyrolobium Linnaeanum, p. 44, 11.

Chayota edulis Jacq., v. Sechium edule, p. 798.

Cheilanthes Sw., Schuppenfarrn.

I. Pteroides Kze. et Eucheilanthes Endl.

canescens Kunze, graulicher, 4. w. ? Südamerika.

cenescens Kaulf., Lk.

fimbriata Visian. (= *Szowitsii* Fisch. et Mey.), gefranzter, 4. k. Dalmatien, südöstl. Asien, Carabagh.

hirta Sw. (= *Adiantum caffrorum* Sw.).

Kaulfussii Kunze (= *viscosa* Kaulf.), Kaulfuss's, 4. w. Südamerika.

Linkiana Kunze (= *microphylla* Lk., non Sw.), Link's, 4. w. Südamerika.

leucopoda Lk., weißstieliger, 4. w. Mexico.

microphylla Sw. (= *micromera* Lk.).

multifida Sw., vieltheiliger, 4. w. k. Cap d. g. H.

pruinosa Kaulf. (= *Mathewsii* Kunze), bereifter, 4. w. ? Südamerika.

Sieberi Kunze (= *tenuifolia* Sieb., non Sw.), Sieber's, 4. w. Neuholland etc.

squamosa Gill., Hook. et Grev., ächter, 4. w. Chili.

viscosa Lk., schmieriger, 4. w. Mexico.

II. Hypolepis Bernh., Presl.

chlorophylla Sw. (= *brasiliensis* Raddi = *spectabilis* Kaulf. = *Hypolepis spectabilis* Lk., *H. tenuifolia* Presl), grünblätteriger, 4. w. Brasilien.

dicksoniodes Endl. (= *hastata* Hort. = *Dicksonia davallioides* Lk. et Hort. Angl. = *Hypolepis dicks.* Presl), dicksoniaähnlicher, 4. w. t. Norfolk-Insel.

repens Kaulf. (= *aculeata* Kaulf. = *Hypolepis repens* Presl = *Dicksonia aculeata* Spgl. = *Lonchitis repens* L. W. spec.).

Hinsichtl. der übrigen s. Allosorus, p. 22, II.

Cheiranthera A. Cunn., Fingerbeutel, V. m., Pittosporeae.

linearis A. Cunningh. (= *cyanea* Brogn.), gleichbreiter, ♄. t. k. Westl. Neuholland.

Cheiranthodendrum pentadactylon Larrat., v. Cheirostemon platanoides, p. 188.

Digitized by Google

Cheiranthus L., Lack.

arboreus Sweet, baumartiger, ♄. ♄. k. Aegypten.

asper Chamiss. Schltdl. (= *capitatus* Dougl.), rauher, 4. k. Columbia, Californien.

axillaris Brouss. (= *scoparius* DC. prodrom., non Brouss.), achselblumiger, ♄. 4. t. k. Canarische Inseln.

flexuosus Sib. Sm., hin- u. hergebogener, ⊙. f. Cypern.

scoparius Brouss. et W. E. (= *scaber* B. Webb. = *Dichroanthus scoparius* B. Webb.)

Cheiranthus Androsowskiana Lk. etc., v. Erysimum Sect. I. p. 313 etc.

Chelonanthera Blum. Lindl., Schildbeutel, XX. I., Orchideae.

sulphurea Blume, schwefelgelber, 4. w. Java.

ventricosa Blume, bauchiger, 4. w. Java.

speciosa Blume, v. Coelogyne speciosa.

Chenopodium T., Gänsefufs.

album L., ε) armeniacum H. Berol.

benghalense Spielm. (= *C. Atriplicis* L. var.? = *Atriplex benghalensis* Lam.), bengalischer, ⊙. f. Bengalen.

bonariense Tenore, bonarischer, ⊙. f. Bonaria.

chilense Schrad. (= *anthelminticum* Bertero, non L. = *Ambrina chilensis* Spach), chilesischer, ⊙. 4. f. k. Chili.

ficifolium Sm. (= *album* et *populifolium* Hort. = *Frankianum* DC. et Hort.).

foetidum Schrad. (= *C. Botrys* β Hort. Wratislav. = *graveolens* Lagasca = *trilobatum* et *trilobum* Hort.).

lanceolatum Mühlbg. (= *concatenatum* Hort.).

nepalense Hort., nepalischer, ⊙. f. Nepal.

Pseudo-Botrys Hort., unächter Trauben-G., ⊙. f. ?

rubricaule Schrad. (= *Quinoa* var.), rothstengelicher, ⊙. f. Chili.

virens Wender., grünlicher, ⊙. f. ?

Chiazospermum erectum Bernh., v. Hypecoum erectum, p. 409.

Chiliadenus camphoratus Cassins., v. Jasonia glutinosa, p. 430.

Chirita Hamilt. Don, Chirita, XIV. II., Personatae-Cyrtandreae.

grandiflora Wall. (= *urticaefolia* Don = ? *Calosacme grandiflora* Wall. = *Bonnaya grandiflora* Spgl. = *Gratiola grandiflora* Retz. = *Henckelia urticaefolia* A. Dietr.), grofsblumige, ⊙. w. Ostindien.

sinensis Lindl., chinesische, ♄. w. China.

zeylanica Hook., zeylonische, ♄. w. Ceylon.

Chironia L., Chironie.

baccifera L. (= *Roeslinia baccifera* G. Don = *R. tetragona* Mch.).

β) grandiflora Griseb., γ dilatata E. Mey.

floribunda Paxt., blüthenreiche, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Fischeri Hort., Fischer's, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

maritima Eckl. (= *melampyrifolia* E. Mey.), Meeresstrands-Ch., ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

β) frutescens Griesbach.

peduncularis Lindl. (= *latifolia* E. Mey. = *Burchellana* et *trinervia* Hortul.).

serpyllifolia Lehm. (= *ovata* Spgl.), quendelblätterige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

β) laxa Griseb., γ) microphylla Griseb.

speciosa E. Mey., prächtige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Chironia

Unbestimmtere: conferta Hort., tabularis Page, tenuiflora Lk.

floribunda Hort.. v. Logania floribunda, p. 474.

frutescens L. (= *decussata* Vent. et var. *angustifolia* Curt.), v. Orphium frutescens etc.

Chitonia Moç. Sess. (non D. Don), Chitonie, VIII. 1., Zygophylleae.

mexicana DC., mexicanische, ħ. w. t. Mexico.

Chlamydophora Ehrbg., Hüllchenträger, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

tridentata Ehrbg. (= *Balsamita tridentata* Delil.), dreizähniger, ☉. f. Aegypten.

Chlamysporum juncifolium Salisb., v. Thysanothus junceus, p. 810.

Chloanthes RBr., Grünling.

Bartlingii Lehm., Bartling's, ħ. t. Neuholland.

Chlora L., Chlore.

exaltata Griseb. (= *Erythraea Plumieri* H. B. K. = *Eustoma silenifolium* G. Don, Salisb. p. 326 = *Lisianthus glaucifolius* Jacq., p. 469), hohe, ☉. f. Nord- und Südamerika.

grandiflora Steud. et Hochst. (= *perfoliata* δ *grandiflora* Griseb.), großblumige, ☉. f. Italien.

imperfoliata L. fil. (= *crenulata* Salzm. = *dubia* Lam. = *sessilifolia* Desv.).

β) lanceolata K.

perfoliata L. (= *Blackstonia perfoliata* Huds. = *Gentiana perfoliata* L.), β) acuminata K. (= *intermedia* Tenore), γ) serotina K.

Chloraea Lindl., Grünstendel.

virescens Lindl. (= ? *chrysantha* Poepp. Endl. = *Limodorum Piquichia* Lam.), hellfarbiger, 4. w. Chili.

Außerdem kommen in Chili noch folgende vor: affinis Lindl., alaris Lindl., alpina Poepp. Endl., campestris Poepp. Endl., cristata Lindl., cylindrostachya Poepp. Endl., decipiens Poepp. Endl., disenides Lindl., fimbriata Poepp. Endl., galeata Lindl., Gavila Lindl., grandiflora Poepp. Endl., incisa Poepp. Endl., multiflora Lindl., nudilabia Poepp. Endl., speciosa Poepp. Endl., viridiflora Poepp. Endl., volucris Lindl. Sämmtlich 4. Ob denen einige kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Chloranthus Sw., Grünblume.

erectus Wall. (= *elatior* Lk., non RBr. et G. Don = *Cryphaea erecta* Hamilt.), aufrechte, ħ. w. Ostindien.

officinalis Blum. (= *inconspicuus* plur. Auct.), gebräuchliche, ħ. w. Java, China [1]).

C. japonicus Sieb. scheint in den europäischen Gärten noch nicht eingeführt.

Chloraster Haw., v. Narcissus Sect. III, p. 540.

Chloris Sw., Chloris.

abyssinica Hochst., abyssinische, ☉. f. m. Abyssinien.

compressa DC. (= *ciliata* P. B., non Sw.) = *penicillata* Hort. = *polydactyla* Durand. Jacq. fil.), flachhalmige, ☉. f. m. Südamerika.

1) Van Houtte empfiehlt sie in seinem neuesten Pflanzenverzeichnisse als „Plante d'un haut interêt. Les Chinois s'en servent pour aromatiser le thé. Elle exhale une odeur suave d'une nature très fine."

Digitized by Google

Chloris

distichophylla Lagasc. (= *fasciculata* Schrad.), zweizeiligblätterige, ⊙. 4. w. Brasilien.

Gayana Kunth, Gay's, 4. w. Senegambien.

humilis Kunth (= *pycnotrix* Trin.), niedrige, ⊙. m. f. Brasilien.

meccana Hochst. et Steud. (= *mexicana* Hort.), meccaische, ⊙. m. f. Arabien.

penicillata P. (= *Cynosurus penicillatus* Vahl = *Eleusine penicillata* Spgl.), pinselförmige, 4. w. Ostindien.

Unbestimmt: peregrina Durand.

procumbens Durand, v. Chondrosium tenue.

Chlorophytum Ker, Grünlilie.

? graminifolium Kunth (= *Anthericum graminifolium* W., p. 63 = *Anthericum undulatum* Jacq.).

? trifloruin Kunth (= *Anthericum triflorum* Ait., p. 64) et β) bipeduneulatum.

micranthum Hort. = ?, *Sternbergianum* Steud., v. Hartwegia comosa.

Chondrilla T. L., Knorpelsalat.

piptocoma C. A. Mey., fallschopfiger, ♂. Asiat. Rufsland.

muralis Lam., v. Lactuca muralis, p. 442, *viminea* Lam. et *ramosissima* Zeyh., v. Phoenixopus viminеus et β) ramosissimus, p. 884.

Chondrosea Aizoon Haw. etc., v. Saxifraga Aizoon etc., p. 725.

Chondrosium Desv., P. B., Knorpelgras, III. II., Gramineae.

gracile H. B. K. (= *Actinochloa gracilis* W. = *Atheropogon gracilis* Spgl. = *Eutriana gracilis* Trin.), schlankes, 4. w. Mexico.

hirtum H. B. (= *Actinochloa hirsuta* R. et S. = *Bouteloua hirsuta* Lagasca = *Atheropogon hirtus* Spgl. = *Eutriana hirta* Trin.), rauhhaariges, ⊙. f. Mexico.

prostratum Kunth (= *Actinochloa prostrata* R. et S. = *Bouteloua prostrata* Lagasca), gestrecktes, ⊙. f. Mexico.

tenue P. B. (= *procumbens* Desv. = *Actinochloa tenuis* W. = *Atheropogon procumbens* Jacq. = *Chloris filiformis* Poir. = *C. procumbens* Durand = *C. tenuis* Poir. = *Eutriana tenuis* Trin.), dünnes, 4. w. Neuspanien, Mexico.

Chenemorpha dichotoma G. Don, *reticulata* G. Don, v. Echites Heynii et reticulata, p. 281.

Choretrum RBr., Choretrum, V. I., Santalaceae.

lateriflorum RBr., seitenblumiges, ♄. t.. k. Neuholland.

Ob C. glomeratum RBr., Preissianum Miquel et spinosum Miquel, sämmtlich ♄. und in Neuholland heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Chorilaena Endl., Chorilaena, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

myoporoides Endl. (= *Boronia à fleurbleue* Hort. belg.), porenblattähnliche, ♄. t. Neuholland.

quercifolia Endl. Hügel, eichenblätterige, ♄. ♄. t. Neuh.

Chorisema LaBill., Fisch. emend. (= Chorizema, Chorozema Auct.). [1]).

angustifolium Benth. (= *Dillwynia glycinefolia* Sm., p. 275), schmalblätterige, ♄. t. Neuholland.

---

1) „χωρὶς et σῆμα (vexillum separatum). Man schreibt ja auch Brachysema, Platysema". Staatsrath v. Fischer.

Digitized by Google

Chorisema

Baueri Benth, Bauer's, ♄. t. Neuholland.
Brownii Hort. belg., Brown's, ♄. t. Neuholland.
Dicksonii Henslow (= *Hügelii, coccineum* Hort.).
ericoides Hort. belg. (= *ericaefolium* Hort.), heideähnliche, ♄. t. Neuholland.
macrophyllum Hort. belg. (= *elegans* Hügel), grofsblätterige, ♄. t. Neuholland.
mucronatum Hort. belg., stachelspitzige, ♄. t. Neuholl.
parviflorum Benth., kleinblumige, ♄. t. Neuholland.
ruscifolium Hort. belg., mäusedornblätterige, ♄. t. Neuh.
spectabile Lindl., ansehnliche, ♄. t. Neuholland.
varium Benth. (= *elegans* Hort.), veränderliche, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluss).
β) rotundifolium Hort., γ) grandinosum Hort., δ) multiflorum.
dillwyniaefolium Hort. = ? *Manglesii* Hort. = cordatum, *coriaceum* Sm., *scandens* Sm. (= *Baxteri* Grah.) et *trilobum* Sm., v. Podolobium coriaceum, scandens et trilobatum, p. 638 seq., *lancifolium* Hort. (= *longifolium* Hort.), v. Callistachys lanceolata, p. 107, 11., *oppositifolium* Hort. belg., v. Gastrolobium spinosum.

Chorisia Kunth, Chorisie, XVI. VIII., Bombaceae.
speciosa Cambess. Juss. et St. Hil., prächtige, ♄. w. Brasil.
Chorisma tetragona Lindl., v. Pelargonium tetragonum, Sect. II. p. 594.
Chorispermum tenellum RBr., v. Chorispora tenella, p. 192.
Choristes carnosa Thbg. et *spinosa* Thbg., v. Didelta carnosum et spinosum, p. 262.
Chrysanthellina fasciculata Cass., v. Chrysanthellum procumbens, p. 192.

Chroilema Bernh., Chroilema, XIX. II., Compositae-Corymbiferae,
suffrutescens Bernh. grauliche, ♄. k. Chili.

Chrysanthellum R., Zwergwucherblume.
abyssinicum Schultz, abyssinische, ☉. f. Abyssinien.

Chrysanthemum T. L., Wucherblume.
I. Genuini = Chrysanthemum DC.
foeniculaceum DC. (= *Pyrethrum foeniculaceum* Choisy).
α) pinnatifidum DC. (= *Pyrethrum foeniculaceum* W. Enum.), β) crithmifolium Steud. (= *Pyrethrum crithmifolium* W. Enum.), γ) bipinnatifidum DC. (= *Pyrethrum anethifolium* W. Enum. = *P. foeniculaceum* Bot. reg.[1]).
grandiflorum W., α) adauctum DC. (= *tanacetifolium* H. Par. = *Pyrethrum adauctum* Lk. = *P. Broussonetii* β Choisy), β) intermedium Hort. monspel. (= *foliosum* Brouss. = *Pyrethrum grandiflorum* W.), γ) subradiatum DC. (= *Pyrethr. speciosum* W. E.), δ) cuneiforme DC. (= *Pyrethr. coronopifolium* W. = *P. grandiflorum* Dsf. H. Par.).
leptophyllum DC., schlankblätterige, ♄. k. Cap d. g. H.
nodosum DC. (= *Arctotis nodosa* Thbg. = *Ismelia nodosa* Less. = *Pinardia nodosa* Less.), knotige, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

---

[1]) Diese Varietäten sind daher p. 193 bei Ch. frutescens zu streichen, da sie zu Ch. foeniculaceum gehören.

Digitized by Google

Chrysanthemum

viscosum Dsf. (= *anisocephalum* Hort. = *Pinardia anisocephala* Cass. = *Centrospermum Chrysanthemum* Spgl. = *Heteranthemis viscoso-hirta* Schott = *H. hirta* H. Berol. = *Centrachena viscida* Schott).

Zawadskii Herbich, Zawadski's, 4. ♄. f. Galicien.

Unbestimmtere: asteroides Dsf. H. Par. ♄., Barrelieri Tausch ⊙., caespitosum Weinm., daucifolium P., lacerum Hortor. ♄. Canar. Inseln, moschatum W. 4. *aureum* Hort., v. ? Anthemis aurea, p. 62, *disciforme* C. A. Mey., v. Matricaria disciformis, *hirtum* Thbg., v. Matricaria hirta, *indicum* Thbg. et Hort., v. Pyrethrum sinense, *umbrosum* Hort., non W. = *C. Roxburghii*.

II. Leucanthemum T. DC.

Bauhini Tausch (= *atratum* β L.), Bauhins, 4. f. Oberitalien.

Leucanthemum L. (= *Leucanthemum vulgare* Lam.), β) sylvestre W.

pectinatum L., kammförmige, ⊙. f. Spanien.

Chryseis glauca Cass. (= *odorata* Cass.), *moschata* Cass. et *odorata* Cass., v. Amberboa odora et moschata, p. 175 u. p. 32, II.

Chrysion biflorum Spach, v. Viola biflora, p. 849.

Chrysiphiala Lamb. Ker, Goldnarcisse.

latifolia Lindl. (= *Pancratium latifolium* R. et P. = *Leperiza latifolia* Herb.), breitblätterige, 4. Zw. w. t. Peru.

recurvata Lindl. (= *Pancratium recurvatum* R. et P. = *Carpodetes recurvatus* Herb.), zurückgekrümmte, 4. Zw. w. t. Peru.

Chrysocephalum Walp., Goldköpfchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

flavissimum Steetz (= *Helichrysum flavissimum* DC. = *Gnaphalium flavissimum* Sieber), hellgelbes, 4. t. k. Neuholland.

Chrysocoma juncea Dsf. = ?, *Linosyris* L. et var. *palustris Savi* etc., v. Linosyris vulgaris etc.

Chrysocoryne Endl., Goldkeulchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

pusilla Endl. (= *Crossolepis pusilla* Benth.), niedriges, ⊙. f. Südwestl. Neuholland.

Chrysoglosum Blume, Lindl., Goldzüngel, XX. I., Orchideae.

ornatum Blume, zierliches, 4. w. Java.

villosum Blume, zottiges, 4. w. Java.

Chrysoliga salicifolia Hffg. W., v. Hetaeria salicifolia, p. 380.

Chrysophyllum L., Goldblatt.

fuscum Fisch. Page, braunes, ♄. w. Ostindien.

grandifolium Steud. (= *macrophyllum* Dsf. nec alior.), grofsblätteriges, ♄. w. Philippinen.

macrophyllum Lam. (nec alior.), v. Lucuma Rivicoa, *Manglillo* Lam. et *melanophloeos* Lam., v. Myrsine Manglillo etc., *Millerianum* Lam. etc., v. Sideroxylum mite, C. splendens Spgl. ♄. Brasil., Peru ist nach Martius nicht = mit Nycterisition ferrugineum.

Chrysopsis Nutt., Goldalant.

gossypina Ell. (= *Conyza asteroides* Walt. = *Diplopappus lanatus* Cass. = *Inula glandulosa* Lam. = *I. gossypina* Mchx. p. 416 = *I. lanata* Banks.).

Digitized by Google

Chrysopsis
Mariana Rll. (= *Diplogon Marianus* Rafin. = *Inula glandulosa* Lam. = *I. Mariana* L., p. 418).
villosa Nutt., p. 195, (= *Amellus villosus* Pursh = *Diplopappus villosus* Hook. Arn. = *Inula villosa* Spgl. = *Siderantlus integrifolius* Fras. = *S. villosus* Sweet).
Chrysopteris Lk. sect. Polypod., *C. aurea* Lk., *Billardieri* Lk., *lepidopoda* Lk., *longipes* Lk., *phymatodes* Lk., *peltidea* Lk., *pulvinata* Lk., *sporodocarpa* Lk., *terminalis* Lk., v. Polypodium aureum L. etc, p. 645.

Chrysoscias E. Mey., Goldwicke, XVII. IV. (VR.), Leguminosae-Papilionaceae.
calycina E. Mey. (= *Cytisus angustifolius* Rekl. Zeyh. = *Glycine angustifolia* Jacq. = *Rhynchosia angustifolia* DC., p. 688 = *Ononis villosa* Sieb.), grofskelchige, ħ. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Chrysosplenium T., Goldmilz, Milzkraut.
ovalifolium M. B. Ledeb., eiblätteriges, 4. f. Altai.
Chrysostoma aurea Lilja (= *Creolobus* Lilja), v. Bartonia aurea Lindl., p. 114.

Chusquea Humb., Bonpl., K. (einheimischer Name), III. II., Gramineae.
scandens Kunth (= *Bambusa Chusque* Poir. = *Mustelia arundinacea* Cav. = *Nastus Chusque* H. B.), klimmende, ħ. Sch. w. Südamerika.

Chymocarpus brachyceras etc., p. 195, gehören mit Ausschluss C. pentaphyllus zu Tropaeolum.

Chymocormus Zeyh. Hook., Speisestock, V. II., Asclepiadeae.
edulis Zeyh. Hook. (= *Pergularia edulis* Thbg. = *Cynanchum edule* Andr.), geniefsbarer, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

Chysis Lindl., Chysis.
bractescens van Houtte, deckblätterige, 4. w. Südam.
Makoyi* („species du Mexique à fleur blanche" Makoy Catal.), Makoy's, 4. w. Mexico.

Cibotium Kaulf., Knorpelfarrn.
glaucescens Kunze (= *Balantium glaucescens* Dicks. = *Dicksonia Baranetz* Lk. = *Aspidium, Nephrodium* et *Polypodium Baranetz* Auct. et H. anglor.), blaugrünlicher, 4. w. Cochinchina, China, Bugaria.
Schiedei Chamiss. et Schltdl., Schiede's, 4. w. Mexico.
Billardieri Kaulf., v. Balantium antarcticum Presl, p. 58, II.

Cicendia Adans., Cicendie, IV. I., Contortae-Gentianeae.
Candollei Griseb. (= *Exacum Candollei* Bast. = *E. glaucum* Bast. = *E. pusillum* β DC.), Candolles, ☉. f. Westeuropa.
pusilla Griseb. (= *Chironia minima* Thuill. = *C. pusilla* Lam. = *Exacum pusillum* DC. = *Microcale pusilla**, p. 523).
filiformis Rchb., v. Microcale filiformis, p. 523.

Cicer T., Kichern.
arietinum L., α) vulgare Walpers, (= *physodes* Rchb.), β) ryditospermum Walp., γ) macrocarpum Walp. (= *sativum* Schk.).
floribundum Fenzl, blüthenreiche, ☉. f. Taurien.

Digitized by Google

Cicerbita acuminata Wallr., *alpina* Wallr. etc., v. Mulgedium acuminatum, alpinum etc., p. 533.
Ciconium acetosum Hffg. etc., v. Pelargonium (Sect. III.) acetosum etc., p. 594.

Cicuta L., Wasserschierling.
occidentalis Dougl., westlicher, 4. f. Nordwestl. Amerika.
Ciliaria aspera Haw. et *bryoides* Haw., v. Saxifraga aspera etc., p. 724.

Cinchona L., Fieberrindenbaum.
alba Makoy, weifser, ħ. w. Südamerika.
pubescens Vahl, weichhaariger, ħ. w. Peru.
caribaea Jacq, v. Exostemma caribaeum, p. 328.

Cineraria L., Aschenpflanze.
alba Loddig., weifse, ħ. k. t. Cap d. g. Hoffn.
distans Kunze, abstehende. ħ. 4. k. t. Cap d. g. H.
pumila Thbg. (= ? *humifusa* L'Her.), niedrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
polycephala DC., vielköpfige, 4. k. t. Cap d. g. H.
pulchella Sweet (non Meyer), hübsche, k. t. Canarische Inseln.
Von C. aurita L'Her. (= *Senecio maderensis* DC.), cruenta Mass. (= *Senecio cruentus* DC.) et β hybrida W. (= ? *lactea* Jacq. fil.), lobata L'Her., populifolia L'Her. (= *Senecio populifolius* DC.), hat man in neuerer Zeit mehrere sehr schöne Hybriden gezogen, von denen hier einige erwähnt werden, als: Adelaide, alba odorata, azurea, bicolor (= *pulcherrima*), blak eyed maid (Gaine's), blue eyed maid, carminea, Cissa, Cunninghamii, Delachii, Dutchess of Glocester, Eclipse (Henderson's et Jvery's), elegantissima, enchantress, formosa, fulgida, Gem, Grandesse, grandis, grandissima, Granii, Hendersonii, imperial blue, King (Greéns), King major, Lady of de lake, Laveistoniensis, Lilac triumphant, Louisa, Madonna, magniflora (Miller's), Maréchal Bugeaud (De Lachés), mont blanc, nec plus ultra, Ovid, Prince Albert, Prince of Wales (Gaine's), Princess royal (Piper's), Queen of May (May's), Queen Victoria (Ivery's), rival King, royal blue, Shawieana, spectabilis, splendens (Woodhall's), splendidissima, superbissima, Taglionii, Triumph (Ivery's), true blue, unique, Urania, Victoria reginae (Ivery's), violacea, Waterhousiana, Weberiana, etc. etc.

Cinnamomum Burm., Zimmtbaum.
albiflorum N. E. (= *C. Cassia* D. Don, p. 197 = *Laurus albiflora* Wall. = *L. Soncaurium* Hamilt. = *L. Cassia* Roxb. = *L. triplinervia* Reinw.), weifsblumiger, ħ. w. Ostindien.
aromaticum N. E. (= *officinarum* N. E. = *C. Cassia* Fr. N. E. = *Laurus Cassia* N. E. fratr. = *L. Cinnamomum* Andr. = *L. Malabathrum* Reinw. = *Persea Cassia* Spgl.), gebräuchlicher, ħ. w. China.
camphoratum Blume (= *calophyllum* Reinw. = *Laurus Pseudocassia* Reinw.), kampferähnlicher, ħ. w. Java.
eucalyptoides Fr. N. E. (= *nitidum* Blume, Hook. = *Laurus Cassia* Hortor. = *L. malabathrica* Roxb. = *L. nitida* Hamilt. = *Persea nitida* Spgl.), schönmützenähnlicher, ħ. w. Java.
obtusifolium N. E. (= *C. Bejolgota* Sweet).
Reinwardti N. E. (= *C. Culilawan javanicum* N. E. = *C. nitidum oblongifolium* Blume = *L. Culilawang* Reinw., non L.), Reinwardt's, ħ. w. Java, Sumatra.

Digitized by Google

Cinnamomum
pedunculatum N. E. (= *japonicum* Siebold = *Laurus pedunculata* Thbg.), gestielter, ♄. t. Japan.
Tamala Fr. N. E. (= *Laurus Tamala* Hamilt. = *Persea Tamala* Spgl.), Tamala-Z. ♄. w. Ostindien.
zeylanicum Blume, N. E. (= *verum* Sweet = *Laurus Cassia* Bot. mag. excl. Synon. = *L. Cinnamomum* N. E. fr. = *Persea Cinnamomum* Spgl.), zeylanischer, ♄. w. Zeylon, Java.
Camphora Sweet, Fr. N. E. et *gracile* Sweet, v. Camphora officinarum et β gracilis, p. 114, II., *glaucum* G. Don, v. Litsaea glauca.

Cipura humilis Humb. Bonpl. var. lutea.

Cirrhaea Lindl., Cirrhaea.
adspersa Hoffmg., angesprenkelte, 4. w. Brasilien.
atropurpurea Hoffg., schwarzpurpurfarbige, 4. w. Brasil.
livida Hoffmg., braunblaue, 4. w. Brasilien.
olivacea Hoffmg., olivenfarbige, 4. w. Brasilien.
pallida Hort., bleiche, 4. w. Südamerika.
picta Lindl., bemalte, 4. w. Südamerika.
purpurascens Hoffmg., purpurfarbige, 4. w. Südamerika.
rubro-purpurea Lindl., rothpurpurfarbige, 4. w. Südam.
Russeliana, Lindl., Russel's, 4. w. Südamerika.
squalens Lindl., gelbbunte, 4. w. Südamerika.
violaceo-virens Hoffg., violettgrüne, 4. w. Brasilien.
violascens Hoffg. (= *viridipurpurea* Hoffg., non Lodd.), violette, 4. w. Brasilien.

Cirrhopetalum Lindl., Braunstendel.
antenniferum Lindl., fühlhorntragender, 4. w. Ostindien.
auratum Lindl., goldfarbiger, 4. w. Manilla.
Blumii Lindl. (= *Ephippium ciliatum* Blume), Blume's, 4. w. Java.
Candelabrum Hort. belg., leuchterförmiger, 4. w. Ostindien.
? capitatum Lindl., (= *Ephippium capitatum* Blume), kopfförmiger, 4. w. Java.
chinense Lindl., chinesischer, 4. w. China.
compressum Lindl. (= *Ephippium uniflorum* Blume), platter, 4. w. Java.
cornutum Lindl., gehörnter, 4. w. Ostindien.
Cummingii Lindl., Cumming's, 4. w. Philippinen.
? elongatum Lindl. (= *Ephippium elongatum* Blume), verlängerter, 4. w. Java.
fimbriatum Lindl., gefranzter, 4. w. Ostindien.
Macraei Lindl., Macraei's, 4. w. Zeylon.
maculosum Lindl., gefleckter, 4. w. Ostindien.
maxillare Lindl., kerfähnlicher, 4. w. Ostindien.
Medusae Lindl., Medusen-B., 4. w. Ostindien.
nutans Lindl., nickender, 4. w. Manilla.
picturatum Lodd., bemalter, 4. w. Ostindien.
Roxburghii Lindl. (= *Aerides radiatum* Roxb.), Roxburgh's, 4. w. Ostindien.
Thouarsii Lindl. (= *Bulbophyllum longiflorum* Pet. Th. = *Cymbidium umbellatum* Spgl. = *Epidendrum umbellatum* Forst. (non Sw.) = *Zygoglossum umbellatum* Reinw.).
vaginatum Lindl. scheidiger, 4. w. Ostindien.

Cirsium T., Federdistel.
carminans Dumort., hellrothe, ♂. 4. f. Belgien.
dentatum DC. (= *anglicum* DC. var. Spgl.), gezahnte, 4. f. ?

Digitized by Google

Cirsium

polyacanthum Karel. et Kiril., vielstacheliche, 4. f. Altai.

ponticum C. A. Mey., pontische, ♂. f. Natolien.

Wiedemannii Fisch. et Mey., Wiedemann's, ♂. 4. f. Natolien.

Hybriden: oleraceo-acaule Schied., oleraceo-arvense Nägeli, oleraceo-bulbosum Nägeli, oleraceo-heterophyllum Nägeli, lanceolato-palustre Nägeli, pallens Wallr., palustri-oleraceum Rchb. (= *oleraceo-palustre* Nägeli), palustri-rigens Rchb. etc. Unbestimmtere: coloriceps (Brotero) lilacinum Hort. — *Kochianum* Löhr. = palustri-bulbosum, *medium* All. = ? Zizianum.

Cissus L., diversifolia DC. (= *heterophylla* W., non Poir.), b. fol. variegat.

Cistanthe discolor Spach, *glauca* Spach, *speciosa* Lilja, v. Calandrinia discolor, glauca et speciosa, p. 145 et p. 105, II.

Cistocarpium utriculatum Spach, v. Vesicaria utriculata, p. 845.

Cistomorpha lanceolata Caley, v. Hibbertia saligna, p. 395.

Cistus T., Ciströschen.

corberiensis Pourr. (= *hybridus* Pourr = *populifolius* β W. = *Ledonia peduncutaris* β Spach).

floribundus Tausch (= *laurifolius* Hort.), blüthenreiches, ♄. k. Südeuropa.

grandiflorus Tausch (= *longifolius* Hort.), grofsblumiges, ♄. k. ?

hirsutus Lam. (= *platysepalus* Sweet = *psilocarpus* Sweet = *Ledonia hirsuta* Spach).

hybridus Vahl (non Pourr.), Bastard-C., ♄. k. Spanien.

longifolius Lam. (= *asperifolius* Sweet = *nigricans* Pourr. = *oblongifolius* Sweet = *obtusifolius* Sweet).

parviflorus Lam. (= *complicatus* Lam. = *lilacinus* Hffg.), β) cymosus Dunal.

populifolius L. (= *cordifolius* Mch. = *acutifolius* Sweet = *Cupanianus* Presl = *latifolius* Sweet = *Ledonia populifolia* Spach).

Pouzolzii H. Monspel., Pouzol's, ♄. k. ? Südl. Frankreich.

tauricus Presl (= *creticus* MB. = *salviaefolius* Pall.), taurisches, ♄. k. f. b. Taurien.

villosus Lam., β) garganicus Tenore, γ) rotundifolius Sweet (= *eriosepalus* Visian.).

viscosissimus Tausch, schmierigstes, ♄. k. ?

Citharelοma Bunge, Geigensaum, XV. II., Cruciferae-Camelineae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ⊙. f. Caucasus.

Citrullus Neck., Schrad. (= *Colocynthis* T.), Wassermelone (Gurke, Angurie), XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.

amarus Schrad. (= *Cucumis* s. Colocynthis amarissima Schrad., p. 212).

caffer Schrad. (= *Cucurbita caffra* Eckl., Zey. = *Cucumis caffer** p. 238).

Colocynthis Arn. (= *Colocynthis officinalis* Schrad., p. 212, = *Cucumis Colocynthis* L.).

vulgaris Schrad. (= *edulis* Spach = *Cucurbita Citrullus* L. = *C. Anguria* Duch. = *Cucumis Citrullus* Sering., p. 238).

Digitized by Google

Citrus T., Orangenbaum.

amara Hassk., bitterer, ♄. w. Java.

Aurantium L. (= *corniculata* Hort. = *dulcis* Hort. = *hispanica* Hort. = *lunata* Hort. = *lusitanica* Hort. = *maxima* Hort. = *multiflora* Hort. = *myrtifolia* Hort. = *olisiponensis* Hort. = *pumila* Hort. = *racemosa* Hort. = *rubra* Hort. = *stellata* Hort. = *striata* Hort. = *sulcata* Hort. = *sylvestris* Hort. = *violácea* Hort.).

Nach Risso kommen folgende Varietäten vor: a) balearica, b) sinensis, c) nicaeensis, d) genuensis, e) cortice crasso, f) gibbosa g) microcarpa, h) duplex, i) hierochontica, k) fructu depresso, l) fructu costato, m) fructu minutissimo, n) ilicifolia, o) fructu aurato, p) fructu variegato, q) fructu variabili, r) limettiformis, s) limoniformis, t) vulgaris; nach Loiseleur noch: u) olivaeformis, v) multiflora, w) grassensis.

Bigaradia Tussac, Bigaradia-O., ♄ w. t. Antillen.

deliciosa Tenore, wohlschmeckender, ♄. k. t. ? China.

grandis Hassk., grofsblätteriger, ♄. t. w. Java.

α) sphaerocarpa Hassk., β) oblonga Hassk.

javanica Blume, javanischer, ♄. t. w. Java.

Lima Macfadyen, Lima-O., ♄. t. w. Jamaika.

Limetta Risso, a) fructu pumilo, b) limoniformis, c) fructu stellato, d) Bergamium, e) Peretta, f) pomum Adami, g) pomum Rosae Risso, h) hispanica, i) romana, k) tuberculata Loisel.

Limonellus Rumph, Hassk., Limonellen-O., ♄. t. w. Java.

α) oxycarpa Hassk., β) amblycarpa Hassk.

Limonium Risso nebst folgenden Varietäten: a) cortice tenui, b) striatum, c) calabrinum, d) Shardonii, e) incomparabilis, f) fructu pusillo, g) Caly, h) pulpa dulci, i) ponzinum, k) rosolinum, l) citratum pumilum, m) Bignetta, n) Bignetta fructu maximo, o) citratum, p) Ceriescum, q) gujetana, r) imperialis, s) fructu elongato, t) amalphitana, u) Balotina, v) racemosa, w) Laurae, x) paradisi, y) fructu bipapillata Risso, et z) pusilla, aa) rosea, bb) barbodorum, cc) cajetana, dd) Rheginorum, ee) bimamillata Loisel.

macracantha Hassk., grofsstacheliger, ♄. t. w. Java.

medica L. (= *acida* Hort. = *balotina* Hort. = *bergamotta* Hort. = *cedra* Hort. = *florentina* Hort. = *Limon* Loisel. = *macrocarpa* Hort. = *paradisiaca* Hort. = *saloniana* Loisel. = *tuberosa* Mill. Risso = *umbilicata* Hort. = *Limon racemosum* Mill. = *L. spinosum* Mill. = *L. vulgare* Mill.).

microcarpa Bunge, kleinfrüchtiger, ♄. k. t. Nordchina.

nobilis Lour., α) chrysocarpa Hassk., β) melanocarpa Hassk. (= *japonica minor* Auct.).

ovata Hassk., eiförmiger, ♄. t. w. Java.

paniculata Schum. et Thonn., rispiger, ♄. t. w. Guinea.

Paradisi Macf. (= *medica β acida* Tussac), Paradies-O., ♄. t. w. Jamaica.

Peretta Tussac, Peretta-O., ♄. w. Westindien.

β) domingensis Tussac.

pyriformis Hassk., birnförmiger, ♄. t. w. Java.

vulgaris Risso, n) corniculata, o) florifera, p) hispanica, q) rugosa, r) pulpa dulci, s) glaberrima, t) chinensis, u) fructu maximo Risso etc. etc. Unbestimmtere: australis Hort., emarginata Dsf., triptera Dsf. — buxifolia Hort., v. Severinia buxifolia Tenore.

Digitized by Google

Cladochaeta DC., Aestchenborste, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

candidissima DC. (= *Gnaphalium candidissimum* MB. (non Lam.) = *Helichrysum candissimum* D. Don, p. 384.

Cladrastis Rafin., Cladrastis, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

tinctoria Rafin. (= *Virgilia lutea* Mchx., p. 852), färbende, ♄. k. f. b. Nordamerika (Tennessee).

Clarkia Pursh, Clarkie.

pulchella Pursh, var. denticulata.

unguiculata Lindl., nägelkronige, ☉. f. Californien.

Clausena Burm., Clausena.

heptaphylla Wight et Arn. (= *Amyris anisata* Roxb. = *A. heptaphylla* Roxb., DC., p. 50).

punctata Wight et Arn. (= *Amyris punctata* Roxb.), punktirte, ♄. w. Ostindien.

Clausia Trotzky, Clausie, XV. III., Cruciferae.

aprica Trotzky (= *Hesperis aprica* Poir., p. 393).

Clavija R. et P., Clavija.

lancifolia Dsf. (= *Potalia amara* H. Par.), lanzettblätterige, ♄. w. Cayenne.

C. longifolia Don, macrocarpa Don, pendula Don, spathulata Don, undulata Don, in Südamerika heimisch und ♄. scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu werden.

Claytonia L., Claytonie.

alsinoides Sims (= *unalaschkensis* Fisch. = *Limnia alsinoides* Haw.), β) rosea (= *sibirica* Bot. mag.), γ) heterophylla Nutt., mierenähnliche, ☉. f. Oregongebiet, Unalaschka.

arctica Adans. (= *Chamissoi* DC. = *Joannea* R. et S. = *sibirica* Pall.), nördlichste, ☉. f. Nördl. Sibirien.

caroliniana Mchx. (= *spatulaefolia* Salisb. = *virginica* β *latifolia* Torr. = *virginica* γ *spatulaefolia* DC.).

Cleanthe bicolor Salisb., v. Aristea melaleuca, p. 77.

Cleithria hirta Schrad., v. Venidium Schraderi.

Clematis L, Waldrebe.

aquifolia DC., stechhülsenblätterige, ♄. Sch. t. k. Japan.

campaniflora Brotero (= *viornoides* Hort.).

coerulea Lindl., β) grandiflora Hook.

cordata Pursh (non Sims), herzförmige, ♄. Sch. f. Nordamerika.

discolor Gard., verschiedenfarbige, ♄. Sch. w. Brasilien.

erecta All. (= *recta* L.), γ) cordifolia Notaris.

Hügelii Hort. Mak., Hügel's, ♄. Sch. t. k. ? Neuholland.

japonica Thbg. (= *crassifolia* Hort.), japanische, Sch. t. k. Japan.

integrifolia L., β) elongata Trattin.

Kerii Steud. (= *brachiata* Ker, non Thbg.), Ker's, ♄. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lasiantha Fisch. (= *angustifolia* Jacq. var. ?), wollblumige, 4. f. Dahurien.

longecaudata Ledeb., langschwänzige, ♄. Sch. f. Gegend des Caspischen Meeres.

β) orientalis Lepech. (= *glauca* Claus).

microphylla DC., kleinblätterige, ♄. Sch. t. k. Neuholland.

parviflora DC. (= *campaniflora* Lodd. = *revoluta* H. Par.), kleinblumige, 4. ♄. Sch. f. ?

patens Morren et Decais., abstehende, ♄. Sch. t. k. Japan.

Digitized by Google

Clematis

pubescens Hugel, weichhaarige, ♄. Sch. t. k. Neuholland.
soongarica Bunge (= *Gebleriana* Bong. et C. A. Mey.), soongarische, 4. ♄. f. Soongarische Wüste.
β) integrifolia Schrenk.
stricta Wender. (= *lathyrifolia* Bess. = *erecta* L. var.?), steife, 4. f. Süd- und Osteuropa.
trifoliata Thbg., dreiblätterige, ♄. Sch. k. t. Japan.
Vitalba L., *β*) bannatica Wierzb.
Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen noch folgende aufgeführt: californica, candida fl. pleno, hybrida, hybrida odoratissima, insulensis, magniflora Hffg., odora Wender., odoratissima nova plena.

Cleome L., Senfkapper.

affinis DC., ähnelnde, ⊙. w. Brasilien.
flexuosa Hort., hin- und hergebogene, ⊙. w. ?
glutinosa Schrad., klebrige, ⊙. w. ?
purpurea DC., purpurfarbige, ♄. w. Peru.
urens Brotero, brennende, ⊙. ♄. w. Brasilien.
lutea Hook., v. Peritoma lutea, *monandra* DC., v. Dactylaena micrantha, *muricata* Schult., v. Gynandropsis muricata.

Clerodendron L., Loosbaum.

capense G. Gon, capischer, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
emirnense Bojer, Hooker (= *floribundum* Lindl. non RBr.).
fallax Lindl. (= *speciosissimum* Paxt. = *squamatum* H. Anglor.), täuschender, ♄. w. ? Ostindien.
fragrans W. (= *Volkameria fragrans* Vent. = *Volkmannia japonica* Jacq. = *Agricolaea fragrans* Schrk.), c) flore rubro simpl.
glandulosum Lindl. (= *speciosissimum* Hort. Anglor.), drüsiger, ♄. w. ?
Hügelii Hort. belg. (= ? *splendens* de Hügel Makoy), Hügel's, ♄. w. ? Ostindien.
Kaempferi Siebold (= *Volkameria japonica* Thbg., p. 853). Kämpfer's, ♄. t. Japan.
laevifolium Blume, glattblätteriger, ♄. ♄. w. Java, Timor.
odoratum Wall. (= *Volkameria odorata* Roxb.), gutriechender, ♄. ♄. w. Ostindien.
splendens G. Don, Lindl., schimmernder, ♄. Sch. w. Sierra Leone.
squamatum Vahl (= *coccineum* Hort. = *Kaempferi* Fisch. = *Volkameria Kaempferi* Jacq.).
villosum Blume (= *infortunatum* Dennst., non L.), zottiger, ♄. ♄. w. Ostindien, Java.
viscosum Vent. (= *canescens* Wall. = *infortunatum* W., non L. = *Volkameria laurifolia* Hort.).
phlomoides Hort. Ital., v. Verbesina atriplicifolia, p. 840.

Clethra L. G., Else.

corcovadensis Hort. belg., corcovadensische, ♄. t. Südam.
divaricata Loisel., ausgesperrte, ♄. t. Südamerika.
mexicana Hort. et (? DC.) (= *integrifolia* Moç. Sess. = *ovalifolia* Moç. Sess.), mexicanische, ♄. t. Mexico.
Michauxii Courtois, Michaux's, ♄. f. Nordamerika.
nervosa Loisel., nervige, ♄. t. Peru.
quercifolia Schltdl., Lindl., eichenblätterige, ♄. t. Mexico.
Aufserdem kommen in Mexico noch eine C. lanata Martens et Galiotti u. macrophylla Martens et Galeotti vor, die wohl noch nicht kultivirt werden.

Digitized by Google

Clianthus Soland., Prachtwicke.

Dampieri A. Cunningh. (= *Donia formosa* G. Don), Dampier's, 4. ħ. t. Neuholland.

Oxleyi A. Cunningh. (= *Donia speciosa* G. Don), Oxley's, 4. ħ. t. Neuholland.

pictus Endl. (= *carneus* Lindl. = *Baueri* A. Cunn. = *Streblorhiza speciosa* Endl.), prächtiger, 4. ħ. t. Norfolkinsel.

puniceus Soland. (= *Donia punicea* Sweet, G. Don).

Clintonia Dougl., Clintonie.

corymbosa DC., traubendoldige, ⊙. f. Nordwestl. Amerika.

Clitoria L., Clitorie.

arborea Benth. (= *Vexillaria arborea* Hoffg.), baumartige, ħ. ħ. w. Brasilien.

arborescens Ait., baumähnliche, ħ. ħ. w. Trinidad.

fulgens van Houtte, leuchtende, ħ. Sch. w. ? Südamer.

laurifolia Desv. (= ? *Galactia coriacea* N. E.), lorbeerblätterige, ħ. Sch. w. Brasilien.

mexicana Lk. (= *C. Mariana* Schltdl.).

coccinea Schrad., v. Periandra coccinea.

Hinsichtlich der übrigen s. Centrosema.

? **Clodanthus** chinensis H. Booth. 4. ? ?

Clowesia Lindl. (Rev. Clowes zu Broughton Hall bei Manchester), XX. 1., Orchideae.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Brasilien.

Cluytia collina Roxb., *patula* Roxb., p. 207, gehören zur Gattung Bridelia, p. 131, werden aber wohl kaum kultivirt.

Clypeola L., Schildkraut.

cyclodonta Delile, kreiszahnige, ⊙. f. Südfrankreich.

Cnicus diacantha LaBill. (= *Cirsium diacantha* DC.) et *fruticosus* Dsf., v. Chamaepeuce diacantha et fruticosa, p. 186 et 187. Die übrigen s. Cirsium, p. 197 et 198, II.

Cnidium Cuss., Brenndolde.

anomalum Ledeb., abweichende, 4. f. Altais. Sibirien.

argenteum Cesati, silberfarbige, 4. f. Dahurien.

carvifolium MB. (= *Laserpitium caucasicum* MB., p. 446).

Petroselinum DC. (= *Peucedanum Petroselinum* Dsf.), Steinsilgenähnliche, 4. f. ?

atropurpureum Spgl., v. Thapsium cordatum β atropurpureum, *Fischeri* Spgl. = Coenolophium Fischeri, p. 876, *pyrenaeum* Spgl., v. Ligusticum pyrenaeum, tenuifolium Mch., v. Heloscíadium lateriflorum s. leptophyllum, p. 879.

Cnidoscolus Pohl, Brennnufs.

Marcgravii Pohl (= *Jatropha herbacea* Auct. et ? L.), Marcgrav's, ⊙. 4. w. Neuspanien.

Michauxii Pohl (= *Bivonaea stimulosa* Raf. = *Jatropha stimulosa* Mchx. = *J. urens* Walt.), Michaux's, ⊙. 4. w. k. Nordamerika.

neglectus Pohl (= *Jatropha urens* Hort., non L.), übersehene, ħ. w. Südamerika.

palmatus Pohl (= ? *Jatropha aconitifolia* Jacq. = *J. palmata* W.), handförmige, ħ. w. Südamerika.

quinquelobus Pohl (= *Janipha urens* Poir. = *Jatropha urens* L.), fünflappige, ħ. w. Südamerika.

Cnoophora Kaulf. [1]), Wollfarrn, XXIV. 1., Pteroideae.

elegans H. Hügel., zierlicher, ħ. w. Ostindien.

---

1) Wohl richtiger Chnoophora.

Digitized by Google

Cobaea Cav., Cobaea.
macrostemma Pav. in Hook. bot. mag. (= *lutea* D. Don = *acuminata* DC.), grofsfadige, 4. ♄. Sch. t. k. Guatimala.
stipularis Lindl., Benth., zwischenblätterige, 4. ♄. Sch. t. k. Guatimala.

Coburgia Swt., Coburgie.
humilis Hort. belg., niedrige, 4. Zw. w. Südamerika.
versicolor Lindl., buntfarbige, 4. Zw. w. Südamerika.
flava Hort. belg. = ? fulva Herb.

Coccinia Wight Arn., Coccinie, XXII. x. (XVI. 1.), Cucurbitaceae.
indica Wight. Arn. (= *Bryonia grandis* L., p. 135 = *B. Monoi* Sering. = *B.* ? *palmata* L. = *Cucurbita dioica* Roxb. = *Momordica Cosel* Dennst. = *M. monadelpha* Roxb.), indische, 4. Sch. w. Ostindien.

Coccocypselum P. Br., Beerenröthe.
glabrum Bartl., glatte, 4. w. Panama.

Coccoloba Jacq. L., Seetraube.
fagifolia Jacq. (= *nitida* Dsf., non H. B.), buchenblätterige, ♄ w. Südamerika[1]).
latifolia Lam (= *rheifolia* Dsf.).
ferruginea H. Berol. et Endl., H. Vindob., rostfarbige, ♄. w. ?
macrophylla Dsf., grofsblätterige, ♄. w. ?
pyrifolia Dsf. (= *excoriata* β Lam.), birnblätterige, ♄. w. Antillen.
rugosa Dsf., runzelige, ♄. w. Antillen.
sagittata Poir. (= *Conobaea sagittaefolia* Bertero = *Menispermum sagittatum* Spgl. = *Polygonum acetosaefolium* Vent.), pfeilblätterige. ♄. Sch. w. Südam.
scandens Brotero (= ? *sagittaefolia* Ortega) klimmende, ♄. Sch. w. Südamerika[2]).

Cocculus C. Bauh, DC., Fischkörnerbaum.
japonicus DC. (= *Menispermum japonicum* Thbg.), japanischer, ♄. Sch. k. Japan.
Cocoyanthe flos cuculi Rchb., v. Lychnis flos cuculi, p. 482.

Cochlearia T., Löffelkraut.
arctica Schltdl. (= *officinalis* L. var. Spach), nördlichstes, 4. f. Nördl. Sibirien.
sagittaefolia Desv., pfeilblätteriges, ⊙. f. ?
fenestrata RBr., v. Eutrema Rossii.
Cochliospermum altissimum Lagasca, v. Schanginia altissima, p. 729, *Cavanillesii* Lagasca, *Clemente* Lag., *hispanicum* Lag., *salsum* Lag., v. Schoberia crassifolia, Clemente, trigyna et salsa.

Cochlospermum Kunth, Schneckensaame, XIII. 1., Ternstroemiaceae.
insigne St. Hil., Juss. et Cambess. (= *Maximiliana regia* Mart. et Schrk. = *Wittelsbachia insignis* Mart. et Zucear.), ausgezeichneter, ♄. w. Brasilien.

Cocos L., Kokospalme.
amara Jacq., bittere, ♄. w. Martinique.
australis Hort. Par. südliche, ♄. w. Paraguay.

---

1) Endlicher Catalog. hort. academ. Vindob. führt eine C. fagifolia Hort. Carlsr. ohne Angabe des Vaterlands auf.

2) Vielleicht mit vorhergehender =.

Digitized by Google

Cocos

fernambucensis van Houtte, Fernambuco-K., ♄. w. Fernambuco.

Mikaniana Mart., Mikans, ♄. w. Brasilien.

oleracea Mart., kohlgebende, ♄. w. Brasilien (Minas Geraé's).

Aufserdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen (zumal niederländischen) noch folgende (deren Autor und Vaterland mir unbekannt ist), vor: C. Cheribu, frigida, melanococca, ovata, reflexa H. Anglor., simplicifolia. — *C. lapidea* G. (= *Lithocarpus coccifórmis* Targ. Tozz. = *C. de Piacaba* Max. Neuw.), v. Attalea funifera, p. 106).

Codonocephalum Fenzl, Glockenköpfchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae (Inuleae).

inuloides Fenzl., alantähnliches, 4. k. f. b. Kurdistan. *Codonophora grandiflora* Lindl. et *lanceolata* Lindl., v. Rytidophyllum prasinatum et tomentosum. *Codonoprasum carinatum* Rchb., *flavum* Rchb., *flexum* Rchb., *fuscum* Rchb., *intermedium* Rchb., *longispathum* Rchb., *oleraceum* Rchb., *pallens* Rchb., et *paniculatum* Rchb., v. Allium carinatum L. etc. p. 29 etc.

Codonopsis Wall., DC., Glöckchen, V. I., Campanulaceae.

lurida Hort. Lips., schmuzigfarbiges, 4. k. f. ?

purpurea Wall. (= *Campanula purpurea* Spgl. = *Wahlenbergia purpurea* DC.), purpurfarbiges, 4. k. f. Nepal.

Codoriocalyx Hasskarl., Schweifkelch, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

conicus Hassk., kegelförmiger, ♄. w. Java.

gyrans Hassk. (= *Desmodium gyrans* DC., p. 257 = *Hedysarum gyrans* L.), ♄. ♂. Bengalen.

gyroides* (= *Desmodium gyroides* DC., p. 257 = *Hedysarum gyroides* Roxb.).

Coelachyrum Hochst. et N. E. (= *Coelochloa* Hochst.), Hohlspelze, III. II., Gramineae.

brevifolium Hochst. et N. E. (= *Eleusine brevifolia* Hochst. et Steud.), kurzblätterige, ☉. f. Arabien.

Coelanthus W., Hohlblümchen, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

complicatus W. herb. (= *Lachenalia pusilla* Eckl. = *reflexa* Thbg. = *Phormium orchioides* Thbg.), zusammengefaltetes, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Coelestina Cass., Coelestine.

paleacea Gay, spreublätterige, 4. k. Mexico.

Coelia Lindl. (= *Caelia* Don), Coelie, XX. I., Orchideae.

albiflora H. Cels., weifsblumige, 4. w. ? Südamerika.

Galeottiana van Houtte, Galeotti's, 4. w. Mexico.

glacialis van Houtte, Gletscher-C., 4. w. ? Südamer.

macrostachya van Houtte, grofsährige, 4. w. ? Südam.

purpurea H. Cels., purpurfarbige, 4. w. ? Südamer.

triptera Don (= *Bauériana* Lindl. = *Cymbidium tripterum* Sw. = *Epidendrum tripterum* Sm.), dreiflügelige, 4. w. Jamaica [1]).

---

1) Coeloglossum Lindl. (non Hartm.), Hohlzüngel, XX. I., Orchideae.

acuminatum Lindl. Nepal, brevifolium Lindl. Nepal, densum Lindl. (= *Gymnadenia tenuis* Lindl.), lacertiferum Lindl. (= *Gymn. tenuiflora* Lindl.), secundum Lindl. (= *Gymn. secund.* Lindl.). Die letztern in Ostindien heimisch. Scheinen bis jetzt sämmtlich noch nicht kultivirt zu werden.

Digitized by Google

Coelobogyne ilicifolia Hort. Kew., v. Sapium ilicifolium, p. 721.

Coelogyne Lindl., Hohlnarbe.

candida Lindl., blendendweifse, 4. w. Ostindien.
Cummingii Lindl., Cumming's, 4. w. Ostindien.
elata Lindl., hohe, 4. w. Ostindien.
fuscescens Lindl., bräunliche, 4. w. Nepal.
interrupta Lindl., unterbrochene, 4. w. Ostindien.
nitida Lindl. (= *punctulata* Lindl.), glänzende, 4. w. Nepal.
odoratissima Lindl., wohlriechendste, 4. w. Ostindien.
testacea Lindl., scherbengelbe, 4. w. Ostindien.
undulata Lindl., wellenförmige, 4. w. Ostindien.
fuliginosa H. Belg. = ? prolifera.

Coffea L., Kaffeebaum.

hirsuta G. Don, rauher, ♄. w. Sierra Leone.
mauritiana Lam. (= *arabica* β W. = *sylvestris* W.), mascarenischer, ♄. w. Mascarenas.
paniculata Aubl. (= *Tetramerium paniculatum* Spgl., p. 802).
stenophylla G. Don, schmalblätteriger, ♄. w. Sierra Leone.
C. Moka Hort. = arabica, *occidentalis* Jacq., v. Faramea odoratissima, *opulina* Forst., v. Pavetta opulina.

Coix Lacryma L., β) gigantea Hort.

Colchicum T., Zeitlose.

atticum Sprunner, attische, 4. Zw. f. Griechenland.
autumnale L., h) polyanthum Ker, i) multiflorum Brotero.
Bertolonii Steven (= *montanum* Bertol. = *Cupani* Guss.), Bertolone's, 4. Zw. f. Italien, Dalmatien, Griechenl.
Bivonae Guss. (= *variegatum* Bivon. = *latifolium* Sibth. = *byzantinum* Tenore = *tesselatum* Mill.), Bivone's, 4. Zw. f. Sicilien, Griechenland, Portugal.
laetum Steven, freudige, 4. Zw. f. Syrien, Caucasus.
neapolitanum Tenore, neapolitanische, 4. Zw. f. Neapel.
parvulum Tenore, kleine 4. Zw. f. Neapel.
speciosum Steven (= ? *illyricum* Friwaldsky), prächtige, 4. Zw. f. Iberien, Macedonien.
Steveni Kunth (= *montanum* Dsf. excl. syn.), Steven's, 4. Zw. f. b. k. Nordafrika, Syrien, Persien.
umbrosum Steven, Fisch. (= *arenarium* β umbrosum Bot. reg.).
Hinsichtlich der übrigen s. Bulbocodium, p. 81, II.

Colea Bojer, Colea, XIV. II., Bignoniaceae.

floribunda Boj., Lindl., blüthenreiche, ♄. w. Madagasc.
mauritiana Boj. (= *Bignonia* Colei Boj. mss. Hook.), mascarenische, ♄. w. Mauritius.
Telfairiae Boj. (= *Bignonia Telfairiae* Boj. mss. Hook.), Telfair's, ♄. w. Mascarenas, Madagascar.

Coleonema Barth et Wendl., album Bartl. et Wendl., β) virgatum Schltdl., Eckl., Zeyh., γ) gracile Schltdl., Eckl., Zeyh.
rubrum Hort. (= *tenuifolium* Hort.) = pulchrum.
Coleosanthus tiliaefolius Cass., v. Eupatorium II., Hebeclinium macrophyllum, p. 321.

Coleus Lour., Scheidenlippe.

aromaticus Benth. (= *crassifolius* Benth. = *Plectranthus aromaticus* Roxb. = *P. crassifolius* Hort. = *amboinensis* Spgl.).
scutellarioides Benth. (= *Plectranthus scutellarioides* RBr., p. 634), 4. ♄. w. ?

Digitized by Google

Colicodendron Mart., Pumperbaum, XIII. 1., Capparideae.

Breynia Endl. (= *Capparis Breynia* L., p. 158).

Zwei andere brasilianische Arten longifolium Mart. et Yco Mart., werden kaum kultivirt.

Colladonia DC., (Colladon Botaniker zu Genf), V. 11., Umbelliferae.

triquetra DC. (= *Cachrys triquetra* Spgl. = *Laserpitium triquetrum* Vent., p. 446).

Collaea DC. (A. Colla, Besitzer eines reichen Gartens zu Rivoli bei Turin), XVII. 1. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

pendula Benth. (= *Clitoria Galactia* L. = *Galactia pendula* P., p. 342).

Collania urceolata Schult., v. Urceolina pendula, p. 831.

Colletia Commers., Colletie.

ferox Gill. et Hook. (= *horrida* Brogn. (non W.) = *spinosa* Bertero).

parvifolia Hort., kleinblätterige, ♄. w. t. ?

Collinsia micrantha Wender., v. Clintonia elegans, p. 206.

Collinsonia L., Collinsonie.

punctata Ell., punktirte, 4. f. Carolina, Georgien.

verticillata Baldw., Nutt., wirtelblätterige, 4. f. Georgien.

cuneata Wenderoth = ? canadensis.

Collomia coccinea Lehm. (= *Cavanillesii* Hook.).

heterophylla Hook., v. Navarretia heterophylla.

Colocasia Raj., Schott, Endl., Colocasiawurz, XXI. IX., Aroideae.

antiquorum Schott, (= *Arum Colocasia* L., p. 85).

Boryi Kunth (= *Arum cordifolium* Bory d. St. Vinc. Dsf. Catal.), Bory's, 4. Kn. w. Bourbon.

cucullata Schott (= *Caladium cucullatum* P.).

esculenta Schott (= *Caladium esculentum* Vent., p. 143).

humilis Hassk., niedrige, 4. Kn. w. Java.

indica Kunth (= *Arum indicum* Lour.), indische, 4. Kn. w. Bengalen, Cochinchina.

macrorrhiza Schott (= *Arum macrorrhizum* L., p. 85).

nymphaeifolia Kunth (= *Caladium nymphaeifolium* Vent., p. 143).

odorata Brogn. (= *Caladium odoratum* Bot. reg., p. 143).

ramosa Schott (= *Arum ramosum* Hort. Angl. Lk., p. 86).

Colophonia mauritiana DC., v. Canarium commune, p. 115, II.

Columnea L., Columnea.

flava Martens et Galeotti, hellgelbe, ♄. Sch. w. Mexico.

scandens L. (= *villosa* P. = *rotundifolia* Salisb.).

Schiedeana Schltdl. (= *longiflora*, = *Lindeniana*, = *spectabilis* Hort.), Schiede's, 4. ♄. w. Mexico.

splendens Schlchtl., Paxt. (= *Nematanthus Guilleminiana* = *C. grandiflora* Hort. Angl.), schimmernde, 4. ♄. w. Mexico.

Aufserdem kommen in den Verzeichnissen der belgischen Handelsgärtner noch vor: C. chloronema, crassifolia, pilosa, wahrscheinlich sämmtl. aus Südamerika.

erecta Lam., v. Achimenes coccinea, p. 6, II.

henkelioides Spgl., v. Streptocarpus Rexii, *speciosa* W., v. Rytidophyllum prasinatum.

Colutea tanacetifolia Hort. Turin. ?

Digitized by Google

Comaropsis Rich., Sumpfbeere.

pedata DC. (= *Dalibarda pedata* Steph. = *Rubus pedatus* Sm.), fufsförmige, 4. f. Nordamerika.

sibirica DC. (= *Dalibarda ternata* Steph. = *Waldsteinia sibirica* Tratt.), sibirische, 4. f. Sibirien.

Comarostaphylis arguta Zuecar. (? = *arbutoides* Bot. reg.), v. Arctostaphylos arguta, p. 42, II.

Comarum L., Sumpfröschen.

Salesowii Bunge (= *Potentilla Salesowii* Steph. W. p. 652).

Combretum Löfl., Langfaden.

acuminatum Roxb., zugespitzter, ♄. w. Ostindien.

latifolium G. Don (? Blum.) (= *macrophyllum* Roxb.), breitblätteriger, ♄. Sch. w. Ostindien.

leucophyllum G. Don, weifsblätteriger, ♄. w. Sierra Leone.

racemosum P. B. (= *corymbosum* Schum. = *trigonoides* Perr.).

Roxburghii G. Don (non Spgl.), Roxburgh's, ♄. w. Ostindien.

Comesperma LaBill., Schopfsaame.

virgatum LaBillard, ruthenförmiger, ♄. t. Neuholland.

integerrimum Endl., simplex Endl. und strictum Endl., werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Commelyna Dill., Commelyna.

carnea Schltdl. (= *scabra* Benth. = *Ehrenbergiana* Lk. Kl. Otto), fleischfarbige, 4. Kn. k. Mexico.

debilis Ledeb., schwache, 4. k. ?

dianthifolia DC. Red., nelkenblätterige, 4. Kn. t. w. Mexico.

diffusa Burm., Vahl, weitschweifige, ☉. w. m. f. Ostind.

elegans H. B. (= *hirsuta* W.), zierliche, 4. w. Südamerika.

erecta L. (= *communis* Walt.), aufrechte, 4. k. Virginien.

Karwinskii Mart., Karwinsky's, 4. k. t. Mexico.

lanceolata RBr., lanzettblätterige, 4. k. Neuholland.

lineolata Blume, linirte, ☉. m. w. Java.

Loddigesii Steud. (= *undulata* Lodd.), Loddiges's, 4. k. t. Mexico.

pallida H. B. K. et W. E. (= *rubens* Redouté = *Aclisia foetida* H. Berol.), bleiche, 4. w. Mittägl. Amer.

paludosa Blume, Sumpfliebende, 4. w. Java.

persicariaefolia DC., Red. knöterigblätterige, 4. w. ?

puberula H. Berol., feinhaarige, 4. t. Mexico.

scapigera H. Berol., schafttragende, 4. k. t. ?

β) orchioides H. Berol. (non Booth).

stricta Dsf. (= *pallida* H. Par. = *caroliniana* H. Par. = *repens* H. Berol.), steife, 4. k. t. Mexico.

(*C. angustifolia caroliniana, debilis, rubens* Hort. (nec Auct.) et ? puberula H. Berol. sind nach Kunth nur Formen dieser Art).

variabilis Schltdl., veränderliche, 4. Kn. t. k. Mexico.

virginica L., virginische, 4. f. b. k. Nordamerika.

Willdenowii Kunth (= *communis* Herb. reg. Berol.), Willdenow's, ☉. w. m. f. ?

(*C. dubia, erecta, japonica, longicaulis, paniculata, stricta, tuberosa* Hort. (nec Auct.), sind nach Kunth nur Formen d. C. coelestis).

C. axillaris L. spec., v. Cyanotis axillaris, p. 241, *dubia* Jacq., v. Leptanthus gramineus, p. 455, *rosea* Schltdl., v. Tinantia fugax, *Zanonia* L., v. Campelia Zanonia, p. 156. — *C. affinis* Poir., *Brownii* A. Dietr. etc., v. Aneilema affinis, acuminata etc., p. 58 et p. 35, II.

Digitized by Google

Commersonia Forst. aspera Colebr. in Roxb. fl. ind. (= *Büttneria grandifolia* DC., p. 136), rauhe, ♃. w. Ostindien.

? vitifolia Hort., weinblätterige, ♄. w. ?

Commidendron DC., Gummistrauch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae [1]). Vergl. p. 217.

gummiferum DC. (= *Conyza gummifera* Roxb.).

rugosum DC. (= *Aster glutinosus* Roxb. = *Conyza rugosa* Ait.).

Comocladia P. Br., ilicifolia Sw., p. 214 (= *angulosa* W. = *triouspidata* Lam. = *Ilex Dodonaea* L.).

Comparettia Poepp., Endl., Comparettia.

rosea Lindl., rosafarbige, ♃. w. Spanisches Amerika.

Ob C. saccata Poepp., Endl. in Peru heimisch, kultivirt wird, ist mir nicht bekannt.

Conanthera Echeandia P., v. Echeandia terniflora.

Conchium aciculare Sm. etc., v. Hakea acicularis etc., p. 374 [2]).

Coniandra Schrad., Coniandra, XXI. x. (XVI. I.), Cucurbitaceae.

dissecta Schrad. (= *Bryonia dissecta* Thbg., p. 135).

glauca Schrad., blaugrüne, ♃. Sch. t. k. Cap d. g. H. *Conioselinum canadense* Torr. et Grey, v. Cnidium canadense, p. 208.

Conium L., Schierling.

maculatum L., γ) sibiricum, δ) tenuifolium Mill., ε) strictum Tratt.

nodosum H. Par., Fisch., Tenor., knotiger, ♂. f. Neapel. *moschatum* H. B., v. Arracachia moschata, p. 45, II.

Conobea Aubl., Conobea, XIV. II., Personatae.

ovata Otto H. Berol., eiförmige, ♄. w. Südamerika.

Conoclinium DC., Kegelhüllchen, XIX. I., Compositae-Eupatorineae. Vergl. p. 320. Sect. III.

coelestinum DC. (= *Eupatorium coelestinum* L., p. 320).

oligolepis Kunze, wenigschuppiges, ♄. k. Mexico.

Conopodium canadense K., v. Cryptotaenia canadensis, *Claytoni** v. Osmorrhiza longistylis.

Conospermum Sm., Kegelsaame.

acerosum Lindl., nadelblätteriger, ♄. t. Neuholland.

amoenum Meissn., lieblicher, ♄. t. Neuholland.

brachyphyllum Lindl., kurzblätteriger, ♄. t. Neuholland.

densiflorum Lindl., dichtblumiger, ♄. t. Neuholland.

Hügelii RBr., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

incurvum Lindl., einwärtsgekrümmter, ♄. t. Neuholland.

laniflorum Endl., wollblumiger, ♄. t. Neuholland.

Stoechadis Endl. (= *sclerophyllum* Lindl.), knorpelblätteriger, ♄. t. Neuholland.

taxifolium Sm. (= ? *salicifolium* Knght. Salisb.).

tenuifolium RBr. (= *repens* Sbr.), dünnblätteriger, ♄. t. Neuholland.

teretifolium RBr., stielrundblätteriger, ♄. t. Neuholland.

undulatum Lindl., wellenblätteriger, ♄. t. Neuholland.

Conostegia Don, DC., Conostegie, X. I, Melastomaceae.

arborea Schltdl. (= *Melastoma arbor.* Schltdl.), baumartige, ♄. w. Mexico.

---

1) Schon p. 217 als Untergattung II. von Conyza aufgeführt, verdient aber nochmals als besonderer Gattung Erwähnung.

2) Conchochilus Hassk. distichus et oppositiflorus Hassk., Orchideae, beide in Java heimisch, werden bei uns wohl kaum kultivirt.

Digitized by Google

Conostegia
holosericea Don (= *Melastoma holosericea* Pavon., non Hort.), sammethaarige, ♄. w. Peru.
semicrenata Sering. (= *Melastoma acuminata* Desv. = *ebracteata* Dietr. = *elongata* Vahl = *semicrenata* Rich.), halbkerbige, ♄. w. Westindien.
superba Don (= *Melastoma superba* Bonpl.), stolze, ♄. w. Mittägl. Amerika [1]).

Conradia Mart., Conradie, XIV. II., Person.-Gesnerieae.
calycina Mart. (= *Gesneria calycina* Sw., p. 354 = *Gloxinia calycina* Hort. = *Sinningia calycina* Hort.).
Craniolaria Mart. (= *Craniolaria fruticosa* L. = *Gesneria Craniolaria* Sw. = *G. fimbriata* Lam. = *Martynia fruticosa* Gloxin), Craniolarienähnliche, ♄. w. Domingo.
ventricosa Mart. (= *Gesneria ventricosa* Sw. = *Pentaraphia longiflora* Lindl., p. 605), bauchige, ♄. w. Westindien.

Conringia alpina Lk., v. Arabis brassicaeformis, p. 70.

Convallaria majalis L., d. foliis variegatis, *β)* Mappii Gmel., *γ)* latifolia Mill. (non Jacq.).

Convolvulus L., Chois., Winde.
althaeoides L. (= ? *flexuosus* Buch.), *β)* nanus Chois., *γ)* hirsutus Tenor. (non Stev. M. B.), (= *bryoniaefolius* W. = *italicus* R. et S.), *δ)* ferrugineus Chois., *ε)* sericeus Tratt., *ζ)* argyreus DC. (= *althaeoides* Bot. mag. = *argyrophyllus* Hoffg.), *η* pedatus Forsk. (= *tenuissimus* Sibth. = *elegantissimus* Mill.).
arvensis L. (= *sagittaefolius* Salisb. = *prostratus* Schm.), *β)* pumilus Wallr., *γ)* obtusifolius Chois. (= *corsicus* R. et S.), *δ)* crassifolius Chois. (= *chinensis* Ker = *Malcolmi* Roxb.), *ε)* biflorus Chois. (= *hastatus* Forsk. Vahl = *hastifolius* Poir.), *ζ)* multiflorus Bess., *η)* linearifolius Chois. (= *sagittifolius* Fisch. h. Gor.), *ϑ)* parvifolius Chois., *ι)* auriculatus Desv., *χ)* villosus Choisy. In Europa, Asien, Afrika und Südamerika verbreitet.
bonariensis Cav. (= *Aniseia diversifolia* Walp.).
californicus Chois. (= *Calystegia subacaulis* Hook.), californische, 4. f. Neu-Californien.
canariensis L. (= *pannifolius* Dryand. Ait. = *pallidus* Salisb.).
capensis Burm., capische, 4. Sch. k. Cap d. g. Hoffn.
dianthoides Karel. et Kir. (= *pseudocantabrica* Schrenk et C. A. Mey.), nelkenähnliche, 4. f. Asiat. Rußland.
dissectus Cav. (non L.) (= ? *variabilis* Weinm. ?), schlitzblätterige, 4. k. Sch. Chili, Cap d. g. Hoffn.
erinaceus Eichw., Erinusähnliche, ♄. f. b. k. Gegend des caspischen Meeres.
erubescens Sims (= *rubescens* Poir. = ? *geniculatus* Lehm.), *β)* angustissimus RBr., *γ)* dilatatus Chois., ♂. 4. ?
Falkia Jacq., Falkia-W., 4. Sch. k. Cap d. g. Hoffn.
farinosus L. (= *hirtus* Mill. ? L.), ⊙. 4. Griechenland, Madeira, Mascarenas, Madagascar, Cap d. g. Hoffn.
fatmensis Kunze (= *ambliocalyx* Steud.), fatmeische, ⊙. f. Sch. Aegypten, Arabien.

---

1) Conostephium Benth., Epacrideae minus Lindl. et pendulum Benth. ♄. Neuholland. Ob kultivirt?

Digitized by Google

Convolvulus

Forskolii Del. (= *Cneorum* Forsk., non L.), Forskol's, ♄. k. Aegypten, Sinai.

Hermanniae L'Her. (= *crenatus* Jacq. = *stellaris* Salisb. = *Vahlii* R. et S. = *Ipomoea Hermanniae* G. Don).

hirsutus Stev., M. B. (= *betonicifolius* Mill. = *sagittifolius* Sibth. = *Sibthorpii* R. et S. = *pubescens* Russ.).

holosericeus MB. (= *procumbens* Pall. = *mollissimus* Pall.), sammethaarige, ♄. f. b. k. Taurien, Kleinasien.

lanuginosus Desr. (non Vahl) (= *saxatilis* Vahl), wollige, 4. f. b. k. Westeuropa, Taurien.

lineatus L. (= *spicaefolius* Desr. = *intermedius* Lois. = *Cneorum* β Gouan = *humilis* Salisb. = *Besseri* Spgl. = *Gerardi* R. et S.).

Massoni Dietr. (? = *solanifolius* Lowe = *suffruticosus* Ait. Kew. (non Desf.) = *Dryandri* Spgl. = *suberosus* W. mss. h. = *rupestris* Buch. = *volubilis* Brouss.), Masson's, ♄. Sch. k. Madeira.

micranthus R. et S. (non W.) (= *parviflorus* Desr., non Vahl, non Salisb. = *polycarpus* H. B. K. = *Plumieri* Spgl. = *Jacquemontia micrantha* et *polycarpa* G. Don), kleinblumige, ♄. Sch. w. Westindien, Mexico.

ocellatus Hook., geäugelte, ♄. t. Mittägl. Afrika.

oleaefolius Desr. (= *linearis* Curt, non DC. = *Tournefortii* Sieb.), oelbaumblätterige, 4. ♄. k. Griechenland, Creta, Kleinasien.

pentapetaloides L. (= *prostratus* Forsk. Roth), Süd- und Westeuropa, Majorca, Griechenland.

persicus L., persische, 4. ♄. k. f. b. Persien, asiat. Türkei, Sibirien.

piloselloefolius Desr. (= ? *tenuis* Tenor. = ? *linearifolius* Mill.), mausöhrchenblätterige, ⊙. f. Persien, Kleinasien.

scoparius L. (= *Rhodorrhiza scoparia* Webb. = *Breweria* ? *scoparia* Lindl.).

sericeus Burm. (= *lanatus* Vahl = *salviaefolius* Sieb.), seidenhaarige, 4. ♄. k. Aegypten, Arabien, Kleinasien, Kreta.

siculus L. (= *ovatus* Mch. = *parviflorus* Sal., non Vahl = *Berardi* Hort. Mutin. = *neglectus* Hort.).

tricolor L., β) meonanthus Hffmsg. et Lk.

undulatus Cav. (= *strictus* Lehm.).

Nicht hinlänglich oder nur den Namen nach bekannte Arten: albus H. Ticin., arenosus Cyrill., Boerhavii H. Neapol., emarginatus Lk. 4., erianthus W. Nordamer., hircinus Cat. Parm., laniger W., monospermus Hort. Parm., nudus Hort., Otites W., reniformis Hort. Carlsr., stellatus Brot., superbus H. Tic., villosus Dietr. — *albivenus* Lindl., *arborescens* H. B. K., *cairicus* L., *candicans* Soland., *ciliatus* Vahl, *dentatus* Vahl, *ebracteatus* Desr., *filicaulis* Vahl, *glaber* Aubl., *macrocarpus* L., *ochraceus* Bot. reg., *ocularis* Endl., *panduratus* L., *reptans* L., *scrobiculatus* Bot. reg., *tiliaceus* W., *verrucipes* Tenor., v. Ipomoea albivenia, arborescens, palmata, pandurata, tamnifolia, chryseidis, ebracteata, filicaulis, glabra, operculata, ochracea, ocularis, pandurata, reptans, scrobiculata, tiliacea, verrucipes, — *acetosaefolius* Vahl, *cissoides* Vahl (=

Digitized by Google

Convolvulus

colycinus H. B. K.), *edulis* Thbg. (= *Batatas* L. = *esculentus* Spgl.), *glaucifolius* Spgl., *Jalapa* L., *littoralis* L. (= *arenarius* Vahl = *Imperati* Vahl = *obtusilobus* Mchx. = *sinuatus* Petagna = *stoloniferus* Cyrill.), *paniculatus* L. (= *roseus* H. B. K.), *pentaphyllus* L. (= *hirsutus* Roxb.), *quinquefolius* L. (= *palmatus* Mill.), v. Batatas acetosaefolia etc., p. 61, II., — *argenteus* Wall., *capitatus* Vahl, *cuneatus* W., *ellipticus* Heyne (= *laurifolius* Roxb. = *pedunculatis* Wall.), *malabaricus* L., *mollis* Burm., *Roxburghii* Wall., *speciosus* L. fil. (= *nervosus* Burm.), *splendens* Hornem. etc., v. Argyreia argentea etc., p. 83 et 44, II., — *bicolor* Vahl, v. Shuteria bicolor, — *candicans* R. et S. (= *hypocrateriformis* Desr. = *hypoleucus* R. et S.), *gangeticus* Roxb. (= *tiliaefolius* Desr.) etc., v. Rivea hypocrateriformis, tiliaefolia etc., — *pentanthus* Jacq., *verticillatus* L., v. Jacquemontia violacea et azurea, — *bogotensis* W., *pudibundus* Lindl., *purpureus* L., *serotinus* DC. etc., v. Pharbitis bogotensis, cathartica, hispida, serotina etc. Hinsichtlich der übrigen s. überhaupt Ipomoea u. noch die Gattungen Aniseja, Calonyction, Calystegia, Exogonium et Quamoilit.

Conyza T. Less., Dürrwurz.

absinthifolia DC. (= *microcephala* Spgl. = *montana* et *stricta* Heyne), wermuthblätterige, 4. w. Ostindien.

β) pinnatifida Roxb. (= *Baccharis trifurcata* Trevir. = *Erigeron pinnatifidum* Don).

chilensis Spgl. (= *diversifolia* Weinm. = *longifolia* et *procera* Dsf. H. Par. = *Blumea longifolia* et *senegalensis* Hort.).

decurrens L. (= *glomerata* Lk.), herablaufende, ☉. f. m. Ostindien.

laxiflora Dsf., lockerblumige, ☉. f. ?

mauritiana Bojer, mascarenische, ☉. m. f. Mauritius.

pinnatifida Less. (non Roxb.) (= *Erigeron pinnatifidum* Thbg.), fiederspaltige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

viscosa Bojer, schmierige, ☉. m. f. Mauritius.

ovatifolia Hort. = ?, *candida* L., *limonifolia* Sm. et *verbascifolia* W., v. Inula candida et *β*, *squarrosa* L., v. Inula squarrosa.

Cookia Sonn., Cookia.

anisata Dsf., anisriechende, ♄. w. ?

macrophylla Lindl., grofsblätterige, ♄. w. Ostindien.

Copaifera (= *Copaiba* Adans. = *Copaiva* Jacq.), officinalis L. (= *C. Jacquini* Dsf.).

Coprosma Forst., L. fil., Coprosma, V. 1., Rubiaceae.

lucida Forst., L. fil., glänzende, ♄. k. t. Neuzeeland.

Ob C. pilosa Endl. (♄. Norfolkinsel) kultivirt wird, ist mir nicht bekannt.

Corallorrhiza Hall., RBr. Korallenwurz.

ericetorum Drej., Heide-K., 4. Kn. f. Dänemark (Seeland).

innata RBr. (= *C. Halleri* Rich. = *C. Neottia* Scop.).

verna Nutt. (= *innata* Eaton, non RBr.), Frühling's, 4. Kn. f. Nordamerika.

virescens Drej., grünliche, 4. Kn. Dänemark (Insel Möen).

Coralluma Haw., v. Caralluma, p. 159.

Corbularia Haw. Sal, v. Narcissus Sect. IV. p. 540.

Digitized by Google

Corchorus L., Mufspflanze.

acutangulus Lam. (= ? *tetragonus* Mill. = *aestuans* Wall., non L. = *subscandens* Wall.).

bifurcatus Mill., zweigabelige, ⊙. w. Jamaika.

catharticus H. Monspel., Purgier-M., ⊙. w. m. Nubien.

fascicularis Lam., büschelförmige, 4. ♄. w. Ostindien.

linearis Mill. (= ? *siliquosus* L. var. DC.), gleichbreite, ⊙. w. m. Neuspanien.

hirtus et *siliquosus* Hort. (= *tetrangulus* Langsd.) = pilolobus, *patens* Lehm. (= *Burmanni* DC. = *senegalensis* Juss.) = tridens.

Cordia Plum., Brustbeere.

bifurcata R. et S. (= *Varronia bifurcata* R. et P. = *dichotoma* R. et P. = *parviflora* Hort.), zweigabelige, ♄. w. Peru.

β) parviflora Ortega (non Dsf.).

canescens H. B. K. = rugosa.

Cordiopsis Desv., Hamilt., Herzbeere, V. 1., Asperifoliaceae.

mirabiloides Desv. Hamilt. (= *Varronia mirabiloides* Jacq., p. 837 = *V. geniculata* P. = *V. bullata* Auct. = *Tournefortia serrata* L. = *Cordia mirabiloides* R. et S.).

monosperma Hamilt. (= *Varronia monosperma* Jacq., p. 837 = *V. corymbosa* Desv. = *V. ulmifolia* Dum. Cours. = *Cordia monosperma* R. et S. = *C. corymbosa* G. Don = *C. ulmifolia* Spgl.).

Cordyline Commers., Cordyline.

australis Endl. (= *Charlwoodia australis* G. Don, p. 187 = *Dracaena australis* Forst. = *D. obtecta* Grah.).

cernua Endl. (= *Dracaena cernua* Jacq. = *D. candelaria* Hort.), übergebogene, ♄. w. Mauritius.

congesta Steud. (= *Charlwoodia* et *Dracaena congesta* Sweet, p. 187).

ferrea Endl. (= *Dracaena ferrea* L. W. = *D. terminalis* Jacq., p. 274).

β) rosea Endl.

indivisa Steud. (= *Charlwoodia indivisa* Sweet, G. Don = *Dracaena indivisa* Forst.).

marginata Endl. (= *Dracaena marginata* Lam. = *D. angustifolia* H. Par. = *D. tessellata* W. E., p. 274), gerandete, ♄. w. Mauritius.

parviflora H. Bonpl. (= *Dracaena parviflora* W. Herb. = ? *D. ensifolia* Haw., p. 274), kleinblumige, ♄. ♄. w. Mexico.

reflexa Endl. (= *Dracaena reflexa* Lam., p. 274).

stricta Steud. (= *Charlwoodia stricta* Sweet, p. 187 = *Dracaena stricta* Sims).

dracaenoides Hort. = ?, *C. vivipara* Hort., v. Hartwegia comosa.

Coreopsis L., Wanzenblume.

aristata P. W. (= *aristosa* Mchx.), gegrannte, 4. f. Nordamerika.

aurea Ait. (= *arguta* Pursh = *Diatonta aurea* Nutt.).

Boykiniana Nutt., Boykin's, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Hogg., *β*) longipes Hook.

heterophylla Nutt., verschiedenblätterige, 4. f. Arkansas.

philadelphica Hort., philadelphische, 4. f. Nordamerika.

praecox Fresen., frühe, 4. f. Nordamerika.

purpurea Moç. Sess., purpurfarbige, ⊙. f. Mexico.

Digitized by Google

Coreopsis
trichosperma Michx. (= *aurea* Lindl.).
Unbestimmtere: Ackermanni Hort. angl., minima H. anglor., sambucifolia W. — *C. Bidens* L., *diversifolia* Jacq. (non DC.), *ferulaefolia* Jacq. etc., v. Bidens cernua, grandiflora, ferulaefolia etc., *filifolia* Hook., v. Cosmidium filifolium, *formosa* Hort. et *odoratissima* Cav., v. Cosmea bipinnata et odoratissima, p. 222. Vergl. überhaupt Bidens et Calliopsis, p. 121 u. p. 67 II, p. 147 u. p. 107 II.
Coreosma florida Spach, *viscosissima* Spach, v. Ribes floridum et viscosissimum, p. 689 et 690.
Corethrogyne bracteata H. Hügel., v. Corethrostyles bracteata, p. 876.

Coriandrum T. Hoffm., Coriander.
mephitense Ten. et Guss., amalfitanischer, ⊙. f. Neapel.
sativum L., *β*) microcarpum DC.
testiculatum L. et *testiculatum* MB., v. Bifora testiculata et radians, p. 121.

Coriaria Nissol., Gerberstrauch.
nepalensis Wall., nepalscher, ♄. t. k. Nepal.
Corion testiculatum Lk., v. Bifora radians.

Corispermum L., Wanzensame.
crassifolium Stev. Turcz., dickblätteriger, ⊙. f. Asiat. Rufsland.
glomeratum Lagasca (= *salsoloides* Hort.).
heteracanthum Ledeb., verschiedenstachelicher, ⊙. f. Sibirien.
Marschallii Steven (= *bracteatum* Vivian. = ? *baccatum* et *elatum* Hort. ? = *hyssopifolium* Bertol. = *squarrosum* Vahl.).
nitidum Kitaib. (= *purpurascens* Host.).
Pallasii Steven (= *latifolium* Lk. = *pentandrum* W. Herb. = *hyssopifolium* Pall. (non L.) = *subpentandrum* Pall.), Pallas's, ⊙. f. Sibirien.
sabulosum Ledeb., sandliebender, ⊙. f. Sibirien.
tenue Lk. (= *microspermum* Host.), dünner, ⊙. f. Osteuropa.
Unbestimmtere: apetalum Hort., marginatum Cav., spicatum Dsf., *patens* R. et S. = intermedium, *polygaloides* Fisch. et Mey., v. Anthochlamys polygaloides, p. 38, II.
Cornulaca muricata Delil., v. Kochia muricata.

Cornus T., Hartriegel.
alba L. (= *sibirica* Lodd. = *purpurea* Tausch = *tatarica* Mill.).
sericea L'Her. (= *ferruginea* Hort.), *γ*) minor H. Par.
stolonifera Mich. (= *alba* Auctor.), sprossentreibender, ♄. f. Nordamerika.
Unbestimmtere: ferulacea Jacq. (= *ferulaefolia* Nocca), latifolia Bray (Liefland), plicata Tausch (= *alternifolia* Hort.), — *capitata* Wall., v. Benthamia fragifera, p. 117.
Coronaria coeli rosa Fries, *flos cuculi* A. Br., v. Lychnis coeli rosa et flos cuculi, p. 482.
Corone quinquevulnera et *vespertina* Hffg., v. Silene quinquevulnera et vespertina.
Coronopus Hall., v. Senebiera.

Digitized by Google

Correa Sm. Spgl. (= *Correaea* Ait. = *Correas* Hffg.), Correa.
Backhousiana Hook., Backhous's, ♄. t. Van Diemens Land.
cordifolia Lindl., herzblätterige, ♄. t. Neuholland.
glabra Lindl., kahle, ♄. t. Neuholland.
leucoclada Lindl., weifsästige, ♄. t. Neuholland.
Lawrencia Hook., Lawrenc's, ♄. t. Van Diemens Land.
rotundifolia Lindl., rundblätterige, ♄. t. Neuholland.
speciosa Andr. (= *revoluta* Vent. = *rubra* Sm. = *Antommarchia speciosa* Colla).
Hybriden aus den p. 221 u. p. 876 verzeichneten Arten erzeugt: alba ochroleuca et superba, Alexandrina, ampullacea, bicolor Lowii et Knightii (= *elegans maxima*), Bootheana, Cavendishii, cerina, cerise, color di laca, cordata, densa, elegans, Goodii, Grevillei, Harrisii, Lindleyana, longiflora, multiflora et rubra, mutabilis nana, nec plus ultra, pumila, quadrangularis, quadriformis, rosea et major, rubra elegans et major, speciosa major (= *ventricosa*), speciosissima, Stockwelliana, tricolor, triumphans Milleri, turgida etc.
Cortusa Gmelini L., v. Androsace Gmelini, p. 57. *Cortusina odoratissima* Eckl. Zeyh., *reniformis* Eckl. Zeyh., *rubropurpurea* Eckl. Zeyh., v. Pelargonium odoratissimum, reniforme, echinatum, p. 595 seq. *Coryanthes macrantha* Hook., *maculata* Hook., *Purkerii* Hook., *speciosa* Hook., v. Gongora macrantha etc., p. 364.

Corydalis Vent., Kappenmohn.
acaulis P. (= *rigidula* Tausch).
alpestris C. A. Mey., Voralpen-K., 4. f. Caucasus.
alpina Gay (= *fabacea* DC. = *intermedia* Lois. = *Fumaria intermedia* Schk.), Alpen-K., 4. Kn. f. Südeuropäische Alpen.
glauca Pursh (= *sempervirens* P.).
Lobelii Tausch (= *pumila* Host. Rchb.), Lobel's, 4. Kn. f. Deutschland.

Corylus Avellana L., *α*) sylvestris Ait., *β*) humilis W. (= ? *pumila* Lodd.), *γ*) heterophylla Lodd. (= *laciniata* et *urticaefolia* Hort.), *δ*) purpurea Lodd., *ε*) ovata W., *ζ*) globosa, *η*) depressa, *ϑ*) tubulosa W. (= *maxima* Mill. = *sativa rubra* Ait.), b) alba, *ι*) barcelonensis Lodd. (= *grandis* Lodd.), *κ*) Lamberti Lodd, *λ*) sicula etc.

Corypha L., Schirmpalme.
Gebanga Mart. (= *Gembanga rotundifolia* Blume = *Taliera Gembanga* R. et S.), Gebanga-S., ♄. w. Java.
Miraguana H. B., Miraguana-S., ♄. w. Cuba.
rotundifolia Lam. (= *Livistona rotundifolia* Mart.), rundblätterige, ♄. w. Molucken.
sylvestris Mart. (= *Ulan* Lam. = *Lontarus sylvestris* Rumph = *Gembanga sylvestris* Blume = *Taliera sylvestris* Bl.), wilde, ♄. w. Java, Molucken.
Palmetto Walt. et *umbraculifera* Jacq. (non L.), v. Sabal Palmetto et umbraculifera.
Corysanthes macrantha Hook., *maculata* Hook., v. Gongora macrantha etc., p. 364.

Cosmanthus Nolte, Franzenblume.
fimbriatus Nolte, p. 222.
grandiflorus A. DC. (= *Eutoca grandiflora* Benth.), grofsblumige, ⊙. f. Californien.

Digitized by Google

Cosmanthus
mexicanus A. DC. (= *Eutoca mexicana* Benth. = *Polemonium achilleaefolium* et *pimpinelloides* herb. Willd.), mexicanische, ⊙. f. Mexico.
parviflorus A. DC. (= *Phacelia parviflora* Pursh = *Polemonium dubium* W. = *Eutoca parviflora* RBr.), kleinblumige, ⊙. f. Nordamerika.
viscidus A. DC. (= *Eutoca viscida* Benth., p. 327 = *E. viscosa* Hook.).

Cosmea W. (= *Cosmus* Cav.), Cosmea.
diversifolia Fr. Otto, verschiedenblätterige, ⊙. f. Mexico.

Cosmidium Nutt., Cosmidie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.
filifolium Nutt. (= *Coreopsis filifolia* Hook., p. 218), ⊙. f. Texas.

Costus L., Costwurz.
angustifolius Ker (= *speciosus* Sm. var. ? Ker), schmalblätterige, 4. w. Nepal.
niveus C. F. W. Meyer, schneeweisse, 4. w. Surinam.
spiralis Rosc. (= *Anachiri* Jacq. = *quintus* Aubl. = *Amomum spirale* Auct. = *Alpinia spiralis* Jacq. = *Gliesanthe spiralis* Salisb.), β) cylindricus Jacq. (= *quartus* Aubl. = *Pisonis* Lindl.).
villosissimus Jacq. (= *septimus* Aubl.), zottigster, 4. w. Insel St. Vincent.
Cotinus Coccygia Mch. (= *C. Coriaria* Duham.), v. Rhus Cotinus, p. 687.

Cotoneaster Medik., Quittenmispel.
denticulata H. B. (= *Mespilus denticulata* Spgl.), gezähnelte, ♄. k. Mexico.
emarginata Hoffg., ausgerandete, ♄. k. ?
Fontanesii Spach (= *Mespilus racemiflora* Dsf.), Desfontaine's, ♄. f. ?
Lindleyi Steud., (= *elliptica* Hort. = *laevis* Hort. = *Nummularia* Lindl. (non Fisch. et Mey.) = *Eriobotrya elliptica* Lindl. = *Mespilus Cuile* Hamilt.), Lindley's, ♄. k. Nepal.
multiflora Bunge, Ledeb., vielblumige, ♄. ♄. f. Altai.
Nummularia Fisch. et Mey. (= *tomentosa* C. A. Mey.), pfennigkrautblätterige, ♄. f. Caucasus, Arabien.
obtusa Wall., stumpfe, ♄. k. Nepal.
uniflora Bunge, Ledeb., einblumige, ♄. f. Altai.

Cotula L. G., Laugenblume.
multifida DC. (= *nudicaulis* Hort.), vielspaltige, ⊙. f. Südafrika.
abrotanifolia W., v. Lyonettia abrotanifolia, p. 485, *aurea* L., *cinerea* Delil., *matricarioides* Bong., v. Cenocline aurea etc., p. 130, II., *microcephala* DC. (= ? *bipinnata* Thbg.), *villosa* DC., v. Cenia microcephala, villosa etc., p. 129 et 130, II.

Cotyledon T. DC., Fettblatt.
fascicularis Ait. (= *paniculata* Thbg. = *tardiflora* Bonpl.).
orbiculata L., α) rotundifolia DC. (Haw.), β) obovata DC. Aufserdem werden als Abarten C. elata Haw., oblonga Haw., ovata Haw. et ramosa Haw. (= *paniculata* L. = *ramosissima* Mill. Haw.) hierher gezogen.
purpurea Thbg., purpurfarbiges, 4. ♄. t. Cap d. g. H.
ungulata Lam. (= *canaliculata* Haw.).
horizontalis Guss., v. Umbilicus horizontalis, *pinnata* Lam., v. Bryophyllum calycinum, p. 135.

Digitized by Google

Coumarouna odorata Aubl., v. Dipterix odorata, p. 269.

Couralia fluviatilis Splitg., v. Zeyheria fluviatilis.

Couroupita Aubl. (einheimischer Name), XIII, 1., Lecythideae.

guianensis Aubl. (= *Lecythis bracteata* W., p. 451 = *Peckea Couroupita* Juss.), guianische, ♄. ♄. w. Cayenne.

Coursetia DC. (Dumont de Courset, Verfasser eines Werkes über Gartenbotanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

tomentosa DC. (= *Lathyrus fruticosus* Cav. = *L. tomentosus* Auct. = *Orobus fruticosus* P. = *O. tomentosus* Dsf. = *Vicia fruticosa* W.), filzige, ♄. t. Peru.

Courtoisia bipinnatifida Rchb. (= *daucifolia* Rchb.), v. Navarretia heterophylla.

Cousinia Cass., Coussinie.

affinis Fisch. et Mey., ähnelnde, ♂. f. Asiat. Rufsland.

alata Schrenk., Fisch. et Mey., geflügelte, ♂. f. Asiat. Rufsland.

arachnoidea Fisch. et Mey. (= *Carduus pterocaulos* Stephan. = *C. pycnocephalus alatus* Stev.), spinnewebenartige, ♂. f. Caucasus.

Hystrix C. A. Mey. (= *Carthamus pterocaulos* C. A. Mey.), starkstacheliche, ♂. 4. f. Caucasus, Persien.

lappacea Fisch. et Mey., klettenähnliche, ♂. f. Asiat. Rufsland.

platylepis Fisch. et Mey., breitschuppige, ♂. f. Asiat. Rufsland.

wolgensis C. A. Meyer (= *Carduus wolgensis* MB.), wolgaische, ♂. f. Sarepta.

Coutarea Aubl., Coutarea.

mexicana Mart. et Zuccar., mexicanische, ♄. w. t. Mexico.

Coutoubea verticillata G. Don, v. Slevogtia occidentalis.

Crambe T., Meerkohl.

glabrata DC. (= *cordifolia* Dufour, non Stev.), glatter, ⊙. f. Spanien.

pinnatifida RBr. (= *laciniata* Dsf., H. Par. = *orientalis* Jacq. = *suecica* Mill.).

strigosa L'Her. (= *fruticosa* Murray = *scabra* Lam. = *Myagrum arborescens* Jacq.).

cordata W. E. = cordifolia.

Craniolaria L., Craniolarie.

fallax A. DC. (= *Martynia Craniolaria* et *proboscidea* Hort. = *M. fallax* Kunze), trügerische, ⊙. m. w. ?

integrifolia Chamiss. (= *Martynia integrifolia* Steud.), ganzblätterige, ⊙. m. w. Brasilien.

unibracteata N. E. et Mart. (= *Holoregmia viscida* N. E. = *Martynia spathacea* Spgl.), eindeckblätterige, 4. ♄. w. Brasilien.

Craniospermum Lehm., Schädelsaame, V. 1., Asperifoliaceae.

subvillosum Lehm., wenigzottiger, 4. f. Sibirien.

Craspedia Forst., Spgl., Craspedia.

plebeja Cunningh., gewöhnliche, 4. ♄. t. k. Neuholland.

uniflora Forst. (= *glauca* Spgl., Lindl. = *C. Richea* Cass. = *Richea glauca* LaBill.).

Craspedaria chinensis Lk., *pertusa* Lk. et *rupestris* Lk., v. Niphobolus Lingua, pertusus et rupestris,

Digitized by Google

p. 549 — *ciliata* Lk. et *vaccinifolia* Lk., v. Polypodium ciliatum et vaccinifolium, p. 645 et. 655. *Crassocephalum cernuum* Mch. v. Cremocephalum (Senecio Sect. III.), cernuum, p. 746, *sonchifolium* Less., v. Emilia sonchifolia, *valerianaefolium* Less., v. Erechtites valerianaefolius (Senecio Sect. IV. p. 746). *Crassouvia floripendula* Lam., v. Bryophyllum calycinum, p. 135.

Crassula L. Haw., Dickblatt.

debilis Thbg., schwaches, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

pharnaceoides Fisch. et Mey. (= *Tillaea pharnaceoides* Hochst.), pharnaceumähnliches, ⊙. ♂. m. f. t. Abyssinien.

Schimperi Fisch. et Mey., Schimper's, ⊙. ♂. m. f. t. Abyssinien.

sulphurea Kunze, schwefelgelbes, ♂. t. k. Cap d. g. H.

Unbestimmt: livida H. Erford. — *articulata* Hort. = obliqua, *coronata* Don = perfilata, *lucida* Lam. (= *cordata* Lodd. et Hort., non Ait.) = spathulata, *lycopodioides* Lam. (= *muscosa* Thbg.) = imbricata, *marginata* Thbg. = marginalis, — *glabra* Haw., *glomerata* L., v. Thisantha glabra, glomerata.

Crataegus T. L., Weifsdorn.

acanthocarpa Hort., stachelfrüchtiger, ♄. f. ?

alpina Mill., Alpen-W., ♄ f. Italien.

Aronia Bosc (= *fissa* Lodd. = *Mespilus Aronia* W.).

Bosciana Steud. (= *badiata* H. Angl. = *Mespilus badiata* Bosc = *M. Bosciana* Spach), Bosc's, ♄. f. Nordamerika.

coccinea L. (= *aestivalis* Booth = ? *viridis* L.), ε) C. neapolitana Hort. (= *Mespilus constantin.* Godefr.).

cordata Mill. (= *acerifolia* Poir. = *corallina* L'Her. = *phaenopyrum* Borck. = *Mespilus acerifolia* Burgsd. = *M. corallina* Dsf. = *M. phaenopyrum* Mill.).

corymbosa Dsf. H. Par. (= *flabellifolia* Spach = *Pyrus edulis* Wats. (non W.) = *Sorbus corymbosa* Lodd.), traubendoldiger, ♄. f. ?

crenulata Roxb. (= *Mespilus crenulata* Don = *C. Pyracantha* β P.), kerbiger, ♄. k. f. b. Nepal.

Crus galli L. (= *cuneifolia* Lodd. = *lucida* Wangenh. = *Mespilus Crus galli* Poir. = *M. cuneifolia* Mch. = *M. hyemalis* Walt. = *M. lucida* Ehrh.), ε) linearis P. DC. (= *Poiretiana* DC. = *Mespilus linearis* Dsf. Poir.), ζ) nana Sweet (= *Mespilus nana* Dum. Cours.).

cuspidata Spach (= *Sorbus vestita* Lodd. = *Pyrus nepalensis* Hort.), zugespitzter, ♄. f. b. k. Nepal.

elliptica Ait. (= *prunifolia* Bosc Poir. = *Mespilus elliptica* W.), elliptischer, ♄. f. Nordamerika.

fissa Bosc (= *cordata* Mill. var. Spgl. = ? *incisa* Hort. = *Mespilus fissa* Poir.), gespaltener, ♄. f. Nordamer.

flava Ait. (= *flavissima* Hort. = *caroliniana* P. = *Mespilus caroliniana* Poir. = *M. flava* W. = *M. flexispina* Mch.).

flavescens Bosc (= *Mespilus flavescens* Bosc), gelblicher, ♄. f. ?

flexuosa Poir. (= *pyrifolia* Ait. var. Spgl. = *Mespilus flexuosa* Bosc), gebogener, ♄. f. Carolina.

florentina Zucc. (= *Mespilus florentina* Bertol. = *Pyrus crataegifolia* Savi), florentinischer, ♄. f. Italien.

Fontanesiana Steud. (= *Mespilus Crus galli* Dsf. h. Par.

Digitized by Google

Crataegus
= *M. Fontanesiana* Spach = *M. glandulosa* Bosc, non W.), Desfontaine's, ħ. f. Nordamerika.
glabra Lodd., kahler, ħ. f. Nordamerika.
glandulosa Ait. (= *rotundifolia* Borckh. = *Mespilus glandulosa* W. = *M. rotundifolia* Ehrh. = *Pyrus glandulosa* Mch.) [1]), drüsiger, f. Nordamerika.
β) succulenta Fisch., Schrad., γ) subvillosa Fisch., δ) macracantha Lodd. (= *spina longissima* Lee).
heterophylla Flügge (= *monogyna* Jacq. var. Spgl. = ? *Mespilus constantinopolitana* Hort.). Vaterland unbekannt.
laciniata Ucria, schlitzblätteriger, ħ. f. Sicilien.
laevigata DC. (= *Oxyacantha* L. var. Spgl.), glatter, ħ. f. Vogesen.
microcarpa Lindl. (= *spathulata* Ell., non Mch.), kleinfrüchtiger, ħ. f. Nordamerika.
orientalis MB., β) sanguinea Schrad. (= *tanacetifolia* β *taurica* DC.).
prunellaefolia Bosc (= *Mespilus prunellaefolia* Poir. = *M. prunifolia* Poir. var. Spgl.), prunellenblätteriger, ħ. f. ?
punctata Ait. (= *cuneifolia* Borckh. = *Mespilus cornifolia* Poir. = *M. cuneifolia* Ehrh.).
pyrifolia Ait. (= *C. Calpodendron* Borckh. = *edulis* Lodd. = *Mespilus Calpodendron* Ehrh. = *M. pyrifolia* W.).
sanguinea Pall. (non Schrad.) (= *purpurea* Bosc = *Mespilus purpurea* Poir. = *sanguinea* Spach), blutrother, ħ. f. Sibirien.
spathulata Mchx. (= *virginica* Lodd. = *viridis* Hort. = *Mespilus spathulata* Spgl.).
spinosissima Lodd., dornigster, ħ. f. Nordamerika.
stipulacea Lodd. (= *Mespilus Loddigesiana* Spach = *M. stipulacea* Dsf.), zwischenblätteriger, ħ. f. ?
tanacetifolia Pursh (= ? *Celsiana* Bosc).
Trewiana (Tausch) (= *Crus galli* Trew.), Trew's, ħ. f. ?
trifoliata DC. (= *Mespilus trifoliata* Bosc), dreiblätteriger, ħ. f. ? Nordamerika.
turbinata P. (= *flava* β *lobata* Lindl.).
unilateralis P. (= *Mespilus unilateralis* Poir.), einseitiger, ħ. f. Carolina.
Watsoniana Steud. (= *Mespilus Crus galli* Wats. = *M. Watsoniana* Spach), Watson's, ħ. f. Nordamer.
Unbest.: corallina (Tausch), lancifolia Wender., media Bechst., serratifolia Dsf., sorbifolia Dsf., umbellata Dsf. *lobata* Bosc, v. Mespilus Smithii, p. 521, *obtusata* Spach, v. Sorbus obtusata, *rubra* Wender., v. C. monogyna punicea.

Crataeva L., Crataeva.
Adansonii DC. (= *laeta* DC. = *Tapia* Adans.), Adanson's, ħ. w. Senegal.
odora Hamilt. (= *religiosa* Hamilt. = *Roxburghii* RBr. p. 229 = *Tapia* Vahl, non L.).
religiosa Forst., heilige, ħ. w. Malabar. Societätsinseln. *Crematostemon capense* Hort., v. Olinia capensis.

Cremocephalum cernuum Cass., v. Senecio, Sect. III., p. 746.

---

1) C. sanguinea Pall. gehört nicht hierher.

Digitized by Google

Cremopyllum Scheidw., Nickblatt, ?XI. III, Euphorbiaceae.

spathulatum Scheidw., spatelförmiges, ♄. t. Mexico.

Crepis L. Mönch, Pippau.

A. Genuinae.

abyssinica Schultz, abyssinischer, ⊙. f. Abyssinien.

baicalensis Ledeb. (= *elegans* Fisch. = *Prenanthes diversifolia* Ledeb. = *P. versicolor* Fisch.).

corymbosa Tenore, β) glabra C. A. Mey.

laevigata Dumort., glatter, ♂. f. Belgien.

lappacea W., klettenähnlicher, ⊙. f. ?

multiflora Sibth., Sm., vielblumiger, ⊙. f. Thracien.

parviflora Dsf., Aegypten, } vergl. p. 229.

pauciflora Dsf., Orient, }

II. Brachyderea Cass.

lacera Tenore (= *latialis* Sebast.) [1]).

rigida W. Kit (= *latifolia* Balb. = *Hieracium pannonicum* Jacq.).

III. Phaecasium Cass.

pulchra L. (= *Phaecasium lampsanoides* Cass. = *Chondrilla pulchra* Lam. = *Intybellia pulchra* Monn. = *Lapsana pulchra* Vill. = *Prenanthes hieracifolia* W. = *P. pulchra* DC. = *P. viscosa* Baumg. = *Sclenophyllum pulchrum* Gaud.).

β) lampsanifolia Rchb.

IV. Geracium Rchb. (= *Intybelloides* DC.).

Froelichiana DC. (= *auriculaefolia* Froel. = *G. parviflorum* Rchb. = *Hieracium parviflorum* Schlchr. = *H. praemorsum corymbosum* Gaud.).

V. Aetheorrhiza Cass.

bulbosa Tausch. (= *Hieracium bulbosum* W. = *Leontodon bulbosus* L. etc.).

VI. Calliopea Don.

aurea Cass., Tausch (= *Andryala aurea* Scop. = *Apargia aurea* Hoppe = *Geracium aureum* Rchb. = *Hieracium aureum* Scop. = *Leontodon aureus* L.).

VII. Berinia.

tenuifolia W., v. Barkhausia tenuifolia, p. 60, II.

VIII. Catonia.

alpestris Tausch (= *albida* All.).

Columnae Froel. (= *Apargia lucida* Tenore = *Catonia crocea* Moessl. = *Hieracium Columnae* Tenore = *parvulum* et *pumilum* Tenore), Columna's, 4. f. Calabr.

grandiflora Tausch (non W.) (= *Hieracium grandiflorum* All.).

β) conyzaefolium (Gouan), γ) leucopappum (P.).

heterogyna Froel. (= *Hieracium glaucum* Asch. = *H. stuppeum* Rchb. = *H. Tommasinii* Host.), verschiedenweibiges, 4. f. Istrien, Dalmatien.

Jacquini Tausch (= *Froelichii* Steud. (non DC.) = *chondrilloides* Froel. (non Jacq.) = *Hieracium chondrill.* Jacq. = *H. rhaeticum* et *taraxacifolium* Froel.).

lyrata Froel. (= *Hieracium lyratum* L.).

macrocephala DC. (= *grandiflora* W., non Tausch), grölsköpfiger, 4. f. ?

pinnatifida Froel. (= *Hieracium pinnatifidum* W.), fiederspaliger, 4. f. Armenien.

---

1) Herba venenatissima, vulgo „Angina" et „Cichoria di montagna dicta", Endl. Catal. hort. acad. Vindob. I. p. 426.

Digitized by Google

Crepis
pygmaea L. (= *Hieracium prunellaefolium* Gouan. = *H. pumilum* L. = *H. pygmaeum* L.).

Crescentia L., Crescentie.
cucurbitina L. (= *latifolia* Lam. Mill.).
edulis Desv., genieſsbare, ♄. w. Neuspanien.
Crinitaria biflora Cass. (= *punctata* Cass.), v. Aster IX. Sect., Galatella punctata, p. 99 et p. 51, II. *C. Linosyris* Less., v. Linosyris vulgaris (= *Chrysocoma Linosyris*, p. 194), *viscidiflora* Hook., v. Bigelowia viscidiflora, p. 68, II.

Crinum L., Hackenlilie.
asiaticum L. (= *americanum* Redout. = *floridanum* Fraser = *toxicarium* Roxb.), β) plicatum Livingst., Hook., γ) declinatum Herb., δ) bracteatum W. (= *brevifolium* Roxb.), ε) sinicum Carey (= ? *Sinense* Lodd.), ζ) angustifolium Herb.
australasicum Herb., neuholländische, 4. Zw. w. Neuholland, Ostindien.
β) confertum Herb., γ) angustifolium RBr., δ) arenarium Sims, ε) blandum Bot. mag., ζ) verecundum Herb.
Broussonetii Herb. (= *Broussonetianum* Sweet = *yuccaeoides* Herb. = *yuccaeflorum* Salisb. = *Amaryllis Broussonetii* Red. = *A. Jagus* Hort. = *A. longa* Hort. = *A. ornata* Ker = *A. spectabilis* Andr. = *A. yuccaeoides* Thomps.).
capense Herb. = *longifolium* Thbg. = *Amaryllis bulbisperma* Burm. = *A. capensis* Mill. = *A. longifolia* L'Her., Ait.) β) longiflorum Herb., δ) riparium Herb.
Commelyni Jacq. (= *angustifolium* Hort. = *Dieterichii* Schult.).
concinnum Mart., nette, 4. Zw. w. Brasilien.
distichum Herb. (= *Amaryllis disticha* Bot. mag. (non L.) = *A. ornata* Afz. = *A. scillifolia* Hort.).
erubescens Ait. (= *rubrolimbum* Sweet = *americanum* Rodsch., non L.), β) corantinum Herb., γ) octoflorum Herb., δ) aquaticum Herb., ε) glabrum album Herb., ζ) undulatum Hook. (= ? *attenuatum* W.).
giganteum Andr. (= *petiolatum* Herb. = *Amaryllis candida* Tratt. = *gigantea* Ait. = *A. Jagus* Thomps. = *A. ornata* β Bot. mag.), β) spectabile Herb.
graciliflorum Kunth et Bouché, schlankblumige, 4. Zw. w. ?
Herbertianum Schult. (non G. Don) (= *strictum* Herb.), Herbert's, 4. Zw. w. Zeylon.
inodorum Tausch (= *americanum* H. Prag.), geruchlose, 4. Zw. w. ? Südamerika.
latifolium Roxb. (= *amabile* Roxb.).
Lindleyanum Schult. (= *revolutum* Lindl, = *undulatum* Hook. var. ?), Lindley's, 4. Zw. w. Ostindien.
odoratissimum Tausch (= *erubescens* H. Prag., non Ait.), wohlriechendste, 4. Zw. w. ?
Osbeckii Schult. (= *Amaryllis Osbeckii* Dsf.), Osbeck's, 4. Zw. w. ?
Paxtoni Herb., Paxton's, 4. Zw. w. Ostindien.
pratense Herb., Wiesen-H., 4. Zw. w. Ostindien.
β) longifolium Roxb., γ) lorifolium Roxb.
revolutum Herb. (= *Herberti* G. Don = *Amaryllis revoluta* Ait. = *A. variabilis* Jacq.), zurückgerollte 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Crinum

rigidum Herb., starre, 4. Zw. w. Ostindien.
β) sumatranum Roxb., γ) macrocarpum Carey.

scabrum Sims (= *scaberrimum* Sims = *undulaefolium* Herb.).

strictum Hornem. (non Herb.) et Bot. mag., steife, 4. Zw. w. Südamerika.

submersum Herb. (= ? *Binsii* Hffg. = *erubescens* Ait. var. Spgl.).

variabile Sweet (= *crassifolium* Herb. = *Amaryllis revoluta* β Bot. mag.), veränderliche, 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.
β) roseum Bot. reg. (= *Amaryllis variabilis* Jacq.).

Zaguapana H. Booth., Zaguapana-H., 4. Zw. w. ? Südamerika.

zeylanicum L., Herb. (= *latifolium* Andr. = *Amaryllis ornata* Bot. mag. (β Ait.) = *A. zeylanica* L.), β) longistylum Herb., γ) insigne Schult. (= *Amaryllis insignis* Ker), δ) Careyanum Herb. (= *mauritianum* Lodd. = *ornatum* Carrey), ε) speciosum Sims (= *speciosissimum* Herb.), ζ) moluccanum Roxb. (= *Amaryllis moluccana* Spgl.).

Hybriden: americano-brevifolium Herb., americano-capense Herb., americano-erubescens Herb. (= *duplex* Herb.), brevifolio-capense Herb., canaliculato-capense Herb. (= *fertile* Herb.), candidum Herb. (= *americano-bracteatum* Hort.), capensi-erubescens Herb., (= *bulbulosum* Herb.), Cooperi Herb. (= *speciosо-longifolium* Hort.), corantino-canaliculatum Herb., cruento-erubescens Herb, cupitum Herb. (= *cruento-capense* Herb.), Digweedii Herb. (= *scabro-americanum* Hort.), diversum Herb. (= *Careyano-tortuosum* Hort.), egregium Herb. (= *pedunculato-riparium* Hort.), elongatum Herb., (= *corantino-capense* Herb. = *erectius* Herb.), erubescenti-capense Herb., exaltato-scabrum Herb., exaltato-speciosum Herb., felix Herb. (= *latifolio-capense* Hort.), flaccido-brevifolium Herb., flaccidulum Herb. (= *speciosо-defixum* Hort.), Forbesi-Careyanum Herb. (= *promissum* Herb.), Govenianum Herb. (= *zeylanico-capense* Herb.), Highclerianum Herb. (= *asiatico-capense* Hort.), ingens Herb. (= *pedunculato-capense* Herb.), lorifolio-defixum Herb., microspermum Herb. (= *revoluto-capense* Hort.), mirabile Herb. (= *flaccido-canaliculatum* Herb.), modestum Herb. (= *speciosо-capense* Hort.), moluccano-capense Herb., praestans Herb. (= *canaliculato-riparium* Hort.), pudicum Herb. (= *Careyano-capense* Herb.), pulchrum Herb. (= *scabro-erubescens* Herb.), quadruplex Herb. (= *candido-fertile* Hort.), rubricaule Herb. (= *erubescenti-bracteatum* Hort.), scabro-capense Herb., Spofforthianum Herb. (= *Herbertianum* Sweet), tortuosum Herb. (= *defixo-capense* Herb.), toxicario-capense Herb., triplex Herb. (= *Careyano-fertile* Hort.), unicum Herb. (= *flaccido-bracteatum* Hort.), zeylanico-americanum Herb., zeylanico-capense Herb, zeylanico-erubescens Hort. (= *Baconi* Herb.), zeylanico-pedunculatum Herb. (= *amatum* Herb.).

Unbestimmtere: hybridum Hort., javanicum Hort. — *Candelabrum* Hort. *falcatum* Jacq., v. Brunswigia multiflora et falcata, p. 135, *caspium* Pall., v. Allium

Digitized by Google

Crinum

caspium, p. 29, *Forbesii* Schult., v. Amaryllis Forbesii, p. 44, *speciosum* L., v. Vallota purpurea, p. 836, *speciosum* Hort., v. Pancratium speciosum, p. 852, *spirale* Andr. (= *tenellum* Jacq.), v. Carpolyza spiralis, p. 122, II., *urceolatum* R. et P., v. Urceolina pendula, p. 831.

Cristaria Cav., Kammmalve.

betonicaefolia P. (= *Sida chilensis* Spgl.), betonienblätterige, ♂. ♄. t. Chili.

Berteriana Hort. bot. (= ? *Sida Berteriana* Balb.), Bertero's, ⊙. ♄. m. f. w. Portorico.

heterophylla Hook. Arn. (= *Sida heterophylla* Cav.), verschiedenblätterige, ⊙. 4. f. t. Chili.

multifida P. (= *Sida multifida* Cav. = *pteroperma* L'Her.), vieltheilige, ⊙. f. Peru.

Critamus dahuricus Hoffm. (= *Cicuta dahurica* Fisch.), v. Falcaria dahurica.

Critesion geniculatum Rafin., v. Hordeum jubatum, p. 403.

Crithmum T., Meerfenchel.

maritimum L. (= *Cachrys maritima* Spgl.), *β*) canariense Cav.

campestre Güldenst. (= *mediterraneum* MB.), v. Silaus longifolius, *latifolium* L., v. Astydamia canariensis, *pyrenaicum* Forsk., v. Deverra tortuosa.

Critonia P. Br., Critonie, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

Dalea DC. (= *Calydermos jamaicensis* Spgl. = *Eupatorium Dalea* L. = *Wickstroemia glandulosa* Spgl. = *Isocarpha Berterii* Balb.), Dalea's, ♄. w. Jamaika.

parviflora DC. (= *Eupatorium Dalea* Hort. = *E. parviflorum* Sw., non Aubl.), kleinblumige, ♄. w. Jamaika.

Crocodylium Galactites Dum. Cours., v. Galactites tomentosa, p. 342, *syriacum* Spgl., v. Centaurea Crocodylium, p. 177.

Crocoxylon excelsum Eckl. Zeyh. (= *Ilex crocea* Thbg.), v. Elaeodendron croceum.

Crocus T., Safran.

argenteus Sabin. Sweet (= *biflorus* Mill. var.), silberfarbiger, 4. Zw. f. ?

aureus Sm. (= *lagenaeflorus* var. *η* Sm. = *moesiacus* Sims), goldfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa, England.

banaticus Heuff., banatischer, 4. Zw. f. Banat.

biflorus Mill. (? = *praecox* Haw. = *vernus β bicolor* Adam., Silberlacken, Hort. Holland).

Boryi Gay, Bory's, 4. Zw. f. Griechenland, Cephalonien.

byzantinus Parkins., Ker, byzantinischer, 4. Zw. f. Türkei.

Cambessèdianus Gay., Cambessède's, 4. Zw. f. Majorka.

Cartwrightianus Herb., Cartwright's, 4. Zw. f. Levante, Canea.

β) creticus Herb.

Clusianus Gay, Clusiu's, 4. Zw. f. ? Südeuropa.

damascenus Herb., Damascener-S., 4. Zw. f. Syrien.

Imperati Tenore (= *incurvus* Don = *minimus* a *italicus* Gay. = *recurvus* Hort.).

insularis Gay., Insel-S., 4. Zw. f. Carsica, Sardinien.

a) major, b) medius, c) minimus (DC.), d) geminiflorus.

Digitized by Google

Crocus

iridiflorus Heuff. (= *multifidus* et *speciosus* Rochel et plur. Auct. = *banaticus* Gay., non Heuff.), schwertelblumiger, 4. Zw. f. Banat, Ungarn, Siebenbürgen.

lacteus Sabin. Haw., β) penicillatus Sabin.

laevigatus Bory et Chaub., glatter, 4. Zw. f. Griechenland.

nervifolius Rchb., nervigblätteriger, 4. Zw. f. ?

nudiflorus Sm. (= *autumnalis* Brotero = *fimbriatus* Lapeyr. = *medius* Balb. = *serotinus* Salisb.).

odorus Bivon. Bernard. (= *longiflorus* Rafin. = *neapolitanus* Hoppe = *sativus* Bivone).

β) longiflorus Herb.

pulchellus Herb., hübscher, 4. Zw. f. Byzanz, Athos.

pusillus Tenore (= *biflorus Tenorii* Rchb. = *minimus* Tenore = *nanus* Herbich = *sativus minor* Savi = *vernus* Sebast. Mauri.), β) Janii (= *vernus Janii* Rchb. = *lineatus* Jan.).

sativus L. (= *hybernus* Frivaldsky = *autumnalis* Sm. = *officinalis* P.).

siculus Tineo (= *minimus* Red. var. ? Cesati), sicilianischer, 4. Zw. f. Sicilien.

stellaris Sabin. Haw. (= ? *stellatus* Hort.).

suaveolens Bertol. (= *Imperati* Colla (non Tenor.) = *sativus* Tenore), feinriechender, 4. Zw. f. Italien.

Susianus Ker (= *praecox* H. Berol.).

Tournefortianus Gay., Tournefort's, 4. Zw. f. ? Levante.

vernus All. (= *acutiflorus* Opitz = *Reineggeri* Opitz *sativus* β *vernus* L.), β) obovatus Haw. (= *neapolitanus* Sims), γ) pictus Tausch, δ) semifasciatus Tausch.

Croilema Auct., v. Chroilema, p. 141, II.

Crossandra Salisb., Franzenbeutel.

infundibuliformis N. E. (= *undulaefolia* Salisb., p. 233 = *Justicia infundibuliformis* L. = *Ruellia infundibuliformis* Andr. = *Harrachia speciosa* Jacq. fil.).

spicata Hamilt. (= *Ruellia auriculata* Wall.), ähriger, 4. w. Ostindien.

Crotalaria T. L., Klapperschote.

anthylloides Lam. (= *calycina* Schrk. = *crenata* Wall. = *linearis* Wall. = ? *nepalensis* Lk. = *Roxburghiana* DC. = *stricta* Roxb.).

biflora L. (= *hirta* Roth (non W.) = *nummularia* W. = *Rothii* Spgl. = *Rothiana* DC. = *Astragalus biflorus* L.).

Bojeri Sweet (= *dichotoma* Boj., nec Alior.), Bojer's, ♄. ♄. w. Madagascar.

brasila Schrank, Zuccar., brasilianische, ♂. ♄. w. Brasil.

Brownei Berter. (= *lanceolata* Roxb. = *latifolia* Roxb.).

cytisifolia Hffg., Geifskleeähnliche, ♄. w. Peru.

cytisoides Roxb. (= *psoralioides* Don = *Priotropis cytisoides* W. A.).

digitata Hook. (= *quinquefolia* Hook. = *tomentosa* Wight), fingerförmige, ♄. w. Ostindien.

Drummondii H. Anglor., Drummond's, ♄. k. t. ?

formosa Grah., schöne, 4. w. Ostindien.

genistella H. B., Ginster-K., 4. w. t. Südamerika.

genistoides Lam., Ginsterähnliche, ♄. k. Cap d. g. H.

hirsuta W. (= *clavata* Roxb.).

Hookeri Walk. Arn., Hooker's, ♄. w. Insel St. Vincent.

impressa N. E., eingedrückte, ☉. w. m. f. Abyssinien.

juncea L. (= *benghalensis* Lam. = *fenestrata* Sims =

Digitized by Google

Crotalaria

perrecta Wall. = *sericea* W. = *tenuifolia* Hornem., Roxb. = *viminea* Wall.).

laburnifolia L. (= *pedunculosa* Desv. = *pendula* Bertero = *Clavulium pedunculosum* Desv.).

linifolia L. (= *caespitosa* Roxb. = *diffusa* Roxb. = *tecta* et *montana* Heyne = *sobolifera* Grah.).

Linkiana Steud. (= *diffusa* Lk., p. 234, non Arrab.).

lupulina DC., hopfenähnliche, ⊙. m. f. Mexico.

macrophylla Weinm., grofsblätterige, ♄. t. w. Ostindien.

medicaginea Lam. (excl. Synon. W. et Roth. (= *divaricata* Grah. = *foliosa* W. = *procumbens* Roxb.).

mollis Weinm. (non E. Mey.), weiche, ♄. t. China.

pilosa Mill., behaarte, ⊙. w. m. f. Vera Crux.

pubera Vahl (= ? *pubescens* Hort.), feinhaarige, ♄. w. Westindien.

pulchella Andr. (= *Calobata pulchella* Eckl., Zeyh. = *Lebeckia decipiens* E. Mey. = *L. pulchella* Walp.).

pulcherrima Roxb. (= *cuneata* Hort. Mission. = *pulchra* Andr. = *tetrasperma* Dietr.).

purpurea Vent. (= *elegans* Hort. = *speciosa* Hort.).

retusa L. (= *cuneifolia* Schrk. = *Dolichos cuneifolia* Forsk. = *Lupinus cochinchinensis* Lour.).

sagittalis L., *β*) bialata Schrank.

Schimperi* (= *striata* A. Br.), Schimper's, ⊙. w. m. f. Abyssinien.

splendens Vogel, schimmernde, ♄. t. China (Macao).

styracifolia Hornem., Dsf., Storaxblätterige, ♂. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Trifoliastrum W. (= *medicaginea* W. (non Lam.) = *stricta* Roth. = *virgata* Roxb. = *Lupinus trifoliatus* Rottl.), kleeblätterige, 4. ♄. w. Ostindien.

undulata Knowl. et Westc., wellenförmige, ♄. t. Mexico.

Willdenowiana DC. (= *genistoides* W. (non Lam.) = *spartioides* Spgl.), Willdenow's, ♄. t. k. Cap d. g. H.

Unbestimmtere: magnifolia Tenore, pubescens Hort. *argentea* Jacq., v. Argyrolobium argenteum, p. 44, II., *cuneiformis* Lam., v. Rafnia cuneifolia, p. 675, *floribunda* Lodd., v. Loethainia (*Wiborgia*) floribunda, *glycinea* Lam., v. Fagelia bituminosa, p. 328, *oxalidifolia* Hort., v. Loddigesia oxalidifolia, p. 474.

Croton L., Croton.

adenophyllum Bertero, drüsenblätteriger, ♄. w. Jamaika.

althaeifolium Mill. (non Vahl), eibischblätteriger, ♄. w. Jamaika.

angustifolium Hort., schmalblätteriger, ♄. w. Ostindien.

argyranthemum Mchx. (= *punctatum* Jacq.), silberblumiger, ♄. k. Nordamerika.

elaeagnifolium Vahl, Oleasterblätteriger, ♄. w. ?

hircinum Vent., stinkender, ♄. w. Ostindien.

hirtum L'Her., rauher, ⊙. w. m. Westindien, Mexico.

lucidum L. (= *pallens* Sw. = *portoricense* Vahl = *spicatum* Berg.).

rosmarinifolium Cunn., rosmarinblätteriger, ♄. t. Neuh.

Tiglium L. (= *Jamalgota* Hamilt.).

Unbestimmtere: pentaphyllum Hort., salviaefolium Mill. *digitatum* Fisch., v. Manihot digitata, *lobatum* L., v. Astraea lobata, p. 52, II., *pictum* Hort. (= *variegatum* L.), v. Codiaeum chrysostictum, p. 876, *plicatum* Vahl etc., v. Crozophora plicata etc.

Digitized by Google

Crotonopsis argentea Pursh (= *linearis* Pursh, Mchx. *Friesia argentea* Spgl.), *β)* elliptica W., vergl. p. 236.

Crowea Sm., Crowea.

canaliculata H. Belg., rinnenförmige, ♄. t. Neuholland. *myoporoides* Hort. = ? Chorilaena myoporoides, p. 140, II.

Crozophora Neck., Crozophore.

plicata Juss. (= *Croton plicatum* Vahl = *C. tinctorium* γ Lam.), gefaltete, ⊙. m. f. Ostindien, Arabien.

verbascifolia Juss. (= *Croton verbascifolium* W.), königskerzenblätterige, ⊙. f. Griechenland.

Crucianella L., Kreuzpflanze.

chlorostachys Fisch. et Mey., grünährige, 4. f. Caucasus.

Decaisnei Steud. (= *hispidula* Dec, non Fisch. et Mey. ?), Decaisne's, ⊙. f. Arabien.

exasperata Fisch. et Mey., rauheste, 4. f. Persien.

gilanica Trin. (= *glauca* Rich.).

molluginoides MB. (= *anomala* Balb. = *Asperula molluginoides* Rchb. = *A. tubiflora* Hort. = *Galium longiflorum* Güldenst.).

rigida Tausch (= *Asperula brevifolia* Vent. = *A. rigida* Sibth., Sm., p. 90).

Cruciella candida Lesch., v. Xanthosia rotundifolia, p. 859.

Crupina P. Cass., Bartflockenblume, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

Crupinastrum Moris, sardinische, ⊙. f. Sardinien.

vulgaris P. Cass. (= *pauciflora* Kar. et Kiril. = *Centaurea Crupina* L., p. 179 = *C. acuta* Lam.).

Crusea Cham. et Schltdl., Crusea.

aspera Bartl. (= *rubra* Cham. et Schltdl. excl. Synon.), rauhe, ⊙. m. f. Mexico.

rubra Bartl. (= *strigosa* H. Monac. = *Spermacoce rubra* Jacq. = *strigosa* Sims = *S. longiflora* H. B. K.).

Cryphaea erecta Hamilt., v. Chloranthes erectus, p. 139, II.

Cryphiacanthus N. E., Kleinklau, XIV. II., Acanthaceae.

barbadensis N. E. (= *Ruellia clandestina* L. et R. *tuberosa* L., p. 705 et 706), barbadensischer, 4. w. Antillen.

lacteus N. E. (= *Ruellia lactea* Cav., p. 705).

Crypsis Ait., Dornengras.

geniculata R. et S. (= *alopecuroides* Schrad. var. Trin. = *Alopecurus geniculatus* Sibth. = *Phalaris geniculata* Sibth. Sm.), gelenkförmiges, ⊙. f. Griechenland.

Cryptadenia Meissn., Cryptadenie, VIII. I., Thymeleaceae.

uniflora Meissn. (= *Passerina uniflora* L., p. 588).

Cryptandra Sm., Hüllbeutel.

arbutifolia Fenzl. (= *arbutiflora* Hort., p. 237).

buxifolia Fenzl, buchsbaumblätteriger, ♄. t. Neuholland.

pomaderroides Reissek, wersenstrauchähnlicher, ♄. t. Neuholland.

propinqua Cunningh., verwandter, ♄. t. Neuholland.

suavis Lindl., lieblichriechender, ♄. t. Schwanenfluss.

tubulosa Fenzl, röhriger, ♄. t. Neuholland.

spinosa Cunningh., v. Solenantha spinosa.

Cryptocalyx Benth., Ohnkelch, XIV. II., Verbenaceae.

nepetaefolia Benth., katzenmünzenblätteriger, ⊙. m. Guiana.

Digitized by Google

Cryptocarya RBr., Kelchnufs.
Peumus N. E. (= *Adenostemon nitidum* Bert. = *Laurus Peumus* Dombey, Hook. = ? *Peumus rubra* Molin.), chilesische, ♄. t. w. Chili.

Cryptocoryne Fisch., Cryptocoryne, XX. IX., Aroideae.
ciliata Fisch. et Blume (= *Ambrosinia ciliata* Roxb.), gewimperte, 4. w. Bengalen, Java, Amboina.
spiralis Fisch. (= *Arum spirale* Retz. Sims, p. 86 = = *Ambrosinia spiralis* Roxb.).

Cryptodiscus Schrenk., C. A. Mey., Kleinscheibler, V. II., Umbelliferae.
cachroides Schrenk., C. A. Mey., nufsdoldenähnlicher, ♂. f. Südl. Sibirien.

Cryptolepis elegans Wall., Ostindien. Zu berichtigen p. 237.

Cryptomeria Don, Endl., Cryptomerie, XXI. X., Coniferae-Cupressineae.
japonica Don (= *Cupressus jap.* Thbg. L. fil.), japanische, ♄. k. Japan.

Crptophragmium N. E., venustum N. E., v. Justicia, Sect. IV., p. 434.
Cryptopyrum Richardsonii Hort. bot., v. Triticum Richardsonii Schrad., p. 824.

Cryptosanus Scheidw., Cryptosanus, XX. I. Orchideae.
scriptus Scheidw., brasilianischer, 4. w. Brasilien.

Cryptotaenia DC, Fadendolde, V. II., Umbelliferae.
canadensis DC. (= *Chaerophyllum canadense* P. = *Conopodium canadense* K., p. 214 = *Cyrtospermum trifoliatum* Rafin. = *Myrrhis canadensis* G., Nutt. = *Scandix ternata* Moh. = *Sison canadense* L. = *Sium canadense* Lam.).
Thomasii DC. (= *Sison Thomasii* Tenore), Thomas's, 4. f. Calabrien.
Cucullaria excelsa W., v. Vochysia excelsa, p. 853.

Cucumis T. Gurke.
abyssinicus Hort., abyssinische, ⊙. m. f. Abyssinien.
campechianus H. B. (= *prophetarum* L. var. Spgl.), Campeche-G., ⊙. m. f. Südamerika.
dipsaceus, Ehrbg., kardenähnliche, ⊙. m. f. Gegend des rothen Meeres.
Dudaim L. (= *odoratissimus* Mch.).
flexuosus L., β) reflexus Zeyh.
macrocarpus Wender., grofsfrüchtige, ⊙. m. f. Brasilien.
Melo L. (= *bucharicus* Hort. = *erivanicus* Hort. = *saccharinus* Hort. = *verrucosus* Hort. = *viridis* Hort.), β) princeps Wender.
metuliferus E. Mey., säulentragende, ⊙. m. f. Südafrika.
pedatifidus Schrad., fiederspaltige, ⊙. m. f. ?
prophetarum L. (= *grossularioides* Hort.).
pseudocolocynthis Wender. (= ? *colocynthoides* Hort.), Coloquintenähnliche, ⊙. m. f. ?
pubescens W. (= *maderaspatanus* Roxb. Wall.).
Reginae Schrad., königliche, ⊙. m. f. ?
sativus L., ζ) semperfructiferus.
serotinus Haberle, späte, ⊙. m. f. Türkei.
amarissimus Schrad., *caffer* (Eckl., Zeyh.), *Colocynthis* L., *Citrullus* Sering., v. Citrullus amarus etc., p. 146, II.

Cucurbita T., Kürbis.
asteroides Schrad., sternförmiger, ⊙. m. f. ?
ceratoceros Haberle, hörnerfrüchtiger, ⊙. m. f. ?

Digitized by Google

Cucurbita
cucumifera Schrad., gurkentragender, ⊙. m. f. ?
elongata Beauv., Schrad., verlängerter, ⊙. m. f. ?
foetidissima H. B., stinkender, ⊙. m. f. Mexico.
lignosa Mill., holziger, ⊙. m. f. Mittägl. Amerika.
mammeata Molina, zitzenähnlicher, ⊙. m. f. Chili.
marsupiformis Jacq., Haberle, beutelförmiger, ⊙. m. f. ?
maxima Duch. (= *Potiro* P. = *Pepo macrocarpus* Rich.).
medullaris Haberle, markreicher, ⊙. m. f. ?
Melopepo L. (= *C. polymorpha* Melopepo Duch. = *Pepo Melopepo* Mönch.), *β*) radiata.
picta Brotero, bemahlter, ⊙. m. f. ? Südamerika.
pileiformis Duch. (= *polymorpha pileiformis* Spach), haarförmiger, ⊙. m. f. Orient.
pinnatifida Schrank, fiederspaltiger, ⊙. m. f. Brasilien.
spathularis Schrad., spatelförmiger, ⊙. m. f. Mexico.
Hybriden oder Varietäten: picta Haberl ⊙., tiarata maculata Haberl ⊙.
Citrullus L. et *variegata* Steud., v. Citrullus vulgaris, p. 146, II., *dioica* Roxb., v. Coccinia indica, p. 151, II., *latior* Hort. (= *leucantha* Duch. = *longa* Hort. = *pyrotecha* Hort.), v. Lagenaria vulgaris, *idolatrica* W., v. Lagenaria idolatrica, p. 443. *Cuellaria ferruginea* R. et P., v. Clethra ferruginea, p. 205.

Culcasia P. B. Endl., Culcasie, XXI. IX., Aroideae.
scandens P. Beauv., (= *Caladium scandens* W., p. 143 = *Denhamia scandens* Schott.).
Culcitium salicinum Spgl., v. Bedfordia salicina. *Culhamia platanifolia* Forsk., v. Sterculia platanifolia, p. 787.

Cullumia RBr., Cullumie,
patula Less. (= *Berkheya patula* W. = *Gorteria ciliata* Thbg. W., p. 366 = *Rohria patula* Thbg.), ausgebreitete, ♄. k. t. Cap der guten Hoffn.
pectinata Less. (= *Berkheya pectinata* W., p. 119 = *Rohria pectinata* Thbg.).
sulcata Less. (= *Berkheya sulcata* W. = *Gorteria spinosa* Jacq. = *Rohria sulcata* Thbg.), gefurchte, ♄. t. k. Cap der guten Hoffn.

Cuminia Colla, Cuminie, XIV. I., Labiatae.
eriantha Colla (= *Bystropogon erianthus* Benth.), wollblumige, ♄. w. Insel St. Juan Fernandez.

Cuminum L., Kreuzkümmel.
hispanicum Merat, spanischer, ⊙. f. Spanien, Soongaria.
minimum Urvill. (= *Cyminum* L. var. Spgl.), kleinster, ⊙. f. Griechenland.

Cummingia campanulata D. Don (= *bifolia* Sims).

Cunila L., Cunila.
microcephala Benth., kleinköpfige, 4. f. ?
coccinea Nutt., Hook., v. Gardoquia Hookeri, p. 346.

Cunninghamia lanceolata RBr., *β*) glauca Hort. angl.

Cupania Plum., Cupanie.
Akeesia Cambess. (= *Akeesia africana* Tussac = *Bligbia sapida* Koen., p. 125 = *Bonannia nitida* Rafin.), Akeesia-C., ♄. w. Guinea.
discolor Vahl, verschiedenfarbige, ♄. w. ?
glabra Sw. (= *americana* L.).

Cuphea P. Br. (= *Cuphaea* Jacq.).
floribunda Lehm., blüthenreiche, ♄. t. k. Mexico.

Digitized by Google

Cuphea

fruticulosa Schrad. (= *fruticosa* N. E.), strauchige, ♄. t. Brasilien.

glabra Gill., kahle, ♄. t. Bonaria.

malvacea Hort., malvenähnliche, ♄. t. ? Südamerika.

procumbens Cav. (= *erecta* Hffg.).

strigulosa H. Bonpl., stiegeliche, ♄. t. Südamerika.

viscosissima Jacq. (= *petiolata* Auct. = *Lythrum Cuphea* L. fil. = *L. petiolatum* L.).

Cupressus T., Cypresse.

expansa Audib., ausgebreitete, ♄. k. ? Orient.

pendula Thbg. (= *patula* P.).

sempervirens L., a) stricta Mill. (= *fastigiata* DC. = *pyramidalis* Targ. Tozz.).

Unbestimmtere: angustifolia Hort., capensis Hort. Cels, sinensis Hort. — *africana* Mill., *americana* Trautv., *arbor-vitae* Targ. Tozz., *Thuja* Targ. Tozz., *thyoides* L., v. Thuja cupressoides, excelsa, occidentalis, orientalis et sphaeroidea, p. 808, — *australis* P., *Fothergillii* Hort. (= *triquetra* Lodd.), v. Callitris australis et quadrivalvis, p. 149 et p. 108, II., — *japonica* Thbg. L. fil., v. Cryptomeria japonica.

Curcas Adans., Curcasbaum, XXI. x. (XVI. VI.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

Adansonii Endl. (= *purgans* Medik. = *Jatropha Curcas* L., p. 430 = *Castiglionia lobata* R. et P. = *Ricinus americanus* Mill. = *β R. urens* Mill.), Adanson's, ♄. w. Südamerika.

Curculigo G., Curculigo.

chinensis Lodd., chinesische, 4. w. China.

sumatrana Roxb. (= *latifolia* Voigt = *Molineria plicata* Colla).

Curcuma L., Gelbwurz.

purpurascens Blume, purpurfarbige, 4. w. Java.

Roscoeana Wall., Roscoe's, 4. w. Ostindien.

rubescens Roxb. (= ?*erubescens* Roxb. = *longiflora* Salisb.).

Zerumbet Roxb. (= *officinalis* Salisb. = *speciosa* Lk. *Zedoaria* Salisb. = *Amomum latifolium* Lam. = *A. Zerumbet* Koen.).

Curtogyne Auct., v. Cyrtogyne.

Cuscuta T., Flachsseide.

approximata Babingt., genäherte, ⊙. Sch. f. England.

bonariensis H. Berol., bonarische, ⊙. Sch. f. Bonaria.

californica Dougl., californische, ⊙. Sch. f. Neucalifornien.

corymbosa R. et P. (= *hassiaca* Pfeiff. = *Trifolii* Hensl.) [1], traubendoldige, ⊙. Sch. f. Peru, Chili, Holland, Deutschland, Schweitz.

β) pauciflora Chois.

major C. Bauh., Chois. (= *europaea α* L. = *vulgaris* P. = *alba* Presl.), Europa, Nordafrika, Asien.

minor C. Bauh. (= *europaea β* L. = *Epithymum* Sm. = *planiflora* Tenore = *halophyta* Fr. = *alpina* Kotsch.), *β*) Trifolii Babingt. Europa, Griechenland, Syrien, Caucasus, Canarische Inseln.

reflexa Roxb. (= *verrucosa* Swt.), zurückgebogene, ⊙. Sch. w. f. Ostindien, Nepal.

Uebrigens ist p. 240 u. 241 zu allen noch das Zeichen Sch. zu setzen.

---

1) Gehören nach Choisy (DeCandolle prodrom. syst. nat reg. veget. vol. IX. p. 456 et 565) zu C. corymbosa.

Digitized by Google

Cuspidia araneosa G. (= *castrata* Cass.), v. Didelta cernuum, p. 262.
Cussambium glabrum Hamilt. (= *pubescens* Hamilt.), v. Melicocca trijuga, p. 507.

Cussonia Thbg., Cussonie.
paniculata Eckl., Zeyh., rispige, ♄. t. k. Cap d. g. H.
triptera Colla (= *quercifolia* Hort.).

Cyamopsis DC., Afterbohne.
psoraleoides DC. (= *Dolichos fabaeformis* L'Her. = *D. psoraloides* Lam. = *Lupinus trifoliatus* Car. = *Psoralea tetragonoloba* L. = *Trigonella Goalia* Hamilt. = *T. tetrapetala* Roxb.).
senegalensis Guillem. et Perr., senegalsche, ⊙. m. f. Senegal.
Cyamus flavicomus Salisb. (= *luteus* Tratt.), v. Nelumbium luteum, p. 544.

Cyanella coerulea Eckl. (= *alba* L., Suppl. p. 241). *Cyanopsis radicatissima* Cass., v. Amberboa muricata, p. 32, II.

Cyanospermum Wight et Arn., Blausaame, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
albiflorum Wight et Arn. (= *Cylista albiflora* Sims, p. 242).
tomentosum Wight et Arn. (= *Cylista tomentosa* Roxb., p. 242) [1]).

Cyanotis D. Don, Endl., Blauhaar.
hirsuta Fisch. et Mey. (= ? *abyssinica* H. bot. = *Commelyna hirsuta* Hochst. et Schimp.), rauhhaarige, 4. Kn. t. Adoa.
imbricata Kunth (= *Tradescantia imbricata* Roxb.), ziegeldachförmige, ⊙. m. f. Ostindien.
nodiflora Kunth (= *Tradescantia nodiflora* Lam. = *T. formosa* W. = *T. speciosa* L. fil., p. 814 = *Commelyna speciosa* Thbg.), knotenblumige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.
papilionacea R. et S. (= *Tradescantia papilionacea* L. = ? *Commelyna papilionacea* Burm.), schmetterlingsblumige, ⊙. m. f. Ostindien.
Cyanus arvensis Mch. (= *segetum* G. M. Scherb.) etc., v. Centaurea Cyanus etc., p. 177 seq.

Cyathea Kunze, Becherfarrn.
Dregei Kunze, Drege's, 4. ♄. w. Südafrika.

Cyathodes LaBill., Becherheide.
abietina RBr. (= *Epacris juniperina* Forst. = *Styphelia abietina* LaBill.), tannenähnliche, ♄. t. Neuholl.
Cybele umbellifera Knight et Salib., v. Stenocarpus Forsteri, — *Cybelion tenerum* Steud., *teres* Steud., *Utricularia* Spgl., v. Jonopsis tenera, teres et utricularioides, p. 431.

Cycas L., Farrnpalme.
celebica Miq., celebische, ♄. w. Celebes.
circinalis L., β) javana Miq.
inermis Lour., unbewehrte, ♄. w. Cochinchina, China.
madagascariensis Miq. (= ? *Thouarsii* RBr. = *circinalis* A. du Pet. Thouars), madagascarische, ♄. w. Madagascar.

---

1) **Cyanothamnus** Lindl., Blaustrauch, Tricoccae-Rutaceae. **ramosus** Lindl., **tenuis** Lindl. Beide ♄ und in Neuholland am Schwanenfluss heimisch, werden wohl noch nicht kultivirt.

Digitized by Google

Cycas
media RBr., mittlere, ♄. w. Neuholland.
revoluta Thbg. [1]), β) planifolia Miq.
Riedlei Fisch., Riedl's, ♄. w. Neuholland.
Rumphii Miq., Rumph's, ♄. w. Molucken, Amboina, Ternate.
sphaerica Roxb., kugelige, ♄. w. Molucken [2]).
undulata Gaudich., Dsf. Hort. Par., wellenförmige, ♄. w. ?
Wallichii Miq., Wallich's, ♄. w. Ostind. („Colitur in hort. bot. Calcuttensi").
Unbestimmt: Laguna de Verde Hort. Booth.

Cyclamen T., Erdscheibe, Saubrod.
aleppicum Fisch. (= *persicum fl. albo* Hort.).
europaeum L. (= *aestivum* Rchb. = *hungaricum* Hort. = *litorale* Sadl. = *officinale* Wender. = *Clusii* W. Shm.), b. flore albo.
hederaefolium Ait. (= *autumnale* Boos = *europaeum* Mill., Sm. = *neapolitanum* Tenor. h. Neapol. = *graecum* Lk. = *ficariaefolium* Rchb.).
β) subhastatum Rchb., γ) linearifolium DC. (= *lancaefolium* Hort belg.).
neapolitanum Tenore Prodr. fl. neapol. Suppl. II. 66 (nec fl. neapol. III. p. 197 etc.).
Poli Delle Chiaje, Poli's, 4. Kn. k. Mittelitalien, Südfrankreich.
repandum Sibth. Sm. (= *neapolitanum* Auct.).
vernum Lobel., Rchb. (= *vernale* Mill. = *hederaefoliam* Bot. mag.), Südeuropa, Caucasus (Georgia).
Unbestimmtere: anemonoides Hort., corniculatum H. Hügel., indicum L., intermedium Wender., orbiculatum Mill., pictum Hort., purpurascens Mill. = *utopicum* Hffg. = persicum.

Cyclanthera Schrad., Scheibenbeutel, XXI. x. (XVI. VIII.), Cucurbitaceae.
pedata Schrad., fufsförmiger, ☉. m. f. Mexico.

Cyclobothra Don, Sweet, Scheibentraube.
elegans Benth., Lindl. (= *Calochortus elegans* Pursh, Hook., p. 149).
flava Benth., Lindl. (= *Calochortus flavus* Schult. fil.), hellgelbe, 4. Zw. t. Mexico.
fusca Benth., Lindl. (= *Calochortus fuscus* Schult. fil.), braune, 4. Zw. t. Mexico.
? Hartwegii Kunth (= *Calochortus Hartwegii* Benth.), Hartweg's, 4. Zw. t. Mexico.
lutea Lindl. (= *barbata* Sweet).
nitida Kunth (= *Calochortus nitidus* Dougl., p. 149).
pallida Lindl. (= *Calochortus pallidus* Schult. fil.), bleiche, 4. Zw. t. Mexico.
paniculata Benth., Lindl., rispige, 4. Zw. k. f. b. Californien.

---

1) „Teste Millero Anno 1758 in Angliam introducta; sed antea jam in Hollandiam. Floret apud nos verno tempore. Specimina culta omnia fere foeminea. Masc. in horto Petropolitano exstat, ubi bis floruit" (Otto et Dietr. Gartenzeit. VII. 24). „In hortis Calcuttae stirps foeminea abunde colitur" (Roxb.); „saepe prope domos colitur, etiam in China" (Thbg.). Conf. Miquel genera et species Cycadearum viventium, 24. (Im Dresdener botanischen Garten blühte 1841 ein weibliches Exemplar sehr reichlich. G. H.)

2) „In hortum Calcuttensem Anno 1798 introduct., ubi utroque sexus m. Majo floret; sem. Jan. et Febr. maturescunt" Miquel l. c.

Digitized by Google

Cyclobothra
purpurea Sweet (= *Fritillaria purpurea* Humb. B. K. = *Calochortus Bonplandianus* R. et S.),
uniflora Kunth (= *Calochortus uniflorus* Hook.), einblumige, 4. Zw. k. f. b. Californien.

Cyclolepis Gill. et Don, Kreisschuppe, XIX. II., Compositae-Eupatorineae (Mutisiaceae).
genistoides Gill. et Don (= *Gochnatia genistoides* Hook.), ginsterähnliche, ♄. k. t. Chili, Patagonien.

Cycloloma Moq. Tand., Endl. (= *Cyclolepis* Moq. Tand. = *Petermannia* Rchb.), Scheibensaum, V. II., Atripliceae-Aizoideae (Chenopodeae).
platyphylla Moq. Tandon (= *Cyclolepis platyph.* Moq. Tand. = *Salsola platyphylla* Mchx. = *S. radiata* Dsf. = *S. atriplicifolia* Spgl. = *S. atriplicis* Schult. = *Kochia atriplicifolia* Roth = *K. dentata* W., p. 438 = *Chenopodium radiatum* Schrad. = *Salsola chenopodioides, latifolia, paniculata et stellata* Hort.), breitblätterige, ⊙. f. Nordamerika.

Cyclogyne Benth., Kreisnarbe, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
canescens Benth., grauliche, 4. ♄. t. Ostwestl. Neuholl.

Cyclosia Kl., Scheibenstendel, XX. I., Orchideae.
maculata Kl. (= *Mormodes pardina* Batem., p. 531), gefleckter, 4. w. Mexico (Oaxaca).

Cyclosorus gongylodes Lk., v. Aspidium Sect. II, p. 49, II.

Cycnoches Lindl., Schwanenstendel.
chlorochiton Lindl., grünlichblumiger, 4. w. Demerara.
maculatum Lindl., Lodd., gefleckter, 4. w. Brasilien, Mexico.
pentadactylon Lindl., fünffingeriger, 4. w. Brasilien.
ventricosum Batem., β) Egertonianum Lindl., Mexico, Guatimala.

Cycnoseris Endl., Schwanenblümchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
australis Endl., neuholländisches, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland (Schwanenfluss).

Cylista polystachya Spgl. (= *pycnostachya* DC.).
C. albiflora Sims et *tomentosa* Roxb. (= ? *mollis* Hort.), v. Cyanospermum albiflorum et tomentosum.
Cymbalaria Elatine G. M. Scherb., *muralis* G. M. S. = *vulgaris* Auct.), *spuria* G. M. S., v. Linaria Elatine, Cymbalaria, spuria, p. 465.

Cymbidium Sw., Cymbelstendel (Kahnlippe),
bicolor Lindl. (= *aloifolium* Blum., non Sw.), zweifarbiger, 4. w. Ceylon.
chinense W. (= *sinense* Auct. = *fragrans* Salisb.).
cruentum Hffg., blutrother, 4. w. Brasilien.
cuspidatum Blum., langspitziger, 4. w. Java.
diurnum Sw. (= *Limodorum diurnum* Jacq.), Tag-C., 4. w. Caracas.
elegans Lindl. (= *Limodorum cyperifolium* Hamilt.), zierlicher, 4. w. Ostindien.
gigantеum Wall. (non Sw.) (= *Limodorum longifolium* Hamilt. = ? *iridioides* Don), riesenhafter, 4. w. Nepal.
grandiflorum W. (= *Limodorum grandiflorum* Aubl.), grofsblumiger, 4. w. Guiana.
marginatum Lindl. (= *emarginatum* Hort. = *Maxillaria gracilis* Lodd., p. 500).
Mastersii Griff., Master's, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Cymbidium
pendulum Sw., Lindl. (= *crassifolium* Wall. = *Epidendrum pendulum* Roxb.), überhängender, 4. w. Ostindien.
β) brevilabre Lindl.
speciosissimum Don, prächtigster, 4. w. Nepal.
triste W. (= *Epidendrum teres* Thbg. = *E. triste* Forst. = *Luisia teretifolia* Gaudich. = *Trichorrhiza teretifolia* Lindl. = *Vanda trichorrhiza* Hook., p. 836), trauriger, 4. w. Japan, Ostindien, Hebriden.
vexilliferum Llav. et Lex., fahnenähnlicher, 4. w. Mexico.
Wallichii Lindl. (= *aloifolium* Wall., non Sw.), Wallich's, 4. w. Ostindien.
II. Camaridium Lindl., p. 151 et p. 110, II.
ochroleucum Lindl. (= *Ornithidium album* Hook., p. 568).
vestitum Sw. (= *Camaridium purpureum* Spgl. = *Epidendrum vestitum* Sw.), bekleideter, 4. w. Jamaika.
In den Pflanzenverzeichnissen kommen noch vor: C. pubescens, purpureum.
altum W., *floridum* Salisb., *hyacinthinum* Sm. (= *striatum* Sw.), v. Bletia verecunda, florida et hyacinthina, p. 125, *coccineum* Sw., v. Ornithidium coccineum, p. 568, *Corallorrhiza* Sw., v. Corallorrhiza innata, p. 217, *cucullatum* Sw. et *nodosum* Sw., v. Brassavola cucullata et nodosa, p. 130, *giganteum* Sw., v. Cyrtopera gigantea, *imbricatum* Hook., v. Pholidota pallida, p. 617, *iridifolium* Roxb., v. Oberonia iridifolia, *iridifolium* Sw. (= *pusillum* Sw.), *juncifolium* W., v. Oncidium iridifolium et Cebolleta, p. 557 et 558, *madidum* Hort., v. Maxillaria madida, *pallens* Sw., v. Cephalanthera pallens, p. 180, *palustre* Sw., v. Epipactis palustris, p. 290, *stapelioides* Lk., v. Maxillaria stapelioides, p. 500, *triptera* Sw., v. Coelia triptera, p. 152, II., *umbellatum* Spgl., v. Cirrhopetalum Thouarsii, p. 145, II., *virescens* W., v. Chloraea virescens, p. 139, II. *Cymburus urticaef.* Salisb., v. Stachytarpheta urticaef. *Cyminosma oblongifolia* A. Cunnigh., Hook. et *ovata* Hort., v. Acronychia oblongifolia et ovata, p. 8, II. *Cynanchum capense* L., *crassifolium* RBr. (= *obtusifolium* L. Suppl.), v. Cynoctonum capense et crassifolium, *crispum* Jacq., v. Fockea capensis, *foetidum* H. B. K. (= *racemosum* Jacq.), v. Roulinia Jacquini, *maritimum* L. mant., v. Ibatia maritima, *medium* RBr. (= *fuscatum* Lk.), *nigrum* P., *Vincetoxicum* P., v. Vincetoxicum medium etc., *mauritianum* Hort. (= *capense* Sbr. = *laevigatum* Vahl = *indicum* Lam.), *parviflorum* Hort., *viridiflorum* Sims (= *vomitorium* Lam.), v. Tylophora laevigata, laevis et asthmatica, *radians* Lam., v. Steinheilia radians, *sibiricum* RBr., v. Skylakanthus sibiricus, *villosum* R. et S, v. Lachnostoma Bablisii.
Cynara T. Vaill., Artischocke.
Cardunculus L. (= *sylvestris* Lam.), β) hortensis Mill. ferox Tenor., starkbewehrte, ♂. 4. f. Unteritalien.
Cynocardamum Webb. et Berth., Hundskresse, XV. II., Cruciferae.
Menziesii Endl. (= *Lepidium Menziesii* DC., p. 454).
virginicum Webb. et Berth. (= *Lepidium virginicum* L., p. 454 = *L. Iberis* Schk., non L.).
Wahrscheinlich werden zu dieser neuen Gattung noch mehrere Lepidia gestellt werden.

Digitized by Google

Cynoctonum E. Mey., Hundsschlinger, V. 11., Asclepiadeae.

capense E. Mey. (= *Cynanchum capense* L., p. 243).

crassifolium E. Mey. (= *Cynanchum crassifolium* RBr., p. 243 = ? *obtusifolium* L. Suppl.), β) pilosum E. Mey. (= *Cynanchum pilosum* RBr. = *Periploca africana* Poir.).

Cynodon Dactylon Rich. P. (= *maritimus* H. B. K. = *occidentalis* et *portoricensis* W. = *Chloris Cynodon* et *maritima* Trin.), β) linearis W. (= *Panicum lineare* Burm.), γ) stellatus W.

virgatus W., v. Leptochloa tenerrima, p. 455.

Cynoglossum T. L., Hundszunge.

canescens W. (= *hirtum* et *hispidum* Hort. = *racemosum* Roxb.).

erectum Schrank, Schweigg., aufrechte, ♂. f. ?

furcatum Wall., gabelförmige, 4. f. b. k. Nepal.

glochidiatum Wall., widerhackige, 4. k. Ostindien.

longiflorum Lehm., langblumige, ⊙. f. Sibirien.

montanum Lam. (= *Dioscoridis* Vill. = *elongatum* Hornem. = *Mönchii* Nocca = *apenninum* Roth = *germanicum* Jacq. = *Haenkei* Schult. = *officinale* β L. = *sylvaticum* Haenk.-Sm. = *virens* Schreb. = *virginicum* Schreb., W. E.).

valentinum Lagasc., valentinische, 4. f. Spanien.

virginicum L. (= *amplexicaule* Mchx. = *pensylvanicum* Hort.).

Cyperus T., Cypergras.

asperifolius Dsf., rauhblätteriges, 4. w. ?

australis Schrad. (= *alopecuroides* β Poir. = *cinnamomeus* et *confertus* Hort. = *multumbelliferus* Hort. = *paniculatus* et *thyrsiflorus* Hort.).

bulbillosus Brotero, zwiebeltragendes, 4. Kn. w. ? Südamerika.

congestus Vahl (= *badius* Auct. = *bulbosus* Lagas. = *ligularis* Thbg. Lk. = *Linkianus* Schult. = *multiceps* Lk. = *polycephalus* Lk. = *spiculosus* Rchb. = *strigosus* W. = *subbulbosus* R. et S.), gedrängtähriges, 4. k. Cap der guten Hoffn.

dentatus Torr. (= *micranthus* Schult. = *parviflorus* Mühlbg.), gezahntes, 4. f. Nordamerika.

diaphanus Schrad., durchschimmerndes, ⊙. f. Nepal.

difformis L. (= *complanatus* Forsk. = ? *holoschoenoides* Jan. = *protractus* Sbr., non Delil.).

Eragrostis Vahl (= *albidus* Lam. = *cruentus* Retz = *nitidus* Lam. = *sanguinolentus* Vahl = *turfosus* Salzm.).

fasciculatus Ell. (= *Elliottianus* Schult.).

flabelliformis Rottb. (= *gradatus* Forsk.), fächerförmiges, 4. w. Arabien.

flavicomus Mchx. (= *elegans* Walt. = *Distimus flavicomus* Rafin.), gelbschopfiges, 4. k. Nordamerika.

fuscus L. (= *brachystachys* Presl = *ferrugineus* Forsk. = *protractus* Delil.).

giganteus Rottb. (= *densiflorus* Rchb.), riesenhaftes, 4. w. Portorico, Surinam.

globosus All. (= ? *conglomeratus* var. Rottb. = *fasciculatus* DC. = *humifusus* Clem. = *vulgaris* Sieb.), kügelähriges, ⊙. f. Italien, Nordafrika.

glomeruliferus Schrad., knaulähriges, 4. w. Brasilien.

Digitized by Google

Cyperus

holosericeus Hornem., Lk. (= *incrassatus* Beyr.), sammethaariges, 4. k. f. Nordamerika.

Iria L. (= *chrysomelinus* Lk. = *panicoides* Lam. = *Santonici* Rottb.).

kyllingioides Vahl (= *dubius* Rottb. Roxb. = *monocephalus* Roxb. = *striatulus* var. *major* W. herbar.).

lanceus Thbg., lanzettähriges, 4. w. t. Cap d. g. H.

lateralis Forsk. (= *mucronatus* Retz, Rottb. = *mucronatus* β *albidus* Vahl = *Roxburghii* A. Dietr. = *Roxburghianus* Presl = *Pycreus lateralis* N. E.), seitenähriges, 4. w. Ostindien, Arabien.

longus L., β) thermalis Dumort.

Luzulae Rottb. (= *conoideus* Rich. = *globuliferus* et *sphaerostachyus* Willd. herb. = *surinamensis* Vahl herb. = ? *Kyllingia scirpina* Rchb. = *Mariscus paniceus* H. Berol.).

macrostachyos Lam. (= *puncticulatus* β Kunth), großährige, 4. w. Ostindien.

Michauxianus Schult. (= *erythrorhizus* Torr., non Mchx.), Michaux's, ⊙. f. Nordamerika.

micromegas N. E., kleinähriges, ⊙. f. Cap d. g. Hffn.

Mundtii Kunth (= *Pycreus Mundtii* N. E.), Mundt's, 4. w. t. Cap der guten Hoffnung.

olivaris Targion. (= *esculentus* Gouan, Vill. Savi, (non L.) = *Hydra* Tenore = *radicosus* Sib. Sm. = *rotundus* DC., Tenor.), olivenförmiges, 4. Kn. k. f. b. Frankreich, Italien.

patulus Kit. MB. (= *canescens* et *caucasicus* Hort. = *fascicularis* Philippi = *imbricatus* Vill. = *pictus* Tenor. = *squarrosus* Afzel.), 4. f. Süd- und Osteuropa.

polystachyus Rottb. (= *brizaeus* W. herb. = *fascicularis* Lam., Dsf. = *tetraphyllus* P. B.).

procerus L. Rottb., Vahl (= *elongatus* Sbr.), hohes, 4. w. Ostindien, Aegypten.

prolixus H. B. K. (= *Schottii* H. Berol., A. Dietr. = *Comostemum Schottii* N. E.), Schott's, 4. w. Brasilien, Neugranada.

puncticulatus Vahl (= *diluvialis* Schult. = *inundatus* et *procerus* Roxb.), punktirtes, 4. w. Ostindien.

radicans N. E., wurzelndes, ⊙. m. f. China.

reflexus Vahl (= *montevidensis* Lk. = *Sellowii* Lk.), zurückgebogenes, 4. w. Montevideo.

repens Elh. Nutt. (= *esculentus* Mühlbg., non L. = *gracilis* W. herb. = *gracilescens* Schult. = *phymatodes* Mühlbg. = *tuberosus* Pursh), kriechendes, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

rotundus L. (= *agrestis* W. herb. = *ferrugineus* Forsk. = *jeminicus* Retz = *Pangorei* Vahl herb. = *radicosus* Sib., Sm. = *rubicundus* W. herb. = *stoloniser* W. herb. = *heterostachyus* Dsf., Tenore, Presl), 4. Kn. k. f. b. Südeuropa, Asien, Afrika, Amerika, Neuholland.

Schraderianus Mart., Schrader's, 4. w. Brasilien.

Sieberianus Lk. (= *damiettensis* A. Dietr.).

speciosus Vahl (= *virginicus* Jacq.), prächtiges, 4. k. Nordamerika.

spectabilis Lk. (= *Monti* h. Berol. = *Paramatta* Mart. = *paramattensis* Lk. = *patulus* Hort. = *scaber* Lagasc.).

Digitized by Google

Cyperus

sphaerocephalus Vahl (= *flavissimus* Schrad.), kugelähriges, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.

sphaerospermus Schrad. (= *corymbosus* Steud.), kugelsaamiges, 4. t. w. Cap der guten Hoffnung.

strigosus L. (= *Enslenii* Pursh = *incompletus* Lk.).

surinamensis Rottb. (= *compressus* Sbr. = *formosus* Vahl herb. = *microcephalus* N. E. = *polycephalus* Schrk. = *Sieberianus* Spgl. = *tortulanus* Vahl herb. = *virens* Rchb., in Weigelt herb.), surinamisches, 4. w. Westindien, Südamerika.

tenuiculus Kunth (= *angustifolius* A. Dietr. = *tenellus* Presl), dünnes, ⊙. f. Californien.

tenuiflorus Rottb. (= *incurvus* Roxb.).

textilis Thbg. (= *pungens* H. Berol.), stechendes, 4. t. w. Cap der guten Hoffnung.

thyrsiflorus Schltdl., strausblumiges, 4. w. t. Mexico.

venustus RBr. (= *alopecuroides* Koen. = *fastigiatus* Rottb. = *auriculatus* Sieber = *xanthocomus* Lk. = *Papyrus venustus* N. E.), liebliches, 4. w. Südl. Asien, Afrika, Neuholland.

virens Michx. (= *elegans* Schreb. = *glomeratus* Walt.), grünliches, 4. k. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. Dichostylis, Kyllingia, Mariscus et Papyrus.

Cypripedium L., Frauenschuh.

barbatum H. belg., bärtiger, 4. Kn. w. ? Ostindien.

japonicum Thbg., japanischer, 4. Kn. t. Japan.

purpuratum Lindl. (= *Knightii* H. Anglor.), purpurfarbiger, 4. Kn. w. Malayen.

speciosissimum Hort. Hügel., prächtigster, 4. Kn. w. Nepal.

spectabile Sw. (= *hirsutum* Mill. = *Reginae* Walt.).

ventricosum Sw., bauchiger, 4. Kn. f. Sibirien.

Cyrilla pulchella L'Her., v. Achimenes coccinea, p. 6, II. — *spinosa* Spgl., v. Bursaria spinosa, p. 140.

Cyrtanthus Ait., Bogen-(Hacken-)lilie.

albus Hort. angl., weiſse, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

carneus Lindl., fleischfarbige, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

helictus Lehm., gewundene, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

ochroleucus Burch. (= *Monella ochroleuca* Herb.), weiſsgelbe, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffn.

Pumilio Schult. fil. (= *Amaryllis Pumilio* Ait. = *A. humilis* Lk.. Enum.), kleine, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

puniceus Eckl., H. Dyck, hochrothe, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffnung.

spiralis Burch. (= *angustifolius* Jacq. = *Amaryllis bivaginata* Don = *Monella spiralis* Herb.).

striatus Herb. (= *Amaryllis falcata* Lee), gestreifte, 4. Zw. w. t. Cap d. g. Hoffn.

uniflorus Ker (= *Amaryllis falcata* L'Her. = *Gastronema clavatum* Herb., p. 347), einblumige, 4. Zw. w. t. Cap d. g. Hoffn.

longiflorus Gmel., v. Pesoqueria longiflora, p. 649.

Cyrtoceras Bennet, (= *Centrostemma* Decaisn.), Bogenhorn, V. 11., Asclepiadeae.

coriaceum* (= *Centrostemma coriaceum* Meisn. = *Hoya coriacea* Bot. reg.), lederartiges, ♄. w. Molucken.

multiflorum (Decaisn.) (= *Hoya multiflora* Blum.), vielblumiges, ♄. w. Java.

Digitized by Google

Cyrtoceras
reflexum Bennet (= *Centrostemma Cyrtoceras* Meissn. = *Hoya reflexa* Hort.), zurückgebogenes, ♄. w. Java.

Cyrtochilum H. B. K., Bogenlippe.
candidum Hort. belg., reinweifse, 4. w. ? Südamerika.
filipes Hort., fadenstielige, 4. w. Südamerika.
floribundum Hort. belg., blüthenreiche, 4. w. Südamer.
hastatum Hort. belg. (= *Odontoglossum hastatum* Auct.), spontonförmige, 4. w. Südamerika.
ixioides Lindl., Ixienähnliche, 4. w. Neugranada.
maculatum Lindl., *β*) ecornutum H. belg.
pardinum Lindl., buntfleckige, 4. w. Peru.
Russelianum H. Anglor., Russel's, 4. w. Südamerika.
stellatum Lindl., sternförmige, 4. w. Brasilien.
undulatum H. B. K., wellenförmige, 4. w. Neugranada.
volubile Poepp. et Endl., windende, 4. Sch. w. Peru.

Cyrtolepis Less., DC., Bogenschuppe.
monantha Less. (= ? *Santolina rigida* Sibth., Sm. = *S. terrestris* Forsk. = *Tanacetum monanthum* L.), einblumige, ☉. f. Aegypten, Orient.

Cyrtomium falcatum Presl, v. Aspidium Sect. VI., p. 50, II.

Cyrtonema Schrad., Bogengurke, XXI. x. (XVI. 1.), Cucurbitaceae.
digitata Schrad. (= ? *Bryonia digitata* Thbg.), fingerförmige, 4. Sch. t. k. Cap d. g. Hoffn.
triloba Schrad. (= *Bryonia triloba* Thb., p. 135).

Cyrtopera Lindl., Bogenstendel, XXI. 1., Orchideae.
bicarinata Lindl. (= *Epipactis bicarinata* Hamilt.), zweikieliger, 4. w. Ostindien.
flava Lindl. (= *Dipodium flavum* Hamilt.), hellgelber, 4. w. Ostindien.
gigantea Lindl. (= *Cymbidium giganteum* Sw. = *Limodorum giganteum* Thbg. = *Satyrium giganteum* L. fil.), riesenhafter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
obtusa Lindl., stumpfer, 4. w. Ostindien.
plantaginea Lindl. (= *Limodorum plantagineum* Aub. d. Pet. Th.), wegetrittähnlicher, 4. w. Madagascar.
plicata Lindl. (= *Dipodium plicatum* Hamilt.), gefalteter, 4. w. Ostindien.
scabrilinguis Lindl., scharfzüngeliger, 4. w. Peru.
Woodfordii Lindl. (= *Cyrtopodium glutiniferum* Radd. = *C. Woodfordii* Sims, p. 247).

Cyrtopodium RBr., Bogenfufs.
cruentum H. Hügel. (= ? *punctatum* Lindl. var.), blutfarbiger, 4. w. Westindien.
cupreum H. Hügel., kupferfarbiger, 4. w. Westindien.
flavescens Lindl., gelblicher, 4. w. Mexico.
grandiflorum H. Hugel., grofsblumiger, 4. w. Westind.
speciosissimum Hort. Hügel., prächtigster, 4. w. Südamerika.
venustum H. Hügel., lieblicher, 4. w. Südamerika.
maculatum Hort., v. Cyrtochilum maculatum, p. 247,
Woodfordii Sims, v. Cyrtopera Woodfordii.
Cyrtospermum trifoliatum Rafin., v. Cryptotaenia canadensis.

Cystibax Mart., Genessstrauch, XIV. 11., Bignoniaceae.
antisyphilitica Mart. (= *Bignonia antisyphilitica* Mart. = *viridiflora* Lodd.), antivenerischer, ♄. Sch. w. Brasilien.

Digitized by Google

Cystopteris Bernh., Blasenfarrn.

albescens Lk. (= *islandica* Hort.), weifslicher, 4. f. Island.

alpina Lk., β) regia Lk. (= *alpina* Hook. = *Cystea regia* Sm. = *Aspidium regium* Sw.).

crenata Fr. (= *Aspidium crenatum* Sommerf.), gekerbter, 4. f. Norwegen.

dentata Sm, Lk. (= *Cystea dentata* Sm Engl. bot. = *Polyped. dentatum* Dicks.).

fragilis Bernh., γ) angustata Lk. Fil. (= *rhaetica* Lk. Hort. Berol. = *Cystea angustata* Sm. = *Aspidium rhaeticum* Sw.).

obtusa Presl (= *Aspidium obtusum* Sw.), stumpfer, 4. f. Pensylvanien [1]).

Pontederae Lk. (= *Polypodium Pontederae* All.), Pontedera's, 4. f. Oberitalien.

tenuis Presl, Schott. (= *Aspidium tenue* Sw.), dünner, 4. f. Nordamerika. Vergl. p. 876 seq.

Cytisanthus radiatus O. F. Lang., v. Genista radiata, p. 349.

Cytisophyllum sessilifolium O. F. Lang., v. Cytisus sessilifolius, p. 248.

Cytisus T., Geifsklee.

africanus Loisel., afrikanischer, ħ. k. Nordafrika.

alpinus Mill. (= *angustifolius* Moench. = *Laburnum alpinum* Griseb.).

β) albus, γ) macrostachys.

Alschingeri Visian., Alschinger's, ħ. ħ. f. Dalmatien.

chrysobotrys Fisch. (= ? *racemosus* Marnock = *Genista racemosa* Hort.), goldtraubiger, ħ. f. ?

β) grandiflorus.

elongatus W. K. (= *biflorus* Bot. reg.).

emeriflorus Rchb., kronenwickenähnlicher, ħ. f. Oberitalien.

Laburnum L. (= *Laburnum vulgare* Griseb.), ε) purpurascens Hort. (= *carneus* Hffsg. = *Laburno-purpureus* Hort.), ζ) serotinus.

laniger DC. (= *Colycotome villosa* Lk. = *Genista villosa* Lam. = *Spartium lanigerum* Dsf. = *S. villosum* Poir.).

leucanthus W. P. (= *austriacus* L. var. K. = *pallidus* Schrad.).

multiflorus G. Don (= *petiolaris* Hffg. = *falcatus* var. Auct.).

nigricans L. (= *Lembotropis nigricans* Griseb.).

parviflorus Boiss. (= *Genista parviflora* DC. = *G. angulata* Lk. = *Spartium parviflorum* Vent.), kleinblumiger, ħ. k. Anatolien.

peregrinus Hffg. (= *Lebeckia cytisoides* Hort., non Thbg.), fremder, ħ. k. ?

purpureus Scopol., ε) roseus Hort.

serotinus Kit. (= ? *hirsutus* L. var.), spätblühender, ħ. f. Ungarn.

triflorus L'Her. (= *villosus* L'Her.).

Unbestimmtere: bracteolatus Hort. anglor., filipes Hort., Lobelii Tausch, longissimus Hffmsg., onustus Tausch, polycephalus Tausch (= *austriacus* Hort.), tomentosus Host. — *canariensis* Hort., v. Genista canariensis.

Czernaevia laevigata Turcz., v. Conioselinum Czernaevia, p. 876,

1) Vergl. Physematium Perrinianum Presl (= *Cystopteris Perriniana* Lk. hort.).

Digitized by Google

Dacrydium Banks. Soland. Lamb., Gummitanne.
fuscum H. belg. (= *cupressinoides* Hort.), braune, ħ. t. k. Neuholland.
Mayi H. Anglor., May's, ħ. t. k. Neuholland.
spicatum Hort., ährige, ħ. t. k. Neuholland.
taxifolium H. angl. et belg., taxusblätterige, ħ. t. k. Neuholland.
plumosum Don, v. Thuja Doniana.

Dactylaena Schrad., Fingerkaper, I. r., Capparideae.
micrantha Schrad., (= *Cleome monandra* DC.), kleinblumige, ⊙. w. m. f. Brasilien.
Dactylagrostis Richardsonii Lk. = ? Triticum Richardsonii, p. 824.

Dactylis L., Knaulgras.
glomerata L., β) abbreviata Bernh., γ) altaica Bess, δ) glaucescens W., ε) nemoralis *.
distichophylla Brignol. (= *litoralis* W. = *maritima* Schrad.), *repens* Dsf. etc., v. Aeluropus laevis, villosus etc., p. 11, II.
Dactylogramm ocinnoides Lk., v. Mühlenbergia glomerata, p. 533.

Daemonorops Blum., Teufelspalme, VI. r., Palmae.
melanochaetes Blum., (= *Calamus niger* W., p. 144), schwarzborstige, ħ. w. Java.

Dahlia Cav. (A. Dahl, ehem. Prof. d. Botanik zu Abo), (= *Georgina* W., p. 352), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
astrantiaeflora Swt., sterndoldenblumige, 4. Kn. k. Mexico.
Barkeriae Knowl. et Westc., Barker's, 4. Kn. k. ?
Cervantesii Lagasc. (= *acutiflora* Moç., Sess. = *Georgina Cervantesii* Auct., p. 352).
coccinea Cavan. (= *bidentifolia* Salisb. = *crocata* Lag. = *crocea* Poir. = *frustranea* Ait. = *fulgens* Hort. = *Georgina coccinea* W. = *Coreopsis Georgina pruinosa* Cass.).
Merkii Lehm. (= *minor* Visian. = *glabrata* Lindl.), Merk's, 4. Kn. k. Mexico.
scapigera Bartl. (= *Georgina scapigera* Otto et Dietr.).
variabilis Dsf. (= *pinnata* Cav. = *purpurea* Poir. = *rosea* Cav. = *sambucifolia* Salisb. = *superflua* DC. = *sphondilifolia* Salisb. = *Georgina purpurea, rosea* et *variabilis* W. = *Coreopsis Georgina nuda* Cassin.).
β) excelsa Henslow (= *arborea* Hort.).

Varietäten u. Hybriden v. D. coccinea u. variabilis.

A. Aeltere[1]):

Admirable (Spary's), Agathe imperiale, Agathe royal, alba, Arabelle (Wieck's), Attilla (Whale's), atropurpurea, atrosanguinea, Beauty of Bedford (Maley's), Beauty of England, Beauty superbe, Belladonna, Belvedere, Bloomsbury (Pamplin's), Brides maid (Brown's), brightpurple, Brillant (Whale's), Calliopse (Spencer's),

1) Alljährlich werden neue Varietäten dieser ausgezeichnet schönen Zierpflanze gewonnen; die neueren und schöneren derselben, den Anforderungen einer kritischen Blumenästhetik mehr und mehr entsprechend, verdrängen allmählig die älteren, da letztere aber ebenfalls schön, die vorzüglichern auch in den Verzeichnissen der Herren Cultivateurs noch aufgeführt werden, so verdienen sie auch hier unter einer besondern Rubrik Erwähnung.

Digitized by Google

Dahlia

camelliaeflora, Canute (Ingram's), Carno (Ansel's), Chancellor, changeable purple, Charles XII. (Miller's), Climax (Jeffrie's), Colonel Schwanenfeld (Girling's), Comet (Sweet's), Countess of Pembrocke (Dood's), crimson, cuprea, Cyclops (Neville's), de Mirbel (Baltets), Dodonaeus, Dutchess of Glocester, Dutchess of Kent (Mitchel's), Dutchess of Nordhumberland (Newton's), Eclipse, elegans, Emilie Trebsen, Evêque de Tournay (Mackoy's), excellent, Fanny (Simon Louis), fawncoloured, Fire Ball (Squibbe's), flava, floribunda, floribunda nana, Freischütz (Rinz's), fulgida, Fürst Poniatowsky (Hanisch), Gem (Smith's), Gem (Willison's), Grand Alexander, Grand Tournament (Union's), Grenadier (Jackson's), Gris de Lin, Henriette, Herzogin von Meiningen, Hornzey Surprize (Pamplin's), imperiosa (Sweet's), insignis, Isabelline, Junoniana (Sweet's), Koning Aza, Lady Bathurst (Squibb's), Lady Dartmouth (Widnall's), La Ruel (Dufresne's), Leonore (Girling's), l'honeur d'Anvers, lilacina (Salisb.), lilac-striped, luteola, ma favorite, Marquis, Miss Golebourn (Sheppard's), Morison, mutabilis, nana (Andr.), Nicolas de Sauvage, Nicolaus Nickelby (Cormack's et Knigth's), nigra, nigra et alba, non pareil (Girling's), orange flag, pallida, Peruvian chief (Harrison's), Prinzess Alexandrina Victoria, Prinzess Elizabeth, pulchra, punicea (Bot. reg.), purpureo-nigra, Rival Praesident (Elliot's), Rival Queen of Dahlias (Barnes) (= *Agnes Graham*), Rival Sussex (Stanford's), royal-olive, rouge et noir (Ansel's), royal purple, Rubis superb (Girling's), rubra (Bot. mag.), Sabini, sanguinea, sansrival, Shaklewell Rivel (Gellan's), sovereign, speciosa, sphaerocephala, Staar of Buckland (Truclove's), stellaris (Sweet), sulphurea grandiflora, sulphurea speciosa, sunflower, superba (Bot. mag.), superb crimson, Surprize, tendre Agathe, Victory, Virgin Queen, Vitruvius (Davie's), Waratah, Whit Dutch, William (Forster's) etc. etc.

B. Neuere[1]):

Achilles (Schmidt's), Admiral Stopfordt (Trenfield's), Advancer (Squibb's), Africa (Drummond's), Aglaja Girardoni, à la mode (Whale's), Alba purpurea grandiflora, Albert (Dietrich's), Alexander v. Humboldt, Alexander Schulz (Deegen's), Alice Hawthorn (Harrison's), Aline (Hoffmann's), Aloys Götz (Lesor's), Alphonse (du Mortier), Altkönig (Rinz's), Ammy Robsart (Gill.), Andrew Marvel (Woodmansey's), Aniane (Sieckmann's), Antagonist (Bragg's), Argo (Widnall's), Argus (Montjoy's), Array (Walter's), Asmodeus (Davie's), Atar Gull (Pachott's), August Ehrig (Deegen's), August Raabe (Deegen's), Aurantia (Sparry's), Bachus (Deschold's), Bangup (Girling's), Baron v. Toll (Deegen's), Baudin (Salter's), Beauty of Birmingham (Harrison's), Beauty of Chelmsford (Wick's), Beauty of Sussex (Mitchell's), Beauty (Parson's), Beauty of Wackefield (Barrat's), Beeswing (Drummond's), Belsice Rival

1) Vergl. C. F. Schreiber Eilftes Verzeichniss einer Auswahl der neuern und neuesten deutschen, englischen, französischen u. belgischen Georginen oder Dahlien etc. Dresden 1846.

Digitized by Google

Dahlia

(Pipe's), Bermondsey Bree (Proctor's), Bertha v. Jena (Koch's), Bianca (Wildman's), Bischof Adhemar von Boy (Reichert's), Bizarre (Allen's), Blanche Shelly (Mitchell's), Bloomsbury (Lee's), Bouquet noir, British Queen (Back's), Brittish Yeoman, Bunte von Gotha (Weichselfelder's), Butterfly (Girling's), Candidate (Silverlock's), Capitain Schmitt (Denant's), Carl der Grofse (Mardner's), Cendrillon (Dubras's), Champion of Essex (Turvill's), Charbonneaux Denizet (Baldet's), Chateaubriand (Lenson's), Charlotte (Mootz), Cheltenham Queen (Hodge's), Chrysocoma (Rinz's), Comte de Cussy (Delafontaine's), Comte de Mannsfeld (Bake's), Confidence (Cook's), Conqueror of the World (Stein's), Coronation (Harrison's), Coronation (Smith's), Countess of Cornwallis (Smith's), Delight (Brown's), De Rum (Boutin's), Desirable (Brown's), Deutsche Jungfrau (Sieckmann's), Diaconus Martini (Sieckmann's), Diadem (Sieckmann's), Diademe (Tassart's), Diamant (Deegen's), Diane de Beaucourt (Salter's), die Schneerose vom Elsterthal (Deegen's), Doctor Dijon (Wachy's), Doctor Meyer (Deegen's), Doctor Schmaltz (Deegen's), Doctor Struve (Deegen's), Dowager Lady Cooper (Jackson's), Duke of York (Keyne's), Dumont de Courset (Wachy's), Dumont de Courset (Whale's), Dupetit Thouars (Millet's), Electra (Salter's), Elisabeth Meyer (Knes's), Emilie (Bretschneider's), Emilie (Peter's), Emilie (Schmidt's), Emperor of Chadwick's, Englands Rival (Sieckmann's), Erbgraf Gustav (Stork's), Erfurter Glocke (Salter's), Erzherzog Ludwig (Mühlbeck's), Erzherzog Palatinus (Deegen's), Erzherzog Stephan (Deegen's), Essex scarlet (Wick's), Essex triumphant (Turvill's), Évêque de Bayeux (Oudin's), Eximia (Girling's), Fancy (Tebay's), Fanny (Keyne's), Fanny Wangh (Forster's), Favorite (Dood's), Favorite (Girling's), Ferdinand I. (Deegen's), Firebrand (Smith's), Fire King (Ansell's), Flambeau (Bailly's), Flora (Stauden's), Francis (Johne's), Fräulein Mutzel (H. Schmitt's), Freiherr v. Biedenfeld (Deegen's), Freiherr v. Pasqualati (Deegen's), Freund Pfister (Mardner's), Friedrich Dietrich (Deegen's), Friedrich Wilhelm IV. (Hanisch), Fritz Knapp (Pohle's), Fürst Poniatowsky, Fürst Wolkonsky (Sieckmann's), Fürstin Trautmannsdorf (Girardoni), Garland (Girling's), Gellert (Rinz's), General Benard, General Bedeau (Millez's), General v. Hedemann (Schmit's), General v. Stockhausen (Bernkopf's), German Defiance (Booth's), Gountied (Smith's), Gräfin Orloff (Sieckmann's), Gräfin v. Stollberg (Deegen's), Grand Duke (Daviés), Grand Maréchal (Bouzin's), Grand Perpetual (Brown's), Gustav (Richter's), Hanseatenstern (Deegen's), Haverland Hero (Harrison's), Hauptmann Schmitt (Sieckmann's), Helene Schmitt (Deegen's), Hero of Maida (Syred's), Hero of Stonehenge (Whale's), Homer (Millet's), Honorable Miss Abbot (Smith's), Ida (Dubra's), Jeanne de Flandres (Descholdt's), Illuminator (Keyne's), Indian Queen, Indispensable (Girling's), Indispensable (Tassart's), Johannes Bosse, oder Sonne vom Elsterthale (Sieckmann's), Johannes Ronge (Sieckmann's), Johannes Ronge (Werker's), Joseph Weyringer (Deegen's), Isi-

Digitized by Google

Dahlia

dora (Schmidt's), J. Sieckmann (Girardoni), Jupiter (Sieckmann's), Kaufmann Maurer (Deegen's), King of the Goths (Union's), King of Lilac's (Girling's), Königin Elisabeth von Preussen (Pohle), Lady Antrobus (Sparry's), Lady Catharine Jermyn (Girling's), Lady Charlotte (Tomphson's), Lady Grey (Harrison's), Lady Leycester (Girling's), Lady Seymour (Willmer's), Lady St. Mour (Brown's), La Lione (Lucoz), Lamoriçiere (Belleperche), Landrentmeister Bliessener (v. Helldorf), Laura (Sieckmann's), Leila (Wildmann's), Leontina (Dubras's), Leuchtkugel (v. Tettenborn's), Lieutenant Hermann (Deegen's), Lochill (Robertson's), Locomotive (Schmidt's), Lord Grey (Every's), Ludwig Marquardt (Sieckmann's), Ludwig Pemsl (Deegen's), Ludwig Ranniger (Deegen's), Lyna Rival (Church's), Madame Chauvière (Girling's), Madame Dresser (Deegen's), Madame Forster (Deegen's), Madame Humann (Mardner's), Madame Pemsl (Deegen's), Madame v. Marsch (Mackoy's), Madame Dumortier Bavais (Girling's), Mademoiselle Louise Messière, Mädchen vom Elsterthal (Sieckmann's), Majestic (Widnall's), Major Lettjau, Marchioness of Aylesbury (Whale's), Marchioness of Exeter, Marchioness of Ormond (Brown's), Maria (Schmidt's), Marie Theresia (Haugk's), Mark Antony (Dood's), Melchior (Sieckmann's), Miranda (Brown's), Miss Chester (Stein's), Miss Funnel (Girling's), Miss Lecharlier (Dufresne's), Miss Wattson (Girling's), Model (Bourne's), Modesta (Girling's), Modesta (Sieckmann's), Mons. Piccy (Tassart's), Moritz Weltz (Sieckmann's), Mstr. Richardson (Edward's), Mstr. Shelly (Mitchell's), Napoleon (Peter's), Natalie (Bretschneider's), Nicolaus Becker (Rinz's), Nihil (Bailly's), Noir et blanc (Deschiolt's), Nonpareil (Proctor's), Novelty (Whale's), Orange Climax, Orange Perfection (Henbrey's), Orange superb (Dood's), Oriental pearl (Attwell's), Painted Lady (Girling's), Pappenheim (H. Schmitt's), Pauline (Sieckmann's), Perle (Grüneberg's), Peter I. (Haugk's), Pfarrer Kotzschy (Deegen's). Polarstern (Deegen's), Pound Hill Rival (Willmer's), Präsident von Lichtenberg (Rinz's), Präsident Pittschaft (Mardner's), Premier de Voisenau (Guènauv's), Preussens Kokarde (Deegen's), Princesse de Jointille (Fourquet's), Princesse de Liège (Mackoy's), Prinz Albert (Adam's), Prinz Albert (Whiteacker's), Prinz Carl von Preussen (Sieckmann's), Prinz of Wales (Dood's), Prinzess Alexandra (Bretschneider's), Prinzess Alicie (Gain's), Prinzess royal (Cook's), Prinzess royal (Hudson's), Prinzess royal (Thompson's), Prinzess Sophie, Pulla (Dubras's), Purpurea alba (Young's), Queen of the Isles (Low's), Queen of Perpetuals (Girling's), Queen of Sommer (Union's), Queen of Trumps (Brown's), Rainbow (Smith's), Raphael (Brown's), Rembrandt (Brown's), Remy (Mardner's), Revenge (Cook's), Rival Whithe (Whiteacker's), Rival Yellow (Smith's), Rouilland (Soutif's), Rudolph, Edler von Aethaber (Deegen's), Rubens (van Gaert's), Ruthenia (Sieckmann's), Satyrist (Headley's), Schöne Erfurterin (Schmidt's), Sir Frederic Johnstone (Hillier's), Sir John Stew

Digitized by Google

Dahlia
Richardson (Union's), Sophie, Erbgrossherzogin von Sachsen-Weimar (Gebser's), Souvenir de Gand (van Houtte's), Spitfire (Fischer's), Standart of Perfection (Keyne's), Standart of Perfection (Union's), Stern von Himmelsthür (Diederich's), Sultana (Appleby's), Sure enough (Harrison's), Surprize (Oakley's), Talma, Tancred (Wildman's), Teutonia (Firl's), The bride (Tancred's), Th. Sieckmann (Sieckmann's), Thiers (Fauvel's), Thorwaldson (Motz), Tournament (Cattleugh's), Tricolor (Meiert's), Triomph de belle perche (Bouzin's), Triomph de Liège (De Fresnes), Triomph de Tours (Messire's), Triumph von Köstritz (Sieckmann's), Twyfordt Perfection (Young's), Uranus (Pohle), Vanguard (Girling's), Venus (Atwell's), Venus (Brown's), Vivid (Thompson's), Weisse Dame (von Weissenborn's), White Defiance (Langellier's), Wilhelm II. (Mardner's), Wilhelmine von Weissenborn, Will Watsch (Girling's), Winterton Rival (Low's), Wratislavia (Hanisch), Yellow Climax (Wildmann's), Zamba (von Tettenborn's), Zeitgeist (Rinz), Zigeunerin (Krauskopf), Zoroaster (Schmitt's), Zrini (Stork's) etc. etc.
Dahlia crinita Thbg., v. Trichocladus crinitus, p. 816.

Dais L., Dais.
urticaefolia Hort., nesselblätterige, ♄. t. ?
Dalbergaria sanguinea Tuss. Juss., v. Tussacia sanguinea.

Dalbergia L. fil., Dalbergie.
frondosa Roxb. (= *arborea* Heyn.).
latisiliqua Dsf., breitschotige, ♄. w. Südamerika.
pendula Tenore, herabhängende, ♄. w. Ostindien.
Barclayi Hook., v. Tephrosia mimosoides.

Dalea L., Dalea.
alopecuroides W. (= *alba* Mchx. = *Cliffortiana* W. = *Linnaei* Mchx. = *Petalostemon alopecuroideum* Pursh = *Psoralea alopecuroides* Poir. = *P. annua* Mill. = *P. Dalea* L.).
citriodora W. (= *lateripes* Moç. Sess. = *Psoralea citriodora* Cav. = *P. foliolosa* Ait.).
laxiflora Pursh (= *enneandra* Fras. = *Kühnistera laxiflora* Ait. = *Petalostemon laxiflorum* Steud. = *Psoralea laxiflora* Poir.).
versicolor Zuccar., buntfarbige, ♄. t. w. Mexico.
Dalrymplea domingensis Spgl. et *pomifera* Roxb., v. Turpinia paniculata et pomifera.

Damasonium indicum W. (= *alismoides* RBr. = *Hymenotheca laxifolia* Salisb. = *Ottelia alismoides* P. = *Stratiotes alismoides* L.), — *australe* Salisb., v. Actinocarpus minor, p. 17, *maximum* Burm., v. Limnocharis Plumieri, p. 464.
Damironia cernua Cass., v. Helipterum variegatum, p. 888.

Dammara Rumpf, Dammaratanne.
pinnata Hort., Mack. (= ? *Taxodium* p. Hort. Hügel.), gefiederte, ♄. w. Ostindien.
Danaa aquilegifolia All., v. Physospermum aquilegifolium. — *Danthia palustris* Pet., Th., v. Isnardia palustris, p. 425.

Danthonia DC., Danthonie.
tiroides N. E., schmielenähnliche, ☉. f. ? Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Daphne L., Seidelbast.

Aucklandiae Hort., Auckland's, ♄. k. t. ? China.
Blagayana Freyer, vergl. p. 251.
collina b) fol. luteo-marginatis, c) latifolia.
Laureola L., b) fol. variegatis.
multiflora Thore (= *Laureola* L. var. Rchb.), vielblumiger, ♄. f. Pyrenäen.
odora Thbg. (= *japonica* Thbg. = *indica* Hort. = *sinensis* Lam.), d) hybrida fol. variegatis.
Noch kommen in den Pflanzenverzeichnissen vor: lutetiana, marginata.

Daphnidium N. E. (= *Laurus* Auct.), Daphnidie, IX. 1., Laurineae.

gracile N. E. (= *Laurus Culilawan* H. Berol. = *L. glauca* Hort. Herbipolit. = *L. gracilis* H. Dresd.), schlanke, ♄. w. ?
Myrrha N. E. (= *Laurus Myrrha* Lour. = *Litsaea Myrrha* Mirb. = *Litsaea trinervis* Juss. P. = *Tetranthera trinervis* Spgl. exparte), Myrrha-D., ♄. w. Cochinchina.
Daphnitis capensis Spgl., v. Laurophyllus capensis.

Dasylirion Zuccar., Rauchlilie, VI. 1., Bromeliaceae [1]).

acrotriche Zuccar., spitzhaarige, 4. w. Mexico.
filifolium Hort., fadenblätterige, 4. w. Mexico.
longifolium Zuccar., Endl. (= *Roulinia longifol.* Brogn. = *Yucca longifol.* Karw.), langblätterige, 4. w. Mexico.
serratifolium Zuccar., sägezähnige, 4. w. Mexico.

Dasystemon DC., Rauchfaden, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

calycinum DC. (= *Crassula calycina* Dsf. H. Par.), kelchiger, ⊙. m. f. Neuholland.

Datura L., Stechapfel.

I. Brugmansia P., p. 134.

arborea L. (= *B. candida* P.).
bicolor D. Don (= *sanguinea* R. et P. = *B. bicolor* P. = *B. sanguinea* Auct.), *α*) lutea Hort., *β*) sanguinea Hort., *γ*) Lowii*.
suaveolens H. B. K. (= *arborea* Hort. = *B. suaveolens* W.).
Waymanni Steud. (= *Waymanni* Paxt. t.).
Gartenhybriden: Arbuscula, Knigthii.
floribunda Paxt. (= *parviflora* Hort.), v. Juanulloa peregrina, p. 829.

II. Stramonium Bernh.

alba Wall., N. E. (= *Metel* Roxb., Wall., non L.), weifser, ⊙. m. f. Ostindien.
Bojeri Delil., Bojer's, ⊙. m. f. ? Mascarenas, Madagasc.
discolor Bernh., verschiedenfarbiger, ⊙. m. f. Ostindien.
fastuosa Mill. (= *Hummata β* Bernh.).
fruticosa Hornem., Sw., strauchiger, ♂. ♄. m. f. w. Südam.
Hummata Bernh. (= *dubia* Rich. P.), Hummata-St. ⊙. m. f. w. Malabar. b) flore pleno. *β*) parviflora N. E.
humilis Dsf., niedriger, ⊙. m. f. ?
muricata Bernh., Lk. (= *fastuosa* plur. hort. = *Hummata δ* Bernh. = *hybrida* Tenore = *laevis* Schk.), weichstachelicher, ⊙. m. f. Ostindien.
Stramonium L. (= *capensis* Hort. = *loricata* Sbr. = *Pseudostramonium* Sieb.).
Trapezia Wall., N. E., Trapezia-St., ⊙. m. f. Ostindien.

1) Nach Endlicher gener plantar. Suppl. ist die Gattung Roulinia Brogn. nicht davon verschieden. Auch Cordyline parviflora H. B. K. p. 160 gehört nach Endlicher zu dieser Gattung.

Digitized by Google

Daubentonia DC., Daubentonie.

coccinea Hort. belg., scharlachfarbige, ♄. w. Südamerika.

Tripetii Poit.[1]) (= *Tripetiana* Hort.), Tripet's, ♄. w. t. Südamerika.

Daubenya Lindl., Daubenye.

aurea Lindl. (= *Massonia lutea* Hortul.).

fulva Lindl., rothbraune, 4. Zw. t. Süd- u. Ostafrika.

Daucus T. L., Möhre.

abyssinicus C. A. Mey. (= *Carota* var. abyssinic. A. Braun), abyssinische, ⊙. ♂. f. Abyssinien.

australis Poepp. (= *Carota* Gill. et Hook.), südliche, ⊙. f. Chili.

bessarabicus DC. (= *Cachrys littoralis* Spgl. = *Caucalis littoralis* MB. = *Platyspermum littorale* K., p. 634), bessarabische, ♂. Bessarabien, Caucasus.

bicolor Sibth., Sm. (= *Carota* L. var. Spgl.), zweifarbige, ⊙. f. Griechenland.

Bocconi Guss., Boccone's, ♂. f. Calabrien.

coadunatus Tenore (= *polygamus β maximus* Auct.), verbundene, ⊙. ♂. Neapel.

Gingidium L. (= *mauritanicus* Salzm. = *maximus* Dsf.).

glaberrimus Dsf., kahlste, ⊙. f. Nordafrika.

glochidiatus Fisch. et Mey. (= *Caucalis glochidiata* Poir. = *Scandix glochidiata* LaBill.), widerhackige, ⊙. f. Neuholland.

grandiflorus Dsf., grofsblumige, ⊙. f. Nordafrika.

hispanicus DC., Gouan (= *Carota* var. γ Sm. = *gummifer* Lam. = *maritimus* Wither.), spanische, ♂. f. England, Süd- und Westeuropa.

involucratus Sibth., Sm. (= *creticus* Mill.), vielhüllige, ⊙. f. Cypern, Creta.

laserpitioides DC. (= *Caucalis virgata* Poir. = *Laserpitium daucoides* Dsf.), laserkrautähnliche, ♂. 4. k. Mauritanien.

mauritanicus All. (? L.) (= *Carota* L. var. Spgl. = *carnosus* Mch. = ? *maximus* Dsf. = ? *prolifer* Auct. et Hort. = *Caucalis hispanica* Crtz.).

muricatus L. (= *alatus* Poir. = *Artedia muricata* L. = *Platyspermum muricatum* Hoffm., p. 634).

prolifer Presl (= ? *siculus* Tineo), sprossende, ⊙. f. Sicilien.

pubescens K. (= ? *littoralis* Sib. Sm. = *Caucalis glabra* Forsk.), feinhaarige, ⊙. f. Aegypten.

pulcherrimus K. (= *Caucalis orientalis* MB. = *C. pulcherrima* W. = *Platyspermum pulcherrimum* K. p. 634).

setifolius Dsf. (= ? *verticillatus* Hornem.), borstenblätterige, ♂. 4. f. b. k. Nordafrika.

setulosus Guss., borstige, ⊙. f. Unteritalien.

Unbestimmtere: cuminoides Lam., pectinatus DC., rigidus H. Par., serratus Hort.

Davallia Sm., Davallie.

arborescens W. (= *concinna* Presl), baumartige, 4. ♄. w. Hispaniola.

Schlechtendalii Presl, Lk. (= *divaricata* Chamiss. et Schltdl.), Schlechtendal's, 4. w. Mexico.

solida Sw. (= *Trichomanes solidum* Forst.), dichte, 4. w. Inseln des stillen Meeres.

---

1) J. J. Tripet, berühmter Tulpenkultivateur.

Digitized by Google

Daviesia Sm., Daviesia.
alternifolia Endl., wechselblätterige, ♄. t. Neuholland.
angulata Benth., kantige, ♄. t. Neuh. (Schwanenfluß).
brevifolia Lindl., kurzblätterige, ♄. t. Neuholland.
colletioides Cunningh., colletiaähnliche, ♄. t. Neuholl.
coluteoides A. Cunn., blasenstrauchähnliche, ♄. t. Neuh.
divaricata Benth., ausgesperrte, ♄. t. Neuholland.
falcata H. Belg., sichelförmige, ♄. t. Neuholland.
flexuosa Benth., hin- und hergebogene, ♄. t. Neuholl.
Frazeri H. angl. et belg., Frazer's, ♄. t. Neuholland.
genistaefolia Benth., ginsterblätterige, ♄. t. Neuholl.
intermedia H. Belg., mittlere, ♄. t. Neuholland.
longifolia Benth., langblätterige, ♄. t. Neuholland.
macrophylla Endl., großblätterige, ♄. t. Neuholland.
mimosoides RBr. (= *corymbosa* Andr., non Sm.).
oppositifolia Endl., gegenblätterige, ♄. t. Neuholland.
paniculata Benth., rispige, ♄. t. Neuholland.
pedunculata Benth., gestielte, ♄. t. Neuholland.
pectinata Lindl., kammförmige, ♄. t. Neuholland.
physodes A. Cunningh. (= *cornuta* Hort. belg.).
polyphylla Benth., vielblätterige, ♄. t. Neuholland.
pubigera Cunn., feinhaarige, ♄. t. Neuholland.
pungens Hort. belg., stechende, ♄. t. Neuholland.
quadrilatera Benth., vierseitige, ♄. t. Neuholland.
ramulosa Benth., ästige, ♄. t. Neuholland.
ruscifolia Cunn., mäusedornblätterige, ♄. t. Neuholl.
saligna H. Anglor., weidenblätterige, ♄. t. Neuholland.
ternata Endl., dreizählige, ♄. t. Neuholland.
umbellulata Sm. (= *umbellata* LaBill.).
villifera Cunn., zottige, ♄. t. Neuholland.

denudata Vent. (= *juncea* P.), v. Viminaria denudata, p. 840, *ericoides* P., v. Aotus villosa, p. 40, 11.
Debraea floribunda R. et S. et *violacea* Mart. et Zucc., v. Erisma floribundum, p. 310 et violaceum.

Decaneurum DC., Zehnnerver.
amygdalinum DC. (= *Vernonia amygdalina* Delil.), mandelblätteriger, ♄. w. Nubien.
senegalense DC. (= *Baccharis senegalensis* P. = *Chrysocoma amara* Schum. = *Conyza rutilans* Poir. = *Eupatorium coloratum* W. = *Gymnanthemum capulare* Cass. = *Vernonia senegalensis* Less., non Def.).

Decaspora RBr., Zehnsaamler, V. i., Epacrideae.
Cunninghami DC. (= *thymifolia* Cunn., non RBr.), Cunningham's, ♄. t. Neuholland.
disticha RBr. (= *Cyathodes disticha* LaBill. = *Trochocarpa disticha* Spgl.), zweizeiliger, ♄. t. Neuholland.
thymifolia RBr. (= *oxycoccoides* Cunningh. = *Trochocarpa thymifolia* Spgl.), thymianblätteriger, ♄. t. Van Diemens Land.

Deckera canescens C. A. Mey., v. Picris laevis.

Decodon aquaticus Gmel. (= *verticillatus* Ell. = *Astragnea aquatica* Gm. = *Lythrum verticillatum* L. = *Nesaea verticillata* H. B. K.), vergl. v. 254.

Decumaria barbara L. (= *Forsythia* Mchx. = *radicans* Mch. = *scandens* P.).

* *Deilesma matronalis* Andrzy (= *sibirica* Andrzy), *suaveolens* Andrzy, *tristis* Spach, v. Hesperis matronalis, runcinata, tristis, p. 393.
Deloderium taraxacifolium Cass., v. Millina hyoseroides, p. 524.

Digitized by Google

Delphinium T., Rittersporn.

axilliflorum DC., achselblumiger, ⊙. f. Syrien.

azureum Mchx. (= *carolinianum* Walt.), β) ochroleucum Nutt., γ) puberulum, δ) velutinum, ε) minute puberulum.

Bovei Decaisn., Boves, ⊙. f. Syrien.

camptocarpum Fisch. et Mey., bogenfrüchtiger, ⊙. f. Nord-Turcomanien.

Carumnae Lapeyr. (= *Garumnae* Auct. = *verdunense* Balb.), Carumna's, ⊙. f. Südfrankreich.

cheilanthum Fisch. (= *dahuricum* Stev. Bess.).

elatum L., ζ) speciosum MB. (= *crassifolium* Schrad.), amoenum Bernh., angustum Hort. gratum Hffg., fol. albo marginatis Hort. neglectum Colla, sulcatum Hffg, sind ebenfalls hierher gehörige mehr oder wenig beständige Gartenvarietäten.

exaltatum Ait. (= *americanum* Hort. = *anomalum* Spgl.).

flavum DC., hellgelber, ⊙. f. Orient.

Forskohlei Rchb. (= *grandiflorum* Forsk.), Forskohl's, ⊙. f. Dardanellen.

glabellum Turcz. (= *palmatifidum* β *glabellum* DC.), glatter, 4. f. Baikal.

gracile DC. (= *junceum* L. var. Spgl.), schlanker, ⊙. f. Spanien.

grandiflorum, Gartenvariet.: anomalum fl. pleno, azureum et fl. pleno, flore rubro et pleno, monstrosum, pallidum fl. pleno, pallidum tricolor, purpureo-coeruleum etc.

hybridum Steph. W., α) orientale Fisch., Mey. et Lallem. (= *hybridum* Rchb.), a) albiflorum DC., b) ochroleucum Stev., c) puniceum Pall., β) fissum W. K., γ) velutinum Bertol., δ) dasyanthum Lallem. (= *velutinum* γ *orientale* DC.) [1]).

lepidum Fisch. et Lallem., schilferiger, 4. f. Caucasus.

macropetalum DC., grofskroniger, ⊙. f. Nordafrika.

Menziesii DC. (= *simplex* Hook.).

mesoleucum Lk.

nanum DC. (= *peregrinum* Delille), zwergiger, ⊙. f. Aegypten.

ornatum C. Bouché (= *commutatum* Bouché = *Consolida* fl. pleno Hort. = *anglicum* Hort. = *humile* Hort.), zierlicher, ⊙. f. England. b) fl. pleno.

parviflorum Turcz., kleinblumiger, 4. f. Baikal.

pubescens DC. (= *Ajacis* L. var. Trevir. = *ambiguum* Loisel. = *Consolida* Gouan), b) flore pleno.

triste Fisch. (= *obscurum* Steven = *puniceum* L. var. Spgl.).

vestitum Wall., bekleideter, ♂. k. Ostindien.

Demazeria sicula Dumort., v. Brizopyrum siculum, p. 131.

Demetria glutinosa Lagasc. et *inuloides* Lagasc., v. Grindelia glutinosa et inuloides, p. 869.

Dendrium buxifolium Desv., v. Leiophyllum thymifolium, p. 452.

---

1) Vergl. Index nonus seminum quae hortus botanicus imperialis Petropolitanus pro mutua commutatione offert. Auct. Fischer, C. A. Mey. et Avé Lallemant.

Digitized by Google

Dendrobium Sw. Baumstendel.

aduncum Hort. Mak., hackiggekrümmter, 4. w. ? Ostind.
aqueum Lindl., wässeriger, 4. w. Ostindien.
aureum Lindl. (= *pallidum* Bot. reg.), goldfarbiger, 4. w. Ceylon.
calamiforme Lodd., federkielartiger, 4. w. Ostindien.
catenatum Lindl. (= *Epidendrum monile* Thbg.), kettenförmiger, 4. w. Japan.
compressum Lindl., platter, 4. w. Ceylon.
crispatum Sw. (= *denudans* Hort. belg. = *Epidendrum crispatum* Forst.), krauser, 4. w. Societätsinseln.
cucullatum RBr. (= *Pierardi* Roxb.), *α*) latifolium, *β*) lutescens.
cucumerinum Lindl., gurkenähnlicher, 4. w. Neuholl.
Cunninghami Steud. (= *pygmaeum* Cunnigh., non Sm.), Cunningham's, 4. w. Neuholland.
cuspidatum Lindl., langspitziger, 4. w. Ostindien.
Devonianum Hort. Mak., Devon's, 4. w. Ostindien.
fimbriatum Wall., Hook., *β*) oculatum Hook. Nepal.
flavescens Lindl. (= *Onychium flavescens* Blum.), gelblicher, 4. w. Java.
flavum Hort. belg., hellgelber, 4. w. ? Ostindien.
grandiflorum Lindl. (= *Desmotrichum grandiflorum* Blum.), grofsblumiger, 4. w. Java.
Griffithii Lindl., Griffith's, 4. w. Ostindien.
heterocarpum Wall., Lindl. (= *Cambridgeanum* Paxt.), verschiedenfrüchtiger, 4. w. Nepal.
japonicum Lindl. (= *Onychium japonicum* Blume), japanischer, 4. w. Japan.
Jenkinsii Lindl., Jenkin's, 4. w. Ostindien.
Kingianum van Houtte, King's, 4. w. ? Ostindien.
Lindleyi Steud. (= *aggregatum* Lindl. (non H. B.) = *Epidendrum aggregatum* Roxb.), Lindley's, 4. w. Ostindien.
Macraei Lindl., Macraei's, 4. w. Ceylon.
macranthum Rich., grofsblumiger, 4. w. Insel Vanikoro, Manilla.
macrophyllum Rich., grofsblätteriger, 4. w. Neuguinea.
Maelenii Hort. belg., Maelen's, 4. w. ? Ostindien.
multicaule Hort., vielstengeliger, 4. w. ? Ostindien.
mutabile Lindl. (= *Onychium mutabile* Blume), veränderlicher, 4. w. Java.
nutans Lindl. (non Presl), nickender, 4. w. China.
paniculatum Sw., rispiger, 4. w. Sierra Leone.
Paxtonii Lindl., Paxton's, 4. w. Ostindien.
pulchellum Roxb. (= *buxifolium* Hort.).
pygmaeum Lindl., Wall. (= ? *pusillum* Don), zwergiger, 4. w. Ostindien.
recurvum Hort., zurückgekrümmter, 4. w. ? Ostindien.
rhombeum Lindl., rautenförmiger, 4. w. Manilla.
Ruckeri Lindl., Rucker's, 4. w. Philippinen.
sanguinolentum Lindl., blutfarbiger, 4. w. Ceylon.
secundum Wall., Lindl. (= *Pedilonum secundum* Blum.), Ostindien, Java.
taurinum Lindl., stierähnlicher, 4. w. Manilla.
Wallichianum Lindl., Wallich's, 4. w. Ostindien.
undulatum RB. (= *discolor* Lindl.).

album Hook., *Barringtonia* Sm., *ciliatum* Sw., *Harrisoniae* Hook., *Houttei* Hort. belg., *plicatum* Dietr. (= *paniculatum* P.), *palmifolium* Sw., *pro-*

Digitized by Google

liferum Sw., *squalens* Lindl., v. Maxillaria alba, Barringtoniae, ciliata Harrisoniae, Houttei, palmifolia, paniculata, prolifera et squalens (zum Theil p. 500), — *cultriforme* Pet. Th., *polystachyum* Pet. Th., v. Polystachya cultriformis et zeylanica, — *graminifolium* W., v. Octomeria graminifolia, p. 553, — *galeatum* Sw., *leopardinum* Wall., *pumilum* Sw., v. Bulbophyllum galeatum, leopardinum et pumilum p. 137 et p. 81, II., *ruscifolium* Sw., v. Pleurothallis ruscifolia, p. 635, — *veratrifolium* Roxb., v. Phajus veratrifolius.

Denhamia scandens Schott, v. Culcasia scandens, p. 175, II.

Dentaria T., Zahnwurz.

bipinnata C. A. Mey., doppeltgefiederte, 4. Kn. f. Caucasus.

canescens Tenore, graulichе, 4. Kn. f. Neapel.

leucantha Tausch, weifsblumige, 4. Kn. f. ?

microphylla W., kleinblätterige, 4. Kn. f. Caucasus.

quinquefolia MB. (= *caucasica* W.).

tenuifolia Ledeb. (= *trifida* Lam. = *Cardamine tuberosa* Patrin), dünnblätterige, 4. Kn. f. Sibirien.

dasyloba Turcz., v. Cardamine dasyloba, p. 118, II.

Descurainia Irio Webb Berthel., *pinnatifida* Webb Berthel., v. Sisymbrium Irio et pinnatifidum, p. 762.

Desmanthus W., Schopfblume, Büschelschopf.

divergens W. (= *leptostachys* DC. = *nutans* DC. = *trichostachys* DC. = *Dichrostachys nutans* Benth. = *Caillea dichrostachys* Guill. et Perr.). Senegambien, Aethiopien, Port Natal.

natans W. (= *Mimosa natans* Roxb. = *M. prostrata* Lam. = *Neptunia oleracea* Lour.), — *lacustris* W. (= *Acacia lacustris* Dsf. = *Mimosa aquatica* P. = *M. lacustris* H. B. K.), — *stolonifer* DC. (= *Neptunia stolonifera* Guillem. et Perr. gehören nach Benth. und Walpers auch zu natans), Ostind. Cochinchina, Mittägl. Amerika, Senegal. Vergl. p. 257.

plenus W. (= *Mimosa plena* L. = *Neptunia plena* Benth.).

strictus Bertol. Antillen.

virgatus W. (= *leptophyllus* H. B. K. = *Acacia virgata* G. = *A. angustisiliqua* Dsf. = *Mimosa angustisiliqua* Lam. = *M. virgata* L.), Ostindien, Cumana.

Desmochaeta Bandhaar.

sanguinolenta Lk., blutfarbiges, ♄. w. Ostindien.

densiflora H. B. K. (= *uncinata* R. et S.), v. Pupalia densiflora, — *alternifolia* DC. et *muricata* DC., v. Cladostachys alternifolia et frutescens, p. 202.

Desmodium Desv., DC., Bandesparsette.

altissimum Sweet, höchste, ♄. w. Ostindien.

ancistrocarpum DC. (= *Hedysarum ancistrocarpum* Ledeb. = *H. uncinatum* Jacq.), stachelfrüchtige, ♄. w. Brasilien.

canescens DC. (= *Hedysarum scaberrimum* Bll.).

caudatum DC. (= *Hedysarum caudatum* Thbg.), geschwänzte, 4. k. Japan.

congestum Wall. (= *Hedysarum congestum* Rottl. = *H. umbellatum* Roxb., non L.), gedrängte, ♄. w. Ostindien.

gangeticum DC. (= *collinum* Loud. = *maculatum* DC. = *Aeschynomene gangetica* et *maculata* Poir. =

Digitized by Google

Desmodium

Hedysarum Asperula Hamilt. = *H. collinum* Roxb. = *H. gangeticum* et *maculatum* L. = *H. ochroleucum* Mch. = *H. styracifolium* Roxb.).

glabrum DC. (= *Hedysarum glabrum* Mill.), kahle, ⊙. w. m. f. ?

heptaphyllum Sweet, siebenblätterige, ♄. w. Ostindien.

incanum DC. (= *Aeschynomene incana* Meyer = *Hedysarum canescens* Mill. = *H. incanum* Sw.).

laburnifolium DC. (= *Hedysarum laburnifolium* Poir.), bohnenbaumblätterige, ♄. w. Java.

leiocarpum G. Don, glattfrüchtige, ♄. w. Montevideo.

mauritianum DC. (= *Aeschynomene arborea* Sbr. = *Hedysarum mauritanicum* W.), mascarenische, ♄. w. Mauritius.

mexicanum Sweet (= *Hedysarum adscendens β coeruleum* Liudl.), mexicanische, ♄. t. k. Mexico.

multiflorum DC. (= *floribundum* Don = *Hedysarum floribundum* Don).

polycarpum DC. (= *angulatum* DC. = *capitatum* DC. = *Hippocrepis* DC. = *heterocarpum* DC. = *serpens* Wall. = *siliquosum* DC. = *tenue* Grah. = *Hedysarum capitatum* Burm. = *H. conicum* P. = *H. heterocarpum* L. = *H. polycarpum* Poir. = *H. retusum* Don = *H. siliquosum* Burm. = *H. Wallichianum* Spgl. = *H. purpureum* Roxb. = *Hippocrepis barbata* Lour.), vielfrüchtige, 4. ♄. w. Ostindien, China.

repens DC. (= *Hedysarum repens* L.), kriechende, 4. f. Nordamerika.

rhomboideum Sweet (= *Hedysarum rhombifolium* Ell., non Roxb.), rautenförmige, ♄. w. Ostindien.

sagittatum DC. (= *Hallia sagittata* Desv. = *Hedysarum sagittatum* Poir.).

serotinum DC. (= *Hedysarum serotinum* W.), späte, 4. k. Mexico.

Thunbergii DC. (= *Hedysarum heterocarpum* Thbg.), Thunberg's, 4. k. Japan.

uncinatum DC. (= *Hedysarum uncinatum* Jacq.), hakenförmige, ♄. w. Caracas.

velutinum DC. (= *Hedysarum velutinum* W.), sammethaarige, ♄. w. Mittägl. Amerika.

hamosum Loud., v. Uraria hamosa.

Desmoncus Mart., Bandpalme.

americanus Lodd. (= *Calamus americanus* Hort. angl.).

macroacanthus Mart., grofsstachelige, ♄. w. Brasilien.

polyphyllus Poit., vielblätterige, ♄. w. Guiana.

mitis Mart., oxyacanthus Mart., pycnacanthus Mart., setosus Mart., ♄. sämmtl. Brasilianer, und prunifer Poepp., ♄. Peru, werden bis jetzt noch nicht kultivirt.

Desvauxia Billardieri RBr. (= *Centrolepis fascicularis* LaBill. = *cuspidigera* Rudge), p. 258.

Desvauxia fluitans P. Beauv., v. Glyceria fluitans.

Detridium Bergianum N. E., v. Agathaea Bergiana, p. 13, 11.

Deutzia Thbg., Deutzia.

canescens Sieb., grauliche, ♄ k. f. b. Japan.

crenata Sieb. et Zuccar., kerbblätterige, ♄. k. f. b. Japan.

corymbosa RBr. (= *Philadelphus corymbosus* Wall.), traubendoldige, ♄. k. f. b. Nepal.

gracilis Sieb. et Zuccar., schlanke, ♄. k. f. b. Japan.

Digitized by Google

Deutzia

Aufserdem kommen von dieser interessanten Gattung noch folgende (die mit der Zeit vielleicht auch noch in den Gärten eingeführt werden), vor: Brunoniana RBr. (= *Leptospermum scabrum* Wall.), Ostindien, grandiflora Bunge, Nordchina, parviflora Bunge, Nordchina, staminea RBr. (= *Philadelphus stamineus* Wall. = *Leptospermum stamineum* Wall.), Ostind. Sämmlich ♄. ♄.

Deverra DC., Deverra, V. II., Umbelliferae.

tortuosa DC. (= *Bubon tortuosum* Dsf., non Lk. Hffg. = *Athamantha tortuosa* Spgl. = *Crithmum pyrenaicum* Forsk.), gewundene, ♄. k. Nordafrika.

Deyeuxia acutiflora P. B., *confinis* Kunth, *Langsdorfii* Kunth, *lapponica* Kunth, *montana* Clar. Poir. (= *varia* Kunth), *neglecta* Kunth, *purpurea* Kunth, *sylvatica* Kunth, v. Calamagrostis acutiflora, confinis, Langsdorfii, lapponica, montana, stricta, purpurea et sylvatica, p. 143 et 144, — *aemula* Kunth, *Billardieri* Kunth, *Forsteri* Kunth, *retrofracta* Kunth, v. Lachnagrostis aemula, Billardieri, Forsteri et retrofracta, p. 887, — *megapotamica* Spgl., v. Andropogon laguroides, p. 56.

Dianella Lam., Dianelle.

humilis Lodd., niedrige, 4. Kn. t. ?

scabra Lodd., schärfliche, 4. Kn. t. ?

Dianthera americana Forsk. (= *flava* Vahl), v. Barleria flava, p. 113.

Hinsichtl. der übrigen s. Dicliptera et Justicia.

Dianthus L., Nelke.

actinopetalus Fenzl, strahlenkronige, 4. ♄. k. Taurus.

albens Ait. (= *incurvus* Thbg.).

arenarius L. (= *dubius* Hornem. = *praecox* W. = *uniflorus* Gilib.).

atrorubens All. (non M. B.) (= *Carthusianorum* β Poir. DC. = *diutinus* Rchb. = *glomeratus* Bess.).

attenuatus Sm. (= *fimbriatus* Brotero = *geminiflorus* Loisel. = *inodorus* G. = *longiflorus* Lam. = *lusitanicus* Brotero = *malacitanus* Hens.), verschmälerte, 4. f. Frankreich, Spanien.

barbatus L., c) splendidissimus Hort.

bicolor MB. (= *lanceolatus* Steven, *saxatilis* Pall.).

biflorus Sm. (= *binatus* Bartl.).

caesius Sm. (= *suavis* W. = *virgineus* β L.).

Carthusianorum L., e) nanus Sweet.

Caryophyllus L., β) imbricatus L., γ) coronarius Lam., δ) corsicus Fisch. Aufserdem viele Gartenvarietäten, die vorzüglichsten nach Sweet: Bacchus, coeruleo-purpureus, Clintoniae, Franklini, fruticans (= *fruticosus*) inimitabilis, tricolor, Leopoldi, multiplex, pulchellus, puellulus, purpureo-cinctus, rubro-cinctus, striatulus, Tarrara, triumphans etc. etc.

ciliatus Gussone, gewimperte, ? 4. f. Unteritalien.

clavatus Dsf. (non Spgl.) (= *cornutus* Hort.), keilförmige, 4. f. ?

compactus Kit. (? = *pulchellus* Schrad.), dichtblumige, 4. f. Ungarn.

crinitus Sm., mähnenförmige, 4. f. b. k. Orient.

dentatus Fisch. (= *dentosus* Auct. = ? *inodorus* Pall.).

elatus Ledeb., hohe, 4. f. Altai.

Digitized by Google

Dianthus

elongatus C. A. Mey., verlängerte, 4. f. Caucasus.
filiformis Tenore, fadenförmige, ?♂. f. ? Unteritalien.
floribundus Spach, blüthenreiche, ♂. f. ?
fragrans MB. (= *multifidus* W. herb. = *plumarius* MB.).
graminifolius Presl (= *Arrostii* γ Presl), grasblätterige, 4. f. Süditalien.
hirtus Vill. MB. (= *scaber* Chaix = *virgineus* Habl.), rauhe, 4. f. Südfrankreich, Taurien.
hyssopifolius Hort. Angl., ysopblätterige, 4. Sibirien.
integer Visian., ganze, 4. f. Dalmatien.
juniperinus Sm. (= *aciphyllus* Sbr. = *arboreus* L. var. P.), wachholderähnliche, ħ. k. Griechenland.
longicaulis Tenore (= *nodosus* Tausch).
monspessulanus L., β) alpestris Stbg. Hoppe (non Balb.) (= *Sternbergii* plur. Auct. = *speciosus* Rchb.), γ) marsicus Tenore.
nitidus W. K. (= ? *alpestris* Balb.),
pavonius Tausch (= *alpinus* L. var.?), Pfauen-N., 4. f. ? Schweiz.
plumarius L. (= *blandus* Rchb.), β) hortensis Schrad., γ) portensis Libosch., δ) moschatus Dsf. Mey. Gartenvarietäten: plenus, albus, carneus, Aclandae, Barrati, Cheeseanus, heroicus, Houseanus, inclitus, regalis, Uxbridgeanus Sweet.
polymorphus MB. (= *atratus* Beaupré), vielgestaltige, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibirien.
β) diutinus Kit. Lk. (= *brevifolius* Frivalds.).
pomeridianus L. (= *tricolor* Adam).
pratensis MB. (= *chloroleucus* Fisch. Hornem. = *tataricus* Fisch.).
pulchellus P. Rchb., schöne, 4. f. Mont Cenis.
pulcherrimus Loisel., schönste, 4. k. China.
racemosus Visian., traubige, 4. f. Dalmatien.
scaber Thbg., scharfe, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
Schraderi Rchb. (= *chinensis* L. var. = *pulchellus* Schrad. non P.), Schrader's, ♂. 4. f. ? (Hybride).
serotinus W. K. (= *arenarius* Towns., non L. = *hungaricus* P. = *plumarius* β Whlbg. K.).
serrulatus Dsf., feinsägezähnige, 4. k. Nordafrika.
suaveolens Spgl. (= *dubius* Hornem.).
suffruticosus W. (= *arborescens* Hort. Carlsruh.).
tataricus Fisch. Schrank, tatarische, 4. f. Tatarei.
trifasciculatus Kit. (= *pseudobarbatus* Bess. = *lancifolius* Tausch), dreibüschelige, 4. f. Banat.
virgineus L. (= *Arrostii* Presl = *rupestris* L. fil. = *pungens* Poir., non L.), 4. f. Südeuropa, Sibirien.
b) flore pleno, β) subacaulis Vill. Loisel.
viridescens Visian., grünende, 4. f. b. k. Dalmatien.
viscidus Bory et Chaub., schmierige, 4. k. Griechenland.
vulturius Guss. et Tenore, neapolitanische, ♂. 4. f. Süditalien.
Waldsteinii Stbg., Waldstein's, 4. f. Krain, Ungarn.

Gartenhybriden: badinus, glaucophyllus Colla (non ? Hornem.), Goethalsii, grandiflorus, hybridus H. Angl., Napoleonis, purpureus Lam.

rectícaulis Ledeb., v. Tunica stricta.
Diaphane edulis Salisb., v. Moraea Sisyrinchium, p. 530.

Digitized by Google

Diasia DC., Diasie.

graminifolia β intermedia* (= *Melasphaerula intermedia* Swt.).

parviflora Steud. (= *Melasphaerula parviflora* Lodd.), kleinblumige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Diastella bryiflora Salisb., v. Leucospermum puberum, p. 459.

Diatonta aurea Nutt., *coronata* Nutt., v. Coreopsis aurea et trichosperma, p. 218 et 119 et p. 160 et 191 II.

Dibrachia peltata Eckl. Zeyh., *scutata* Eckl. Zeyh., v. Pelargonium peltatum et scutatum, p. 597 et 598.

Diceratium prostratum Lagasc., v. Notoceras hispanicum, p. 550.

Dichaea Lindl., Schweifstendel, XX. 1., Orchideae.

glauca Lindl. (= *Cymbidium glaucum* Sw. = *Epidendrum glaucum* Sw.), blaugrüner, 4. w. Jamaica.

graminoides Lindl. (= *Cymbidium graminoides* Sw. = *Epidendron graminoides* Sw. = *Isochilus graminoides* Hook.), grasähnlicher, 4. w. Westindien.

panamensis Lindl., panamischer, 4. w. Panama.

trichocarpa Lindl. (= *Cymbidium trichocarpum* Sw. = *Epidendrum trichocarpum* Sw.), haarfrüchtiger, 4. w. Jamaica.

Dichantium nodosum Willem., v. Andropogon annulatus p. 56.

Dichelostemma Kunth, Spaltkrone, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

congestum Kunth (= *Brodiaea congesta* Sm., p. 131, = *Hookera pulchella* Salisb.).

Dichodon Bartl., Doppelmiere, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae (Stellarieae).

anomalum Bartl., Rchb. (= *Cerastium anomalum* W. K. = *Stellaria anomala* Rchb. = *St. cerastoides* Merlet = *St. dubia* DC. = *St. sabulosa* Fisch. = *St. viscida* MB., p. 786).

cerastoides Rchb. (= *Cerastium carinthiacum* Vest. = *C. elegans* Fisch. = *C. lapponicum* Crantz = *C. refractum* All. = *C. stellarioides* Hartm. = *C. trigynum* Vill. = *Stellaria elegans* Sering. = *cerastoides* L., p. 786 = *glareosa* Turctsch. = *multicaulis* W.).

Dichondra Forst., Doppelkorn.

repens Forst., β) sericea Sw., γ) carolinensis Mchx.

Dichopogon Kunth, Doppelbart, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

setosus Kunth (= *Arthropodium fimbriatum* RBr., p. 85).

Dichorisandra Mik., Doppelbeutel.

Aubletiana R. et S. (= *Commelyna hexandra* Aubl. = *Tradescantia divaricata* Vahl), Aublet's, 4. w. Südamerika.

hirtella Mart. (= *puberula* β N. N. Mart.), kurzhaarige, 4. w. Brasilien.

ovata Mart., eiförmiger, 4. w. Brasilien.

procera Mart., hohe, 4. w. Brasilien.

Dichostylis N. E., Zinkengriffel, III. 1., Cyperaceae. Vergl. p. 262.

Micheliana N. E. (= *Isolepis Micheliana* R. et S. = *Fimbristylis Micheliana* Rchb. = *Scirpus Michelianus* L.).

pygmaea N. E. (= *Cyperus pygmaeus* Rottb., p. 246 = *C. diffusus* Roxb. = *C. Michelianus* Lk. = *pygmaeus*

Digitized by Google

Dichostylis
formis A. Dietr. = *C. squarrosus* Roxb. (non L.) = *Kyllingia uncinata* Lk., p. 440 = *Pycreus pygmaeus* N. E. = *Scirpus Michelianus* Sieb., non L.), zwergiger. ⊙. ♂. w. f. Ostindien, Aegypten.

Dichromena Rich., Doppelbinse, III. 1., Cyperaceae.
leucocephala Mchx. (= *Rhynchospora ochroleuca* Baldw. = *Schoenus stellatus* Sw. = *Scirpus cephalotes* Walt.), weifsköpfige, 4. k, Nordamerika, Westindien.

Dicksonia L'Her., Dicksonie.
squarrosa Lodd. (non Sw.), sparrige, 4. w. ? Südamer.
tenera Presl (= *adiantoides* Hort. Berol. non Humb.), zarte, 4. w. Südamerika.
Zippeliana Kunze (= *aculeata* Zipp., non Spgl.), Zippelius's, 4. w. Ostindien.
antarctica LaBill. et *arborescens* L'Her., v. Balantium antarcticum et arborescens, p. 58, II., *Baranetz* Lk., v. Cibotium glaucescens, p. 143, II.

Diclidostigma Kunze, Doppelnarbe, XVII. 1. (V. 1.),
melothrioides Kunze, kümmerlingähnliche, 4. Kn. Sch. w. Cuba.

Dicliptera Juss., Doppelklappe.
ciliata S. Schauer, gewimperte, ♄. w. Caracas.
Moritziana S. Schauer, Moritz's, ♄. w. Caracas.
multiflora Juss. (= *Dianthera multiflora* R. et S. = *Justicia multiflora* Vahl), vielblumige, ⊙. 4. w. Quito.
pectinata Juss., v. Rungia pectinata, *spinosa* Lodd., v. Barleria lupulina, p. 113, *verticillaris* R. et S., v. Hypoestes verticillaris.

Dicoma Cass., Doppelschopf, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
carduoides Schultz Bipont. (= *Schaffnera carduoides* Schultz), distelähnlicher, ⊙. m. f. Abyssinien.
speciosa Less., prächtiger, 4. k. t. Südafrika.

Dicrypta Lindl., Dicrypte.
Baueri Lindl. (= *Heterotaxis crassifolia* Lindl.), Bauer's. 4. w. Jamaika.
glaucescens Lindl., blaugrüne, 4. w. Südamerika.

Dictyoloma Juss., Netzsaum, X. 1., Rutaceae-Xanthoxyleae.
Vandellianum Juss. (= ? *incanescens* DC.), Vandelli's, ♄. w. Brasilien.

Dictyopteris attenuata Kunze, v. Polypodium (Sect.) attenuatum, p. 645.

Didelta carnosum Ait. (= *tetragoniaefolia* L'Her. = *capensis* Lam. = *Choristea carnosa* Thbg. = *Polymnia carnosa* L. fil.), ♂. ?
Didymocarpus Rexii Bowie, v. Streptocarpus Rexii.

Dieffenbachia Schott (D. Dieffenbach, Naturforscher und Reisender etc.), XXI. IX., Aroideae.
Seguine Schott (= *Caladium seguinum* Vent., p. 143 = *Arum seguinum* L.), β) maculata Sweet (= *Caladium maculatum* Lodd., p. 143).

Dienia Lindl., Dienie, XX. 1., Orchideae.
congesta Lindl. (= *Malaxis latifolia* Sm. = ? *Stelis hirta* Sw.), gedrängte, 4. w. Mexico.
cordata Lindl., herzförmige, 4. w. Ostindien.
cylindrostachya Lindl., cylinderährige, 4. w. Ostindien.
muscifera Lindl., fliegenblumige, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Diervilla T., Dierville.

hortensis Sieb. et Zuccar., Garten-D., ♄. f. b. k. Japan. Ob von den Nachverzeichneten einige in unsern Gärten eingeführt worden, ist mir unbekannt: floribunda Sieb. et Zuccar., Japan, florida Sieb. et Zucc. (= *Calysphyrum floridum* Bunge), Nordchina, Japan, grandiflora Sieb. et Zuccar. (= *corensis* DC.), Japan, versicolor Sieb. et Zuccar. (= *japonica* DC. = *Weigelia japonica* Thbg.), Japan. Sämmtlich ♄.

Dietes crassifolia G. Don (= *Iris crassifolia* Lodd., p. 422).

Dietrichia bicolor Eckl, *coccinea* Tratt., *jasminea* Eckl., *odoratissima* Tratt., *versicolor* Eckl., v. Kalosanthes bicolor, coccinea etc., p. 436.

Digera Forsk., Digera, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.

arvensis Fork. (= *Achyranthes Digera* Poir. = *A. polygonoides* Retz), Acker-D., ⊙. m. f. Ostindien.

ciliata Mart. (= *Achyranthes ciliata* Lam. = *Desmochaeta ciliata* R. et S.), gewimperte, ⊙. m. f. Ostind.

Digitalis T., Fingerhut.

Buxbaumii Bess., Buxbaum's, ♂. 4. f. Kleinasien.

Fontanesii Steud. (= *aurea* Dsf., non Lindl.), Desfontaine's, 4. f. ?

intermedia Lindl., mittlerer, ♂. 4. f. b. Portugal.

laciniata Lindl., geschlitzter, ♄. k. Spanien.

laevigata W. K. (= *epiglottis* Hort. = *integrifolia* Seenus).

Libertiana Dumort. (= *purpurascens* Lejeun. excl. Synon.), Libert's, 4. f. Belgien.

Lindleyana Tausch (= *erubescens* Ait. = *purpurascens* Lindl., non Roth), Lindley's, ♂. f. ?

Milleri G. Don (= *orientalis* Mill.), Miller's, ♂. 4. f. Kleinasien.

ochroleuca Jacq. (= *grandiflora* Lam. var. K. = *lutea* Auct. = *truncata* Auct.).

β) fuscescens W. K.

nervosa Steud., nerviger, 4. f. Caucasus.

purpurascens Roth (= *fucata* Ehrh. = *hybrida* Koelr.).

purpurea L., b) alba (= *candida* Haberl.), c) carnea Meig. Wenig., d) monstrosa Hort., e) superba Hort.

Unbestimmtere: bicornuta Hort., denticulata Tausch, fuscopunctata Tausch, paniculata Hort., pyramidalis Hort., tubulosa Tausch.

Dilepyrum aristatum Mchx., *diffusum* B. Beauv. (= *minutiflorum* Mchx. = *multiflorum* P. B.), v. Mühlenbergia aristata et diffusa.

Dilivaria Neck., Juss., Dilivarie, XIV. 11., Acanthaceae.

ilicifolia P. (= *Acanthus ilicifolius* L.), stechhülsenblätterige, ♄. w. Ostindien.

Dillwynia Sm., Dillwynie.

adenophora Endl., drüsentragende, ♄ t. Neuholland.

angustifolia H. Hügel., schmalblätterige, ♄. t. Neuholl.

clavata H. Cels., Makoy, Paxton, keulenförmige, ♄. t. Neuholland.

conferta Hort., gedrängte, ♄. t. Neuholland.

elegans Endl., zierliche, ♄. t. Neuholland.

filifolia Endl., fadenblätterige, ♄. t. Neuholland.

floribunda Sm. (= *ericaefolia* Sims et Hort., non Sm.).

glaucescens Hort. angl. et belg., blaugrüne, ♄. t. Neuh.

Hügelii Hort., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

latifolia Hort., breitblätterige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Dillwynia
laxiflora Benth., lockerblumige, ♄. t. Neuholland.
peduncularis Benth., langstielige, ♄. t. Neuholland.
pungens Makoy (= *Eutaxia pungens* Swt., p. 327).
plumosa Hort. belg., federige, ♄. t. Neuholland.
racemosa Hort. belg., traubige, ♄. t. Neuholland.
ramosissima Benth., ästigste, ♄. t. Neuholland.
seriphioides Endl., seriphiumähnliche, ♄. t. Neuholland.
Sieberi Steud. (= *cinerascens* Sieb.), Sieber's, ♄. t. Neuholland.
speciosa Hügel., prächtige, ♄. t. Neuholland.
subaphylla Colla, fastblattlose, ♄. t. Neuholland.
tomentosa H. anglor. et belg., filzige, ♄. t. Neuholland.
Dimacria affinis Sweet, *Andrewsii* Swt., *apiifolia* Swt., *aristata* Swt., *astragalifolia* Swt., *auriculata* Swt., *barbata* Swt., *bipartita* Swt., *carnea* Swt., *coronillaefolia* Swt., *depressa* Swt., *elegans* Swt., *fissifolia* Swt., *floribunda* Swt., *foliolosa* Swt., *fulgens* Swt., *heracleifolia* Swt., *imbuta* Swt., *lanceolata* Swt., *linearis* Swt., *longiflora* Swt., *longifolia* Swt., *oxalidifolia* Swt., *pinnata* Swt., *radiata* Swt., *recurvata* Swt., *rumicifolia* Swt., *setigera* Swt., *Smithiana* Swt., *spathulata* Swt., *sulphurea* Swt., *tenella* Swt., *undulata* Swt., *virginea* Swt., v. Pelargonium affine, Andrewsii, apioides, aristatum, astragalifolium, ciliatum, p. 599 etc.

Dimorphanthus Miq., Unformblume, V. 1., Araliaceae.
elatus Miquel (= *Aralia chinensis* L. excl. Synon.), hohe, ♄. t. China, Java.
edulis Miquel (= *Aralia cordata* Thbg. = *A. edulis* Sieb. et Zuccar.), genieſsbare, ♄. k. t. Japan.
japonicus Endl. (= *Aralia japonica* Thbg., p. 71).
Dimorphanthes aegyptiaca Cass., *angustifolia* Cass., *Gouani* Cass., *procera* Cass., *stipulacea* Cass., v. Conyza aegyptiaca, ambigua, Gouani, chilensis et incisa, p. 216 — *sicula* Cassin., v. Jasonia sicula, p. 430.

Dioclea Humb. B. K., non Spgl. (alter griechischer Arzt und Kräuterkenner), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
bicolor Benth. (= *Dolichos bicolor* Hflg.), zweifarbige, ♃. ♄. Sch. w. Brasilien.
glycinoides Hort. belg. (= *Kennedya splendens* Hort.), glycinenähnliche, ♄. Sch. t. k. ?
grandiflora Mart., groſsblumige, ♄. Sch. w. Brasilien.
Jacquiniana DC. (= *Dolichos ruber* Jacq. = *Hymenospron rubrum* Spgl.), Jacquin's, ♄. Sch. w. Martinique.
mollis DC. (= *Dolichos mollis* Jacq. = *Hymenospron molle**, p. 608).
sericea H. B. K. (= *Hymenospron sericeum* Spgl., p. 408).
violacea Mart. (= *Dolichos altissimus* Arrab. = *Mucuna altissima* Boj., non DC.), violette, ♄. Sch. w. Brasilien.
Dioclea hispidissima Spgl., v. Meneghinia asperrima.

Dionysia Fenzl, odora Fenzl, V. 1., Primulaceae, ♃. ♄. Kurdistan. Ob kultivirt?

Dioscorea L., Yamswurzel.
bonariensis Tenore, bonarische, ♃. Kn. w. Bonaria.
macrophylla Martens (= ? *mexicana* Hort.), groſsblätterige, ♃. Kn. k. t. Mexico.
septemloba Thbg., siebenlappige, ♃. Kn. k. f. b. Japan.

Digitized by Google

Elephantopus Spgl., v. Testudinaria Elephantipes, p. 801, *parvifolia* Fisch. ?

Diosma Berg., Göttergeruch.

ciliata Berg. (non L., nec Lam. et Thbg.), gewimperter, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

Meyeriana Spgl. (= *virgata* Mey. Bartl. Wendl., non Thbg.).

Simsiana Eckl. (= *ericoides* Sims, non L.), Sim's, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

vulgaris Schltdl. (ambigua Bartl. et Wendl., longifolia Wendl., oppositifolia L., hirsuta L. et rubra L., werden vom H. Prof. v. Schltdl. als Abarten hierher gezogen).

acuminata Dsf. et *cordata* Hort., v. Agathosma acuminata et β cordata, p. 23, *acuminata* Lodd, v. Adenandra acuminata Don, p. 18, *buckoo* H. angl. = ?, *capitata* Dum. Cours. Hort., v. Agathos. ciliata et concinna, p. 23, *ciliata* L., *ciliata* Lam. et *ciliata* Thbg., v. Agath. ciliata, obtusa et Thunbergiana, p. 23, *corifolia* Nois. = ?, *crassifolia* H. angl. = succulenta, *crenatifolia* Vent. = ?, *dioica* Ker, v. Barosma dioica, p. 114, *foetidissima* Spgl., v. Barosma foetidissima, *fragrans* Sims, v. Adenandra fragrans, p. 18, *glandulosa* Hort. (= *graveolens* Lichtenst.), v. Barosma ovata, *glandulosa* Thbg., v. Agathosma Ventenatiana, p. 23, *hircina* Hort. angl. = ?, *hybrida* Hort., v. Agathosma hybrida, p. 23, *imbricata* Dum. Cours., v. Audouinia capitata, p. 106, *lanceolata* Mill.; *lasiophylla* Spgl., v. Agathosma obtusa et villosa, p. 23, *latifolia* Andr., *latifolia* Lodd. et *latifolia* Thbg. (= *odoratissima* Mont.), v. Barosma serratifolia β crenulata et latifolia, p. 114, *laxa* Spgl. (= *speciosa* H. Cels. = *rugosa* Hortul.), v. Agathosma laxa, p. 23, *odorata* DC., v. Barosma crenata, *orbicularis* Hort., v. Barosma ovata, *reclinata* Hort., anglor. = ?, *reflexa* Lodd. et *serpyllacea* DC., v. Agathosma reflexa et serpyllacea, p. 23, *serratifolia* Curt. (= *serrulata* H. angl.), v. Barosma serratifolia, p. 114, *squarrosa* Wendl., v. Macrostylis squarrosa, p. 487, *tenuissima* Lodd., v. Agathosma tenuissima, p. 23, *tetragona* L. et *tetragona* Thbg., v. Acmadenia tetragona et laevigata, p. 12, *umbellata* Hort., v. Adenandra umbellata, p. 18, *uniflora* Schrad. Wendl., v. Adenandra uniflora, *ursina* Nois. = ?, *villosa* Thbg., v. Adenandra villosa, p. 18, *villoca* Wendl. et *virgata* Thbg. (non Hort.), v. Agathosma villosa et virgata, p. 23.

Diospyros L., Dattelpflaume.

angustifolia H. Cels., schmalblätterige, ♄. w. ? Ostindien.

digyna Jacq., zweiweibige, ♄. w. Insel Celebes.

Kaki L. fil. (= *chinensis* Blume).

Loddigesii* (= *lucida* Lodd.), Loddiges's, ♄. f. b. Nordamerika.

lucida Wall., glänzende, ♄. w. Ostindien.

Sapota Roxb., Sapota-D., ♄. w. Ostindien, Philippinen.

β) nigra L.

Diotis Schreb., Doppelohr.

ferruginea N. E. (= *ceratoides* Auct.), rostfarbiges, ♄. f. Caucasus.

Digitized by Google

Diphyes angustifolia Blume, *odorata* Blume, v. Bulbophyllum angustifolium et odoratum, p. 81, II.

Diplacus Nutt., Maskenblume, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrophularineae).

glutinosus Nutt. (= *aurantiacus* Don = *Mimulus glutinosus* Wendl., p. 525 = *aurantiacus* Curt.).

puniceus Nutt., p. 268, b) coccineus Hort., latifolius Nutt., leptanthus Nutt. et longiflorus Nutt. Sämmtlich 4. und in Californien heimisch, scheinen noch nicht kultivirt zu werden.

Dipladenia A. DC., Doppeldrüse, V. I., Contortae-Apocyneae.

atropurpurea A. DC. (= *Echites atropurpurea* Lindl.), schwarzpurpurfarbige, 4. ♄. w. Brasilien.

crassinoda A. DC. (= *Echites crassa* Hort. = *E. crassinoda* Gardn.), dickknotige, 4. ♄. w. Brasilien.

Gardneria A. DC., Gardner's, ♄. w. Brasilien.

splendens A. DC. (= *Echites splendens* Lindl.), schimmernde, 4. ♄. w. Brasilien.

Diplasia karataefolia Rich. (= *Fimbristylis bromeliaefolia* Spgl. fil. = *Scirpus bromeliaefolius* Rudge).

Diplazium Sw., Aderfarrn.

brevifolium Kunze (= *fraxinifolium* H. Angl.), kurzblätteriger, 4. w. ? Brasilien.

coarctatum Lk. gedrängter, 4. w. ? Brasilien.

dubium Lk. (= *ambiguum* Raddi), zweifelhafter, 4. w. Brasilien.

Lasiopteris Kunze (= *decussatum* H. Anglor.), haarflügeliger, 4. w. ?

obtusum Lk., stumpfer, 4. w. Brasilien.

plantagineum Raddi (= *acuminatum* Raddi).

pubescens Lk. (= *serampurense* Hort., non Spgl.), weichhaariger, 4. w. Ostindien.

Shepherdi Lk. (= *Asplenium ambiguum* Raddi = *A. striatum* Hortul.), Shepherd's, 4. w. Brasilien.

Diplochita DC., Doppelweiderich.

caudata DC. (= *Chitonia caudata* Don), schweifiger, ♄. w. Peru.

Fothergilla DC. (= *Fothergilla mirabilis* Aubl. = *Melastoma compressa* Vahl = *M. Fothergilla* Rich. = *M. rubiginosa* H. B. K.).

macrophylla DC. (= *Chitonia macrophylla* Don = *Melastoma macrophylla* Pav.).

serrulata DC. (= *Melastoma lasiopetala* Mart.), sägezähniger, ♄. w. Brasilien.

β) Balbisiana (Sering) (= *Melastoma patens* Spgl. = *M. serrulata* Rich.). Vergl. p. 877.

Diplolaena Dsf., RBr., Diplolaena.

angustifolia Hook., schmalblätterige, ♄. t. Neuholland.

Diplolepis apiculata Lindl., *Menziesii* R. et S. (= *vomitoria* Lindl.), *ovata* Lindl., v. Sonnimia apiculata etc.

Diplopappus Cass., DC., asper Less., asperrimus DC., caucasicus DC., extenuatus N. E. (= *Aster coriaceus* Hort.), filifolius DC. (= *Aster chrysanthemifolius* Hort. = *Diplostephium teretifolium* N. E.), fruticulosus Less., incanus Lindl., linariaefolius Lindl., obtusatus Less, (= *Aster fruticulosus β* W. = *A. rosmarinifolius* Spgl.), pluriflorus Steud. (= *Aster fruticulosus β* Hookeri), rigidus Lindl. (= *Aster fragilis* Jacq. =

Digitized by Google

Diplopappus
linarifolius Mchx. (= *Aster pulcherimus* Lodd.), v. Aster Sect. V., p. 98.
Diplopappus chinensis Less., v. Callistephus chinensis, p. 98, — *dubius* Cassin., v. Stenactis annua, p. 786, *pinnatifidus* Hook., v. Aplopappus spinulosus, p. 68, = *albus* Hook. (= *ptarmicoides* Lindl.) et *paludosus* Lindl., v. Heleastrum album et paludosum, p. 99 Aster Sect. X. — *pinifolius glaber* H. Berol., *pinifolius* Less., H. Berol., *graminifolius* Less., v. Neja ciliaris, filiformis et gracilis.

Diplopeltis Endl., Doppelschild.
Lehmanni Miquel, Lehmann's, ♄. t, Neuholland.

Diplophractum Dsf., Spgl., Diplophracte, (= *Diplofractum* Hort.), XIII. 1., Tiliaceae.
auriculatum Dsf., geöhrte, ♄, w. Java.

Diplospora DC., Doppelsämler, V. 1., Rubiaceae.
viridiflora DC. (= *Canthium dubium* Lindl., p. 157), ♄. t. w. China, Ostindien.

Diplostephium Cass. (= *Doellingera* N. E.), acuminatum DC., amygdalinum Cass. (= *Aster divaricatus* Spgl. = *A. humilis* W. = *Chrysopsis humilis* Nutt.), cornifolium DC., (= *Aster humilis* Ell. = *A. firmus* Mchx.), dichotomum DC., obovatum DC. (= *boreale* Spgl. = *Chrysopsis obovata* Nutt.), umbellatum Nutt. (= *Chrysopsis amygdalina* Nutt. = *Diplopappus umbellatus* Nutt.), v. Aster, p. 98, Sect. VI.

Diplotaxis DC., Mauersenf.
biloba C. Koch, zweilappiger, ⊙. f. Armenien.
erucoides DC. (= *Eruca erucoides* Rchb. = *Euzomum erucoides* Spach = *Moricandia hesperidiflora* Hort. = *Sinapis erucoides* L. = *Sisymbrium erucoides* Dsf.).

Diplothemium Mart., Doppelscheide(palme).
caudescens Mart., strunkige, ♄. w. Brasilien.
litorale Mart., (= *Cocos arenarius* Gomez.), Ufer-D., ♄. w. Brasilien.

Diplusodon Pohl, Zahnweiderich, XI. 1.
amoenus DC. (= *Friedlandia amoena* Chamiss. Schltdl.), lieblicher, ♄. w. Brasilien.
speciosus DC. (= *Dubyaea melastomoides* DC. = *Nesaea speciosa* H. B. K.), prächtiger, ♄. w. Brasilien.
virgatus Pohl (= *amoenus* DC. = *Friedlandia albiflora* Mart. herb.), ruthenförmiger, ♄. w. Brasilien.

Diporidium Wendl., Diporidie, XIII. 1., Tricoccae-Ochnaceae.
arboreum Wendl. (= *Ochna arborea* Burch., p. 552 = *O. capensis* Page = *O. chrysantha* Mund = *Tetracera lutea* Spgl.).
atropurpureum Wendl. (= *Ochna atropurpurea* DC., p. 552).

Dipsacus Vaill., Karden.
azureus Schrenk. (= *Cephalaria dipsacoides* Kar. et Kirilow), azurblaue, ♂. f. Soongarien.
divaricatus Presl (= ? *laciniatus* Ucria), ausgespreitzte, ♂. f. Sicilien.
recurvus Haberl, zurückgekrümmte, ♂. f. Osteuropa.

Diptera Borckh., Zweiflügler, X. 11., Corniculatae-Saxifrageae.
cuscutaeformis* (= *Saxifraga cuscutaeformis* Lodd. = *grandiflora* Hort.).

Digitized by Google

Diptera
sarmentosa Borckh. Lk. (= *Saxifraga sarmentosa* L. Suppl. = *chinensis* Lour. = *stolonifera* Jacq.). Vergl. p. 724.

Dipteracanthus N. E. (= *Calophanes* Don, Endl.), Flügelklau.
biflorus N. E. (= *Ruellia biflora* L. = *oblongifolia* Mchx. = *Calophanes oblongifolia* D. Don, p. 149).
ciliatus N. E. (= *Ruellia ciliata* Hornem.).
ciliosus N. E. (= *Ruellia ciliosa* Pursh).
hybridus N. E. (= *Ruellia hybrida* Pursh = *strepens* Torrey, non L.), Bastard-F., 4. k. Nordamerika.
lanceolatus N. E. (= *Ruellia repens* L. mant.), lanzettförmiger, 4. w. Ostindien.
oblongatus N. E., verlängerter, 4. w. ?
parviflorus N. E. (= *Jucticia parviflora* Ortega, Vahl = *Eranthemum parviflorum* RBr.), kleinblumiger, ♄. t. Mexico.
patulus N. E. (= *Ruellia aromatica* Roxb. = *R. patula* Jacq., p. 705).
pilosus N. E., behaarter, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.
Schauerianus N. E. (= *Ruellia brasiliensis* Hort., non Spgl.).
strepens N. E. (= *Ruellia strepens* L.).
strictus N. E. (= *Ruellia strepens* Hort.)
vagans N. E. (= *oblongatus* N. E.), zerstreuter, 4. w. ?
viscidulus N. E. (= *Ruellia viscidula* Mart. Catal. h. reg. Monac.).
Zu berichtigen und zu vergleichen p. 269 et p. 705.

Dipterygium Decaisne, Flügelschötchen, XV. 1., Crucif.
glaucum Decaisne (= *Pteroloma arabicum* Hochst. et Steud.), blaugrünes, ♂. 4. k. Arabien.

Dipterocarpus G., Zweiflügelfrucht, XIII. 1., Tiliaceae.
elegans Blume, zierliche, ♄. w. Java.
trinervis Blume, dreinervige, ♄. w. Java.

Disa Berg., Disa.
fasciata Lindl., gebänderte, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
gracilis Lindl., schlanke, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
grandiflora L. Suppl. (= *uniflora* Berg. = *Satyrium grandiflorum* Thbg.).
longifolia Lindl., langblätterige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
flexuosa Sw., v. Schizodium flexuosum, *graminifolia* Ker, v. Herschelia coelestis, *patens* Thbg., v. Penthea patens.

Dischisma Choisy, Dischisma, XIV. 11., Globulariaceae (Selagineae).
capitatum Chois. (= *Hebenstreitia capitata* Thbg., p. 377).
ciliatum Choisy (= *Hebenstreitia albiflora* Lk., Enum. = *H. ciliata* Berg., p. 377).
chamaedryfolium Walp. (= *Hebenstr. chamaedryfolia* Lk.).
erinoides G. Don (= *ciliatum* var. ? Chois. = *Hebenstreitia erinoides* Thbg.), leberbalsamähnliche, ♂. ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Discocactus insignis Pfeiff. etc., v. Cacteae, p. 93 II.

Discocapnus Chamiss., Schltdl., Scheibenmohn, XVII. v. (IV.), Papaveraceae-Fumarieae.
Mundtii Chamiss., Schltdl. (= ? *Fumaria capreolata* Thbg. = *F. Mundtii* Spgl. = *F. scandens* E. Mey.), Mundt's, ⊙. Sch. f. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Disemma LaBill., DC., Doppelkrone.
aurantiaca Lindl. (= *Murucuja aurantiaca* P. = *Passiflora aurantia* Forst., non Andr.), orangefarbige, ♄. 4. Sch. w. t. Neucaledonien.
Bauerianum Endl. (= *Baueri* Don = *Herbertiana* DC. var. Spgl. = *Murucuja Baueri* Lindl.), Bauer's, ♄. 4. Sch. t. w. Norfolkinsel.
coccinea DC. (= *Passiflora coccinea* Banks herb., non Aubl.), scharlachfarbige, 4. ♄. Sch. t. w. Neuholland.

Disperis Sw., Disperis.
tripetaloides Lindl. (= *Dryopeia tripetaloidea* Pet. Th.), dreikronenblätterige, 4. w. Mascarenas, Ceylon.

Disporum Salisb., Don, Endl., Lochlilie.
calcaratum Don (= *Uvularia calcarata* Wall.), gespornte, 4. t. Ostindien, Nepal.
fulvum Salisb. (= *pullum* Schult. = *Fritillaria cantoniensis* Lodr. = *Streptopus chinensis* Sm. = *Uvularia chinensis* Ker, p. 269).
Pitsutum Don (= *Uvularia Pitsuta* Hamilt. = *U. umbellata* Wall. = *Streptopus pedunculatus* Sm.), langstielige, 4. t. Ostindien.

Disisocactus (= *Distocactus* Auct.), biformis Lindl., v. Cacteae, Sect. XVI., p. 103, II.

Distemon P. C. Bouché, v. Canna, Sect. III., p. 116, II.

Distictis A. DC., Distictis, XIV. 11., Bignoniaceae.
lactiflora A. DC. (= *Bignonia lactiflora* Vahl, p. 122).
rigescens A. DC. (= *Bignonia rigescens* Jacq., p. 122).

Ditaxis Vahl, Ditaxis, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
chinopetala Bertero (= *Croton lanceolatum* Cav.), handkronige, ♄. w. t. Chili.
heteracantha Zucc., verschiedenstachelige, ♄. w. t. Mexico.

Dithyrocarpus Kunth., Doppelklappler, Vl. 1., Commelynaceae.
paniculatus Kunth (= *Tradescantia paniculata* Roxb., p. 814).

Dobrowskya Presl (Dobrowsky, Prof. d. Philologie an der Universität zu Prag, †), V. 1., Campanulaceae-Lobeliaceae.
aspera DC., unidentata DC., v. Lobelia, Sect., p. 470.

Dodecatheon L.
Meadia L., c) giganteum striatum, e) bicolorum.

Dodonaea L., Dodonaea.
Baueri Endl., Bauer's, ♄. t. k. Neuholland.
ceratocarpa Endl., hornfrüchtige, ♄. t. k. Neuholland.
dioica Roxb. (= ? *oblongifolia* Lk. = ? *triquetra* And.).
discolor Desf., verschiedenfarbige, ♄. t. ?
filiformis Lk. (= *angustissima* Hort.).
? glaucea van Houtte, klebrige, ♄. w. ?
heterophylla Colla, verschiedenblätterige, ♄. t. k. Neuholl.
humilis Endl, niedrige, ? ♄. t. k. Südneuholland.
praemorsa Hort. angl., abgebissene, ♄. k. t. Neuholland.
Doellingera amygdalina N. E., *cornifolia* N. E., *obovata* N. E., v. Diplostephium amygdalinum etc., Aster Sect. VI, 98.

Doemia guineensis Sweet (= *scandens* G. Don = *Asclepias scandens* P. B.).

Dolichos L., Faseole.
capensis L. (= *Scytalis tenuis* E. Mey. = *Vigna capensis* Walp.).

Digitized by Google

Dolichos

Catjang L. (= *Scytalis tenuis* E. Mey. = *Vigna Catjang* Walp.).

chinensis L. (= *chinensis* Auct. = *cylindricus* Mch. (non Desv.) = *Catjang* Wall.).

β) tranquebaricus Jacq. (= *Catjang* Roxb. non L.).

glycinoides H. B. K., glycinenähnliche, 4. Sch. w. Peru.

leucomelas Kunze, weifsschwarze, ⊙. Sch. m. f. Cap der guten Hoffnung.

melanophthalmus DC. (= *unguiculatus* Thore).

monachalis Brot. (= *Catjang* L. var. Link.).

niloticus Delil. (= *sinensis* Forsk., non L.), Nil-F., ⊙. w. m. f. Aegypten.

pubescens L. (= *Glycine tomentosa β* W.), feinhaarige, ⊙. Sch. w. Südamerika.

Unbestimmtere: Brunelli Zuccar., caribaeus Mart., farinaceus Hort., muricatus Hort., myodes Tenore, pictus Hortor. — *bicolor* Hffg., *mollis* Jacq. etc., v. Dioclea bicolor etc., *hirtus* Andr., v. Cylista villosa, p. 242, *helvolus* Nutt. et *trilobatus* L., v. Phaseolus helvolus et trilobus, p. 613 et 614, *japonicus* Spgl., v. Wistaria floribunda, *pruriens* L., v. Mucuna pruriens, p. 533, *tetraspermus* W., v. Lablab vulgaris, p. 440.

Dollinera Endl. (George Dolliner), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

sambucensis Endl. (= *Ototropis sambucensis* N. E. Schauer, p. 674 = *Hedysarum sambucense* Don = *Desmodium sambucense* DC.).

Dombeya Cav., Dombeya.

Amelia Guillem. (= *Astrapaea viscosa* Sweet, p. 104), Amelia's, ♄. w. Madagascar.

cannabina Bojer, hanfähnliche, ♄. w. Mauritius.

nivea H. Cels, schneeweisse, ♄. w. ?

acerifolia G., v. Pterospermum acerifolium, p. 665, *Erythroxylon* W., v. Melhania Erythroxylon, p. 506.

Dondisia DC., Dondisie, V. 1., Rubiaceae.

foetida Hassk., übelriechende, ♄. w. Java.

Donia canariensis Less., v. Jasonia laevigata, *D. ciliata* Nutt., v. Aplopappus ciliatus, p. 68.

Donzellia spinosa Tenore? Nicht hinlänglich bekannt, ob kultivirt?

Doodia RBr., Doodie.

Kunthii Lk., Kunth's, 4. t. w. Neuholland.

lunulata H. belg., mondförmige, 4. t. w. Neuholland.

rupestris Sieb., Kaulf. (= *caudata* Hook. ? RBr.), felsenliebende, 4. t. w. Neuholland.

Doronicum T. L., Gemswurz.

caucasicum MB. (= *orriorrhizon* Gussone).

Columnae Tenore (= *cordifolium* Sthg. = *orientale* Rchb. = *Arnica cordata* Wulf.), Columna's, 4. f. Tyroler Alpen, Italien.

Nentwichii Sadler, Nentwich's, 4. f. Ungarn.

Unbestimmt: lucidum Hort.

altaicum Pall., *Clusii* Tausch (= *longifolium* Rchb.), *corsicum* Poir., Tausch, *Jacquini* Tausch, *scorpioides* Lam., v. Aronicum altaicum, Doronicum, corsicum, scorpioides *α* et *β*, p. 80 et p. 45 II, *glutinosum* W., v. Grindelia glutinosa, p. 369.

Dorstenia Plum., Dorstenie.

fruticulosa Schott, strauchige, ♄. w. Brasilien.

Digitized by Google

Dorycnium herbaceum Vill. (= *pentaphyllum* Scop.), latifolium W. (= *thericum* W. = *intermedium* Ledeb.). *rectum* Sering., v. Bonjeanea recta, p. 73, II.

Doryçnopsis Boiss., Dorycnidie, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Gerardi Boiss. (= ? *Anthyllis heterophylla*, L., p. 66 = *onobrychoides* Cav.), Gerard's, ♄. k. Spanien, Portugal.

Draba Dill., L., Hungerblümchen.

Aizoon Wahlbg. (= *aizoides* γ Auct. = *ciliaris* Schrank = *hispida* W. = *laciocarpa* Roch.), haarfrüchtiges, 4. f. Deutschland, Ungarn.

algida Adams (= *pilosa* Adams), kaltes, 4. f. Sibirien.

altaica Bunge (= *rupestris* β *altaica* Flora Altaica), altaisches, 4. f. Altai.

arabisans Mchx. (= *Arabis* P.), gänsekrautähnliches, ♂. f. Nordamerika.

aspera Adams, rauhes, 4. f. Sibirien.

brachystemon DC. (= *aizoides* Curt. = ? *ciliaris* L.).

confusa Ehrh. (= *incana* L. var. W. = *stylaris* Gay.), β) pauciflora Chamiss. (? = *paucifolia* Auct.).

dasycarpa C. A. Mey., rauchfrüchtiges, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Gmelini Adams (= *stellarioides* W. herb. = *repens* MB.).

hirta L. (= *incano-hirta* Hartm. = *confusa* Hartm., non Ehrh.).

lactea Adams (= *Wahlenbergii* Hartm. = *androsacea* Wahlbg. = *lapponica* Wahlbg.), milchweifses, 4. f. Nördl. Sibirien, Lappland.

laxa Lindbl., lockeres, ♂. f. Scandinavien.

Liljebladii Wallm. (= *caesia* Adams = *rivularis* Bernh.).

lutea Gilib. (= *intermedia* Andrzy. = *muralis* Stephan. MB. = *nemoralis* L. var. Goldb. = *pontica* Dsf.), Armenien, Dahurien.

mollissima Steven, weichstes, 4. f. Ostcaucasus.

rivularis Hornem. (non Bernh.) (= *confusa* Turczch., non W.), Bach-H., ♂. f. Baical.

scandinavica Lindblom (= *hirta* β *lapponica* Wahlbg.), nördliches, 4. f. Scandinavien.

tomentosa Wahlbg. (= *dubia* Suter = *hirta* Towns. *stellata* Jacq. var. Spgl.).

trichella Fr., feinhaariges, ♂. 4. f. Scandinavien.

tridentata DC. (= *hispida* MB. = *rupestris* W. herb.).

unalaschkiana DC. (= *unalascensis* Auct.). ♂.

nummularia Ehrbg., Lk., v. Koniga nummularia, p. 439, *ruderalis* Baumg., v. Lepidium Draba, p. 454.

Dracaena Vandell., L., Drachenbaum.

Draco L. (= *yuccaeformis* Vandell. = *Sterbia Draco* Crantz.).

β) Boerhavii Tenore.

flabelliformis Bory, fächerförmiger, ♄. w. Mauritius.

Fontanesiana Schult. (= *elliptica* Dsf. h. Par.), Desfontaine's, ♄. w. Mascarenas.

umbraculifera Jacq. (= *pumila* Hort.).

Unsichere: flexuosa Hort., frutescens Hort., reclinata Hort., viridis Hort.

angustifolia H. Par. (= *marginata* Lam. = *tessellata* W. E.), *australis* Forst. (= *obtecta* Gesn.), *cernua* Jacq. = *candelaria* Hort.), *congesta* Sweet

Digitized by Google

(= *coerulea* H. Angl.), *ferrea* L. (= *terminalis* Jacq.), *hemichrysa* Salm, *indivisa* Forst., *parviflora* W. (= ? *ensifolia* Haw.), *reflexa* Lam., *stricta* Sims, v. Cordyline australis, cernua, congesta, ferrea, hemichrysa, indivisa etc., p. 218 et 160, II. — *borealis* Sims, Ait., v. Smilacina borealis, p. 764, *Boscii* Hort. Cels. (= *filamentosa* Scanag.), v. Agave geminiflora, p. 24 et 14, II. — *dentata* P. (= *marginata* Ait.), v. Lomatophyllum borbonicum, — *filiformis* Thbg. et *obliqua* Thbg., v. Xerotis filiformis et flexifolia, p. 860, — *medeoloides* L., v. Myrsiphyllum asparagoides, — *nemorosa* Jacq. (= *ensifolia* L.), v. Dianella nemorosa, p. 258.

Dracocephalum L., Drachenkopf.

discolor Bunge, verschiedenfarbiger, 4. f. Altai.

foetidum Bunge (= *Moldavica* L. var. ? Bunge), stinkender, ⊙. f. Sibirien.

fruticulosum Stephan., strauchiger, ♄. f. Sibirien.

Ludovicianum Hort., Ludovici's, 4. f. ? Nordamerika.

pinnatum L. (= *pinnatifidum* Lam.).

speciosum Benth., prächtiger, 4. k. Himalayagebirge.

spinescens Wender., stacheliger, 4. f. ?

alpinum H. Hffg. = ?, *canescens* L., *iberiсum* MB., *peltatum* L. (= *ocymifolium* Mill.), v. Lallemantia canescens, iberica, peltata, p. 881, — *mexicanum* H. B. K. (= *Cedronella mexicana* Benth.), v. Gardoquia betonicoides, p. 346, — *sibiricum* L., v. Nepeta macrantha.

Dracontium L., Drachenwurz.

dubium Kunth, zweifelhafte, 4. w. Guiana.

lacerum Hort. (= *nymphaeifolium* Hort.), v. Colocasia nymphaeifolia, p. 154, II. — *lanceaefolium* Jacq. et *sagittaefolium* Meyer, v. Spatiphyllum lanceolatum et sagittaefolium, — *pertusum* L., v. Monstera Adansonii, ? *spinosum* L., v. Lasia heterophylla, — *triphyllum* Hort. angl., v. ? Arisaema brasilianum, p. 45, II.

Dracophyllum LaBill., Drachenblatt.

cuspidatum Hort. belg., feinspitziges, ♄. t. Neuholland.

Hügelii ? Benth., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

rosmarinifolium RBr., (= *Epacris rosmarinifolia* Forst.), rosmarinblätteriges, ♄. t. Neuholland.

capitatum Lindl., v. Sphenotoma capitatum, p. 777.

Dracunculus T., Otterwurz, XXI. ix., Aroideae.

canariensis Kunth, canarische, 4. Kn. k. Teneriffa.

crinitus Schott (= *Arum crinitum* Ait., p. 85).

vulgaris Schott (= *polyphyllus* Blume = *Arum Dracunculus* L., p. 85), gemeine, 4. Kn. f. b. Südeuropa.

Drimia Jacq., Drimia.

Eckloniana Schult. (= *humilis* Berg.), Ecklon's, 4. Zw. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Gawleri Schrad. (= *lanceaefolia* β *minor* Ker = *revoluta* Sims = *Hyacinthus revolutus* Ait.), Gawler's, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

lanceaefolia Ker, β) densiflora Schrad. (= *maculata* Tratt.), γ) longepedunculata Schrad. (= *Scilla maculata* Schrk. H. monac.).

lanceolata Schrad. (= *Lachenalia reflexa* Andr.), lanzettförmige, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Drimia
ovalifolia Schrad. (= *lanceaefolia* Lodd.), eiblätterige, 4. Zw. t. k. Cap. d. g. Hoffn.

Dryandra RBr., Dryandra.
Brownii Meissn., Brown's, ♄. t. Neuholland.
cardiacea Lindl., distelähnliche, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).
favosa Lindl., bienenzellige, ♄. t. Neuholland.
Lindleyana Meissn., Lindley's, ♄. t. Neuholland.
nobilis Lindl., edle, ♄. t. Neuholland.
planifolia H. Hügel., flachblätterige, ♄. t. Neuholland.
proteoides Lindl., wunderfichtenähnliche, ♄. t. Neuholl.
speciosa Hort. angl., (= *elegans* Hort.), prächtige, ♄. t. Neuholland.
stuposa Lindl., wergartige, ♄. t. Neuholland.
tenuifolia RBr. (= *uncata* Cunningh. = *Josephia tenuifolia* Poir.).

Dryas integrifolia Vahl (= *tenella* Pursh).

Drymaria W., Hainling.
ciliata H. Berol. et H. Hafn. (= *cubensis* Hort. berol.), gewimperter, ⊙. m. f. Cuba.
cordata W. (= *Holosteum cordatum* L.), ⊙. m. f. Südam.
gracilis Chamiss. et Schltdl., schlanker, ⊙. m. f. Mexico.
erubescens H. Berol., röthlicher, ⊙. m. f. Südamerika.

Drymonia Mart., Waldglocke.
grandiflora G. Don (= *Besleria grandiflora* H. B. K., p. 119).
punctata Lindl. (= *Sinningia Hartwegii* H. angl. et belg.), punktirte, 4. ♄. w. Guatimala.
spectabilis Mart. (= *Besleria spectabilis* H. B. K. = *B. splendens* Hort.), ansehnliche, 4. ♄. w. Neugranada.
suberecta van Houtte, fastaufrechte, 4. ♄. w. Brasilien.

Drymophloeus Zipp., Hainpalme, ? XXII. VI. (VI. III.), Palmae.
Zippelii Hassk., Zippelius's, ♄. w. Java.

Dubyaea DC. (J. C. Duby, Pastor in Genf, Verfasser mehr. bot. Werke), XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.
sonchoidea DC. (= *Lasiopus sonchoides* DC., p. 446).
Dubyaea melastomoides DC., v. Diplusodon speciosus, p. 206, 11.
Duchesnea fragarioides Sm., v. Fragaria indica, p. 336.

Duranta L., Duranta.
Fischeri Mart., Fischer's, ♄. w. Brasilien.
microphylla Desf. (= *D. Ellisia* L. var. Spgl.), kleinblätterige, ♄. w. Westindien.

Duvaua Kunth, Duvaua.
dependens DC. (= *Amyris polygama* Cav. = *Schinus dependens* Ortega).
longifolia Lindl., langblätterige, ♄. k. f. b. Buenos Ayres.
ovata Lindl. (= *D. Molle* Bertero).

Dyckia Schult. fil. et Mart., Dyckia.
altissima Hort. Makoy., höchste. 4. w. Brasilien.
rariflora Mart., Schult. fil., sparsamblumige, 4. w. Brasil.
remotiflora Otto, Dietr., entferntblumige, 4. w. Brasilien.
densiflora Mart. Schult. fil., et dissitiflora Schult. fil. Mart., beide 4. und in Brasilien heimisch, scheinen nicht kultivirt zu werden.

Dyschoriste N. E., Dyschoriste, XIV. II., Acanthaceae.
littoralis N. E. (= *Ruellia littoralis* L. Suppl.), strandliebende, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Dyschoriste
radicans N. E. (= *Ruellia radicans* Hochst. et Steud. (non Wall.) = *R. Hochstetteri* Steud.), wurzelnde, 4. ♄. w. Abyssinien.
α) diffusa N. E., β) minor N. E.

Dysophylla Blume, Stinkmünze. Vergl. p. 277.
Auricularia Blume (= *Mentha Auricularia* L. mant., p. 510 = ? *M. foetida* Lam.).
pumila Benth. (= *Mentha pumila* Grah. = *M. quadrifolia* Hamilt. = *M. verticillata* D. Don, Hook. in Bot. mag., non Roxb.), kleine, 4. Wa. k. Ostindien, Nepal.
quadrifolia Benth. (= *Choteckia sericea* Opiz et Corda = *Mentha quadrifolia* Roxb., non Don).
stellata Benth. (= *Mentha malabarica* Heyne = *M. quaternifolia* Roth = *stellata* Hamilt., non Lour.), sternförmige, 4. t. w. Ostindien, China.
Ob D. cruciata Benth. (= *Mentha quadrifolia* Don, non Roxb.) et verticillata Benth. (= *Mentha verticillata* Roxb. = *stellata* Lour.), beide 4. in Nepal und Ostindien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Dyssodia Cav., Dyssodia.
fastigiata DC. (= *Boebera fastigiata* H. B. K.), gipfelständige, ☉. f. m. Mexico.

Ebenus L. Adans., Ebenus.
Sibthorpii DC. (= *pinnata* Sibth. et Sm.), Sibthorp's, ♂. k. f. b. Griechenland.

Echeandia Ortega, Echeandia, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae-Conanthereae.
terniflora Ortega (= *Conanthera Echeandia* P. = *Anthericum reflexum* Cavan.), dreiblumige, 4. t. k. Chili.

Echenais Cass., Rauschdistel.
Sieversii Schrenk., C. A. Mey., Siever's, ♂. f. Asiatisches Rufsland.

Echeveria DC., Echeverie.
acutifolia Lindl., spitzblätterige, ♄. k. t. Mexico.
bifida Schltdl., zweispaltige, ♄. k. t. Mexico.
bracteolata Lk., Kl., Otto, deckblätterige, ♄. t. Caracas.
caespitosa DC. (= *Cotyledon caespitosa* DC. = *C. linguiformis* RBr. = *C. reflexa* W. = *Sedum Cotyledon* Jacq.), rasenartige, 4. ♄. t. k. Californien.
campanulata Kunze, glockenblumige, ♄. t. k. Mexico.
fulgens van Houtte, funkelnde, ♄. t. k. Mexico.
pumila van Houtte, kleine, 4. ♄. t. k. Mexico.
rosea Lindl., rosafarbige, 4. ♄. t. k. Mexico.
Scheerii Lindl., Scheeri's, 4. ♄. t. k. Mexico.
secunda Lindl., einseitige, 4. ♄. t. k. Mexico.
teretifolia DC. (= *Sedum teretifolium* Moç. Sess.), stielrundblätterige, 4. ♄. t. k. Mexico.

Echinacea Mönch., Stachelkopf.
angustifolia DC. (= *pallida* Nutt. = *americana* Hort.), schmalblätterige, 4. f. b. k. Mittelamerika.
serotina DC. (= *Rudbeckia hispida* Hoffmgs. = *serotina* Sweet = *speciosa* Lk. (non Wender.), = *R. purpurea* β Natt.).

Echinocactus Salm Dyck, v. Cacteae, p. 182, 872 et 84, II.

Digitized by Google

Echinoloma arenarium Jacq. fil., v. Acicarpha spathulata, p. 12.

Echinonyctanthus Lemaire, v. Echinopsis, p. 873 et p. 93, II.

Echinops L., Kugeldistel.

cornigerus DC., hörnertragende, 4. k. Ostindien.

dahuricus Fisch. (= *Gmelini* Ledeb. = *latifolius* Tausch.). Gmelini Turcz. (= *Turczaninowii* Trautv.).

horridus Dsf. (= *orientalis* Trautv. = *sphaerocephalus* L. var. Spgl.).

humilis MB. (= *eriophorus* Steven = *lanatus* Stephan.).

niveus Wall., schneeweisser, 4. k. Ostindien.

persicus Stev., Fisch. (= *pungens* Trautv.).

platylepis Trautv. (= *humilis* Rchb. (non MB.) = *tauricus* Hort., non W.).

Ritro L., *β*) tenuifolius Fisch. (= *ruthenicus* MB.), *γ*) polycephalus Gouan, *δ*) wolgaricus Endl., *ε*) hybridus Endl.

sphaerocephalus L. (= *maximus* Sievers = *multiflorus* Lam. = *strictus* Sims).

tricholepis Schrenk, haarschuppige, 4. f. Asiat. Rufsland.

Echinopsilon Moq. Tand., Stachelborste, V. II., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

eriophorum Moq. Tand. (= *Willemetia eriophora* Moq. Tand. = *Kochia eriophora* Schrad., p. 488 = *Salsola erianthe*, *eriophora*, *lanata et laniflora* Hort.), ☉. f. Spanien, Berg Sinai.

lanatum Moq. Tand. (= *Kochia hyssopifolia* Roth, p. 438 = *Chenopodium lanuginosum* Roth, Mch. = *C. villosum* Hort. = *Salsola hyssopifolia* Pall. MB. = *Suaeda hyssopifolia* Pall. = *Willemetia lanata* Maerkl.), wollige, ☉. f. Sibirien, Ungarn, Caucasus, Barbarei.

muricatum Moq. Tand. (= *Kochia muricata* Schrad. = *Bassia muricata* All. = *Cornulaca muricata* Delil. = *Salsola muricata* L. = *Suaeda muricata* Pall. = *Willemetia muricata* Moq. Tand.), weichstachelige, ☿. k. Südeuropa, Nordafrika.

sedoides Moq. Tand. (= *Kochia sedoides* Schrad., p. 438 = *Salsola cinerea* W. K. = *S. muricata* MB. = *S. sedoides* Pall. = *Willemetia sedoides* Moq. Tand.).

Echinospermum Sw., Lehm., Stachelsaame.

affine Kar. et Kiril., ähnelnder, ☉. f. Soongaria.

brachycentrum Ledeb., kurzhaackiger, ♂. f. Sibirien.

diploloma Fisch. et Mey., Schrenk, doppelsaumiger, ☉. f. Sibirien.

heteracanthum Ledeb., verschiedenhaackiger, ☉. f. Astrachan.

macranthum Ledeb., grofsblumiger, ☉. ♂. f. Sibirien.

microcarpum Ledeb., kleinfrüchtiger, ☉. ♂. f. Sibirien.

patulum Lehm. (= *Rochelia squarrosa* R. et S. excl. Syn. = *Myosotis squarrosa* MB., non Retz).

Redowskii Lehm. (= *intermedium* Ledeb. = *Myosotis Redowskii* Hornem. = *Rochelia Redowskii* R. et S.), Redowski's, ♂. f. Asiat. Rufsland.

semiglabrum Ledeb., halbkahler, ☉. f. Sibirien.

strictum Ledeb., steifer, ☉. f. Sibirien.

tenue Ledeb., dünner, ☉. f. Sibirien.

stylosum Kar. et Kiril., langgriffeliger, ☉. f. Soongaria.

Digitized by Google

cristatum Bong. Bunge, v. Omphalodes cristata, *gracile* Lehm., v. Pectocarya chilensis, *leiocarpum* Fisch. et Mey., v. Krynitzkia leiocarpa, p. 881, *minimum* Lehm. et *Szovitzianum* Fisch. et Mey., v. Heterocaryum minimum et Szovitzianum, *virginicum* Lehm., Frank., v. Cynoglosum Morisoni, — *cynoglossoides* Hort., v. Cryptantha microcarpa, p. 287.

Echiochilon (= *Chilochium* Rafin.), Stachellippe, V. r., Asperifoliaceae.

fruticosum Dsf. (= *Lithospermum divaricatum* Sieber), strauchige, ♄. k. t. Nordafrika, Arabien, Palästina. *Echioides grandiflora* Dsf., *lutea* Dsf., *nigricans* Dsf., *rosea* Poir., *violacea* Dsf., v. Nonnea grandiflora, lutea etc., p. 549 etc.

Echites P. Brown, Klammerstrauch.

auriculata Stadelm, geöhrter, 4. ♄. w. Brasilien.

bicolor Pohl, Hort. belg., zweifarbiger, 4. ♄ w. Südamer.

Carassa Hort. belg., Carassa-K., ♄. w. Südamerika.

Catesbaei G. Don (= *Vinca lutea* L. spec.), Catesbaei's, 4. ♄. Sch. t. w. Bahama.

chilensis A. DC. (= *pubescens* Hook.), chilesischer, 4. Sch. w. Chili.

Cururu Mart., Cururu-K., ♄. Sch. w. Brasilien.

lasiocarpa A. DC. (= *hirsuta latifolia* Stadelm., non R. et Pav. nec Rich.), haarfrüchtiger, ♄. Sch. w. Brasilien.

β) augustifolia Stadelm., γ) Lobbiana DC. (= *hirsuta* Hook. bot. mag.).

longiflora Dsf. (= *augusta* Vellozo).

speciosa H. B. K. (= *Exothostemon speciosum* G. Don), prächtiger, 4. ♄. Sch. w. Südamerika.

suaveolens A. DC. (= *Mandevilla suaveolens* Lindl.), gutriechender, 4. ♄. Sch. w. Buenos Ayres.

torosa Jacq., β) Brownei A. DC. (= *torulosa* Lam.).

trichotoma Dsf., dreizinkiger, ♄. Sch. w. ?

Velame St. Hil., Velame-K., ♄. w. Brasilien.

Außerdem kommen in den Verzeichnissen der belgischen Gärten noch vor: picta (= ? *melaleuca*), primula, rosacampestris.

annularis L. fil., *nutans* Anders. (= *venosa* Hort.), *sanguinolenta* Juss., v. Haemadictyon annulare, nutans et sanguinolentum, *corymbosa* Jacq. et *floribunda* Sw., v. Forsteronia corymbosa et floribunda, — *atropurpurea* Lindl., *crassa* Hort. (= *crassinoda* Gardn.), *splendens* Lindl., v. Dipladenia atropurpurea etc., p. 205, II., *purpurea* Hort. belg., v. Tylophora lutescens, *scholaris* L., v. Alstonia scholaris, p. 39, *suberecta* Andr., v. Neriandra suberecta, *venenata* Roxb., v. Blaberopus venen., p. 70, II.

Echium T., Natterkopf.

altissimum Jacq. (= *linearifolium* Mch. = *asperrimum* MB., non Lam. = *italicum* Lehm.), höchster, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Caucasus.

arenarium Gussone (= *diffusum* Guss. = *setosum* Delil, non Vahl), sandliebender, ⊙. ♂. f. Sicilien, Calabrien, Aegypten.

β) Sieberi DC. (= *prostratum* Sieb.).

Digitized by Google

Echium

calycinum Vivian. (= *lusitanicum* All. = *ovatum* Poir. = *prostratum* Tenore), grofskelchiger, ⊙. f. Italien, Griechenland, Mauritanien.

β) erectum DC. (= *parviflorum* Mch., Roth = *micranthum* Schousb.).

candicans L. fil. (= *virescens* DC. = *madeirense* Hort.).

creticum L. (= *angustifolium* Mill., non Lam. = *australe* Lam., non Tenor. = *rubrum* Mch., non Jacq.).

cynogloſſoides Dsf. Hort. Paris.

dahuricum G. Don, dahurischer, ♂. f. Dahurien.

fastuosum Jacq. (= ? *nervosum* Ait. = *candicans* DC. Cat. hort. monspel., non L. fil.).

Fontanesii DC. (= *flavum* Dsf. = *valentinum* Lagasc.), Desfontaine's, ♂. k. f. b. Südspanien, Nordafrika.

formosum P. (= *grandiflorum* Andr. Vent. etc. = *tubiflorum* Poir. = *regulariflorum* Ker = *longiflorum* Dum. Cours. = *Lobostemon formosus* Buek.).

giganteum L. fil. (= *rupestre* Salisb.).

glomeratum Poir., knaulförmiger, ♂. f. b. Syrien.

β) elongatum Lam. (= ? *papillosum* Lehm.).

lusitanicum L. (= *italicum* Brotero Hffg., Lk., non L. = *salmanticum* Lagasca).

plantagineum L. (= *lusitanicum* Mill.).

pyramidatum DC. (non Dum. Cours.) (= *italicum* L. spec. (non Lehm.) = *pyrenaicum* Dsf. = *asperrimum* Lam. (non MB.) = *pyramidale* et *luteum* Lapeyr. = *brachystachyum* Pall.), pyramidenförmiger, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa, Oriental. Nordafrika.

β) bifidum DC.

postulatum Sibth., Sm. (= *pictum* Jan = *vulgare* var. Bertol.).

Rauwolfii Delil. (= *margaritaceum* Lehm. = *Lycopsis Dioscoridis* Rauw.), Rauwolf's, ⊙. f. Aegypten.

rubrum Jacq. (= *rossicum* Gmel.), *β*) acutifolium Lehm., *γ*) thyrsoideum Vent.

sericeum Vahl (= *prostratum* Dsf. Fl. Par. Delil.), seidenhaariger, 4. ♄. k. Aegypten.

simplex DC. (= *fastuosum* Salisb., non Banks, nec Jacq.).

Simsii G. Don, Sweet (= *creticum* Bot. mag.), Sims's, ⊙. f. Südeuropa.

strictum L. fil., *β*) ambiguum DC. cat. hort. monspel.

tenue Roth (= *parviflorum* W. E. = *humile* Auct., non Dsf.), ⊙. f. Vaterland unbekannt.

thyrsiflorum Masson (= *fastuosum* Banks, non Salisb. nec Jacq.), straufsblumiger, ♄. k. Canar. Inseln.

violaceum L. mant. (= *creticum* Lam., non L. = *plantagineum* Jacq. Boiss.), *β*) grandiflorum Dsf. fl. Atl. non ejusd. arb. nec Andr. Tenor. (= *megalanthos* Lapey. = *macranthum* R. et S.), Süd- u. Westeuropa, Orient, Nordafrika, Südamerika.

vulgare L. (= *collinum* Fieb. = *pannonicum* Wierzb. = *pentagonum* Fieb. = *Opizii* Fieb. = *polymorphum* Fieb. = *recurvum* Fieb. = *Schüchtii* Fieb.), *γ*) dalmaticum Tausch, *δ*) Schifferi Lang.

Unbestimmtere: arboreum Hort., canescens Presl, dahuricum G. Don, indicum Bernh.

argenteum Berg., *argenteum β* Lehm. (= *argenteum* Roth = *ferocissimum* Andr. = *ferox* P.) etc., v. Lobostemon argenteus, ferocissimus etc., — *humile*

Digitized by Google

Dsf., v. Anchusa aggregata, p. 53, — *petraeum* Tratt., *rosmarinifolium* Vahl, v. Lithospermum petraeum et rosmarinifolium.

Eclipta L., Mehlblume.

brachypoda Mchx. (= *Amellus carolinianus* Walt. = *Grangea lanceolata* Poir.), kurzfüssige, ☉. f. Carolina.

hirsuta Bartl., rauhhaarige, ☉. f. ?

longifolia Schrad., *β)* linearis C. A. Mey., gleichbreitblätterige, ☉. m. f. Bahia.

marginata Steud. (= *erecta* MB., Fisch. et Mey. excl. Synon.), berandete, ☉. f. Gegend d. caspisch. Meeres.

patula Schrad. (= *procumbens β* DC.), ausgebreitete, ☉. f. ?

thermalis Bunge, Wasser-M., ☉. f. China.

latifolia L., v. Blainvillea latifolia, p. 71, II.

Eclopes G., DC.

cuneata Less. (= *Athanasia uniflora* L. fil. = *Relhania cuneata* L'Her.), keilförmige, ♄. t. k. Cap d. g. H.

genistaefolia DC., vergl. p. 680.

trinervis Less. (= *pungens* Cass. = *Relhania pungens* Ker), vergl. p. 680.

Edwardsia Salisb., Edwardsie.

grandiflora Salisb. (= *macrophylla* Wender.).

intermedia Tausch (= *grandiflora* var. ?), mittlere, ♄. k. t. ?

Macnabiana Grah., Macnab's, ♄. k. t. ?

chilensis Miers, *et velutina* Hort., v. Sophora macrocarpa et velutina, p. 772.

Ehretia L., Ehretie.

affinis Wall. (= *laevis* Roxb. var. ? Wall.), ähnelnde, ♄. w. Ostindien.

aspera Roxb. (= *tomentosa* Heyne) etc., v. Beureria aspera etc., p. 67, II. et p. 121.

Ehrharta Sm., Ehrharta.

longiflora Sm. (= *aristata* Thbg. = *Banksii* Gmel.), langblumige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

distichophylla LaBill., v. Tetrarrhena distichophylla.

Eichhornia Kunth, (F. Eichhorn, k. preuss. Staatsminister), VI. 1., Commelynaceae.

azurea Kunth (= *Pontederia azurea* Sw., p. 647).

speciosa Kunth (= *Pontederia crassipes* Mart., p. 647 = *P. azurea* Hook., non Sw.).

Elaeagnus T., Oleaster (wilder Oelbaum).

acuminata Lk., Loud. (= *argentea* Colla, non Pursh), hortensis MB., *α)* angustifolia L. spec., *β)* songarica Fisch., *γ)* tiflensis Fisch., *δ)* eriwanensis Fisch., *ε)* dactyliformis Hort., *ζ)* orientalis L. (= *tomentosa* Mch.), *η)* spinosa L.

nepalensis Hort. Dyck, nepalscher, ♄. k. t. Nepal.

parvifolia Royle, Wall. (= *reflexa* Hort.), kleinblätteriger, ♄. k. t. Ostindien.

pungens Thbg., stechender, ♄. k. t. Nepal.

Unbestimmtere: chrysophylla Hort., cyanea Ait., flava Hort., fusca Hort.

Elaeis melanococca G. (= *Alfonsia oleifera* H. B. K.).

Elaeocarpus L., Oelfrucht.

albus Makoy, weifse, ♄. t. k. ? Ostindien.

grandiflorus Sm., grofsblumige, ♄. t. Neuholland.

resinosus, Bl., harzgebende, ♄. w. Java.

dentatus Vahl, *recticulatus* Sm. (= *cyaneus* Sims), v. Monocera dentata et reticulata.

Digitized by Google

Elaeodendron Jacq., Oelstrauch.
angustifolium H. Ceis., schmalblätteriger, ħ. ħ. w. ?
capense Eckl., Zeyh., capischer, ħ. t. k. Cap d. g. H.
trinerve H. Madrit., dreinerviger, ħ. t. w. ?
xylocarpum DC. (= *Cassine sphaerocarpa* H. Par. = *C. xylocarpa* Vent.).
laurinum et *oleoides* (Eckl. Zeyh.), v. Scytophyllum laurinum et oleoides.

Elaeoselinum K., Oelsilge, V. 11., Umbelliferae.
foetidum Boiss. (= *Thapsia foetida* L., p. 806).
meoides K. (= *Laserpitium meoides* Dsf., p. 446 = *Thapsia meoides* Gussone), meumähnliche, 4. k. f. h. Nordafrika, Sicilien.

Elatine T. L., Tannenwedel.
minima Fisch. et Mey. (= *americana* Auct. = *Peplis americana* Pursh = *Crypta minima* Nutt.), kleinster, ⊙. f. Nordamerika.
paludosa Seubert (= *Hydropiper* Sm. et Auct.; *α*) hexandra DC., *β*) octandra Seub. (= *Hydropiper* Schk. = *major* A. Braun).
Eleogiton atropurpureus A. Dietr., v. Heleocharis atropurpurea, *fluitans* Lk., v. Isolepis fluitans, p. 425, *parvula* Lk., v. Limnochloa parvula, p. 464.

Elephantopus L., Elephantenfuss, XIX. 1., Compositae-Vernoniaceae.
carolinianus W. (= ? *tomentosus* L. = *flexuosus* Rafin. = *scaber* Mch., Sw.).
angustifolius Sw. (= *nudiflorus* Spgl. non W.), v. Elephantosis angustifolia.

Elephantorrhiza Benth., Elephantenwurzel, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.
Burchellii Benth. (= *Prosopis elephantorrhiza* Spgl. = *P. elephantina* E. Mey. = *Acacia elephantorrhiza* Burch.), Burchell's, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

Elephantosis Less., Elephantose, XIX. 1., Compositae-Vernoniaceae.
angustifolia Less. (= *Distreptus angustifolius* Cass. = *Elephantopus angustifolius* Sw., p. 284 = *E. nudiflorus* Spgl. non W.).
biflora Less., zweiblumige. 4. w. Brasilien.
quadriflora Less. (= *Piatroides* Fisch. et Mey., p. 285), vierblumige, 4. w. Brasilien.

Eleusine G., Eleusine.
cerealis Ehbg., Getreidegebende, ⊙. f. Aegypten.
flagellifera N. E. (= *arabica* Hochst. et Steud.), peitschentragende, 4. w. Arabien, Ostindien.
floccifolia Spgl., Kl. (= *Cynosurus floccifolius* Forsk. = *Chloris floccifolia* Poir.), flockigblätterige, ♂. 4. w. Arabien.
gonantha Schrank, kantenblumige, 4. w. Brasilien.
indica G. (= *Chloris repens* Hort.), *β*) distachya Trin. (= *Agropyrum geminatum* Schult. = ? *Cynosurus pectinatus* Lam. = ? *Triticum geminatum* Spgt.).
oligostachya Lk. (= *erythrosperma* Jan = *indica γ brachystachya* = *leucosperma* Bernh. = *rigida* Spgl. = *Cynosurus rigidus* H. Berol.).
ovalis Ehbg., eiförmige, ⊙. f. Aegypten.
Tocusso Fresen. (= ? *stricta* Roxb.).
tristachya Kunth (= *Cynosurus tristachyus* Lam.), dreiährige, ⊙. f. Montevideo.

Digitized by Google

brevifolia Hochst. et Steud., v. Coelachyrum brevifolium, p. 152, II. — *aegyptiaca* P. (= *pectinata* Mch.), *mucronata* Mühlbg., *prostrata* Spgl., v. Dactyloctenium aegyptiacum, mucronatum et prostratum, p. 250. Hinsichtl. d. übrigen s. Leptochloa. p. 355.

Eleutherine Herb., Lindl., Käferschwertel, VI. 1., Irideae.

anomala Herb. Bot. reg., abweichende, 4. t. ?

Elisena Herb. (= *Liriopsis* Rchb.), Elisena, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

longipetala Herb. Lindl, langkronige, 4. Zw. t. w. Lima. *Elmigera barbata* Rchb., v. Pentastemon barbatus.

Elodea Adans. (Helodea), Elodea, XVIII. 11., Guttiferae-Hypericineae.

aegyptiaca Endl. [1]) (= *Hypericum aegyptiacum* L., p. 409 = *Triadenia microphylla* Spach.).

axillaris Spach (= *petiolata* Pursh = *Hypericum paludosum* Chois. = *H. axillare* Mchx. = *petiolatum* Walt.), achselständige, 4. f. Nordamerika.

floribunda Spach (= *Hypericum petiolatum* Leconte, non Walt.), blüthenreiche, 4. f. Nordamerika.

Fraseri Spach (= *canadensis* Fras. fil. = *Hypericum Fraseri* Steud.), Fraser's, 4. f. Nordamerika.

palustris Ledeb. (= *Hypericum Elodes* L., p. 409).

pulchella Roxb. (= ? *Hypericum pulchellum* W. E. Suppl.), schöne, 4. k. Ostindien. Zu ergänzen p. 285.

virginica Nutt. (= *campanulata* Pursh. = *Martia campanulata* Spgl. = *Triadenia purpurascens* Rafin. = *Hypericum virginicum* L., p. 411).

Elodea canadensis Mchx., v. Udora verticillata, p. 828.

Elsholtzia W., Elsholtzie.

blanda Benth. (= *Aphanochilus blandus* Benth., p. 68 = *Mentha blanda* Wall. = *Perilla elata* D. Don).

incisa Benth. (= *Aphanochilus festens* Benth. = *A. incisus* Benth., p. 68 = *A. paniculatus* Benth. = *Hyptis stachyoides* Lk. = *Mentha blanda* DC., Lindl. (non Wall.) = *M. festens* Wall. = *M. incisa* Wall. = *Perilla leptostachya* D. Don).

pilosa Benth. (= *Aphanochilus pilosus* Benth.), behaarte, ⊙. f. Ostindien.

polystachya Benth. (= *Aphanochilus polystachyus* Benth. = *Mentha polystachya* Wall. = *Perilla fruticosa* D. Don, p. 607), vielährige, ♄. k. t. Ostindien.

Stauntoni Benth., Staunton's, 4. ♄. k. Ostindien.

ocymoides P., v. Geniosporum prostratum, *paniculata* W., v. Pogostemon paniculatum.

Elvira Cass., Elvira, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

biflora DC. (= *Martini* DC. = *Delilia Besleri* Spr. = *Meratia Sprengelii* Cass. = *Milleria biflora* L., p. 924), zweiblumige, ⊙. w. m. f. Südamerika.

Elymus L., Haargras.

angustatus Trin., verschmälertes, 4. f. Sibirien.

canadensis L. (= *philadelphicus* L. = *Hordeum patulum* Mch.).

condensatus Presl, gedrängtähriges, 4. f. Nordamerika.

crinitus Schreb. (= *hordeiformis* Hort. = *intermedius* MB. = *Hordeum crinitum* Dsf. = *H. jubatum* Dsf.).

dasystachys Trin., rauchähriges, 4. f. Sibirien.

---

1) Catalog. hort. academ. Vindob. II., p. 869.

Digitized by Google

Elymus
hordeiformis Dsf., gerstenähnliches, 4. f. ?
junceus Fisch., simsenähnliches, 4. f. Sibirien.
lanuginosus Trin., Ledeb., wolliges, 4. f. Sibirien.
mexicanus Cavan., mexicanisches, 4. f. b. k. Mexico.
ovatus Ledeb. Trin. (= *obtusus* Kunth), eiförmiges, 4. f. Sibirien.
virginicus L. (= *durus* Hort. = *Hordeum cartilagineum* Mch.).

Elyna Schrad., Hüllriet.
schoenoides C. A. Mey., Ledeb. (= *Carex curvula* MB.), knopfgrasähnliches, 4. f. Caucasus.

Elytraria tridentata Vahl (= *imbricata* P., p. 286 = *Justicia imbricata* Vahl).

Elytropappus Cassin., DC., Schildfederchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.
ambiguus DC. (= *Achyrocome ambigua* Schrk. = *Stoebe cinerea* Sieb. (non Thbg.) = *St. mucida* E. Mey. = *St. ? subulata* Sm.), zweifelhaftes, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Embothrium Forst., Prachtstrauch.
integrifolium H. Mackoy., ganzblätteriger, ♄. t. ?
Emerus major et *minor* Mill., v. Coronilla Emerus.

Emilia Cass., Emilie, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.
citrina DC. (= *Cacalia citrina* Boj.), citronfarbige, ☉. m. f. Madagascar.
sagittata DC. (= *flammea* Cass. = *Cacalia sagittata* Vahl excl. Synon., p. 141 et 871), β) coccinea Swt. (= *Cacalia coccinea* Curt. = *C. sonchifolia* Hortul., non L.).
sonchifolia DC. (= *purpurea* Cass. = *Cacalia glabra* Wall. = *C. prenanthoides* Sieber = *C. sonchifolia* L. = *Crassocephalum sonchifolium* Less. = *Senecio sonchifolius* Mch. = *Sonchus amboinensis* Hort.), gänsedistelblätterige, ☉. m. f. Ostindien, China.

Empleurum Soland., Empleurum.
ensatum Eckl., Zeyh. (= *Diosma ensata* Thbg.), schwertförmiges, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
serrulatum Ait. (= *Aitoni* Gmel. = *Diosma unicapsularis* L. fil.).

Empusaria Rchb. (= *Empusa* Lindl.), Empusarie, XX. I., Orchideae.
paradoxa (Lindl.) (= ? *Bletia bicallosa* Don = *Malaxis lanceifolia* Smith = *Stelis racemosa* Sm.), wunderbare, 4. w. Nepal.

Enarthrocarpus LaBill., Gliederschote.
lyratus DC. (= *Raphanistrum recurvatum* Juss. = *Raphanus recurvatus* P. = *R. lyratus* Forsk.), leierförmige, ☉. f. Aegypten.

Encephalartos Lehm., Hirnpalme, XXII. XII., Cycadeaceae [1]). Vergl. p. 862.
Altensteinii Lehm. (= *Zamia spinulosa* Hortul. = *Zamia spinosissima* Hortul. belg. = *spinosa* Lodd.), Altenstein's, ♄. w. Cap d. g. Hoffn.
β) angustifolia Miq. (= *glaber* Hort.), γ) semidentata Miq. (= *E. Marumii* Vriese = *Zamia spinosissima* Hort.).

---

1) Nach Miquel genera et species Cycadearum viventium.

Digitized by Google

Encephalartos

brachyphyllus Lehm. (= *Zamia cycadifolia* H. belgor.), kurzblätterige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

caffer Lehm. (= *Cycas caffra* Thbg. = *Zamia Cycadis* L. fil. = *Z. caffra* Thbg. = ? *Z. villosa* G. = *Z. elliptica* Lodd.), caffersche, ħ. w. Cap. d. g. H.

cycadifolius Lehm. (= *Zamia cycadifolia* Jacq.), cycasblätterige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

elongatus Lehm. (= *procer* Miq. = *Zamia pungens* Lodd.), verlängerte, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

Friederici Guilelmi Lehm., Friedrich Wilhelm's, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

horridus Lehm. (= *Zamia horrida* Jacq. = *Zamia tricuspidata* Hortul.), stachelige, ħ. w. Cap d. g. Hffn.

A. horridus genuinus Miq. (= *Zamia horrida* Jacq. fragm.). B. horridus Hallianus Miq. (= *E. van Hallii* Vriese).

lanuginosus Lehm. (= *horridus* var. *lanuginosa* Miq. = *Zamia lanuginosa* Jacq. = *Z. horrida* Lodd.), wollige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

β) tridens Miq. (= *tridentatus* Hort., non Lehm.).

latifrons Lehm. (= *Aquifolium* Lodd.), breitwedelige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

Lehmanni Ecklon (= *Cycas glauca* van Royen. = *Zamia Lehmanniana* Eckl. et Zeyh.), Lehmann's, ħ. w. Cap der guten Hoffnung.

longifolius Lehm. (= *pungens* Lodd. = *Zamia longifolia* Jacq. = *Z. caffra* et *Cycadis* plur. Hort.), langblätterige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

β) revoluta Miq., γ) angustifolia Miq.

mauritianus Miq. [1]), mascarenische, ħ. w. ? Mauritius.

nanus Lehm. (= *Zamia nana* Hort. = *aurea* H. Belg. = *Z. gleina* Hort.), zwergige, Cap. d. g. Hoffn.

pungens Lehm. (= *Zamia pungens* Ait. = *Z. cycadifolia* et *spiralis* plur. Hort. = *Z. occidentalis* Lodd.), stechende, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

spinulosus Lehm. (= *spinosa* Hortul.), feinstachelige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

tridentatus Lehm. (= *spiralis* H. Roterod. = *Zamia tridentata* W. = *Z. occidentalis* Hort.), dreizähnige, ħ. w. Cap d. g. Hoffn.

pruniferus Sweet, v. Zamia debilis, *spiralis* Lehm., v. Macrozamia spiralis.

Encholirium Mart, Steinlilie, VI. r., Bromeliaceae.

spectabile Mart. (= *Puya saxatilis* Mart.), ansehaliche, 4. ħ. w. Brasilien.

Enchysia Presl (= *Lourentia* Neck.), Enchysie, V. r., Campanulaceae-Lobelieae, (Lobelia Sect. III., p. 470).

erinoides Presl, repens Presl.

Enckea glaucescens Kunth, *plantaginea* Kunth etc., v. Ottonia glaucescens, plantaginea etc.

Encliandra Autor, v. Eucliandra.

Encyanthus Lour. (= *Enkyanthus* Lour., DC.), Prachtglocke.

uniflorus Benth., einblumige, ħ. r. China.

Außerdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen noch E. longifolius u. undulatus vor.

---

1) „Colitur in Palmophylacio insulae Pavonum" Miq.

Digitized by Google

Endoptera aspera DC., v. Nemauchenes aspera, *Dioscoridis* DC., v. Gatyona Dioscorides s. globulifera, p. 347.

Endressia Gay. (Endress, hat mehrere ausgezeichnete botan. Reisen unternommen), V. II., Umbelliferae.

pyrenaica Gay. (= *Meum pyrenaicum* Gay. in DC. prodrom. = *Laserpitium simplex* Lapeyr. excl. Synon.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

Entada Adans., Entada.

Gandu Hffg., javanische, ħ. Sch. w. Java.

scandens van Houtte, klimmende, ħ. Sch. w. ? Java.

Entelea RBr., Entelea.

australis RBr. (= *Apeiba* A. Rich.), südliche, ħ. t. Neuzeeland.

palmata Lindl. (= *Sparmannia palmata* Hort.).

pubescens Lindl., weichhaarige, ħ. t. Neuzeeland.

Epacris Forst., Sm., Felsbusch.

autumnalis Hort. belg. (= *coruscans*, *elegans*, *refulgens* Hort.), Herbst-F., ħ. t. k. Neuholland.

Copelandii Hort. belg., Copeland's, ħ. t. k. Neuholland.

flammea Makoy, flammender, ħ. t. k. Neuholland.

grandiflora Sm., β) coccinea Hort. belg. (= ? *splendens* Hort.).

laevigata Hort., glatter, ħ. t. k. Neuholland.

miniata Lindl. (= ? *carminibrata* Hort.), mennigrother, ħ. t. k. Neuholland.

mutabilis Hort., veränderlicher, ħ. t. k. Neuholland.

tomentosa Lindl., filziger, ħ. t. k. Neuholland.

Noch werden in den Pflanzenverzeichnissen nachstehende zum Theil ? Varietäten oder Hybriden aufgeführt: brevifolia, Hügelii, longiflora splendens, lutescens, Mühlbeckii, sparsa, Willmoreana, — *tubiflora* Hort. = obtusifolia. Hinsichtlich der übrigen siehe überhaupt Lysinema.

Epaltes Cass., Epaltes, XIX. r., Compositae-Eupatorineae.

divaricata Cass. (= *Ethulia divaricata* L., p. 316).

linearifolia DC. (= *Ethulia divaricata* Wall.), gleichbreitblätterige, ☉. f. m. Ostindien.

Ephedra L., Meertraubel.

fragilis Dsf. (= *distachya* Bové), brüchiges, ħ. k. Creta, Nordafrika, Arabien.

major Host, grofses, ħ. k. f. b. Dalmatien.

Ephippium Blume, v. Cirrhopetalum, p. 145, II.

Epidendrum L., Baumstendel.

altissimum Batem. (non Jacq.), höchster, 4. w. Bahama.

apiculatum Lk., Kl., Otto, kurzspitziger, 4. w. Mexico.

armeniacum Lindl., armenischer, 4. w. Brasilien.

articulatum Burm., Lam., gegliederter, 4. w. Westindien.

basilare Kl. (= *Stamfordianum* H. Angl.), grundständiger, 4. w. Caracas, Guiana.

bifarium Sw. (= *anceps* Sw., non Jacq.), zweireihiger, 4. w. Jamaika.

bifidum Aubl., Burm., Sw. (= *papilionaceum* Westc.), zweispaltiger, 4. w. Westindien, Guiana.

biforatum H. belg., paarigdurchbohrter, 4. w. ? Südam.

Candollei Lindl., Candolle's, 4. w. Mexico.

cepiforme Parkins., zwiebelförmiger, 4. w. Mexico.

ciliare L., β) latifolium Booth, γ) majus Booth.

cinnabarinum Salzm., hellrother, 4. w. Bahia.

citrosmum v. Houtte, orangeduftender, 4. w. ? Südamer.

Digitized by Google

Epidendrum

cochleatum L., β) majus Booth, γ) minus Booth.
crassifolium Lindl. (= *ellipticum* Lodd., non Grah.), dickblätteriger, 4. w. Antillen.
densiflorum Hook., dichtblumiger, 4. w. Mexico.
dichotomum Presl (non Paxt.), zweizinkiger, 4. w. Peru.
diffusum Sw., β) fuscum van Houtte.
dipus Lindl., zweistieliger, 4. w. Brasilien.
erubescens Makoy Cat., röthlicher, 4. w. ? Südamerika.
ferrugineum Ruiz et Pav., rostfarbiger, 4. w. Peru.
filicaule Lindl., fadenstengeliger, 4. w. Brasilien.
flexuosum Meyer, gebogener, 4. w. Guiana.
fragrans Sw. (= *cochleatum* Curt (non L.) = *linearum* Salisb.), β) cinnamomum Booth, γ) minus Booth.
giganteum H. belg. (= *Guillemianum* Hort.), riesenhafter, 4. w. ? Südamerika.
glaucescens H. Hügel., blaugrünlicher, 4. w. Jamaika.
glumaceum Lindl., spelzenartiger, 4. w. Brasilien.
glutinosum Scheidw. (= *odoratissimum* Lindl.), klebriger, 4. w. Brasilien.
grandiceps H. Hügel, grofsköpfiger, 4. w. Jamaika.
haematotum Bartl., blutfarbiger, 4. w. ? Südamerika.
japonicum H. Booth, japanischer, 4. w. Japan.
insigne H. Hügel, ausgezeichneter, 4. w. Brasilien.
inversum van Houtte, einwärtsgekehrter, 4. w. ? Südam.
ionoleucum Hflg., veilchenweifslicher, 4. w. Brasilien.
lancifolium Pavon, Lindl., lanzettblätteriger, 4. w. Mexico, Guatimala.
latilabre van Houtte, breitlippiger, 4. w. ? Südamerika.
leucochilon Lk., Kl., Otto, weifslippiger, 4. w. ? Südam.
lentiginosum van Houtte, linsenförmiger, 4. w. ? Südam.
longiflorum H. B. K., langblumiger, 4. w. Neugranada.
luteum H. Hügel., gelber, 4. w. Brasilien.
macrochilum Hook., β) roseum Booth.
marginatum Lk., Kl., Otto, (*Osmophytum*), berandeter, 4. w. Südamerika.
mexicanum Booth, mexicanischer, 4. w. Mexico.
obtusum A. DC., stumpfer, 4. w. Südamerika.
ochroleucum H. Hügel., weifsgelber, 4. w. Brasilien.
pallidiflorum Lindl., bleichblumiger, 4. w. Ostindien.
pallidum Courtois, bleicher, 4. w. ?
paniculatum R. et P., rispiger, 4. w. Peru.
Parkinsonianum Hook. (= *falcatum* Hort.), Parkinson's, 4. w. Mexico.
Parmentierii van Houtte, Parmentier's, 4. w. ? Südamer.
patens Sw., abstehender, 4. w. Westindien.
Paxtonianum Steud. (= *dichotomum* Paxt., non Presl), Paxton's, 4. w. Brasilien.
phoeniceum van Houtte, hochrother, 4. w. ? Südamerika.
polyanthum Lindl. (= *polystachyum* Pav.), vielblumiger, 4. w. Mexico.
pterocarpum Lindl., Hook., flügelfrüchtiger, 4. w. Mexico.
Quesnelianum Hort. belg. (= *dichromum* Hort.), Quesnel's, 4. w. ? Südamerika.
radiatum Lindl., strahliger, 4. w. Mexico.
radicans Pavon, wurzelnder, 4. w. Mexico.
ramosum Jacq. (= *rigidum* Lodd. (non Jacq.) = *Isochilus ramosus* Spgl.), ästiger, 4. w. Jamaica.
raniferum Lindl., froschähnlicher, 4. w. Mexico.
repens H. Hügel., kriechender, 4. w. Brasilien.

Digitized by Google

Epidendrum

roseum H. Hügel., rosafarbiger, 4. w. Brasilien.
Skinneri Batem. (= *clavatum* Lindl., non Retz).
speciosissimum H. Hügel., prächtigster, 4. w. Brasilien.
sphaerobulbon Hort. belg., kugelförmiger, 4. w. ? Südam.
squalidum Hort. belg., gelbbunter, 4. w. ? Südamerika.
subumbellatum Hffg., wenigdoldiger, 4. w. Brasilien.
superbum H. Hügel., stolzer, 4. w. Brasilien.
violaceum Jacq. (non Lodd.), violetter, 4. w. Südamer.
viscidum van Houtte, schmieriger, 4. w. ? Südamerika.
virens Hoffg., grünender, 4. w. Brasilien.
virescens Lodd., grünlicher, 4. w. Domingo.
vitellinum Lindl., dottergelber, 4. w. Mexico (Oaxaca).
ybaguense H. B. K., ybaguensischer, 4. w. Neugranada.
Barringtoniae Sm., v. Maxillaria Barringtoniae, p. 500, *carthagenense* Jacq., *Ceboletta* Jacq., v. Oncidium carthagenense et Ceboletta, p. 557, *coccineum* Jacq., v. Ornithidium coccineum, p. 568, *cucullatum* L. (non Lindl.), v. Brassavolea cucullata, p. 130, *glaucum* Sw., *graminoides* Sw. etc., v. Dichaea glauca et graminoides etc., p. 200, II., *graminifolium* L., v. Octomeria graminifolia, p. 553, *grandiflorum* H. B. K., v. Anguloa grandiflora, p. 60, *lineare* L., v. Isochilos lineare, p. 425, *moschatum* Buchan., v. Dendrobium Calceolaria, p. 255, *ophioglossoides* L., v. Stelis ophioglossoides, p. 786, *pendulum* Roxb., v. Cymbidium pendulum, p. 180, II, *polybulbon* Sw., v. Dinema polybulbon, p. 877, *praemorsum* Roxb. et *retusum* L., v. Saccolobium papillosum et guttatum, *Renanthera* Lour., v. Renanthera coccinea, p. 680, *ruscifolium* L., v. Pleurothallis ruscifolia, p. 635, *striatum* Sw., v. Bletia hyacinthina, p. 125, *tibicinum* Batem. (= *tibicinis* Loud.), v. Schomburgkia tibicinis, *uniflorum* Lindl. (= *menanthum* Steud.), v. Hormidium uniflorum, p. 880, *violaceum* Lodd., v. Cattleya Loddigesii, p. 173, *volucre* Pet. Thouars, v. Aeonia volucris, p. 11, II.

Epilobium L., Weidenröschen.

algidum MB. (= *origanifolium* Lam. var. Spgl.), Eifs-W., 4. f. Caucasus.
anceps Fries, zweischneidiges, 4. f. Schweden.
angustifolium L. (= *Antonianum* Hort. = *speciosum* Lodd.).
chilense H. Berol., chilesisches, ☉. f. Chili.
Durieui Gay., Durieu's, 4. f. Frankreich.
dahuricum Fisch. (= *cylindricum* Don).
decumbens Dumort., niederliegendes, 4. f. Belgien.
denticulatum Wender. (= *angustissimum* Rchb. = *angustissimum* MB. β = *crassifolium* Lehm. = *Fleischeri* Hochst. = *rosmarinifolium* β DC.), gezähneltes, 4. f. Europäische Alpen.
Dodonaei Vill. (= *angustifolium* Lam. = *angustissimum* Ait. = *Halleri* Retz = *rosmarinifolium* Haenke = *Chamaenerion Halleri* Sweet), Dodonaeus's, 4. f. Europäische Alpen.
minutum Lindl. (= *Crossostigma Lindleyi* Spach), kleinstes, ♂. 4. f. Nordamerika.
sparsifolium Dumort., zersteutblätteriges, 4. f. Belgien.
umbrosum Dumort., schattenliebendes, 4. f. Belgien.

Digitized by Google

Epimedium T., Sockenblume.
colchicum Hort. belg., colchische, 4. k. f. b. Kleinasien.
elatum Morr. et Decaisn., hohe, 4. k. f. b. Persien, Ostindien.
pubigerum Morr. et Decaisn. (= *alpinum* β DC.), weichhaarige, 4. k. Kleinasien, Japan.
diphyllum Lodd., v. Aceranthus diphyllus, p. 6, II., *hexandrum* Hook. (= *Caulophyllum gracile* Dougl.), v. Vancouveria hexandra.

Epiphyllum Haw., Pfeiff., v. Cacteae, p. 872 et 98, II.

Episcia Mart., Episcia, XIV. u., Personatae-Gesneriaceae.
melittifolia Mart. (= *Besleria melittaefolia* L., p. 119).
pulchella Mart. (= *Besleria pulchella* Sims, Don, p. 119 = *B. umbellata* Banks).

Eragrostis P. B., Liebesgras.
abyssinica Lk. (= *Poa abyssinica* Jacq.) α) leucosperma, β) erythrosperma.
airoides N. E. (= *Aira brasiliensis* Raddi = *Poa airoides* Kunth), schmielenähnliches, 4. w. Brasilien.
β ? microstachya.
articulata N. E. (= *Poa articulata* Schrank), gegliedertes, ⊙. w. m. f. Brasilien.
aspera N. E. (= *Poa aspera* Jacq., p. 636).
bahiensis Schult. (= *brasiliensis* N. E. = *Poa bahiensis* Schrad. = *P. brasiliensis* Radd. = *P. polymorpha* W.), Bahia-L., 4. w. Brasilien.
benghalensis Hort. bot., bengalisches, ⊙. w. m. f. Ostind.
capillaris N. E. (= *Poa capillaris* L. = *P. caroliniana* Spgl.).
ciliaris Lk. (= *villosa* Trin. = *Megastachya ciliaris* P. B. = *Poa ciliaris* L. = *P. ciliata* Aust. = *P. elegans* Poir.).
cinnaeformis Schrad. (= *Poa cinnaeformis* Hort. Hafn. = *P. cinnoides* Hort.), Cinnaähnliches, 4. w. ?
compta Lk. (= *ciliaris* Lk. var. N. E. = *Poa compta* Kunth).
coromandelina Trin. (= *bifaria* β Wight = *Poa bifaria* Vahl), coromandelinisches, 4. w. Coromandel.
cynosuroides P. B. (= *bipinnata* P. B. = *Brisa bipinnata* L. = *Cynosurus durus* Forsk. = *Megastachya bipinnata* P. B. = *Poa cynosuroides* Retz = *Uniola bipinnata* L.), kammgrasähnliches, 4. w. Aegypten, Arabien, Ostindien.
delicatula Trin. (= *Poa delicatula* Fisch. Hort. Petropol.), zartes, ⊙. w. f. Brasilien.
elegans N. E. (= *brasiliensis* N. E. = *Poa brasiliensis* Spgl. = *P. elegans* Hffg. = *Megastachya brasiliensis* Schult.), brasilianisches, ⊙. w. m. f. Brasilien.
elongata Lk. (= *brasiliensis* γ N. E. = *Poa elongata* Jacq. = *Megastachya elongata* P. B. = *P. dependens* Hornem. = ? *P. glomerata* Dsf.).
filiformis Lk. (= *Poa Linkii* Kunth = *P. tenella* Pursh = *P. punctata* Lk. Enum.).
gracilis Schrad. (= *Poa chilensis* H. Par. (non Moris) = *P. plumosa* H. Par.), schlankes, ⊙. f. Chili.
hirsuta N. E. (= *Poa hirsuta* Mchx. = *P. simplex* Walt.), rauhhaariges, ⊙. f. Nordamerika.
Jacquini Schrad., Jacquin's, ⊙. f. ?
japonica Trin. (= ? *caudata* N. E. = *namaquensis* N. E. = *tenuissima* Schrad. = *Poa japonica* Thbg. =

Digitized by Google

Eragrostis

P. tenella RBr. = *P. tenellula* Kunth), japanisches, ⊙. f. Japan, Neuholland, Cap d. g. Hoffn.

inconstans N. E. (= *cuspidata* Link = *floribunda* Schrad. = *rufescens* Schrad. = *Calotheca cuspidata* Spr. = *Megastachya cuspidata* Schult. = *M Swainsonii* Radd. = *Poa cuspidata* Roth = *P. floribunda* Schrad.), unbeständiges, ⊙. w. f. Südamerika.

interrupta P. B. (= *Poa interrupta* RBr. = *P. glomerata* Dsf. = ? *P. intercepta* Spgl.), unterbrochenrispiges, ⊙. f. Neuholland.

laxiflora Schrad., lockerblumiges, ⊙. f. Cap d. g. H.

linearis Trin., gleichbreites, ⊙. f. Nordchina.

mexicana Lk. (= *Poa capillaris* Lk. = *P. mexicana* Lag.).

microstachya Lk. (= *aireides* β N. E.), kleinähriges, ⊙. f. Montevideo.

Neesii Trin. (= *brasiliensis* δ N. E. = *Poa auriculata* Hornem. = *P. Neesii* Kunth), Nees's, ⊙. w. f. Brasilien.

paniciformis A. Braun, hirseförmiges, ⊙. m. f. Abyssinien.

peruviana Trin. (= *Poa nana* Savi = *P. peruviana* Jacquin = *Koeleria peruviana* P. B.), peruvianisches, ⊙. w. m. f. Peru, Chili.

pilosa P. B. (= *Poa pilosa* L. = *P. tenella* Pall.), β) pectinacea (Mchx.) (= *Poa pallida* Lagasca), γ) verticillata P. B. (= *Poa chinensis* Lk., Enum. = *P. verticillata* Cav.), δ) Purshii Schrad. (= *P. diandra* Hort., non RBr.), behaartes, ⊙. f. Süd-, Mittel- u. Westeuropa, Asiat. Rufsland, Nord- u. Südamer.

poaeformis Lk. (= *poaeoides* P. B. = *minor* Host. = *vulgaris* Presl).

polytricha N. E. (= *Poa capillaris* Salzm. = *P. polytricha* Kunth), vielhaariges, ⊙. w. m. f. Bahia.

reptans N. E. (= *Megastachya hypnoides* P. B. = *M. reptans* P. B. = *Poa dioica* Vent. = *P. carinata* Poir. = *P. hypnoides* Lam. = *P. reptans* Mchx. = *P. subsecunda* Lam. = *P. Weigeltiana* Rchb.), kriechendes, ⊙. f. Nord- und Südamerika.

solida N. E. (= *rufescens* Schult., non Schrad. = ? *Megastachya Berteroniana* Schult. = *Poa solida* Kunth), dichtes, ⊙. w. m. f. Brasilien.

spectabilis Steud. (= *Megastachya spectabilis* R. et S. = *Poa amabilis* Walt. = *P. refracta* Mühlbg. = *P. spectabilis* Pursh), ansehnliches, ⊙. f. Nordamerika.

spinosa Trin. (= *Festuca spinosa* L. fil. = *Poa spinosa* Thbg.), dorniges, ♃. t. k. Cap d. g. Hoffn.

tenella P. B. (= *Poa tenella* L.), zartes, ⊙. w. f. Ostindien, Molucken.

tephrosanthes Schult. (= *poaeoides* γ Trin. = *P. polymorpha* Sieb. = *P. tephrosanthes* Spgl.), grauähriges, ⊙. w. m. f. Martinique.

Vahlii N. E. (= ? *Megastachya Swainsonii* Raddi = *Poa racemosa* Vahl = *P. Vahlii* R. et S.), Vahl's, ⊙. w. m. f. Brasilien.

Hiernach zu berichtigen u. zu ergänzen, p. 292 et 878.

Eranthemum L., RBr., Frühlingsblume.

ambiguum Schult. (= *parvifolium* Lk. Enum. = *Justicia parvifolia* Hort.).

montanum Roxb (= *Justicia montana* Roxb.), Berg-F., ♄. w. Ostindien.

Digitized by Google

Eranthemum
parviflorum RBr. (= *Justicia parviflora* Ortega), kleinblumige, 4. t. w. Mexico.
punctatum N. E., punktirte, ♄. w. ? Ostindien.

Eranthis Salisb., Frühlingsnieswurz.
uncinata Turcz., hakenförmige, 4. f. Dahurien.

Erechtites Rafin., DC., Erechtites, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
ambigua DC. (= *Senecio cacalioides* Lk., non Spgl.), zweifelhafte, ⊙. m. f. Brasilien.
carduifolia DC. (= *Neoceis carduifolia* Cass. = *Senecio carduifolius* Dsf.), distelblätterige, ⊙. f. ?
Die übrigen zu dieser Gattung gehörigen Arten als: cacalioides Less., glomerata DC. (= *Neoceis microcephala* Cass. = *Senecio glomeratus* Dsf. = *S.? multicaulis* Rich.), hieracifolia Rafin., valerianaefolia DC. (= *Crassocephalum valerianaefolium* Less.), vergl. Senecio, Sect. IV., p. 746.

Eremaea Lindl., Eremaea, XVIII. II., Myrtaceae.
ericifolia Lindl., fimbriata Lindl., pilosa Lindl., ♄. Neuholland. Ob kultivirt?
Eremanthe calycina Spach, v. Hypericum calycinum, p. 409.

Eremodaucus Bunge, Wüstenmöhre, V. II., Umbelliferae.
Lehmanni Bunge, Lehmann's, ⊙. f. Asiat. Rufsland.

Eremogone Fenzl, Wüstenmiere.
cephalotes Fenzl (= *Arenaria cephalotes* M. B.), grofsköpfige, 4. f. Taurien.
graminifolia Fenzl (= *Arenaria graminifolia* Schrad.), *α*) glabra Fenzl, *β*) pubescens Fenzl. (= *Arenaria filifolia* MB.).
procera Rchb. (= *Arenaria graminifolia* Auct. = *A. procera* Spgl.), hohe, 4. f. Ungarn, Dalmatien.
Die übrigen sind p. 878 verzeichnet.

Eremosparton Fisch. et Mey., Wüstenginster(pfriemen), XVII. IV. (XVI. VI.).
aphyllum Fisch. et Mey. (= *Genista aphylla* DC., p. 348 = *virgata* Lam. = *Spartium aphyllum* Pall.), blattloser, ♄. f. Sibirien.

Eremostachys Bunge, Ledeb., Wüstenziest, XIV. I., Labiatae.
gymnocalyx Schrenk., kahlkelchiger, ⊙. f. Asiat. Rufsland.
laciniata Bunge (= *Phlomis laciniata* L., p. 616).
molucelloides Bunge (= *Phlomis lanigera* Sievers), trichterkelchähnlicher, 4. f. Altaisch. Sibirien, Songaria.
phlomoides Bunge, phlomisähnliche, 4. f. Caucasus, Sibirien.
rotata Fisch., Mey. et Lallem., radförmiger, 4. f. ? Asiat. Rufsland.
tuberosa Bunge (= *Moluccella tuberosa* Pall., p. 528).

Eremurus MB., Schweifaffodile.
caucasicus Stev., caucasische, 4. f. Caucasus.
tauricus Stev., Weinm., taurische, 4. f. Taurien.
spectabilis MB. (= *sibiricus* Weinm. = *Asphodelus altaicus* Pall., p. 293).

Eria Lindl., Wollstendel.
armeniaca ? Lindl., armenischer, 4. w. ? Ostindien.
bractescens Lindl., deckblätteriger, 4. w. Sincapore.

Digitized by Google

Eria

convallarioides Lindl. (= *Octomeria convallarioides* Wall. = *O. spicata* D. Don, p. 553 = *Pinalia alba* Hamilt.), maiblumenähnlicher, 4. w. Ostindien.

Dillwynii Hook., Dillwyn's, 4. w. Philippinen.

excavata Lindl. (= *Octomeria excavata* Wall.), ausgegehölter, 4. w. Ostindien.

ferruginea Lindl., rostfarbiger, 4. w. Ostindien.

floribunda Lindl., blüthenreicher, 4. w. Sincapore.

longilabris Lindl., langlippiger, 4. w. Philippinen.

obesa Lindl., fetter, 4. w. Ostindien.

ovata Lindl., eiförmiger, 4. w. Philippinen.

paniculata Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.

platycaulis H. Booth., breitstengeliger, 4. w. ? Ostindien.

pubescens Lindl. (= *flava* Lindl. = *Dendrobium pubescens* Hook. = *Octomeria flava* Wall. = *O. pubescens* Spgl., p. 293).

pumila Lindl., kleiner, 4. w. Ostindien.

vestita Lindl. (= *Dendrobium vestitum* Wall.), bekleideter, 4. w. Sincapore, Philippinen.

Eriachne RBr., Wollspelze, Ill. II., Gramineae.

obtusa RBr. (= *Achneria obtusa* P. B. ? = *Aira obtusata* Spgl.), stumpfe, 4. k. Neuholland.

Zu berichtigen p. 293 [1]).

Erica T. Heide, Sect. I. et IV.

anthura Lk., blüthenschweifige, ♄. ♄. k. Dalmatien.

tenera Kl. (= *gracilis* Andr. et Hort., non Wendl.), zarte, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

In den Pflanzenverzeichnissen der Gärten werden noch folgende erwähnt: Banksii Andr. b. fl. purpureo, Cavendishiana, cerinthoides L. b. magna, colorans Andr. b. verna, cuneata, hyacinthiflora, hyemalis, Murrayana Hamilt. (Hybride), Ottonis, pubescens L. b. major, ruffa, Sebana L. b. lutea, undulata Rollison, vernix Andr. b. coccinea et c. ovata, — *rubrosepala* Sweet = rubida Lodd., p. 295 Hybrid.

Ericilla Juss., Ericilla, X. 1., Rutaceae (Diosmeae).

volubilis Juss. (= *Bridgesia spicata* Hook., Arn. = *Galvezia spicata* Bertero), windende, ♄. Sch. t. Chili.

Erigeron L., Flöhkraut (Berufskraut).

amplexicaulis Poir., H. Par., stengelumfassendes, 4. f. Nordamerika.

angustissimus Lindl., schmälstes, 4. ♄. k. Ostindien.

asperulus Fisch. et Mey., wenigrauhes, ⊙. f. ?

coronopifolius Schrk., krähenfufsblätteriges, ? ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

fastigiatus Hornem., gipfelständiges, ⊙. f. ?

fragrans Spgl. (= *Senecio fragrans* Lehm.), wohlriechendes, ? ⊙. f. ?

lanatus Hook., wollíges, 4. f. Nordamerika.

Lehmanni Spgl. (= *pusillus* Lehm., non Nutt.).

quercifolius Lam. (= *Aster quercifolius* Less.), eichenblätteriges, 4. f. b. Florida.

radicatus Hook., langwurzeliges, 4. f. Nordamerika.

spinulosus Hook. et Arn. (= *E. fasciculatus* Colla), feinstacheliges, ⊙. ♂. f. Chili.

squarrosus Lindl., sparriges, 4. f. Nordamerika.

---

1) *Aira obtusata* Mchx. (= *truncata* Mchx., p. 26), gehört als Synonym nicht hierher, sondern zu Reboulea gracilis Kunth.

Digitized by Google

Erigeron

spathulatus Vest., spatelförmiges, ⊙. f. Para.
strictissimus Wender., steifstes, 4. f. ?
uniflorus L, β) oreades Schrenk.
uralensis Less., uralsches, 4. f. Ural.

annuus L., v. Stenactis annua, p. 786, *Beyrichii* H. Berol. (= *Stenactis Beyrichii* Fisch. et Mey.), v. Phalacroloma Beyrichii, *aegyptiacus* L., *bonariensis* Hort. (= *canadensis* Tenor. = *linifolius* W. = *contortus* Dsf. = *crispus* Pourr.), *chilensis* Don, *Gouani* L., *hirtus* Thbg., *incisus* Thbg., v. Conyza aegyptiaca, ambigua, chilensis etc., p. 216 et 159, II., *graveolens* L., v. Inula graveolens, *obliquum* L., v. Blumea amplectens, p. 870, *siculum* L. et *tuberosum* L., v. Jasonia sicula et tuberosa, p. 430, *sulcatum* Mey., v. Conyza chilensis, *viscosum* Dsf. (non L.), v. Psiadia glutinosa, p. 661, — *virginicus* Hort. = carolinianus.

Erinacea Boiss., Wollklee, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

pungens Boiss. (= *Anthyllis erinacea* L., p. 65), stechender, ♄. k. Südspanien, Nordafrika.

Erinia Campanula Noullet, v. Campanula Erinus, p. 153.

Erinus procumbens Mill., v. Herpestes chamaedryoides, *verticillatus* Mill., v. Stemodia parviflora.

Eriobotrya Lindl., Wolltraube.

cordata Lindl. (= *Crataegus ferruginea* P. = *Mespilus lanuginosa* R. et P. = *Osteomeles ferruginea* H. B. K.), herzförmige, ♄. t. Peru.

elliptica Lindl., v. Cotoneaster Lindleyi, p. 163, II.

Eriocalia Sm., Wolldolde.

leucocephala* (= *Actinotus leucocephala* Benth.), weifsköpfige, ⊙. t. f. Neuholland. Ob kultivirt?

Eriocephalus Dill., Wollkopf.

africanus L. (= *septifer* Cass. = *corymbosus* Mch. = *frutescens* Ait.).

glaber Thbg. (= *decussatus* Burch. = *Tarchonanthus senecioides* L. fil.).

Eriochloa punctata Hamilt. (= *Oedipachne punctata* Lk.), v. Helopus punctatus.

Eriocladium pyramidatum Lindl., XIX. I., Compositae-Corymbiferae, Neuholland (Schwanenfluſs). Ob kultivirt?

Eriodendron DC., Wollbaum.

aesculifolium DC., roſskastanienblätteriger, ♄. w. Neuspanien.

caribaeum Don, Hook. (= *anfractuosum β caribaeum* DC. = *Bombax occidentale* Spgl. = *B. pentandrum* Jacq.).

orientale Steud. (= *anfractuosum α indicum* DC. = *Ceiba Casearia* Medik. = *C. pentandra* G. = *B. pentandrum* L. (non Jacq.) = *Gossampinus alba* Hamilt.). Zu ergänzen p. 309.

Eriophorum L., Wollgras, Sect. B.

Chamissonis C. A. Meyer (= *intermedium* Chamiss.), Chamisso's, 4. f. Altaisch. Sibirien, Schweden.

Eriophyllum caespitosum Dougl. et *oppositifolium* Nutt., v. Bahia lanata et oppositifolia, p. 58, II.

Digitized by Google

Eriospermum Jacq., Wollsame.
virgatum Hort., ruthenförmiger, 4. Zw. k. t. ?

Eriostemon Sm., Wollfaden.
Banksii Cunningh., Banks's, ħ. t. Neuholland.
brevifolius Cunningh., kurzblätteriger, ħ. t. Neuholland.
buxifolius Sm., β) intermedius Makoy.
lanceolatus G. fil. (= *australasium* Sm.).
oblongifolius Hook., länglichblätteriger, ħ. t. Neuholl.
paradoxus Sm., wunderbarer, ħ. t. Neuholland.
racemosus Endl., traubiger, ħ. t. Neuholland.
rotundifolius Cunningh., rundblätteriger, ħ. t. Neuholl.
scaber Hort. belg., scharfer, ħ. t. Neuholland.
Eriostemon alpinum Hffg., *germanicum* Hffg., *lanatum* Hffg., *lusitanicum* Hffg. etc., v. Stachys alpina etc., p. 780.

Eriotheca Schott, Endl., Wollbüchsenbaum, XVI. VIII., Bombaceae.
parviflora Schott, Endl. (= *Bombax parviflorum* Mart.), kleinblumiger, ħ. w. Brasilien.
pubescens Schott, Endl. (= *Bombax pubescens* Mart.), weichhaariger, ħ. w. Brasilien.

Erisma Rudge, Erisma.
niveum Lk., schneeweifses, ħ. w. Brasilien.
violaceum Mart. (= *Debraea violacea* Mart. et Zuccar. = *Ditmaria violacea* R. et S. = *Qualea calcarata* Lk.), violettes, w. Brasilien.
Eritheis maritima Gray, v. Inula crithmoides, p. 417.

Eritrichum Schrad., Bunge, v. Myosotis, Sect. II.
Erodendrum amplexicaule Salisb., *bombycinum* Salisb., *eximium* Salisb., *formosum* Salisb., *longifolium* Salisb., *magnificum* Salisb., *mellifluum* Salisb., *tenax* Salisb., *turbiniflorum* Salisb., *umbonale* Salisb., v. Protea amplexicaulis, longiflora, latifolia, formosa laevis, speciosa, mellifera, tenax, turbiniflora et longiflora, p. 658.

Erodium L'Her., Reiherschnabel.
affine Tenore (= *decipiens* Delil. = *gruinum* Tenor. = *laciniatum* Guss.), ähnelnder, ☉. f. Neapel.
arabicum Decaisn. (= *Bowei* Delil.), arabischer, ☉. f. Arabien.
asplenioides W. (= *muticum* L'Her. = *Geranium asplenioides* Dsf.), milzfarrnähnlicher, 4. k. Nordafrika.
fumarioides Steven, erdrauchähnlicher, 4. f. Oestl. Caucas.
Jacquinianum H. Petropol. (= *hirtum* H. Par., non W.), Jacquin's, ☉. ♂. f. k. ?
melanostigma Mart. (= *bipinnatum* Moris), schwarznarbiger, ☉. 4. f. Italien.
niveum Decaisn. (= ? *glaucophyllum* Bové), schneeweifser, ☉. f. Arabien.
petraeum W. (= *foetidum* L'Her.).
romanum W. (= *Geranium acaule* L. syst. = *G. pinnatifidum* Mch. = *G. romanum* L.), β) (*Geranium*) alpinum H. Par.
Salzmanni Delil. (= *viscosum* Salzm.).
sebaceum Delil., talgiger, ? ☉. f. Südfrankreich.
verbenaefolium Delil., eisenkrautblätteriger, ☉. f. ? Südfrankreich.
viscosum Steud. (= *Geranium viscosum* Mill., non Salzm.), schmieriger, ☉. f. ?

Erophilla DC., v. Draba, Sect. B., p. 274 u. 877.

Digitized by Google

Eruca elongata Baumg., v. Erucastrum elongatum.
Erucago campestris Desv. (= *dentata* Mch. = *glandulosa* Roel. = *monspeliaca* J. St. Hil. = *runcinata* Hornem.), v. Bunias Erucago, p. 138.

Erucaria G., Räupling.
hyrcanica DC., hyrcanischer, ⊙. f. Nordpersien.
latifolia DC., breitblätteriger, ⊙. f. Aegypten, Syrien.
persica Hort., v. Erucastrum incanum, p. 312.

Erucastrum Schimp., Spenn., Rchb., K., Mauerrauke.
elongatum Ledeb., Rchb. (= *Brassica elongata* Ehrh., p. 130 = *B. nova* Winterl = *Eruca elongata* Baumg. = *Güntheria elongata* Andrzy. = *Sinapis elongata* Spach = *S. laevigata* Habl., Pall.), verlängerte, ♂. 4. f. Ungarn, Taurien, Caucasus.
Lamarckii Spenn. (= *obtusangulum* Rchb. = *Brassica Erucastrum* L. = *Sinapis hispanica* Lam.).
Pollichii Schimp. et Spenn. (= *inodorum* Rchb. = *Brassica ochroleuca* Soyer, Willem. = *B. Pollichii* Schuttlew.).
obtusangulum Rchb. (= *Brassica obtusangula* Schuttlew. = *Sisymbrium obtusangulum* Schlchr.).
laevigata Presl, v. Sinapis laevigata, p. 760.
Hiernach zu ergänzen p. 312.
Ervilia sativa Lk., v. Ervum Ervilia.

Ervum T., Erve.
diphyllum Bess., zweiblätterige, ⊙. f. ? Volhynien.
Lenticula Schreb. (= *punctatum* Hort. = *soloniense* Wulf. = *uniflorum* Tenor. = *Cicer ervoides* Brignol. *Cicer punctulatum* Hort.).
nigricans MB. (= *sylvaticum* Fisch.).
pendulum Roth (= *dispermum* W.), überhängende, ⊙. Sch. f. Ostindien.
Tenorei Guss., Tenore's, ⊙. Sch. f. Neapel.
parviflorum Bertol., v. Vicia disperma, p. 846.

Eryngium T., Mannstreu.
anomalum Hook., Arn., ungewöhnliche, ⊙. f. Chili.
aquaticum L. (= *yuccaefolium* Mchx.).
Bonplandi Delarb. (= *Bonplandianum* H. B. K. = *microcephalum* W.), Bonpland's, 4. k. Mexico.
caucasicum Fisch., caucasische, 4. f. Caucasus.
corniculatum Lam. (= *cornutum* Don = *odoratum* H. Par. = *palustre* H. Madrit. = *suaveolens* Brouss.).
dichotomum Dsf. (= *coeruleum* MB. = *syriacum* Lam.).
dilatatum Lam. (= *amethystinum* Salzm. = *australe* Wulf. = *Bourgati* Vahl, Host. (non Gouan) = *foetidum* Forsk. = *purpuratum* Sm.).
flaccidum Hook., Arn., schlaffe, ⊙. f. Bonaria.
giganteum MB. (= *asperrimum* Delarb. = *glaucum* W.).
glomeratum Lam. (= *parviflorum* Sibth., Sm.).
intermedium Weinm., mittlere, 4. Rufsland.
Oliverianum Delarb. (= *alpinum* γ Schott), Olivier's, 4. f. Orient.
pallescens Mill. (= *amethystinum* L. var. ?), bleiche, Europa.
paniculatum Cav., rispige, 4. k. Chili.
tricuspidatum L. (= *Bocconi* Lam. = *Zanoni* Lam.).
tripartitum Dsf., dreitheilige, 4. f. ?
virens Lk., grünende, 4. f. Griechenland.
Zweifelhafte: dubium Tratt., jamaicense Hort., laeve Brouss., pentanthum Lk.

Digitized by Google

Erysymum T. L., Hederich.

I. Cheirinia Lk.

altaicum C. A. Mey., altaischer, ♃. f. Altaisch. Sibirien.

bicolor DC. (= *Cheiranthus bicolor* Hornem.), zweifarbiger, ♂. f. Schweiz.

binerve C. A. Mey., zweinerviger, ♂. f. Asiat. Rufsland.

Geyeri Rchb., Geyer's, ♂. f. ?

linariaefolium Tausch, leinkrautblätteriger, ♆. f. b. Dalmatien.

Marschallianum Andrzy., Marschall's, ♂. f. Podolien, Sibirien.

sabulosum Fisch., sandliebender, ♂. f. Sibirien.

squarrosum Jan, sparriger, ♂. f. ? Südeuropa.

tenellum DC. (= *repandum* var. Spgl.), zarter, ☉. f. Orient.

Unbestimmtere: brevirostre Tausch, chidopodum Tausch, cinereum Mch. (= *canescens* Mch.), integrifolium Tenore, longirostre Tausch, macranthum Tausch, micranthum Buek., patens Hort., patulum Hornem., Schaererianum Wallr., Schultesii Schrad. (= *Cheiranthus quadrangulus* Schult.).

II. Syrenia Andrzy.

sessiliflorum RBr. (= *cornutum* P. = *quadrangulum* Dsf. = *Cheiranthus angulatus* Schult. = *C. cornutus* Lam. = *C. montanus* Pall. = *C. quadrangulus* L'Her. = *Cheirinia sessiliflora* Lk. = *Syrenia Lamarckii* Andrzy.) [1]).

III. Conringia Lk. (= *Coringia* P., DC.).

planisiliqum Fisch. et Mey., flachschotiger, ☉. Iberien (Tiflis).

β) ochroleucum Schrenk.

alpinum Roth, Baumg., v. Arabis brassicaeformis, p. 70, *polyceratum* Lk., *supinum* Lk., v. Sisymbrium polyceratum et supinum, p. 762, *tanacetifolium* Clairv., v. Huegeninia (Sisymbr. Sect. III), tanacetifolia, p. 762.

Erythraea Ren., Rich., P., Tausendgüldenkraut.

Centaurium P. (= *Gentiana Centaurium* α L spec. = *Chironia Centaurium* W. = *Hippocentaurea Centaurium* Schult.), β) grandiflora Bivon., γ) major Lk., δ) suffruticosa Griseb.

chilensis P. (= *Cachanlahuan* R. et S. = *pallida* W. = *Chironia chilensis* W.).

latifolia Sm., β) tenuiflora Lk. (= *centauroides* Schrad. = *arenaria* Presl = *conferta* Steud. et Hochst.).

linarifolia P. (= *compressa* Hayne = *angustifolia* Wallr. = *paludosa* Schrad.), β) humilis Griseb. (= *littoralis* Sm. = *conferta* P. = *caespitosa* Lk. = *palustris* Schrad. = *Chironia pulchella* DC.), γ) tenuifolia Griseb. (= *uliginosa* W. K. = *triphylla* Schm. *Chironia linarifolia* DC. = *Hippocentaurea uliginosa* Schult.).

maritima P. (= *Chironia maritima* W. = *Gentiana maritima* L.), β) lutea R. et S. (= *Chironia lutea* Bertol.).

Massoni Sw. (= *diffusa* Woods.).

---

1) E. Perofskianum Fisch. et Mey., p. 314, gehört nach Lilja auch zu dieser Abtheilung. Vielleicht auch E. Schultesii Schrad.

Digitized by Google

Erythraea
romosissima P. (= *pulchella* Hornem. = *inaperta* Schltdl. = *Gerardi* Baumg. = *intermedia* Poll. = *Chironia inaperta* W. = *C. ramosissima* Ehrh. = *C. pulchella* Sm.), *β*) pulchella Fr. (= *Chironia pulchella* DC. = *Gentiana pulchella* Sw.), *γ*) emarginata Kit.

Zu ergänzen und zu berichtigen p. 314.

Erythrina L., Korallenbaum.
alba H. Cels., weifser, ħ. w. t. ?
Andersonii Hort., Anderson's, ħ. w. t. ?
Corallodendron L. (= *spinosa* Mill.).
fissa Presl, gespaltener, ħ. w. t. ?
laeta Dehnh., freudiger, ħ. w. t. ?
lithosperma Sweet, steinsaamiger, ħ. t. Neuholland.
marginata van Houtte, gerandeter, ħ. w. t. ?
mitis Jacq. (= ?*inermis* Mill.).
nana Bowie, Swt., zwergiger, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.
poianthos Brot., rispigblumiger, ħ. w. t. Südamerika.
β) subinermis Bot. reg.
princeps A. Dietr., fürstlicher, ħ. t. Mexico.
rosea A. Dietr., rosafarbiger, ħ. t. Mexico.
arborescens Roxb., v. Uraria Lagopus, p. 830.

Erythrochiton N. E., Erythrochite, V. t., Rutaceae.
brasiliense N. E., brasilianische, ħ. w. Brasilien.

Erythronium L., Hundszahn.
americanum Ker (= *aquatile* Salisb. = *flavum* Sm. = *aureum* Lk. = *luteum* Hort. = *angustatum* Rafin. = *Dens-canis* var. Mchx. = *lanceolatum* Pursh), amerikanischer, 4. Zw. f. b. Nordamerika.
Dens-canis L., *γ*) sibiricum Fisch. et Mey.
grandiflorum Pursh, *α*) minor Kunth, *β*) giganteum Lindl., Kunth, *γ*) albiflorum Kunth.
Nuttallianum R. et S. (= *lanceolatum* Schweinitz, non Pursh), Nuttall's, 4. Zw. f. b. Nordamerika.
revolutum Sm. (= *grandiflorum δ Smithii* Kunth), zurückgerollter, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

Erythropsis Lindl., Roth-Sterculie, XXI. x. (XVI. VII.), Sterculiaceae.
Roxburghiana Schott, Endl. (= *Sterculia colorata* Roxb., p. 787), Roxburgh's, ħ. w. Ostindien.
Erythrostemon Gilliesii Lk., Kl., Otto, v. Poinciana Gilliesii, p. 639.

Erythrostictus Schltdl., Rothmelanthie, VI. III., Melanthaceae.
gramineus Schltdl. (= *Melanthium angustifolium* W. = *M. gramineum* Cav., p. 505).
punctatus Schltdl. (= *Melanthium punctatum* Cav.), punktirte, 4. Zw. k. Nordafrika.

Erythroxylon L., Rothholz.
? americanum Hort., amerikanisches, ħ. w. Südamerika.

Escallonia Mutis, Escallonie.
Cummingii H. Cels., Cumming's, ħ. t. Südamerika.
Grahamiana Gill. (= *glandulosa* Sweet) [1]), Graham's, ħ. k. f. b. Chili.
rubra P. (= *glandulosa* Lodd. = *Stereoxylon rubrum* R. et S.). *β*) albiflora.
rubricaulis Colla, rothstengelige, ħ. t. k. Chili.

---

1) Nicht Sm. wie p. 316 steht, daher daselbst zu berichtigen.

Digitized by Google

Escallonia

Sellowiana DC. (= *resinosa* var. *dodonaeifolia* Cham., Schltdl.), Sellow's, ♄. t. Brasilien.

spectabilis H. Monac. (= *glandulosa* Hort. ? Lodd.), ansehnliche, ♄. t. Südamerika.

Eschscholtzia Chamiss., Eschscholtzie.

caespitosa Benth. (= *Chryseis caespitosa* Lindl.), rasenartige, ♂. 4. f. Californien.

californica Chamiss. (= *crocea* Benth. = *Chryseis crocea* Lindl. = *Chelidonium multifidum* Moç. Sess.).

compacta Steud., Walp. (= *Chryseis compacta* Lindl.).

Douglasii Hook. et Arn. (= *californica* Lindl. = *Chryseis californica* Lindl. = *C. Douglasii* Torr. et Gr.), Douglas's, ☉. f. Nordamerika (Oregongebiet).

Ob E. hypecoides Benth. et tenuifolia Benth., beide in Californien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

fumariaefolia Hort., v. Hunnemannia fumariaefolia, p. 405.

Ethulia L., Cass., Ethulie.

conyzoides L. (= *Vernonia formosa* Hort. Patav.).

corymbosa H. Berol. (= *Conyza scabrida* H. Berol.), traubendoldige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

eupatorioides H. Erfur., Walddostähnliche, ☉. f. ?

gracilis Delile, schlanke, ☉. f. Nordafrika, Senaar.

divaricata L et *divaricata* Wall., v. Epaltes divaricata et linearifolia, p. 222, II., *glomerata* Spgl., *paniculata* Schkr., v. Dichrocephala latifolia et sonchifolia, p. 262, *repanda* N. E., v. Cephalophora glauca, p. 180, *sparganophora* L., v. Sparganophorus Vaillantii, p. 774.

Eucalyptus L'Herit., Schönmütze.

alata Hort. angl., geflügelte, ♄. k. t. Neuholland.

albicaulis Hort. angl., weifsstengelige, ♄. k. t. Neuholl.

ambigua DC., zweifelhafte, ♄. k. t. Neuholland.

amygdalina LaBill. (= ? *globularis* Hort.).

biglandulosa H. Cels., zweidrüsige, ♄. k. t. Neuholland.

calophylla Lindl. (= *splachnocarpa* Hook.), schönblätterige, ♄. k. t. Neuholland (Schwanenfluſs).

capitellata Sm. (= *triantha* Lk. = *Metrosideros coriacea* Salisb.).

decipiens Endl., täuschende, ♄. k. t. Neuholland.

diversifolia Bonpl. (= ? *connata* Dum. Cours. = ? *piperita* H. Berol.), verschiedenblätterige, ♄. k. t. Neuh.

elata Dehnh., hohe, ♄. k. t. Neuholland.

floribunda Hügel, blüthenreiche, ♄. k t. Neuholland.

glandulosa Dsf. (= ? *tuberculata* Otto), drüsige, ♄. k. t. Neuholland.

glauca DC. (= *perfoliata* Nois. = *pulverulenta* Lk.), blaugrüne, ♄. k. t. Neuholland.

ligustrina DC. (= ? *salicifolia* Cav.), ligusterblätterige, ♄. k. t. Neuholland.

Lindleyana DC. (= *longifolia* Lindl.).

linearis Dehnh., gleichbreite, ♄. k. t. Neuholland.

longifolia Lk. (= *glaucophylla* Hffg. = *multiflora* Poir.), langblätterige, ♄. k. t. Neuholland.

macrocarpa Hook., grofsfrüchtige, ♄. k. t. Neuholland.

microphylla W., kleinblätterige, ♄. k. t. Neuholland.

occidentalis Endl., westliche, ♄. k. t. Westl. Neuholland.

pendula Page, überhängende, ♄. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Eucalyptus
perfoliata Dsf. (non Nois.), durchwachsene, ħ. k. t. Neuh.
persicifolia Lodd., β) incrassata Sieb. (= *multiflora* Poir.).
populifolia Dsf., pappelblätterige, ħ. k. t. Neuholland.
procera Dehnh., erhabene, ħ. k. t. Neuholland.
pulchella Dsf. et ? Lodd.
pulverulenta Sims (non Lk.) (= *cordata* H. Berol Lodd.), bestäubte, ħ. t. k. Neuholland.
purpurascens Lk. (= *discolor* Dsf.), β) oppositifolia Dsf.
radiata Sbr., strahlige, ħ. k. t. Neuholland.
rigida Hffg., starre, ħ. k. t. Neuholland.
robusta Sm, β) rostrata Cav.
rubricaulis Dsf., rothstengelige, ħ. k. t. Neuholland.
rudis Endl., rauhe, ħ. k. t. Neuholland.
salicifolia Cav., weidenblätterige, ħ. k. t. Neuholland.
saligna Sm. (= *angustifolia* Lk.).
scabra Dum. Cours., (= *eugenioides* Sbr. = *penicillata* Hort.).
serratifolia Dum. Cours., sägezahnblätterige, ħ. k. t. Neuholland.
tuberculata Otto, kleinhöckerige, ħ. k. t. Neuholland.
turbinata Page, aufgetriebene, ħ. k. t. Neuholland.
umbellata Dum. Cours., doldige, ħ. k. t. Neuholland.
undulata Hort. Lond., Page, wellenblätterige, ħ. k. t. Neuholland.
verrucosa H. Lond., warzige, ħ. k. t. Neuholland.
Unbestimmtere: Mahoni H. Cels. [1]).
hirsuta Lk., v. Angophora cordifolia, p. 869.
Eucapnos eximius et formosus Bernh., v. Dielytra eximia et formosa, p. 263.

Eucharidium Fisch. et Mey., Schönkerze.
grandiflorum Fisch. et Mey., grofsblumige, ⊙. f. Neucalifornien.

Euchilus RBr., Euchilus.
linearis Benth., gleichbreiter, ħ. t. Neuholland.
Euchiton Forsteri Cass. (= *pulchellus* Cass.), v. Gnaphalium involucratum, p. 362.
Euchroma coccinea et grandiflora Nutt., v. Castilleja coccinea et grandiflora, p. 125, II.

Euclea L., Euclea, XXII. x. (XI. II.), Sapotaceae-Ebenaceae.
elliptica DC. (= *Royena polyandra* L. fil., Thbg., p. 701 = *Diplonema elliptica* G. Don), elliptische, ħ. k. Cap der guten Hoffnung.
β) ambigua (= *Royena ambigua* Vent. = *Diplonema ambigua* G. Don).
Eucliandra microphylla Zuccar., *parviflora* Zuccar., *thymifolia* Zuccar., v. Fuchsia (Sect.) microphylla, parviflora et thymifolia, p. 340.

Eucnide Zuccar., Eucnide, XVI. VIII., Loasaceae.
bartonioides Zuccar., bartonienähnliche, ⊙. m. f. Mexico.

Eucomis L'Her., Schopflilie.
punctata L'Her., β) striata Don Hort. Cantabr.

Eudianthe Rchb., *coeli rosa* Fenzl, *oculata* (Lindl.), v. Lychnis coeli rosa etc., p. 482.

---

1) Ein Theil der p. 317 als „Unbestimmtere" verzeichneten Arten, sind hier berichtigend wiederum aufgeführt worden.

Digitized by Google

Eugenia Michel., Eugenie.

acris Wight et Arnott (= *Caryophyllus racemosus* Mill. = *Eugenia Pimenta β ovalifolia* DC. = *Myrcia acris* DC., p. 537 = *M. pimentoides* DC. = *Myrtus acris* Sw. = *M. aromatica* Poir. = *M. caryophyllata* Jacq. = *M. Pimenta* var. *latifolia* Roxb.).

Berteriana DC. (= *australis* Colla = *Myrtus Berteriana* Spgl.), Bertero's, ♄. w. Südamerika.

bracteosa DC. (= ? *bracteata* Arrabida), deckblätterige, ♄. w. Brasilien.

brasiliensis Lam. (= *bracteolaris* Lam. = *Myrtus Dombeyi* Spgl.), brasilianische, ♄. w. Brasilien.

citrifolia Poir. (= *Myrtus cayennensis* Spgl. = *M. Pimenta* L. var. Spgl.), citronenblätterige, ♄. w. Cayenne.

disticha DC. (= *Myrtus disticha* Sw. = *Olynthia disticha* Lindl., p. 557).

fragrans W. (= ? *montana* Aubl. = *paniculata* Jacq. = *Myrtus fragrans* Sw.).

Lindleyana DC. (= *Myrtus Lindleyana* H. B. K.), Lindley's, ♄. w. Mittägl. Amerika.

Pimenta DC. (= *Myrtus Pimenta* L. = *Pimenta vulgaris* Lindl.), Pimenta-E., ♄. w. Westindien.

pseudocaryophyllus DC. (= *Myrtus Oleaster* Mart. = *M. pseudocaryophyllus* Gomez), gewürznelkenähnliche, ♄ w. Brasilien.

In den Verzeichnissen der belgischen Gärten werden noch E. albinervia et Barneriana erwähnt.

elliptica Sm., v. Acmena floribunda *β* p. 13, *javanica* Lam., v Jambosa laurifolia, *Mini* Aubl., v. Myrcia Mini, *obovata* Poir., *obsusifolia* Roxb., v. Syzigium obovatum et Jambolanum, *pseudomalaccensis* H. Par., v. Jambosa purpurascens.

Eulophia RBr., Kammstendel.

pulchra Lindl. (= *Limodorum pulchrum* P. Th.), schöner, 4. Kn. w. Mascarenas.

viridiflora Steud. (= *virens* Bot. reg. non Spgl.), grünblumiger, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

cochlearis Steud., *crinita* Loud., *Mackai* Lindl., *maxillaris* Loud., *Murrayana* Steud., *rostrata* Steud., *stenochila* Steud., v. Zygopetalum cochleare etc., p. 865, *gracilis* Lindl., v. Galeandra gracilis.

Eumorpha elegans Eckl., Zeyh., *grandiflora* Eckl., Zeyh., *laevigata* Eckl., Zeyh., *nobilis* Eckl., Zeyh., *tabulare* Eckl., Zeyh., *variegata* Eckl., Zeyh., v. Pelargonium elegans etc., p. 595.

Eupatorium T., Walddost.

Sect. I. Genuin.

Bartlingianum Steud. (= *australe* Bartl., non Thbg.), Bartling's, ♄. t. k. Chili.

biceps Hort., zweiköpfiger, ♄. t. k. ?

deltoideum Jacq. (= *triangulare* Moç, Sess.).

dubium Poir. (= *maculatum* Hort. = *punctatum* W., non Lam.), zweifelhafter, 4. f. Nordamerika.

Engelmannianum H. Berol., Engelmann's, 4. f. Nordamerika

glabellum H. Berol., wenigkahler, 4. k. Mexico.

Milleri Steud. (= *punctatum* Mill.), Miller's, ♄. w. Vera Crux.

myosotifolium Jacq., mausöhrchenblätteriger, ♂. w. Südamerika.

Digitized by Google

Eupatorium

occidentale Hook., westlicher, 4. f. Westl. Nordamerika.
omphaliaefolium Kunth et Bouché, omphaliablätteriger, ♄. k. t. Mexico.
paniculatum Schrad. (= *microstemon* Cass.).
perfoliatum L. Auct. (= *connatum* Mchx.).
pinnatifidum Ell., fiederspaltiger, 4. f. b. k. Carolina.
punctatum Lam. (non W.), punktirter, ♄. w. Westindien.
purpureum L. spec. (? = *laevigatum* Poir. = *verticillatum* Lam, non Mühlb.). Nach Walpers gehören als Variet. hierher: E. maculatum L., dubium Poir. (= *punctatum* W.) u. verticillatum Mühlbg., W. (= *amoenum* Pursh).
resinosum Torr., harziger, 4. f. Nordamerika.
triplinerve Vahl (= *Ayapana* Vent), dreinerviger, ♄. w. Caribäen, Brasilien.
truncatum Mühlbg., W. (= *perfoliatum* L. var. = *salviaefolium* Bot. mag., non H. B. K.).
variifolium Bartl., verschiedenblätteriger, 4. f. Nordam.
verticillatum Mühlbg. (= ? *fuscorubrum* Walt. = *purpureum* Mchx., non L.), wirtelblätteriger, 4. f. Nordamerika.
Unbestimmtere: affine Wender., pumilum Wender., ramosum Mill. Maryland.

II. Bulbostylis DC.

squarrosum Cav. (= *B. Cavanillesii* DC. = *Coleosanthus Cavanillesii* Cass.).
veronicaefolium H. B. K. (= *glechomaefolium* Moç.) [1]).

E. Dalea L., *parviflorum* Sw. (= *Dalea* Hort.), v. Critonia Dalea et parviflora, p. 170, II.

Euphorbia L., Wolfsmilch.

agraria MB. (= *nitens* Trevir.).
Anacantha Ait. (= *tridentata* Lam. = *Dactylanthes tridentata* Haw.).
androsaemifolia Steud. (non Schousb. nec Presl) (= *palustris* L. var. Braun = *Galarrhoeus androsaemifolius* Haw.), blutheilblätterige, 4 f. Ungarn.
antisyphilitica Zucc., syphilisheilende, ♄. t. Mexico.
ariensis H. B. K., ariensische, 4. w. t. Neuspanien.
arvensis W. K., Acker-W., ☉. f. Ungarn.
Baselices Tenore, Baselicische-W., ♄. k. f. Italien.
Bivonae Steud. (= *fruticosa* Bivon.), Bivone's, ♄. k. Unteritalien.
Bonplandii Sweet (= *marginata* H. B. K., non Pursh), Bonpland's, 4. w. t. Neuspanien.
caespitosa Guss., Tenore, rasenartige, 4. f. b. k. Unteritalien.
Characias L, *β*) melapetala Gasparini.
Clava Jacq. (= *canaliculata* Lam.).
clusiaefolia Hook., clusiablätterige, ♄. t. Sandwichinseln.
coerulescens Haw., bläuliche, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
coscinosperma Rchb., (= *ragusana* Auct.), löchersaamige, 4. f. Italien, Dalmatien.
cotinifolia L. (= *Tithymalus cotinifolius* Haw.), perückenbaumblätterige, ♄. w. Surinam.
decumbens W. (= *procumbens* DC., non Mill.).
dendroides L. (= *laeta* Ait. = ? *divaricata* Jacq.)

---

1) p. 320 beide schon aufgenommen, aber fälschlich unter Sect. I. gestellt, daher hier berichtiget.

Digitized by Google

Euphorbia

diversifolia P. (= *heterophylla* Dsf. = *marginata* Hort. = *tauricensis* All. = *valentina* W.).

echinata Salm Dyck, stachelige, ♄. t. ?

Ehrenbergii Sweet (= *heterophylla* Ehbg.), Ehrenberg's, ⊙. f. Aegypten.

eriocarpa Bertol., wollfrüchtige, 4. f. Italien.

Esula L., *β*) racemosa Tausch, *γ*) mosana Lejeun.

filicina Portenschl. (= *pilosa* var. Roch.), farrnähnliche, 4. f. Dalmatien.

flavicoma DC. (= *carniolica* DC., non Jacq. = *flavissima* DC. H. monspel.), gelbschopfige, 4. f. Frankreich.

Fontanesii Steud. (= *dentata* Dsf., non Mchx.), Desfontaine's, ⊙. f. ?

Fructus pini Mill. (= *Commelyni* DC.).

guineensis Brot., guineische, ? ♄. w. Guinea.

Hystrix Jacq. (= *loricata* Lam.).

incompta Cesati, ungezierte, ? 4. f. Italien.

isatidifolia Lam. (= *androsaemifolia* Schousb. = *Isatis* P.), waidblätterige, 4. k. Spanien, Portugal.

Kunzei Lehm., Aegypten.

latifolia C. A. Mey., breitblätterige, 4. f. Sibiren, Caucasus.

Martiusiana Steud. (= *Kunzii* Mart., non Lehm.), Martius's, ♄. w. Brasilien.

Neumanniana H. Cels, Neumann's, ♄. w. ? Südamerika.

nicaeensis All. (= *Barrelieri* Savi = *oleaefolia* Gouan = *pulverulenta* Kit. = *serotina* Host.).

octogona H. Cels., achtkantige, ♄. t. ?

paniculata Dsf., rispige, 4. f. Nordafrika.

praecox Fisch. (= *longifolia* Güldenst. = *tenuifolia* MB.), frühe, 4. f. Taurien.

Preslii Gussone (= *maculata* L. mant. = *androsaemifolia* Presl, non Steud. = *hypericifolia* Jan, non L. = *trinervis* Bertol., non trinervia Boiss.), Presl's, ⊙. f. Sicilien.

procumbens Mill. (non DC.) (= *Caput medusae* W. *γ* = *Medusea procumbens* Haw.), niederliegende, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

provincialis W. (= ? *italica* Lam.), Provence-W., ⊙. f. Südfrankreich.

Pseudo-Chamaesyce Fisch. et Mey. (= *Chamaesyce* Ledeb.), unächtgrauliche, ⊙. f. Mittägl. Sibirien, Mongolei.

pulcherrima Karwinsk. (non W.) (= *fastuosa* Hort.), *β*) lutescens (= *lutea*) Hort.

rigida MB. (= *biglandulosa* Dsf., non W.).

serpens H. B. K. (= *humifusa* et *begoniaefolia* Hort.).

serrata L., sägezähnige, ⊙. f. Spanien, Frankreich.

spongiosa Ledeb., schwammige, ♄. t. ?

stellata W., sternförmige, ♄. t. Südafrika.

subcordata C. A. Mey., fastherzförmige, 4. f. Sibirien.

triangularis Dsf., dreiwinkelige, ♄. t. ? Cap d. g. Hoffn.

trigonocarpa Fisch, dreikantigfrüchtige, 4. f. Südrufsland.

uncinata DC. (= *procumbens* Meerb., non Mill. = *Scolopendria* Haw.).

valentina Ortega (non Auct.), valentianische, 4. f. Spanien.

Unbestimmtere: adenophylla Hort., densifolia Hort., echinocarpa Brotero (non Sbr.), Mönchiana Steud. (= *Tithymalus glaucus* Mch.), sanguinea Hort., virginica Hort. *pulcherima* W. (non Karw.) (= *Poinsettia* Buist.), v. Poinsettia pulcherrima, p. 640.

Digitized by Google

Euphrasia T., Augentrost.
azorica Wats., azorischer, ⊙. f. Azoren.
gracilis Fries, schlanker, ⊙. f. Schweden.

Euphrosyne DC., Euphrosyne, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae).
parthenifolia DC. (= *Gymnostyles parthenifolia* Moç., Sess.), mutterkrautblätterige, ⊙. f. Mexico.
xanthiifolia H. Prag. = ? Cyclachaena xanthiifolia, p. 241.

Eurotia Adans., Eurotia, XXI. IV., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).
ceratoides C. A. Mey., Moq., Tand. (= *Ceratospermum papposum* P. = *Diotis ceratoides* L., p. 267 = *Krascheninikowia ceratoides* Gülst.).
ferruginea (N. E.) (Diotis, p. 204, II).

Eurycles Salisb., Eurycles.
australasica G. Don (= *alata* Sweet = *australis* Schult. fil. = *Pancratium australasicum* Bot. reg.).
nervosa G. Don (= *nuda* Sweet. = *Crinum nervosum* Roxb.).
sylvestris Salisb. (= *amboinensis* Loud. = *coronata* Sweet = *Pancratium amboinense* L.). Vergl. p. 326.

Euryomyrtus Schauer, Aftermyrte, VIII. (X.) I., Myrtaceae.
diffusa Schauer (= *Baeckea affinis* Hook. = *B. prostrata* Hook. = *diffusa* Sieb.), weitschweifige, ♄. t. Neuholl.
thymifolia Schauer (= *Baeckea thymifolia* Hook.), thymianblätterige, ♄. t. Neuholland.

Euryops Cass., Euryops.
abrotanifolius DC. (= *comosus* Cass.).
linifolius DC. (= *Agathaea linifolia* G. Don, p. 22 = *Cineraria linifolia* L.),
tenuissimus Less. (= *carnosus* Cass. = *Othonna linifolia* Burm. = *O. speciosa* Hort. = *O. tenuissima* L.).
virgineus DC. (= *flabelliformis* Cass. = *Othonna flabellifolia* Lodd. = *O. virginica* L.), jungfräulicher, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Eurystylus P. C. Bouché, v. Canna, Sect. I., p. 115, II.

Eustachys Desv., Schönähre.
polystachya Kunth (= *Chloris polystachya* Lagasc., non Roxb. = *C. inermis* Trin.), vielstrahlige, 4. k. t. Mexico.

Eustoma G. Don, Griseb. in DC. prodr., Schönmund.
chironioides Griseb. (= *Urananthus chironioides* Benth.), chironienähnlicher, 4. t. k. Mexico.
exaltatum Griseb. (= *silenifolium* G. Don = *Gentiana exaltata* Juss. = *G. connata* W. herb. = *Lisianthus exaltatus* Lam. = *L. glaucifolius* Jacq., p. 469 = *Erythraea Plumieri* Kunth = *Chlora exaltata* Griseb., p. 139, II. = *Urananthus glaucifolius* Benth.).
Russelianum G. Don (= *Lisianthus glaucifolius* Nutt., non Jacq. = *L. Russelianus* Hook., p. 496 = *Urananthus Russelianus* Benth.).

Eutacta Salisb., Säulentanne, XXII. XIII., Coniferae.
excelsa Lk. Abiet., Endl. H. Vindob. (= *Eutassa heterophylla* Salisb. = *Araucaria excelsa* RBr., p. 72 = *Dombeya excelsa* Lamb. = *Colymbea excelsa* Spgl. = *Altingia excelsa* Loud.).

Digitized by Google

Eutacta
Cunninghamii Lk., Endl. (= *Araucaria Cunninghamii* Ait., p. 72 = *Altingia Cunninghamii* Loud.) [1]).

Eutaxia RBr., Hülseneibe.
floribunda H. belg., blüthenreiche, ♄. t. Neuholland.
parvifolia Benth., kleinblätterige, ♄. t. Neuholland.
virgata Benth., ruthenförmige, ♄. t. Neuholland.
Aufserdem wird in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch E. stricta erwähnt.
pungens Sweet = Dillwynia pungens, p. 203, II.

Euterpe G., Jissarapalme.
edulis Mart., genieſsbare, ♄. w. Brasilien.
globosa G. (= *Areca rubra* Hort.).
caribaea Spgl., v. Oreodoxa oleracea.

Euthales RBr., Euthales.
macrophylla Lindl., groſsblätterige, 4. t. Neuholland.

Eutoca RBr., Eutoca.
divaricata Benth., *β*) Wrangeliana Fisch. et Mey., A. DC.
Douglasii Benth., Douglas's, ⊙. f. Californien.
loasaefolia Benth., loasablätterige, ⊙. f. Californien.
Menziesii RBr. (= *Hydrophyllum lineare* Pursh), Menzies's, ⊙. f. Californien, Oregongebiet.
α) multiflora Lehm., Dougl. (= *Menziesii* Hook. bot. mag.), *β*) congesta Lehm. (= *echioides* et *glomerata* Dougl.).
phacelioides Benth., phacelienähnliche, ⊙. f. Californien.
sericea Grah. (= *pulchella* Lehm.).
grandiflora Benth., *mexicana* Benth., *parviflora* RBr., *viscida* Benth. (= *viscosa* Hook.), v. Cosmanthus grandiflorus etc., p. 162, II.
Eutriana curtipendula Trin., v. Atheropogon apludoides, p. 105.

Euxenia grata Chamisso (= *Baccharis chilensis* Weinm.).
Euzomum erucoides Spach, v. Diplotaxis erucoides, p. 268, *hesperidiflorum* Spach, v. Moricandia hesperidiflora, p. 531, *sativum* Lk., v. *Eruca sativa*, p, 312.

Evax G., Evax, XIX. IV., Compositae-Helichryseae.
asterisciflora P. (= *Gnaphalium asterisciflorum* Lam.), sternblumige, ⊙. f. Südeuropa, Orient.
Heldreichii Parlatore, Heldreich's, ⊙. f. Sicilien.
pygmaea P. (= *umbellata* G. = *Filago acaulis* All. = *F. pygmaea* L. = *Gnaphalium pygmaeum* Lam. = *Micropus pygmaeus* Dsf., p. 523).

Evodia Forst., Evodia.
hortensis Forst. (= *Fagara Evodia* L. fil.), Garten-E., ♄. w. Hebriden.
triphylla DC., v. Xanthoxylum Lamarckianum et Roxburghianum.

Evolvulus L., Faltenblume.
argenteus Pursh (= *Nuttallianus* R. et S.), silberfarbige, ⊙. 4. f. Nordamerika.
gypsophiloides Moric. (= *ericaefolius* Schrank), gypskrautblätterige, 4. ♄. w. Brasilien.
holosericeus H. B. K (= *distichophyllus* Mart.), sammethaarige, 4. w. Südamerika.

---

1) Araucaria Bidwilli Hook., p. 41, II. gehört auch zu dieser Gattung, daher E. Bidwilli*.

Digitized by Google

Evolvulus
incanus P. (= *virgatus* W., non Chois. = *cuspidatus* H. B. K. = *cressoides* Mart. = *Nama sericea* W.).
linifolius L. (= *fugacissimus* Hochst. = *debilis* H. B. K. = *decumbens* RBr. = ? *javanicus* Blum. = *Convolvulus linifolius* Br., L. = *C. fugacissimus* Hochst.), leinblätterige, 4. k. Neuholl., Afrika, mittägl. Amerika.
nummularius L. (= *veronicaefolius* H. B. K. = *capreolatus* Mart.).
sericeus Sw. (= *Commersonii* R. et S. = *angustissimus* H. B. K. = *Convolvulus minimus* Vitm.).
emarginatus Burm. (= *gangeticus* L.), v. Ipomoea reniformis.

Evonymus T., Spindelbaum.
bullatus Wall., blasiger, ħ. k. Nepal.
chinensis Lindl. (nec Lour.), chinesischer, ħ. k. f. b. China.
europaeus L., d) pumilus Loud.
fibrilliflorus Fisch. et Mey., faserblumiger, ħ. f. Talysch.
fimbriatus Wall., gefranzter, ħ. k. t. Nepal, Ostindien.
nepalensis Hort. anglor., nepalscher, ħ. k. f. b. Nepal.
tingens Wall., färbender, ħ. t. Ostindien.
Colpoon Lam. (non L.), v. Fusanus compressus, p. 341, *grandiflorus* Wall., *lucidus* D. Don, v. Lophopetalum grandiflorum et lucidum.
Evosma radicans van Houtte Cat. = ? Loganiae spec.
Evosmus aestivalis Nutt., *Benzoin* Nutt., *Diospyros* Nutt., v. Benzoin aestivale, odoriferum et melissaefolium, p. 65, II., *albida* Nutt., *Sassafras* Nutt., v. Sassafras albidum et officinale.

Exacum L., Bitterblatt.
bicolor Roxb., zweifarbiges, ⊙. w. Ostindien.
zeylanicum Roxb. (= *Chironia trinervis* L. = *Lisianthus zeylanicus* Spgl.), zeylonisches, ⊙. w. Ceylon.
Candollei Bast. (= *glaucum* Bast.) et *pusillum* DC., v. Cicendia Candollei et pusilla, p. 143, II., *cordatum* L. suppl., v. Belmontia cordata, p. 64, II., *filiforme* W., v. Microcalis filiformis, p. 523, *viscosum* Sm., v. Ixanthus viscosus, — *pulchellum* Pursh (= *Sabbatia pulchella* Spgl. = *Microcale pulchellum* G. Don) = Cicendia ? pulchella Griseb., ist nach Grisebach eine nicht hinlänglich bekannte Art.

Exogonium Choisy, Afterwinde, V. r., Convolvulaceae.
filiforme Choisy (= *Convolvulus filiformis* Desr. = *Ipomoea filiformis* Jacq., p. 419).
pedatum Choisy (= *Ipomoea pedata* Poit.), fufsförmige, 4. ħ. Sch. w. St. Domingo.
repandum Choisy (= *Convolvulus repandus* Desr. = *Ipomoea repanda* Jacq., p. 420), ausgeschweifte, 4. ħ. Sch. w. Westindien.
curviflorum Moç. et *umbellatum* Moç., v. Quamoclit hederaefolia et vitifolia, *dumosum* Benth. (= *Purga* Benth.), v. Ipomoea Purga, p. 420.
Eyselia bellidiflora Rchb., v. Egletes bellidiflora, p. 283.

Fabiana R. et P., Solanaceae. Zu berichtigen p. 329.
Fabricia G., Fabricie.
? glauca van Houtte, blaugrüne, ħ. k. t. Neuholland.
argentea Hort. (= *incana* Dum Cours. = *sericea*

Digitized by Google

Nois., Sweet = *minor* Hort.), v. Leptospermum tonsum, *myrtifolia* Hort. (non G.) et *angustifolia* Otto, v. Billiotia marginata et *β* angustifolia, p. 70, II.
Facchinia lanceolata Rchb., v. Alsine lanceolata, p. 39.
Fagara microphylla Dsf., v. Xanthoxylon tragodes *β*.

Fagraea Thbg., Fagraea.
diversifolia van Houtte, verschiedenblätterige, ♄. w. Ostindien.
oblonga van Houtte, längliche, ♄. w. Ostindien.

Fagus T. Buche.
americana Sweet (= *sylvatica β americana* P.), amerikanische, f. Nordamerika.
betuloides Mirb. (= *Betula antarctica* Forst.).
ferruginea Ait. (= *grandifolia* Hort. = *latifolia* L'Her. = *purpurea* Dsf. = *americana latifolia* DuRoi).
sylvatica L., e) heterophylla Loud. (= *comptoniaefolia* Dsf.).

Falcaria Dill., Host, Sicheldolde.
dahurica DC. (= *Cicuta dahurica* Fisch., p. 195 = *Critamus dahuricus* Hoffm. = *Sium cicutaefolium* Gmel. syst. = *S. latifolium β* MB.).
Rivini Host. (= *Sium Falcaria* L. = *Critamus agrestis* Bess. = *Drepanophyllum agreste* Hoffm.).

Faldermannia Bunge, Faldermannie, H. 1. (XIV. 1.), Labiatae.
parviflora Schrenk, C. A. Mey. (= *Ziziphora tenuior* Flor. altaic., excl. Synon.), kleinblumige, ☉. f. Iberien, Soongarien.
taurica Bunge (= *Ziziphora taurica* MB., p. 864 = *Thymbra spicata* Pall.).
Falimiria bromoides Bess., (= *coarctata* Bess. = *Arthrostachya coarctata* Lk., p. 85), v. Gaudinia geminiflora.

Faramea Aubl., Faramea V. 1., Rubiaceae.
odoratissima DC. (= *Coffea occidentalis* L. = *Ixora americana* L. = *Tetramerium occidentale* N. E., Mart. = *T. odoratissimum* G. fil., p. 892).
Farnesia odora Gaspar., v. Vachelia Farnesiana.
Farobaea nemorensis Schrank et *tropica* Schrk. = ??

Farsetia Turra, Farsetia.
triquetra DC. (= *Alyssum triquetrum* Portenschl.), dreikantige, ♄. k. f. b. Dalmatien.
Favonium spinosum G., v. Didelta spinosum, p. 262.

Fedia Mch., Fedie.
Cornucopiae Vahl (= *graeca* Dufr. = *incrassata* Mch. ? = *pulchella* Hort.).
graciliflora Fisch. et Mey. (= *algerica* Hort.), schlankblumige, ☉. f. Nordafrika, Sardinien.
orientalis Schltdl., morgenländische, ☉. f. Aleppo.
paniculata Colla, rispige, ☉. f. ? ?
scorpioides Dufresn., vergifsmeinnichtähnliche, ☉. f. Nordafrika.
intermedia Hornem., *rupestris* Vahl, *ruthenica* Mirb. (= *sibirica* G.), v. Patrinia intermedia, rupestris, sibirica, p. 591.

Felicia Cass., v. Aster, Sect. VIII., p. 99 et 51, II., *F. Fontanesii* Cass., v. Nolletia chrysocomoides.

Fenzlia dianthiflora Benth., v. Gilia, Sect. V.

Fernandezia R. et P., Fernandezie.
lunifera van Houtte Catal., mondförmige, ♃. w. Südamer.

Digitized by Google

Ferraria L., Ferrarie.

Ferrariola Thbg. (= *antherosa* Ker = *minor* P. = *viridiflora* Andr. = *Moraea Ferrariola* Jacq.).

major Eckl., grofse, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

purgans Mart., purgirende, 4. Zw. w. Brasilien.

pusilla Lk., Otto, v. Herbertia pusilla.

Ferula T., Steckenkraut.

caspica MB. (= *pumila* W. = *Peucedanum gracile* α Ledeb. = *P. caspicum* Lk. = *P. dubium* Ledeb.).

desertorum Ledeb., Wüsten-St., 4. f. Sibirien.

geniculata Guss. (= *rigida* Tenor. = *Bubon rigidius* Ucria), gegliedertes, 4. f. b. Sicilien, Neapel.

gigantea Hornem., riesenhaftes, 4. f. ?

rigidula β songarica Schrenk. et H. Petropolit., starres, 4. f. Soongaria.

Szowitsiana DC., Szowits's, 4. f. b. Persien.

Ungewifs: verticillata Maerkl.

Barrelieri Tenor. = nodiflora s. sulcata Dsf. — *meoides* L., v. Lophosciadium millefolium, *obtusifolia* Spgl., v. Pastinaca obtusifolia, *sibirica* Spgl., v. Peucedanum sibiricum, *racemifera* Szowits, v. Dorema glabrum, p. 272.

Ferulago nodiflora K., sylvatica K., thyrsiflora K., v. Ferula nodiflora etc., p. 330 et 331.

Festuca L., Schwingel.

binodosa Kl., zweiknotiger, 4. f. Nordamerika.

ferruginea Rchb. (= *Schedonorus ferrugineus* Vest.), rostfarbiger, 4. f. Kärnthen.

flavescens Bellardi (= *Bellardi* Schott = *dimorpha* Gussone).

Hemipoa Delile, rispengrasähnlicher, 4. f. Südfrankreich.

scabra Vahl (= *aspera* Poir.), scharfer, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Zu den zweifelhaften gehören noch: macrostachya Dsf., Urii H. Edinb. Was die übrigen anlangt, die allenfalls in botanischen Gärten kultivirt und als Festucae aufgeführt werden, so ist p. 332 auf die Gattungen verwiesen, unter welchen sie verzeichnet worden und wohin sie gehören.

Ficaria Dill., Feigwarzenkraut.

fascicularis C. Koch, büschelförmiges, 4. Kn. f. Caucasus, Armenien.

Ficinia Schrad., Ficinie.

antarctica N. E. (= *Isolepis antarctica* R. et S. = *I. diabolica* Schrad. = *Scirpus antarcticus* Thbg. L. fil., non Vahl), südliche, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

filiformis Schrad. (= *Bacothryum crinitum* A. Dietr. = *Isolepis marginata* A. Dietr. = *I. oliganthos* N. E. = *Scirpus marginatus* Thbg. = *S. oliganthos* Steud.), fadenförmige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

scariosa N. E. (= *Eleogiton scariosa* A. Dietr. = *Isolepis scariosa* N. E. = *Schoenus deustus* Berg. = *S. scariosus* Vahl (non Thbg.), *Scirpus bulbosus* Rottb. = *S. trigynus* L. mant.), trockenhäutige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Ficus T., Feigenbaum.

americana Aubl. (= *arbutifolia* Hort. = *ciliolata* Hort.).

benghalensis L. (= *vasta* Forsk.).

camelliaefolia Dieffenb., camellienblätteriger, ħ. w. t. Neuholland.

Digitized by Google

Ficus

Catesbaei Steud. (= *citrifolia* Mill.), Catesbaei's, ħ. w. Westindien.

cerasiformis Parment., Dsf., kirschförmiger, ħ. w. ?

coccolobifolia Lodd., seetraubenähnlicher, ħ. w. ?

cordata Thbg. (= *glauca* Dum. Cours. = *glaucophylla* Dsf.).

cuneata Hffg., keilförmiger, ħ. w. Brasilien.

denticulata Vahl (= *aquatica* Koen.), gezähnelter, ħ. w. Ostindien.

diversifolia Blume, verschiedenblätteriger, ħ. w. Java.

exasperata Vahl (= *aspera* Hort.).

ferruginea Parment., Dsf., rostfarbiger, ħ w. ?

Fontanesii Steud. (= *pyrifolia* Dsf., H. Par., non Burm.), Desfontaine's, ħ. w. ?

fulva Spgl. et ? Dsf. H. Par., rothbrauner, ħ. w. Brasilien.

hirsuta Schott, rauhhaariger, ħ. w. Brasilien.

intermedia Hort. Schönbr. (non Caill. et Delil.), mittlerer, ħ. w. Ostindien.

ligustrifolia Dieffenb., ligusterblätteriger, ħ. w. ?

Loddigesii* (= *quercifolia* Lodd., non Blum.), Loddige's, ħ. w. Ostindien.

macrocarpa Blume, grofsfrüchtiger, ħ. w. Java.

magnoliaefolia Blume, magnolienblätteriger, ħ. w. Java.

Neumanni Cels. (= *rigida* Dsf., non Hamilt), Neumann's, ħ. w. ?

pendula Nestl., Lk. (= *cuspidata* Dsf.).

phytolaccaefolia Dsf., kermesbeerenblätteriger, ħ. w. ?

polita Vahl (= *myrtifolia* Lk.), geschmückter, ħ. w. Guinea.

populeaster Dsf., Pappel-F., ħ. w. ?

pumila L. (= *vestita* Dsf.).

purpurascens Dsf. (non Blum.), purpurfarbiger, ħ. w. ?

radicans Dsf., wurzelnder, ħ. w. ?

reclinata Dsf., zurückgebeugter, ħ. w. ?

Reinwardtii Lk., Otto (= *fulva* Reinw., Blum., non Spgl.), Reinwardt's, ħ. w. Java.

rubra Vahl (= *pyrifolia* Lam.), rother, ħ. w. Ostindien.

rufescens Vahl (= *heterophylla* Lam., non L. fil. = *aquatica* W.), fuchsröthlicher, ħ. w. Ostindien, China.

Saussureana DC. (= *Galactodendron* spec. Hort.), Saussures, ħ. w. ?

symphitifolia Lam. (= ? *scabra* Jacq.), schwarzwurzelblätteriger, ħ. w. Java.

terebrata W. (= *pertusa* Bory).

undulata Dsf., wellenblätteriger, ħ. w. Antillen.

variolosa Lindl., kleinblattgriger, ħ. w. China.

Filago L., Faden-(Filz-)kraut.

Candolleana Parlatore (= *congesta* DC., non Gussone), Candolle's, ☉. f. Sicilien.

Fimbriaria Juss., Fimbriarie, ?X. III., Malpighiaceae.

elegans Juss., zierliche, ħ. w. Brasilien.

Fimbristylis Vahl, Franzengriffel.

Candelabrum Lk. (= ? *F. laxa* Vahl = *Scirpus Candelabrum* W.), candelaberförmiger, ? ☉. 4. w. Brasilien.

geminata Kunth (= *Trichelostylis geminata* N. E.), gepaarter, 4. w. ?

globulosa Wall., Kunth (= *umbellaris* Vahl = *Isolepis globulosa* R. et S. = *Scirpus globulosus* Retz, non Roxb. = *S. umbellaris* Lam. = *Trichelostylis globulosa* N. E.), kugelförmiger, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Fimbristilis

Humboldtii Presl (= ? *laxa* Vahl = *pallescens* Lk., non N. E. = *Isolepis dichotoma* H. B. K. = *Scirpus pallescens* W.), Humboldt's, ⊙. w. Südamerika.

pilosa Vahl (= *communis* Kunth = *elongata* Sbr. = *Scirpus fimbriatus* W.), behaarter, 4. w. Guinea.

squarrosa Vahl (= *comata* N. E. = *hirta* R. et S. = *Isolepis hirta* H. B. K. = *Scirpus aestivalis* Wall. = *S. hirtus* W. herb.), sparriger, ⊙. 4. w. Ostindien, Cap d. g. Hoffn., Südamerika.

Vahlii Lk. (= *Isolepis Vahlii* H. B. K. = *Scirpus trichophyllus* W. herb. = *S. Vahlii* Lam.), Vahl's, ⊙. w. Südamerika.

bromeliaefolia Spgl., v. Diplasia karataefolia, p. 268 et 205, II., *Micheliana* Rchb., v. Dichostylis Micheliana, p. 262 et 200, II.

Fingerhuthia ciliata N. E. (= *africana* Lehm. = *capensis* N. E.). Vergl. p. 335.

Firmiana platanifolia Schott et Endl., v. Sterculia platanifolia, p. 787.

Fischeria DC. (v. Fischer, K. russ. Staatsrath u. Director des k. botan. Gartens zu Petersburg), V. II., Asclepiadeae.

scandens DC. Catal. h. monspel. (= *Holostemma Candollcanum* Spgl.), klimmende, ♄. Sch. w. Südamerika.

Floerkea marsupiiflora Spgl. etc., v. Adenophora marsupiiflora etc., p. 18.

Florestina Cass., Florestina, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae (Eupatorineae).

callosa DC. (= *Stevia callosa* Nutt), schwielige, ⊙. f. Nordamerika.

pedata Cass. (= *Achyropappus pedatus* Less. = *Ageratum pedatum* Ortega = *Hymenopappus pedatus* Lagasca, p. 408 = *Stevia pedata* Cav.).

Flüggea japonica Rich. et *spicata* Schult., v. Ophiopogon japonicus et spicatus, p. 562.

Fluvialis minor P., v. Najas minor, p. 539.

Fockea Endl., Fockea, V. II., Asclepiadeae.

capensis Endl. (= *Cynanchum crispum* Jacq. fragm.), capische, ♄. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

glabra Decaisne, kahle, ♄. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Foeniculum T., Adans., Fenchel.

dulce DC. (= *Anethum dulce* DC. H. monspel.), süfser, ⊙. ♂. f. Italien, Portugal.

luteum Fisch., gelber, ♂. f. Persien.

piperitum DC. (= *Anethum Foeniculum* β DC. H. monspel. = *A. piperitum* Bertol. = *Meum piperitum* R. et S.), Pfeffer-F., 4. f. Südeuropa.

vulgare G. (= *officinale* All.), β) azoricum Hort.

Forbesia plicata Eckl. (= *angustifolia* Eckl.), v. Curculigo plicata, p. 240.

Forestiera Poir., Forestiera, XXII. II., Urticaceae-Forestiereae.

acuminata Poir. (= *Adelia acuminata* Mchx. = *Borya acuminata* W. et *nitida* W. E., p. 128).

ligustrina Poir. (= *Adelia ligustrina* Mchx. = *Borya ligustrina* W., p. 128).

porulosa Poir. (= *Adelia porulosa* Mchx. = *Bigelowia porulosa* Sm. = *Borya porulosa* W., p. 128).

retusa Poir. (= *Borya retusa* W., p. 128).

Digitized by Google

Ficus

Catesbaei Steud. (= *citrifolia* Mill.), Catesbaei's, ħ. w. Westindien.
cerasiformis Parment., Dsf., kirschförmiger, ħ. w. ?
coccolobifolia Lodd., seetraubenähnlicher, ħ. w. ?
cordata Thbg. (= *glauca* Dum. Cours. = *glaucophylla* Dsf.).
cuneata Hffg., keilförmiger, ħ. w. Brasilien.
denticulata Vahl (= *aquatica* Koen.), gezähnelter, ħ. w. Ostindien.
diversifolia Blume, verschiedenblätteriger, ħ. w. Java.
exasperata Vahl (= *aspera* Hort.).
ferruginea Parment., Dsf., rostfarbiger, ħ w. ?
Fontanesii Steud. (= *pyrifolia* Dsf., H. Par., non Burm.), Desfontaine's, ħ. w. ?
fulva Spgl. et ? Dsf. H. Par., rothbrauner, ħ. w. Brasilien.
hirsuta Schott, rauhhaariger, ħ. w. Brasilien.
intermedia Hort. Schönbr. (non Caill. et Delil.), mittlerer, ħ. w. Ostindien.
ligustrifolia Dieffenb., ligusterblätteriger, ħ. w. ?
Loddigesii* (= *quercifolia* Lodd., non Blum.), Loddige's, ħ. w. Ostindien.
macrocarpa Blume, grofsfrüchtiger, ħ. w. Java.
magnoliaefolia Blume, magnolienblätteriger, ħ. w. Java.
Neumanni Cels. (= *rigida* Dsf., non Hamilt), Neumann's, ħ. w. ?
pendula Nestl., Lk. (= *cuspidata* Dsf.).
phytolaccaefolia Dsf., kermesbeerenblätteriger, ħ. w. ?
polita Vahl (= *myrtifolia* Lk.), geschmückter, ħ. w. Guinea.
populeaster Dsf., Pappel-F., ħ. w. ?
pumila L. (= *vestita* Dsf.).
purpurascens Dsf. (non Blum.), purpurfarbiger, ħ. w. ?
radicans Dsf., wurzelnder, ħ. w. ?
reclinata Dsf., zurückgebeugter, ħ. w. ?
Reinwardtii Lk., Otto (= *fulva* Reinw., Blum., non Spgl.), Reinwardt's, ħ. w. Java.
rubra Vahl (= *pyrifolia* Lam.), rother, ħ. w. Ostindien.
rufescens Vahl (= *heterophylla* Lam., non L. fil. = *aquatica* W.), fuchsröthlicher, ħ. w. Ostindien, China.
Saussureana DC. (= *Galactodendron* spec. Hort.), Saussures, ħ. w. ?
symphitifolia Lam. (= ? *scabra* Jacq.), schwarzwurzelblätteriger, ħ. w. Java.
terebrata W. (= *pertusa* Bory).
undulata Dsf., wellenblätteriger, ħ. w. Antillen.
variolosa Lindl., kleinblatteriger, ħ. w. China.

Filago L., Faden-(Filz-)kraut.

Candolleana Parlatore (= *congesta* DC., non Gussone), Candolle's, ⊙. f. Sicilien.

Fimbriaria Juss., Fimbriarie, ?X. III., Malpighiaceae.

elegans Juss., zierliche, ħ. w. Brasilien.

Fimbristylis Vahl, Franzengriffel.

Candelabrum Lk. (= ? *F. laxa* Vahl = *Scirpus Candelabrum* W.), candelaberförmiger, ? ⊙. 4. w. Brasilien.
geminata Kunth (= *Trichelostylis geminata* N. E.), gepaarter, 4. w. ?
globulosa Wall., Kunth (= *umbellaris* Vahl = *Isolepis globulosa* R. et S. = *Scirpus globulosus* Retz, non Roxb. = *S. umbellaris* Lam. = *Trichelostylis globulosa* N. E.), kugelförmiger, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Fimbristilis
Humboldtii Presl (= ? *laxa* Vahl = *pallescens* Lk., non N. E. = *Isolepis dichotoma* H. B. K. = *Scirpus pallescens* W.), Humboldt's, ⊙. w. Südamerika.
pilosa Vahl (= *communis* Kunth = *elongata* Sbr. = *Scirpus fimbriatus* W.), behaarter, 4. w. Guinea.
squarrosa Vahl (= *comata* N. E. = *hirta* R. et S. = *Isolepis hirta* H. B. K. = *Scirpus aestivalis* Wall. = *S. hirtus* W. herb.), sparriger, ⊙. 4. w. Ostindien, Cap d. g. Hoffn., Südamerika.
Vahlii Lk. (= *Isolepis Vahlii* H. B. K. = *Scirpus trichophyllus* W. herb. = *S. Vahlii* Lam.), Vahl's, ⊙. w. Südamerika.
bromeliaefolia Spgl., v. Diplasia karataefolia, p. 268 et 205, II., *Micheliana* Rchb., v. Dichostylis Micheliana, p. 262 et 200, II.

Fingerhuthia ciliata N. E. (= *africana* Lehm. = *capensis* N. E.). Vergl. p. 335.
Firmiana platanifolia Schott et Endl., v. Sterculia platanifolia, p. 787.

Fischeria DC. (v. Fischer, K. russ. Staatsrath u. Director des k. botan. Gartens zu Petersburg), V. II., Asclepiadeae.
scandens DC. Catal. h. monspel. (= *Holostemma Candolleanum* Spgl.), klimmende, ♄. Sch. w. Südamerika.
Floerkea marsupiiflora Spgl. etc., v. Adenophora marsupiiflora etc., p. 18.

Florestina Cass., Florestina, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae (Eupatorineae).
callosa DC. (= *Stevia callosa* Nutt), schwielige, ☉. f. Nordamerika.
pedata Cass. (= *Achyropappus pedatus* Less. = *Ageratum pedatum* Ortega = *Hymenopappus pedatus* Lagasca, p. 408 = *Stevia pedata* Cav.).
Flüggea japonica Rich. et *spicata* Schult., v. Ophiopogon japonicus et spicatus, p. 562.
Fluvialis minor P., v. Najas minor, p. 539.

Fockea Endl., Fockea, V. II., Asclepiadeae.
capensis Endl. (= *Cynanchum crispum* Jacq. fragm.), capische, ♄. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.
glabra Decaisne, kahle, ♄. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Foeniculum T., Adans., Fenchel.
dulce DC. (= *Anethum dulce* DC. H. monspel.), süfser, ☉. ♂. f. Italien, Portugal.
luteum Fisch., gelber, ♂. f. Persien.
piperitum DC. (= *Anethum Foeniculum* β DC. H. monspel. = *A. piperitum* Bertol. = *Meum piperitum* R. et S.), Pfeffer-F., 4. f. Südeuropa.
vulgare G. (= *officinale* All.), β) azoricum Hort.
Forbesia plicata Eckl. (= *angustifolia* Eckl.), v. Curculigo plicata, p. 240.

Forestiera Poir., Forestiera, XXII. II., Urticaceae-Forestiereae.
acuminata Poir. (= *Adelia acuminata* Mchx. = *Borya acuminata* W. et *nitida* W. E., p. 128).
ligustrina Poir. (= *Adelia ligustrina* Mchx. = *Borya ligustrina* W., p. 128).
porulosa Poir. (= *Adelia porulosa* Mchx. = *Bigelowia porulosa* Sm. = *Borya porulosa* W., p. 128).
retusa Poir. (= *Borya retusa* W., p. 128).

Digitized by Google

Fornicium rhaponticoides Cass., v. Leuzea conifera, p. 460.

Forskolea L., Forskolea.

viridis Ehbg., grüne, ☉. f. Aegypten.

Forsteronia Mey., Forsteronie, V. 1., Contortae-Apocyneae.

corymbosa Mey. (= *Parsonsia corymbosa* RBr., p. 587 = *Echites corymbosa* Jacq.).

floribunda Mey., G. Don (= *Parsonsia floribunda* RBr., p. 587 = *Echites floribunda* Sw.).

Forsythia scandens Walt., v. Decumaria sarmentosa, p. 254.

Fougerouxia alba DC. (= *Milleria alba* H. Par-olim), *recta* DC. (= *Fougeria tetragona* Mchx.), v. Baltimora recta et β alba, p. 111.

Fourcroya Vent. (= *Furcraea* Auct., p. 340).

cubensis Haw. (= *agavephylla* Brotero = *tuberosa* β Ait. = *Agave mexicana* β Lam. = *A. odorata* P.).

rigida Haw., β) ? Agave aspera Jacq.

tuberosa Ait. (= *spinosa* Targ., Tozzet. = *Agave angustifolia* H. Par.).

Fragaria T., Erdbeere.

calycina Loisel. (= ? *collina* Ehrh. = *grandiflora* Thuill. = *vesca grandiflora* DC.), großkelchige, 4. f. Frankreich.

californica Schltdl., californische, 4. f. Californien.

chilensis Molin., β) ananassa Duches., γ) calyculata Duches. (= *carolinensis* Duches., δ) tincta Duchesn.

collina Ehrh., β) breslingia Duches. (= *abortiva* Duches.), b) nigra Duches., c) pendula Duches., d) hispida Duches., e) viridis Duches., f) pratensis Duches. (= *vesca* β *pratensis* L.).

Hagenbachiana Lang. (= *collina* Ehrh. var.? = ? *majaufea* Duches. = *bifera* Duches.), Hagenbach's, 4. f. Breisgau.

indica Andr. (= *malayana* Roxb.).

mexicana Schltdl., mexicanische, ♄. f. Mexico.

vesca L., η) minor Duches., ϑ) hortensis Duches., ι) monophylla Duches. (= *abnormis* Tratt. = *unifolia* Hall.), κ) multiplex Duches., λ) botryformis Duches., μ) pentaphylla, ν) fol. variegatis.

Francisceа Pohl, (Franz II., Kaiser von Oesterreich, großer Beförderer der Botanik), XIV. 11., Personatae-Brunfelsieae.

hydrangeaeformis Pohl, wasserstrauchähnliche, ♄. w. Brasilien.

latifolia Pohl, breitblätterige, ♄. w. Brasilien.

ramosissima Pohl (= *Gardoquia obovata montevidensis* Spgl. = *Gerardia brasiliensis* Spgl.), ästige, ♄. w. Brasilien.

uniflora Pohl (= *Hopeana* Hook. = *Brunsfelsia uniflora* Don, p. 336).

villosa Lodd. (= *Pohleana* Hort. belg.), zottige, ♄. w. Brasilien.

mutabilis Hort. = ?

Frankenia L., Frankenie.

pauciflora DC. (= *virens* Dsf.), wenigblumige, ♄. k. t. Van Diemens Land.

β) scabra Schult. (= *pauciflora* Grah.).

Digitized by Google

Frankenia
thymifolia Dsf. (= *capitata* γ Webb. et Berth.), thymianblätterige, ♄. k. Nordafrika, Spanien.
Frankia ramiflora Bertero, v. Cicca disticha, p. 195. *Franklinia Alatamaha* Marsh., et *americana* Marsh., v. Gordonia Franklini et pubescens, p. 366.

Fraseria Walt., Fraserie.
speciosa Dougl., Hook., prächtige, 4. f. Nordamerika.

Fraxinus T., Esche.
cerasifolia Hffg. (= *pubescens* β *longifolia* Vahl = *subvillosa* Bosc.), kirschblätterige, ♄. f. Nordamerika.
curvidens Hffsg. (= *caroliniana* W. β), gekrümmtzähnige, ♄. f. Nordamerika.
heterophylla Vahl (= *integrifolia* Hort.), γ) angustifolia.
lentiscifolia Dsf. (= *microphylla* Bosc, W.).
macrophylla Hffg., ? Thouin (= *juglandifolia* Hort., non Lam.), grofsblätterige, ♄. f. Nordamerika.
mexicana Sweet, mexicanische, ♄. k. Mexico.
platyphylla Hffg. (= *pubescens* β *latifolia* W., R. et S.), breitblätterige, ♄. f. Nordamerika.
polycarpa W., vielfrüchtige, ♄. f. Nordamerika.
pubescens Walt. (= *pensylvanica* Marsh.).
rostrata Guss. (= *parvifolia* Auch. Ell., non W.), geschnäbelte, ♄. f. Kleinasien, Süd- u. Westeuropa.
Schiedeana Schldtl., Schiedea, ♄. k. Mexico.
Unbestimmtere: lyrata Hort., salicifolia Hort.
Hinsichtl. der übrigen s. Ornus, p. 570.
Freesea crispa Eckl., *flava* Eckl., *longiflora* Eckl., *miniato-lateritia* Eckl., v. Montbretia crispa etc., (*Watsia crispa* etc., p. 854).

Freirea Gaudich. (Freire, ehem. portugiesischer Staatsminister), XXIII. 1. (IV. 1.), Urticaceae.
alsinefolia Gaudich. (= *Parietaria alsinefolia* Delil.), mierenblättrige, ☉. f. Aegypten.
filiformis Endl. (= *Parietaria filiformis* Tenore), fadenförmige, ☉. f. Neapel.
microphylla Endl. (= *Parietaria microphylla* Ledeb.), kleinblätterige, ☉. f. Altais. Sibirien.

Fresnelia Mirb., Fresnelie, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.
glaucescens Hort. belg., blaugrüne, ♄. k. t. Neuholland.
Hügelii Hort. belg., Hügel's, ♄. k. t. Neuholland.
pendula Hort. belg., überhängende, ♄. k. t. Neuholland.
Fontanesii Mirb., v. Callitris quadrivalvis, p. 149.

Freycinetia Gaudich. (C. L. D. v. Freycinet, Naturforscher und Weltumsegler), XXII. 1., Pandaneae.
Baueriana Endl., Bauer's, ♄. Sch. w. t. Norfolkinsel.

Freylinia Benth., Colla, Freylinie, XIV. 11., Personatae-Gratioleae.
lanceolata G. Don (= *cestroides* Colla = *oppositifolia* Spin. = *Capraria lanceolata* L. Suppl., p. 158), β) salicifolia (= *Capraria salicifolia* Lk. et Otto = *Andrewsia salicifolia* Hort. = *Buddlea glaberrima* Hort. Taur. = *Cestrum aurantiacum* Hort.).
undulata Benth. (= *Capraria undulata* L. Suppl.).

Fridericia Mart. (Friedrich Wilhelm III. und IV., Könige von Preussen, erl. Mäcene d. Botanik u. Gartenkunst), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.
Guilielma Mart., Wilhelm's, ♄. Sch. w. Brasilien.

Digitized by Google

Friedlandia albiflora Mart., *amoena* Chamiss. Schltdl., v. Diplusodon virgatus et amoenus, p. 206, II.

Friedrichsthalia Fenzl, *incana* Bunge, *physaloides* Fenzl etc., v. Trichodesma, Sect. II.

Fritillaria T., I. Genuina, Schachblume.

biflora Benth., Lindl., zweiblumige, 4. f. Zw. Californien.

camtschatcensis Ker (= *Lilium quadrifoliatum* E. Mey. = *Amblirion camtschatcense* Swt.), kamtschatkaische, 4. Zw. f. Nordamerika, Unalaschka, Kamtschatka.

cirrhosa Don, wickelrankige, 4. Zw. f. b. k. Nepal.

Fleischeriana Steud. et Hochst. (= *pyrenaica* Sibth.), Fleischer's, 4. Zw. f. b. Griechenland, Smyrna.

glaucescens W., blaugrünliche, 4. Zw. f. ?

latifolia W. (= *esculenta* Adam = *italica* P. = *persica* Pall.), β) ? aquitanica Mill. (= ? *involucrata* All.).

leucantha Grah., Fisch. (= *verticillata* H. Berol.).

liliacea Benth., lilienartige, 4. Zw. f. Californien.

messanensis Rafin. (= *pyrenaica* Guss.), siciliamische, 4. Zw. f. Sicilien, Calabrien, Spanien, Nordafrika.

montana Hoppe (= *pyrenaica* M. et K. = *tenella* Rchb.), Bergliebende, 4. Zw. f. Illyrien, Istrien.

mutica Benth., Lindl., unbewehrte, 4. Zw. f. Californ.

nervosa W. (= *serotina* P.).

pallidiflora Schrenk, bleichblumige, 4. Zw. f. Soongaria.

parviflora Mart., kleinblumige, 4. Zw. f. Caucasus.

plantaginifolia Lam. (= *plantaginea* P.), wegtrittblätterige, 4. Zw. f. Orient.

pontica Wahlbg. (= *pyrenaica* d'Urville), pontische, 4. Zw. f. Asiat. Türkei.

pudica Spgl. (= *Lilium pudicum* Pursh = *Amblirion pudicum* Sweet), schamhafte, 4. Zw. f. Nordamerika.

racemosa Sm. (= *pyrenaica* Ker = *nigra* Mill.), traubige, 4. Zw. f. Taurien, Caucasus.

α) orientalis Adam (= *tenella* MB.), β) major pluriflora Kunth (= *pyrenaica* Ait. Kew.).

verticillata W. (= *altaica* Lamb.), β) multiflora R. et S.).

Unbestimmtere: cantoniensis Lour., cornuta H. Gorenk., Cornuti H. Dorpat., tardiflora Lehm., umbellata Mill., vittata H. anglor.

Froelichia Mch. (= *Hoplotheca* Nutt., p. 403), (v. Froelich, Arzt u. Botaniker, Bearbeiter d. G. Hieracium u. Gentiana †), V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.

floridana * (= *Hoplotheca floridana* Nutt.)

interrupta * (= *lanata* Mch. = *Hoplotheca interrupta* Nutt. = *Gomphrena interrupta* L. = *G. spicata* Lam. = *Celosia procumbens* Jacq., Murr.).

lactea * (= *Hoplotheca lactea* Mart. = *Gomphrena lactea* DC.).

lanata * (= *Hoplotheca lanata* Mart. = *Gomphrena Humboldtiana* R. et S. = *G. lanata* H. B. K., nec Alior.).

sericea * (= *Hoplotheca sericea* Mart. = *Gomphrena sericea* Hffg.).

Froelichia caricoides Wulf., v. Elyna spicata, p. 286.

Fuchsia L., Fuchsie.

I. Genuina.

alpestris Gardn., Voralpen-F., ħ. k. t. Brasilien.

arborescens Sims (= *amoena* Hort. = *Schufia arborescens* Spach).

coccinea L. (= *elegans* Salisb. = *magellanica* Lam. = *pendula* Salisb.).

Digitized by Google

Fuchsia

conica Lindl. (= *macrostemma* γ Sweet).

cordifolia Benth., Lindl., herzblätterige, ħ. k. t. Mexico, Peru.

discolor Lindl. (= *macrostemma* var. *discolor* Don, Swt.), verschiedenfarbige, ħ. k. Falklandsinsel.

globosa Lindl., Lodd. (= *elegans* Paxt. = *macrostemma* δ Don, Sweet), kugelförmige, ħ. k. t. Mexico.

b) fol. variegatis, c) superba, d) crassa, e) dealbata, f) grandiflora, g) maxima.

gracilis Lindl. (= *decussata* Grah. = *multiflora* Lindl., Hort. = *macrostemma* ε Don, Sweet).

integrifolia Cambess. (= *pyrifolia* Presl = *affinis* Gardn.), ganzblätterige, ħ. t. k. Brasilien.

lycioides Andr. (= *rosea* R. et P.).

macropetala Presl, grofskronige, ħ. t. k. Peru.

macrostemma R. et P., β) tenella Loud., γ) recurvata Hook.

montana Cambess., Bergliebende, ħ. t. k. Brasilien. Ob eingeführt?

procumbens A. Cunningh., niederliegende, ħ. k. Neuzeeland.

radicans Miers, starkwurzelnde, ħ. t. k. Brasilien.

splendens Zucc., Lindl., schimmernde, ħ. t. k. Mexico.

unguiculata Lindl. (= *mutabilis* Hort.), nagelförmige, ħ. t. k. Südamerika.

II. Eucliandra Zuccar. (= *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach et *Kirschlegera* Spach).

Eucliandra Steud. (= *E. parviflora* Zuccar., = *F. parviflora* Zuccar., non Lindl.), Eucliandra-F., ħ. t. k. Mexico.

parviflora Lindl. (= *ovata* Moç., Sess. = *Kirschlegeria Lindleyi* Spach).

thymifolia H. B. K. (= *alternans* Moç., Sess. = *Brebissonia thymifolia* Spach = *Lopezia thymifolia* Bonpl. = *Lyciopsis thymifolia* Spach).

Nachverzeichnete scheinen noch nicht eingeführt, als: ayavacensis H. B. K., petiolaris H. B. K., pubescens Cambess., quindivensis H. B. K., racemosa Lam. (= *triphylla* L.), simplicicaulis R. et P., spinosa Presl, sämmtlich ħ. und in Südamerika heimisch.

Hybriden:

Admirable, Adonia, affinis, Albion, Alfred, Amulet, Anna Pawlowna, arborea grandiflora, Argo (Harrison), Atkinsonii, Audot, Ballonii, Barclayana, Bellii, Bergemanni (Warscewicz), Bertramii (Warsc.), bicolor, Boydii (Hally.), Braunii (Warsc.), Brennus, Brewsterii, Bridegroom (Epp), Britannia, Brockmannii, capitata (Warsc.), carnea, cardinalis, Carswelliana, Chandleri, champion, Chinois (Salter), Clara, Clio, coccinea vera (J. Smith), Comet, conspicua et arborea (Cattleugh) (= *Prince of Wales*), Conqueror, Constellation (Miller), Cooperi, Coronet (J. Smith), Curtisii, cylindracea, Dalstoniana, decora (J. Smith), defiance, delicata, Denisiana, Duke of Wellington (Epp), elegans superba, Elvira, Emperor of China (Buisby), Enchantress et superba, Epsii, Espartero (Knight), excelsa, eximia, exoniensis (Harrison), (*globoso cordifolia*), expansa, exquisita, Fairy, Fair Helen (Hally), Fair Rosamond (Harrison), Fintelmanni, Flora (Harrison), Florence (Epp) et Florence (Harrison), formosa (Harrison), formosa elegans

Digitized by Google

Fuchsia
(Thompson), Frostii, fulgens multiflora, Gem, gigantea (Smith), glabrata multiflora, Godfreydii, Goldfinch (Harrison), grandis, grandiflora et maxima, Guillauma II., Hartwegiana, Hector (et Harrison's), Hoepnerii (Warsc.), ilicifolia (Smith), incarnata, inflata fulgida (May), insignis (Smith), invincible (Smith), Iveryana, Josephus, Juno, Kentish hero (Epp), Kentish bride, King, King John (Hally), Koopmanni, Lady Sale (Rogers), Lami (Harris.), Laneii, Leader, Leonore, lilacina alba (Warsc.), London rival (G. Smith), linifolia, longiflora splendens floribunda, longiflora superba, Lord Sandon (Roger's), Madonna (Harris.), Magnet (W. Pawley), magnifica, majestica (Smith), marginata (Hally), Maria (Epp), mirabilis (Smith), Miss Talfourd (Salter), modesta (J. Smith), Monypennii, Neptune (J. Smith), Nietneriana (Warsc.), nobilissima, Norfolk Hero (Barkway), Nymph (Epp), Paragon, patens, pearl (Harrison), pendula elegans et pendula terminalis, picta, Prima Donna (Harrison), (= *fulg.-splendens*), Prince Albert (Th. Brown), Prince of Wales (Buisby), Prince of Wales (W. Pawley), princeps (Smith), Princess Sophie (Marnock), pulchella (May), pulcherrima (Harrison), Queen (W. Pawley), Queen Victoria (Harrison), Queen of Seba, racemosa (Smith), reflexa, reflexa aurantiaca (Warsc.), Regelii (Warsc.), Rienzi (Knight), Richardsonii, Rogersiana, Rosalba (Harrison), (= ? *roseo-alba*), rosea, rosea superba, Sellowii (Warsc.), Sidmouthii (Bartlett), speciosa, speciosissima (Sheffield), spectabilis (Harrison), Standishii dependens et majestica, Stanwelliana, St. Clare (Youell), striatiflora (Warsc.), stylosa maxima (May), superba (Mortlock), surpass racemiflora, Targetti, Theophrastus (Roger), the President, Theresita, Thyneana, Toddiana, transparens, tricolor (Pontey), triumphans (Smith), unique, Uttoxeter beauty (Roger), Uttoxeter rival, Van Guard (Harrison), Venus Victrix, vernalis, Vesta (J. Smith), Vesta (Harrison), venusta (= *arborea*), Victory, Wat-Tyler (Hally), Woodsii, Youellii, Zenobia (Harrison) etc. etc.

Fugosia Juss., P., Fugosie, XVI. VIII., Malvaceae.
heterophylla Spach (= *Redoutea heterophylla* Vent., p. 679), verschiedenblätterige, ♂. ħ. w. Südamerika.
sulphurea Juss., schwefelgelbe, ħ. w. Brasilien.

Fuirena Rottb., Fuirena.
cephalothes Schrad., grofsköpfige, 4. k. t. Cap d. g. H.
quinquangularis Hassk., fünfkantige, 4. w. Java.
scirpoidea Vahl (= *Vaginaria Richardi* P.), binsenähnliche, 4. f. Nordamerika.
squarrosa Mchx. (= *β pumila* Spgl. = *Torreyana* Beck), sparrige, 4. f. Nordamerika.

Fulchironia senegalensis Lestib. = *leonensis* Hort.), v. Phoenix leonensis, p. 617.

Fumana Dun., Spach, *arabica* Spach, *laevipes* Spach, *viscida* Spach, *viridis* Spach, *vulgaris* Spach, v. Helianthemum arabicum, laevipes, glutinosum, viride et Fumana, p. 380 etc.

Fumaria T., Erdrauch.
alexandrina Ehrbg., alexandrinischer, ☉. f. Aegypten.

Digitized by Google

Fumaria

Burchelli DC. (= *capreolata* β DC.), Burchell's, ☉. Sch. f. Cap d. g. Hoffn.

calycina Babingt., kelchiger, ☉. f. Schottland.

flabellata Gasparini, fächerförmiger, ☉. f. Calabrien.

media Lois. (= *agraria* Lagasca = *capreolata* Aut. = *cirrhata* Rohde = *officinalis* L. var. Huds. Spgl.), mittlerer, ☉. f. Europa.

β) prehensilis Kit.

macrocarpa Parlatore, grofsfrüchtiger, ☉. f. Sicilien.

parviflora Lam. (= *diffusa* Mch. = *leucantha* Vivian. = *sicula* Pison.).

Funkia Spgl., Funkie.

lancifolia Spgl. (= *ovata* β Schult = *ovata* β *flore albo* Kunth = *Hemerocallis coerulea* α Ker = *H. lancifolia* Thbg.).

Sieboldiana Hook. (= *Sieboldi* Lindl. = *cucullata* Hort. = *cordata* Sieb. = *Hemerocallis Sieboldiana* Lodd.), b) flore candido, c) fol. albo variegatis, d) fol. luteo variegatis; zu ergänzen p. 340.

Gagea Salisb., Gagea.

bonariensis R. et S. (= *Ornithogalum bonariense* P. = *O. spathaceum* Poir.), bonarische, 4. Zw. t. k. Buenos Ayres.

chrysantha R. et S. (= *Ornithogalum chrysanthum* Jan), goldfarbige, 4. Zw. f. Sicilien.

Clusiana R. et S. (= *Ornithogalum Clusii* Tausch = *O. marginatum* Pall. = *pusillum* MB. = *trigonophyllum* Auct. = *pratense* Sadl.), Clusius's, 4. Zw. f. Deutschland, Italien, Ungarn, Caucasus, Sibirien.

β) pusilla Rchb., R. et S. (= *Ornithog. arvense* β Pohl = *O. pusillum* Schm. = *O. uniflorum* Zauschn.), γ) ? tunicata (= *Ornithogalum tunicatum* Presl).

erubescens R. et S. (= *Ornithogalum erubescens* Bess.), röthliche, 4. Zw. f. Podolien, Volhynien.

fibrosa R. et S. (= *Ornithogalum fibrosum* Dsf.), faserige, 4. Zw. k. Nordafrika.

filiformis Kunth (= *Ornithogalum filiforme* Ledeb.), fadenförmige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

foliosa R. et S. (= *Ornithog. foliosum* Presl = *O. luteum* L. var.), blattreiche, 4. Zw. f. Sicilien.

glauca Sweet (= *Ornithogalum luteum* W. E., nec P. = *O. sylvaticum* Schlchr.), blaugrüne, 4. Zw. f. Schweiz.

Liotardi R. et S. (= *fistulosa* Duby = *pygmaea* Salisb. = *Ornithogalum bohemicum* Balb. = *fistulosum* Ram. = *O. fragiferum* Vill. = *O. intermedium* Schlchr. = *O. Liotardi* Sthg. = *O. luteum* Gaud.).

lutea R. et S. (= *Ornithogalum luteum* L. = *O. luteum* β *majus* Red. = *O. luteum* λ *sylvaticum* W. = *O. Persoonii* Hoppe = *O. sylvaticum* P.).

minima Sweet, Rchb., R. et S. (= *Sternbergii* Loud. = *Ornithogalum gracile* Hagen = *O. acutipetalum* Auct. = *O. minimum* L. = *O. Sternbergii* Hoppe).

pratensis K., Rchb. (= *Ornithogalum pratense* P. = *O. stenopetalum* β *pratense* M. et K.).

reticulata R. et S. (= *circinnata* Loud. = *Hornungia* Bernh. = *Ornithogalum circinnatum* L. fil. = *O.*

Digitized by Google

Gagea
reticulatum Pall.), netzförmige, 4. Zw. f. Caucasus, Taurien.
saxatilis R. et S., K. (= *arvensis* var. *subuniflora* Rchb. = *Ornithogalum bohemicum β saxatile* M. et K. = *O. luteum β* Roth = *O. saxatile* K.).
spathacea Ker (= *Ornithogalum minimum β spathaceum* Whlbg. = *O. Heynei* Roth = *O. spathaceum* Heyne = *O. transversale* Pall.).
stenopetala Rchb. (= *pratensis* R. et S., non K. = ? *bracteolaris* Salisb. = *lutea* Duby = *Ornithogalum belgicum* Lej. = *O. glaucum* Dethar. = *O. luteum* W. et *reliq.* Auct. = *O. stenopetalum* Fr.).
Szovitsii Besser (= *Ornithogalum Szovitsii* Lang = *O. pygmaeum* Fleisch., non W.), Szovits's, 4. Zw. f. Odessa, Smyrna.
triflora R. et S. (= *chlorantha* R. et S. var. Spgl. = *Ornithogalum triflorum* Ledeb.), dreiblumige, 4. Zw. f. Sibirien.
uniflora R. et S., v. Orithyja uniflora.
Hiernach p. **341** zu ergänzen und zu berichtigen.

Gaillardia Fouger, DC., Gaillardia.
Amblyodon Gay., grofszahnige, ⊙. f. Mexico.
aristata Pursh (= *bicolor β aristata* Nutt. = *perennis* H. Par. = *rustica* Cass. = *lanceolata* DC., nec Mchx.).
picta Sweet (= *bicolor β Drummondii* Hook.), bunte, 4. k. Texas.
b) coccinea Hort., c) grandiflora Hort.
pinnatifida Torr. (= *lyrata* Hort.), fiederspaltige, ♂. 4. f. Nordamerika.
pulchella Fouger. (= *bicolor* Lam. = *Drummondii* DC.).
Hybriden u. Varietäten: cyaniflora Hort. (aristato-picta), Herberti, Kartwrigthii, Kirtlandii, maxima, Rollissonii, Schomburgkii, Smeathmanni, splendida, Welsiana.
Galactia pendula P., v. Collaea pendula, p. **154**, II.

Galanthus plicatus M. B. (= *Clusii* Fisch.).
Galarrhoeus aleppicus Haw., *androsaemifolius* Haw., *Apios* Haw. etc., v. Euphorbia aleppica, androsaemifolia, Apios etc., p. **321** etc., p. **237**, II.
Galasia (= *Gelasia* Cass.) *villosa* Less., v. Scorzonera Sect. II., p. **735**.

Galatella (= *Galatea* Cass.), v. Aster, Sect. IX., p. **99** et **51**, II., *obtusifolia* Lehm., v. Seriocarpus solidagineus (Aster, Sect. XIV.), p. **100**.
Galathenium floridanum Nutt., *multiflorum* Nutt., v. Mulgedium floridanum et multiflorum, p. **341** u. **884**.

Galaxia Thbg., Galaxie.
grandiflora Andr. (= *ciliata* P. = *multiflora* Spgl. = *ovata α* Ker), *β*) mucronularis Salisb.
ixiaeflora DC. Redout. (= *Ixia columnaris* Andr., Salisb., p. **427** = *I. curta* Andr. = *I. monadelpha* Delarb. = *I. variegata* Banks), Ixienblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
minuta Ker (= *Ixia minuta* L. = *Romulea minuta* Eckl.), kleinste, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
ovata Thbg. (= *obtusa* Salisb.), *β*) versicolor Salisb. (= ? *violacea* Eckl.).
ramosa DC. (= *Ixia columnaris angustifolia* Andr. = *I. columellaris* Ker, p. **426** = *I. monadelpha* Delar. var. ?), ästige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Galbanum officinale Don, v. Ferula Ferulago, p. 330.

Galeandra Lindl., Galeandra, XX. 1., Orchideae.
Baueri Lindl., Batem., Bauer's, 4. w. Südamerika.
cristata Lindl., kammförmige, 4. w. Cayenne.
Devoniana H. Angl., Devon's, 4. w. ? Südamerika.
extinctoria Lindl., nichtfärbende, 4. w. Sierra Leone.
gracilis Lindl. (= *Eulophia gracilis* Lindl., p. 319 = *Limodorum ciliatum* Schum.).
Galearia Cupani Presl, *fragifera* Presl, *resupinata* Presl, *tomentosa* Presl, v. Trifolium alatum, fragiferum etc., p. 818 etc.

Galega T., Geifsraute.
frutescens Mill, strauchige, ħ. w. Vera Crux.
persica P. (= *africana* Mill.).
tricolor Hook. (= *Callotropis tricolor* G. Don), dreifarbige, 4. k. t. Neuholland.
Ungewifs: glandulosa Hort.

Galeobdolon luteum Huds., Sm., (= *vulgare* P. = *Lamium Galeobdolon* Crantz = *Galeopsis Galeobdolon* L.), β) montanum Hoffm.

Galeopsis versicolor Curt. (= *speciosa* Mill.).

Galinsogea Cav. (= *Sogalgina* Cass.), Galinsogea.
dentata Rchb., Hffg. (= *trilobata* Hort., non Cav.), gezahnte, ⊙. f. ?
brachystephana H. bot., v. Wiborgia brachystephana.

Galium L., Scop., Labkraut.
anglicum Huds. (= *gracile* Wallr., M. et K. = *parvifolium* Gaud.).
aristatum L. (= *erectum* Don = *glaucum* Suter, Hegetsch. = *sylvaticum* Vill., non L.).
bermudianum L. (= *pilosum* Ait., Ell. = *punctatum* P. = *puncticulosum* Mchx. = *purpureum* Walt., non L.), bermudisches, 4. f. Nordamerika.
capillare Decaisn. (non Cav.), haarförmiges, ⊙. f. Arabien.
caspicum Stev., caspisches, 4. f. Persien.
chloroleucum Fisch. et Mey., grünlichweifses, ⊙. f. Persien.
cinereum All., β) corrudaefolium Vill. (= *pallidum* Presl = *tenuifolium* All.).
cordatum R. et S. (= *articulatum* Lam. var. ? Poir. = *Valantia cordata* P.), herzförmiges, ⊙. f. Orient.
coriaceum Bunge, Ledeb., lederartiges, 4. f. Altaisch. Sibirien.
Cruciata Scopol. (= *chersonense* R. et S. = *G. Valantia* Baumg. = *Valantia chersonensis* W. = *V. ciliata* Opiz, Presl = *V. Cruciata* L.).
ellipticum Presl (= *Barrelieri* Salzm. = *ovalifolium* Schott = *rotundifolium* β R. et S., M. et K.).
erectum Huds. (= *Bocconi* Tenore = *lucidum* All. = *provinciale* Lam. = *pubescens* Schlchr. = *rigidum* Vill. = *scabrum* Jacq.).
eriocarpum Bartl., wollfrüchtiges, ħ. k. Chili.
firmum Tausch, dichtes, 4. f. Dalmatien.
hyrcanicum C. A. Mey., hyrcanisches, 4. f. Caucasus, Persien.
linifolium Lam. (= *atrovirens* Lapeyr. = *laevigatum* Lam. = *aristatum* Auct.), gleichbreitblätteriges, 4. f. Südeuropa.
maritimum L., β) villosum Lam. (= *humifusum* MB. = *ruthenicum* W.).
montanum L., Berg-L., 4. f. England, Frankreich.
Mollugo L., β) tyrolense W. (= *splendens* Hornem.).

Digitized by Google

Galium

Neesianum Req. (= *hirsutum* N. E , Buch. = *ovalifolium* Schott), Nees's, 4. k. Teneriffa.

pauciflorum Bunge, wenigblumiges, ⊙. f. Nordchina.

pedemontanum All. (= *chloranthum* Brotero = *minus* Hort. = *Vaillantia pedemontana* Bellard. = *V. granulata* Roth).

persicum DC., persisches, 4. f. Persien.

pumilum Lam., δ) caespitosum Ram. (= *Jussieui* Vill.).

pygmaeum DC. (= *articulatum* R. et S. var. Tausch. = *Vaillantia pusilla* Stev. = *V. muralis* MB.), zwergiges, ⊙. f. Iberien.

retrorsum DC. (= *pedemontanum* MB., non All. = *Vaillantia pedemontana* W. K., non Bell), rückwärtshackeriges, ⊙. f. Sicilien, Ungarn, Caucasus.

saccharatum All., γ) granulatum Schrad (= *Vaillantia granulata* Spgl.).

setaceum Lam. (= *capillare* Cavan., non Decais. = *eriospermum* Chaix = *floribundum* Sm. = *microcarpum* Vahl), borstiges, ⊙. f. Spanien, Frankreich, Sicilien, Nordafrika.

sylvestre Poll., ε) alpestre Gaud. (= *sudeticum* Tausch).

vernum Scopol. (= *Vaillanta glabra* Vill.), β) Bauhini R. et S. (= *glabrum* Rochel = *Scopolianum* Bess. = *Vaillantia glabra* L. = *V. verna* G. Don).

verticillatum Danth. Lam. (= *murale* MB. = *Sherardia muralis* Pall.), wirtelförmiges, ⊙. f. Sicilien, Frankreich, Taurien.

verum L., γ) caucasicum Lagasca. ? Fisch.

Cucullaria R. et S., v. Callipeltis Cucullaria, p. 107, II.

Garcinia L., Garcinie.

emarginata H. Cels., ausgerandete, ♄. w. Ostindien.

speciosa Wall., prächtige, ♄. w. Ostindien.

Gardenia Ellis, Gardenie.

Moruba Siebold, Blume, Moruba-G., ♄. k. Japan.

pallida Lindl., bleiche, ♄. w. Südamerika.

Sherbourniae Hook., Sherbourn's, ♄. Sch. w. Sierra Leone.

Stanleyana Lindl., Hook., Stanley's, ♄. w. Sierra Leone.

tetrasperma Roxb., viersaamige, ♄. ♄. w. Ostindien.

Thunbergia L. fil. (= *crassicaulis* Salisb. = *verticillata* Lam. = *Thunbergia capensis* Montin).

Whitfieldii Lindl., Whitfield's, ♄. w. Sierra Leone.

Aufserdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen der Handelsgärten noch vor: australis H. Cels, litoralis, macrophylla H. Cels.

armata Sw., *Bowieana* A. Cunn., *dumetorum* Retz, *longispina* Spgl., *micrantha* Thbg., *Mussaenda* L. fil., *nutans* Spgl., *propinqua* Lindl., *spinosa* Thbg., *uliginosa* Retz, v. Randia armata, Bowieana, dumetorum, longispina, parviflora, Mussaenda, nutans, propinqua etc., *fragrans* Roxb., v. Griffithia fragrans, *Pavetta* Roxb., v. Stylocoryae Webera.

Gardoquia R. et P., Gardoquie.

elegans H. B. K. (= *pulchella* H. B. K.), zierliche, ♄. k. t. Peru.

elliptica R. et P. (= *Stachys speciosa* Hook.), elliptische, ♄. k. t. Peru.

Gilliesii Grah. (= *chilensis* Hook.).

grandiflora H. B. K. (= *incana* W. herb. = ? *quitensis* W. herb.), grofsblumige, ♄. k. t. Quito.

Digitized by Google

Gardoquia
Hookeri Benth. (= *Cunila coccinea* Nutt. = *Melissa coccinea* Spgl.), Hooker's, ♄. k. Florida.

Garrya Dougl., Garrya, Urticaceae-Garryeae.
laurifolia ? Lindl., lorbeerblätterige, ♄. k. Neucalifornien.

Garuleum Cass., Garuleum, XIX. xv., Compositae-Corymbiferae (Calendulaceae).
bipinnatum Less. (= *Osteospermum bipinnatum* Thbg.), doppeltgefiedertes, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
viscosum Cass. (= *pinnatifidum* DC. = *Chrysanthemoides coerulea* Mch. = *Osteospermum coeruleum* Jacq., Ait., p. 573 = *O. pinnatifidum* L'Her.), schmieriges, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
Gasparrinia virescens Bertol., v. Bunium virescens, p. 82, II.

Gasterolychnis Fenzl, v. Lychnis, Sect. III[b].

Gastonia Commers., Gastonie.
cutispongia Lam. (= *spongiosa* P.), schwammige, ♄. w. Mauritius.
? *dentata* H. Makoy., *palmata* Roxb., v. Gilibertia dentata et palmata.

Gastrochilus Wall., Bauchlippler, I. x., Scitamineae-Zingiberaceae [1]).
longiflorus Wall., langblumiger, 4. w. Ostindien.
Gastrochilus calceolaris Don, v. Sarcochilus nepalensis.

Gastrolobium RBr., Bauchläppler.
acutum Benth., Hook., spitziger, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).
calycinum Benth., groſskelchiger, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).
cordatum Benth., herzförmiger, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).
Makoyanum Hort. belg., Makoy's, ♄. t. Neuholland.
parvifolium Benth., kleinblätteriger, ♄. t. Neuh. (Schwfl.).
spinosum Benth., dorniger, ♄. t. Neuholl. (Schwanenfl.).
Noch kommen in den Verzeichnissen der Handelsgärten G. splendens u. verticillatum vor.
Ob von Nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir nicht bekannt, als: obovatum Benth., oxylobioides Benth., spathulatum Benth., trilobum Benth., villosum Benth. Sämmtlich ♄. und in Neuholland (am Schwanenfluſs) heimisch.

Gastromeria G. Don, Gastromerie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.
physaloides G. Don (= *Lophospermum physaloides* Don = *Scrophularia physaloides* Moç., Sess.), schluttenähnliche, 4. ♄. k. t. Mexico.
Gastronema clavatum Herb. Sims, *pallidum* Lodd., *spirale* Eckl., Zeyh., v. Cyrtanthus uniflorus, p. 184, II. et Cyrtanth. pallidus et spiralis, p. 247.

Gaudinia P. B., Gaudinie.
geminiflora Gay. (= *Arthrostachya coarctata* Lk. = *Avena coarctata* Dsf. = *A. geminiflora* Kunth = *Bromus coarctatus* Hornem. = *Triticum coarctatum* Spgl. = *Falimiria bromoides* et *coarctata* Bess.), paarblumige, ⊙. f. ?
tenuis Trin. (= *Avena dubia* Leers = *A. tenuis* Mch., p. 107 = *A. triaristata* Vill. = *Bromus triflorus* Poll. = *Holcus biaristatus* Web. = *Trisetum tenue* R. et S. = *Ventenata avenacea* Koel. = *V. bromoides* Koel).

---

1) Orchideae p. 347 3te Zeile v. o. ist zu streichen.

Digitized by Google

Gaulthieria L. (Gautiera Kaln, Endl.), Gaulthiera.
coccinea H. B. K., scharlachfarbige, ♄. t. ?
cordifolia H. B. K., herzblätterige, ♄. t. Neugranada.
ferruginea Schltdl. (= ? *tomentosa* H. B. K. = *Andromeda hirsuta* Arrabida), rostfarbige, ♄. t. Brasilien.
Ob lanigera Hook. ♄. Südamerika, myrsinites Hook. ♄. Nordamerika, venusta DC. (= *Andromeda pulchra* Arrabida, non Cham. Schltdl.), ♄. Brasilien, in den Gärten eingeführt worden, ist mir unbekannt.

Gaura L., Prachtkerze.
angustifolia Mchx. (= *fruticosa* Jacq. = *undulata* Dsf.).
coccinea Pras., β) marginata Lehm., γ) parvifolia Torrey, δ) glabra Lehm.
Drummondii Torr. et Gr. (= *Schizocarya Drummondii* Spach), Drummond's, 4. ♄. k. Texas.
epilobioides H. B. K. (= *angustifolia* et *tripetala* W. herb. = *Schizocarya Kunthii* Spach), weidenröschenähnliche, 4. k. Mexico.
mollis H. B. K. (= *Gauridium Kunthii* Spach = *G. molle* Spach), weiche, 4. k. Mexico.
odorata Lagasca, Sessé, wohlriechende, 4. k. Neuspanien.
oenotheraeflora Zuccar. (= *canescens* Hort. = *mutabilis* Cav. var.? DC.).
parviflora Dougl., Hook. (= *Schizocarya micrantha* Spach).
suffrutescens Moç., Sess., wenigstrauchige, 4. ♄. k. Mexico.
tripetala Cav. (= *hexandra* Ortega).
Gauridium Kunthii Spach (= *molle* Spach), *mutabile* Spach, v. Gaura mollis et mutabilis.
Gaya nutans Sweet, *occidentalis* Sweet, v. Sida nutans et occidentalis, — *Gaya platyphylla* Spgl., v. Seringia platyphylla, p. 747.

Gaylussacia Humb., Blonpl., K. (= *Lussacia* Spgl.), (Gaylussac, ber. franz. Chemiker u. Physiker), X. 1., Vaccinieae.
cordifolia Mart. et Galeotti, herzblätterige, ♄. t. Mexico.
dependens G. Don, herabhängende, ♄. t. Peru.
Pseudo-Vaccinium Schltdl. (= *Lussacia Vaccinium* Spgl.), heidelbeerähnliche, ♄. t. Brasilien.
serrata Lindl. (= *Agapetes serrata* G. Don = *Thibaudia serrata* Wall.), sägezähnige, ♄. ♄. t. w. Ostindien.

Gazania G., Gazanie.
pinnata Less. (= *Arctotis asplenifolia* Burm. = *Gorteria incisa* Thbg. = *G. lyratopinnata* Poir. = *G. pinnata* Thbg. = *Mussinia incisa* W. = *M. pinnata* W.), gefiederte, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
rigens RBr. (= *Gorteria rigens* L. = *Melanchrysum rigens* Cass.), β) heterophylla Hort.
speciosa Less. (= *pectinata* Spgl. = *Gorteria pectinata* Thbg. = *G. rigens* Thbg., non L. = *Melanchrysum spinulosum* Cass. = *Mussinia speciosa* W.), prächtige, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Geissomeria Lindl., Ziegelkelch.
fulgida Sweet (= *Ruellia fulgida* Andr., p. 705).

Geissorrhiza Ker, Dachzwiebel.
ciliaris Salisb. (= *inflexa* Ker = *Ixia ciliaris* Salisb. = *I. inflexa* Delarb.).
scillaris Ker (= *Ixia ramosa* Ker = *I. phalangioides* R. et S. = *I. scillaris* Thbg., non L.), scillaähnliche, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.
Gela lanceolata Lour., v. Ximenia lanceol., *oblongifolia* Cunn., v. Acronychia oblongifolia, p. 8, 11.

Digitized by Google

Gelasine Herb., Gelasine, Ill. 1., (XVI. 1.), Irideae.
azurea Herb., azurblaue, 4. Zw. k. t. Banda oriental.

Gendarussa N. E., Adhadota Steud., debilis N. E., furcata N. E. (= *Diplanthera furcata* Schrk.), ventricosa N. E., vulgaris N. E., v. Justicia, Sect. V., p. 434 etc.
Geneciphylla asplenifolia L'Her., v. Phyllanthus speciosus, p. 620 [1]).

Geniosporum Benth., Bartsaame, XIV. 1., Labiatae.
prostratum Benth. (= *Elsholtzia ocymoides* Lam. = *Lumnitzera prostrata* Spgl. = *Mentha ocymoides* P. Spgl., p. 285 = *Ocymum menthoides* Burm., L. fil. = *O. prostratum* L. = *Thymus indicus* Burm.), gestreckter, 4. w. Ostindien.

Geniostoma Forst., Bartmund, V. 1., Contortae-Loganiaceae.
ligustrifolium A. Cunningh. (= *rupestre* A. Rich., non Forst. = *Aspilotum laevigatum* Banks et Soland.), ligusterblätteriger, ħ. t. k. Neuzeeland.

Genista L., Ginster.
albida W., weisslicher, ħ. f. Taurien, Bessarabien.
amsantica Tenore (= *anxantica* Auct. = ? *januensis* Bertolone), amsantischer, ħ. f. Neapel.
anglica L. (= *britannica* Hort. = *minor* Lam.).
aspalathoides Lam. (= *Cytisus aspalathoides* Spgl. = *Spartium aspalathoides* Dsf.), witschenähnlicher, ħ. k. Nordafrika.
canariensis L. (= *Cytisus paniculatus* Loisel. = *ramosissimus* Poir. = *Spartium albicans* Cav.).
β) Atlecana Harrison.
candicans L. (= *canariensis* Bot. reg. = *Cytisus candicans* L. = *C. pubescens* Mch.).
carinalis Griseb. (= *micrantha* et *incerta* Frivalds.), nachenförmiger, ħ. f. b. Macedonien, Thracien.
elata Wender. (= ? *virgata* W., non DC. = *tinctoria* L. var. Auct. = *sibirica* Mch. et Hort., nec L.), erhabener, ħ. f. ?
Gasparinii Presl, Gasparini's, ħ. f. b. k. Corsica, Sardinien, Sicilien.
humilis Tenore (= *depressa* Tenore, nec MB. = *Tenorii* Steud.), niedriger, ħ. f. b. k. Neapel.
Morisii Colla, Steud. (= *microphylla* Moris, non DC. = *parvifolia* G. Don), Moris's, ħ. k. f. b. Sardinien.
multibracteata Tausch (= *sibirica* Hort.), vieldeckblätteriger ħ. f. ?
nodosa Tausch, knotiger, ħ. f. b. Oestr. Litorale.
numidica Spach, numidischer, ħ. k. Numidien.
parviflora Brotero (non DC.) (= *Broteri* Poir.).
pulchella Visian., schöner, ħ. f. b. Dalmatien.
radiata Scop. (= *Cytisus radiatus* K. = *Spartium radiatum* L.).
scariosa Vivian. (= *januensis* Bertol. = *genuensis* P. [2]).

---

1) **Gomphyllis** DC., Myrtaceae, ellriodora Endl. (= *Hedaroma latifolium* Lindl.), diosmoides DC., pinifolia Schauer (= *Hedaroma pinifolium* Lindl.), thymoides Schauer (= *Hedaroma thymoides* Lindl.), vestita Endl. Sämmtlich ħ, ħ, und im westl. Neuholland heimisch, scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu werden.

2) Die übrigen Synonyme sind auszuschliessen, vergl. p. 349.

Digitized by Google

Genista

triangularis W. (= *triquetra* W. K.), dreikantiger, ♄. f. b. Banat.

tricuspidata Dsf. (= *hirsuta* Vahl var. Lk. = *Spartium tricuspidatum* Dsf.), dreispitziger, ♄. k. Nordafrika.

triquetra L'Her., Ait. (? = *Spartium triquetrum* Lam.).

versiflora Tausch (= *triangularis* Hort.), wendigblumiger, ♄. f. ?

virgata DC. (= *gracilis* Poir. = *Spartium virgatum* Ait. = *Cytisus tener* Jacq.).

monosperma Lam. (= *Spartium monospermum* L.), v. Retama monosperma, *racemosa* Hort. et *parviflora* DC., v. Cytisus chrysobotrys et parviflorus, p. 185, II.

Genistella racemosa Mch., v. Genista sagittalis.

Genistoides elata Mch., *linifolia* Mch., *tinctoria* Mch., *tuberculata* Mch., v. Genista elata, linifolia, tinctoria et pilosa.

Genlisia corymbosa Rchb., v. Witsenia corymbosa, p. 858.

Genosiria fragilis LaBill., v. Patersonia glauca, p. 591.

Gentiana T., Enzian.

acaulis L. (= *grandiflora* Lam. = *excisa* K. = *Cruciata acaulis* Borkh.), β) angustifolia Vill., γ) alpina Vill. (= *excisa* Presl).

acuta Mchx. (= *Amarella* Richards. = *plebeja* Bunge = *Ericala acuta* G. Don), spitzblätteriger, ⊙. f. Nordamerika.

Amarella L. (= *pratensis* Fröl. = *Eurythalia Amarella* Borkh. = *E. pratensis* G. Don), β) uliginosa W., γ) axillaris Rchb. (= *lancifolia* Rafn. = *tetragona* Mayer), δ) pyramidalis W. (= *obtusifolia* Fr.).

Andrewsii Griseb. (= *Saponaria* Fröl. excl. syn. Vahl), Andrew's, 4. f. Nordamerika.

β) linearis Griseb. (= *Catesbaei* Andr.).

aquatica L. (= *Ledebourii* Rchb. = *Ericala aquatica* G. Don), Wasser-E., ⊙. ♂. f. Altai, Nordchina.

asclepiadea L. (= *Coilanthe asclepiadea* G. Don), d) fl. albo.

aurea L., ⊙. (nicht 4).

Burseri Lapeyr. (= *Coilanthe Burseri* G. Don), β) Villarsii Griseb. (= *punctata* Vill. = *macrophylla* Bertol., nec Pall. = *Burseri-punctata* Griseb.).

campestris L., β) montana Griseb. (= c. β *chloraefolia* Mey.), γ) Columnae Tenore.

* chloraefolia N. E. (campestri-germanica).

clavata Bot. mag. (= *Pneumonanthe intermedia* G. Don), keulförmiger, 4. f. Nordamerika.

conferta Fisch. (= *Eurythalia conferta* G. Don), gedrängter, ♂. f. Altaisch. Sibirien.

decumbens L. Suppl. (= *adscendens* Pall. = ? *daurica* Fisch. = *Dasystephana adscendens* Borkh.), niederliegender, 4. f. Altaisch. Sibirien.

β) Gebleri Ledeb.

detonsa Rottb. (= *ciliata* et *serrata* Gunn. = *Gentianella serrata* Borkh. = *G. detonsa* G. Don), bärtige, ⊙. f. Lappland, Island, Grönland, Nordam., Sibirien.

β) barbata Froel. (= *Gentianella barbata* G. Don), γ) simplex Bunge.

frigida Haenke, β) algida Pall.

Digitized by Google

Gentiana

Froelichii Jan (= *caulescens* Lam. = *angustifolia* Sturm., Rchb., non Vill.).

germanica W., β) minor Mey. (= *obliqua* N. E. = *uniflora* W. = *compacta* Hegetschw. = *Eurythalia uniflora* G. Don), γ) praecox Griseb. (= *obtusifolia* W. = *flava* Murat = *spathulata* Bartl. = *montana* N. E. = *pyramidalis* N. E. = *crispata* Vis. = *aspera* Hegetschw. = *Eurythalia obtusifolia* G. Don), δ) caucasica MB. (= *collina* Adams = *oppositifolia* Zawadski = *Bieberstenii* Bunge = *Eurythalia caucasica* G. Don).

glauca Pall. (= *caespitosa* Grah.), blaugrüner, 4. f. Kamtschatka.

livonica Rechecholtz (= *lancifolia* Bess.), liefländischer, ⊙. f. Lithauen, Liefland.

lutea L., Hybriden von lutea, punctata u. purpurea nach Grisebach: * biloba DC. (punctato-lutea Griseb.), ** Charpentieri Thom. (luteo-punctata Griseb.), *** hybrida Vill. (pannonico-lutea Griseb. = *Asterias hybrida* G. Don), **** purpurascens Griseb. (= *Thomasii* β Gaud. = *hybrida secundaria* Griseb.), ***** rubra Clairv. (purpureo-lutea Griseb. = *Thomasii* Gilibog = *hybrida* DC. = *campanulata* Reyn.).

ochroleuca Frol. (= *villosa* L. = *Saponaria* Walt., non L. = *Pneumonanthe ochroleuca* G. Don = *P. villosa* Schm.), Hybriden: * incarnata Sims (Saponario-ochroleuca Griseb.), ** intermedia Sims (Andrews.-ochroleuca Griseb.), *** heterophylla Rafin.

pannonica Scopol. (= *purpurea* Schrk., Vill. = *punctata* Jacq., non L. = *semifida* Hffg.).

prostrata Haenke (= *bavarica* L. var. Whlbg. = *Ericoila prostrata* Borkh.), gestreckter, ⊙. f. Tyroler, Kärnthner, altaische, nordamerikanische Alpen, Magellanische Meerenge.

Pseudo Pneumonanthe R. et S. (= *Pneumonanthe Michauxii* et *Pseudo-Pneumonanthe* G. Don = *G. Saponaria* β *linearis* Griseb. = *G. Pneumonanthe* Mchx. = *puberula* Mchx. = *Ericalia linearis* G. Don), unächte, 4. f. Nordamerika.

punctata L., * Gaudiniana Thomas (punctato-purpurea Griseb. = *pannonica* Schlchr., non Scopol. = *spuria* Lebert), Gaudin's, 4. f. Südl. Schweiz.

verna L., β) heterophylla Vill., γ) alata Griseb. (= *angulosa* MB. = *discolor* Hffg.).

aurea Thbg., v. Sebaea aurea, p. 737, *carinthiaca* Frol., v. Pleurogyne carinthiaca, *exacoides* L., v. Belmontia cordata, p. 64, *exaltata* Juss. (= *connata* W. herb.), v. Eustoma exaltatum, p. 239 II., *perfoliata* L., v. Chlora perfoliata, p. 191, *verticillata* L. et *verticillaris* Retz, v. Hippion verticillatum et hyssopifolium, p. 491, *viscosa* Ait., v. Ixanthus viscosus.

Geonoma W., Erdpalme.

Pohliana Mart., Pohl's, ♄. w. Brasilien.

Geophila pyrenaica Berger, v. Bulbocodium montanum, p. 81, II.

Georgina (= *Georgia* Spgl.) *Cervantesii* Sweet etc., v. Dahlia Cervantesii etc., p. 186, II.

Digitized by Google

Geracium Rchb., *aureum* Rchb., *chondrilloides* Rchb., *incarnatum* Rchb., *lapsanoides* Rchb., *paludosum* Rchb., *parviflorum* Rchb., *praemorsum* Rchb., *succisaefolium* Rchb. (= *croaticum* Rchb.), v. Crepis aurea, Jacquini, incarnata, lampsanoides, paludosa, Frölichiana, praemorsa, succisaefolia, p. 229 et 230, et p. 167, ll., — *cydoniaefolium* Rchb., *prenanthoides* Rchb., v. Hieracium cydoniaefolium et prenanthoides, p. 399 et 400.

Geranium T., L'Her., Storchschnabel.

affine Ledeb., ähnlicher, 4. f. Altaisch. Sibirien.

albiflorum Ledeb. (= *baicalense* Turczan.).

altaicum Hort., altaischer, 4. f. Altai.

amethystinum Ledeb., amethystfarbiger, 4. f. Caucasus.

angulatum Curt. (= *venosum* P.), kantiger, 4. f. Thracien.

asphodeloides Born. (= *orientale* Mill.).

bifolium Patrin (= *laetum* Ledeb.).

Briceanum Sweet (= *Robertianum pinodorum* DC.), Brice's, ⊙. f. Nordamerika.

brutium Gasparini (= *villosum* Rchb., non Tenore), calabrischer, ⊙. f. Calabrien.

Donianum Sweet (= *multifidum* Don, nec Aliar.), Don's, 4. k. Nepal.

Endressii Gay, Endress's, 4. f. Pyrenäen.

erianthum DC., Lindl. (= ? *Richardsonii* Fisch. et Trautv.), wollblumiger, 4. f. Nordwestl. Amerika.

Hookerianum Walp. (= *albiflorum* Hook., nec Ledeb.), Hooker's, 4. f. Nordamerika (Rockymountains).

lelocanton Ledeb., glattstengeliger, ⊙. f. Talysch.

linearilobum DC. (= *tuberosum* MB. = *tuberosum* var. *sibiricum* W.), gleichbreitzipfeliger, 4. Kn. f. Caucasus, Sibirien.

multifidum Sweet, vieltheiliger, 4. k. t. Cap d. g. H.

nemorosum Tenore, hainliebender, 4. f. Neapel.

psilostemon Ledeb., dünnhaarfadiger, 4. f. Caucasus.

rubifolium Lindl., brombeerblätteriger, 4. f. b. k. Himalayagebirge.

Schiedeanum Schltdl., Schiede's, 4. k. Mexico.

tuberosum L., Kn., β) ramosum Lindl.

villosum Tenore, zottiger, 4. f. Neapel.

Unbestimmtere: declinatum Mch. 4., micranthum Hort., montanum Räusch. Sibir., rubellum Mch. ? Wender.

Gerascanthos vulgaris Mart., v. Cordia Gerascanthus, p. 218.

Gerbera Gronov., Gerbera.

asplenifolia Spgl. (= *Linnaei* Cass. = *Arnica Gerbera* L. = *Doronicum asplenifolium* Lam.), strichfarnblätterige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Gerontogea Deppeana Lk. et Otto, v. Hedyotis Deppeana.

Geropogon glaber L. (= *australis* Spgl.), *G. calyculatus* Jacq. (= *hirsutus* All.), v. Scorzonera hirsuta, p. 735, *hirsutus* L. v. Tragopogon hirsutus.

Geryonia cordifolia Schrk., *crassifolia* Schrk., v. Saxifraga, Sect. I., p. 724.

Gesneria Plum., Mart., Gesnerie.

aggregata Ker (= *pendulina* Lindl.).

canescens Mart., graulichte, 4. Kn. w. Brasilien.

caracasana Otto et Dietr., caracasanische, ♄. 4. Kn. w. Caracas.

cochlearis Hook., löffelförmige, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.

Digitized by Google

Gesneria

Deppeana Schltdl. (= *elongata* var. Grah. = *quaterniflora* Moç., Sess.), Deppe's, 4. ♄. Kn. w. Mexico.
Douglasii Lindl. (= *maculata* Mart. = *verticillata* Hook.), β) verticillata Hort., γ) thyrsoidea v. Houtte.
flavo-virens N. E., Mart., gelbgrüne, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
Gardneriana Hook., Gardner's, 4. ♄. Kn. Brasilien.
Geroldtiana Kunth et Bouché, Geroldt's, 4. ♄. Kn. w. Mexico.
Houttei Dumort., van Houtte's, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
lasiantha Zuccar., haarblumige, 4. ♄. Kn. w. Mexico.
lateritia Lindl. (= *Sellowii* H. angl. non Mart.).
longifolia Lindl., langblätterige, 4. ♄. Kn. w. Guatimala.
macrorrhiza Dumort., grofswurzelige, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
macrostachya Lindl. (= *latifolia* Mart.).
Merckii Wendl. jun. (in Otto et Dietr. Gartenzeitung), Merck's, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
mollis H. B. K. (= *lanata* Hort.), weichblätterige, 4. ♄. Kn. w. Neugranada, Caracas.
polyantha DC. (= *discolor* Lindl.), vielblumige, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
reflexa Know. et Westc., zurückgebogene, 4. k. Kn. w. Chili.
Schiedeana Hook. (= *spicata* β *Schiedeana* DC.), Schiede's, 4. ♄. Kn. w. Mexico.
Schomburgkii Kunth et Bouché, Schomburgk's, 4. ♄. Kn. w. Guiana.
splendens Klotzsch, schimmernde, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
stricta Hook., Arn., steife, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
tribracteata Otto et Dietr., dreideckblätterige, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
trifoliata Mart., dreiblätterige, 4. ♄. Kn. w. Südamerika.
tuberosa Mart. (= *rupestris* Grah., non ? Paxt.), knollige, 4. ♄. Kn. w. Brasilien.
tubiflora Cavan. (= ? *albiflora* Hort.).
uniflora Moç., Sess. (= ? *pendulina* Lindl.), einblumige, 4. ♄. Kn. w. Mexico.
zebrina Paxt., Lindl., scheckige, 4. ♄. Kn. w. Südamerika [1]).

Aufserdem sind in den Pflanzen-Catalogen verschiedener Gärten, noch nachstehende (zum Theil wohl Hybriden) verzeichnet: Bethmanni, digitaliflora, fulgentissima, Herbertiana, hislapiana, hybrida, montevidensis, oblongata, palustris, placentifera Lodd., Tweediana.

barbata N. E., Mart., v. Tapina barbata, *calycina* Sw., *Craniolaria* Sw., *ventricosa* Sw., v. Conradia calycina etc., p. 157, II., *crenulata* DC. fil., *prasinata* Ker, *tomentosa* L., v. Rytidophyllum crenulatum etc., *pulchella* Sw., v. Achimenes coccinea, p. 6, II. — *acaulis* L. (= Conradia Sloanei DC.) et *humilis* L. (= Conradia humilis Mart.), scheinen nicht kultivirt zu werden.

Gesnouinia Gaudich., Gesnouinie, XXI. IV., Urticaceae.
arborea Gaudich. (= *Böhmeria rubescens* Jacq., p. 126 = *Parietaria arborea* Ait. = *Urtica arborea* L. Suppl.), baumartige, ♄. k. Canarische Inseln.

---

1) Walpers (Repertor. Botanic. systemat.) stellt folgende als Abarten zu G. bulbosa Ker: α) dentata Hornsch., β) macrorrhiza Dumort., γ) Suttoni Booth, δ) lateritia Lindl., ε) faucialis Lindl. (= *fascialis* Hook.), ζ) Cooperi H. Woburn., η) Houttei Dumort., ϑ) Merckii Wendl., ι) magnifica Otto et Dietr., κ) splendens Kl.

Digitized by Google

Gethyra occidentalis Salisb., v. Alpinia occidentalis, p. 38.

Geum L., Nelkenwurz.

canadense Murray (= *hirsutum* Mühlg., Lk., Enum.), canadische, 4. f. Nordamerika.

geniculatum Mchx., gelenkige, 4. f. Nordamerika.

intermedium Ehrh. (= *? brachypetalum* Sering. = *urbano-rivale* Schiede), δ) dubium Hornem.

japonicum Thbg., japanische, 4. f. b. k. Japan.

nutans Rafin. (= *Rafinesquianum* Steud.).

obliquum Steud. (= *Caryophyllata obliqua* Mch. = *Waldsteinia Mönchii* Tratt.), schiefe, 4. f. ?

pyrenaicum Ramond (= *nutans* Lam. = *inclinatum* Schlchr. = *sudeticum* Tausch).

strictum Ait. (= *alappicum* Jacq. = *Besserianum* Sweet = *Fischeri* Bess. = *heterophyllum* Fisch. = *hispidum* Fries. = *intermedium* Bess., MB. = *ranunculoides* Sering. = *rugosum* Dsf.), steife, 4. f. Nordamerika, Sibirien, Volhynien, Schweden.

Thomasianum Sering., Thomas's, 4. f. Pyrenäen.

virginianum L. (= *canadense* Jacq., non Murray = *heterophyllum* Dsf. = *laciniatum* Murray).

Geunsia rosea Moç., Sess., v. Calandrinia caulescens, p. 145.

Gilia R. et Pav., Gilie [1]).

I. Collomioides Endl. (= *Hügelia* Benth. = *Welwitschia* Rchb., p. 856).

densifolia Benth. (= *Hügelia* Steud. = *H. densifolia* Benth.).

elongata Steud. (= *Hügelia elongata* Benth.).

gossypifera Gill. (= *Douglasia* Gill.), wolltragende, ? 4. k. Mendoza. (Wohl kaum kultivirt).

virgata Steud. (= *Hügelia virgata* Benth. = *W. virgata* Rchb.).

II. Pseudocollomia Benth.

lutescens Steud. (= *H. lutea* Benth. = *W. lutea* Rchb.).

III. Eugilia Benth., p. 356.

congesta Hook., gedrängtblumige, 4. f. b. k. Nordwestl. Amerika.

crassifolia Benth., dickblätterige, ⊙. f. Chili, Mendoza.

foetida Gill., stinkende, 4. k. Mendoza. (Kaum kultiv.).

incisa Benth., schlitzblätterige, ⊙. ♂. k. f. Texas. (Ob kultivirt?).

millefoliata Fisch. et Mey., garbenblätterige, ⊙. f. Neucalifornien.

multicaulis Benth. (= *achilleaefolia* Lindl., Hook., Swt., non Benth.).

rigidula Benth., starre, ♂. 4. k. Texas. (Kaum kultiv.).

Die übrigen s. p. 356.

IV. Ipomopsis Mchx., Benth. (= *Ipomeria* Nutt., p. 356).

aggregata Spgl. (= *Cantua aggregata* Pursh = *Ipomeria aggregata* Nutt.), angehäuftblumige, ♂. k. Nordamerika.

Beyrichiana Bouché.

coronopifolia P. (= *Polemonium rubrum* L. = *Ipomoea rubra* L. = *Cantua thyrsoidea* Juss. = *C. pinna-*

1) Nach Bentham in DeCandolle prodrom. s. n. r. veget. IX. p. 310 seq.

Digitized by Google

Gilia

tifida Lam. = *C. coronopifolia* W. = *C. elegans* Poir. = *Ipomopsis elegans* Mchx. Sm. = *Ipomoria coronopifolia* Nutt.).

glomeriflora Juss. (= *Collomia Cavanillesiana* G. Don = *Phlox pinnata* Cav.), knaulblumige, ♂. ? 4. k. Mexico, Neuspanien, Buenos Ayres. (Ob kultiv. ?).

pulchella Dougl. (= *aggregata* Swt. = *Ipomopsis elegans* Lindl., non Mchx.).

floridana G. Don (= *Cantua floridana* Nutt), ♂. Florida, longiflora G. Don (= *Cantua longiflora* Torrey), ⊙. Nordam. (Rocky mountains), sinuata Dougl., ⊙. Nordwestl. Amerika, werden wohl kaum kultivirt.

V. Dianthoides Endl. (= *Fenzlia* Benth.).

dianthoides Endl. (= *Fenzlia* Steud. = *Fenzlia dianthiflora* Benth., p. 880).

VI. Linanthus Endl., Benth.

dichotoma Benth. (= *Linanthus* Steud. = *L. dichotomus* Benth., p. 464).

VII. Dactylophyllum Benth., Endl.

linifolia Benth., pharnaceoides Benth., pusilla Benth., v. p. 356.

VIII. Microgilia Benth.

minutiflora Benth., winzigblumige, ⊙. f. Nordwestamerika[1]). (Kaum kultivirt).

IX. Leptosiphon Endl., Benth.

androsacea Steud., densiflora Benth. (= *Leptosiphon* Steud.), grandiflora Steud., lutea Steud., micrantha Steud. (= *L. parviflorus* Benth.), v. p. 455.

X. Leptodactylon Hook. et Arn., Benth.

californica Benth. (= *L. californicum* Hook.), 4. Nordwestl. Amerika, Hookeri Benth. (= *Phlox Hookeri* Dougl.), Neucalifornien, pungens Benth. (= *Cantua pungens* Torrey = *Aegoglochea Torreyi* G. Don), ? 4. Nordamer. (Rocky mountains), scheinen in unseren Gärten noch nicht eingeführt.

Hinsichtlich der übrigen siehe Navarretia.

Gilibertia R. et P. (J. E. Gilibert, ehem. Prof. der Naturgesch. zu Wilna †), ?VIII. 1., Araliaceae.

? dentata (Makoy) (= *Gastonia dentata* Makoy), gezahnte, ♄. w. ? Ostindien.

palmata DC. (= *Aralia palmata* Spgl. = *Hedera palmata* Wall. = *Gastonia palmata* Roxb., p. 346).

Gilibertia heterophylla W., v. Quivisia heterophylla, p. 674.

Ginginsia DC. (Baron F. de Gingins Lassaraz, franz. Botaniker), V. III., Portulaceae-Paronychieae.

albens DC. (= *Pharnaceum albens* Thbg. = ? *P. lineare fl. albo* Andr.), weifsliche, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

aurantiaca DC. (= *Pharnaceum lineare* Ait., non Thbg.), orangefarbige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

elongata DC. (= *Pharnaceum incanum* L. mant., p. 613 = *Pharnaceum lineare* Andr.), verlängerte, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

pruinosa G. Don (= *Pharnaceum pruinosum* Haw., p. 613).

---

1) „Species a Dactylophyllis genorice non removenda, nisi omnes Giliae sectiones pro genera haberes," Benth. l. c.

Digitized by Google

Ginoria Jacq. (= *Ginora* L. = *Genora* P.), **Ginorie**, XI. 1., Lythrariae (Salicariae).

americana L., Jacq., amerikanische, ♄. w. Cuba.
flava Moç., Sess., v. Heimia salicifolia, p. 389.
Ginoria collina Salish., v. Leucadendron plumosum, p. 458. — *Githago segetum* Dsf. et β) nicaeensis W., v. Agrostemma Githago, p. 25.

Gladiolus T., Siegwurz.

aequinoctialis Lindl., aequinoctiale, 4. Zw. k. t. Sierra Leon.
affinis P. (= *cuspidatus* β Andr.), ähnelnde, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn
aphyllus Ker, blattlose, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.
aristatus Schrank, begrannte, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.
bockfeldensis Herb., bockfeldische, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.
brevifolius Jacq. (= *amoenus* Bank's = *carneus* Andr. = *hirsutus* var. α β Ker = *tristis* var. Thbg. = *villosiusculus* Bank's), kurzblätterige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
Breynianus Ker (= *versicolor* β *inaequalis* Ker), Breyn's, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
communis L., β) italicus Mill. (= *dalmaticus* Tausch), γ) leucanthus Bouché (= *fl. alba* Hort.), δ) pallidus Bouché (= *carneus, fl. roseo* Hort.).
discolor Schrank, verschiedenfarbige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
elatus Balb., hohe, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
excelsus Ker (= *blandus* δ *excelsus* Bot. mag.), sehr hohe, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
expallescens Schrk. (= *floribundus* Jacq. var.? Schrk.), verbleichende, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
fasciatus R. et S. (= *vittatus* Hornem.), bebänderte, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
flabellifer Tausch, fächerförmige, 4. k. f. b. Cap d. g. H.
gracilis Jacq. (= *debilis* Sims = *recurvus* W. E. Suppl. = *punctatus* β Banks, Soland.).
gramineus Hornem., grasblätterige, 4. k. f. b. Cap d. g. H.
Gueinzii Kunze, Gueinzius's, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.
hirsutus Jacq., β) roseus Ker, Andr. (= *rubro marginatus* Schrad. = *Watsonia amoena* β *rosea* P.), γ) Merianellus Thbg. (= ? *biflorus* Curt. = *Watsonia humilis* P. = ? *Merianella* Eckl.), γ) Orobanche DC.
hyalinus Jacq. (= *strictus* Jacq., non Ait.).
Jacquini Schrank (= *Merianus* var. Jacq.), Jacquin's, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
inflatus Thbg. (= *cuspidatus* Jacq. var. Ker = ? *blandus* Ait. var. = *tristis violaceus* Thbg.), aufgeblasene, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
ixioides Thbg. (= *longiflorus* Jacq., non L.), ixienähnliche, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
magnificus H. Berol., prächtige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.
marmoratus Tausch (non Lam.), marmorirte, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
oppositiflorus Herb., gegenblumige, 4. Zw. k. t. Madagascar.
psittacinus Lindl., Hook., β) sulphureus H. belg.
recurvus L. (= *alatus* Schneev. = *carinatus* Ait. = *odorus* Salish. = *ringens* Andr. = *violaceus* P. = *punctatus* Jacq.).
scaber Lk. (= *gracilis* W. herb.), scharfe, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.
setifolius L. fil. (= *gracilis* Jacq. var. Spgl.), borstenblätterige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Gladiolus

tenellus Jacq. (= *setifolius β flavus* P. = *tristis* var. *humilis et luteus* Thbg.).

umbellatus Schrank, doldige, 4. Zw. k. f. h. Cap d. g. H.

versicolor Andr., γ) tenuior Ker (= *suaveolens* Sweet).

vittatus Zuccar., bandstreifige, 4. Zw. k. f. h. Cap d. g. H.

vomerculus Ker, pflugschaarähnl., 4. Zw. k. f. h. Cap d. g. H.

Watsonia Jacq., Thbg. (= *pruinosa* Andr. = *recurvus* Houtt. = *Antholyza revoluta* Burm. = *Watsonia praecox* P. = *W. revoluta* P.).

Hybriden:

Arenbergii H. belg., Candollii H. Belg., cardinalis major, Colvillii Sweet, delicatus Herb. (recurvo-blandus), fragrans Herb. (recurvo-tristis), gandavensis H. belg. (oppositifloro-psittacinus), Gretry, Haylockianus Herb. (versicolori-blandus), Herbertianus Sweet (tristi-Spofforthianus), Hermannianus H. belg., mitchamiensis Herb. (tristi-hirsutus), propinquus Herb. (floribundo-blandus), pudibundus Sweet, pyramidalis H. belg., ramosus Hor. belg. et holl. (oppositifloro-cardinalis Herb.), mit folgenden Varietäten:

Amélie, Amsterdam, Batavia, Beauté rouge, Belvédère, Christianus, Dumont d'Urville, Eclatant, emicans, Ernest Maltravers, Fanny Elsler, Feu brillant, formosissimus, fulgens, gloriosus, Haarlem, Hendricus, imperialis, insignis, John Russel, Lafayette, Lehmann, Lisette, Lord Palmerston, monstrosus, Pawlowna, Prince Albert, Prince of Galitzin, Prince of Wales, Princesse Sophie, Queen Bess, Queen Victoria, Regina, reticulatus, Robin hood, Rosa mundi et superba, rouge clair et éblouissant et royal, speciosus, splendens, unique rouge, Van Dam van Isselt, van Hall, vitellinus, Wilhelmus, William II., — reine de Belges, rigidus Herbert (tristi-blandus), Salmianus, Schwarzenbergianus, Spofforthianus Herb. (blando-cardinalis), ? superbus Fisch., vividus etc. — Baron de Pronay, Lowii, Pfeifferi.

alopecuroides L. (= ? *micranthus* Schrank = *plantagineus* P.), v. Miranthus alopecuroides, *flavus* Ait. etc., v. Montbretia flava etc., *orchidiflorus* Andr. etc., v. Hebea orchidiflora etc., *tubulosus* Jacq. (= *aletroides* Vahl = *Merianus* Thbg.), v. Watsonia aletroides, p. 855.

Glaucium T. G., Hornmohn.

persicum DC., persischer, ♂. f. Persien.

Gleditschia L., Gleditschie.

heterophylla Bunge, verschiedenblätterige, ♄. f. Nordchina.

macracantha Dsf. (= *Fontanesii* Spach).

micracantha Lodd., kleindornige, ♄. f. ?

triacanthos L. (= *meliloba* Walt. = *spinosa* Duh.), β) inermis DC. (= *laevis* Hort.), γ) latisiliqua Hort., δ) flava Hort.

Glinus L., Glinus.

Mollugo Feazl (= *Pharnaceum Mollugo* L. mant., p. 613). *Gliricidia sepium* Kunth, v. Lonchocarpus sepium, p. 475.

Globba L., Globba.

maculata Blume, gefleckte, 4. w. Java.

saltatoria Roxb. (= *nemifera* Hort. = *Mantisia saltatoria* Sims).

Digitized by Google

Glochidion Forst., Widerhackler, XVI. f., (XXI. x.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

? laurifolium * (= *Bradleja laurifolia* H. Cels.), lorbeerblätteriger, ♄. w. ?

nitidum (Roxb.) (= *Bradleja nitida* Roxb.), glänzender, ♄. w. Ostindien.

sinicum Hook., Arn. (= *Bradleja sinica* G.), chinesischer, ♄. w. China.

Gloriosa nepalensis Lindl., *simplex* L., *superba* L. etc., v. Methonica nepalensis etc.

Glossarrhen floribundus N. E., Mart., *mexicanus* Steud., *pauciflorus* N. E., Mart., v. Schweiggeria floribunda, mexicana, pauciflora.

Glossogyne Cassin., Zungenweibchen, XIX. r., Compositae-Corymbiferae.

chinensis Cassin. (= *Bidens chinensis* W., p. 121), chinesisches, ⊙. f. China.

Gloxinia L'Her., Gloxinia.

I. Euglоxinia DC. (Genuina).

arborea Colla, baumartige, ♄. Kn, w. ?

caulescens Lindl. (= *Martynia caulescens* Dsf.), b) grandiflora Hort.

cerina v. Houtte, wachsähnliche, 4. Kn. w. Südamerika.

discolor Kunze et ? H. Cels. (= *speciosa* var. DC.), verschiedenfarbige, 4. Kn. w. ? Brasilien.

macrophylla N. E., Mart, b) variegata Hort.

speciosa Lodd. (= *formosa* Hortul. = *Martynia speciosa* Hortul.), a) albiflora Hook. (= *alba* Hort. = *candida* Hort.), b) alba maxima A. P. (= *candidissima* Hort.), c) bicolor Bot. reg., d) Cartoni Bot. reg., e) coelestina Hort., f) digitaliflora Knigth et Rolliss., g) grandiflora Hort., g^b) Handleyana Harris. (rubroalba), h) incarnata Hort., i) insignis H. angl., k) magnifica H. angl., l) maxima Hort.), m) Menziesii Hort., n) pallida maxima A. P., o) Pressii Hort., p) praecellentissima H. Monac., q) Priestleyana Hort., r) rosalba H. belg., s) rubra Hort. et b rosea, t) violacea A. P., u) Youngii H. angl.

* hybrida carnea Möhring (specioso-rubra-Helleri).

II. Sinningia N. E., Lindl.

Lindleyi Schauer (? = *Gesneria calycina* Sw. = *Sinningia Helleri* Lindl., non Mart.), Lindley's, ♄. w. Brasilien.

III. Houttea * (van Houtte, Besitzer eines reichen Gartenetablissements etc. in Gent).

tubiflora Hook., röhrenblumige, 4. ♄. w. Südamerika, (? Buenos Ayres).

G. calycina Hort., v. Conradia calycina, p. 157, II.

Glyceria RBr., Süfsgras.

I. Catabrosa P. B.

aquatica Presl (= *airoides* Rchb. = *Colpodium aquaticum* Trin. = *Hydrochloa aquatica* Hartm. = *Poa airoides* Koel. = *P. dulcis* Salisb.).

Engelmanni (Lk.), Engelmann's, 4. f. Nordamerika.

humilis (Trin.) (= *Aira humilis* MB. = *Colpodium bulbosum* Trin.).

scabra (Kunth) (= *Aira scabra* Zuccag.), scharfes, 4. f. ?

viridula (R. et S.) (= *Aira scabra* Hort. = *A. viridula* Poir.).

minuta Trin., v. Airopsis minuta, p. 26.

Digitized by Google

Glyceria

II. Euglyceria (Genuina).

acutiflora Torrey (= *brevifolia* Schult. = *Festuca bicornis* Schreb. = *F. brevifolia* Mühlbg.), spitzblumiges, 4. f. Nordamerika.

arundinacea Kunth (= *spectabilis* δ Trin. = *Hydrochloa arundinacea* Sweet = *P. arundinacea* MB.).

conferta Fr., gedrängtähriges, 4. Wa. f. Schweden.

delawarica* Endl. Hort. Vindob. p. 49.

distans Wahlbg. (= *Aira aquatica* β Huds. = *Festuca distans* Kunth), β) capillaris Wahlbg. (= *Festuca capillaris* Liljebl = *Molinia capillaris* Hartm.).

festucaeformis* (= *Festuca Hostii* Kunth = *F. palustris* Scenus = *Poa festucaeformis* Host).

fluitans RBr. (= *Festuca fluitans* L. = *Hydrochloa fluitans* Hartm. = *Poa fluitans* Scopol.), α) poaeformis Fr., β) festucacea Fr., γ) triticea Fr.

maritima M. et K. (= *Diachroa maritima* Nutt. = *Festuca thalassica* Kunth = *Hydrochloa maritima* Hartm.), α) palustris Fr., β) arenaria Fr. (= *Poa arenaria* Trin. = *convoluta* Hartm. = *P. festucaeformis* Hort.).

Michauxii Kunth (= *nervata* Trin.).

pendulina Laestad., herabhängendes, 4. f. Schweden.

plicata Fries, gefaltetes, 4. Wa. f. Schweden.

remota Fr. (= norwegica Sommerf. = *Poa remota* Forselles), entferntähriges, 4. f. Norwegen, Schweden.

songarica Schrenk (= ? *Poa paradoxa* Karel. et Kiril., C. A. Mey.), songarisches, ⊙. ? 4. Soongaria.

spectabilis M. et K. (= *aquatica* Whlbg. = *Hydrochloa aq.* Hartm. = *Poa altissima* Mch. = *P. aquatica* L.). *arundinacea* Fr. (non Kunth), v. Scolochloa festucacea, p. 734. Hiernach p. 360 et 361 zu berichtigen und zu ergänzen.

Glycine L., Glycine.

labialis L. Suppl. (= *anonychia* Walp. = *debilis* Ait. = *filiformis* Wall. = ? *pallens* Grah. = *parviflora* Lam. = *pentandra* Roxb. = *Bujacia anonychia* E. Mey. = *Teramnus labialis* et *parviflorus* Spgl.), lippenförmige, ♂. ♄. Sch. w. Ostindien.

americana Tenore, H. Par. (= *bracteata* L. = *monoica* L.), *comosa* L. (= *monoica* L. var. Auct.), *elliptica* Sm. (= *filosa* Hornem. = *heterocarpa* Hegetschw. = *monoica* Schk. = *sarmentosa* Roth), v. Amphicarpaea comosa, monoica et sarmentosa, p. 49, *Backhousiana* Hort. angl., *chinensis* Curt, *rosea* Hort. belg., v. Wistaria Backhousiana etc., *clandestina* Wendl., v. Leptocyamus clandestinus, *hedysaroides* W. (= *pentandra* Spgl., non Roxb.), v. Teramnus hedysaroides, *humifusa* W., v. Westonia humifusa, *secunda* Thbg., v. Rhynchosia secunda. — *sagittata* H. B. K. (= Centrosema hastatum Benth.), scheint nicht kultivirt zu werden.

Glycyphylla hispidula Rafin., v. Phalerocarpus hispidulus, p. 612.

Glycosmis Correa, Süfsbaum.

citrifolia Lindl. (= *parvifolia* Steud. = *Limonia citrifolia* W., p. 404 = *Limonia parvifolia* Sims).

madagascariensis H. Cels., madagascarischer, ♄. w. Madagascar.

Digitized by Google

Glycyrrhiza T., Süfsholz(wurzel).
astragalina Gill., tragantähnliches, ♄. k. Chili.
grandiflora Tausch (= *hirsuta* H. Prag.), grofsblumiges, 4. f. ?
triphylla Fisch. et Mey., v. Meristotropis triphylla.
Gmelina L., *asiatica* L. (= *lobata* G.).
Gnaphalium Vaill., DC., Ruhrkraut.
acuminatum Lk. (= *Helichrysum acuminatum* Don, p. 384).
candidissimum Lam. (non MB.) (= *campestre* Schrank = *carroense* Schrank = *mucilentum* E. Mey.), reinweifses, ☉ f. Cap d. g. Hoffn.
cephaloideum W. (= *asteroides* Balb. ? = *globosum* Hornem. = *Willdenowii* Dietr. = *Filago cephaloidea* Lk.), kopfförmiges, ♂. 4. k. Neuholland.
citrinum Hook., citrofarbiges, ♂. k. Chili.
collinum LaBill. (= ? *cephaloideum* W. = *Euchiton collinum* Cass.), Hügel-R., ♂. k. Neuholland.
confusum DC. (= *arenarium* Thbg. = *martabanicum* Wall. = *pallidum* Hamilt. = *Helichrysum affine* D. Don, p. 384) verwechseltes, ☉. f. m. Ostindien.
Gaudichaudianum DC (= ? *decurrens* Schrank), Gaudichaud's, ☉. m. f. Brasilien.
indicum L. (= *multicaule* W. = *pluricaule* Poir. = *polycaulon* P.), indisches, ☉. m. f. Ostindien, Chili.
β) chilense Fisch., Mey. et Lallem.
involucratum Forst. (= ? *collinum* LaBill. = *globosum* Dsf., H. Par. = *hemisphaericum* Hornem. = *glomeratum* H. Par. = *sphaericum* W. = *Euchiton Forsteri* et *pulchellum* Cass.).
lasiocaulon Lk. (= *Helichrysum lasiocaulon* Don, p. 185).
luteo album L. (= *Helichrysum luteo album* Rchb.), *β*) depressum P. (= *Pompejanum* Tenore = *sphaericum* Perrott. = *trifidum* Thbg.), Europa, Asien, Afrika, Amerika, Neuholland.
niliacum Raddi (= spathulatum Delil.), Nil-R., ☉. f. Aegypten.
paniculatum Colla (= *Pira s. Vira Vira* Less. (non Mol. et DC.).
pensylvanicum W. (= *americanum* Hortul. = *chilense* H. Par. = *Cruickshankii plur.* Hort.).
polycephalum Mchx. (= *conoideum* Lam. = *obtusifolium* L.).
Sprengelii Hook., Arn. (= *chilense* Spgl. = *decurrens* Hook. = *luteo-album β occidentale* Nutt.), Sprengel's, ☉. f. Californien, Oregongebiet.
suffrutescens Brotero, halbstrauchiges, ♄. k. ? Südamer.
velutinum Willd. herb., sammethaariges, ☉. f. ?
Vira-Vira Molin. (= *Pira-Vira* Less., excl. Synon.), Vira-Vira-R., ☉. f. Chili.
Unbestimmtere: australe Fisch. Neuholl., linarifolium Wendl., longifolium Hort., nitidum Hornem. ☉. *alpinum* L., *carpathicum* Whlbg., *dioicum* L. etc., v. Antennaria alpina etc., p. 62, *arboreseens* L., *asperum* Thbg., v. Anaxeton arborescens etc., p. 53, *arenarium* L. etc., v. Helichrysum arenarium etc., p. 384 etc., *arvense* W. etc., v. Filago arvensis, p. 334, *candidissimum* MB., v. Cladochaeta candidissima, p. 148, II., *celosioides* H. B. K. et *flaccidum* Weinm. etc., v. Achyrocline celosioides, flaccida etc., p. 7, II., *cynoglossoides* Trev. (= *nepalense* Hort.

Digitized by Google

Gnaphalium
= *perfoliatum* Wall. = *quintuplinerve* Hamilt.) et *margaritaceum* L., v. Antennaria triplinervis et margaritacea, p. 62, *diosmaefolium* Vent. (= *piluliferum* Hort.), v. Ozothamnus diosmaefolius, *divergens* Thbg. (= *glabrescens* Schrank), *fastigiatum* Thbg. etc., v. Metalasia divergens, fastigiata etc, p. 521, *legitimum* G., v. Otanthus maritimus, p. 573, *Leontopodium* Jacq., v. Leontopodium alpinum, p. 453, *modestum* Hook., *phlomoides* Lam., v. Helipterum gnaphalodes, phlomoides, p. 388, *spathulatum* Thbg. (= *spadiceum* Lam.), *squarrosum* L., v. Leontonix spathulatus, squarrosus, p. 453, *umbellatum* L., v. Erythropogon umbellatum, p. 316, *umbellatum* Schrk., v. Metalasia muricata, p. 521, *virgatum* L., v. Pterocaulon virgatum, p 885. — Hiernach zu berichtigen und zu ergänzen, p. 362 et p. 878.

Gnephosis Cass., Gnephosis, XIX. II., Compositae-Helichryseae.
tenuissima Cass. (= *Podolepis divaricata* Cunningh.), feinste, ⊙. m. f. Neuholland.

Gnidia L., Gnidie.
filamentosa L. fil. (= *Lachnaea buxifolia* Lam., p. 441), fadenförmige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
β) glauca Sims (= *grandis* Hort. = *Lachnaea glauca* Salisb., p. 442).
grandiflora W. E. Suppl., grofsblumige, ♄. t. Cap d. g. H.
radiata L. (= *pinifolia* Lodd., non L.), strahlige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
sericea L. (= *oppositifolia* Andr., non L.).
tomentosa L. (= *pubescens* Berg. = *punctata* Lam.).

Godetia Spach (Godet, franz. Botaniker), VIII. 1. Onagrariae.
albescens Lindl., weifsliche, ⊙. ♂. f. Columbia.
Bottae Spach (= *Oenothera Godetia* Steud.), Botta's, ⊙. f. Californien.
Cavanillesii Spach (= *tenella* Spach = *Oenothera tenella* Cav., Swt., p. 555).
decumbens Spach (= *Oenothera decumbens* Dougl., 554).
Gayana Spach (= *Oenothera tenella β tenuifolia* Lindl. = *O. Gayana* Steud.), Gay's, ⊙. f. Chili.
grandiflora Lindl., grofsblumige, ⊙. f. Nordamerika.
Lehmanniana Spach (= *amoena* Sweet, Lilja = *roseoalba* Hort. = *Oenothera amoena* Lehm. = *O. roseoalba* Hornem., p. 555), Lehmann's, ⊙. f. Californien.
lepida Lindl. (= *Oenothera lepida* Torr. et Gr.).
Lindleyana Spach (= *Oenothera Lindleyi* Dougl., p. 555 = *O. macrantha* Nutt.).
quadrivulnera Spach (= *Oenothera quadrivulnera* Dougl., p. 555).
Romanzowii Spach (= *Oenothera Romanzowii* Ledeb., Hornem., p. 555).
rubicunda Lindl. (= *Oenothera rubicunda* Torrey et Gr.), röthliche, ⊙. f. Californien.
tenuifolia Spach (= *Oenothera tenuifolia* Cav., p. 555).
viminea Spach (= *Oenothera viminea* Dougl., p. 556).
vinosa Lindl. (= *macrantha* Lilja = *vinosa* Hortul. = *Oenothera vinosa* Torrey et A. Gr.).

Digitized by Google

Godetia

Willdenowiana Spach (= *purpurea* Sweet = *Oenothera purpurea* Curt. W. = *humilis* Don = *Onagra purpurea* Mch.), Willdenow's, ⊙. f. Westl. Nordamer.

Hiernach p. 363 zu ergänzen.

Goeppertia bicolor N. E. (= *Calathea bicolor* Steud.), v. Maranta bicolor, p. 496, *G. zebrina* N. E., v. Calathea zebrina, p. 145.

Goetzea Rchb., v. Westonia.

Goldfussia N. E., Goldfussie.

anisophylla N. E. (= *Ruellia anisophylla* Wall. = *R. amygdalaefolia* Hort. = *persicifolia* Bot. reg.).

Dicksonii H. Cels., Dickson's, ♄. w. ?

glomerata N. E. (= *Ruellia glomerata* Wall.), knaulförmige, ♄. w. Ostindien.

Gomezia RBr., Gomezie.

chrysostoma Hffg., goldmundige, 4. w. Brasilien.

densiflora Hffg., dichtblumige, 4. w. Brasilien.

divaricata Hoffg., ausgesperrte, 4. w. Brasilien.

intermedia Hoffg., mittlere, 4. w. Brasilien.

multiflora Hoffg. (= *pauciflora* Hffg.), vielblumige, 4. w. Brasilien.

pycnantha Hffg., ballblumige, 4. w. Brasilien.

reclinata Hffg., zurückgebeugte, 4. w. Brasilien.

undulata Hffg., wellenförmige, 4. w. Brasilien.

virescens Hffg., grünliche, 4. w. Brasilien.

Gomphia Schreb., obtusifolia DC. (= *laevigata* Lodd.), zeylanica DC. (= *angustifolia* Vahl).

Gomphocarpus RBr., Nagelfrucht.

angustifolius Lk. (= *Asclepias angustifolia* W.), schmalblätterige, ♄. k. t. Mexico.

viridiflorus Spgl. (= *Acerates viridiflora* Ell. = *Asclepias viridiflora* Pursh), grünblumige, 4. f. Nordamer.

viridis Spgl. = Anantherix viridis Nutt., scheint nicht kultivirt zu werden.

Gompholobium Sm., Nagelhülse.

aciculare Rchb. (= ? *ericoides* Hort.), nadelblätterige, ♄. t. Neuholland.

Drummondii H. Angl., Drummond's, ♄. t, Neuholland.

glaucescens Cunn. (= *grandiflorum β setifolium* DC. = ? *glaucum* H. Angl. = *setifolium* Sbr.).

Hendersonii Paxt., Henderson's, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).

Hügelii Benth., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

intermedium Makoy, mittlere, ♄. t. Neuholland.

Knightianum Lindl. (= *heterophyllum* Cunn.).

mucronatum Makoy, stachelspitzige, ♄. t. Neuholland.

polymorphum RBr. (= *grandiflorum* Andr. non Sm. = *sparsum* Cunn.).

splendens Low, schimmernde, ♄. t. Neuholland.

subulatum Benth., pfriemenförmige, ♄. t. Neuholland.

uncinatum Cunningh., hackenförmige, ♄. t. Neuholland.

versicolor Benth., Lindl. Bot. reg., buntfarbige, ♄. t. Neuholland.

tenuifolium Hort. = ? tenue Lindl. — *ellipticum* LaBill., v. Oxylobium ellipticum.

Gomphrena L., Kugelamaranth.

arborescens L. (= *officinalis* Mart. = *Bragantia Vandellii* R. et S.).

callosa Sweet, schwieliger, ♄. w. Südamerika.

carnea Jacq., Sweet, fleischfarbiger, ♄. w. Südamerika.

Digitized by Google

Gomphrena
decumbens Jacq., Sweet (= *bicolor* Hort. = *prostrata* Dsf. = *tumida* Hort. = *Achyranthes ternata* Hort.).
pulchella Mart., Hook., schöner, ⊙. w. m. f. Montevideo.
virgata Mart., ruthenförmiger, 4. w. Brasilien.
aggregata W. et *vermicularis* Sw., v. Philoxerus aggregatus et vermiculatus, p. 615, *brasiliensis* Jacq. etc., v. Telejanthera brasiliensis etc., Sect. III. Mogiphanes, *ficoidea* L., *polygonoides* L., *prostrata* Zuccagn., *sessilis* L., v. Alternanthera ficoidea etc. p. 40, *elongata* W. (= *fruticosa* Hort.), v. Telejanthera porrigens, Sect. II. Brandesia, *floridana* Spgl., *interrupta* L. etc., v. Froelichia floridana etc., p. 248, li.

Gonatanthus Kl., Sprossenwurz, XXI. IX., Aroideae.
sarmentosus Kl. (= *Caladium sarmentosum* H. Berol.), brasilianische, 4. w. ? Brasilien.

Gongora R. et P. (= *Gongoras* Hffg.), Gongora.
atropurpurea Hook., a) albescens Hort. Booth., b) major Hort., c) nigra Hort. Booth., d) picta Hort., e) picta albescens Hort. Booth.
citrina Hort. belg., citronfarbige, 4. w. Südamerika.
fulva Lindl., rothbraune, 4. w. Demerara.
irrorata Hffg., getüpfelte, 4. w. Brasilien.
macrantha Lindl., Hook., (= *Coryanthes s. Corysanthes macrantha* p. 222).
maculata Lindl. (= *Coryanthes s. Corysanthes maculata* Hook., p. 222), b) alba Hort. (= *leucochila* Hort.), c) fulgida Hort. (= *fulgens* Hort.), d) grisea Lodd., e) pallida Hort., β) Histrio Hort.
nigrita Lindl., schwärzliche, 4. w. Demerara.
quinquenervis R. et P., fünfnervige, 4. w. Peru.
speciosa Lindl., Hook. (= *Coryanthes speciosa* Hook.).
truncata Lindl., abgestutzte, 4. w. Mexico.
versicolor H. Booth., buntfarbige, 4. w. Südamerika.

Goniophlebium Bl., *Presliauum* Sm., *ramosum* Sm. etc., v. Polypodium, Sect. VI.

Goniopteris Presl, *asplenioides* Presl, *crenata* Lk., *prolifera* Presl, v. Polypodium, Sect. IX.
Gonogona discolor Lk., v. Goodyera discolor, p. 365.

Gonolobus Mchx., Ringelkranz.
Baldwinianus Sweet (= *caroliniamus* Nutt. = *hirsutus* Lodd., non Mchx.), Baldwin's, 4. Sch. f. Nordamer.
hispidus Hook., Arn., steifhaariger, 4. ♄. Sch. w. Südbrasilien.
macrophyllus Mchx. (= *carolinensis* RBr.).
maritimus RBr., v. Ibatia maritima.

Gonospermum Less., elegans DC. (= *Achillea arborea* Hornem. = *Hymenolepis elegans* Cass. = *Tanacetum canariense* DC. Catal. h. monspel.), multiflorum DC. (= *canariense* Less.).

Goodenia Sm., Goodenie.
cistifolia Cunn., ciströschenblätterige, 4. k. t. Neuholl.
coronopifolia RBr., krähenfufsblätterige, ⊙. ♂. k. f. Neuholland.
paniculata Sm. (= *lanceolata* Hort. = *Boutonia pomifera* Hort.).
radicans P. (= *Selliera radicans* Cav.), starkwurzelnde, 4. k. t. Neuholland.
rigida Benth., starre, 4. ♄. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Goodia Salisb., Goodie.
retusa Makoy, Sweet, abgestutzte, ♄. t. k. Neuholland.
subpubescens Sweet, wenighaarige, ♄. t. k. Neuholland.
latifolia Hort. (non Salisb.), v. Trichasma ciliatum, *simplicifolia* Spgl., v. Platychilum Celsianum, p. 633.

Goodyera RBr., Goodyera.
macrophylla Lowe, grofsblätterige, 4. w. t. Madeira.

Gordonia Ellis, Gordonie.
axillaris Endl. (= *anomala* Spgl. = *Camellia axillaris* Roxb. = *Polyspora axillaris* Sweet, p. 646).
nepalensis ? Wall., nepalsche, ♄. t. w. Nepal.
semiserrata Spgl. (= *Haemocharis semiserrata* Mart. = *Lindleya fruticosa* N. E. = *Laplacea inaequilatera* Schott = *Wikstroemia fruticosa* Schrad.), halbsägezähnige, ♄. w. Brasilien.
Wallichii DC. (= *Chilaunea* Don = *integrifolia* Roxb. H. Benghalensis), Wallich's, ♄ w. t. Nepal, Java.
Gorinkia orientalis Presl, v. Erysimum orientale, Sect. III., p. 314.

Gorteria L., Gorteria.
calendulacea DC. (= *Chrysostemma calendulaceum* E. Mey.), ringelblumenähnliche, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.
ciliata Thbg., v. Cullumia patula, p. 175, II.
Gossampinus alba Hamilt. (= *Rumphii* Wight), v. Eriodendron orientale, p. 229, *rubra* Hamilt, v. Salmalia malabarica.

Gossypium L., Baumwolle.
album Hamilt., Wight et Arn. (= *herbaceum* L. = *hirsutum* L. = *obtusifolium* Roxb. = *tricuspidatum* Lam.), weifse, ⊙. ♂. 4. w. Ostindien.
arboreum L. (= *nigrum* γ Wight et Arn. = *purpurascens* Poir., Dsf. = *rubicundum* Roxb. = *vitifolium* Wall.).
barbadense L. (= *javanicum* Blume = *nigrum* β Wight Arn. = *racemosum* Poir. = *glabrum* Poir.).
chinense Fisch. et Otto (= ? *siamense* Tenore).
nigrum Hamilt., Wight, Arn. (= *indicum* Lam. = *latifolium* Murr. = *macedonicum* Murray = *peruvianum* Cav. = *vitifolium* Lam.), schwarze, ♂. w. Ostindien.
religiosum L. (= *croceum* Hamilt. = *Nanking* Meyen).
brasiliense Macf. Brasil., jamaicense Macf. Jamaika, javanicum Decaisne, Molucken (nigrum var. ?), oligospermum Macf. Jamaika, prostratum Schum. et Thonn. Guinea, punctatum Schum. et Thonn. Guinea, werden in den europäischen Gärten wohl kaum kultivirt.

Gouania L., Gouanie.
brasiliensis Hffg., brasilianische, ♄. ♄. Sch. w. Brasilien.
corylifolia Raddi, haselnufsblätterige, ♄. ♄. Sch. w. Brasilien.
domingensis L. (= *glabra* Jacq.).
mauritiana Lam. (= *incisa* Vahl).
tiliaefolia Lam. (= ? *nepalensis* Wall. = *Stadtmanni* Willem.).

Gouffeia Robil. et Cast., Gouffeia.
arenarioides Robill. et Cast., Sandmierenähnliche, ⊙. f. Südfrankreich.
holosteoides Fisch. et C. A. Mey., v. Lepyrodiclis holosteoides.

Govenia Lindl., Govenie.
aurea H. belg., goldfarbige, 4. w. ? Mexico.

Digitized by Google

Govenia
fasciata H. belg, querbändrige, 4. w. Südamerika.
Gardneri Hook., Gardner's, 4. w. Brasilien.
lagenophora Lindl., flaschentragende, 4. w. Brasilien.
superba Lindl. (= *Maxillaria superba* Lex. et Lall.), b) fl. albo H. Booth.
utriculata Lindl. (= *Cymbidium utriculatum* Sw. = *Limodorum utriculatum* Jacq.), schlauchförmige, 4. w. Jamaika, Domingo.

Grabowskia Grabowskia.
duplicata W. Arn. (= *brasiliana* Schltdl. = *Ehretia duplicata* N. E.), brasilianische, ♄. t. Brasilien.
Grahamia (= *Graemia*) *aromatica* Spgl., v. Cephalophora aromatica p. 180 et p. 133, II.

Grammanthes DC., Schriftblümchen.
chloraefolia DC. (= *dichotoma* Auct. = *Crassula dichotoma* L. = *Vananthes chloraefolia* Haw.), chlorablätteriges, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.
β) retroflexa Sweet (= *Crassula retroflexa* Thbg.).
gentianoides DC. (= *Crassula gentianoides* Lam.), enzianähnliches, ⊙. f. Cap d. g. Hffn.
Grammarthron scorpioides Cass., v. Doronicum scorpioides, p. 272.

Grammatocarpus Presl, Schriftfrucht, XVIII. II. (XIII. I.), Loasaceae.
volubilis Presl (= *Scyphanthus elegans* Don), windende, 4. Sch. t. k. Chili.
β) grandiflorus * (= *Scyphanthus grandiflorus* Sweet, p. 737 = *Loasa volubilis* Hort.).

Grammatophyllum Blum., Lindl., Schriftstendel.
Finlaysonianum Lindl., Wall., Finlayson's, 4. w. Ostind.
multiflorum Lindl., β) tigrinum Lindl.

Grammatotheca Presl, Bergiana Presl, v. Lobelia, Sect. III^b.

Grammitis Sw., Schriftfarrn.
linearis W., gleichbreitblätteriger, 4. w. Java.
villosa Presl, v. Gymnogramme villosa.

Grammosciadium DC., Keulendolde, V. II., Umbelliferae.
daucoides DC., möhrenähnliche, ⊙ f. Armenien, Persien.
meoides DC. (= *Myrrhis clavata* Spgl. = *Scandix macrosperma* W. herb.), bärwurzähnliche, ⊙. f. Armenien.

Grangea Adans., Grangea.
aegyptiaca DC. (= *maderaspatana* Dsf., non Lam. = *Tanacetum aegyptiacum* Jacq. = ? *T. humile* Forsk.), aegyptische, ⊙. f. Aegypten.
maderaspatana Lam. (= *Adansonii* Cassin. = *Artemisia maderaspatana* L. = *Cotula maderaspatana* W.).
bicolor Dsf (= *latifolia* Lam.), *sonchifolia* Loud., v. Dichrocephala latifolia et sonchifolia, p. 262, *cinerea* Loud, v. Tanacetum cinereum.

Grangeria Commers., borbonica Lam. (= *buxifolia* Sm.).

Graptophyllum N. E., hortense N. E., v. Justicia, Sect. VI. = J. picta L., p. 434.

Gratiola L., Gnadenkraut.
anagalloidea Mchx (= *dilatata* Mühlbg. = *inaequalis* Walt. = ? *tetragona* Ell. = *Lindernia dilatata* Ell. = *L. pyxidaria* Pursh), gauchheilblätteriges, ⊙. f. Nordam.
oppositifolia W. h. (= *serrata* Roxb.), *reptans* Roxb., *veronicaefolia* Retz., v. Bonnaya brachiata etc., p. 127.

Digitized by Google

Greenovia Webb. (G. B. Greenough, berühmter engl. Geolog), XI. VII., Corniculatae Crassulaceae.

aurea Webb. (= *Sempervivum aureum* Ch. Sm., p. 741 = *calyciforme* Haw.), goldfarbige, ♄. 4. k. t. Canarische Inseln.

Gregoria Vitaliana Duby, v. Aretia Vitaliana, p. 77.

Grenvillea Swt., conspicua Swt., v. Pelargonium, Sect. VI. p. 599.

Grevillea RBr., Grevillea.

anethifolia RBr., dillblätterige, ♄. t. Neuholland.

angulata RBr. (= *ilicifolia* Cunn.), kantige, ♄. t. Neuholland.

angustata RBr., verschmälerte, ♄. t. Neuholland.

Aquifolium Meisn., (= *aquifolia* Cunningh. = *agrifolia* Hort. = *Anadenia Aquifolium* Lindl.), stechhülsenblätterige, ♄. t. Neuholland.

australis RBr., südliche, ♄. t. Neuholland.

Baueri RBr. (= *duphnoides* Sbr. = *myrtillifolia* Cunn.), β) pubescens Hook. (non Grah.).

Baxteri RBr., Baxter's, ♄. t. Neuholland.

bipinnatifida RBr., doppeltfiederspaltige, ♄. t. Neuholl.

Brownii Meisn., Brown's, ♄. t. Neuholland.

buxifolia RBr. (= *collina* Knght = *Embothrium buxifolium* Sm. = *E. genianthum* Cavan. = *Stylurus buxifolius* Knght., Salisb. = *St. collinus* Knght., Salisb.).

Candolleana Meisn., Candolle's, ♄. t. Neuholland.

chrysodendron RBr. (= *pteridifolia* Knght. et Salisb.), goldfarbige, ♄. t. Neuholland.

crithmifolia RBr., meerfenchelblätterige, ♄. t. Neuholland.

Cunninghamii RBr. (= *carduifolia* Cunningh.), Cunningham's, ♄. t. Neuholland.

depauperata RBr., ärmliche, ♄. t. Neuholland.

Drummondii Meisn., Drummond's, ♄. t. Neuholland.

Endlicheriana Meisn., Endlicher's, ♄. t. Neuholland.

ericifolia RBr., heideblätterige, ♄. t. Neuholland.

eriostachya Lindl., wollährige, ♄. t. Neuholland.

fasciculata RBr., büschelförmige, ♄. t. Neuholland.

ferruginea Sieb., rostfarbige, ♄. t. Neuholland.

floribunda RBr., blüthenreiche, ♄. t. Neuholland.

Gaudichaudii RBr., Gaudichaud's, ♄. t. Neuholland.

gibbosa RBr. (= *glauca* Knght. et Salisb.), höckerige, ♄. t. Neuholland.

glabella RBr. (= *acicularis* Cunningh., non Schult.), kahle, ♄ t. Neuholland.

Goodii RBr., Good's, ♄. t. Neuholland.

Hookeriana Meisn., Hooker's, ♄. t. Neuholland.

Hügelii Meisn, Hügel's, ♄. t. Neuholland.

ilicifolia RBr. (= *Anadenia ilicifolia* RBr.), ilexblätterige, ♄. t. Neuholland.

Lawrenceana H. angl., Lawrence's, ♄. t. Neuholland.

Lindleyana Meisn., Lindley's, ♄. t. Neuholland.

longifolia RBr. (= *argentea* Hort.), langblätterige, ♄. t. Neuholland.

mimosoides RBr., sinnpflanzenähnliche, ♄. t. Neuholl.

mucronifolia Cunn., stachelspitzblätterige, ♄. t. Neuholl.

mucronulata Salisb. (= *Lysanthe podalyriaefolia* Knght. et Salisb.).

obtusiflora RBr., stumpfblumige, ♄. t. Neuholland.

polystachya RBr. (= *parallela* Knght. et Salisb.), vielährige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Grevillea

pulchella Meisn. (= ? *Anadenia pulchella* RBr.), schöne, ħ. t. Neuholland.

pungens RBr., stechende, ħ. t. Neuholland.

pyramidalis Cunningh., pyramidenförmige, ħ. t. Neuh.

quercifolia RBr. (= *brachyantha* Lindl.), eichenblätterige, ħ. t. Neuholland.

rigens Cunningh., starre, ħ. t. Neuholland.

salicifolia Endl., weidenblätterige, ħ. t. Neuh. (Schwfl.).

Sternbergiana Hügel, Sternberg's, ħ. t. Neuholland.

sulphurea Cunningh. (= *acicularis* Schult., non Cunn. = *acifolia* Spgl. = *aciphylla* Sbr.).

Synapheae RBr. (= *Anadenia gracilis* Lindl.), schlanke, ħ. t. Neuholland.

tenuifolia RBr., dünnblätterige, ħ. t. Neuholland.

tenuiflora Meisn. (= *Anadenia tenuiflora* Lindl.), dünnblumige, ħ. t. Neuholland.

Thelemanniana Hügel (= *absinthifolia* Hort. belg.), Thelemann's, ħ. t. Neuholland.

trifida Meisn. (= *Anadenia trifida* RBr.), dreispaltige, ħ. t. Neuholland.

triternata RBr. (= *Anadenia triternata* Cunningh.), dreimaldreizählige, ħ. t. Neuholland.

vestita Hort., bekleidete, ħ. t. Neuholland.

glabrata Meisn. (= *Manglesii* Hortul.), v. Manglesia cuneata, *silaifolia* Don, v. Lomatia silaifolia, p. 475.

Grewia Juss., Grewie.

abutilifolia Juss. (= *arbutifolia* P. = *aspera* Roth = *macrophylla* Don), sammetmalvenblätterige, ħ. w. Java.

africana Mill. (= ? *mollis* Juss.), africanische, ħ. w. Senegal.

asiatica L. (= *subinaequalis* DC.).

cuneifolia Juss., keilblätterige, ħ. w. Madagascar.

glabra DC., kahle, k. t. Canarische Inseln.

Heynei Steud. (= *villifera* Swt. = *villosa* Heyne, Roth), Heyne's, ħ. w. Ostindien.

hirsuta Vahl (= *montana* Koenig = *pilosa* Roxb., non Lam. = *Roxburghii* Don = *salvifolia* Wall. = *tomentosa* Roxb.).

Microcos L. (= *affinis* Lindl. = *ulmifolia* Roxb. = *Arsis rugosa* Lour. = *Microcos Mala* Hamilt. = *M. paniculata* L. = *M. Stauntoniana* Don).

pendula Brotero, herabhängende, ħ. t. ?

pilosa Lam. (= *carpinifolia* Roxb. = *commutata* DC. = *flavescens* Juss. = *orientalis* G., Vahl = *scabrida* Wall.).

serrulata DC. (= *laevigata* Vahl = *sepiaria* Roxb.).

Griffinia Ker, Griffinia.

Libonina H. belg., Libon's, 4. Zw. w. Südamerika.

Griffithia RBr. (Griffith, Will., Dr., Prof. u. Conservator am botanischen Garten in Singapore etc., †), V. 1., Rubiaceae.

fragrans Walk., Arn. (= *Gardenia fragrans* Roxb., p. 346 = *G. Pandaki* Vahl = *Posoqueria fragrans* Roxb. = *Randia malabarica* Lam. = *Stylocoryne malabarica* DC. = *St. Pandaki* DC.), wohlriechende, ħ. ħ w. Ostind.

Grimaldia assurgens Schrk. (= *decumbens* Schrk.), *bifoliulata* Schrk., v. Cassia nictitans et bifolialata, p. 169 et 170, p. 123, 11.

Digitized by Google

Grindelia W., Grindelie.

crispa H. Berol., krausblätterige, ? 4. ħ. k. ? Südamer.

fruticosa Dunal (= *Donia fruticosa* Dsf.), strauchige, ħ. k. ?

pulchella Dunal, schöne, ħ. k. t. Chili.

villosa Courtois = ?

Grisebachia Kl. (Grisebach, Prof. der Botanik in Göttingen, Verfass. mehr. schätzbarer botan. Werke), (= Erica Sect. VI., p. 307).

bruniades Benth. (= *Finckea bruniades* Kl.), bruniaähnliche, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

ciliaris Kl. (= *Blaeria ciliaris* L. fil. = *Erica plumosa* Thbg.).

hispida Kl. (= *Blaeria Thunbergii* G. Don = *Erica hirsuta* Salisb.).

plumosa Kl. (= *Blaeria nodiflora* G. Don = *Erica nodiflora* Salisb.).

Guajava pisiformis G., v. Psidium pyriferum, p. 662.

Guettarda L., Guettarda.

Fontanesii DC. (= *hirsuta* Dsf., non P.), Desfontaine's, ħ. w. ?

hirsuta P. (= *Laugeria hirsuta* R. et P.).

scabra Lam., Vent. (= *Matthiola* P. = *M. scabra* L.). *lucida* P. et *tomentosa* P., v. Stenostomum lucidum et tomentosum.

Guilielma Mart. (? Wilhelmie), XXI. VI. (VI. 1.), Palmae.

speciosa Mart (= *Bactris Gasipaës* Humb., Bonpl. K.), prächtige, ħ. w. Brasilien.

Guizotia Cass., oleifera DC. (= *abyssinica* Cass. = *Polymnia abyssinica* L. = *P. frondosa* Bruce = *Bidens Ramtilla* Wall. = *Helianthus oleifer* Wall. = *Jaegeria abyssinica* Spgl. = *Parthenium luteum* Spgl., Lk. = *Ramtilla oleifera* DC. = *Tetragonotheca abyssinica* Ledeb. = *Verbesina sativa* Roxb. = *Werinnia* Heyne = *Heliopsis platyglossa* Cassin. = *Veslingia scabra* Visian. sem. Hort. Patav. 1840) [1]).

Gunnera L., Gunnera.

scabra R. et P. (= *chilensis* Lam. = *tinctoria* Mirb. = *Panke acaulis* Molin. = *P. tinctoria* Auct.), scharfe, 4. t. k. Chili, Peru.

sonchifolia Mirb., v. Frankoa sonchifolia, p. 337.

Gunnia Lindl., Gunnie, XX. 1., Orchideae.

australis Lindl., südliche, 4. w. Van Diemens Land.

picta Lindl., bemalte, 4. w. Neuholland.

Gyas florida Salisb., *humilis* Salisb. et *verecunda* Salisb., v. Bletia florida, hyacinthina et verecunda, p. 125.

Gymnachaena bruniades Rchb., v. Perotriche tortilis.

Gymnadenia RBr., Richard, Händleinwurz.

humilis Lindl. (= *Orchis Hostii* Tratt. = *O. Nicodemi* Cyril., p. 566), niedrige, 4. Kn. k. Neapel.

pauciflora Lindl. (= *Orchis pauciflora* Fisch.), wenigblumige, 4. Kn. f. b. Dahurien.

tridentata Lindl. (= *Habenaria clavellata* Spgl. = *H. tridentata* Hook., p. 373 = *Orchis clavellata* Mchx. = *O. tridentata* W.).

albida Rich., v. Leucorchis albida, *viridis* Rich., v. Peristylus viridis.

---

1) Das letztere Synonym gehört nach H. Prof. Endlicher auch hierher, dagegen sagt Visiani „Genus (Veslingia) Heliopsidi, Guizotiae et Tetragonothecae affinis, at diversum".

Digitized by Google

Gymnagathis J. C. Schauer, Nacktmyrte, XVIII. 11., Myrtaceae.

teretifolia J. C. Schauer (= *Melaleuca teretifolia* Endl.), stielrundblätterige, ♄. ♄. t. Neuholland.

Gymnandra Pall., Kletschblume.

altaica C. A. Mey., altaische, 4. f. Altai.

Gymnanthemum cupulare Cass. (= *senegalense* C. H. Schulz), v. Decaneuron senegalense, p. 254 et p. 198, II.

Gymnarrhena Dsf., Nacktbeutel, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

micrantha Dsf. (= *Frankia Schimperi* Steud.), kleinblumiger, ☉. f. Persien.

Gymnobalanus N. E., Nacktlorbeer, IX. 1., Laurineae.

Catesbyanus N. E. (= *Laurus borbonica α* Lam. = *L. Catesbaei* P. = *L. Catesbyana* Mchx., p. 449).

Gymnocline Vaillantii Cass., v. Pyrethrum achilleaefolium var. β, p. 669.

Gymnogramme Desv., Schriftfarrn.

I. Anogramma Lk. (= *Chloropteris* Kze.).

asplenioides Sw.

chaerophylla Desv. (= *Hemionitis chaerophylla* Poir.), kerbelblätteriger, 4. w. Jamaika, Bonaria, Montevideo, Brasilien.

leptophylla Desv. (= *Grammitis leptophylla* Sw.), schlankblätteriger, 4. k. t. Morea, Neapel, Sicilien, Portugal, Spanien.

rutaefolia RBr., rautenblätteriger, 4. w. Neuholland.

II. Ceropteris Lk. (= *Calomelanos* Presl).

Calomelanos Kaulf. (= *Acrostichum Calomelanos* L.).

chrysophylla Kaulf. (= *Acrostichum chrysophyll.* Sw.).

dealbata Lk. (= *tartarea* Desv. = *Hemionitis dealbata* W.).

distans Lk.

flavens Kaulf. (= *Acrostichum flavens* Sw.), gelblicher, 4. w. Mittägl. Amerika.

L'Herminieri Bory (chrysophyllo-peruviana Regel), L'Herminier's, 4. w. Guadeloupe.

ochracea Presl.

peruviana Desv. (= *dealbata* Presl, non Lk.).

sulfurea Desv. (= *Acrostichum sulfureum* Sw.).

trifoliata Desv.

Hybriden:

Calomelaena-dealbata Regel, chrysophyllo-Calomelaena Regel, dealbato-Calomelaena Regel, distante-Calomelaena Regel, distante-dealbata Regel, Martensii Lk. (chrysophyllo-dealbata = *hybrida* Martens), Massoni Lk. (chrysophyllo-distans).

III. Ceterach W., p. 185 et p. 134, II.

capensis (Kunze) (= *cordata* Hook. et Grevill.).

Ceterach Spgl. (= *Ceterach officinarum* W. = *Asplenium Ceterach* L.).

cordata Schltdl. (= *crenata* Kaulf. = *Ceterach cordatum* Kunze = *C. crenatum* Kaulf. = *Grammitis cordata* Sw. = *Nothochlaena cordata* Desv.), herzförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

sinuata Presl (= *Nothochlaena sinuata* Kaulf., p. 550 = *Acrostichum sinuatum* Sw.).

Digitized by Google

Gymnogramme

IV. Gymnogramma genuina Lk.

polypodioides Spgl. (= *Ceterach polypodioides* Raddi = *Polystichum gymnogrammoides* Gaudich.), β Raddiana Lk.

villosa Lk. (= *aspidioides* Kaulf. = *Grammitis villosa* Presl), zottiger, 4. w. Caracas, Brasilien.

V. Neurogramma Presl, Lk.

myriophylla Sw.

pedata Kaulf. (= *Hemionitis pedata* Sw.).

rufa Desv. (= *Hemionitis rufa* Sw.).

tomentosa Desv. (= *Hemionitis tomentosa* Raddi = *Ceterach lobatum* (= *barbatum*) Presl).

palmata Lk., v. Hemionitis palmata, p. 389.

Gymnopogon P. B., Nacktbart, III. II., Gramineae.

mollis N. E., weicher, ⊙. w. m. f. Brasilien.

racemosus P. B. (= *scoparius* Trin. = *Aloecatherus ambiguus* Ell. = *Andropogon ambiguus* Mchx. = *Anthopogon lepturoides* Nutt. = *Stipa expansa* W.), traubiges, 4. f. Nordamerika.

Gymnopsis connata Steud., *triplinervia* DC., v. Gymnoloma connatum, triplinerve, p. 371, — *maculata* Ker, v. Wulffia maculata.

Gymnosperma Less., DC., Nacktsaame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

corymbosum DC., traubendoldiger, ♄. t. k. Mexico.

glutinosum Less. (= *Molina viscosa* H. Berol. = *Selloa glutinosa* Spgl., p. 741).

multiflorum DC. (= *Molina glutinosa* Alam.), vielblumige, ♄. t. k. Mexico.

Gymnostyles Juss, Nacktgriffel, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

anthemifolia Juss. (= *Soliva anthemifolia* RBr., p. 711).

lusitanica Spgl. (= *stolonifera* Juss. = *Hippia stolonifera* Brot. = *Soliva lusitanica* Less. = *S. stolonifera* Loud.), portugiesischer, ⊙. f. Portugal.

Gymnothrix P. B., *adoensis* Hochst., *cenchroides* R. et S., v. Pennisetum, Sect. I.

Gynandropsis DC., Zwitterkapper.

muricata Schrad. (= *Cleome muricata* Schult.), weichstachelige, ⊙. w. m. Ostindien.

Gynema balsamica Rafin., v. Pluchea camphorata, p. 885.

Gynerium W., Prachtrohr, XXII. III. (III. II.), Gramineae.

argenteum N. E. (= *Arundo Selloana* Schult. = *A. dioica* Spgl. = *A. Kila* Spgl.), silberfarbiges, ♂. 4. w. Brasilien.

saccharoides H. B. K. (= *procerum* P. B. = *sagittatum* P. B. = *Arundo fastuosa* W. herb. = *A. sagittata* P. = *Saccharum sagittatum* Aubl.), zuckergrasähnliches, 4. ♄. w. Südamerika.

Gynestum acaule Poit., v. Geonoma acaulis, p. 352.

Gynopleura linearifolia Cav., v. Malesherbia linearifolia, p. 490.

Gynopogon pugioniformis Cunningh., *scandens* Forst., v. Alyxia pugioniformis et scandens, p. 42 et 29, II.

Gynura Cass., Gynura, XIX. I. (II.), Compositae-Corymbiferae. (Senecio, Sect. V., p. 746).

bicolor DC. (= *Caculia bicolor* Roxb., p. 141).

haematophylla DC. (= *Senecio africanus* Hort. = *S. bicolor* Balb. = *S. discolor* Dsf. = *S. cruentus* Roth = *S. haematophyllus* W. Enum.).

Digitized by Google

Gynura
nepalensis DC. (= *Cacalia aurantiaca* W. = *C. nepalensis* Spgl.), nepalsche, 4. k. Nepal.
ovalis DC. (= *Cacalia ovalis* Ker), eiförmige, 4. k. China.
Pseudo-China (= *Senecio Pseudo-China* L.).

Gypsophila L., Gypskraut.
Arrostii Gussone (= *dichotoma* Gussone, non Bess. = *Arrostia dichotoma* Ratin.), Arrosti's, ⊙. f. Unteritalien.
β) pubescens.
dahurica Turcz., dahurisches, 4. f. Dahurien.
glomerata Pall. (= *dianthoides* Sib., Sm.).
Gmelini Bunge (= *Patrini* Sering. = *thesiifolia* Sering.).
hirsuta Spgl. (= *Saponaria hirsuta* LaBill. = *S. hirta* Steud.), rauhhaariges, 4. k. Syrien.
paniculata L. (= *effusa* Tausch), *β*) grandiflora Dsf.
perfoliata L. (= *sabulosa* Stev. = *scorzonerifolia* H. Par.), *β*) tomentosa L.
porrigens Fenzl (= *Saponaria porrigens* L., p. 721).
Rokejeka Delil. (= *Rokejeka capillaris* Forsk. = *R. deserti* Poir.).
stricta Bunge, steifes, 4. f. Altai.
Szowitsii Fisch. et Mey., Szowits's, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.
β) glandulosa Fisch. et Mey. (= *Dichoglottis lineariſolia* Fisch. et Mey.).
venusta Fenzl, liebliches, 4. f. b. k. Syrien.
Unbestimmtere: elata Wender., trichotoma Wender.

Gyrocarpus Jacq., Rundnufs, Gyrocarpeae.
rugosus RBr., runzelige, ħ. k. t. Neuholland.

Gyrostemum Dsf., ramulosus Dsf. p. 372 (= *Codonocarpus australis* Cunningh.).

Habenaria W., RBr., Habenarie.
alata Hook. (= *bidentata* Poepp. = *Orchis foliosa* Sw.).
aranifera Lindl., spinnenblumige, 4. Kn. w. Bonaria.
arenaria Lindl., sandliebende, 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffn.
bractescens Lindl., deckblätterige, 4. Kn. w. Bonaria.
clypeata Lindl., schildförmige, 4. Kn. w. Mexico.
digitata Lindl. (= *Bonatea herbacea* Wall. = *B. panduana* Lindl.), fingerförmige, 4. Kn. w. Ostindien.
ensifolia Lindl. (= *intermedia* Wall.), schwerthlätterige, 4. Kn. w. Ostindien.
filicornis Lindl. (= *Orchis filicornis* Thonn., Schum.), fadenhornige, 4. Kn. w. Guinea.
flexuosa Lindl., gebogene, 4. Kn. w. Mexico.
floribunda Lindl., blüthenreiche, 4. Kn. w. Peru.
Gourlieana Gill., Gourlie's, 4. Kn. w. Chili.
hexaptera Lindl., sechsflügelige, 4. Kn. w. Brasilien.
imbricata Lindl., ziegeldachförmige, 4. Kn. w. Brasilien.
Lindleyana Steud. (= *latifolia* Lindl., non H. B. K.), Lindley's, 4. Kn. w. Ceylon.
longicauda Hook., langschweifige, 4. Kn. w. Demerara.
maculosa Lindl., fleckige, 4. Kn. w. Westindien, Südamer.
maxillaris Lindl. (= *Platanthera foliosa* Brogn.), kerfähnliche, 4. Kn. w. Peru.
mystacina Lindl., kleinbartige, 4. Kn. w. Brasilien.
nuda Lindl., nackte, 4. Kn. w. Brasilien.
obtusa Lindl., stumpfe, 4. Kn. w. Brasilien.
parviflora Lindl., kleinblumige, 4. Kn. w. Brasilien.
pentadactyla Lindl., fünffingerige, 4. Kn. w. Bonaria.

Digitized by Google

Habenaria

petalodes Lindl., grofsblumige, 4. Kn w. Brasilien.
pubescens Lindl., weichhaarige, 4. Kn. w. Ostindien.
quadrata Lindl., gevierte, 4. Kn. w. Brasilien.
repens Nutt., kriechende, 4. Kn. t. k. Carolina.
rotundifolia Lindl. (= *grandiflora* Lindl. = *Orchis grandiflora* Heyne), rundblätterige, 4. Kn. w. Ostindien.
secunda Lindl, einseitige, 4. Kn. w. Brasilien.
stenopetala Lindl., schmalkronige, 4. Kn. w. Ostindien.
tridactylites Lindl. (= *Orchis tridactylites* Webb.), dreitheilige, 4. Kn. t. Canarische Inseln.

albida RBr., v. Leucorchis albida, *blephariglottis* Hook., *ciliaris* RBr., *cristata* RBr., *dilatata* Hook., *fimbriata* RBr., *flava* RBr., *gigantea* Don, *Herbiola* RBr., *hyperborea* RBr., *incisa* Spgl., *lacera* RBr. (= *psychodes* Spgl.), *Susannae* RBr., v. Platanthera blephariglottis etc. — *bracteata* RBr., *cordata* RBr., *goodyeroides* RBr., *virescens* Spgl., *viridis* Hook., v. Peristylus bracteatus, cordatus etc.

Habranthus Herb., Jugendblume.

Bangoldianus Herb. (= *Amaryllis Bangoldiana* Steud.), Bangold's, 4. Zw k. t. Chili.
concolor Lindl., einfarbige, 4. Zw. k. t. Mexico.
grandiflorus v. Houtte, grofsblumige, 4. Zw k. t. Südam.
intermedius Herb. (= *Amaryllis intermedia* Lindl.), mittlere, 4. Zw. w. Brasilien.
kermesinus Sweet (= *Amaryllis kermesina* Lindl.), karminrothe, 4. Zw. w. Brasilien.
pratensis v. Houtte, Wiesen-J., 4. Zw. w. Südamerika.

Habrosia Fenzl, Habrosie, V. II., Caryophyllaceae-Scleranthеae.

spinuliflora Fenzl (= *Arenaria spinuliflora* Sering.), stachelblumige, ☉. f. ?

Habrothamnus corymbosus Endl., *cyaneus* Lindl., *fasciculatus* Endl., *purpureus* Lindl. (= *elegans* Scheidweil.) etc., v. Meyenia corymbosa etc.

Haemadictyon Lindl., Blutling.

annulare Lindl., DC. (= *Echites annularis* L. fil.), ringelförmiger, ♄. Sch. w. Surinam.
sanguinolentum A. DC., ächter, ♄. Sch. w. Westindien.
suberectum Don (= *Apocynum speciosissimum* Mill. = *Echites suberecta* L.), fastaufrechter, ♄. w. Ostindien.

Haemanthus L., Blutblume.

Lambertianus Schult. fil., Lambert's, 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.
longifolius Hort., langblätterige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.
multiflorus Martyn (= *Amaryllis multiflora* Tratt.), vielblumige, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.
obliquus Don, schiefe, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.
quadrivalvis Jacq. (= *pubescens* Thbg. = *trispathinus* Hort.).

Unbestimmtere: hydrophilus Thbg., roseus Hort., sinuatus Thbg., spathulatus Hort.

Haemaria Lindl., Haemarie, XX. I., Orchideae.

discolor Lindl., verschiedenfarbige, 4. w. China.

Haemocharis semiserrata Mart., v. Gordonia semiserrata, p. 272, II.

Digitized by Google

Haemodorum Sm., Blutnarzisse.

coccineum RBr. (= ? *corymbosum* Sm.), scharlachfarbige, 4. t. Neuholland.

Hugaea alsinefolia Bivon., *polycarpoides* Bivon., *Teneriffae* P., v. Polycarpaea alsinefolia etc., p. 641.

Hakea Schrad., Hakea.

aculeata Hügel (= *acuminata* Hort.), stachelige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

adnata RBr, angewachsene, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

amplexicaulis RBr., *α*) latifolia Meisn. (= *triformis* Lindl.), *β*) angustifolia Meisn.

bipinnatifida RBr., doppeltfiederspaltige, ħ. ħ. t. k. Neuh.

Bouchéana Kunth, Bouche's, ħ. ħ. t. k. Van Diemens Land.

Brownii Meisn., Brown's, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

canescens Lk., grauliche, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

corymbosa RBr., traubendoldige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

costata Meisn., gerippte, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

crassinervia Meisn., dicknervige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

cucullata Cunningh., RBr, *β*) conchifolia Hook.

Cunninghamii RBr, (= *longifolia* Cunningh.), Cunningham's, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

cyclocarpa Lindl., rundfrüchtige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

dactyloides Cav. (= *nervosa* Knght. et Salisb. = *Conchium dactyloides* Vent. = *C. nervosum* Sm., Don, G.).

decurrens RBr., herablaufende, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

drupacea RBr. (= *Conchium drupaceum* G.), steinfrüchtige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

eucalyptoides Meisn., schönmützenähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuh.

eriantha RBr., wollblumige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

falcata RBr., sichelförmige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

Fraseri RBr., Fraser's, ħ ħ. t. k. Neuholland.

gibbosa Cav. (= *pinifolia* Knght., Salisb. = *pubescens* Schrad., Wendl. = *Conchium gibbosum* Sm. = *C. pubescens* W.).

glabella RBr., kahle, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

α) paucidentata Meisn., *β*) denticulata RBr.

heterophylla H. angl., verschiedenblätterige, ħ. ħ t. k. Neuholland.

ilicifolia RBr. (= *intermedia* Hook.).

incrassata RBr., verdickte, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

lasiantha RBr., haarblumige, ħ. ħ t. k. Neuholland.

lasiocarpha RBr, haarfrüchtige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

Lehmanniana Meisn., Lehmann's, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

Leucadendron Meisn., weifsholzige, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

leucoptera RBr. (= *leucocephala* Hort.), weifsflügelige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

lissocarpha RBr., glattfrüchtige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

lorea RBr. (= *Grevillea lorea* RBr., Spgl.), riemenförmige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

macrocarpa RBr., grofsfrüchtige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

myrtoides Meisn., myrtenähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

oleaefolia RBr. (= *ligustrina* Knght., Salisb.).

patula RBr., ausgebreitete, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

petiolaris Meisn., gestielte, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

propinqua Cunningh. (= *pachyphylla* Sbr.).

proteoides H. belg., proteaähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

pugioniformis Cav. (= *glabra* Schrad., Wendl. = *glauca* Knght., Salisb. = *Conchium pugioniforme* Sm. = *C. longifolium* Sm. = *Lambertia teretifolia* G.), *β*) parilis Knght., Salisb.

Digitized by Google

Hakea

Preissii Meisn., Preiss's, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
repanda RBr. (= *ferruginea* Sweet), ausgeschweifte, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
smilacifolia Meisn., stechwindenblätterige, ♄. t. k. Neuh.
stenocarpa RBr., schmalfrüchtige, ♄. ♄. t. k. Neuholl.
stenophylla RBr., schmalblätterige, ♄. t. k. Neuholland.
suaveolens RBr. (= *heterophylla* H. Cels. = *pinnata* Hort. = *Banksia heterophylla* et *pinnata* Hort.).
tephrosperma RBr., grausaamige, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
virgata RBr., ruthenförmige, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

Halenia Borkh., Halenie, V. 1. (11.), Contortae-Gentianeae.

deflexa Griseb. (= *Michauxiana* Don = *Swertia americana* Spgl. = *corniculata* Mchx. = *S. deflexa* Sm. = *S. Michauxiana* R. et S.), herabgebogene, ☌. f. Nordamerika.
Fischeri Graham, Fischer's, ⊙. f. Dahurien.
sibirica Borkh. (= *Swertia corniculata* L.), sibirische, ⊙. ☌. f. Sibirien.

Halianthus peploides Fr., v. Alsine, Sect. II, p. 38. *Halimium atriplicifolium* Spach, *lasianthum* Spach, *lepidotum* Spach, *rosmarinifolium* Spach, *umbellatum* Spach, v. Helianthemum atriplicifolium, lasianthum, halimifolium, Libanotis et umbellatum, p. 380 etc., — *Clusii* Spach, v. Cistus Clusii, p. 200.

Halimocnemis C. A. Mey., Salzmelde, V. 11. (III. 11., I. 11.), Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

brachiata C. A. Mey. (= *Anabasis conjugata* Hoffm. = *Polycnemum brachiatum* MB. = *P. conjugatum* MB. = *P. oppositifolium* R. et S. = *P. triandrum* Pall.), armförmige, ⊙. f. Taurien.
crassifolia C. A. Mey. (= *Anabasis oppositifolia* MB. = *Polycnemum alternifolium* Pall. = *P. crassifolium* Pall. = *P. oppositifolium* MB.), dickblätterige, ⊙. f. Altaisch. Sibirien.
glauca C. A. Mey. (= *Polycnemum glaucum* Pall.), blaugrüne, ⊙. f. Altaisch. Sibirien.
juniperina C. A. Mey. (= *Anabasis caespitosa* Steph. = *A. Sieversii* W. = *Camphorosma acuta* Falk = *Polycnemum erinaceum* Pall. = *P. juniperinum* MB.), wachholderähnliche, ♄. f. Altaisch. Sibirien.
malacophylla C. A. Mey. (= *Polycnemum malacophyllum* MB. = ? *Salsola arborescens* L. fil. = *S. pilosa* Pall.), weichblätterige, ⊙. f. Caucasus, Sibirien.
monandra C. A. Mey. (= *Polycnemum monandrum* Pall.), einmännige, ⊙. f. Altaisch. Sibirien.
pubescens Ledeb., weichhaarige, ⊙. f. Sibirien.
sclerosperma C. A. Mey. (= *Polycnemum nuciferum* Pall. = *P. sclerospermum* Pall.), knorpelsaamige, ⊙. f. Taurien, Mittelasien.
sibirica C. A. Mey. (= *Polycnemum sibiricum* Pall. = *Salsola oppositifolia* Pall.), sibirische, ⊙. f. Sibirien.
Volvox C. A. Mey. (= *Anabasis triandra* MB. = *Polycnemum salsum* MB. = *P. triandrum* Pall. = *P. Volvox* Pall.), dreimännige, ⊙. f. Altaisch. Sibirien, Mittelasien.

Vergl. p. 641.

Digitized by Google

Halimolobus Tausch, XV. III., Cruciferae.
patula Tausch (= *Sisymbrium polystachyum* Hort.).
stricta Tausch (= *Arabis lasioloba* Hort.).
Angabe der Dauer, des Vaterlandes etc. fehlt, daher noch unsicher. —

Hallia Thbg., Hallia.
angustifolia DC. (= *virgata* Thbg.), schmalblätterige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
ruscifolia Bot. mag., mäusedornblätterige, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.
Halmyra stellaris Salisb., v. Pancratium illyricum, p. 582.
Halocharis altaica Fisch., *carthamoides* MB., v. Leuzea altaica et carthamoides, p. 460.

Halocnemum MB., Salzstrauch, V. II., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).
caspicum MB. (= *Salicornia caspica* L., Pall.), caspischer, ♄. k. f. b. Gegend des caspischen Meeres.
fruticosum Lk. (= *Arthrocnemum fruticosum* Moq. Tand. = *Salicornia fruticosa* L. et Auct., p. 710 = *S. Alpini* Lagasc.).
strobilaceum MB. (= *Salicornia caspica* Stev. = *S. glauca* Delil. = *S. mucronata* Lagasc. = *S. strobilacea* W.), zapfenförmiger, ♄. k. f. b. Taurien, Gegend des caspischen Meeres.

Halogeton C. A. Mey., Salzgänsefuss, V. II. (I. II.), Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).
glomeratus C. A. Mey. (= *Anabasis glomerata* MB. = *Salsola glomerata* Stephan.), knaulförmiger, ⊙. f. Sibirien.
monandrus C. A. Mey. (= *Anabasis monandra* MB. = *Salsola monandra* Pall.), einmänniger, ⊙. f. Sibirien.
oppositiflorus C. A. Mey. (= *Anabasis oppositiflora* Schrad., p. 51 = *Chenopodium oppositiflorum* L.).
tamariscifolia C. A. Mey. (= *Anabasis tamariscifolia* L., p. 51 = *Salsola tamariscifolia* Lagasca).

Halolachna Ehbg., Salztamariske, V. III., Tamariscineae.
soongarica Ehbg. (= *Tamarix soongarica* Pall.), soongarische, ♄ f. Soongaria.

Haloragis Forst., Meernüfschen.
capensis Nois., Cels., capisches, ♄. k. t. Cap d. g. H.

Hamelia L., Hamelie.
axillaris Sw., β) appendiculata G. fil. (= ? *lucida* Dsf.).
patens L. (= *coccinea* Sw.), β) erecta Jacq. (= *chrysantha* Sbr.).
xorulensis H. B. K. (= *patens* Sw., non L.), xorulische, ♄. t. Mexico.
Hamelinia veratroides A. Rich., v. Astelia Banksii, p. 94 et 51, II.
Hamiltonia scabra Don et *suaveolens* Don, v. Spermadictyon scabrum et suaveolens.
Hamulium alatum Cass., v. Verbesina alata, p. 840.
Hapalanthus repens Jacq., v. Callisia repens, p. 148.

Hapalochlamys Cass. (= *Apalochlamys* Auct., p. 870), Zartdosten, XIX. v., Compositae-Eupatorineae.
Billardieri DC., Billardiere's, ♄. ♄. t. k. Van Diemens Land.
Endlicheri DC. (= *Cassinia spathulata* Endl.), Endlicher's, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
Kerii DC. (= *Cassinia spectabilis* Ker), Ker's, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

Digitized by Google

Haplopappus Cass. (= *Aplopappus* Auct. p. 68).

Haplophyllum Adr. Juss. (= *Aplophyllum* Auct.), Schmalraute.

Sieversii Schrenk (= *perforatum* Karel. et Kiril.), Sievers's, 4. f. b. Soongaria.

spathulatum Rchb. (= *suaveolens* Sweet = *Ruta linifolia* MB. = *R. linifolia β grandiflora* Sims = *R. suaveolens* DC.), spatelförmige, 4. ♄. f. b. Griechenland, Taurien.

Haplotaxis DC. (= *Aplotaxis* Auct.), Schmalkelch, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

albescens DC. (= *Serratula albescens* Wall.), weifslicher, ⊙. f. Nepal, Ostindien.

Bungei DC. (= *Cirsium lyratum* Bunge = *Hemisteptia lyrata* Bunge, p. 389).

Frolovii DC. (= *Cnicus altaicus* Steph. = *Frolovia lyrata* Ledeb., p. 339 = *Saussurea Frolovii* Ledeb.).

gossypina DC. (= *Cnicus gossypinus* Wall. = *Eriocoryne nidularis* Wall. = *Saussurea gossypina* Wall. = *S. gossypiphora* Don), baumwolletragender, ⊙. m. f. Ostindien.

Hardenbergia Benth, Comptoniana Benth. etc., v. Kennedya Sect. II.

Harina Hamilt., Harina, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

caryotoides Hamilt. (= *H. Wallichia* Steud. = *Wallichia caryotoides* Roxb., p. 855 = *Wrightea caryotoides* Roxb.), brennpalmenähnliche, ♄. w. Ostindien.

Harmogia C. Schauer, Harmogie, VIII. 1., Myrtaceae.

parvula C. Schauer (= *Baeckea parvula* DC. = ? *B. virgata* Andr. = *Leptospermum parvulum* LaBill.), kleine, ♄ t. k. Neuholland.

pinifolia C. Schauer (= *Baeckea pinifolia* DC. = *Leptospermum pinifolium* LaBill.), kieferblatterige, ♄. t. k. Neucaledonien.

virgata C. Schauer (= *Baeckea virgata* Ker, p. 110 = *Leptospermum virgatum* Forst. = *Melaleuca virgata* L. fil.).

Harpalyce alba Don, *altissima* Don, *cordata* Don, *racemosa* Don, *rubicunda* Don, *Serpentaria* Don, *virgata* Don, v. Nabalus suavis, altissimus etc.

Harpechloa Kunth, Sichelspelze, III. II., Gramineae.

capensis Kunth (= *falcata* Kunth = *Campulosus falcatus* B. P. = *Campuloa hirsuta* Desv. = *Chloris falcata* Sw. = *Cynosurus falcatus* Thbg. = *Dactyloctenium falcatum* W. = *Eleusine falcata* Spgl. = *Melica falx* L.), capische, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Harpephora Endl., Sichelträger, XIX II., Compositae-Corymbiferae.

Schottii Endl., Schott's, ⊙. m. f. Ostafrika.

Harriota DC., v. Cacteae, p. 874 et p. 99, II.

Harrisonia loniceroides Hook, v. Baxtera loniceroides, p. 62, II.

Hartigsea Juss., Hartigsea X. 1. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

spectabilis Juss. (= *Trichilia spectabilis* Forst.), ansehnliche, ♄. t. w. Neuzeeland.

Hartmannia gauroides Spach (= *rosea* Sweet), *Kunthiana* Spach, *macrantha* Spach, *virgata* Spach, (= *affinis* Spach), v. Oenothera rosea, pinnatifida, tetraptera, et virgata.

Digitized by Google

Hartwegia Lindl. (Th. Hartweg aus Carlsruhe, berühmt als Reisender und fleifsiger Pflanzensammler [in Südamerika], für Sir William Hooker etc.), XX. 1., Orchideae.

purpurea Lindl, purpurfarbige, 4. w. Mexico.

Hartwegia comosa N. E., v. Hollia comosa.

Haxtonia phlogopappa Caley, *tomentosa* Caley, v. Olearia phlogopappa et tomentosa, p. 99, Aster, Sect. XIII.

Haynea pedunculata Spgl., v. Vernonia pedunculata, p. 841.

Hebea P. Eckl., Hebea, III. 1., Irideae.

alata P. (= *Gladiolus alatus* L., p. 346 = *G. galeatus* Burm. = *viperatus* Ker).

orchidiflora P., Eckl. (= *Gladiolus orchidiflorus* Andr.), knabenkrautähnliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

tabularis P. (= *Antholyza montana* Ker, p. 65 = *Gladiolus montanus* Thbg. = *G. parviflorus* Jacq. = *G. tabularis* P.), Tafelberg's H., 4. Zw. t. k. Cap der guten Hoffnung.

bicolor Eckl., *galeata* P., v. Synnotia bicolor et galeata, p. 794.

Hebeclinium DC., macrophyllum DC., v. Eupatorium, Sect. IV., p. 320.

Hebenstreitia L., Hebenstreitia.

aurea Andr., goldfarbige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

dentata Thbg. (= *pulchella* Salisb.), β) integrifolia L.

tenuifolia Schrad. (= ? *angustifolia* Hort.), dünnblätterige, 4. ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

capitata Thbg., *ciliata* Berg. (= *albiflora* Lk.), *chamaedryfolia* Lk., *erinoides* Thbg.), v. Dischisma capitatum, ciliatum etc., p. 207, II., *cordata* L., v. Polycenia cordata.

Heberdenia Banks, Heberdenie, V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.

excelsa Banks (= *Ardisia excelsa* Ait., p. 74 = *A. bahamensis* DC. = *Anguillaria bahamensis* G. = *Icacorea bahamensis* Lam = *Myrsine excelsa* Lk. = *M. Heberdenia* R. et S. = *Condalia coriacea* Holl.).

Hecastaphyllum Kunth (= *Ecastaphyllum* P. Br., p. 378).

Brownei Kunth, P. (= *E. frutescens* P. Br. = *Amerimnum Sieberi* Rchb. = *Hedysarum Ecastaphyllum* L. = *Pterocarpus Ecastaphyllum* L.), Plumieri P., Sieberi Rchb.

Hechtia Klotzsch (Hecht, J. G. H., k. Preuss. Geheimer Regierungsrath, † 1837), XXII VI., Bromeliaceae.

stenopetala Klotzsch, smalkronige, 4. w. t. Mexico.

Ob H. glomerata Zuccar., pitcairniaefolia Zuccar., planifolia Zuccar. 4. Mexico, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Heckeria Kunth, peltata Kunth, scutatata Kunth, sidaefolia Kunth, umbellata Kunth, v. Piper, Sect.

Hedeoma P., Zwergminze.

Drummondii Benth., Drummond's, 4. ♄. f. h. k. Nordamerika, Texas.

? *thymoides* P., v. Thymus Serpyllum, β) montanus Benth.

Hedera T., Epheu.

arborea Sw. (= *Aralia arborea* L., p. 71).

Digitized by Google

Hedera
capitata Sm. (= *Aralia capitata* Jacq., p. 71).
ferruginea DC. (= *Aralia ferruginea* H. B. K., p. 71 = *A. heptaphylla* W. herb.).
flexuosa Broter., hin- und hergebogener, ♄. Sch. ? ?

Hedychium Koenig, Kranzblume.
barbatum Wall., bärtige, 4. w. Ostindien.
Gomezianum Wall, Gomez's, 4. w. Ostindien.
Hasselti Blume, Haſselt's, 4. w. Java.
lingulatum Hassk., zungenförmige, 4. w. Java.
Roscoi Wall., Roscoe's, 4. w. Nepal.
thyrsiforme Sm. (= *hoteromallum* Ker).

Hedyotis L., Ohrling (= *Oldenlandia* L., p. 556).
Burmanniana RBr. (= *biflora* Lam., Roth = *diantha* Schult. mant. = *diffusa* W. = *Gerontogea biflora* Chamiss., Schltdl. = *Oldenlandia biflora* Lam., Roxb. = *O. dichotoma* W.), Burmann's, ⊙. w. m. f. Ostind.
corymbosa Lam. (= *lactea* Hort. = *Oldenlandia corymbosa* L.).
Deppeana Steud., Endl. (= *Gerontogea Deppeana* Cham., Schltdl., p. 354 = *Oldenlandia Deppeana* DC.).
dichotoma W. A. (= *brachiata* Wall. = *affinis* R. et S. = *attenuata* W. = *diffusa et graminifolia* Spgl. = *linifolia* W. = *Oldenlandia affinis* DC. = *O. capillaris* DC. = *O. linifolia* DC. = *O. pusilla* DC.), zweizinkige, ⊙. w. m. f. Ostindien.
herbacea L. fil. (= *Oldenlandia herbacea* DC. = *O. madagascariensis* Dsf. = ? *O. tenuifolia* Burm.).
lactea W. (= *cymosa* Spgl. = *Gerontogea lactea* Cham. et Schltdl. = *Oldenlandia corymbosa* Ait. = *O. lactea* DC. = *O. umbellata* Hort.).
ramosissima Spgl. (= *Oldenl. ramosissima* Fisch.).
umbellata Lam. (= *indica* R. et S. = *hispida* Roth = *Oldenl. umbellata* L. = *O. hispida* DC.).

Hedypnois T., Röhrleinkraut.
pendula Balb. (= *Hyoseris pendula* P.), β) pinnatifida (= *Hyoseris arenaria* Hort., non Schousb. = *H. crepoides* P.).
persica MB., Fisch. (= *cretica* W. var. = *rhagadioloides* Steven), persisches, ⊙. f. Persien, Caucasus.

Hedysarum T., Hahnenkopf.
altaicum Fisch. (= *Gmelini* Ledeb. = *polymorphum* δ Ledeb.).
argyrophyllum Fisch., silberblätteriger, 4 f. Alt. Sibirien.
brachypterum Bunge, kurzflügeliger, 4. k. f. b. Nordchina.
capitatum Desf. (= *corsicum* Balb. = *decumbens* Dennst. = *glomeratum* Dietr. = *pallidum* Dsf. var.), kopfförmiger, ⊙. f. Nordafrika, Corsica.
esculentum Ledeb., genieſsbarer, 4. f. Ostsibirien.
lanuginosum Dsf, wolliger, 4. f. b. Orient.
lasiocarpum Ledeb. (= *Ledebourii* Spgl. = *neglectum* Ledeb.).
leucophyllum Lk. (= *bucophyllum* W. E.), weiſsblätteriger, ♄. k. t. ?
roseum Stephan, non Sims (= *ibericum* W. herb., non MB. = *polymorphum* β *prostratum* Ledeb. = *prostratum* Sievers).
soongaricum Bong. et C. A. Mey. (= *echinocarpum* Karel. et Kiril.), soongarisches, ♂. 4. f. Soongaria.
tauricum Pall. (= *fruticosum* Habl. = *roseum* Sims).

Digitized by Google

Hedysarum

Thunbergianum Steud. (= *reflexum* Thbg.), Thunberg's, ♄. k. t. ?

uniflorum Lapeyr., einblumiger, 4. f. b. Pyrenäen.

variegatum Portensch., bunter, 4. f. b. k. Dalmatien.

Unbestimmtere: binaculatum Brotero, mutilatum Brotero.

Heeria Meisn. (Oswald Heer, Profess. u. Director des botan. Gartens in Zürich), V. I., Sapotaceae.

argentea Meisn. (= *Sideroxylon argenteum* Thbg. = *Bumelia argentea* R. et S. = *Roemeria argentea* Thbg.), silberfarbige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

inermis Meisn. (= *Sideroxylon inerme* L., p. 755 = *S. atrovirens* Lam., W. = *Roemeria inermis* Thbg.). *melanophleos* Meisn., v. Myrsine melanophleos, p. 538. *Heeria elegans* Schltdl., v. Rhexia elegans.

Hegemone Bunge, Engelblume, XIII. IV, Ranunculaceae.

lilacina Bunge (= *Trollius lilacinus* Bunge), lilafarbige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Hegetschweilera O. Heer (J. Hegetschweiler, Regierungs- und Staatsrath, Prof. der Botanik etc. zu Zürich, † Septbr. 1839), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae (Hedysareae).

pulchella O. Heer, schöne, 4. w. Guiana.

Heimia Lk. et Otto, Heimie.

grandiflora Lindl. (= *salicifolia* Lk. var. *β grandiflora* Hook.), grofsblumige, ♄. ♄. t. k. Bonaria.

linariaefolia H. angl., leinkrautblätterige, ♄. ♄. t. Südam.

myrtifolia Cham., Schltdl. (= *salicifolia β* var. Walp. = *Lythrum upetalum* Spgl.), myrtenblätterige, ♄. ♄. t. k. Brasilien.

Heinsia DC., Heinsie, V. I., Rubiaceae.

jasminiflora DC., jasminblumige, ♄. w. Sierra Leone.

Helenium L., Helenie.

altissimum H. Berol., höchste, 4. f. Nordamerika.

autumnale L., *β*) latifolium Mill. (= ? *longifolium* Sm. ? = *pubescens* Ait.), *γ*) grandiflorum Nutt., *δ*) tubuliflorum DC.

californicum Dougl., californische, ? ⊙. f. Californien.

commutatum H. Berol., verwechselte, 4. f. Nordamerika.

elegans DC., zierliche, ⊙. f. Mexico.

neglectum H. Berol., übersehene, 4. f. Nordamerika.

quadridentatum LaBill. (= *Milleri* Schult.).

undulatum Maund, wellenförmige, 4. f. Californien.

caespitosum Dougl (= *lanatum* Spgl.), v. Bahia lanata, p. 58, II, *Douglasii* Hort., v. Monolopia major.

Heleocharis Lestib., Teichriet, (Sumpfbinse).

atropurpurea Kunth (= *Lereschii* Schuttlew. = *Scirpus Lereschii* Thom. = *monandra* Hochst. = *Aplostemum atropurp.* Rafin. = *Eleogenus atrop.* N. E. = *Eleogiton atrop.* A. Dietr. = *Isolepis atrop.* R. et S. = *S. atropurpureus* Retz, Vahl), dunkelpurpurfarbiges, ⊙. f. Nord- u. Südamerika, Ostindien, Senegambien, Nubien, südl. Schweiz. *β*) gymnocarpa K.

capitata RBr. (= *atropurpurea* Presl, non Kunth = *sulciculmis* Rchb. = *Eleogenus capit.* N. E. = *Scirpus capitatus* L. = *S. caribaeus* Roth. = *S. flavescens* Poir.), kopfförmiges, ⊙. w. m. Südamerika, Ostindien, Neuholland.

Heleogiton Lestib. (= *Eleogiton* Lk.), *fluitans* Lk., *verruculosa* A. Dietr., v. Isolepis fluitans et Ecklo-

Digitized by Google

niana, p. 425, *parvula* Lk. v. Limnochloa parvula, p. 464, — *glaucum* Rchb., *Lejeunii* Rchb., *litorale* Rchb., *pungens* Rchb., *trigonum* Rchb., *triquetrum* Rchb., v. Scirpus Tabernaemontani, triqueter γ, litoralis, pungens, carinatus et triqueter, p. 733.

Helianthemum T., Sonnenröschen.

arabicum P. (= *ibericum* Dsf.).

Broussonetii Dun., Broussonet's, ♄. k. Teneriffa.

carolinianum Mchx. (= *Crocanthemum carolinianum* Spach).

corymbosum Mchx. (= *Heteromeris cymosa* Spach), traubendoldiges, ♄. f. Nordamerika.

Fumana Mill. (= *calycinum* Auct. = *ericoides* Dun. = *fumarioides* Dsf. = *procumbens* Dun. = *Fumana vulgaris* Spach).

glomeratum Dun. (= *Cistus glomeratus* Lag. = *Lechea mexicana* H. Berol. = *Taeniostema micranthum* Spach).

glutinosum P. (= *Barrelieri* Tenore = *juniperinum* Lag. = *laeve* P. = *thymifol.* P. = *viride* Tenore).

guttatum Mill. (= *bupleurifol.* Dun. = *eriocaulon* Dun. = *heterodoxum* Dun. = *imbricatum* Lag. = *inconspicuum* Thib. = *macrosepalum* Salzm. = *plantagineum* P. = *praecox* Salzm. = *punctatum* Dun., P. = *Tuberaria annua* Spach).

halimifolium P. (= *multiflorum* L. = *Halimium lepidotum* Spach).

heterophyllum Steud. (= *algarviense* Dun. = *microphyllum* Sweet = *ocymoides* P. = *rugosum* Sweet, non Dun. = *Halimium heterophyllum* Spach), β) candidum Swt. (= *cheiranthoides* Swt.).

lasianthum P. (= *alyssoides* Vent. = *elongatum* P. = *formosum* P. = *rugosum* Dun. = *scabrosum* P.), β) cheiranthoides P., non Swt. (= *involucratum* P. = *Halimium lasianthum* Spach).

lavandulaefolium P., γ) syriacum Jacq., δ) H. Thibaudii P. (= *Cistus racemosus* Cav.).

ledifolium Mill. (= *lasiocarpum* Dsf. = *niloticum* P. = *pilosum* Mill. = *villosum* P., Thib.).

Libanotis P. (= *rosmarinifolium* Lagaca = *Halimium rosmarinif.* Spach.).

mexicanum Steud. (= *Heteromeris mexicana* Spach), mexicanisches, ♄. k. Mexico.

nebrodense v. Heldr., nebrodisches, ♄. k. Sicilien.

polyanthum P. (= *Cistus polyanthus* Dsf. = *Rhodax polyanthus* Spach), vielblumiges, ♄. k. Nordafrika.

Rhodax Steud. [1]), (= *Rhodax Chamecistus* Spach), α) cinereum P. (= *crassifolium* P. exparti, = *marifolium* P. = *molle* P. = *paniculatum* Dun. = *rotundifolium* Dun.), β) canum Dun. (= *italicum* P. = *piloselloides* Dun. = *strigosum* Fisch. = *vineale* P.), γ) alpestre Dun. (= *obovatum* Dun. = *oelandicum* P. = *penicillatum* Dun. = *pulchellum* Swt.).

rosmarinifolium Pursh (= *Heteromeris rosmarinifolia* Spach = *Lechea major* Bigelow.), rosmarinblätteriges, 4. ♄. f. h. Nordamerika.

---

1) [illegible] hier nach Spach's Vorgange mehrere als Va[illegible] lern Schriftstellern wohl mit Recht als Arten [illegible] Vergleich's wegen hier noch einmal in [illegible] werden.

Digitized by Google

Helianthemum

salicifolium P. (= *denticulatum* P. = *intermedium* Thib. = *fugacium* Mill. = *fugax* Dun. = *rubellum* Mch.).
soongaricum Schrenk., soongarisches, 4. ♄. f. Soongaria.
stellulatum Lk., sternförmiges, ? 4. ♄. f. ?
Tuberaria Mill. (= *lignosum* Sweet = *Tuberaria perennis* Spach), β) globulariaefolium P.
umbellatum Mill. (= *Cistus anthurus* Hort. = *C. umbellatus* L. = *Halimium umbell.* Spach).
variabile Spach [1]) (= *H. Chamaecistus* Mill. = *H. vulgare* P. = *Cistus Helianthemum* L.), α) barbatum P. (= *cistifolium* Mill. = *echioides* P. = *grandiflorum* DC. = *hyssopifolium* Tenore = *Milleri* Swt. = *nummularium* Mill. = *obscurum* P. = *sampsucifolium* Mill. = *sulphureum* W. = *tauricum* Swt.), β) acuminatum P. (= *hirsutum* Dun. = *lucidum* Hornem. = *macranthum* Swt. = *serpyllifol.* Dun. = *stramineum* Swt. = *surrejanum* Mill. = *tomentosum* Dun. = *Cistus helianthemoides* Dsf.), γ) Andersonii Swt. (= *croceum* P. = *glaucum* P. = *nudicaule* Dun. = *ovatum* Dun.), δ) apenninum Mill. (= *cupreum* Swt. = *diversifolium* Swt. = *foetidum* P. = *lanceolatum* Sweet = *multiplex* Sweet = *mutabile* P. = *polifolium γ roseum* K. = *roseum* DC. = *versicolor* Swt.), ε) crassifolium P. (= *Sexte* Lag. = *Cistus glaucus* Dsf., non Cav.), ζ) asperum Lagasc. (= *ciliatum* P. = *Cistus hirtus* Thib.), η) racemosum Dun. (= *reflexum* Mch.), ϑ) polifolium P. (= *apenninum* DC. = ? *arcuatum* Presl = *canescens* Swt. = *incanum* Mill. = *lusitanicum* Mill. = *pulverulentum* Swt., P. = *rhodanthum* Dun. = *venustum* Swt. = *rosmarinifolium* Mart., non Presl, nec Pursh = *Cistus roseus* Jacq., non All. = *C. splendens* Lam.), ι) pilosum P. (= ? *bicolor* Presl = *confusum* Swt. = *lineare* P. = *linearifolium* Mch. = *racemosum* P. = *variegatum* Swt. = *violaceum* P. = *virgatum* P.), κ) hispidum Dun. (= *majoranaefolium* β DC.), λ) angustifolium Dun. (= *leptophyllum* Dun. = *Cistus Barrelieri* Bot. mag. = *C. stoechadifolius* Hort.), μ) hirtum P. (= *aureum* P. = *baeticum* H. Madrit. = *Lagascae* Dun. = *Cistus teretifolius* Thib.).

Helianthus L., Sonnenrose.

annuus L., c) maximus Hort., d) pyramidalis Hort., γ) albus H. Vindob.
atrorubens L. (= *sparsifolius* Ell. = *silphioides* Nutt.).
californicus DC. (= *longifolius* Hook.), californische, 4. f. Californien.
Colossus Kunze, riesenhafte, ⊙. f. Südamerika.
decapetalus L. (= *dodecapetalus* Jacq.), β) frondosus L.
doronicoides Lam. (= *Hookeri* G. Don = *pubescens* Vahl).
giganteus L. (= *virgatus* Lam.).
grosseserratus Mertens, grobsägezähnige, 4. f. Nordam.
hirsutus Rafin., rauhaarige, 4. f. Nordamerika (Arkansas), Texas.
β) diversifolius Ell.
lenticularis Dougl. (= *erythrocarpus* Bartl.).

---

1) Vergl. die Bemerkung bei Helianthemum Rhodax Stend., auch p. 380–383.

2) Die übrigen Synonymen sind auszuschliessen, vgl. p. 383.

Digitized by Google

Helianthus

microcephalus Torr. et Gr. (= *divaricatus* Mchx., non L. = *parviflorus* Bernh.), kleinköpfige, 4. f. Nordam.

mollis Lam. (= *pubescens* W., non Vahl = *canescens* Mchx.).

orgyalis DC. (= *angustifolius* Mchx., non L.), klafterhohe, 4. f. Nordamerika.

ovatus Lehm. (= *petiolaris* Hort., non Nutt.).

peruvianus Kl., peruanische, ⊙. f. Peru.

rigidus Dsf. (= *atrorubens* Mchx., (non L.), = *asper* Hort. = *?luxurians* Hort. = *crassifolius* Nutt. *β diffusus* Sims = *laetiflorus* P. = *missouricus* Spgl. = *scaberrimus* Ell.), starre, 4. f. Nordamerika. Vergl. Harpalium rigidum, p. 377.

strumosus L. (= *macrophyllus* W. = *altissimus β* DC. = *mollis* W., Bot. mag.).

tomentosus Mchx., filzige, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: exaltatus Hort., flexuosus Hort., pilosus Tausch, ramosissimus Mill., serotinus Tausch.

buphthalmoides Hort., v. Heliopsis canescens, p. 387, *oleifer* Wall., v. Guizotia oleifera, p. 370.

Helichrysum Vaill., DC., Strohblume.

argenteum Thbg., W. (= *Stähelina* W.).

armenium DC. (= *Gnaphalium armenium* Fisch. et Mey.), armenische, 4. ♄. f. b. k. Armenien.

auriculatum Less. (= *Gnaphalium auriculatum* Thbg. = *G. panduraefolium* Schrnk. = *G. patulum* Berg.), geöhrte, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Banksii Cunningh., Banks's, 4. ♄. t. Neuholland.

Baxteri Cunningh., Baxter's, 4. ♄. t. Neuholland.

bracteatum W. (= *chrysanthum* P. = *lucidum* Donnersm. = *Xeranthemum bracteatum* Vent.), c) plenum Hort., d) compositum Hort., e) borussorum rex Hort. etc.

ericaefolium Less. (= *ericoides* Don = *Gnaphalium ericoides* L., Thbg.).

expansum Less. (= *Gnaphalium drabaeforme* Schrank. = *G. notatum* Thbg. = *G. paniculatum* Berg.), ausgestreckte, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

farinosum Raddi, mehlige, 4. w. Brasilien.

felinum Less. (= *congestum* Don = *discolor* Don).

foetidum Mch. (= *Anaxeton foetidum* G. = *Gnaphalium foetidum* L.), *β*) argenteum (Mill.) (= *G. fruticans* Schrk.).

glutinosum A. Braun (= *foetidum* Schimp., non Mch.), klebrige, ⊙. ♂. m. f. k. Abyssinien (Adoa).

imbricatum Less. (= *Astelma imbric.* Don = *Gnaph. imbric.* L.), ziegeldachförmige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

macranthum Benth. (= *bracteatum* W. var. ?), grofsblumige, ⊙. ♂. m. f. k. Neuholland.

b) fl. albo, c) fl. roseo.

molle Cunningh., weiche, ⊙. m. f. Neuholland.

nebrodense v. Heldr., nebrodische, ♄. k. Sicilien.

niveum Grah., non Less., schneeweise, 4. k. t. Neuholl.

obconicum DC. (= *Antennaria leucophylla* Rchb. = *Gnaphalium crassifolium* Lowe), verkehrtkegelförmige, ♄. k. Madeira.

orientale G. (= *elongatum* Mch.), *β*) fruticosum (Mill.).

paniculatum Thbg. (= *angustifolium* P. = *argenteum* Andr., nec alior. = *Xeranthemum angustifol.* Lam. = *X. paniculatum* L.).

Digitized by Google

Helichrysum

plicatum DC. (= *Gnaphalium plicatum* Fisch. et Mey.), gefaltete, 4. ħ. f. b. k. Persien.

retortum W. (= *argenteum* Schrk. = *radicans* Less. = *Argyrocome retorta* G. = *Astelma retortum* Don = *Xeranthemum retortum* L.), zurückgedrehte, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

rubellum Less. (= *Gnaphalium rubellum* Thbg.), röthliche, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

rupestre DC. (= *Gnaphalium glutinosum* Tenore = *G. pendulinum* Presl = *G. rupestre* Rafin.), Felsen-S., ħ. k. Italien, Nordafrika.

sanguineum DC. (= *Gnaphal. sanguin.* L., p. 362).

saxatile Moris, steinliebende, ħ. k. Sardinien.

scorpioides LaBill. (= *buphthalmoides* Sbr.), vergifsmeinnichtblätterige, ? 4. t. k. Neuholland.

serpyllifolium Less. (= *helianthemifolium* Don).

squamosum Thbg. (= *herbaceum* Swt. = *splendens* Sims = *Xeranthemum herbaceum* Andr. = *X. squamosum* Thbg.), schuppige, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

striatum Thbg. (= *rigidum* Ait., D. Don = *Xeranthemum rigidum* Andr.).

virgineum DC. (= *Gnaphalium virgin.* Sibth., Sm. = *G. olympicum* Sieb.), jungfräuliche, 4. ħ. k. Orient, Griechenland.

arboreum Don, v. Anaxeton arborescens, p. 53, *candidissimum* Don, v. Cladochaeta candidissima, p. 148, II., *cephalotes* Don, v. Metalasia cephalotes, *diosmaefolium* Don, v. Ozothamnus diosmaefolius, *flaccidum* G. Don, v. Achyrocline flaccida, p. 7, II., *spirale* W. et *Stachelina* Thbg. etc., v. Helipterum variegatum et speciosissimum etc., p. 388. — Hinsichtl. d. übrigen s. Gnaphalium, p. 362 et 268, II.

Heliconia L., Heliconie.

acuminata Rich., zugespitzte, 4. w. ?

cannoidea Rich., blumenrohrähnliche, 4. w. ?

farinosa Raddi, mehlige, 4. w. Brasilien.

speciosa H. Cels. et H. belg., prächtige, 4. w. ?

Helicteres L., Schraubenbaum.

brasiliensis Mikan (= *ovata* St. Hil.), brasilianischer, ħ. w. Brasilien.

cordifolia Hffg., herzblätteriger, ħ. w. Brasilien.

Roxburghii G. Don (= *Ixora* Roxb., non L.), Roxburgh's, ħ. w. Ostindien.

tiliaefolia Fisch., lindenblätteriger, ħ. w. Brasilien.

Heliophila L., Sonnenkraut.

amplexicaulis L. (= *integrifolia* H. Monspel.).

latisiliqua Fisch. et Mey., breitschotiges, ☉. m. f. Cap der guten Hoffn.

longifolia DC. (= *Leptermus longifolius* Eckl., Zeyh.), langblätteriges, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

pendula W. (= *coronopifolia* β Lam. = *pinnata* Vent., Ait. = *Leptermus pendulus* Eckl., Zeyh. = *Trentepohlia pinnata* Roth = *Ormiscus pendulus* Spach).

pilosa Lam. (= *integrifolia* L. = *striata* Sims = *Cheiranthus africanus* L. = *Orthoselis pilosa* Spach), β) arabioides Sims.

pinnata Thbg., L. fil. (= *trifida* DC., non Thbg., L. fil.), gefiedertes, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

tenuisiliqua DC. (= *Arabis capensis* Burm. = *Ormis-*

Digitized by Google

Heliophila
cus tenuisiliqua Eckl., Zeyh.), dünnschotiges, ⊙. m. f. Cap der guten Hoffnung.

Heliophytum DC., Sonnenkraut, V. 1., Asperifoliaceae (Borragineae).
anchusaefolium DC., ochsenzungenblätteriges, ♄. w. Buenos Ayres, Brasilien.
α) latifolium DC., β angustifolium DC.
erosum DC. (= *Heliotropium erosum* Lehm.), ausgebissenes, ♄. t. Azoren, canarische Inseln, Senegambien.
β) prostratum DC. (= *Heliotropium plebejum* Banks, Mass.).
indicum DC. (= *anisophyllum* P. B. = *Heliotropium indicum* L. = *cordifolium* Mch. = *horminifolium* Mill. = *Tiaridium anisophyllum* G. Don = *T. indicum* Lehm., p. 810), indisches, ⊙. m. f. Ostindien, Mascarenas, Mittelafrika, Nord- und Südamerika, Westindien.
monostachyum DC. (= *Heliotropium monostachyum* Chamiss. = *Tiaridium monostachyum* G. Don), einähriges, ♄. w. Brasilien.
parviflorum DC. (= *Heliotropium parviflorum* L. mant., p. 387 = *angiospermum* Murr.), Südamerika, Westindien.
velutinum DC. (= *Tiaridium velutinum* Lehm., p. 810).

Heliopsis P., Sonnengesicht.
mollis Wender., weiches, 4. f. ?
patula Wender., ausgebreitetes, 4. f. ?
stricta Wender., steifes, 4. f. ?
dubia Dun., v. Spilanthes Mutisii, *platyglossa* Cass., v. Guizotia oleifera, p. 370.
Heliosperma alpestris et *quadrifida* Rchb., v. Silene alpestris etc., p. 755.

Heliotropium T., Sonnenwende.
arbainense Fresen. (= *maroccanum* Raddi = *amboinense* G. Don), arbainisches, ♄. t. w. Arabien, Syrien, Aegypten.
Bocconi Gussone (= *villosum* Presl, non Dsf. = *aethnicum* Presl = *europaeum* β R. et S.), Boccone's, ⊙. f. Sicilien, Griechenland.
brevifolium Wall. (= *compactum* Don).
curassavicum L. (= *chenopodioides* W. = *glaucophyllum* Mch. = *chilense* Bertero), Westindien, Südamerika, Cap d. g. Hoffn., Mauritanien.
dasycarpum Ledeb., rauchfrüchtige, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.
Eichwaldii Steud. (= *ellipticum* Ledeb., non RBr.), Eichwald's, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.
fruticosum L. (= *demissum* R. et S. = *humile* RBr. = *Tournefortia humilis* L.), strauchige, ♄. w. Westindien.
Kunzii Lehm. (= *villosum* Sieb., non Dsf. = *Syenites* Spgl. = *Brocchianum* Visian. = *cinereum* RBr.), Kunze's, ♄. t. Nordafrika, Abyssinien.
oblongifolium Hornem. (= *europaeum* Buch.), länglichblätterige, ⊙. f. Canarische Inseln.
suaveolens MB. (= *europaeum* β MB. = *intermedium* Andrzy. = *commutatum* R. et S. = *humile* Schult. non Lam.).
tenuiflorum Gussone, dünnblumige, ⊙. f. Spanien, Sicilien, Podolien, Griechenland, Aegypten.

Digitized by Google

Heliotropium

villosum W. (= *hirsutissimum* Webb.), zottige, ☉. f. Griechenland, Türkei.

Nicht hinlänglich bekannt: H. Burmanni R. et S. (= *tomentosum* Burm.), Burmann's, ♄. t. Cap d. g. H. Hinsichtl. der übrigen s. Heliophytum.

Helipterum DC., Sonnenflügel (Immortelle).

albicans DC. (= *Helichrysum albicans* Cunn., non Sbr.), weifslicher, ♄. t. Neuholland.

heterophyllum DC. (= *Aphelexis heterophylla* Don = *Edmondia bracteata* Cass. = *Helichrysum fasciculatum* var. Less. = *Xeranthemum fasciculatum* var. Andr. = *X. heterophyllum* α Lam. = *X. sesamoides* var. L.), verschiedenblätteriger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

humile DC. (= *Helichrysum humile* Less. = *pumilum* Hort. = *longebracteatum* Schrk. = *Xeranth. humile* Andr.), β) pinifolium (Schrk.).

polygalaefolium Cunn. (= *Helichrysum polygalaefolium* Cunn.), kreuzblumenblätteriger, ☉. f. Neucambria.

punctatum DC., punctirter, 4. ♄. t. Van Diemens Land.

virgatum DC. (= *Helichrysum virgatum* W. = *Pteronia pauciflora* Sims = *Xeranthemum Stachelina* Don ? = X. *virgatum* Berg.), ruthenförmiger, ♄. t. Cap d. g. H. *Helleborine americana* Mill., v. Bletia verecunda, p. 125, *cordigera* L., *Lingua* L., *longipetala* Tenor., v. Serapias cordigera etc., p. 746.

Helleborus T. Adans., Nieswurz.

argutifolius Vivian. (= *heterophyllus* Wender.), spitzzähnige, 4. k. Corsica.

atrorubens W. K. (= *atropurpureus* Schult. = *odorus* β K.).

dumetorum W. K. (= *pallidus* Host.), Hecken-N., 4. f. Croatien, Illyrien.

intermedius Host. (non Gussone?), (= *latifolius* Mill. ?= *vernalis* D. Don), mittlere, 4. f. Croatien, Krain.

olympicus Lindl., olympische, 4. k. Griechenland.

Hellenia W., Hellenie.

alba W. (= *Alpinia alba* Rosc. = ? *Amomum medium* Lour. = *Heritiera alba* Retz = *Languas vulgare* Koen. = *Maranta Galanga* α Lam. = ? *Zingiber sylvestre* G.), weifse, 4. w. Ostindien.

aquatica W. (= *Alpinia aquatica* Rosc. = *Heritiera aquatica* Retz).

Helminthia Juss., G., Wurmsalat.

aculeata DC. (= *Picris aculeata* Vahl), stacheliger, 4. k. Sicilien, Nordafrika.

asplenioides DC. (= *Apargia scabra* Nocca = *Crepis sinuata* Lam. = *Deckera asplenioides* Schultz = *Hieracium asplenioides* Hort. Breit. = *Leontodon muricatus* L'Her. = *Virea scabra* Scop.), milzfarrnähnlicher, 4. k. Nordafrika.

echioides G. (= *tuberculata* Mch. = *Picris echioides* L.), β) pratensis Chev.

spinosa DC. (= *echioides* G. var. Spgl. = *rigida* Schult. *Picris spinosa* Poir.).

Helonias L., Schwindblume.

bullata L. (= *latifolia* Mchx. = *lanceolata* Bot. mag.).

japonica Schult. (= *Melanthium japonicum* W. = *luteum* Thbg.), japanische, 4. k. Japan.

angustifolia Mchx. (= *gracilis* Ell., nec Bot. mag. =

Digitized by Google

Helonias
laeta β minor K.), *erythrosperma* Mchx. (= *laeta* Ker), v. Amiantanthus angustifolius etc. Nachlese., *asphodeloides* L., v. Xerophyllum asphodeloides, *graminea* Ker, v. Stenanthium angustifolium et gramineum, *officinalis* G. Don, v. Schoenocaulon officinale, *lutea* Ker (= *pumila* Jacq. = *dioica* Pursh), v. Chamaelirion carolinianum, p. 186, *glaberrima* Sims, v. Anticlea glauca, p. 40, II.

Hinsichtlich der übrigen s. Zygadenus.

Helopus Trin., Haarspindelgras, III. II., Gramineae.

barbatus Trin. (= *Panicum ischaemoides* Koenig = *Paspalum barbatum* Schult. = *obtusifolium* Raddi), bärtiges, 4. w. Mascarenas.

punctatus N. E. (= *pilosus* Trin. = *Agrostis punctata* Lam. = *Eriochloa punctata* Hamilt. = *Milium punctatum* L. = *Oedipachne punctata* Lk., p. 553 = *Paspalum punctatum* Flügge = *Piptatherum annulatum* Raddi = *P. flavescens* Sieb. = *P. punctatum* P. B.).

Helosciadium K. DC., Sumpf-(Haar-)dolde.

bulbosum K. (= *intermedium* DC. = *Sison verticillato-inundatum* Thore = *Sium bulbosum* Thore = *S. intermedium* DC.).

crassipes K. (= *Sium crassipes* Spgl. = *S. limosum* Moris).

inundatum K. (= *Hydrocotyle inundata* Sm. = *Meum inundatum* Spgl. = *Sison inundatum* L. = *Sium inundatum* Roth).

laciniatum DC. (= *Sison laciniatum* L'Her.), p. 879.

leptophyllum DC. (= *lateriflorum* K., p. 879 = *Aethusa Ammi* et *leptophylla* Spgl. = *Pimpinella capillacea* Poit. = *P. dichotoma* Hort. = *P. dioica* Hort. = *P. lateriflora* Lk., p. 624 excl. Syn. = *P. leptophylla* P. = *P. ramosissima* Hort. = *Seseli ammoides* Hort. = *Sison Ammi* L. spec. Jacq. = *Sison capillaceus* Spgl. = *S. fasciculat.* Pohl = *S. Haenkei* Presl), schlankblätterige, ⊙. f. Nord- u. Südamerika.

nodiflorum K. (= *Seseli nodiflorum* Scop. = *Sium nodiflorum* L.).

repens K. (= *Sium repens* L. fil.). Hiernach p. 389 etc. zu ergänzen und zu berichtigen.

*Ammi** v. Ptychotes ammoides, p. 660.

Heloseris palustris Rchb., v. Senecio palustris, p. 743.

Hemerocallis L., Taglilie.

rutilans van Houtte, rothgelbe, 4. f. ?

speciosa Herbert, prächtige, 4. w. Jamaica.

Hemiandra RBr., Halbbeutel.

emarginata Lindl., ausgerandeter, 4. ħ. k. t. Neuholland.

Hemicarpurus fornicatus N. E., v. Atherurus ternatus, p. 54, II.

Hemigenia RBr., Labiatae, purpurea RBr., sericea Benth., ħ. Neuholland. Ob kultivirt?

Hemilepis Kunze, Halbschuppe, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

Ehrenbergii Kunze, Ehrenberg's, ⊙. f. Aegypten.

Hemimeris L. fil., Halbblume.

montana Thbg., L. fil. (= *alsinoides* Lam. = *Diascia montana* Spgl.), Berg-H., ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

sabulosa Thbg., L. fil., sandliebende, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

acutifolia P., *caulialata* P., *coccinea* W. (= *linearis* P.), *incisifolia* P., *parviflora* H. B. K., *urticaefolia* W., v. Alonsoa acutifolia etc., p. 37 et 26, II.
Hemisandra aurantiaca Scheidw., v. Aphelandra aurantiaca, p. 40, II.
Hemistephia lyrata Bunge, v. Haplotaxis Bungei, p. 284, II.
Hemistoma ovatum Ehbg., v. Leucas ovata.
Hemitomus fruticosus L'Her., *urticaefolius* L'Her., v. Alonsoa linearis et urticaefolia, p. 37 et 26, II.
Henckelia grandiflora Dietr. (= *urticaefolia* Dietr.), v. Chirita grandiflora, p. 138, II. — *H. Rexii* v. Streptocarpus Rexii. — *H. Roxburghiana* Dietr., v. Bonnaya reptans, p. 127.

Henningia Karel. et Kiril. (Henning, Botaniker in Moskau), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
anisoptera Karel. et Kiril., ungleichflügelige, 4. Zw. f. Soongaria.
Heracantha cretica Lk., *lanata* Lk., *taurica* Lk., v. Kentrophyllon leucocaulon, p. 881, lanatum et tauricum, p. 437.

Heracleum L., Bärenklau.
amplissimum Wender. (= *Carmelii* Hort.), grofser, 4. f. ? Asiat. Rufsland.
auritum Lehm., geöhrter, 4. f. Nordamerika.
barbatum Ledeb., bärtiger, ♂. f. Altai.
basvicum Hort., Lam., Swt., sibirischer, 4. f. Sibirien.
cordatum Presl (= *Panaces* Ucria = *Sphondylium* Ucria), herzförmiger, 4. f. Sicilien.
cyclocarpum C. Koch, kreisfrüchtiger, ♂. 4. f. Asiat. Rufsland.
Douglasii DC., Douglas's, 4. f. Nordwestl. Amerika.
dulce Fisch. (= *dissectum* H. Petropol., nec Ledeb. = *Sphondylium* Cham. et Schltdl.), süsser, 4. f. Kamtschatka.
flavescens Baumg., Bess., gelblicher, 4. f. Osteuropa, Sibirien.
α) latifolium DC. (= *austriacum* Pall. = *angustifolium* Jacq. = *sibiricum* L. mant.), β) angustifolium DC. (L. mant.).
grandiflorum Steven, grofsblumiger, 4. f. Caucasus.
hypoleucum Visian., weifslicher, 4. f. Nepal.
longifolium Jacq., langblätteriger, 4. f. Oestreich.
minimum Lam. (= *bipinnatum* Gussone = *pumilum* Vill. = *Peucedanum Vocontiorum* Spgl., p. 611), kleinster, 4. f. Dauphiné.
obtusifolium Wall., stumpfblätteriger, 4. f. b. Nepal.
palmatifidum Fisch., Mey. et Lallem., handfiedriger, 4. f. Iberien.
Panaces L. (= *flavescens* W. Enum. = *montanum* Schlchr., Gaud.).
pastinacifolium C. Koch, pastinakblätteriger, ♂. 4. f. b. Armenien.
pubescens MB. (= *speciosum* Ledeb. H. Dorpat. = ? *gummiferum* W.).
Sphondylium L., β) elegans Jacq., γ) caspicum Hortul., δ) laciniatum Dsf.
subvillosum Fisch., wenigzottiger, 4. f. Sibirien.
trachyloma Fisch. et Mey., rauhsaumiger, ♂. f. Armenien.

Digitized by Google

Hedera
capitata Sm. (= *Aralia capitata* Jacq., p. 71).
ferruginea DC. (= *Aralia ferruginea* H. B. K., p. 71 = *A. heptaphylla* W. herb.).
flexuosa Broter., hin- und hergebogener, ♄. Sch. ? ?

Hedychium Koenig, Kranzblume.
barbatum Wall., bärtige, 4. w. Ostindien.
Gomezianum Wall, Gomez's, 4. w. Ostindien.
Hasselti Blume, Hafselt's, 4. w. Java.
lingulatum Hassk., zungenförmige, 4. w. Java.
Roscoi Wall., Roscoe's, 4. w. Nepal.
thyrsiforme Sm. (= *heteromallum* Ker).

Hedyotis L., Ohrling (= *Oldenlandia* L., p. 556).
Burmanniana RBr. (= *biflora* Lam., Roth = *diantha* Schult. mant. = *diffusa* W. = *Gerontogea biflora* Chamiss., Schltdl. = *Oldenlandia biflora* Lam., Roxb. = *O. dichotoma* W.), Burmann's, ⊙. w m. *f.* Ostind.
corymbosa Lam. (= *lactea* Hort. = *Oldenlandia corymbosa* L.).
Deppeana Steud., Endl. (= *Gerontogea Deppeana* Cham., Schltdl., p. 354 = *Oldenlandia Deppeana* DC.).
dichotoma W. A. (= *brachiata* Wall. = *affinis* R. et S. = *attenuata* W. = *diffusa et graminifolia* Spgl. = *linifolia* W. = *Oldenlandia affinis* DC. = *O. capillaris* DC. = *O. linifolia* DC. = *O. pusilla* DC.), zweizinkige, ⊙. w. m. f. Ostindien.
herbacea L. fil. (= *Oldenlandia herbacea* DC. = *O. madagascariensis* Dsf. = ? *O. tenuifolia* Burm.).
lactea W. (= *cymosa* Spgl. = *Gerontogea lactea* Cham. et Schltdl. = *Oldenlandia corymbosa* Ait. = *O. lactea* DC. = *O. umbellata* Hort.).
ramosissima Spgl. (= *Oldenl. ramosissima* Fisch.).
umbellata Lam. (= *indica* R. et S. = *hispida* Roth = *Oldenl. umbellata* L. = *O. hispida* DC.).

Hedypnois T., Röhrleinkraut.
pendula Balb. (= *Hyoseris pendula* P.), β) pinnatifida (= *Hyoseris arenaria* Hort., non Schousb. = *H. crepoides* P.).
persica MB., Fisch. (= *cretica* W. var. = *rhagadioloides* Steven), persisches, ⊙. f. Persien, Caucasus.

Hedysarum T., Hahnenkopf.
altaicum Fisch. (= *Gmelini* Ledeb. = *polymorphum* δ Ledeb.).
argyrophyllum Fisch., silberblätteriger, 4 f. Alt. Sibirien.
brachypterum Bunge, kurzflügeliger, 4. k. f. b. Nordchina.
capitatum Desf. (= *corsicum* Balb. = *decumbens* Dennst. = *glomeratum* Dietr. = *pallidum* Dsf. var.), kopfförmiger, ⊙. f. Nordafrika, Corsica.
esculentum Ledeb., genießbarer, 4. f. Ostsibirien.
lanuginosum Dsf, wolliger, 4. f. b. Orient.
lasiocarpum Ledeb. (= *Ledebourii* Spgl. = *neglectum* Ledeb.).
leucophyllum Lk. (= *bucophyllum* W. E.), weißblätteriger, ♄. k. f. ?
roseum Stephan, non Sims (= *ibericum* W. herb., non MB. = *polymorphum* β *prostratum* Ledeb. = *prostratum* Sievers).
soongaricum Bong. et C. A. Mey. (= *echinocarpum* Karel. et Kiril.), soongarisches, ♂. 4. f. Soongaria.
tauricum Pall. (= *fruticosum* Habl. = *roseum* Sims).

Digitized by Google

Hedysarum
Thunbergianum Steud. (= *reflexum* Thbg.), Thunberg's, ♄. k. t. ?
uniflorum Lapeyr., einblumiger, 4. f. b. Pyrenäen.
variegatum Portensch., bunter, 4. f. b. k. Dalmatien.
Unbestimmtere: binaculatum Brotero, mutilatum Brotero.

Heeria Meisn. (Oswald Heer, Profess. u. Director des botan. Gartens in Zürich), V. 1., Sapotaceae.
argentea Meisn. (= *Sideroxylon argenteum* Thbg. = *Bumelia argentea* R. et S. = *Roemeria argentea* Thbg.), silberfarbige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
inermis Meisn. (= *Sideroxylon inerme* L., p. 755 = *S. atrovirens* Lam., W. = *Roemeria inermis* Thbg.', *melanophleos* Meisn., v. Myrsine melanophleos, p. 538. *Heeria elegans* Schltdl., v. Rhexia elegans.

Hegemone Bunge, Engelblume, XIII. IV, Ranunculaceae.
lilacina Bunge (= *Trollius lilacinus* Bunge), lilafarbige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Hegetschweilera O. Heer (J. Hegetschweiler, Regierungs- und Staatsrath, Prof. der Botanik etc. zu Zürich, † Septbr. 1839), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae (Hedysareae).
pulchella O. Heer, schöne, 4. w. Guiana.

Heimia Lk. et Otto, Heimie.
grandiflora Lindl. (= *salicifolia* Lk. var. *β grandiflora* Hook.), grofsblumige, ♄. ♄. t. k. Bonaria.
linariaefolia H. angl., leinkrautblätterige, ♄. ♄. t. Südam.
myrtifolia Cham., Schltdl. (= *salicifolia β* var. Walp. = *Lythrum apetalum* Spgl.), myrtenblätterige, ♄. ♄. t. k. Brasilien.

Heinsia DC., Heinsie, V. 1., Rubiaceae.
jasminiflora DC., jasminblumige, ♄. w. Sierra Leone.

Helenium L, Helenie.
altissimum H. Berol., höchste, 4. f. Nordamerika.
autumnale L., *β*) latifolium Mill. (= ? *longifolium* Sm. ? = *pubescens* Ait.), *γ*) grandiflorum Nutt., *δ*) tubuliflorum DC.
californicum Dougl., californische, ? ⊙. f. Californien.
commutatum H. Berol., verwechselte, 4. f. Nordamerika.
elegans DC., zierliche, ⊙. f. Mexico.
neglectum H. Berol., übersehene, 4. f. Nordamerika.
quadridentatum LaBill. (= *Milleri* Schult.).
undulatum Maund, wellenförmige, 4. f. Californien.
caespitosum Dougl (= *lunatum* Spgl.), v. Bahia lanata, p. 58, II, *Douglasii* Hort., v. Monolopia major.

Heleocharis Lestib., Teichriet, (Sumpfbinse).
atropurpurea Kunth (= *Lereschii* Schuttlew. = *Scirpus Lereschii* Thom. = *monandra* Hochst. = *Aplostemum atropurp.* Rafin. = *Eleogenus atrop.* N. E. = *Eleogiton atrop.* A. Dietr. = *Isolepis atrop.* R. et S. = *S. atropurpureus* Retz, Vahl), dunkelpurpurfarbiges, ⊙. f. Nord- u. Südamerika, Ostindien, Senegambien, Nubien, südl. Schweiz. *β*) gymnocarpa K.
capitata RBr. (= *atropurpurea* Presl, non Kunth = *salciculmis* Rchb. = *Eleogenus capit.* N. E. = *Scirpus capitatus* L. = *S. caribaeus* Rottb. = *S. flavescens* Poir.), kopfförmiges, ⊙. w. m. Südamerika, Ostindien, Neuholland.
Heleogiton Lestib. (= *Eleogiton* Lk.), *fluitans* Lk., *verruculosa* A. Dietr., v. Isolepis fluitans et Ecklo-

Digitized by Google

niana, p. 425, *parvula* Lk. v. Limnochloa parvula, p. 464, — *glaucum* Rchb., *Lejeunii* Rchb., *litorale* Rchb., *pungens* Rchb., *trigonum* Rchb., *triquetrum* Rchb., v. Scirpus Tabernaemontani, triqueter γ, litoralis, pungens, carinatus et triqueter, p. 733.

Helianthemum T., Sonnenröschen.

arabicum P. (= *ibericum* Dsf.).

Broussonetii Dun., Broussonet's, ♄. k. Teneriffa.

carolinianum Mchx. (= *Crocanthemum carolinianum* Spach).

corymbosum Mchx. (= *Heteromeris cymosa* Spach), traubendoldiges, ♄. f. Nordamerika.

Fumana Mill. (= *calycinum* Auct. = *ericoides* Dun. = *fumarioides* Dsf. = *procumbens* Dun. = *Fumana vulgaris* Spach).

glomeratum Dun. (= *Cistus glomeratus* Lag. = *Lechea mexicana* H. Berol. = *Taenioslema micranthum* Spach).

glutinosum P. (= *Barrelieri* Tenore = *juniperinum* Lag. = *laeve* P. = *thymifol.* P. = *viride* Tenore).

guttatum Mill. (= *bupleurifol.* Dun. = *eriocaulon* Dun. = *heterodoxum* Dun. = *imbricatum* Lag. = *inconspicuum* Thib. = *macrosepalum* Salzm. = *plantagineum* P. = *praecox* Salzm. = *punctatum* Dun., P. = *Tuberaria annua* Spach).

halimifolium P. (= *multiflorum* L. = *Halimium lepidotum* Spach).

heterophyllum Steud. (= *algarviense* Dun. = *microphyllum* Sweet = *ocymoides* P. = *rugosum* Sweet, non Dun. = *Halimium heterophyllum* Spach), β) candidum Swt. (= *cheiranthoides* Swt.).

lasianthum P. (= *alyssoides* Vent. = *elongatum* P. = *formosum* P. = *rugosum* Dun. = *scabrosum* P.), β) cheiranthoides P., non Swt. (= *involucratum* P. = *Halimium lasianthum* Spach).

lavandulaefolium P., γ) syriacum Jacq., δ) H. Thibaudii P. (= *Cistus racemosus* Cav.).

ledifolium Mill. (= *lasiocarpum* Dsf. = *niloticum* P. = *pilosum* Mill. = *villosum* P., Thib.).

Libanotis P. (= *rosmarinifolium* Lagaca = *Halimium rosmarinif.* Spach.).

mexicanum Steud. (= *Heteromeris mexicana* Spach), mexicanisches, ♄. k. Mexico.

nebrodense v. Heldr., nebrodisches, ♄. k. Sicilien.

polyanthum P. (= *Cistus polyanthus* Dsf. = *Rhodax polyanthus* Spach), vielblumiges, ♄. k. Nordafrika.

Rhodax Steud. [1]), (= *Rhodax Chamecistus* Spach), α) cinereum P. (= *crassifolium* P. exparti, = *marifolium* P. = *molle* P. = *paniculatum* Dun. = *rotundifolium* Dun.), β) canum Dun. (= *italicum* P. = *piloselloides* Dun. = *strigosum* Fisch. = *vincale* P.), γ) alpestre Dun. (= *obovatum* Dun. = *oelandicum* P. = *penicillatum* Dun. = *pulchellum* Swt.).

rosmarinifolium Pursh (= *Heteromeris rosmarinifolia* Spach = *Lechea major* Bigelow.), rosmarinblätteriges, 4. ♄. f. b. k. Nordamerika.

---

1) Steudel zieht hierher nach Spach's Vorgange mehrere als Varietäten, die bei andern Schriftstellern wohl mit Recht als Arten gelten, die aber des Vergleich's wegen hier noch einmal in anderer Weise aufgeführt werden.

Digitized by Google

Helianthemum

salicifolium P. (= *denticulatum* P. = *intermedium* Thib. = *fugacium* Mill. = *fugax* Dun. = *rubellum* Mch.).
soongaricum Schrenk., soongarisches, 4. ♄. f. Soongaria.
stellulatum Lk., sternförmiges, ? 4. ♄. f. ?
Tuberaria Mill. (= *lignosum* Sweet = *Tuberaria perennis* Spach), β) globulariaefolium P.
umbellatum Mill. (= *Cistus anthurus* Hort. = *C. umbellatus* L. = *Halimium umbell.* Spach).
variabile Spach [1]) (= *H. Chamaecistus* Mill. = *H. vulgare* P. = *Cistus Helianthemum* L.), α) barbatum P. (= *cistifolium* Mill. = *echioides* P. = *grandiflorum* DC. = *hyssopifolium* Tenore = *Milleri* Swt. = *nummularium* Mill. = *obscurum* P. = *sampsucifolium* Mill. = *sulphureum* W. = *tauricum* Swt.), β) acuminatum P. (= *hirsutum* Dun. = *lucidum* Hornem. = *macranthum* Swt. = *serpyllifol.* Dun. = *stramineum* Swt. = *surrejanum* Mill. = *tomentosum* Dun. = *Cistus helianthemoides* Dsf.), γ) Andersonii Swt. (= *croceum* P. = *glaucum* P. = *nudicaule* Dun. = *ovatum* Dun.), δ) apenninum Mill. (= *cupreum* Swt. = *diversifolium* Swt. = *foetidum* P. = *lanceolatum* Sweet = *multiplex* Sweet = *mutabile* P. = *polifolium γ roseum* K. = *roseum* DC. = *versicolor* Swt.), ε) crassifolium P. (= *Sexte* Lag. = *Cistus glaucus* Dsf., non Cav.), ζ) asperum Lagasc. (= *ciliatum* P. = *Cistus hirtus* Thib.), η) racemosum Dun. (= *reflexum* Mch.), ϑ) polifolium P. (= *apenninum* DC. = ? *arcuatum* Presl = *canescens* Swt. = *incanum* Mill. = *lusitanicum* Mill. = *pulverulentum* Swt., P. = *rhodanthum* Dun. = *venustum* Swt. = *rosmarinifolium* Mart., non Presl, nec Pursh = *Cistus roseus* Jacq., non All. = *C. splendens* Lam.), ι) pilosum P. (= ? *bicolor* Presl = *confusum* Swt. = *lineare* P. = *linearifolium* Mch. = *racemosum* P. = *variegatum* Swt. = *violaceum* P. = *virgatum* P.), κ) hispidum Dun. (= *majoranaefolium β* DC.), λ) angustifolium Dun. (= *leptophyllum* Dun. = *Cistus Barrelieri* Bot. mag. = *C. stoechadifolius* Hort.), μ) hirtum P. (= *aureum* P. = *baeticum* H. Madrit. = *Lagascae* Dun. = *Cistus teretifolius* Thib.).

Helianthus L., Sonnenrose.

annuus L., c) maximus Hort., d) pyramidalis Hort., γ) albus H. Vindob.
atrorubens L. (= *sparsifolius* Ell. = *silphioides* Nutt.).
californicus DC. (= *longifolius* Hook.), californische, 4. f. Californien.
Colossus Kunze, riesenhafte, ⊙. f. Südamerika.
decapetalus L. (= *dodecapetalus* Jacq.), β) frondosus L.
doronicoides Lam. (= *Hookeri* G. Don = *pubescens* Vahl).
giganteus L. (= *virgatus* Lam.).
grosseserratus Mertens, grobsägezähnige, 4. f. Nordam.
hirsutus Rafin., rauhaarige, 4. f. Nordamerika (Arkansas), Texas.
β) diversifolius Ell.
lenticularis Dougl. (= *erythrocarpus* Bartl.).

---

1) Vergl. die Bemerkung bei Helianthemum Rhodax Stend., auch p. 380—383.

2) Die übrigen Synonymen sind auszuschliessen, vgl. p. 383.

Digitized by Google

Helianthus

microcephalus Torr. et Gr. (= *divaricatus* Mchx., non L. = *parviflorus* Bernh.), kleinköpfige, 4. f. Nordam.

mollis Lam. (= *pubescens* W., non Vahl = *canescens* Mchx.).

orgyalis DC. (= *angustifolius* Mchx., non L.), klafterhohe, 4. f. Nordamerika.

ovatus Lehm. (= *petiolaris* Hort., non Nutt.).

peruvianus Kl., peruanische, ⊙. f. Peru.

rigidus Dsf. (= *atrorubens* Mchx., (non L.), = *asper* Hort. = *?luxurians* Hort. = *crassifolius* Nutt. *β diffusus* Sims = *laetiflorus* P. = *missouricus* Spgl. = *scaberrimus* Ell.), starre, 4. f. Nordamerika. Vergl. Harpalium rigidum, p. 377.

strumosus L. (= *macrophyllus* W. = *altissimus β* DC. = *mollis* W., Bot. mag.).

tomentosus Mchx., filzige, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: exaltatus Hort., flexuosus Hort., pilosus Tausch, ramosissimus Mill., serotinus Tausch. *buphthalmoides* Hort., v. Heliopsis canescens, p. 387, *oleifer* Wall., v. Guizotia oleifera, p. 370.

Helichrysum Vaill., DC., Strohblume.

argenteum Thbg., W. (= *Stähelina* W.).

armenium DC. (= *Gnaphalium armenium* Fisch. et Mey.), armenische, 4. ♄. f. b. k. Armenien.

auriculatum Less. (= *Gnaphalium auriculatum* Thbg. = *G. panduraefolium* Schrnk. = *G. patulum* Berg.), geöhrte, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Banksii Cunningh., Banks's, 4. ♄. t. Neuholland.

Baxteri Cunningh., Baxter's, 4. ♄. t. Neuholland.

bracteatum W. (= *chrysanthum* P. = *lucidum* Donnersm. = *Xeranthemum bracteatum* Vent.), c) plenum Hort., d) compositum Hort., e) borussorum rex Hort. etc.

ericaefolium Less. (= *ericoides* Don = *Gnaphalium ericoides* L., Thbg.).

expansum Less. (= *Gnaphalium drabaeforme* Schrank. = *G. notatum* Thbg. = *G. paniculatum* Berg.), ausgestreckte, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

farinosum Raddi, mehlige, 4. w. Brasilien.

felinum Less. (= *congestum* Don = *discolor* Don).

foetidum Mch. (= *Anaxeton foetidum* G. = *Gnaphalium foetidum* L.), *β*) argenteum (Mill.) (= *G. fruticans* Schrk.).

glutinosum A. Braun (= *foetidum* Schimp., non Mch.), klebrige, ⊙. ♂. m. f. k. Abyssinien (Adoa).

imbricatum Less. (= *Astelma imbric.* Don = *Gnaph. imbric.* L.), ziegeldachförmige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

macranthum Benth. (= *bracteatum* W. var. ?), grofsblumige, ⊙. ♂. m. f. k. Neuholland.

b) fl. albo, c) fl. roseo.

molle Cunningh., weiche, ⊙. m. f. Neuholland.

nebrodense v. Heldr., nebrodische, ♄. k. Sicilien.

niveum Grah., non Less., schneeweise, 4. k. t. Neuholl.

obconicum DC. (= *Antennaria leucophylla* Rchb. = *Gnaphalium crassifolium* Lowe), verkehrtkegelförmige, ♄. k. Madeira.

orientale G. (= *elongatum* Mch.), *β*) fruticosum (Mill.).

paniculatum Thbg. (= *angustifolium* P. = *argenteum* Andr., nec alior. = *Xeranthemum angustifol.* Lam. = *X. paniculatum* L.).

Digitized by Google

Helichrysum

plicatum DC. (= *Gnaphalium plicatum* Fisch. et Mey.), gefaltete, 4. ħ. f. b. k. Persien.

retortum W. (= *argenteum* Schrk. = *radicans* Less. = *Argyrocome retorta* G. = *Astelma retortum* Don = *Xeranthemum retortum* L.), zurückgedrehte, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

rubellum Less. (= *Gnaphalium rubellum* Thbg.), röthliche, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

rupestre DC. (= *Gnaphalium glutinosum* Tenore = *G. pendulinum* Presl = *G. rupestre* Rafin.), Felsen-S., ħ. k. Italien, Nordafrika.

sanguineum DC. (= *Gnaphal. sanguin.* L., p. 362).

saxatile Moris, steinliebende, ħ. k. Sardinien.

scorpioides LaBill. (= *buphthalmoides* Sbr.), vergifsmeinnichtblätterige, ? 4. t. k. Neuholland.

serpyllifolium Less. (= *helianthemifolium* Don).

squamosum Thbg. (= *herbaceum* Swt. = *splendens* Sims = *Xeranthemum herbaceum* Andr. = *X. squamosum* Thbg.), schuppige, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

striatum Thbg. (= *rigidum* Ait., D. Don = *Xeranthemum rigidum* Andr.).

virgineum DC. (= *Gnaphalium virgin.* Sibth., Sm. = *G. olympicum* Sieb.), jungfräuliche, 4. ħ. k. Orient, Griechenland.

arboreum Don, v. Anaxeton arborescens, p. 53, *candidissimum* Don, v. Cladochaeta candidissima, p. 148, II., *cephalotes* Don, v. Metalasia cephalotes, *diosmaefolium* Don, v. Ozothamnus diosmaefolius, *flaccidum* G. Don, v. Achyrocline flaccida, p. 7, II., *spirale* W. et *Stoechelina* Thbg. etc., v. Helipterum variegatum et speciosissimum etc., p. 388. — Hinsichtl. d. übrigen s. Gnaphalium, p. 362 et 268, II.

Heliconia L., Heliconie.

acuminata Rich., zugespitzte, 4. w. ?

cannoidea Rich., blumenrohrähnliche, 4. w. ?

farinosa Raddi, mehlige, 4. w. Brasilien.

speciosa H. Cels. et H. belg., prächtige, 4. w. ?

Helicteres L., Schraubenbaum.

brasiliensis Mikan (= *ovata* St. Hil.), brasilianischer, ħ. w. Brasilien.

cordifolia Hffg., herzblätteriger, ħ. w. Brasilien.

Roxburghii G. Don (= *Isora* Roxb., non L.), Roxburgh's, ħ. w. Ostindien.

tiliaefolia Fisch., lindenblätteriger, ħ. w. Brasilien.

Heliophila L., Sonnenkraut.

amplexicaulis L. (= *integrifolia* H. Monspel.).

latisiliqua Fisch. et Mey., breitschotiges, ☉. m. f. Cap der guten Hoffn.

longifolia DC. (= *Leptermus longifolius* Eckl., Zeyh.), langblätteriges, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

pendula W. (= *coronopifolia β* Lam. = *pinnata* Vent., Ait. = *Leptermus pendulus* Eckl., Zeyh. = *Trentepohlia pinnata* Roth = *Ormiscus pendulus* Spach).

pilosa Lam. (= *integrifolia* L. = *stricta* Sims = *Cheiranthus africanus* L. = *Orthoselis pilosa* Spach), *β)* arabioides Sims.

pinnata Thbg., L. fil. (= *trifida* DC., non Thbg., L. fil.), gefiedertes, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

tenuisiliqua DC. (= *Arabis capensis* Burm. = *Ormis-*

Digitized by Google

Heliophila
cus tenuisiliqus Eckl., Zeyh.), dünnschotiges, ⊙. m. f. Cap der guten Hoffnung.

Heliophytum DC., Sonnenkraut, V. 1., Asperifoliaceae (Borragineae).
anchusaefolium DC., ochsenzungenblätteriges, ♄. w. Buenos Ayres, Brasilien.
α) latifolium DC., β angustifolium DC.
erosum DC. (= *Heliotropium erosum* Lehm.), ausgebissenes, ♄. t. Azoren, canarische Inseln, Senegambien.
β) prostratum DC. (= *Heliotropium plebejum* Banks, Mass.).
indicum DC. (= *anisophyllum* P. B. = *Heliotropium indicum* L. = *cordifolium* Mch. = *horminifolium* Mill. = *Tiaridium anisophyllum* G. Don = *T. indicum* Lehm., p. 810), indisches, ⊙. m. f. Ostindien, Mascarenas, Mittelafrika, Nord- und Südamerika, Westindien.
monostachyum DC. (= *Heliotropium monostachyum* Chamiss. = *Tiaridium monostachyum* G. Don), einähriges, ♄. w. Brasilien.
parviflorum DC. (= *Heliotropium parviflorum* L. mant., p. 387 = *angiospermum* Murr.), Südamerika, Westindien.
velutinum DC. (= *Tiaridium velutinum* Lehm., p. 810).

Heliopsis P., Sonnengesicht.
mollis Wender., weiches, 4. f. ?
patula Wender., ausgebreitetes, 4. f. ?
stricta Wender., steifes, 4. f. ?
dubia Dun., v. Spilanthes Mutisii, *platyglossa* Cass., v. Guizotia oleifera, p. 370.
Heliosperma alpestris et *quadrifida* Rchb., v. Silene alpestris etc., p. 755.

Heliotropium T., Sonnenwende.
arbainense Fresen. (= *maroccanum* Raddi = *amboinense* G. Don), arbainisches, ♄. t. w. Arabien, Syrien, Aegypten.
Bocconi Gussone (= *villosum* Presl, non Dsf. = *aethnicum* Presl = *europaeum* β R. et S.), Boccone's, ⊙. f. Sicilien, Griechenland.
brevifolium Wall. (= *compactum* Don).
curassavicum L. (= *chenopodioides* W. = *glaucophyllum* Mch. = *chilense* Bertero), Westindien, Südamerika, Cap d. g. Hoffn., Mauritanien.
dasycarpum Ledeb., rauchfrüchtige, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.
Eichwaldii Steud. (= *ellipticum* Ledeb., non RBr.), Eichwald's, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.
fruticosum L. (= *demissum* R. et S. = *humile* RBr. = *Tournefortia humilis* L.), strauchige, ♄. w. Westindien.
Kunzii Lehm. (= *villosum* Sieb., non Dsf. = *Syenites* Spgl. = *Brocchianum* Visian. = *cinereum* RBr.), Kunze's, ♄. t. Nordafrika, Abyssinien.
oblongifolium Hornem. (= *europaeum* Buch.), länglichblätterige, ⊙. f. Canarische Inseln.
suaveolens MB. (= *europaeum* β MB. = *intermedium* Andrzy. = *commutatum* R. et S. = *humile* Schult. non Lam.).
tenuiflorum Gussone, dünnblumige, ⊙. f. Spanien, Sicilien, Podolien, Griechenland, Aegypten.

Digitized by Google

Heliotropium

villosum W. (= *hirsutissimum* Webb.), zottige, ☉. f. Griechenland, Türkei.

Nicht hinlänglich bekannt: H. Burmanni R. et S. (= *tomentosum* Burm.), Burmann's, ♄. t. Cap d. g. H. Hinsichtl. der übrigen s. Heliophytum.

Helipterum DC., Sonnenflügel (Immortelle).

albicans DC. (= *Helichrysum albicans* Cunn., non Sbr.), weifslicher, ♄. t. Neuholland.

heterophyllum DC. (= *Aphelexis heterophylla* Don = *Edmondia bracteata* Cass. = *Helichrysum fasciculatum* var. Less. = *Xeranthemum fasciculatum* var. Andr. = *X. heterophyllum* α Lam. = *X. sesamoides* var. L.), verschiedenblätteriger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

humile DC. (= *Helichrysum humile* Less. = *pumilum* Hort. = *longebracteatum* Schrk. = *Xeranth. humile* Andr.), β) pinifolium (Schrk.).

polygalaefolium Cunn. (= *Helichrysum polygalaefolium* Cunn.), kreuzblumenblätteriger, ☉. f. Neucambria.

punctatum DC., punctirter, 4. ♄. t. Van Diemens Land.

virgatum DC. (= *Helichrysum virgatum* W. = *Pteronia pauciflora* Sims = *Xeranthemum Stachelina* Dou ? = *X. virgatum* Berg.), ruthenförmiger, ♄. t. Cap d. g. H. *Helleborine americana* Mill., v. Bletia verecunda, p. 125, *cordigera* L., *Lingua* L., *longipetala* Tenor., v. Serapias cordigera etc., p. 746.

Helleborus T. Adans., Nieswurz.

argutifolius Vivian. (= *heterophyllus* Wender.), spitzzähnige, 4. k. Corsica.

atrorubens W. K. (= *atropurpureus* Schult. = *odorus* β K.).

dumetorum W. K. (= *pallidus* Host.), Hecken-N., 4. f. Croatien, Illyrien.

intermedius Host. (non Gussone?), (= *latifolius* Mill. ?= *vernalis* D. Don), mittlere, 4. f. Croatien, Krain.

olympicus Lindl., olympische, 4. k. Griechenland.

Hellenia W., Hellenie.

alba W. (= *Alpinia alba* Rosc. = ? *Amomum medium* Lour. = *Heritiera alba* Retz = *Languas vulgare* Koen. = *Maranta Galanga* α Lam. = ? *Zingiber sylvestre* G.), weifse, 4. w. Ostindien.

aquatica W. (= *Alpinia aquatica* Rosc. = *Heritiera aquatica* Retz).

Helminthia Juss., G., Wurmsalat.

aculeata DC. (= *Picris aculeata* Vahl), stacheliger, 4. k. Sicilien, Nordafrika.

asplenioides DC. (= *Apargia scabra* Nocca = *Crepis sinuata* Lam. = *Deckera asplenioides* Schultz = *Hieracium asplenioides* Hort. Breit. = *Leontodon muricatus* L'Her. = *Virea scabra* Scop.), milzfarrnähnlicher, 4. k. Nordafrika.

echioides G. (= *tuberculata* Mch. = *Picris echioides* L.), β) pratensis Chev.

spinosa DC. (= *echioides* G. var. Spgl. = *rigida* Schult. *Picris spinosa* Poir.).

Helonias L., Schwindblume.

bullata L. (= *latifolia* Mchx. = *lanceolata* Bot. mag.).

japonica Schult. (= *Melanthium japonicum* W. = *luteum* Thbg.), japanische, 4. k. Japan.

angustifolia Mchx. (= *gracilis* Ell., nec Bot. mag. =

Digitized by Google

Helonias
laeta β minor K.), *erythrosperma* Mchx. (= *laeta* Ker), v. Amiantanthus angustifolius etc. Nachlese., *asphodeloides* L., v. Xerophyllum asphodeloides, *graminea* Ker, v. Stenanthium angustifolium et gramineum, *officinalis* G. Don, v. Schoenocaulon officinale, *lutea* Ker (= *pumila* Jacq. = *dioica* Pursh), v. Chamaelirion carolinianum, p. 186, *glaberrima* Sims, v. Anticlea glauca, p. 40, II.
Hinsichtlich der übrigen s. Zygadenus.

Helopus Trin., Haarspindelgras, III. II., Gramineae.
barbatus Trin. (= *Panicum ischaemoides* Koenig = *Paspalum barbatum* Schult. = *obtusifolium* Raddi), bärtiges, 4. w. Mascarenas.
punctatus N. E. (= *pilosus* Trin. = *Agrostis punctata* Lam. = *Eriochloa punctata* Hamilt. = *Milium punctatum* L. = *Oedipachne punctata* Lk., p. 553 = *Paspalum punctatum* Flügge = *Piptatherum annulatum* Raddi = *P. flavescens* Sieb. = *P. punctatum* P. B.).

Heloscia dium K. DC., Sumpf-(Haar-)dolde.
bulbosum K. (= *intermedium* DC. = *Sison verticillato-inundatum* Thore = *Sium bulbosum* Thore = *S. intermedium* DC.).
crassipes K. (= *Sium crassipes* Spgl. = *S. limosum* Moris).
inundatum K. (= *Hydrocotyle inundata* Sm. = *Meum inundatum* Spgl. = *Sison inundatum* L. = *Sium inundatum* Roth).
laciniatum DC. (= *Sison laciniatum* L'Her.), p. 879.
leptophyllum DC. (= *lateriflorum* K., p. 879 = *Aethusa Ammi* et *leptophylla* Spgl. = *Pimpinella capillacea* Poit. = *P. dichotoma* Hort. = *P. dioica* Hort. = *P. lateriflora* Lk., p. 624 excl. Syn. = *P. leptophylla* P. = *P. ramosissima* Hort. = *Seseli ammoides* Hort. = *Sison Ammi* L. spec. Jacq. = *Sison capillaceus* Spgl. = *S. fasciculat.* Pohl = *S. Haenkei* Presl), schlankblätterige, ⊙. f. Nord- u. Südamerika.
nodiflorum K. (= *Seseli nodiflorum* Scop. = *Sium nodiflorum* L.).
repens K. (= *Sium repens* L. fil.). Hiernach p. 389 etc. zu ergänzen und zu berichtigen.
*Ammi** v. Ptychotes ammoides, p. 666.
Heloseris palustris Rchb., v. Senecio palustris, p. 743.

Hemerocallis L., Taglilie.
rutilans van Houtte, rothgelbe, 4. f. ?
speciosa Herbert, prächtige, 4. w. Jamaica.

Hemiandra RBr., Halbbeutel.
emarginata Lindl., ausgerandeter, 4. ħ. k. t. Neuholland.
Hemicarpurus fornicatus N. E., v. Atherurus ternatus, p. 54, II.

Hemigenia RBr., Labiatae, purpurea RBr., sericea Benth., ħ. Neuholland. Ob kultivirt?

Hemilepis Kunze, Halbschuppe, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.
Ehrenbergii Kunze, Ehrenberg's, ⊙. f. Aegypten.

Hemimeris L. fil., Halbblume.
montana Thbg., L. fil. (= *alsinoides* Lam. = *Diasia montana* Spgl.), Berg-H., ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.
sabulosa Thbg., L. fil., sandliebende, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

acutifolia P., *caulialata* P., *coccinea* W. (= *linearis* P.), *incisifolia* P., *parviflora* H. B. K., *urticaefolia* W., v. Alonsoa acutifolia etc., p. 37 et 26, II.
Hemisandra aurantiaca Scheidw., v. Aphelandra aurantiaca, p. 40, II.
Hemistephia lyrata Bunge, v. Haplotaxis Bungei, p. 284, II.
Hemistoma ovatum Ehbg., v. Leucas ovata.
Hemitomus fruticosus L'Her., *urticaefolius* L'Her., v. Alonsoa linearis et urticaefolia, p. 37 et 26, II.
Henckelia grandiflora Dietr. (= *urticaefolia* Dietr.), v. Chirita grandiflora, p. 138, II. — *H. Rexii** v. Streptocarpus Rexii. — *H. Roxburghiana* Dietr., v. Bonnaya reptans, p. 127.

Henningia Karel. et Kiril. (Henning, Botaniker in Moskau), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

anisoptera Karel. et Kiril., ungleichflügelige, 4. Zw. f. Soongaria.
Heracantha cretica Lk., *lanata* Lk., *taurica* Lk., v. Kentrophyllon leucocaulon, p. 881, lanatum et tauricum, p. 437.

Heracleum L., Bärenklau.

amplissimum Wender. (= *Carmelii* Hort.), grofser, 4. f. ? Asiat. Rufsland.
auritum Lehm., geöhrter, 4. f. Nordamerika.
barbatum Ledeb., bärtiger, ♂. f. Altai.
basvicum Hort., Lam., Swt., sibirischer, 4. f. Sibirien.
cordatum Presl (= *Panaces* Ucria = *Sphondylium* Ucria), herzförmiger, 4. f. Sicilien.
cyclocarpum C. Koch, kreisfrüchtiger, ♂. 4. f. Asiat. Rufsland.
Douglasii DC., Douglas's, 4. f. Nordwestl. Amerika.
dulce Fisch. (= *dissectum* H. Petropol., nec Ledeb. = *Sphondylium* Cham. et Schltdl.), süsser, 4. f. Kamtschatka.
flavescens Baumg., Bess., gelblicher, 4. f. Osteuropa, Sibirien.
α) latifolium DC. (= *austriacum* Pall. = *angustifolium* Jacq. = *sibiricum* L. mant.), *β*) angustifolium DC. (L. mant.).
grandiflorum Steven, grofsblumiger, 4. f. Caucasus.
hypoleucum Visian., weifslicher, 4. f. Nepal.
longifolium Jacq., langblätteriger, 4. f. Oestreich.
minimum Lam. (= *bipinnatum* Gussone = *pumilum* Vill. = *Peucedanum Vocontiorum* Spgl., p. 611), kleinster, 4. f. Dauphiné.
obtusifolium Wall., stumpfblätteriger, 4. f. b. Nepal.
palmatifidum Fisch., Mey. et Lallem., handfiedriger, 4. f. Iberien.
Panaces L. (= *flavescens* W. Enum. = *montanum* Schlchr., Gaud.).
pastinacifolium C. Koch, pastinakblätteriger, ♂. 4. f. b. Armenien.
pubescens MB. (= *speciosum* Ledeb. H. Dorpat. = ? *gummiferum* W.).
Sphondylium L., *β*) elegans Jacq., *γ*) caspicum Hortul., *δ*) laciniatum Dsf.
subvillosum Fisch., wenigzottiger, 4. f. Sibirien.
trachyloma Fisch. et Mey., rauhsaumiger, ♂. f. Armenien.

Digitized by Google

Heracleum

villosum Fisch. (= *decipiens* Fisch. = *giganteum* Fisch., Hornem. = *marginatum* Hoffm. = *pyrenaicum* MB.). *tomentosum* Sibth., Sm., v. Zozimia absinthifolia, p. 865.

Herbertia Sweet, Herbertie.

pusilla Steud. (= *Ferraria pusilla* Lk., Otto), niedrige, 4. Zw. t. Brasilien.

Heritiera Ait., L'Heritiera.

grandis Fisch. (= *macrophylla* H. Belg.), grofse, ♄. w. ?

Hermannia L., Hermannie.

arabica Steud. et Hochst. (= *Kurria arabica* Steud. = *Trichanthera modesta* Ehbg.), arabische, ☉. m. f. Arabien.

bipinnata Burch. (= *abrotanoides* Schrad. = *multifida* DC.).

borraginiflora Hook., borretschblumige, ♄. k. t. Südafrika.

candidissima Spr. fil., weifseste, ♄. k. t. Cap d. g. H.

cluytiaefolia Otto et Dietr., cluytiablätterige, ♄. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.

discolor Otto et Dietr., verschiedenfarbige, ♄. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

disticha Schrad. (= *rigida* Nocca = *rotundifolia* Jacq.).

glauca Hort., Herrenh., blaugrüne, ♄. k. t. Cap d. g. H.

incana Cavan. (= *althaeoides* Lk. = *ferruginea* Hort.), weifsgraue, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

incisa W., schlitzblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

latifolia Jacq., breitblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

leucanthemifolia Otto et Dietr., wucherblumenblätterige, ♄. k. t. ? Cap d. g. Hoffn.

pulverulenta Andr. (= *argentea* Sm.).

venosa Bartl., aderige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Hermbstaedtia glauca Rchb., v. Celosia glauca, p. 174.
Herminium cordatum Lindl., v. Peristylus cordatus.
Hermodactylus tuberosus Salisb., v. Iris tuberosa, p. 423.

Herniaria T., Bruchkraut.

Besseri Fisch. (= *hirsuta* d'Urvill. = ? *incana* MB. = ? *microcarpa* Presl = *Millegrana* Pall.), Besser's, 4. f. Taurien, Podolien.

cinerea DC. (= *annua* Lagasc. = ? *latifolia* Lapeyr.).

diandra Bunge, zweimänniges, ☉. f. Samarkand.

incana Lam. (= *alpina* Loisel. = *lenticulata* L. spec. = *maritima* Lk.), weifsgraues, 4. f. Italien, Frankr.

pyrenaica Gay, pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

Herpestes G., Wassermaske.

chrysantha Chamiss., Schltdl., goldblumige, ☉. f. Mexico.

Monnieria H. B. K. (= *Brownei* Steud. = *cuneifolia* Lk. Enum., non Pursh, = *Capraria Monnieria* Roxb. = *Gratiola Monnieria* L. = *G. portulacacea* Weinm. = *Monnieria Brownei* P.).

stricta Lk., steife, 4. w. Brasilien.

Herschelia Lindl., (Herschel, berühmter Astronom), XX. 1., Orchideae.

coelestis Lindl. (= *graminifolia* Sweet = *Disa graminifolia* Ker), himmelblaue, 4. w. Cap d. g. H.

Hertia Less., non Neck., Hertie, XIX., IV., Compositae-Corymbiferae.

crassifolia Less. (= *Othonna crassifolia* L., p. 547.)

Digitized by Google

Hesiodia bicolor Mch. (= *montana* Dumort.), v. Sideritis montana, p. 754).

Hesperantha Ker, Abendschwertel.

virginea Ker (= *Ixia virginea* Banks), jungfräulicher, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Hesperis T., Nachtviole.

laciniata All. (= *glutinosa* Visian. = *hieracifolia* Vill. = *Cheiranthus laciniatus* Poir.), β) suaveolens Bess., γ) villosa DC.

lyrata Lam, leierförmige, ⊙. f. Sibirien.

matronalis L., g) grandiflora fl. pleno, β) sylvestris Crantz (= *inodora* L. = *sibirica* Vill.), γ) sibirica L. (= *obtusa* Mch.).

nivea Baumg. (= *candicans* Hort.).

runcinata W. K. (= *elata* Hornem. = *excelsa* Hort.), β) bituminosa Savi (= ?*unguinosa* Schrank = *Deilosma suaveolens* Andrzy.).

speciosa Swt., v. Neuroloma speciosum.

Hessea Berg. (P. Hesse, botanisirte am Vorgebirge der guten Hoffn.), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

spiralis Berg. (= *Amaryllis spiralis* L'Her. = *Carpolyza spiralis* Salisb. = *Crinum spirale* Andr. = *C. tenellum* Jacq. = *Haemanthus spiralis* Ait., W. = *Strumaria spiralis* Ker, p. 791), spiralförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

stellaris Herb. (= *Strumaria stellaris* Ker, p. 791).

Heteracantha lanata Lk., v. Kentrophyllum lanatum, p. 437.

Heteranthera R. et P., Ungleichbeutel.

graminea Vahl (= *Commelyna dubia* Jacq. = *Leptanthus gramineus* Mchx., p. 455 = *Schollera graminifolia* W. = *S. graminea* Bartr.), gräsähnlicher, 4. Wa. f. k. Pensylvanien, Virginien.

Heteranthemis Schott, v. Chrys. visc., p. 193 et 142, II.

Heterocaryum A. DC., Verschiedennüsschen, V. 1., Asperifoliaceae.

laevigatum A. DC., glattes, ⊙. f. Soongaria.

minimum A. DC. (= *Echinospermum minimum* Lehm., p. 281 = *Myosotis echinophora* Pall.).

rigidum A. DC., starres, ⊙. f. Altaisch. Sibirien.

Szovitsianum A. DC. (= *Ehinospermum Szovitsianum* Fisch. et Mey., p. 281).

Heterodon fragarioides Meisn., v. Berardia fragarioides, p. 65, II. — *H. superbus* Meisn., v. Berzelia superba, p. 66, II.

Heteroloma onobrychioides Desv., v. Adesmia pappposa, p. 19.

Heterolophus sibiricus Cassin., v. Centaurea sibirica, p. 179.

Heteromeris canadensis Spach, *cymosa* Spach, *mexicana* Spach, *polifolia* Spach, v. Helianthemum canadense, corymbosum etc., p. 391 et 288, II.

Heteromorpha Chamiss., Schltdl., Wechseldolde, V. II., Umbelliferae.

arborescens Chamiss., Schltdl. (= *Bupleurum arborescens* Thbg., p. 139, non Jacq. = *Tenoria arborescens* Spgl.).

trifoliata Eckl., Zeyh., (= *Bupleurum trifoliatum* Bartl., Wendl.), dreiblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Heteromorpha decipiens Cass., v. Heterolepis decipiens, p. 393.

Digitized by Google

Heteronema DC., Wechselweidrich, X. 1., Lythrariae-Melastomeae.

diversifolium DC. (= *Rhexia diversifolia* Domb., p. 683).

subtriplinervium DC. (= *Melastoma mexicana* Hort. = *M. subtriplinervia* Lk., Otto), fastdreinervige, ♄. w. Mexico.

Heterophyllum ramosum Bojer, v. Buettneria heterophylla, p. 80, 11.

Heteropteris H. B. K., Flügelkapsel.

argentea H. B. K. (= *Banisteria argentea* Spgl.), silberfarbige, ♄. Sch. w. Neugranada.

nitida H. B. K. (= *Banisteria nitida* Lam.), β) fulgens Lindl.

? ovata van Houtte (= *Echites heterophylla* Hort.), eiförmige, ♄. Sch. w. Südamerika.

paniculata van Houtte, rispige, ♄. Sch. w. Südamerika.

Heterotaxis crassifolia Lindl., Dicrypta Baueri, p. 201.

Heterotrichum DC., Verschiedenhaar, X. 1., Lythrariae-Melastomeae.

patens DC. (= *Melastoma grandiflora* Spgl. = *M. lappacea* Desr. = *M. patens* Sw. = *M. umbellata* Mill.), abstehendes, ♄. w. Domingo.

Heterotrichum leptophyllum MB., *pulchellum* Fisch., *salsum* MB., *squalidum* MB., *Stelleri* MB., v. Saussurea salicifolia, pulchella, crassifolia, alata et elongata, p. 723.

Heuchera L., Heuchera.

acerifolia Rafin., ahornblätterige, 4. f. Nordamerika.

bracteata DC. (= ? *Tiarella bracteata* Torrey), deckblätterige, 4. f. Nordamerika.

glabra W. (= *divaricata* Fisch. = *Tiarella colorans* Grah.).

hispida Pursh (= *reniformis* Rafin.).

Menziesii Hook., Menzies's, 4. f. Nordamerika.

micrantha Dougl. (= *Barbarossa* Presl).

pubescens Pursh (= *grandiflora* et *pulverulenta* Rafin.).

ribifolia Fisch. et Lallem., johannisbeerblätterige, 4. ♄. f. ? Nordamerika.

villosa Mchx. (= *squamosa* Rafin. = *parviflora* Bartl.).

Zu ergänzen p. 394.

Heurnia Spgl., v. Huernia.

Hewittia bicolor W. A., Steud., v. Shutteria bicolor.

Hexacentris N. E., Sechsspitze, XIV. 11., Acanthaceae.

coccinea N. E. (= *Thunbergia coccinea* Hook., p. 808), scharlachfarbige, ♄. Sch. w. Ostindien.

Hexaglottis flexuosa Sweet (= *longifolia* Vent.), v. Sisyrinchium flexuosum, p. 763, *virgata* Sweet, v. Moraea virgata.

Hexanthus umbellatus Lour., v. Tetranthera ferruginea, p. 802.

Hexastemon lanatus Kl., v. Erica (Sect. V. Eremia) lanata, p. 307.

Hexisea Lindl., Hexisea, XX. 1., Orchideae.

bidentata Lindl, zweizähnige, 4. w. Panama, Columbia.

Hexorina dichotoma Rafin., v. Streptopus roseus, p. 790.

Heymassoli inermis Aubl. et *spinosa* Aubl., v. Ximenia inermis et americana, p. 860.

Heymia rigida Dennst., v. Dentella repens, p. 256.

Digitized by Google

Hibbertia Salisb., Andr., Hibbertie.
oblongata RBr., längliche, ♄. t. Neuholland.
perfoliata Hügel, Lindl., durchwachsene, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).
procumbens DC., (= *angustifolia* Salisb. = *Dillenia procumbens* LaBill.), niederliegende, ♄. t. Neuholland.
serpyllifolia RBr., quendelblätterige, ♄. t. Neuholland.
stellaris Endl., sternförmige, ♄. t. Neuholland.
Cunninghami Hook., v. Candollea Cunninghami, p. 115, ll., *lanceolata* Hort. = ?

Hibiscus L., Eibisch.
amoenus Lk. et Otto, lieblicher, ♄. w. Montevideo.
armeniacus Bouché, armenischer, ⊙. f. Armenien.
bahamensis Mill., bahamischer, 4. w. Bahama.
calycinus W. (= *calyphyllus* Cavan.), groſskelchiger, ♄. w. Bourbon.
Cameronii Knowl. et Westc. (= *insignis* Hort.).
β) Cameroni-fulgens Rollisson (Hybride mit H. Rosa sinensis erzogen).
cruentatus Schrk., schmutzigrother, ♄. w. ?
digitiformis DC. (= *digitatus* Poir., H. Par., non Cav.), fingerblätteriger, ♄. w. ?
eriospermus Hochst., wollsaamiger, ⊙. ♄. w. Abyssinien.
flabellatus Dsf. (= *heterophyllus* Vent. var. Spgl.), fächerförmiger, ♄. ♄. t. w. Neuholland.
hakeaefolius Giordano (= ? *Pimelea decussata* Hort., non RBr.), hakeablätteriger, ♄. t. Neuholland.
Hamabo Sieb. et Zucc., Hamabo-E., ♄ t. Japan. (Ob kultiv.?)
Harrisii H. angl. et belg., Harris's, ♄. w. ?
heterophyllus Vent. (= *aculeatus* Dietr. = *Hügelii* Hort.).
Humboldtii Colla, Mart., Humboldt's, ♂. 4. w. ? Südam.
β) virens Hort.
Hügelii Endl., Hügel's, ♄. ♄. t. w. Neuholland.
immutabilis Dehnh., unveränderlicher, ♄. w. ?
Jacquini Colla (= *pruriens* Jacq., non Roxb.), Jacquin's, ♄. 4. w. Ostindien.
javanicus Weinm., javanischer, ♄. w. Java.
Jerroldianus Paxt., Jerrold's, 4. ♄. w. Brasilien.
katguhriensis Hffg., katguhrischer, ♄. w. Ostindien.
laevigatus Targ., Colla, glatter, 4. w. ?
Lambertianus H. B. K., Lambert's, ⊙. m. w. Südamer.
liliiflorus Cav. (= *puniceus* Hort.).
militaris Cavan. (= *hastatus* Mchx. = *laevis* Scop. = *riparius* P. = *virginicus* Walt.).
Moorii H. Makoy., Moor's, ♄. w. ?
panduraeformis Burm. (= *pilosus* Roxb. = *setosus* Wall. = ?*velutinus* DC.), geigenförmiger, ☉. ♄. w. Ostindien.
Rainerianus Visian., Rainer's, ♂. ♄. k. Nordafrika.
regius v. Houtte, königlicher, ♄. w. ?
Sabdariffa L., (= *gossypifolius* Mill.).
scaber Mchx. (= *rugosus* Hort.).
sphaerocarpus Bouché, kugelfrüchtiger, ⊙. m. f. ?
strictus Horneм., steifer, ⊙. m. f. Nepal.
tridactylites Lindl., dreitheiliger, ⊙. m. f. Neuholland.
Trionum L., δ) hispidus Mill., H. Petropol. (= *Humboldtii* Hort. = *Marschallianus* Hort.).
venustus Blume, lieblicher, ♄. w. Java.
Vrieseanus Hassk. (= *vitifolius* H. Bogoriensis, non L.), Vriese's, ♄. w. Java.

Digitized by Google

H. Abelmoschus L. *divaricatus* G. Don, Grah., *esculentus* L., *ficulneus* L., *ficulnoides* Lindl., *longifolius* W., *maculatus* Bartl., non Desr.), *Manihot* L., *Pseudo-Manihot* DC., p. 396 [1]), *splendens* Lodd., Fras., gehören zur Gattung Abelmoschus, vergl. p. I, II. Hinsichtl. der übrigen siehe die Gattungen Kosteletzkya, Lagunaea, Pavonia, Paritium und Thespesia.

Hicorius amarus Rafin., *integrifolius* Rafin., v. Carya amara et integrifolia, p. 168.

Hieracium T. Vaill., Habichtskraut.

I. Pilosella T. Vaill.

aurantiacum L., β) flavum Schlchr., Gaud. (= *repens* W.).

Bauhini Schult. (= *Auricula* W. = *filiferum* Tausch, ?= *melachaetum* Tausch.).

collinum Gochn. (= *asperum* Tausch, non Gaud., Schlchr. = *attenuatum* Tausch. = *calodon* Tausch).

glomeratum Fröl. (= *oymosum* Flor. Dan. = *pratense* Tausch var. ?), knaulförmiges, 4. f. Dänemark, Preussen.

pratense Tausch. (= *ambiguum* Ehrh. = *cichoriifolium* Hort.).

stoloniflorum W. K., β) Vogelianum *

II. Hieracium T. Vaill. (= *Aurella* Tausch).

alpinum L. (= *apiculatum* Tausch = *Cserianum* Baumg. = *intermedium* Hoppe = *melanocephalum* Tausch = *piliferum* Hoppe = *polyanthemum* Vill. = *polytrichum* Ledeb. = *rupicapra* Schrk. = *subnudum* Schlchr. etc.).

bracteolatum Sibth., Sm., deckblätteriges, 4. f. Griechenland, Sicilien.

brevifolium Tausch. (= *sabandum* L. var. ?), kurzblätteriges, 4. f. Südeuropa.

canadense Mchx. (= ? *Kalmii* Spgl. = *virgatum* Pursh, non Hort.).

crassifolium Bernh., non Schult. (= *latifolium* var. ? Spgl.), dickblätteriges, 4. f. ?

diffusum Froel. (= *ambiguum* Hort. Lands), weitschweifiges, 4. f. ?

foliosum W. K. (= *virosum* Pall.).

globosum Dsf. (= *villosum* var. ? DC.), kugelköpfiges, 4. f. ?

graveolens Fröl. (= *calyculatum* Hornem.), starkriechendes, 4. f. ?

helianthemifolium Fröl. (= *angustifolium* H. Landsb., non Hoppe), sonnenröschenblätteriges, 4. f. Armenien.

hirsutum Bernh., rauhhaariges, 4. f. Nordamerika.

jacobaeaefolium Fröl. (= *nemorosum* Lapeyr. = *senchifolium* Fisch., non MB.), Jacobskrautblätteriges, 4. f. Pyrenäen, Caucasus.

Lachenalii C. C. Gmel., γ) diaphanum Fr.

lycopsifolium Fröl. (= *sylvaticum* Spenn.), krummhalsblätteriges, 4. f. Westl. Deutschland.

Milleri Lk. (= ? *carpathicum* Bess.), Miller's, 4. f. ?

prasinum Dumort. (= *glaucum* Lejeun.), lauchgrünes, 4. f. Belgien.

prenanthoides Vill. (= *hirsutum* Tausch = *inuloides* Tausch. = *striatum* Tausch).

---

1) p. I, II. einzurangiren.

Digitized by Google

Hieracium

repandum Schrk., ausgeschweiftes, 4. f. ?

rubricaule Dumort. (= *prenanthoides* Lejeun.), rothstengeliges, 4. f. Belgien.

rupestre All., *β*) Schmidtii Tausch (= *candicans* Tausch = *Halleri* Hook., non Vill. = *ovatum* Hort. Vindob. = *villosum* Sm. = ? *murorum pilosissimum* L.).

sabaudum L. (= *crassicaule* Tausch = *canadense* Hort.).

saxatile Jacq., *β*) graminifolium Gaud. (= *linariaefolium* Fröl. = *porrifolium* Hort. = *Willdenowii* Monn.).

scabrum Mchx. (= *fasciculatum* Torrey = *virgatum* Poepp.), scharfes, 4. f. Nordamerika.

Sternbergii Fröl. (non Schrad., Hornem.), Sternberg's, 4. f. Böhmen.

? thyrsoideum Fisch., straufsförmiges, 4. f. Sibirien.

umbellatum L. (= *serotinum* Host.), *β*) coronopifolium Bernh. (= *ceratophyllum* Dsf.

verruculatum Lk. (= *scabrum* Mchx. var. ? Spgl.), warziges, 4. f. Nordamerika.

villosum L. (= *pilosum* Schlchr. = *acutifolium* Hall. fil. = *aurimontanum* Schrk. = *valdepilosum* Vill.).

Unbestimmtere: edentulum Hort., sanguineum H. Florent.

Hinsichtl. der übrigen s. die Gattungen Crepis, p. 229 et 230, p. 167, II., Tolpis p. 812 et Willemetia p. 857.

Higgensia P. DC. (= *O. Higgensia* R. et P.), Higgensie, V. 1., Rubiaceae.

mexicana Lk., Kl., Otto (= ? *Psychotria excelsa* H. B. K.), mexicanische, ♄. t. Mexico.

Himantoglosum Spgl., Riemenzunge.

secundiflorum Rchb. (= *parviflorum* Spgl. = *Aceras secundifl.* Lindl. = *Ophrys densiflora* Dsf. = *O. secundiflora* Steud. = *Orchis parvifl.* W. = *O. secundifl.* Bertol. = *Satyrium maculatum* Dsf. = *S. parviflorum* P.), einseitsblumige, 4. Kn. f. b. k. Oberitalien, Corsica.

viride Rchb., v. Peristylus viridis.

Himeranthus Endl., Freudenblume, V. 1., Solanaceae.

runcinatus Endl. (= *Linkii* Steud. = *Jaborosa runcinata* Lk. et Otto, ? non Lam.), schrotsägenförmige, 4. t. Bonaria, Montevideo.

Hinsia Benth., Hindsie, V. 1., Rubiaceae.

longiflora Benth. (= *Rondeletia longiflora* Cham., Schltdl.), langblumige, ♄. ♄. w. Brasilien.

β) alba odorata van Houtte.

violacea Benth., violette, ♄. ♄. w. Südl. Brasilien.

Hinterhubera Schultz Bipont. (G. Hinterhuber, Apotheker u. Botaniker in Salzburg), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Kotschyi Schultz Bipont., Kotschy's, ⊙. f. III. Abyssinien. *Hiorthia alexandrina* Neck., v. Cyrtolepis alexandrina, p. 247, *aurea* Less., v. Anthemis aurea, p. 62, *orientalis* Less. et *valentina* Less., v. Anacyclus orientalis et valentinus, p. 50.

Hippeastrum Herb., Sternnarcisse.

ambiguum Herb., Hook., *β*) longiflorum Hook. — *H. advenum* Herb., *aulicum* Herb., *calyptratum* Herb., *crocatum* Herb., *equestre* Herb. (et *equestri-vittatum* Herb.), *fulgido-rutilum* Herb., *fulgidum* Herb., *miniatum* Herb. (et *subbarbatum* Herb. = *proliferum* Herb.),

Digitized by Google

Hippeastrum

psittacinum Herb., *pulverulentum* Herb., *Reginae* Herb., *reticulatum* Herb., *rutilum* Herb., (et *rutilo-equestri-vittatum* Herb. et *rutilo-Reginae-vittatum* Herb. et *spathaceo-hybridum* Herb. et *splendens* Herb.), *striatifolium* Herb., *stylosum* Herb., *vittatum* Herb., v. Amaryllis advena etc. etc., p. 44 et 45, et p. 30 et 31, II.

Hippia stolonifera Brot., v. Gymnostyles lusitanica (= *Soliva stolonifera* RBr., Loud., p. 771 et 278 II.).

Hippion viscosum Spgl., v. Ixanthus viscosus, *Amarella* Schmidt, *campestre* Schmidt etc., v. Gentiana Amarella, campestris, etc., p. 350.

Hippobroma breviflora G. Don, *longiflora* G. Don, v. Isotoma breviflora et longiflora, p. 426.

Hippobromus Eckl., Zeyh., Rofsmach, XXII. v., (V. III.), Amyrideae-Terebinthaceae.

alatus Eckl., Zeyh. (= *Rhus alata* Thbg., p. 686 = *Weinmannia dioica* Spgl.), geflügelter, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

Hippocastanum Adans., *vulgare* G., v. Aesculus Hippocastanum, p. 21.

Hippocentaurea Centaurium Schult. etc., v. Erythraea Centaurium etc., p. 314 et p. 232, II.

Hippocrepis L., Hufschote.

constricta Kunze (= ? *biflora* Schimp., non Jacq.), verengte, ⊙. f. Arabien.

Hippoglossum Hartm., *maritimum* Hartm., *virginicum* Lilja (= *Platynema maritimum** et *pulchrum** p. 634), v. Mertensia maritima et virginica.

Hippomarathrum Lk., *crispum* K., *Libanotis* K., *siculum* Lk., v. Cachrys crispa, Libanotis, sicula, p. 142 et 84, II., — *H. pelviforme* G. M. S. (= *vulgare* Roch.), v. Seseli Hippomarathrum, p. 749.

Hippophaë L., Sanddorn.

fasciculata Wall., büschelförmiger, ♄. f. b. Nepal.

rhamnoides L., *α*) taurica, *β*) sibirica (= *angustifolia* Lodd.).

salicifolia D. Don (= *conferta* Wall. = *nepalensis* Hort.).

Hiptage G., Hiptage.

javanica Blume, javanische, ♄. Sch. w. Java.

Madablota G. (= *Banisteria benghalensis* L. = *B. tetraptera* Sonner. = *B. unicapsularis* Lam. = *Gärtnera racemosa* Roxb. = *Molina racemosa* Cavan.).

Hiraea Houlletiana H. Cels., v. Poivrea (= *Combretum*) Afzelii, p. 640.

Hirculus flagellaris Haw., *ranunculoides* Haw., v. Saxifraga flagellaris, Hirculus, p. 724, 725.

Hirschfeldia adpressa Mch., v. Erucastrum incanum, p. 312.

Hladnickia golaccnsis K., v. Malabaila golaccnsis. — *H. pastinacifolia* Rchb., v. Falcaria latifolia, p. 329.

Hoarea atra Swt., *bubonifolia* Swt. etc., v. Pelargonium atrum etc., Sect. VII., p. 599. — *H. bicolor* Swt. (= *bianda* Swt. = *pilosa* Swt.) = Pelarg. pilosum. — *H. carinata* Swt. = Pelarg. nutans. — *H. elegans* Swt. = Pelarg. Sweetianum.

Als Hybriden gehören zu dieser Section:

H. atrosanguinea Swt., coccinea Swt., Colvilli Swt., fuscata Colvill., galegifolia Swt., hedysarifolia Swt.,

Digitized by Google

Hiptage
Jenkinsonii Colvill., intertexta Swt., labyrinthica Swt., lilacina Swt., literata Swt., magica Colv., Swt., marginata Swt., nigricans Colv., orobifolia Swt., patens Swt., pulchella Swt., recurviflora Swt., replicata Swt., retusa Swt., selinifolia Swt., sisymbriifolia Swt., superba Swt., tenuifolia Swt., unguiculata Swt., varia Swt., venosa Swt., villosa Swt.
Hocquartia macrophylla Dumort., *tomentosa* Dumort., v. Aristolochia Sipho et tomentosa, p. 78.

Hoffmannseggia Cav., Hoffmannseggie.
Drummondii Torr. et Gr. Drummond's, 4. ♄. t. Texas.
gracilis Hook., Arn. (= *Larrea gracilis* R. et P.), schlanke, ♄. t. w. Chili.

Hohenbergia Schult. fil., Hohenbergie, VI. 1., Bromeliaceae.
fasciata Schult. fil. (= *Billbergia fasciata* Lindl., p. 123), bandförmige, 4. w. Brasilien.
Ob H. billbergioides Schult. fil., capitata Schult. fil., stellata Schult. fil., sämmtlich 4. und in Brasilien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt. — *H. strobilacea* Schult. fil., v. Acanthostachys strobilacea, p. 5, II.

Hohenwarthia David Pacher, (Baron v. Hohenwarth, Bischoff, bereiste die Tyroler etc. Alpen in botan. Hinsicht), X. III., Caryophyllaceae-Sileneae.
Pumilio D. Pacher (= *Silene Pumilio* Wulf. = *Saponaria Pumilio* Fenzl), niedrige, 4. f. b. Carnische, norische und rhätische Alpen.

Hoitzia Juss., Hoitzia.
Cervantesii H. B. K. (= *spicata* W. herb.), Cervantes's, ♄. t. Mexico.
coccinea Cav. (= *mexicana* Lam. = *Cantua coccinea* Poir. = *C. Hoitzia* W. = *Loeselia coccinea* G. Don.).
coerulea Cav. (= *Cantua coerulea* Poir. = *Loeselia coerulea* G. Don).
glandulosa Cav. (= *Cantua glandulosa* Poir. = *Loeselia glandulosa* G. Don). Vergl. p. 402.

Holarrhena RBr., Röhrenbeutel.
antidysenterica Wall. (= *Chonemorpha antidysenterica* G. Don = *Echites antidysent.* Roxb., p. 281), ruhrvertreibender, ♄. Sch. w. Ostindien, Nepal.
Holboellia angustifolia Wall., *latifolia* Wall., v. Stauntonia angustifolia et latifolia.

Holcus L., Honiggras.
annuus Salzm. (= *ventricosus* Hort. Gorenk.), jähriges, ☉. f. Nordafrika.
setiger N. E., borstentragendes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Hollia * (D. F. Holl, Lehrer d. Pharmacie zu Dresden, bereiste als Botaniker Portugal und Madeira), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
comosa * (= *Anthericum comosum* Stbg. = *A. Sternbergianum* R. et S. = *Cordyline vivipara* Hort. = *Chlorophytum Sternbergianum* Steud. = *Hartwegia comosa* N. E. = *Phalangium viviparum* Reinw.), schopfige, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.
Hollia africana * v. Noltea africana.

Holmskioldia Retz, Holmskioldie.
sanguinea Retz (= *rubra* P. = *Hastingia coccinea* Sm. = *Platanium rubrum* Juss.).
scandens Roxb. (= *Hastingia scandens* Swt.).

Digitized by Google

Hologymne californica Bartl., *Douglasii* Hort. Petropol., *glabrata* Bartl., v. Monolopia californica, major et glabra.

Hololachne Ehbg., v. Halolachne.

Hololepis pedunculata DC., v. Vernonia pedunculata, p. 841.

Holoregmia viscida N. E., v. Craniolaria unibracteata, p. 164, II.

Holoschoenus Lk., atrovirens Lk. etc., v. Isolepis, Sect. II.

Holosteum L., Spurre.

glutinosum Fisch. et Mey., (non Fr.), klebrige, ⊙. f. Taurien, Gegend d. caspischen Meeres.

liniflorum Stev. (= *Arenaria glutinosa* MB. = *Lepigonum glutinosum* Swt. = *Spergularia glutinosa* G. Don, p. 38), leinblumige, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres.

sperguloides Lehm., sparkähnliche, ⊙. f. Aegypten.

Holostigma cheiranthifolium, *heterophyllum* Spach, *micranthum* Spach, *minutiflorum* Spach, v. Sphaerostigma cheiranthifolium, hirtum, micranthum et minutiflorum, p. 777.

Homalanthes A. Juss., (= *Omalanthus* Grah., p. 557), Flachblume.

Leschenaultianus Juss., Leschenault's, ♄. ♄. w. Java.

populifolius Grah., p. 557.

Homalonema Schott, Natterkraut, VII. 1. (XXI. VI.), Aroideae.

aromaticum Schott (= *Calla aromatica* Roxb. = *C. occulta* Lodd., non Lour. = *Zantedeschia aromatica* Spgl.), gewürzhaftes, 4. ♄. Wa. w. Ostindien.

Homeria Vent., collina Swt. (= *ochroleuca* Salisb.), *β*) aurantiaca Swt.

Homogyne Cass. (= *Tussilago* T., Sect. II., p. 828), Alpenlattig, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

alpina Cass. (= *Tussilago alpina* L.), gemeiner, 4. f. Mitteleuropa, Alpen und Voralpen.

discolor Cass. (= *Tuss. discolor* Jacq.), verschiedenfarbiger, 4. f. Oesterreichische etc. Alpen.

sylvestris Cass. (= *Tuss. sylvestris* Scop.), Wald-L., 4. f. Kärnthen, Krain etc.

Homostylium N. E., cabulicum N. E., v. Aster, Sect. X^{b}., p. 51, II.

Honckenia peploides Ehrh., v. Alsine, Sect. II., p. 38.

Hoodia Swt. (= *Monothylaceum* G. Don = *Scytanthus* Hook.), Hoodie, V. II., Asclepiadeae.

Currori Decaisne (= *Scytanthus Currori* Hook.), Currori's, 4. ♄. w. Cap d. g. Hoffn.

Gordoni Swt. (= *Stapelia Gordoni* Mass., p. 782 = *Scytanthus Gordoni* Hook.), Gordon's, 4. ♄. w. Cap der guten Hoffnung.

Hopkirkia Eupatoria Spgl., *hirsuta* Spgl., *scandens* Spgl., v. Salmea Eupatoria etc., p. 715.

Hoplotheca floridana Nutt. etc., v. Froelichia floridana etc, p. 248, II.

Hoppea sibirica Rchb., *speciosa* Rchb., v. Ligularia sibirica et Reichenbachii, p. 462.

Hordeum T., Gerste.

coeleste Viborg, P. B., a) barbatum Sering., b) trifurcatum Sering.

Digitized by Google

Hordeum
distichum L., a) laxum H. Petr., b) sublaxum H. Petr. c) densum Sering., d) nigricans Sering. (seminibus nigris), e) ramosum Sering.
hexastichon L., a) abbreviatum H. Petrop., b) elongatum H. Petrop., c) laxum Sering., d) densum Sering., e) tetrastachyum Sering.
murinum L., γ) leporinum Lk.
nepalense Swt., nepalsche, ☉. f. Nepal.
nodosum L., β) sibiricum Lk.
nudum Arduin, Schüb. (= *imberbe* R. et S. = *distichum* β W. = *coelestoides* Sering.), nackte, ☉. f. ? β) chinense H. Petrop.
vulgare L. (= *sativum* P.), a) pallidum Sering., b) coerulescens Sering., c) nigrum W., d) tortile Sering., e) hibernum, f) spica abbreviata H. Petrop., g) spica elongata H. Petrop., aa) seminibus majoribus, bb) seminibus minoribus, h) sanguineum Hort., i) multicaule Hort. etc. Ob arachnoideum Hort., distans Hort., intermedium Hornem., auch als Varietäten zu letzterer Art gehören, ist mir nicht bekannt.

Horkelia Chamiss., Schltdl., Horkelie.
californica Schltdl. (= *Sibbaldia californica* Spgl.), californische, 4. f. b. Californien.
capitata Lindl., kopfförmige, 4. f. b. Nordamerika.
congesta Dougl., Hook. (= *hirsuta* Lindl. = *pilosa* Nutt.).
cuneata Lindl. (= *Douglasiana* Nutt.), keilblätterige, 4. f. b. Californien.
Horminum virginicum L., v. Salvia lyrata, p. 717. *Hornemannia ovata* Lk. et Otto, *viscosa* W., v. Vandellia crustacea et hirsuta.

Hornungia Rchb., (Hornung, Apotheker u. Botaniker in Aschersleben), XV. II., Cruciferae.
petraea Rchb. (= *Hutschinsia petraea* RBr., p. 406).
Hornungia Bernh., v. Gagea reticulata, p. 251, II. *Horta spinosa* Vellozo, v. Clavija ornata, p. 202.

Hosackia Dougl., Hosackie.
parviflora Benth., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
subpinnata Torr. et A. Gr., G. Don (= *Anisolotus anthylloides* Bernh., p. 869 = *Anthyllis chilensis* DC. = *Lotus subpinnatus* Lag.), fastfiederige, ☉. ♂. f. Chili, Californien.
Wrangeliana Torr. et A. Gr. (= *Anisolotus Wrangelianus* Bernh., p. 869 = *Lotus Wrangelianus* Fisch. et Mey., p. 478).
Hosta pyramidata Dietr., v. Cornutia pyramidata, p. 220. — *H. foetida* Mch., *rubra* Cass., v. Barkhausia foetida et rubra, p. 113.

Hoteia Sieb., Morr. et Decne. (Von H. v. Siebold nach einem japanischen Botaniker Namens Hotei, benannt), X. II., Saxifrageae.
biternata Morr. et Decne. (= *Astilbe decandra* Don = *Tiarella biternata* Vent.), doppeltdreizählige, 4. f. Nordamerika.
japonica Morr. et Decne. (= *Spiraea japonica* Thbg. et Hort. belg., p. 778), japanische, 4. ħ. f. b. Japan.

Houlletia Lindl., Houlletie, XX. I., Orchideae.
Brocklehurstiana Lindl., Hook. (= *stapeliaeflora* H. belg. = *Maxillaria Brockleh.* H. belg.), Brocklehurst's, 4. w. Brasilien.

Digitized by Google

Houlletia
vittata H. Makoy., verschleierte, 4. w. ? Brasilien.

Houstonia L., Houstonie.
ciliolata Torr. et A. Gr. (= *ciliata* Loud.), feinwimperige, 4. k. f. b. Nordamerika.
coerulea L. (= *grandiflora* Rafin. = *Linnaei* Mchx. = *Hedyotis coerulea* Torr. et A. Gr.).
crocea H. Cels., safranfarbige, 4. ♄. k. ?
tenuifolia Nutt. (= *divaricata* H. Angl.), dünnblätterige, 4. k. f. b. Nordamerika.

Houttea * tubiflora * v. Gloxinia, Sect. III.

Hovea RBr., Hovea.
acutifolia A. Cunn., G. Don, spitzblätterige, ♄. t. Neuh.
ferruginea v. Houtte, rostfarbige, ♄. t. Neuholland.
hirsuta H. Angl., rauhhaarige, ♄. t. Neuholland.
ilicifolia A. Cunn. [1]), stechhülsenblätterige, ♄. t. Neuh.
β) glauca v. Houtte (= *cordata* Hort.), γ) rotundifolia v. Houtte.
lanigera Lodd. (= *pannosa* A. Cunningh.).
longipes Benth., langstielige, ♄. t. Neuholland.
multiflora Makoy, vielblumige, ♄. t. Neuholland.
pungens Benth., β) major Paxt.
racemulosa Lindl., traubige, ♄. t. Neuholland.
ramulosa A. Cunningh., ästige, ♄. t. Neuholland.
spicata Makoy, ährige, ♄. t. Neuholland.
splendens v. Houtte, schimmernde, ♄. t. Neuholland.
trifoliata Hort. (= Mirbelia triternata, p. 526).

Hovenia Thbg., Hovenie.
acerba Lindl., saure, ♄. t. Ostindien, China.

Hoya RBr, Hoya.
angustifolia Lindl., schmalblätterige, ♄. Sch. w. China.
chinensis Lindl., (= *Schollia chinensis* Jacq.), chinesische, ♄. Sch. w. China.
coriacea Blume (non Lindl.), lederartige, ♄. Sch. w. Java.
crassifolia Haw., dickblätterige, ♄. Sch. w. (Zweifelhaft).
pallida Lindl. (= *lanceolata* Lindl. non Wall. = *acuta* Haw. = *albens* Mill.).
Pottsii Traill., Lodd.
coriacea Lindl., non Bl. (= *Centrostemma Lindleyanum* Decsne.), *multiflora* Blume, *reflexa* Hort., v. Cyrtoceras coriaceum etc., p. 183, II.

Huberia DC., (Huber, berühmt. Naturforsch. in Genf), X. 1., Lythrariae-Melastomeae.
annulata DC. (= *Majeta annulata* Vent. = *Melastoma annulata* Poir.), geringelte, ♄. w. Java.
argentea DC. (= *Majeta argentea* Vent. = *Melastoma argentea* Poir.), silberfarbige, ♄. w. Brasilien.
laurina DC. (= *laurifolia* H. belg. = *Melastoma laurina* Sering.), lorbeerähnliche, ♄. w. Brasilien.
semiserrata DC. (= *Rhexia semiserrata* Schrk., Mart.), halbsägezähnige, ♄. w. Brasilien.

Hubertia Juss., Bory, Hubertie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
pinifolia Juss., Sbr. (= *Conyza pinifolia* Bory = *Faujasia pinifolia* Cass. = *Senecio pinifolius* P. = *S. Commersonii* Spgl.), kieferblätterige, ♄. t. Mauritius.
Hügelia Benth., v. Gilia, Sect. I., p. 262.

---

1) Soll mit Plagiolobium ilicifolium Swt. nicht = sein.

Digitized by Google

Huernia RBr., Huernie.
clavigera Haw. (= *Stapelia campanulata* Sims excl. syn.).
tubata RBr., β) duodecimfida Haw. (= *Stapelia duodecimfida* Jacq.).

Hufelandia N. E., (Hufeland, k. pr. geh. Medicinalrath etc., bekannter u. berühmter Arzt in Berlin), IX. 1., Laurineae.
latifolia N. E., breitblätterige, ♄. w. Peru.
pendula N. E. (= *Laurus pendula* Sw., p. 449).
thyrsiflora N. E. (= *Laurus thyrsiflora* Poir., p. 449).

Huguenina Rchb., (A. Huguenin, Botaniker zu Chambery in Savoyen), XV. III, Cruciferae.
tanacetifolia Rchb. (= *Sisymbrium tanacetifolium* L.), rainfarrnblätterige, 4. f. Schweiz, Italien, Frankreich.
Hulthemia berberidifolia Dumort., v. Lowea berberifolia.
Humboldtia R. et P. (non Vahl), *emarginata* R. et P., v. Physosiphon emarginatus, p. 621, *parviflora* R. et P., v. Stelis micrantha, p. 786.

Huntleya Batem., Huntleya.
sessiliflora Batem., stiellosblumige, 4. w. Guiana.

Hutchinsia RBr., Hutchinsie.
alba Bunge H. Dorpat. (= *Sisymbrium album* Pall. = *Nasturtium album* Spgl. = *Smelowskia cinerea* C. A. Mey.), weifse, 4. f. Sibirien.
bifurcata Bunge (= *Smelowskia bifurcata* Turcz.), zweigabelige, 4. f. Dahurien (Baical).
petraea RBr. = Hornungia petraea.

Hyacinthus T., Hyacinthe.
griseus Brouss. H. Monspel., graue, 4. Zw. f. ?
nanus R. et S. (= *Puschkinia scilloides* Sbr., non Adams., = *Scilla bifolia* Sbr., non L.), zwergige, 4. Zw. k. f. b. Creta.
orientalis L., β) foliis recumbentibus Redouté, γ) monstrosus Kunth.
Pouzolzii Gay. (= *Scilla fastigiata* Vivian = *S. verna* Moris = *S. verna* γ R. et S.), Pouzolz's, 4. Zw. k. f. b. Corsica.
Zweifelhafte: convallarioides Thbg., L. Suppl., Jacq. Schönbr., maiblumenähnliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
bifolius Boutelou, v. Polyxena pygmaea, *corymbosus* L. mant., v. Periboea corymbosa.
Hinsichtl. d. übrigen s. d. Gattungen Agraphis, p. 14, II. (Scilla, Sect. II., p. 732), Bellevalia, p. 117 et 64, II., Botryanthus, p. 75, II., Muscari, p. 534 et Uropetalum, p. 831.

Hyaenanche Lam.
capensis P. (= *globosa* Lamb. = *Jatropha globosa* G. = *Toxicodendron capense* Thbg.).
Hyalis Salisb. (non DC.), *aulica* Salisb., *gracilis* Salisb., v. Ixia aulica, capillaris, p. 426, *longiflora* Salisb., v. Montbretia (= *Tritonia* = *Waitzia*) longiflora, p. 854.

Hybanthera Endl., Höckerbeutel, V. II., Asclepiadeae.
biglandulosa Endl., doppeldrüsiger, 4. ♄. Sch. t. Norfolkinsel.
cordifolia H. belg., v. Tylophora lutescens.
Hybanthus concolor Spgl., v. Solea concolor, p. 769.
Hybridella globosa Cass., v. Chiliophyllum globosum, p. 190.

Digitized by Google

Hydrangea L., Wasserstrauch.

arborescens L., β) cordata Torr. et A. Gray (= *cordata* Pursh).

cordifolia Sieb. et Zucc., herzblätterige, ♄. k. f. b. Japan.

Hortensia DC. (= *globulifera* Sering. = *hortensis* Sm. = *opuloides* Hort. = *mutabilis* Hort. = *Hortensia opuloides* Lam. [1]) = *Hort. rosea* Dsf. = *H. speciosa* P. = *Peautia* Commers.), b. fl. coeruleo.

japonica Siebold et DC. prodr. (= *normalis* Sering.), japanische, ♄. k. f. b. Japan.

β) hortensioides * [2]).

involucrata Sieb., eingehüllte, ♄. k. f. b. Japan.

macrophylla DC. (= *Viburnum macrophyllum* Thbg.), grofsblätterige, ♄. k. f. b. Japan.

Otaksa Sieb. et Zuccar., Otaksa-W., ♄. k. f. b. Japan.

pubescens Courtois (= *radiata* var.? W. Enum. = *Neesiana* Steud. = *glauca* Hort.), weichhaarige, ♄. f. ?

quercifolia Bartr., β) angulata Tausch.

stellata Sieb. et Zuccar. (= *Sitsitan* Sieb.), sternförmige, ♄. k. f. b. Japan.

Thunbergii Sieb. (= *serrata* DC. = *Viburnum serratum* Thbg.), Thunberg's, ♄. k. f. b. Japan.

Unbestimmt: laevigata H. Cels.

(Aufserdem wachsen in Japan noch folgende wild, die bis jetzt noch nicht eingeführt zu sein scheinen, als: acuminata Sieb. et Zuccar., Azizai Sieb., Belzoni Sieb. et Zuccar., bracteata Sieb. et Zuccar. (= *cordifolia* var. Sieb. et Zuccar.), hirta Sieb. et Zuccar., paniculata Sieb. et Zuccar., petiolaris Sieb. et Zuccar., virens Sieb. (= *scandens* DC. = *Viburnum virens* Thbg.); — in Nepal: altissima Wall., anomala Wall., aspera D. Don, vestita Wall. etc. — *H. alternifolia* Sieb. = Cardiandra alternifolia).

Hydrastylis californicus Salisb., v. Sisyrinchium californicum, p. 762.

Hydrocera Blume, Wasserhorn, V. 1., Balsamineae-(Hydrocereae Blume).

triflora Wight et Arn. (= *natans* Blume = *Impatiens baccifera* Roxb. = *I. natans* W. = *I. triflora* L., p. 415 = *Tytonia natans* G. Don), dreiblumige, ⊙. Wa. m. w. Ostindien.

Hydrochloa Hartm., *airoides* Hartm., *aquatica* Hartm., *arundinacea* Swt., *distans* Hartm., v. Glyceria aquatica etc., p. 360 et 361 et p. 266 et 267, II. — *H. carolinensis* P. B., v. Hydropyrum fluitans, p. 407.

Hydrocleis L. C. Rich., Wasserlöffel, XIII. VI. Alismaceae-Butomeae.

Humboldtii Endl. (= *Limnocharis Humboldtii* L. C. Rich., p. 464 = *Stratiotes nymphoides* W.), Humboldt's, 4. Wa. w. Südamerika.

Hydrocotyle T., Wassernabel.

bonariensis Lam., a) multiflora R. et P., β) tribotrys R. et P. (= *polystachya* α Rich.).

---

1) Von Commerson zu Ehren der Hortense Lepaut, der Frau eines berühmten Uhrmachers zu Paris so benannt, und von Lamarck in der Encyclop. botan. aufgenommen.

2) Bastard von H. Hortensia und japonica, von Herrn René Rovellis, Obergärtner auf den borromäischen Inseln, gezogen.

Digitized by Google

Hydrocotyle
brasiliensis Scheidw., brasililanischer, 4. Wa. w. Brasilien.
nepalensis Hook., (= *capitata* Moon = *hispida* D. Don).
ranunculoides Don, L. fil. (= *cymbalariaefolia* Mühlberg, Ell.).
repanda P. (= *cordata* Walt. = *erecta* L. fil. = *ficarioides* Mchx. = *reniformis* Walt.).
sibthorpioides Lam. (= *ranunculoides* β R. et S. = *Chondrocarpus sibthorpioides* Swt.).
Solandra L. fil. (= *tomentosa* Thbg. = *Solandra capensis* L.), filziger, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.
β) longifolia DC.
tenella D. Don (= *asiatica* Wight herb. = *sibthorpioides* Auct., ?Lam. = *Wightiana* Wall.), zarter, 4. w. t. Nepal.

Hydropeltis purpurea Mchx., p. 407 (= *pulla* Salisb., *Brasenia peltata* Pursh = *B. Schreberi* Gmel. = *Ixodia natans* Soland., Banks.).

Hydrophyllum L., Rinnenblume (Wasserblatt).
capitatum Dougl., kopfförmiges, 4. f. Nordamerika (Oregon, Californien).

Hygrophila RBr., Feuchtfreund.
longifolia N. E. (= *Ruellia longifolia* Roth, p. 705).
obovata N. E. (= *Ruellia obovata* Roxb.), verkehrteiförmiger, ⊙. w. m. Ostindien.
salicifolia N. E. (= *Ruellia salicifolia* Vahl, p. 705).
undulata Blume (= *Ruellia undulata* Vahl, p. 706).
Hymenidium Brunonis Lindl., v. Hymenolaena Brunonis.
Hymenocallis adnata Herb. (= *disticha* Herb. = *litoralis* Salisb.), *amoenum* Herb. (= *sessilis* Salisb.), *angusta* Herb. (= *tenuiflora* Herb.), *caymanensis* Herb., *crassifolia* Herb., *expansa* Herb., *fragrans* Salisb. (= *caribaea* Herb.), *guianensis* Herb., *lacera* Herb. (= *mexicana* Herb. = *paludosa* Salisb. = *rotata* Herb.), *odorata* Herb., *patens* Herb., *pedalis* Herb., *quitensis* Herb., *repanda* F. Otto, *speciosa* Herb., *spiralis* Lee, *Staplesii* Herb., *tubiflora* Herb., *undulata* Herb., v. Pancratium adnatum, amoenum etc., p. 582 etc.
Hymenocharis obliqua Salisb., v. Maranta obliqua, p. 496.

Hymenolaena DC., Hautdolde, V. II., Umbelliferae.
Brunonis DC. (= *Ligusticum Brunonis* Wall.), Brunon's, 4. k. Nepal.

Hymenolepis Kaulf., Hautschuppenfarrn, XXIV. 1., Pteroideae-(Polypodiaceae).
revoluta Blume, zurückgerollter, 4. w. Java.
Hymenolepis Cass., DC., *parviflora* DC. (= *Athanasia crithmifolia* Hort. = *A. parviflora* Jacq.), v. Metagnanthus parviflorus.

Hymenonema Cass., Hautscorzonere, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
Fontanesii Cass. (= *asperum* DC. = *Scorzonera aspera* Dsf. = *S. stylosa* P.), Desfontaines, 4. f. b. k. Orient.

Hymenopappus L'Her., Hautfederchen.
artemisiaefolius DC., beifufsblätteriges, ♂. k. Texas.
pedatus Lagasc., v. Florestina pedata, p. 245.
Hymenospron molle rubrum* Spgl., *sericeum* Spgl., v. Dioclea mollis, Jacquiniana, sericea, p. 203, II.

Digitized by Google

Hymenotheca laxiflora Lagas., v. Damasonium indicum, p. 251.

Hymenoxis Cass., DC., Spitzfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

californica Hook. (= *Ptilomeris* c. Nutt.), californisches, ⊙. f. Californien.

β) hirta Hook. (= *Shortia californica* Booth et Hort., non Grah.).

Hyophorbe G., Eberpalme, XXI. VI., Palmae.

indica G. (= *Commersoniana* Mart. = *Areca lutescens* Bory), indische, ♄. w. Ostindien, Mascarenas [1]).

Hyoscyamus T., Bilsenkraut.

I. Genuinus.

albus L. (= *major* Mill.).

auriculatus Tenor., Swt., geöhrtes, ⊙. ♂. f. k. Neapel.

Clusii G. Don (= *albus β minor* R. et S.), Clusius's, ⊙. f. Südeuropa.

minor Mill., kleines, ♂. k. Syrien.

muticus L. (= *betaefolius* Lam.).

niger L., *β*) agrestis W. K. (= *bohemicus* Schm. = *pictus* Roth = *verviensis* Lejeun.).

Unbestimmtere: ceratophyllus Fisch., chloranthus Wend., pictus Bernh.

II. Physochlaina G. Don.

orientalis MB.

physaloides L.

?Hybrid.: pseudophysaloides Roth.

Hyoseris arenaria Schousb., v. Hedypnois arenaria, p. 379, *biflora* Walt. (= *amplexicaulis* Mchx. = *prenanthoides* W.), *major* Walt. (= *angustifolia* Mchx.), v. Cynthia virginica, p. 245 et C. Dandelion, p. 876 et 440, *minima* L., v. Arnoseris pusilla, p. 80, *taraxacoides* Lam. (= *cichorioides* Vill.), v. Thrincia hirta, p. 808.

Hypecoum T., Lappenblume.

grandiflorum H. Genev., grofsblumige, ⊙. f. ?

Hyperanthera aptera Steud., v. Moringa aptera.

Hypericum T., Johanniskraut.

adenocarpum Montbret (= *H. Montbretii* Spach), drüsenfrüchtiges, 4. f. b. k. Orient.

albens Schrad., Hffg., weifsliches, ♄. k. Teneriffa.

amoenum Pursh (= *aureum* Bartr., non Lour. = *frondosum* Mchx.).

asperum Ledeb., rauhes, 4. f. Sibirien.

australe Tenore (= *dubium* Mauri = *humifusum* Tenore, non L.), südliches, 4. f. Süditalien.

biflorum Lam. (= *carneum* Wall. = *chinense* Retz = *cochinchinense* Lindl., non Lour. = *petiolatum* Lour., non L.), zweiblumiges, ♄. t. k. China.

canariense L. (= *floribundum* Rchb., non Ait. = *Webbia canariensis* P. Webb et Berth. = W. *heterophylla* Spach).

cistifolium Lam. (= *opacum* Torr. et A. Gr. = *nudiflorum* Hook. = *Brathydium hyssopifolium* Spach), ciströschenblätteriges, 4. f. Nordamerika.

commutatum Nolte, verwechseltes, 4. f. Lauenburg.

---

1) Makoy führt eine „Species de Cayenne" auf. Vergl. dessen Extrait du Catalogue des plantes etc.

Digitized by Google

Hypericum

corymbosum Mühlbg. (= *punctatum* Beck., Rchb. = *micranthum* Hook. = *virginicum* Walt. = *maculatum* Mchx.).

dentatum Loisel. (= *ciliatum* Desv.).

fasciculatum Lam. (= *nitidum* Lam. = *Myriandra nitida* Spach), *β*) aspalathoides W., (= *tenuifolium* Pursh = *Myriandra brachyphylla* Spach).

formosum H. B. K. (= *Humboldtii* Schltdl. pat. = *maculatum* W. herb.), schönes, 4. k. Mexico.

galioides Lam. (= *fasciculatum* Mchx. = *axillare* Lam. = *Michauxii* Desr. = *Myriandra galioides* et *Michauxii* Desr.).

inodorum Mill., W. (= *hircinum* Sbr., non L. = *Androsaemum xylosteifolium* Spach), geruchloses, ♄. f. b. Griechenland, Orient.

Kalmianum Lam. (= *Bartramicum* Mill.).

linarioides Bosse, leinkrautähnliches, ♄. f. b. k. ? Armenien.

lanuginosum Lam., wolliges, 4. k. Orient.

Michauxii Lam., Poir. (= *axillare* Lam. = *fasciculatum* Mchx. = *rosmarinifol.* Ell. = *Myriandra Michauxii* Spach), Michaux's, ♄. f. Nordamerika.

myrtifolium Lam. (= *glaucum* Mchx. = *rosmarinifolium* Choisy = *Myriandra glauca* Spach).

nepaulense Choisy (= *pallens* D. Don = *setosum* Wall.).

origanifolium W., F. M. et Lallem., dostenblätteriges, ♂. f. b. Orient.

α) Willdenowianum Fisch., Mey. et Lallem. (= *origanifolium* W.), *β*) Candolleanum Fisch., Mey. et Lallem., (= *origanifolium* DC.).

platysepalum Walp. (= *Webbia platysepala* Spach), grofskelchiges, 4. k. Canarische Inseln.

prolificum L. (= *densiflorum* Spach = *cryptopetalum* Lam. = *foliosum* Jacq. = *Kalmianum* du Roi et Hort. = *Myriandra prolifica* et *spathulata* Spach).

scabrum L. (= *Drosanthe scabra* Spach), scharfes, 4. ♄. k. Arabien, Nordafrika.

soongaricum Ledeb., soongarisches, 4. f. Soongaria.

sphaerocarpum Mchx. (= *Brathydium sphaerocarpum* Spach), kugelfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.

Webbii Steud. (= *Triadenia Webbii* Spach), Webb's, ♄. k. Malta, Orient.

Unbestimmtere: nigricans Zuccar., paniculatum Lam., pendulum Hort., praealtum Brot.

Hinsichtl. der übrigen s. die Gattungen Androsaemum, p. 57, Elodea, p. 219, Il. et Vismia, p. 852.

Hypertelis E. Meyer, Fenzl, Hörnelkraut, V. III., Portulacaceae-Paronychieae.

verrucosum E. Mey. (= *Pharnaceum verrucosum* Eckl., Zeyh.), warziges, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Hyphaene G., Wabenpalme, XXII. VI. (VI. III.), Palmae.

coriacea G., lederartige, ♄. w. Aegypten.

thebaica Martius (= *crinita* G. = *Cucifera* P. = *guineensis* Schum., Thonn. = *Corypha thebaica* L. = *Cucifera thebaica* Delile = *Douma thebaica* Poir.), thebensische, ♄. w. Arabien, Oberaegypten, Nubien, Abyssinien [1]).

---

1) „Palma caudice apice dichotomo singularis, in hortis europaeis rarissima, e seminibus a Theodoro Kotschy missis, nobis

Digitized by Google

Hypocalyptus capensis Thbg., v. Virgilia capensis, p. 852, *calyptratus* Thbg., *glaucus* Thbg., *pedunculatus* Thbg., *sericeus* Thbg., v. Podalyria styracifolia, glauca, biflora, et sericea, p. 638.

Hypocalymma Endl., Kappenmyrte, XII. 1., Myrtaceae.

Cunninghamii Schauer (= *Baeckia speciosa* A. Cunn.), Cunningham's, ♄. t. Neuholland.

cordifolium Lehm., J. C. Schauer, herzblätterige, ♄. t. Neuholland.

robustum Endl., Lindl. bot. reg., starke, ♄. t. Neuholl.

H. angustifolium Endl., asperum J. C. Schauer, scariosum J. C. Schauer, strictum J. C. Schauer, scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Hypochaeris Vaill., Ferkelkraut.

arachnoidea Poir. (non Bivon.), spinnewebiges, ⊙. f. Mauritanien.

Balbisii Nocca (= *minima* Balb.), *β*) foliosa H. Berol. Candollei Regel, Candolle's, ⊙. f. Südeuropa.

glabra L. (= *adscendens* Broter. = *dimorpha* Broter.), *β*) simplex DC., *γ*) pusilla Poir., *δ*) minima Cyrill, Dsf. (= *arachnoidea* Bivon. = *capensis* Less.).

neapolitana Tenor. (= *dimorpha* Guss., Tenor.), neapolitanisches, 4. f. Neapel.

Unbestimmtere: dubia Mart., hirta Ucria.

Hinsichtl. d. übrigen s. Achyrophorus, p. 7, II.

Hypocyrta Mart., Bogenmaske, XIV. 11., Personatae-Gesnerieae.

hirsuta Mart., rauhhaarige, ♄. w. Brasilien.

strigillosa Mart., striegelige, ♄. w. Brasilien.

Hypodaeurus Hochst., Schweiffennich, III. 11., Gramineae.

cenchroides Hochst., stachelgrasähnlicher, ⊙. ♂. m. f. w. Abyssinien.

Hypoestes Soland., RBr., Hüllklau.

cephalotes Lk. (= *Erinus bilabiatus* Roxb. = *Justicia cephalothes* W. herb.), grofsköpfiger, ♄. w. Ostindien.

Hypolepis Bernh., Presl, Lk. (non P. nec P. B.), v. Cheilanthes, Sect. II., p. 137.

Hypopitys Dill., Scop., Hall., Ohnblatt, Fichtenspargel, X. 1., Ericaceae-Monotropeae.

glabra DC., (= *hypophegea* Don = *Monotropa Hypophegea* Wallr. = *M. Hypoxa* Spgl., p. 529 = *M. Hypopitys α glabra* Roth, K.), glatter, 4. f. Europa.

multiflora Scop. (= *lutea* Gray. = *Monotropa Hypopitys* L., p. 529, *β hirsuta* Roth, K.), vielblumiger, 4. f. Europa.

Hypoxis L., Härtling.

elegans Andr. (= *tridentata* DC. = *stellata* Jacq. *β* Ker).

gracilis Lehm., schlanker, 4. Zw. t. Brasilien.

hemerocallidea C. A. Mey., taglilienähnlicher, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

mexicana Schult., mexicanischer, 4. Zw. t. k. Mexico.

---

nata est. Aegyptii e trunco rates et varia utensilia fabricant. Fructus crudi Dongolae incolis aliisque Aethiopibus cibo sunt, e coctis sorbilli speciem in Aegypto parant." Endlicher Catalogus horti academici Vindobonensis. I. p. 204. Vergl. auch Kunth Enumeratio plantar. III. p. 227.

Digitized by Google

Hyptis Jacq., Linksblume.

barbata Schrk., bärtige, ♄. w. Brasilien.

fasciculata Benth. (= *undulata* Schrk. = ? *Hypothronia undulata* Schrk.), büschelförmige, 4. w. Brasilien.

glomerata Schrk., Mart. (= *oppositiflora* Schrk.), knaulförmige, 4. w. Brasilien.

pectinata Poit. (= *nepetoides* Fisch. = *persica* Poit. = *racemosa* Zuccagn. = *Ballota disticha* et *suaveolens* Rodsch. = *Brotera persica* Spgl. = *Bystropogon coarctatum* Thom. et Schum. = *B. pectinatum* L'Her. = *Mentha perilloides* L., non Auct. = *Nepeta aristata* Rich. = *N. pectinata* L.), kammförmige, 4. ♄. t. w. Südamerika, wärmeres Asien und Afrika.

pubescens Benth., weichhaarige, 4. ♄. k. t. Mexico.

suaveolens Poit. (= *ebracteata* RBr. = *Plumieri* Poit. = *Ballota suaveolens* L., Jacq. = *Bystropogon suaveolens* L'Her.), feinriechende, ⊙. w. Südamerika.

verticillata Jacq. (= *Stachys patens* Sw.), wirtelförmige, ♄. w. Westindien.

Unbestimmtere: glechomoides Weinm. 4. Brasil., marathrosma Spgl. (= *Perilla marathr.* Spgl. in Cat. hort.), menthodora Schrk., nepalensis Lehm., paniculata Brotero. — *Chamaedrys* W. Poit. (= *inflata* Spgl. = *lurida* Spgl. = *pseudo-chamaedrys* Poit., v. Marsypianthus hyptoides, *stachyoides* Lk., v. Elsholtzia incisa, p. 219, II.

Hyssopus T., Ysop.

angustifolia MB. (= ? *altissimus* Mill. = *caucasicus* Spgl. = *officinalis* Habl., Pall., L. var. *β* Benth. = *orientalis* Adam., W. E.).

officinalis L., *α*) latifolius Benth. (= *alopecuroides* Fisch. = *Fischeri* Hortul.), *β*) myrtifolius Dsf. (= *ruber* Mill., Bernh.), *γ*) Schleicheri G. Don, *δ*) vulgaris Benth., b) fl. albo, c) variegatus.

septemcrenatus Ehbg., siebenkerbiger, ♄. k. f. b. Aegypten.

septemfidus Ehbg., siebentheiliger, ♄. k. f. b. Aegypten.

H. anisatus Nutt. (= *bicolor* Dsf. = *Foeniculum* Spgl.), *Lophanthus* L. (= *resupinatus* Mch.), *nepetoides* L., *scrophulariaefolius* W. (= *catariaefolius* H. Par.), v. Lophanthus anisatus, chinensis, nepetoides et scrophulariaefolius p. 477, — *cristatus* Lam., *nepetoides* Heyn. herb., v. Pogostemon paniculatus et plectranthoides, *ocymifolius* Lam. (= *bracteatus* Gmel.), v. Elsholtzia cristata, p. 285. *Hystrix patula* Mch., v. Gymnostichum Hystrix, p. 371.

Ibatia Decsne. (Ibati, arabischer Name), V. 11., Asclepiadeae.

maritima Decne. (= *Cynanchum maritimum* L. mant. = *Gonolobus maritimus* RBr., p. 365), Seestrand's, ♄. Sch. w. Neugranada.

Iberis Rupp., Dill., Schleifenblume.

amara L. (= *bicolor* Rchb. = *linifolia* Schk. = *parviflora* Hort.), b) lusitanica Hort.

ciliata All. (= *Molinieri* Balb.), gewimperte, ⊙. f. Oberitalien, Frankreich.

intermedia Guers. (= *divaricata* Tausch = *amara* Scop. = *umbellata* Flor. German., non L. = *Durandii*

Digitized by Google

Iberis

Lorey et Duret = *linifolia* Durand = *Loreyi* Gay.), mittlere, ⊙. f. Westl. Deutschland, Frankreich.

neglecta Tenore, übersehene, ⊙. f. Süditalien.

Tenoreana DC. (= *Tenorei* Presl = *cepaefol.* Tenore = *pilosa* Desv.).

Unbestimmt: verticillata Hort.

Icacorea bahamensis Lam., v. Heberdenia excelsa, p. 285. — *I. zeylanica* Lam., v. Ardisia humilis, p. 74 et p. 43, II.

Ichnanthus P. B., Sohlenfennich, III. II., Gramineae.

glaber H. Berol., kakler, 4. f. Nordamerika.

Icica Aubl. (Icica, guianischer Name).

Icicariba DC. (= *Amyris* ? *ambrosiaca* L. fil.), Icicariba-T., ħ. w. Brasilien.

Tacamahaca H. B. K. (= *Amyris ambrosiaca* W.), Tacamahaca-I., ħ. w. Südamerika.

Icotorus montanus Rafin., v. Spiraea monogyna, p. 778.

Idothea Kunth, (Tochter d. Proteus), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

ciliaris Kunth (= *Drimia ciliaris* Jacq., p. 275).

elata Kunth (= *Drimia elata* Jacq., p. 275).

humilis Kunth (= *Drimia Eckloniana* R. et S., p. 211, II. = *D. humilis* Berg.), niedrige, 4. Zw. t. k. Cap der guten Hoffnung.

purpurascens Kunth (= *Drimia purpurascens* Jacq. fil. p. 575 = *D. undulata* Hort.).

pusilla Kunth (= *Drimia pusilla* Jacq., 275).

villosa Kunth (= *Drimia villosa* Lindl., p. 275).

Zweifelhaftere Arten:

? drimioides Kunth (= *Anthericum pusillum* Jacq. = *Caesia pusilla* Spgl.).

? marginata Kunth (= *Anthericum marginatum* Thbg.).

? physodes Kunth (= *Anthericum physodes* Jacq. = *Albuca physodes* Ker, p. 27 = *Caesia physodes* Spgl.).

Ilex L., Stechhülse.

Aquifolium L., ♂) latifolium Hort. (= *macrophylla* Hort.), ♀) fructu luteo Hort. (= ? *chrysocarpa* Wender.).

arbutiformis Brotero, erdbeerbaumförmige, ħ. ħ. k. ?

castaneifolia van Houtte, kastanienblätterige, ħ. ħ. k. t. ?

crenata Thbg., gekerbte, ħ. ħ. k. Japan.

Doniana DC. (= *elliptica* D. Don, non H. B. K. = *nepalensis* D. Dietr.), Don's, ħ. ħ. k. Nepal.

latifolia Thbg., breitblätterige, ħ. ħ. k. Japan.

macrophylla Blume, grofsblätterige, ħ. ħ. k. Japan.

maderensis Lam. (= *crassifolia* Meerb. = *Perado* Auct.), madeiraische, ħ. ħ. k. Madeira.

mexicana v. Houtte, mexicanische, ħ. ħ. k. t. Mexico.

platyphylla Webb et Berthelot (= *I. Perado* Ait., Kew. ed. I.), canarische, ħ. ħ. k. Canarische Inseln.

pubescens Hook., Arn., weichhaarige, ħ. ħ. k. China.

recurva Lk. (= *Aquifolium γ serratum* DC. = *ciliata* Booth = *serrata* Hort., non Thbg.), zurückgekrümmte, ħ. ħ. k. ?

Schottii Endl. (= ? *australis* H. belg.), Schott's, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

serrata Thbg., sägezähnige, ħ. ħ. k. t. Japan.

Watsoniana Spach (= *angustifolia* Wats., non W.), Watson's, ħ. ħ. k. f. b. Nordamerika.

crocea Thbg., v. Elaeodendrum croceum Nachlese,

Digitized by Google

Ilex

Dodonaea L., v. Comocladia ilicifolia, p. 214, *prionitis* W. Enum. suppl., v. Prinos deciduus, p. 657. *Illecebrum Achyrantha* W. (= *sinense* Hort. = *ramosum* Hort.), *canescens* Spgl. (= *Humboldtianum* R. et S.), *diffusum* W., *ficoides* W., *frutescens* L'Her. (= *alsinefolium* Scop. non L. = *limense* Jacq.), *gomphrenoides* W., *polygonoides* Mill., *sericeum* Spgl., *sessile* Pall., *spinosum* Spgl. (= *axillare* Hort.), *tenellum* Hort., v. Alternanthera Achyrantha etc., p. 40 et p. 28, II., *javanicum* L., *lanatum* L., *Monsoniae* L. fil., v. Aerva javanica etc., p. 21 et p. 11, II., *sanguinolentum* L., v. Achyranthes sanguinolenta, p. 6, II.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen Paronychia, Philoxerus, Polycarpaea, Telejanthera (et Mogiphanes).

Illicium L., Anisbaum.

parviflorum Mchx. (= *anisatum* Bartr.).

religiosum Sieb. et Zuccar. (= *anisatum* L. spec., Duham. non Lour.), verehrter, ħ. k. Japan, China [1]).

Imbricaria Commers., Juss., Lam., Imbricarie, VI. (V.) 1., Sapotaceae.

coriacea A. DC. (= *Mimusops Imbricaria* Wall., non W. = *Mimusops hexandra* Bouton et Boyer, non Roxb. = *M. Elengi* Sieb., non L.), lederartige, ħ. w. Madagascar, Mauritius.

Imbricaria crispa Herb., *filifolia* Herb., *gemmata* Herb., v. Strumaria crispa etc., p. 790. — *I. marginata* Herb., v. Brunsvigia marginata, p. 134.

Impatiens Riv., L., Springsaame (Wolfskraut).

candida Lindl., candirtweifser, ⊙. f. Ostindien.

glandulifera Arn. (non Roxb.), drüsiger, ⊙. m. f. Zeylon.

labiata Lindl. (= ? *Balsamina labiata* Lk., Kl., Otto, p. 58, II.), lippenförmiger, ⊙. m. f. Ostindien.

longicornu Wall., langsporniger, ⊙. f. Ostindien.

macrocheila Lindl., grofslippiger, ⊙. m. f. Ostindien.

picta Knowl. et Westc., bemalter, ⊙. m. f. Ostindien.

rosea Lindl., rosafarbiger, ⊙. m. f. Ostindien.

Roylei Walp. (= *glandulifera* Royle, nec Arn.), Royle's, ⊙. m. f. Ostindien.

scabrida Wall., schärflicher, ⊙. f. Nepal.

tricornis Lindl., dreihörniger, ⊙ f. Nordindien.

triflora L., v. Hydrocera triflora, p. 308, II.

Hinsichtl. d. übrigen s. Balsamina, p. 110 et p. 58, II.

Imperata ovata Tratt., v. Lagurus ovatus, p. 443.

Imperatoria T., Meisterwurz.

caucasica Spgl. (= *Oreoselinum caucasicum* MB. = *Selinum caucasicum* MB., p. 740), caucasische, 4. f. Caucasus.

glauca Bartl., v. Peucedanum Schottii, p. 610, *Razoulii* Hort. v. Angelica Razoulii, p. 60.

Imperialis Andans., comosa Mch. (= *coronata* Dum. Cours. = *superba* Mirb.), v. Fritillaria, Sect. II. Imperialis, p. 339.

---

1) „Illicii religiosi, arboris vigintiquinquepedalis ante hominum memoriam in Japoniam introductae rami floridi ornandis indolorum altaribus et decorandis bustis inserviunt. Corticis liber modice adstringens, aromaticus, capsulae saporis vapidi. Illicium anisatum Lour. mater Anisi stellati, stirps botanicis ignota." Endlicher Catalogus horti acad. Vindob. II. p. 204.

Digitized by Google

Impia germanica Bluff et Fing. (= *pyramidata* Bluff et Fingerh.), v. Filago germanica, p. 334.
Incarvillea arguta Royle, *Emodii* Wall., v. Amphicome arguta, p. 49 et Emodii, p. 33, II., *grandiflora* Hort., v. Aeschynanthus grandiflorus, p. 868 et p. II, II., *tomentosa* Spgl., v. Pawlownia imperialis.

Indigofera L., Indigo.
amoena Ait. (= *stipularis* Lk.).
Anil L. (= *suffruticosa* Mill.).
Bertolonii Steud. (= *lateritia* Bertol., non W.), Bertolone's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
coerulea Roxb. (= *brachycarpa* Grah. = *Guatimala* Lunan. = *retusa* Grah. = *tinctoria β brachycarpa* DC.), blauer, ♄. w. Ostindien.
coriacea Ait. (= *mauritanica* Thbg.).
decora Lindl., gezierter, ♄. ♄. t. China.
dendroides Jacq., baumartiger, ☉. ♂. w. Guinea.
Dojua Hamilt. (= *Dosua* Bot. reg.), Dojua-I., 4. ♄. t. Nepal.
gracilis Spgl. schlanker, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
juncea DC. (= *spoliata* Hffg. = *Lebeckia contaminata* Ait., non L. = *Spartium contaminatum* Ait., non L.).
Lindleyana Spgl. (= *angulata* RBr., Lindl., non Rottl. *speciosa* Hortul. = *sylvatica* Sieb.), Lindley's, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
macrostachya Vent., grofsähriger, ♄. t. China.
madagascariensis Schrk., Colla (= *? Anil γ orthocarpa* DC.), madagascarischer, ♄. ♄. w. Madagascar.
miniata Ort. (= *coccinea* Hort.), mennigrother, ☉. w. Cuba.
nivea W. (= *argyraea* Eckl., Zeyh. = *argyroides* E. Mey.), schneeweifser ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
paucifolia Delille (= *colorata* et *heterophylla* Roxb. = *macrophylla* Schum. = *Bremontiera ammoxylon β Burmanni* DC.), wenigblätteriger, ♄. ♄. t. Aegypten.
pentaphylla L. (= *? glabra* L. = *fragrans* Retz = *heterophylla* Roxb.), fünfblätteriger, ♂. ♄. w. Ostindien.
pulchra W., schöner, ♄. w. Guinea.
purpurascens Roxb. (= *pulchella* Roxb. = *cassioides* Rottl. = *glaucescens* Grah. = *verrucosa* Grah., non Eckl., Zeyh.), purpurfarbiger, ♄. w. Ostindien.
Roxburghii Tausch (= *linifolia* Roxb., non Retz), Roxburgh's, ♄. w. Ostindien.
sessilifolia DC. (= *falcata* E. Mey. = *patens* Eckl., Zeyh. = *Lotus australis* Andrz.), stiellosblätteriger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
setulosa Bertol., feinborstiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
stachyoides Lindl., ziestähnlicher, 4. ♄. t. Nordöstl. Indien.
trifoliata L. (= *adenophylla* Grah. = *canescens* Grah., Spgl., non Lam. = *congesta* Grah. = *multicaulis* DC. = *orixensis* Roxb. = *prostrata* W.).
trita L. fil. (= *arcuata* W. = *armata* Wall. = *canescens* Lam. = *cinerea* W. = *hedysaroides* Lam. = *ternata* Roxb.).
nuda G. Don, v. Lebeckia nuda, *stricta* Thbg., v. Tephrosia stricta, p. 800.

Inga Marcgr., W. (Südamerikanischer Name).
albicans Walp., weifsliche, ♄. w. Brasilien.
cyclocarpa W. (= *Mimosa cyclocarpa* Jacq.), kreishülsige, ♄. w. Caracas.

Digitized by Google

Inga

forficata Hffg. (= *Bauhinia divaricata* Hort., non L.), scheerenförmige, ħ. w. Brasilien.

fulgens H. B. K., funkelnde, ħ. w. Neugranada.

grandiflora Wall., grofsblumige, ħ. w. Ostindien.

Harrisii Lindl., Harris's, ħ. Sch. w, Mexico.

ligustrina W. (= *Mimosa ligustrina* Jacq.), ligusterähnliche, ħ. w. Caracas.

mertensioides N. E., Mart. (= *Acacia mertensioides* N. E.), Mertensiaähnliche, ħ. w. Brasilien.

nobilis Hffg. (= ?*Humboldtiana* Kunth), edle, ħ. w. Brasilien.

pulcherrima Cervant., schönste, ħ. w. Mexico.

Saman W. (= ?*salutaris* H. B. K. = *Mimosa Saman* Jacq.), Saman-I., ħ. w. Carucas.

umbrosa Wall., Schattenliebende, ħ. w. Ostindien.

Unbestimmtere: Acus Hflg., coccinea minor Hort. = ?Mimosa kermesina, *lignosa* Grah. (= *dolabriformis* Grah.), v. Xylia dolabriformis.

Ingenhousia ericaefolia E. Mey., v. Amphithalea ericaefolia, p. 33.

Inula L. G., Alant.

bifrons L. (= *glabra* Bess. = *glomeriflora* Lam. = *Conyza alata* Baumg.).

Britanica L.[1]) (= *britannica* Auct. = *hirsuta* Vitm. = *Aster britannicus* All.).

campestris Bess. (= *helenioides* DC. = *Oculus Christi* MB., non L.).

candida Cassin. (= *Conyza candida* L., p. 216 = *C. verbascifolia* W., non Poir.), *β*) limonifolia DC. (= *Conyza candida* W. = *C. limonifolia* Sibth., Sm.).

caspica Bunge, Ledeb., *β*) Bongardi Hort.

Conyza DC. (= *squarrosa* Bernh., non L. = *Conyza squarrosa* L., p. 217).

crithmoides L. (= *crithmifolia* Wither. = *Senecio crithmifolia* Scopol. = *Limbardia tricuspis* Cass.), ? *β*) canariensis Mill.

ensifolia L., *β*) angustifolia Wender.

grandiflora W. (= *alpina* Adam = *glandulosa β* Sims).

grandis Schrenk (= *macrophylla* Karel. et Kiril.), grofsblätteriger, 4. f. Asiat. Rufsland.

graveolens Dsf. (= *Conyza graveolens* Auct. = *Erigeron graveolens* L., p. 308 = *Solidago graveolens* Lam.).

hetrusca Moretti, hetrurischer, 4. f. Mittelitalien.

linifolia Wender., gleichbreitblätteriger, 4. f. ?

orientalis W. (= *germanica* MB., non L. = *micranthos* Poir.), morgenländischer, 4. f. Caucasus.

salicina L., *β*) latifolia Endl., DC. (= *aspera* Poir. = *spathulata* H. Par. = *Aster spathulatus* H. Cels.), *γ*) ?lancifolia Wender., *δ*) caucasica Endl.

rhizocephala Schrenk, kopfwurzeliger, 4. f. Asiat. Rufsl.

spiraeifolia L. (= *Bubonium* Jacq., Murray), spierstaudenblätteriger, 4. f. Persien, Podolien, Taurien, Siebenbürgen, Krain, Piemont.

β) hybrida Baumg.

stricta Tausch (= *Bubonium* Hort.), steifer, 4. f. ?

---

1) „E Britannia exul. nec „britannica" sed „Britanica" (*Βριτανικη* Diosc. IV. 2.) dicenda." Endlicher Catalogus hort. academ. Vindobonensis I. p. 332.

Digitized by Google

Inula
thapsoides DC., α) Sprengelii DC. (= *I. thapsoides* Spgl.), β) Poiretii DC. (= *I. thapsoides* Rchb. = *verbascifolia* Poir.), γ) Biebersteinii DC. (= *Conyza thapsoides* MB.).
viscosa Dsf., Ait. (= *Conyza viscosa* Hort. = *Erigeron viscosum* L. = *Solidago viscosa* Lam.), schmieriger, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.
conyzoides Dsf., v. Jasonia tuberosa, p. 430, *calycina* Spgl., v. Pulicaria calycina, *foetida* L., v. Nidorella foetida, *gossypina* Mchx., *graminifolia* Mchx., *Mariana* L., *villosa* Spgl., v. Chrysopsis gossypina etc., p. 195 et 142 II., *saturejoides* Mill. (= *Satureja* Spgl.), v. Lorentea saturejoides Mill.
Ipecachuanha officinalis et *pretа* Arruda, v. Cephaelis Ipecachuanha, p. 132, II.

Iphigenia Kunth (Tochter der Agamemnon), VI. III., Melanthaceae.
indica Kunth (= *Anguillaria indica* RBr., p. 869 = *Melanthium indicum* L. mant.), indische, 4. w. t. Nepal, Ostindien, tropisches Neuholland.

Ipomoea L., Choisy, Trichterwinde.
Aitoni Lindl., Aiton's, ⊙. 4. Sch. f. w. Cap d. g. H.
arborescens G. Don (= *Convolvulus arborescens* W., H. B. K., p. 215).
atropurpurea Choisy (= *sphaerocephala* D. Don, non Swt., *Convolvulus atropurpureus* Wall. = *Batatas Choisyana* Wight), schwarzpurpurfarbige, ?4. Sch. w. Nepal.
batatoides Choisy (non Benth.), batatenähnliche, 4. Sch. w. Brasilien.
β) angulata.
commutata R. et S. (= *I. carolina* Pursh, non L. = *trichocarpa* Ell. = *Convolvulus hederaceus* Mill. = *C. trichocarpus* Spgl.).
coptica Roth (= *Brunetti* Perot. = *dissecta* Heyne = *verrucosa* Ortega = *Convolvul. copticus* L. = *C. dissectus* Herb. Madr. = ? *C. stipulatus* Desr.), coptische, ⊙. Sch. f. Aegypten, Ostindien.
cymosa R. et S. (non Mey., nec Lindl.), (= *I. bifida* Roth = *blanda* Swt. = *Heynei* R. et S. = *C. cymosus* Desr., non R. et P. = *C. bifidus* β Vahl = *C. blandus* Roxb.), afterdoldige, 4. ♄. Sch. w. Ostindien.
β) pilosa Chois. (= *Convolv. bifidus* Vahl = *C. Rothii* Spgl. = *C. pentagonus* Roxb. = *I. bifida* R. et S.), γ) sagittata Choisy (= ? *radicans* Blume), δ) culta Choisy, Wall.
fastigiata Swt. (= *cymosa* Meyer = *platanifolia* R. et S. = *Convolv. essequebensis* Spgl. = *C. fastigiatus* Roxb. = *C. platanifolius* Vahl = *C. roseus* Mill.), gipfelständige 4. Sch. w. Westindien, Südamerika, Bengalen.
ficifolia Lindl. (= ? *I. bonariensis* Hook. = *Convolv. Hookerianus* Dietr.), feigenbaumblätterige, 4. Sch. Kn. w. ? Buenos Ayres.
filicaulis Blum. (= *angustifolia* Jacq., non Choisy = *denticulata* RBr., non Choisy = *Blumii* Steud. = *bidentata* Don = *Convolv. filicaulis* Vahl = *C. hastatus* Desr., non Sieb. nec Thbg. = *C. simplex* P., non Spgl. = *C. medium* Lour., Ait., Wall., non L. =

Digitized by Google

Ipomoea

C. filiformis Thbg. = *C. denticulatus* Thbg. = *C. angustifolius* Desr. = ? *C. japonicus* Thbg.), fadenstengelige, ⊙. m. f. Asien, Australien, Afrika, Südamerika.

fimbriosepala Choisy, franzenkelchige, ♃. Sch. w. Madagascar.

gemella Roth (= *Convolvulus gemellus* Burm.), gepaarte, ⊙. Sch. w. Ostindien.

hastaefolia Bernh., spontonblätterige, ♃. ♄. Sch. w. Havana.

havanensis Choisy (= *Convulv. havanensis* Jacq.), havanensische, ⊙. Sch. w. Havana.

heterophylla RBr., non Ortega (= *polymorpha* R. et S. = *Convolvulus Brownii* Spgl. = *C. Robertianus* Spgl.), verschiedenblätterige, ⊙. f. m. Tropisches Neuholland.

macrorrhizos R. et S. (= *Convolv. macrorrhizus* L. = *C. coccineus* Burm. = *Batatas macrorrhizos* G. Don).

monosperma Spgl. mss. (= *Eustachyana* H. Turin.), einsamige, ♃. ♄. Sch. w. St. Martha.

muracoides R. et S. (= *macrantha* G. Don = *Convolvulus macranthus* H. B. K.), muracujaähnliche, ♄. w. Mexico.

nyctaginea Choisy, wunderblumenähnliche, ♃. Sch. w. Brasilien.

β) cordifolia Mart.

obscura Bot. reg. (= *solanifolia* Burm. = *insuavis* Blume = *ocularis* Bartl. = *ochroleuca* Spanh. = *Convolvulus obscurus* L. = *C. gemellus* Vahl = *C. insuavis* Dietr. = *C. gonatodes* Steud.), dunkle, ⊙. Sch. w. m. Ostindien, Abyssinien.

ochracea G. Don (= *Convolvulus ochraceus* Bot. reg. = *C. trichocalyx* Schum.), ocherfarbige, ⊙. Sch. w. Guinea.

pandurata Mey. Esseq. (= *Convolv. panduratus* L. = *C. megalorhizos* etc. Dill.).

β) candicans Sweet.

peltata Choisy (= *nymphaeifolia* Blume = *Convolvulus peltatus* L. = *Spiranthera peltata* Bojer), schildblätterige, ♄. Sch. w. Amboina, Java, Societätsinseln, Mascarenas.

pendula RBr. (= *Horsfalliae* Hook. bot. mag. = *Convolvulus mucronatus* Forst. = *C. pendulus* Spgl.).

pulchella Roth (= ? *capillata* Spanh. = ? *Batatas pulchella* Bojer = *Convolvul. bellus* Spgl. = *C. heptaphyllus* Rottl. = ? *C. vittatus* Zp.), schöne, ♃. Sch. Ostindien.

quinqueloba Dsf. (= *cairica* Swt. = *palmata* Forsk. = *senegalensis* Lam. = *Batatas senegalensis* G. Don = *Convolvulus cairicus* L. = *C. quinquelobus* Vahl), fünflappige, ♃. Kn. Sch. w. Guinea, Nubien, Aegypten, Syrien, St. Croix.

reniformis Choisy (= *Convolvulus excisus* Zp. = *C. gangeticus* L. = *C. reniformis* Roxb. = *Evolvulus emarginatus* Burm. = *E. gangeticus* L.), nierenförmige, ♄. w. Ostindien.

reptans Poir. (= *aquatica* Forsk. = *repens* Roth = *Convolv. reptans* L. = *C. repens* W. = *C. Adansonii* Desr.).

rugosa Choisy (= *I. Beladamboe* R. et S. = *I. repens* Lam., non Roth = *Convolvulus rugosus* Rottl. =

Digitized by Google

Ipomoea

C. flagelliformis Roxb. = *C. Beladamba* Spgl.), runzelige, 4. w. Ostindien, Molucken.

sagittata Dsf., Cav., Poir. (= *sagittifolia* Ker bot. reg. = *Convolv. sagittifolius* Mchx. = *C. speciosus* Walt. = *C. formosus* Gmel. = *C. Wheleri* Vahl.), pfeilförmige, 4. Sch. f. b. k. Sicilien, Spanien, Nordafrika, Nordamerika.

Schiedeana Ham., non Zuccar. (= *Convolv. Schiedeanus* Dietr.), Schiede's, 4. ♄. Sch. w. Mexico.

scrobiculata G. Don (= *Convolv. scrobiculatus* Bot. reg.), raspelartige, ⊙. Sch. m. f. Südamerika.

sepiaria Koen. in Roxb. et Wall. fl. ind. (= ? *striata* Roth = *Convolv. maximus* Vahl = *C. marginatus* Desr. = *C. striatus* Vahl), β) sagittata Choisy (= *sphaerica* H. b. Calcutt.).

sessiliflora Roth (= ? *conferta* Don = *hispida* R. et S. = *ligulata* Boj. = *sphaerocephala* Sw., non Don = *trematosperma* Hochst. = *Convolv. hispidus* Vahl = *C. sessiliflorus* Spgl. = *C. sphaerocephalus* Roxb. et Wall. = *C. tamnifolius* Klein, non Mey.), stiellosblumige, ⊙. Sch. w. m. Ostindien.

sidaefolia Choisy, non Schrad. (= *corymbosa* Roth = *cymosa* Lindl., non R. et S. (= *Convolv. laevicaulis* et *proliferus* W. = *C. multiflorus* H. B. K. = *C. sidaefolius* H. B. K.), sammetmalvenblätterige, ♄. Sch. w. Westindien, Südamerika, Ostindien.

simplex Bot. mag., einfache, 4. Sch. Kn. Südafrika.

sinensis Choisy (et Cat. h. Gorenk?), (= *Convolvulus sinensis* Desr. = *C. Ser* Spgl.), chinesische, ⊙. Sch. f. China.

sinuata Orteg. (= *dissecta* Pursh, non W. = *nigricans* Gardn. = *Convolvulus dissectus* L. mant. Jacq. H. vindob.).

superba G. Don (= *Convolv. superbus* H. B. K.), stolze, 4. Sch. w. Neuspanien.

tiliacea Choisy (= *Convolv. tiliaceus* W. Enum.), lindenähnliche, 4. Sch. w. Brasilien.

tricolor Cav. (= *Convolv. venustus* Spgl.), dreifarbige, ⊙. Sch. f. ? Südamerika.

trifida G. Don (= *Convolv. trifidus* H. B. K. = *C. hepaticaefolius* W., non Spgl.), dreispaltige, 4. Sch. w. Südamerika.

triloba L. (= *parviflora* Vahl, non P. = ? *clausa* Red. = *Convolv. trilobus* Desr. = *C. Sloanei* Spgl. = *C. Ipomoea* Velloz.? = *Quamoclit triloba* Don).

triquetra R. et S. (= *Hamiltonii* G. Don = *Convolv. triqueter* Vahl).

tuberculata R. et S. (= *frutescens* H. Par. = *stipulacea* Jacq. = *tuberculosa* Dsf. = *tuberosa* Lour., non L. = *Batatas Loureirii* G. Don = *Convolvulus digitatus* Roxb. = *C. tuberculatus* Desr.), Ostindien, Polynesien, mittägl. Amerika, ? China.

tuberosa L. (= *Batatas tuberosa* Boj. = *Convolv. tuberosus* Spgl. = *C. kentrocaulos* Steud. = *C. paniculatus* Blanco, non RBr.). Mittägl. Amerika, Westindien, Abyssinien, Mascarenas, Ostindien.

β) uniflora Choisy (= *Convolvulus gossypifolius* H. B. K. = *C. macrocarpus* Spgl.).

Tweediei Hook., Tweedie's, ♄. Sch. w. Parana.

Digitized by Google

Ipomoea

tyrianthina Lindl. (= *Convolvulus densiflorus* Hook. = *Pharbitis tyrianthina* Hook.).

umbellata Mey. Esseq. (= *polyanthes* R. et S. = *sagittifera* Don = *Convolv. umbellatus* L. = *C. flavus* Ssl., non W. = *C. sagittifer* H. B. K. = *C. caracasanus* W. = *C. ? aristolochiaefolius* Mill., non H. B. K. = *C. Millerianus* R. et S.), doldige, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.

venosa R. et S. (= *Batatas venosa* Boj. = *Convolv. venosus* Vahl).

ventricosa Chois. (= *Convolv. ventricosus* Bert. in Colla h. Ripul.), bauchige, ♄. Sch. w. Westindien.

verrucipes Chois., C. A. Mey. (= *Convolv. verrucipes* Tenore), warzigstielige, ☉. Sch. f. ?

verruculosa Mart., wenigwarzige, ?☉. Sch. f. Mexico.

verticillata Forsk., Vahl (= *Convolv. Forskohlei* Spgl.), wirtelförmige, 4. k. t. Arabien.

vespertina Colla, Abend-T., ?☉. Sch. f. ?

Nicht hinlängl. bekannte Arten (nach Choisy):

bahiensis W. Brasil., compressa Guss. Indien, Ledebourii Choisy (= *Calystegia rugosa* Ledeb.), ♄. w. Brasilien. ?Mestitlanica Chois. (= *batatoides* Benth., non Chois.), 4. Sch. w. Mexico.

Nur dem Namen nach bekannte Arten:

cordifolia Tenore, hispidula H. Dorpat., katgurhiensis Hffg. ☉. Ostind., lilacina Schrk. (= *Schrankii* Steud.), Newmannii Lodd. Catal. 1826, Martiusiana Steud. (= *hirsuta* Schrk.) Brasil., rosea Hort., Sellowii Penny, soldanellaefolia Schrk. Brasil., superba H. Dorpat., Schlechtendalii Visian. (= *lilacina* Kunze = *Pharbitis lilacina* Schltdl.), Mexico.

Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch erwähnt: I. bryoniaefolia, Broadleaziana, Hardingii, Haylockia, hybrida (Lee's), mexicana, physianthifolia, Rollissonii, smilacifolia etc.

acetosaefolia Vahl, R. et S. (= *longifolia* Benth.), *Batatas* Poir., *insignis* Ait. Ker etc., v. Batatas acetosaefolia etc., p. 61, II., *Bona nox* L., *grandiflora* Lam., *longiflora* RBr., W, *latiflora* Bot. reg., *muricata* Jacq. (= *? Krusensternii* Ledeb.) etc., v. Calonyction speciosum etc., p. 109, II., *I. capitata* R. et S., *speciosa* P., *splendens* Bot. mag., v. Argyreia capitata etc., p. 44, II., *crassipes* Hook. etc., v. Aniseja calisteg. etc., p. 37, II., *filiformis* Jacq. etc., v. Exogonium filiforme etc., p. 241, II., *Quamoclit* L., *coccinea* L. etc., v. Quamoclit vulgare, coccineum etc., *purpurea* Lam., *Learii* Paxt., *violacea* L. etc., v. Pharbitis hispida etc., *Schultesii* Weinm. (= *bicolor* Sw., non Lam. = *Weinmanni* R. et S.) etc., v. Shuteria bicolor, *spectabilis* Boj. et *semidigyna* Swt., v. Breweria spectabilis et Roxburghii, p. 78, II., *tiliaefolia* R. et S. (= *benghalensis* Roth = *gangetica* Swt.) etc., v. Rivea tiliaefolia etc.

Hinsichtl. der übrigen s. Convolvulus, p. 157—158, II.

Ipomopsis Mchx., Benth. (= *Ipomeria* Nutt. = *elegans* Mchx. = *picta* Hort.), v. Gilia, Sect. IV., p. 262, II.

Digitized by Google

Iresine L. W., Straufsfeder.
? herbacea Dsf., krautartige, 4. w. ?
nervosa H. Vindob., nervige, ? ⊙. m. w. ? Südamerika.
polymorpha Mart. (= *verticillata* Spgl.), vielgestaltige, 4. w. Brasilien.

Iris T., Schwertel.
acutifolia C. A. Mey., spitzblätteriger, 4. Kn. f. Caucasus.
alata Lam. (= *scorpioides* Dsf. = *verna* H. Panorm. = *Juno scorpioides* Tratt. = *Thelysia grandiflora* Salisb. = *Xiphium planifolium* Mill.).
autumnalis Tausch, Herbst-S., 4. Kn. f. ?
biflora L. (= *Fieberi* Seidel = *bohemica* Wimm.).
carolina Radius, carolinischer, 4. Kn. f. b. Carolina.
cuprea Pursh (= *fusca* Hort.).
fragrans Lindl. (non Salisb.), wohlriechender, 4. Kn. k. Nordindien.
germanica L., b) alba Savi (= *florentina* Auct., non L.), c) diluta, d) saturata (= *violacea* Savi).
Güldenstaedtiana Lepech., MB. (= *desertorum* Güldenst.). *α*) livescens MB. (= *spuria* MB.), *β*) ochroleuca MB. (= *spuria halophila* Bot. mag.).
humilis MB. (= *alpina* Pall. herb. = *ruthenica* Ait. var. Ker.).
hungarica W. K. (= *biflora* Rchb. = *bisflorens* Host.).
imbricata Lindl., ziegeldachförmiger, 4. Kn. f. ?
japonica Thbg., *β*) repanda v. Berg. (hybrida).
laciniata H. Hamb., geschlitzter, 4. Kn. f. ?
longispatha Fisch., langscheidiger, 4. Kn. f. Rufsland.
maritima Mill., Meerstrands-S., 4. Kn. f. Südeuropa.
missouriensis Martens, missourischer, 4. Kn. f. Nordamerika.
mongolica Fisch., mongolischer, 4. Kn. f. Mongolei.
notha MB., *β*) pallida Endl.
nertschinskia Fisch., nertschinskischer, 4. Kn. f. Sibirien.
nudicaulis Lam. (= *aphylla* Vahl = *biflora* Lk., MB., non L. = *bohemica* Schm. = *furcata* MB. = *extrafoliacea* Mikan).
orientalis Thbg. (= *sibirica* Thbg.), morgenländischer, 4. Kn. k. f. b. Japan.
oxypetala Bunge, spitzkroniger, 4. Kn. f. b. Nordchina.
pallida Lam. (= *glauca* Salisb. = *pallide-coerulea* P.). *β*) fulgida v. Berg.
pumila L., e) gracilis v. Berg, f) purpurascens v. Berg, g) pseudo-pulcherrima v. Berg, h) Clusiana Tausch.
ruthenica Ker, Ait. (= *verna* Hortul.).
soongarica Schrenk, soongarischer, 4. Kn. f. Soongaria.
spuria L. (= *halophila* Curt. = *maritima* Lam.).
squalens L., *β*) saturata Endl., *γ*) superba v. Berg, *δ*) tardiflora v. Berg (hybrida).
Susiana L., *β*) livida Tratt.
tenuifolia Pall. (= *Xiphium tenuifolium* Schrk.), dünnblätteriger, 4. Kn. f. Dahurien, Soongaria.
venusta H. Angl., lieblicher, 4. Kn. f. ?
versicolor L., *β*) saturata Endl.

Unbestimmtere: brachycarpa Lodd., caesia Berg, canadensis Fisch., constantinopolitana H. Cremo., hybrida Retz, longiflora Vest, R. et S., Matthioli Tausch, minima Vest, nigra Hort., picta Mill., praecox H. anglor., torta Tausch.

Digitized by Google

Isachne RBr., Gleichspelze.
australis RBr. (= *Panicum antipodum* Spgl. = *P. violaceum* Klein).
dubia Kunth (= *paniceo* Trin. = *Panicum dispermum* Lam. = *arundinaceum* Sw., p. 583), zweifelhafte, 4. w. Westindien.
muricata N. E. (= *Panicum muricatum* Retz, p. 584).
rigens Trin. (= *Panicum rigens* Sw. = ?*P. divaricatum* L.), starre, ⊙. 4. w. Westindien, Südamerika.

Isatis T., Waid.
aleppica Scopol. (= *aegyptiaca* L.).
brachycarpa C. A. Mey., kurzfrüchtiger, ♂. f. Caucasus.
campestris Stev., Feld-W., ♂. f. Südpodolien.
canescens DC., graulicher, ♂. f. Südl. Frankreich.
cappadocica Desv. (= *latisiliqua* Stev. = *armena* MB., non L.), cappadocischer, ♂. f. Cappadocien.
iberica Stev. (= canescens β DC.), iberischer, ♂. f. Iberien.
intermedia Turcz., C. A. Mey., mittlerer, ♂. f. Asiat. Rufsland.
laevigata Trautv., glatter, ♂. f. Sibirien.
microcarpa Gay, kleinfrüchtiger, ♂. k. f. Arabien.
minima Bunge, kleinster, ⊙. ♂. f. Mittelasien.
platycarpa Bunge, breitfrüchtiger, ⊙. ♂. f. Mittelasien.
taurica Stev. (= *tinctoria* L. var., Spgl., Spach), taurischer, ♂. f. Taurien.
tinctoria L., β) microcarpa DC. (= *dalmatica* Mill.), γ) praecox Kit., δ) heterocarpa Andrz., ε) bannatica Ker.
Villarsii Gaud. (= *alpina* Vill. = *bannatica* Rchb. = *dalmatica* Hort.), Villars's, ♂. f. Südeuropa.
Isika alpigena Borckh. (= *lucida* Mch.), *coerulea* Borckh., v. Lonicera alpigena, coerulea, p. 475.
Ismelia madeirensis Don, *nodosa* Don, *versicolor* Cass., v. Chrysanthemum pinnatifidum, nodosum, carinatum, p. 193 et p. 141, II. etc.

Ismene Salisb., Herb. (Ismene, Tochter des Oedip und der Jocaste).
pedunculata Herb., gestielte, 4. Zw. w. t. Peru.
virescens Lindl., grünliche, 4. Zw. w. Peru.

Isnardia L., Isnardie.
alternifolia DC. (= *Ludwigia alternifolia* L., p. 479 = *L. macrocarpa* Mchx. = *microcarpa* Lk. = *L. ramosissima* Walt. = *Rhexia linearifolia* Poir.), wechselblätterige, 4. f. Virgin. Carolina.
β) salicifolia DC. (= *Ludwigia salicifolia* Poir.).
hirsuta R. et S. (= *Ludwigia hirsuta* Lam., Pursh = *pilosa* W., p. 479).

Isocarpha RBr., Gleichbodler.
atriplicifolia RBr. (= *alternifolia* Cassin. = *Bidens atriplicifolia* L. = *Calydermos atriplicifolius* Spgl. = *Spilanthes atriplicifolia* L.), meldenblätteriger, ⊙. ♂. f. w. Südamerika.
oppositifolia RBr., p. 425 (= *tricephala* Cassin. = *Calea oppositifolia* L. = *Calydermos jamaicensis* Spgl. = *Santolina oppositifolia* L.).

Isochilus RBr., Gleichstendel.
dubius van Houtte, zweifelhafter, 4. w. ?Südamerika.
fusiformis Lindl., spindelförmiger, 4. w. Trinidad.
lividus Lindl., schlagblauer, 4. w. Mexico.

Digitized by Google

Isodon plectranthoides Schrad., v. Plectranthus rugosus.

Isoëtes L., Brachsenkraut.

setacea Bosc, borstenförmiges, 4. Wa. f. k. Südfrankreich.

Isolepis RBr., Zartfiet.

I. Genuina.

articulata N. E. (= *fistulosa* Delil. = *Scirpus articulatus* L. = *S. fistulosus* Forsk.), gegliedertes, 4. w. Ostindien, Aegypten.

Bergiana Schult. (= *plebeja* Schrad. = *chrysocarpa* N. E. = *Scirpus Bergianus* Spgl. = *S. minimus* Sieb. herb. cap. = *S. setaceus* Thbg.), Bergius's, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.

bicolor Carmich. (= *Scirpus bicolor* Spgl.), zweifarbiges, ⊙. 4. f. k. Insel Tristan d'Acunha.

capillaris R. et S. (= *brachyphylla* Lk., Schult. = *I. Mühlenbergii* A. Dietr. = *trichodes* var. *minima* Schrad. = *Cyperus minimus* L. = *Scirpus brevifolius* Bernh. = *S. capillaris* L. = *S. ciliatifolius* Darlingt., non Ell. = *S. minimus* Vahl = *S. Mühlbergii* Spgl.), haarförmiges, ⊙. f. Nordamerika.

Ehrenbergii Otto, Ehrenberg's, 4. k. Aegypten.

glaucescens Schrad., blaugrünes, ⊙. w. Brasilien.

Hystrix Kunth (= *Scirpus Hystrix* Thbg.). stacheliges, ⊙. 4. f. k. Cap d. g. Hoffn.

junciformis H. B. K. (= *Scirpus Humboldtii* Spgl. = *S. juncoides* W. herb.), simsenförmiges, ⊙. w. Südamerika.

prolifera RBr. (= *Cyperus prolifer* H. Berol., non Thbg. = *C. punctatus* Lam. = *Scirpus prolifer* Rottb.).

pygmaea Kunth (= *acicularis* Salzm. = *brevis* Brongn. = *brachyphylla* Presl = *brevifolia* Presl = *leptalea* Schult. mant. = *Meyeniana* N. E. = *pumila* H. Berol. = *Saviana* Hort. Berol. = *Fimbristylis pygmaea* Vahl = *Scirpus brevis* Urv. = *S. leptaleus* Koch), zwergiges, ⊙. f. Mittel- u. Südeuropa, Südamerika.

tenerrima Fisch. et Mey. (= *pygmaea* var. Kunth), feinstes, ⊙. f. Südl. Rufsland.

venustula Kunth (= *bicolor* N. E.), liebliches, ⊙. f. m. Cap d. g. Hoffn.

II. Holoschoenus Lk.

atrovirens Lk. (= *Scirpus atrovirens* W. = *S.? polyphyllus* Vahl).

brunneus Steud. (= *Scirpus brunneus* Muhlbg. = *S. exaltatus* Pursh = *S. polyphyllus* Vahl), braunes, 4. f. Nordamerika.

Holoschoenus RBr. et var., p. 425.

nodosus RBr., A. Dietr. (= *I. gracilis* Sweet, non N. E. = *Scirpus globosus* Spgl. = *S. gracilis* Rudge = *S. nodosus* Rottb.), knotiges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn., Neuholland.

Thunbergianus Schrad., A. Dietr. (= *Cyperus marginatus* Thbg. = *C. prolifer* Thbg. = *Scirpus Holoschoenus* Thbg.), Thunberg's, 4. k. t. Cap d. g. H.

antarctica R. et S. (= *diabolica* Schrad.), *marginata* A. Dietr. *scariosa* N. E., v. Ficinia antarctica, filiformis, scariosa, p. 243, II., *hamulosa* Kunth, v. Dichostylis hamulosa Nachl.

Digitized by Google

Isolobus A. DC. (= *Pratia* G. Don), campanuloides A. DC., concolor A. DC., corymbosus A. DC., Kerii A. DC., Roxburghianus A. DC., v. Lobelia, Sect. IV. p. 471.

Isomeris Nutt., Gleichkapper, VI. 1., Capparideae.
arborea Nutt., baumartige, ħ. ħ. k. Californien.
Isonema ovata Cass., v. Scheuchleria patula, p. 729.
Isopetalum Cotyledonis Sweet, v. Pelargonium (Sect. VIII.) Cotyledonis, p. 601, *alchemilloides* Eckl., Zeyh., v. Pelargon. alchemilloides, p. 594.
Isophyllum baldense Hoffm., *falcatum* Hoffm., *Gerardi* Hoffm., *junceum* Hoffm., *petraeum* Hoffm., *tenuissimum* Presl, v. Bupleurum baldense etc.

Isopappus Torr. et A. Gr., Gleichfederchen, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
divaricatus Torr. et A. Gr. (= *Chrysopsis divaricata* Ell., Nutt. = *C. Lamarckii* Nutt. = *Diplopappus divaricatus* Hook. = *Heterotheca Lamarckii* Cass., DC. = *Inula divaricata* Nutt. = *I. subaxillaris* Lam.), ausgesperrtes, 4. k. f. b. Südl. Nordamerika, Texas.

Isopogon RBr., Gleichbart.
asper RBr., rauher, ħ. t. Neuholland.
argenteus v. Houtte, silberfarbiger, ħ. t. Neuholland.
fastigiatus H. belg., gipfelständiger, ħ. t. Neuholland.
grandiflorus v. Houtte, grofsblumiger, ħ. t. Neuholland.
grandis v. Houtte, grofser, ħ. t. Neuholland.
latifolius RBr., breitblätteriger, ħ. t. Neuholland.
pedunculatus RBr., gestielter, ħ. t. Neuholland.
petiolaris Cunningh., stielblätteriger, ħ. t. Neuholland.
petrophiloides RBr., petrophilaähnlicher, ħ. t. Neuh.
pulchellus v. Houtte, schöner, ħ. t. Neuholland.
rigidus v. Houtte, starrer, ħ. t. Neuholland.
scaber Lindl, scharfer, ħ. t. Neuholland.
sphaerocephalus Lindl., kugelköpfiger, ħ. t. Neuholland.
tripartitus RBr., dreitheiliger, ħ. t. Neuholland.
uncinatus RBr., hackenförmiger, ħ. t. Neuholland.

Isotoma RBr., Gleichsäumler, p. 426.
axillaris RBr., Lindl. (= *senecioides* A. DC. = *Lobelia asplenifolia* Hort. = *L. senecioides* Sims = *L. senecionis* Cunn.)
breviflora Steud. (= *Hippobroma brevifl.* G. Don), kurzblumiger, 4. w. Südamerika.
Brownii G. Don (= *Lobelia hypocrateriformis* RBr.), Brown's, ☉. m. f. Neuholland.
longiflora Presl (= *Hippobroma longifl.* G. Don = *Lobelia longifl.* L. = *Rapuntium longifl.* Mill.).

Isotropis Benth., Leguminosae-Sophoreae.
I. biloba Benth., cuneifolia Benth. (= *Callistachya cuneifolia* Sm.), striata Benth. ħ. Neuholland, scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu werden.

Itea L., Itea.
chinensis Hook., Arn., chinesische, ħ. k. China.
caroliniana Lam. (= *racemiflora* Hort.), v. Cyrilla caroliniana, p. 247, *japonica* Hort., v. Adenobasium salicifolium Nachl., *spinosa* Andr., v. Bursaria spinosa, p. 140.

Iva L., Iva.
angustifolia Nutt., schmalblätterige, ☉. f. Nordamerika.
imbricata Walt. (= *integrifolia* Bank's = *Bailleria caroliniana* Spgl.), ziegeldachförmige, ħ f. b. k. Nordam.

Digitized by Google

Ixanthus Griseb., Hüllenzian, V. 1., Gentianeae.

viscosus Griseb. (= *Exacum viscosum* Sm. = *Gentiana viscosa* Ait. = *Hippion viscosum* Spgl., p. 491), klebriger, 4. k. t. Canarische Inseln (Teneriffa).

Ixia L., Ixia.

bicolor Thbg., zweifarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

capillaris Thbg. (= *gracilis* Salisb. = *lancea* Jacq.).

conica Salisb. (= *capitata* var. Andr. = *dubia* Vent. *flava* Mill. = *fuscocitrina* Dsf. = *maculata* Burm. *Milleri* Berg., *nervosa* Vent.).

crateroides Ker, b) hybrida Hort.

erecta Berg. (= *nervosa* var. Vent. = *polystachya* L. = *serotina* Salisb.).

flavescens Eckl., gelbliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

flavovirens Eckl., gelbgrüne, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

flexuosa L., *β*) hybrida Ker.

geminiflora Schrank, paarblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

hexandra Schrk., sechsmännige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

laurea Jacq. (= *Hyalis marginiflora* Salisb.), randblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lilacina Eckl., lilafarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

b) maculata.

lutea Eckl., gelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

maculata L. (= *abbreviata* Houtt. = *amoena* Salisb. = *capitata* var. *ovata* Andr. = *pulchra* et *spectabilis* Salisb. = *spicata* var. *viridi-nigra* Andr. = *viridis* Thbg.). *δ*) bimaculata Schrk.

patens Ait. (= *aristata* Schneev. = *concolor* Salisb. = *flaccida* Salisb. = *kermesina* Hort. = *pallens* Steud. = *Sprengeliana* Schult.).

pulcherrima Eckl., schönste, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

scariosa Thbg. (= *maculata* L. var. Spgl.), trockenhäutige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

striata Vahl (= *capillaris* L. var. Spgl.), gestreifte, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

tenuifolia Vahl, dünnblätterige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

Thunbergii R. et S. (= *squalida* Thbg., non Ait.), Thunberg's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

vitellina Eckl., dottergelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

Hybriden von H. O. Carre gezogen: Bright orange, canariensis, capitata bicolor, cuprea capitata, elegans, elegans minor, lilacea sarniensis, maculata suprema, purpurea, purpurea campanulata, rosea maculata, rosea rubra, rosea rurida, sanguinea.

Unbestimmtere: antholyzaeformis Lam., emarginata Lam., laeta Hort., lobata Hort., pinifolia Hort., propinqua Hort., socialis Hort., tardiflora Hort., tumida Hort., venusta Hort., versicolor Hort.

africana L., v. Aristea cyanea, *africana* Hornem. (= *cyanea* P. = *rubrocyanea* Jacq.), v. Babiana rubro-cyanea, *chinensis* L., v. Pardanthus chinensis, p. 586, coerulescens P. (= *flabelliformis* Salisb. = *punicea* Ait. = *villosa* Ait.), v. Babiana villosa, *columnaris* Andr., Salisb., *monadelpha* Dela Roche etc., v. Galaxia ixiaeflora etc., p. 252, II., *crocata* L., *deusta* Ait. ec., v. Montbretia crocata, deusta etc., *stellata tricolor* Hort., v. Sparaxis tricolor etc.

Digitized by Google

Ixiolirion Fisch., MB., Ixienlilie (Narcissenixie), VI. 4, Amaryllideae-Narcisseae.

Ledebourii Bong. et C. A. Mey, Ledebour's, 4. Zw. f. Altai.

montanum Herb. (= *Amaryllis montana* LaBill., Redouté = *Alstroemeria montana* Ker), Bergliebende, 4. Zw. f. b. Syrien, Persien.

Pallasii Fisch. (= *tataricum* Herb. = *Amaryllis tatarica* Pall.), Pallas's, 4. Zw. f. Sibirien, Taurien.

β) scythica Herb.

Ixodia natans Soland., Bank's, v. Hydropeltis purpurea, p. 407.

Ixora L., Ixora.

acuminata Roxb., zugespitzte, ħ. w. Silhet.

alba L., weifse, ħ. w. Ostindien.

amoena Wall., liebliche, ħ. w. Ostindien.

coccinea L. (= *grandiflora* DC. = *obovata* Heyne = *propinqua* RBr.), scharlachfarbige, ħ. w. Ostindien.

b) fol. variegat.

coriacea Wall. (= *Webera coriacea* Wall.), lederartige, ħ. w. Ostindien,

erubescens Wall. (= *affinis* Wall.), röthliche, ħ. w. Ostindien.

Finlaysoniana Wall., Finlayson's, ħ. w. Ostindien.

fulgens Roxb. (= ? *Breonii* Hort. belg.).

laxiflora Sm., lockerblumige, ħ. w. Sierra Leone.

spectabilis Wall., ansehnliche, ħ. w. Ostindien.

stricta Roxb. (= *coccinea* Curt., Ait. = *flammea* Salisb. = *obtusiflora* Hamilt. = *speciosa* W. Enum. = = *Pavetta stricta* Blume.).

subsessilis Wall., weniggestielte, ħ. w. Ostindien.

jamaicensis Hort. = ?, *ovata* Hort. (= *parviflora* Lam., non Vahl), v. Myonima multiflora, *ternifolia* Cav. (= *americana* Jacq.), v. Bouvardia Jacquini, p. 129.

Jaborosa Juss.

integrifolia Lam. (= *bonariensis* Gmel.).

Jacaranda Juss., (brasilianischer Name).

coerulea Juss. (= *bahamensis* RBr. = *caroliniana* P. = *Bignonia coerulea* L.), blaue, ħ. t. Bahamische Inseln, Carolina.

Claussenïana Casar., Claussen's, ħ. w. Brasilien.

pubescens Chamiss., weichhaarige, ħ. w. Brasilien.

racemosa Chamiss., traubige, ħ. w. Brasilien.

Jacea pratensis Cass. etc., v. Centaurea Jacea.

Jacksonia RBr., Jacksonie.

alata Benth., geflügelte, ħ. t. Neuholland.

capitata Benth., kopfförmige, ħ. t. Neuholland.

dilatata Benth., verbreiterte, ħ. t. Neuholland.

floribunda Endl., blüthenreiche, ħ. t. Neuholland.

grandiflora Booth, grofsblumige, ħ. t. Neuholland.

reticulata DC. (= *Daviesia reticulata* Sm.), netzförmige, ħ. t. Neuholland.

sericea Benth., seidenhaarige, ħ. t. Neuholland.

Jackia Wall., (Will. Jack, Chirurg im Dienste der ostindischen Compagnie, †), V. 1., Rubiaceae.

ornata Wall. (= *Zuccarinia ornata* Spgl.), zierliche, ħ. ħ. w. Ostindien.

Digitized by Google

Jacquemontia Choisy, (Victor Jacquemont, franz. Botaniker u. Reisender), V. 1.

azurea Chois. (= *Convolvulus azureus* Rich. = *C. aureus* Dietr.), azurfarbige, 4. Sch. w. Südamerika.

β) parviflora Chois. (= *Convolv. verticill.* L. = *?Ipomoea verticillata* L.).

violacea Chois. (= *Convolv. violaceus* Vahl), violette. 4. ♄. Sch. w. Carbiäen, Südamerika.

β) canescens Chois. (= *Convolv. canescens* H. B. K.), *γ*) abbreviata Chois. (= *Convolv. pentanthus* Jacq.).

Jacquinia L., Jacquinie.

aurantiaca Ait., Sims (= *macrocarpa* Spgl. ex parte), orangefarbige, ♄. w. ?Sandwichinsel.

macrocarpa Cavan. (= *Bonellia Cavanillesii* Hort. ripul.).

ruscifolia Jacq., *β*) velutina A. DC. Havana, ?*γ*) frutescens A. DC. (= *Ruscus frutescens* Mill. = *J. ruscifol.* var. Sm.).

umbellata A. DC. (= *aurantiaca* Berter., non Ait.), doldige, ♄. w. Porto-Rico.

ruscifolia H. Ticin. v. Bontia daphnoides, p. 127.

Jalapa Adans., *congesta* Mch. etc., v. Mirabilis Jalapa etc.

Jaltomata edulis Schltdl.. v. Saracha Jaltomata.

Jambosa Rumph, DC., Jambusenbaum.

acuminatissima Hassk. (= *Myrtus acuminatissima* Blume = *Syzigium acuminatissimum* DC.), zugespitzter, ♄. w. Java.

australis DC. (= *Eugenia australis* Wendl. = *E. myrtifolia* Sims, Ker, Lodd. = *Myrtus australis* Spgl. = ?*Tristania corymbosa* Hort.), neuholländischer, ♄. k. Neuholland.

cerasiformis Hassk. (= *Eugenia cerasiformis* DC. = *Myrtus cerasiformis* Blume), kirschförmiger, ♄. w. Java.

formosa Spach (= *Eugenia formosa* Wall.), schöner, ♄. w. Ostindien.

laurifolia DC. (= *Eugenia javanica* Lam. = *E. laurifolia* Roxb. = *Myrtus javanica* Spgl.), lorbeerblätteriger, ♄. w. Ostindien.

macrophylla DC. (excl. Syn.), (= *alba* Wight, Arn. = *Eugenia alba* Roxb.).

malaccensis DC. (= *domestica* DC. = *Eugenia macrophylla* Lam. = *E. malaccensis* L. = *Myrtus macrophylla* et *malaccensis* Spgl.).

purpurascens DC. (= *Eugenia pseudomalaccensis* Hort. Par.), purpurfarbiger, ♄. w. Ostindien.

Jania Breyniana Jacq. fil., v. Kolbea Breyniana, p. 439.

Janipha aesculifolia H. B. K. etc., v. Manihot aesculifolia etc., *urens* Poir., v. Cnidoscolus quinquelobus, p. 150, II.

Jasione L., montana L., *β*) maritima Dufour, *γ*) adcendens Hort.

Jasminum T., Jasmin.

adenophyllum Wall. (non Brot.), drüsenblätteriger, ♄. ♄. w. Ostindien.

affine Royle, ähnelnder, ♄. ♄. Sch. k. Nordindien[1]).

---

1) Prof. Lindley hält ihn für die wildwachsende Form von J. officinale.

Digitized by Google

Jasminum

angulare Vahl (= *capense* Thbg., E. Mey.), kantiger, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

?*β*) campanulatum Lk.

aureum D. Don, goldfarbiger, ♄. k. t. Nepal.

auriculatum Vahl (= *trifoliatum* P. = *Mogorium trifoliatum* Lam.).

caudatum Wall., geschweifter, ♄. t. Sch. t. w. Silhet, Bengal.

erectiflorum A. DC., aufrechtblumiger, ♄. Sch. w. Ostind.

Finlaysonianum Wall., Finlayson's, ♄. Sch. w. Ostindien.

glaucum Ait., *α*) rivulare Salisb. (= *ligustrifolium* Salisb.), *β*) lanceolatum E. Mey. (= *glaucum* Vent. h. Cels.), *γ*) latifolium E. Mey., *δ*) parvifolium E. Mey.

grandiflorum L. (= *hispanicum* Hortul.).

guineense G. Don, guineischer, ♄. ♄. w. Guinea.

humile L. (= *italicum* Hort.).

laurifolium Roxb., *β*) lanceolatum H. Berol. (= *angustifolium* Andr.).

mauritianum Bojer (= *flexile* Dsf. hort. Par.), mauritius'scher, ♄. ♄. Sch. w. Mauritius.

molle RBr. (= *hirsutum* Hffg.), weicher, ♄. t. w. Neuh.

nepalense Spgl. (= *dichotomum* D. Don), nepalscher, ♄. t. k. Nepal.

pubigerum D. Don, *β*) glabrum A. DC. (= *Wallichianum* Lindl. = *pubescens* Loud.).

revolutum Sims (= *humile* Heyne, non L. = *praecox* et *sinense* Hortul.).

Sambac L. (= *Mogorium Sambac* Lam. = *Nyctanthes Sambac* L.), *α*) verum A. DC., *β*) Gimea (flore-pleno), *γ*) goaense, *δ*) trifoliatum Vahl, *ε*) undulatum Hort.

solenanthum A. DC. (= *aborescens* Boj. Cat. h. Maur., non Roxb. = *tubiflorum* Roxb), röhrenblumiger, ♄. w. Ostindien.

stenopetalum Lindl. (= *trinerve* Roxb., non Vahl).

subulatum Lindl., pfriemenförmiger, ♄. ♄. Sch. t. China.

syringaefolium Wall., syringablätteriger, ♄. ♄. w. Ostind.

tortuosum W. E. (= *flexile* Jacq.), *β*) latifolium Visian, ?*γ*) campanulatum Lk.

trinerve Vahl (= *acuminatum* P., non RBr.).

volubile Jacq., windender, ♄. Sch. t. Cap d. g. Hoffn.

Unbestimmtere: adenophyllum Brot. (nec Wall.), Loudonianum Hffg.

Jasonia Cass, DC.

dichotoma DC. (= *Allagopappus dichotomus* Cass. = *Chrysocoma dichotoma* Jacq. = *Conyza canariensis* W. = *C. dichotoma* L. fil. = *C. inuloides* Ait.), zweizinkige, ♄. k. Canarische Inseln.

glutinosa Less., DC. (= *Chiliadenus camphoratus* Cass. = *Chrysocoma camphorata* Rob. et Cast. = *C. verticalis* Lag. = *Erigeron glutinosus* L. = *Inula saxatilis* Lam. = *Orsinia camphorata* Bertol.).

laevigata DC. (= *Buphthalmum coriaceum* Hort. = *B. laevigatum* Brouss. = *Donia canariensis* Less.), glatte, ♄. k. Teneriffa.

Jatropha L., Kunth, Brechnufs.

quinquelobata Mill., fünflappige, ♄. w. Havana.

Curcas L., v. Curcas Adansonii, p. 176, II.

Hinsichtl. d. übrigen s. d. Gattungen Cnidoscolus, Hyaenanche et Manihot.

Jcaumea linearis P., v. Kuhnia linearifolia.

Digitized by Google

Jeffersonia Barton, Spgl., Jeffersonie.

diphylla P. (= *Bartonis* Mchx. = *Podophyllum diph.* L.).

lobata Rafin., gelappte, 4. f. Nordamerika.

Jenkinsonia coriandrifolia Swt., *longicaulis* Hffg., *quinata* Swt., *Symoti* Swt., *tetragona* Swt., v. Pelargonium coriandrifol., longicaule, quinatum etc., p. 601 et 594.

Joachimia phalaroides Tenore, v. Beckmannia erucaeformis.

Jochroma Benth., Jochroma, V. 1., Solanaceae.

tubulosa Benth. (= *Habrothamnus cyaneus* Lindl.), röhrige, ħ. ħ. w. Südamerika.

Johnia coromandeliana Roxb. et *salacioides* Roxb., v. Salaxia prinoides et Roxburghii.

Johnsonia RBr., Coronariae-Asphodeleae.

hirta Lindl., lupulina RBr., pubescens Lindl. Sämmtlich 4. und in Neuholland heimisch, scheinen nicht kultivirt zu werden.

Jonopsidium DC., acaule Rchb., v. Cochlearia, Sect. II.

Josephia augusta Arrabida, v. Buginvillea spectabilis. — *J. armata* Poir. etc., v. Dryandra armata etc., *falcata* Poir., v. Hemiclidia Baxteri, p. 389.

Jovellana Cav., *punctata* R. et Pav., *scapiflora* R. et P., v. Calceolaria punctata et plantaginea, p. 146.

Joxylon Rafin., v. Maclura aurantiaca.

Juannulloa R. et P. (= *Ulloa* P., G. J. Ulloa, spanischer Naturforscher), V. 1., Solanaceae.

parasitica R. et P. (= *aurantiaca* Otto et Dietr. = *Brugmansia aurantiaca* Hort. = *floribunda* Paxt. = *parviflora* Hort. = *Swanolloja aurantiaca* Hort. = *Ulloa parasitica* P., p. 829), schmarotzende, ħ. t. Peru.

Jubaea H. B. K. (= *Molinaea* Berter., non Lam.), Jubaeapalme, XXI. IX. (XIII. III.), Palmae.

elegans v. Houtte, zierliche, ħ. w. ? Südamerika.

spectabilis H. B. K. (= *Cocos chilensis* Molina), ansehnliche, ħ. w. Chili.

Juglans L., Wallnufs.

? mexicana H. Cels, mexicanische, ħ. k. Mexico.

regia L., e) sphaerocarpa, f) spicata H. Makoy., g) fertilis Hort. (= *praeparturiensis* Hort.), h) filicifolia Lodd. (= *heterophylla* Hort.).

Juncus T., DC., Simse.

cephalotes Thbg. (= *capensis* Spgl. = *cymosus* Lam. = *multiflorus* Lam.), grofsköpfige, 4. k. Cap d. g. H.

effusus L. (= *communis* β E. Mey.).

fusco-ater Schreb. (= *acutiflorus* α Gaud. = *alpinus* Rchb. = *articulatus* W. β Fr. = *dubius* Wolff = *erectus* Bess. = *intermedius* Poir. = *micranthus* Desv. = *microcarpus* Nolte = *mucroniflorus* Clairv. = *nodulosus* Wahlbg. = *subnodulosus* Hoppe), schwarzbraune, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) alpestris Hartm. (= *alpinus* Vill. Suter = *geniculatus* Schrk. = *ustulatus* Hoppe).

multiflorus Dsf. (= *subulatus* Forsk.), vielblumige, 4. k. Nordafrika, Griech. Archipel.

pallescens Lam. (= *acuminatus* Mchx. = *sylvaticus* Mühlbg.), bleichende, 4. f. Nordamerika.

pallidus RBr., bleiche, 4. k. Neuholland.

polycephalus Mchx. (= *echinatus* Mühlbg.).

Digitized by Google

Juncus

pygmaeus Thuill. (= *mutabilis* α Lam. = *nanus* Duby = *pallens* P. = *triandrus* Gouan).

seranthes H. Petropol, häufchenblumige, 4. f. Soongaria.

subunifolius Brotero, fasteinblätterige, 4. f. Portugal.

tricephalus Gay (= *macrocephalus* Vivian. = *trichocephalus* Auct.), dreiköpfige, 4. f. b. k. Corsica, Calabr.

valvatus Lk. (= *schinoides* Brotero).

Jungia imbricata G., *tenella* G., v. Schidiomyrtus crenulata et tenella.

Juniperus T., Wachholder.

Bedfordiana H. Anglor., Bedford's, ♄. f. ?

Biasoletti Lk., Biasoletto's, ♄. f. b. k. Istrien.

canadensis Fisch., canadischer, ♄. f. Canada.

communis L., g) cracovia Lodd., h) hibernica Lodd.

Deppeana Steud. (= *mexicana* Chamiss., Schltdl., non Spgl.), Deppe's, ♄. k. Mexico.

davurica Pall., davurischer, ♄. f. Davuria, Altai.

flaccida Schltdl., Lindl., schlaffer, ♄. k. Mexico.

glauca H. Cels, blaugrüner, ♄. f. ?

Hermanni H. Par. (= *virginiana* L. var. P.), Hermann's, ♄. f. ?

Pseudo-Sabina C. A. Mey. (= *Sabina* Lebeb.), unächter Seven-W., ♄. f. Altai.

rufescens Lk. (= *Oxycedrus* Auct.), röthlicher, ♄. f. b. k. Südeuropa.

squamosa Wall. (= *squamata* Don).

In Makoy Extrait du Catalogue des plantes werden noch aufgeführt: J. gossainthanea, neoboriensis, pendula.

Unbestimmtere: ericoides Nois., Dsf., horizontalis Mch., rigida Dsf., Thuja Fisch.

Jurinea Cass., Jurinea.

adenocarpa Schrenk, drüsenfrüchtige, 4. f. Soongaria.

ambigua DC. (= *polyclonos* DC. var. = *Serratula ambigua* DC.), zweifelhafte, 4. f. Süd. Rufsland.

chaetocarpa Ledeb. (= *Serratula chaetocarpa* Ledeb.), borstigfrüchtige, 4. f. Altai.

cyanoides DC. (? = *tomentosa* Cass.).

depressa C. A. Mey. (= *Centaurea Moschus* Habl. = *Serratula depressa* Stev.), niedergedrückte, 4. f. Caucasus.

humilis DC. (= *Bocconi* Gay).

moschata DC. (= *Carduus moschatus* Guss. = *Serratula simplex* β Tenore), moschusduftende, 4. f. Neapel.

pulchella DC., schöne, 4. f. b. k. Persien.

rhizantha Fisch. et Mey., wurzelblumige, 4. f. Caucasus, Armenien.

stoechadifolia DC. (= *Serratula stoechadifolia* MB. = *S. tomentosa* Hoffm.), Stoechasblätterige, 4. f. Taurien.

linearifolia Hort. (non DC.), v. Chamaepeuce mutica, p. 187.

Jussieua Houst. L., Jussieua.

acuminata Sw., zugespitzte, ☉. w. m. f. Westindien, Brasilien.

angustifolia Lam. (= *erecta* L. var. Spgl. = *exaltata* Andr. = *suffruticosa* G.), schmalblätterige, ♂. ♄. w. Java, Molucken.

decurrens DC. (= *erecta* Abb. = *Ludwigia decurrens* Walt. = *L. jussiaeoides* Mchx), herablaufende, 4. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Jussieua
frutescens Jacq., strauchige, ♄. w. ?
longifolia DC., langblätterige, ⊙. 4. ♄. w. Brasilien.
octonervia Lam. (= *octofila* DC. = *octovalvis* Sw.).
ramosa Jacq. fil. (= *erecta* L. var. DC.).

Justicia L., Justicie.
IV. Cryptophragmium N. E.
canescens N. E., grauliche, ♄. w. Ostindien.
VIII. Justicia genuina N. E.
callistachya Cham., Schltdl., schönährige, ♄. t. Mexico.
carnea Lindl., b) superba Hort.
longiflora Visian., langblumige, 4. ♄. w. ?
pseudo-coccinea Brotero, unächte, ♄. w. Brasilien.
quadrifida Vahl (= *ligularis* Salisb. = *superba* Hort. angl. = *virgularis* Salisb.).
spathulata N. E. Mart., spatelförmige, ♄. w. Brasilien.
variegata Aubl., bunte, ♄. w. Guiana.
violacea Vahl (= *Dianthera violacea* Vahl), violette, ♄. w. Arabien.
VIII[b]. Odontonema N. E.
lucida Andr.
IX. Peristrophe N. E.
speciosa Roxb. (= *tinctoria* Hort.), β) riviniaefolia, Visian. (= *violacea elegans* Hort.).
XIII. Schaueria N. E.
calycotricha Lk. et Otto (= ? *chrysostachys* Hort.).

Kadsura Juss., (japanischer Name), XIII. VI., Magnoliaceae.
japonica Dunal (= *Uvaria japonica* L.), japanische, ♄. t. Japan, Ostindien.
propinqua Wall., v. Sphaerostemma propinquum.

Kaempferia L., Kaempferie.
angustifolia Rosc. (= *undulata* Lk. = *purpurea* Hort. = *Roxburghiana* Schult.).
Galanga L. (= *plantaginea* Salisb.).
lanceolata Lodd., lanzettblätterige, 4. w. Ostindien.
latifolia Don H. Cantabr., Hornem. (= *Galanga* W. E., non L.).
rotunda L. (= *longa* Jacq. = *rotundifolia* Hort. = *versicolor* Salisb.).
elegans Wall., *secunda* Wall., v. Monolophus elegans, secunda.

Kageneckia R. et P., Kageneckie.
crataegoides D. Don, weifsdornähnliche, ♄. k. t. Chili.
oblonga R. et P. (= *crataegifolia* Lindl.), längliche, ♄. k. t. Chili.
ovata Colla, eiförmige, ♄. k. t. Chili.

Kalanchoë Adans., (chinesischer Name).
floribunda W. A. (= *Cotyledon corymbosa* et *paniculata* Rottl.), blüthenreiche, 4. ♄. w. t. Ostindien.
lanceolata P. (= *Cotyledon lanceolata* Forsk. = *Vereia lanceolata* Spgl.), lanzettblätterige, ♄. t. Arabien.
pinnata P. (= *floripendula* Lam.), v. Bryophyllum calycinum, p. 135.

Kalbfussia Schultz Bip., (C. Kalbfufs, Freund des Herrn Schultz), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
Milleri Schultz Bip. (= *Apargia verna* Hochst. et Steud. herb. Sard. = *Hemilepis hispida* Kunze = *Hete-*

Digitized by Google

Kalbfussia
rochaeta hispida Ehrhg. = *Thrincia laevigata* Lk.), Miller's, ⊙. f. Sardinien, Nordafrika.
Salzmanni Scholtz Bip. (= *Apargia verna* Salzm.), Salzmann's, ⊙. f. Nordafrika.

Kallstroemia Scopol. Wight, Arn., Kallströmie, X. 1., Zygophylleae.
cistoides Endl. (= *Tribulus cistoides* L., Jacq., p. 816 =? *littoralis* Ait.), ciströschenähnliche, 4. w. Südamerika, Sandwichinseln.
maxima W. A. (= *K. Tribulus* Meisn. = *Tribulus maximus* L., p. 816).
tribuloides W. A. (= *Ehrenbergia tribuloides* Mart. = *Tribulus brasiliensis* Spgl.), brasilianische, ⊙. w. m. Brasilien.

Kalmia L., Kalmie.
latifolia L., b) myrtifolia Hort. belg.
Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der belgischen Gärten noch K. glauca superba, lucida, oleifolia und salicifolia erwähnt.
Kamptzia albens N. E., v. Syncarpia laurifolia.

Karelinia Less., (Gr. Karelin, bereiste mit Kirilow Soongarien), XIX. 1. (11.), Compositae-Corymbiferae.
caspia Less. (= *Serratula caspia* Pall.), caspische, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

Karwinskia Zucc., (Baron v. Karwinsky in München, bereiste Mexico), V. 1., Rhamneae.
glandulosa Zucc., drüsige, ħ. k. t. Mexico.
umbellata Endl. (= *Rhamnus umbellatus* Cav. = *Zizyphus umbellata* Poir.), doldige, ħ. k. t. Mexico.
Kaulfussia amelloides N. E., v. Charieis heterophylla γ Neesii, p. 136, II., *ciliata* Spgl. fil., v. Aster Sect. II. tenellus, p. 51, II., *strigosa* Spgl. fil., v. Agathaea strigosa, p. 13, II.

Kennedya Vent., Kennedye.
I. Genuina.
arenaria Benth., Hügel, Sandliebende, ħ. ħ. Sch. t. Neuh.
bracteata Gaudich., deckblätterige, ħ. t. Westl. Neuholl.
Marryattiana Lindl.
monosperma Gaudich., einsaamige, ħ. ħ. Sch. t. Neuholl.
nigricans Lindl.
parviflora Meisn., kleinblumige, ħ. ħ. Sch. t. Neuholland.
prostrata RBr. (= *coccinea* W., non Vent.).
stipularis Desv. (= *prostrata β major* DC. = *? bracteata* Gaudich.), zwischenblätterige, ħ, t. Neuholland.
II. Hardenbergia Benth.
Comptoniana Benth. (Lk.), (= *Glycine Comptoniana* Ker).
cordata Benth. (Lindl.), herzblätterige, ħ. ħ. Sch. t. Neuh.
Hügelii Benth., Hügel's, ħ. ħ. Sch. t. Neuholland.
Lindleyi Meisn., Lindley's, ħ. ħ. Sch. t. Neuholland.
α) trifoliata Meisn., β) digitata Meisn. (Lindl.).
lucida Hügel, spiegelnde, ħ. ħ. Sch. t. Neuholland.
macrophylla Benth. (Lindl.).
monophylla Benth. (Vent.). α) bimaculata (Hort.) (= *Glycine virens* Soland. = *G. bimaculata* Curt.). β) longeracemosa (Lindl.).
ovata Benth. (Sims), (= *latifolia* Lindl.).
Varietäten oder Hybriden: praegnans Harris., purpurea Hort.

Digitized by Google

Kennedya

III. Zichya Hügel, Benth.

angustifolia Lindl., schmalblätterige, ♄. Sch. t. Neuholl.
coccinea Benth. (Vent.).
dilatata (Cunningh.), (= *sericea* Benth.).
glabrata Benth. (Lindl.).
heterophylla Sweet (Makoy).
inophylla Benth. (Lindl.).
Molly Hügel.
pannosa Hort. belg., faserlappige, ♄. Sch. t. Neuholland.
? rotundifolia Hort. belg., rundblätterige, ♄. Sch. t. Neuholland.
tricolor Lindl., dreifarbige, ♄. Sch. t. Neuholland.
villosa Lindl., zottige, ♄. Sch. t. Neuholland.
? Hybriden: Baumanni Hort. (= *oblongata* Hort.), floribunda Hort., Towardi H. belg. (= *inophylla* Hort.).
Unbestimmtere: apetala Lindl., audomarensis Hort., inconspicua Hort., phaseolifolia Hffg., sericea Cunn., undulata Hort.

gracilis Hort., *Stirlingii* Lindl., v. Physolobium gracile etc., *splendens* Hort., v. Dioclea glycinoides, p. 203, II., *microphylla* Sieb. (= *Sieberiana* Hort. = *Kennedynella microphylla* Steudel etc.), v. Leptocyamus microphyllus etc. — *Kennedynella* Stend., v. Leptocyamus.

Ketmia Scop., Mch., *arborea* Mch. (= *syriaca* Scop.), *glandulosa* Mch., *mutabilis* Mch., *Trionum* Scop., v. Hibiscus syriacus, cannabinus etc. p. 395 et 397.

Kielmeyera Mart., (C. F. v. Kielmeyer, k. würtemb. Staatsrath, Arzt u. Naturforscher, †), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

alba Makoy, weiſse, ♄. w. Brasilien.
coriacea Mart. (= *Bonnetia coriacea* Spgl.), lederartige, ♄. w. Brasilien.

Kirschlegeria Lindleyi Spach, *lycioides* Spach, v. Fuchsia parviflora, lycioides, p. 340 et p. 249, II.

Kirganelia Juss., elegans Juss. (= *mauritiana* Hort. = *phyllanthoides* Dsf. = *virginea* Usteri = *Phyllanthus fascicularis* Poir. = *P. Kirganelia* W. = *P. virgineus* P., p. 437).

Kirilowia Bunge, (J. Kirilow, russischer Botaniker u. Reisender, †), V. 11. (1.), Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

eriantha Bunge (= *Londesia eriantha* Karel. et Kiril., non Fisch. et Mey.), wollblumige, ⊙. f. Ural.
pilosa Bunge = Panderia pilosa, p. 583.

Kixia Blume, Kixie, V. 1., Apocyneae.

arborea Blume, baumartige, ♄. w. Java.

Klasea heterophylla Cass., *pinnatifida* Webb, *quinquefolia* Cass., v. Serratula heterophylla etc.

Kleinia L., Haw., non Jacq., (J. H. Klein, deutscher Botaniker), XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

acaulis DC. (= *Cacalia acaulis* L. fil.), stengellose, 4. t. Cap d. g. Hoffn.
aizoides DC., zaserlingähnliche, 4. ♄. t. Cap d. g. H.
Antheuphorbium DC. (= *Cacalia Antheuphorbium* L., p. 141).
articulata Haw. (= *Cacalia articulata* L. fil., p. 141, = *C. lacinata* Jacq. = *C. runcinata* Lam.).

Digitized by Google

Kleinia

breviscapa DC. (= *C. carnosa* Ait.), kurzschaftige, 4. ħ. t. Cap der guten Hoffnung.

cana DC., graue, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

carnosa Endl. (= ? *breviscapa* DC. = *Cacalia carnosa* Ait., p. 141).

crassulaefolia DC., dickblätterige, ħ. t. Cap d. g. H.

cuneifolia DC. (= *Cacalia cuneifolia* L. fil.), keilblätterige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

ficoides Haw. (= *Cacalia ficoides* L., p. 141).

gonoclada DC., sprossenästige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

Haworthii DC. (= *tomentosa* Haw. = *Cacalia canescens* W. Enum. spl. = *C. Haworthii* Swt. = *C. tomentosa* Haw., non L. et Jacq.), Haworth's, ħ. t. Cap der guten Hoffnung.

neriifolia Haw. (= *Cacalia Kleinia* L.), oleanderblätterige, ħ. t. k. Canarische Inseln.

papillaris Haw. (= *Cacalia papillaris* L.), weichwarzige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

pinguifolia DC., fettblätterige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

pugioniformis DC. (= *Cacalia longifolia* Haw. = *C. pugioniformis* Salm), dolchförmige, ħ. t. Cap d. g. H.

radicans Haw. (= *Cacalia radicans* L., p. 141).

repens Haw. (= *C. repens* L., p. 141).

rigida DC. (= *Cacalia rigida* Thbg.), starre, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

semperviva DC. (= *Cacalia sempervirens* Vahl = *C. semperviva* Forsk.), immergrüne, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

talinoides DC., talinumähnliche, ħ. t. Cap d. g. Hoffn. *colorata* H. B. K., *linearis* Dsf. H. Par. (= *suffruticosa* Lodd.), *Porophyllum* W., *ruderalis* W., *suffruticosa* W., *tagetoides* H. B. K., *viridiflora* H. B. K., v. Porophyllum coloratum, decumbens, ellipticum, ruderale, linifolium, tagetoides et viridifl.

Knautia L. Coult., Knautie.

sylvatica DC. (= *arvensis* γ Coult. = *Scabiosa ovatifolia* Lagasca = *S. pannonica* Jacq. = *S. sylvatica* L. = *Trichera sylvatica* Schrad.), Wald-K., 4. f. Deutschland, Ungarn.

Kneiffia angustifolia Spach, *chrysantha* Spach, *floribunda* Spach, *Fraseri* Spach, *glauca* Spach, *gracilis* H. Götting, *linearifolia* Spach, *maculata* Spach (= *serotina* Spach), *pumila* Spach, *suffruticosa* Spach, v. Oenothera linearis, chrysantha, hybrida, Fraseri, glauca, gracilis, linifolia, serotina, pumila, fruticosa, p. 555.

Kniphofia Mch., (Kniphof, deutscher Botaniker, †). VI. 1., Coronariae-Aloineae.

aloides Mch. (= *Aletris Uvaria* L. = *Aloe longifolia* Lam. = *A. Uvaria* L. = *Tritoma Uvaria* Ker = *Tritomanthe Uvaria* Lk., p. 825 = *Veltheimia speciosa* Roth = *V. Uvaria* W., Jacq.), Aloëähnliche, 4. k. f. b. Cap der guten Hoffn.

Burchellii Kunth (= *Tritoma Burchellii* Sweet = *Tritomanthe Burchellii* Herb., p. 825).

odorata * (= *Tritomanthe odorata* Lodd.), wohlriechende, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

pumila Kunth (= *Aletris pumila* Ait. = *Tritoma pumila* Ker = *Tritomanthe pumila* Lk., 825 = *Veltheimia abyssinica* Redout. = *V. pumila* W.).

Digitized by Google

Kniphofia
sarmentosa Kunth (= *Aletris sarmentosa* Andr. = *Tritoma media* Ker = *Tritomanthe media* Lk., p. 826 = *Veltheimia media* Donn = *V. repens* Andr. = *V. sarmentosa* W.), wurzelrankige, 4. k. f. b. Cap der guten Hoffnung.

Knoxia L., Knoxie.
corymbosa W., p. 438 (= *exserta* DC. = *sumatrensis* Wall. = *teres* DC. = *umbellata* Banks = *Spermacoce exserta* Roxb. = *S. sumatrensis* Retz = *S. teres* Roxb.).

Kochia Roth, Kochie.
latifolia Fresen, breitblätterige, ⊙. f. Arabien.
Sieversiana C. A. Mey. (= *Salsola scoparia* var. M. B. = *S. songarica* Sievers = *Suaeda Sieversiana* Pall.), Sievers's, ⊙. f. Sibirien.
atriplicifolia Roth (= *dentata* W.), v. Cycloloma platyphylla, p. 179, II., *eriophora* Schrad., *hyssopifolia* Roth, *muricata* Schrad., *sedoides* Schrad., v. Echinopsilon eriophorum etc., p. 214, II.

Koeberlinia Zuccar., (C. L. Köberlin, deutscher Botaniker), V. 1., Evonymeae-Pittosporeae.
spinosa Zuccar., dornige, ħ. k. Mexico.

Koechlea Endl., (? Köchle, deutscher Gelehrter), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.
mitis Endl., unbewehrte, 4. f. b. Berg Taurus (Asien).

Koeleria P., Koelerie.
brachystachya DC. (= *avenacea* P. B. = *Avena panicea* Lk. Hort. = *Bromus cristatus* Spgl. = *B. phleoides* Hort. = *Dactylis caudata* Brotero = *D. pungens* Hort. = *Festuca cristata* Hort. = *F. phalaroides* Lam. = *F. phleoides* Hort. = *Panicum astracanicum* Hort. = *Trisetum phleoides* var. *pumila* Trin.).
dactyloides Rchb. (= *Aira dactyloides* Roch.), knaulgrasähnliche, 4. f. Banat.
phleoides P. (= *aegyptiaca* Hort. Berol. = *Aira elongata* Salzm. = *Bromus trivialis* Savi = *Festuca cristata* L.). β) dactyloides Spgl. (non Rchb.), (= *Bromus dactyloides* Roth = *Dactylis pungens* Hornem. = *Rostraria pubescens* Trin.).
macilenta DC. (= *tenuiflora* Salzm. = *Avena macilenta* Guss. = *Bromus Michelii* Savi = *Festuca Michelii* Kunth = *F. sicula* Presl = *Trisetum macilentum* Trin. = *Vulpia Michelii* Rchb.), v. Avellinia Michelii, p. 55, II.

Koelreuteria Laxm., paniculata Laxm. (= *paullinioides* L'Her. = *Sapindus chinensis* L. fil.).
Kohlrauschia prolifera Kunth, v. Dianthus prolifer, p. 260. — *K. Sibthorpii* Steud., v. Tunica dianthoides, p. 827.

Koniga RBr., Koniga.
libyca RBr. (= *Farsetia libyca* Spgl. = *Lobularia libyca* Meisn. = *Lunaria libyca* Vivian. = *Octadenia libyca* RBr.), libysche, ♂. ħ. k. Nordafrika.
Hinsichtl. der übrigen s. Ptilotrichum.

Kopsia Blume, (Kops, niederländ. Oekonom u. Botan.), V. 11., Apocyneae.
arborea Blume, baumartige, ħ. w. Java.
fruticosa Blume (= *Cerbera fruticosa* Roxb., Ker, p. 182 = *Calpicarpum Roxburghii* G. Don).

Digitized by Google

Kopsia coerulea Dumort, *ramosa* Dumort., v. Orobanche coerulea, ramosa.

Kosteletzkya Presl, (Dr. V. F. Kosteletzky, Professor u. Director des bot. Gartens zu Prag), XVI. VIII., Malvaceae.

pentacarpa Ledeb. (= *Hibiscus pentacarpos* L. = *Pavonia pentacarpa* Rchb., p. 592 = *P. veneta* Spgl.), fünffrüchtige, 4. f. b. k. Friaul, Venedig, Südrufsl.

Krameria Löfll., L., Kramerie.

cistoidea Hook., ciströschenähnliche, ♄. t. Chili.

Kraschenninikovia lutens Güldenst., v. Diotis ceratoides, p. 267.

Kreysigia Rchb., Endl., Kunth, (Kreysig, ehemal. k. sächs. geheim. Medicinalrath u. Leibarzt, sowie Besitzer einer reichen lebenden Pflanzensammlung, †), VI. 1., Melanthaceae (Coronariae-Asphodeleae).

multiflora Rchb. (= *Schelhammeria multiflora* Hort., non RBr. = *Tripladenia Cunninghamii* G. Don), vielblumige, 4. k. t. Neuholland.

Krigia Schreb., Krigie.

dichotoma Nutt. (= *oppositifolia* Rafin. = *tenella* Rchb. = *Hyoseris ramosissima* Bart. = *Serinia caespitosa* Rafin.), zweizinkige, ☉. f. Nordamerika.

virginica W. (= *Cynthia virginica* Beck. = *Hyoseris virginica* L.), virginische, ☉. f. Virginien.

Krockeria oligoceratos Mch., v. Lotus edulis, p. 478.

Krubera leptophylla Hoff., v. Ulospermum dichotomum, p. 830.

Kuhnia L., Kuhnie.

Critonia W. (= *paniculata* Cass. = *Critonia Kuhnia* G., Mchx.), *β*) corymbulosa Walp. (= *eupatorioides* Ell. = ? *glutinosa* Ell. = *suaveolens* Fresen.).

fruticosa Vent. (= *frutescens* Hornem. = *rosmarinifolia* Balb. = *Eupatorium canescens* Ortega = *E. cubense* P. = *E.* ? *fruticosum* Dsf.), strauchige, ♄. w. Cuba.

linearifolia Spgl. (= *Jaumea linearis* P. = *Kleinia linearifolia* Juss.) gleichbreitblätterige, ♄. w. Südam.

Maximiliani Trevir., Maximilian's, 4. f. b. k. Missouri.

pyrifolia Mart., birnblätterige, 4. k. ?

Kuhnia pinnata Walt. (= *Kunistera carolinensis* Lam.), v. Petalostemon corymbosum. — *Kunistera violacea* Ait., v. Petalostemon violaceum, p. 609.

Kumara disticha Medic., v. Aloe plicatilis, p. 36.

Kundmannia Scopol., Kundmannie, V. II., Umbelliferae.

sicula DC. (= *Athamanta sicula* Ucria, non L. = *Brignolia pastinacaefolia* Bertol., p. 131 = *Campderia sicula* Lagas. = *Ligusticum balearicum* L. = *Sium graecum* L. Hort. Cliff. = *S. siculum* L.), sicilianische, 4. f. b. k. Mittel- und Unteritalien, Corsica, Spanien, Balearen, Mauritanien.

Kunthia Deppei Hortul., *elatior* H. Berol., *xalapensis* Otto et Dietr., v. Chamaedorea elegans, elatior et Schiedeana, p. 186 et p. 135, II.

Kunthia cochinchinensis Dennst., v. Garuga pinnata, p. 346.

Kunzea Rchb., (Dr. G. Kunze, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Leipzig), XII. 1., Myrtaceae.

capitata Rchb. (= *Metrosideros capitata* Sm. = *Melaleuca eriocephala* Sbr. = *Stenosperm. capit.* Swt.).

Digitized by Google

Kunzea
corifolia Rchb. (= *Metrosideros corifolia* Vent. = *M. abietina* Hffg. = *Leptospermum ambiguum* Sm. = *L. punctatum* Hort. = *Stenosperm. corifolium* Swt.).
ericaefolia Rchb. (= *Metrosideros ericaefolia* Sm. = *Stenospermum ericaefolium* * p. 787).
Schaueri Lehm., Schauer's, ♄. t. Neuholland.
Kunsia tridentata Spgl., v. Purshia tridentata, p. 668.

Kyllingia Rottb. L. fil., Kyllingie.
polyphylla W. herb. (= *monocephala* C. Smith), vielblätterige, 4. w. Westl. Afrika, Mauritius.
pulchella Kunth, hübsche, ⊙. k. f. Cap d. g. Hoffn.
pumila Mchx. (= *uncinata* Sbr. herb. Trin. = *Hodychloa fragrans* Raf.), niedrige, 4. k. Nordamerika, Westindien.
pungens Lk. (= *vaginata* Rchb. in Weigelt herb.), stechende, 4. w. Südamerika.
uncinata Lk., v. Dichostylis pygmaea, p. 200, 11.
Kyrtanthus longiflorus Gmel. syst., v. Posoqueria longiflora.

Labichea Gaudich., Labichea.
cassioides Gaudich., cassienähnliche, ♄. t. Neuholland. (Ob eingeführt?)
punctata Lindl., punktirte, ♄. t. Neuholland (Schwanenfl.).

Labisia Lindl., Labisie, V. r., Myrsineae.
pothoina Lindl., indische, 4. w. Penang.

Lablab Adans., (arabischer Name).
sanguineum Lem., blutfarbiger, ⊙. Sch. w. Ostindien.
b) roseum Lem.

Labourdonnaisia Boj., (Labourdonnais, ehem. Gouverneur der Insel Mauritius), XI. r., Sapotaceae.
revoluta Boj., zurückgerollte, ♄. w. Mauritius. (Ob kultivirt?)
Aufserdem wachsen auf Mauritius noch calophylloides Boj. u. glauca Boj.
Laburnum alpinum Griseb., *vulgare* Griseb., v. Cytisus alpinus et Laburnum, p. 248.

Lacaena Lindl., Lacaena, XX. r., Orchideae.
bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Guatemala.

Lacepedea H. B. K., (Gr. Lacepede, berühmt. franz. Naturforscher), V. r., Hippocrateaceae.
insignis H. B. K. (= *Tricostalis tinifolia* H. B. K. = *Tricoros xalapensis* Spgl.), ausgezeichnete, ♄. w. Mexico.
pinnata Schiede, gefiederte, ♄. w. Mexico.

Lachenalia Jacq., Lachenalie.
albida Trattin. (= *angustifolia* Red., *β minor* Schult. fil.), weifsliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
bicolor Lodd., zweifarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
crocea Brot., safranfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
hyacinthoides Jacq., *β*) contaminata Ait.
lucida Ker (= *fragrans* Andr., non Jacq. = *latifolia* Tratt.).
orthopetala Jacq. (= *hyacinthoides* var. Spgl. = *ustulata* Bank's herbar.), geradkronige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
pallida Ait. (= *mediana* Jacq.).
pulchella Kunth (= *orchioides β* Lichtenst. = *pustulata* Berg. = *unicolor* Echl., non Jacq.), hübsche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Lachenalia

purpureo-coerulea Jacq., β) foliis laevibus Ker, γ) botryoides Trattin.

pusilla Jacq. (= *reflexa* Thbg.).

punctulata Jacq. (= *reclinata* Dietr.).

β) densiflora Tratt.

tenella Schneev., zarte, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lanceaefolia Jacq. (= *maculata* Tratt.), v. Drimia lanceaefol., p. 276, *reflexa* Andr., v. Drimia lanceolata, p. 211, H., *serotina* W., ? *speciosa* Dietr., *viridis* W., v. Urepetalum serotinum, glaucum, viride, p. 831.

Lachnanthes tinctoria Ell., p. 442, (= *Anonymus tinctoria* Walt. = *Dilatris caroliniana* Lam. = *D. Heritiera* P. = *D. tinctoria* Pursh = *Gyntheca tinctoria* Swt. = *Heritiera Gmelini* Mchx. = *H. tinctoria* Bosc = *Pyrotheca tinctoria* Salisb.).

Lachnoloma Bunge, Wollsaum, XV. r., Cruciferae-Isatideae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ⊙. f. Asiatisch. Rufsland (Kisilkum).

Lachnopodium Blume, Wollfufs, X. r., Lythrariae-Melastomeae.

rubro-limbatum Blume (= *Melastoma rubro-limbata* Lk. et Otto), rothsäumiger, ♄. ♄. w. Ostindien.

Lachnostoma H. B. K., Wollschland, V. m., Asclepiadeae.

Balbisii Dcsne. (= *Asclepias villosa* Balb. = *Cynanchum villosum* R. et S. = *Pherotrichis villosa* Meisn.), Balbis's, 4. t. ? Südamerika.

prostratum Decsne. (= *Gonolobus prostratus* RBr., p. 465 = *Cynanchum foetidum* L'Her. = *C. prostratum* Cav. W. = *Pherotrichis prostr.* Dcsne.).

Lactuca T. L., Salat.

cracoviensis Swzky., krakauischer, ⊙. f. Polen.

elongata Mühlbg. (= *procera* Schrad.), α) longifolia Mchx. (= *caroliniana* Walt.), β) integrifolia Bigel. (= *sagittifolia* Ell.), γ) sanguinea Bigel. (= *hirsuta* Bigel. = *Galathenium floridanum* et *sanguineum* Nutt.).

erysimifolia DC. (= *Prenanthes erysimifol.* W. = *P. muralis* L. var. Spr. Stev.), hederichblätteriger, ⊙. f. Iberien, Taurien.

Fischeriana DC. (= *Prenanthes graminea* Fisch.), Fischer's, 4. f. Sibirien.

hastata DC. (= *Chondrilla hastata* Wall.), spontonblätteriger, ⊙. f. Nepal.

Heyneana DC. (= *runcinata* DC. = *Chondrilla indica* Steud. = *C. racemosa* Poir. = *Prenanthes racemosa* Roxb. = *P. sonchifolia* W. = *Sonchus calycinatus* Roxb.), Heyne's, ⊙. ♂. f. m. Ostindien.

murorum C. Bauh. (= *muralis* Mey., DC. = *Chondrilla muralis* Lam. = *Cicerbita muralis* Wallr. = *Mycelis muralis* Rchb. (*angulosa* Cass.) = *Prenanthes muralis* L.).

petraea Fisch. et Mey., Felsen-L., 4. f. Caucasus.

pulchella DC. (= *integrifolia* Nutt., non Bigel. = *oblongifolia* Nutt. = *Agathyrsus pulchellus* Don = *Mulgedium pulchellum* G. Don = *Sonchus pulchellus* Pursh), schöner, 4. f. Nordamerika.

sativa L., ε) constantinopolitana Hort., ζ) romana Hort.

Digitized by Google

Lactuca
undulata Ledeb., wellenförmiger, ⊙. f. Alt. Sibirien.
virosa L., β) maculata Hornem., γ) ambigua Schrad. Wilhelmsiana Fisch. et Mey., Wilhelm's, 4. f. b. Persien [1]).
acuminata Spgl., *floridana* G., *tatarica* Mey., v. Mulgedium acuminatum, floridanum et tataricum, p. 532, *intybacea* Jacq., v. Brachyramphus intybaceus, p. 76, II., *prenanthoides* Scopol. (= *chondrilloides* Auct.), v. Chondrilla prenanthoides.
Ladanium cyprium Spach, *laurifolium* Spach, *officinarum* Spach, v. Cistus cyprius, laurifolius, ladaniferus.

Laelia Adans., Desv., Laelie, XV. 1., Cruciferae.
orientalis Desv. (= *Bunias orientalis* L., p. 138 = *B. berennis* Mch. = *B. Winterli* Schult. = *Myagrum tarraxacifolium* Lam. = *Rapistrum glandulosum* Berger), morgenländische, 4. f. Osteuropa, Sibirien.
cochlearioides P., vergl. Calepina Corvini, p. 147 und Bunias cochlearioides, p. 82, II.
Laelia Lindl., *acuminata* H. belg., *albida* Lindl. etc., v. Amalia acuminata etc., p. 29, II.

Lafoensia Vandel., (Lafoens, portugiesisch. Gelehrter), XII. 1., Lythrariae.
speciosa DC. (= *Calyplectus speciosus* H. B. K.), prächtige, ħ. w. Neugranada.
Vandelliana DC. (= *? aromatica* Hort. belg. = *illustris* Arrab.), Vandelli's, ħ. w. Brasilien.

Lagenaria Sering., Flaschenkürbis.
hispida Sering. (= *Cucurbita hispida* Spgl.), steifhaariger, ⊙. Sch, m. f. ? Japan.
vulgaris Sering. Var., latior Hort., longa Hort., pyrotecha Hort.

Lagenophora Cass., Flaschenträger.
Billardieri Cass. (= *Bellis stipitata* Spgl. = *Calendula stipitata* LaBill.), Billardiere's, 4. t. Neuholl.
Forsteri DC. (= *Calendula pumila* Forst. = *Microcalia australis* Rich.).

Lagerstroemia L., Lagerstroemie.
indica L. (= *chinensis* Lam.), b) rosea Lodd. (= *? elegans* Hort.).
Münchhausia W. (= *speciosa* P. = *major* Retz = *Münchhausia speciosa* L.).
venusta Wall., liebliche, ħ. w. Ostindien.

Lagochilus Bunge, Fadenlippe, XIV. 1., Labiatae.
Bungei Benth. (= *diacanthophyllus* Bunge), Bunge's, 4. ħ. f. Sibirien
diacanthophyllus Schrenk et C. A. Mey. (= *Moluccella diacanthophylla* Pall.), zweistacheligblätterige, 4. f. Bucharei.
platycalyx Fisch. et Mey., breitkelchige, 4. f. Soongaria.
pungens Fisch., Mey. et Lallem. (= *Bungei β minor* Schrenk), stechende, 4. f. Asiat. Rufsland.

Lagoseris MB., Less., Flügel(Feder)pippau.
bifida K. (= *Pterotheca bifida* F. et Mey. = *P. nemausensis* Rchb., non Cass. = *Trichocrepis bifida* Visian.).

---

1) D. C. H. Schultz Bipont. zieht als Unterabtheilungen zu Lactuca noch die Gattungen Microrhynchus Less. u. Phoenicopus Cass., s. diese.

Digitized by Google

Lagoseris

Rüppelii C. H. Schultz Bipont. (= *Pterotheca Rüppelii* Steud. = *Trichocrepis Rüppelii* Sch. Bipont.), Rüppel's, ⊙. f. Arabien.

Lagunaria DC., G. Don, Lagunarie, XV. VIII., Malvaceae.

cuneiformis G. Don (= *Hibiscus cuneiformis* DC., p. 395).

lilacinus G. Don (= *H. lilacinus* Lindl., p. 396).

Patersonii G. Don (= *H. Patersonius* Ait., p. 396).

Lalage Lindl. (eine von Horaz besungene Dame).

grandiflora v. Houtte, grofsblumige, ♄. t. Neuholland.

hoveaefolia Benth., hoveablätterige, ♄. t. Neuholland.

In den Verzeichnissen der belgischen Gärten wird auch eine L. tenuifolia u. thymifolia aufgeführt.

Lambertia Sm., Lambertie.

Hügelii Hook., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

ilicifolia Hook., stechhülsenblätterige, ♄. t. Neuholland.

multiflora Lindl., vielblumige, ♄. t. Neuholland.

ovalifolia Camer. (= ? *oleaefolia* H. belg.).

Lamium T., Bienensaug (Taubnessel).

bifidum Cyrill., β) cryptanthum Guss. (= *clandestinum* Auct.).

flexuosum Tenore (= *Petitinum* Gay.).

garganicum L. (= ? *Michelianum* Tausch).

hirsutum Lam. (= *grandiflorum* Pourr. = *stonoliferum* Lapeyr.).

hirtum Poir., rauher, 4. f. ?

incisum W. (= *Coesfeldiae* Boenningh. = *urticaefolium* Weihe = *purpureum* β Lam., Sm.).

intermedium Fr. (= *molucellaefolium* Fr.).

longiflorum Tenor. (= *laevigatum* DC. = *pedemontanum* Rchb.).

maculatum L. (= ? *melissaefolium* Mill. = *mutabile* Dumort. = *vulgatum* Benth.), b) albiflorum (= *niveum* Schrad.).

micranthum Weinm., kleinblumiger, ⊙. f. Brasilien.

parietariaefolium Benth. (= *molle* Hort.), glaskrautblätteriger, 4. f. ?

tomentosum W. (= *Columnae* Tenore).

Galeobdolon Crtz., Hoffm., v. Galeobdolon luteum.

Lamyra lobata Cass., *stipulacea* Cass., *triacantha* Cass. etc., v. Chamaepeuce afra, stellata, Casabonae etc., p. 186 et 187.

Lancasteria Lindl., Lancasterie, XIV. II., Acanthaceae.

parviflora Lindl., kleinblumige, ♄. w. ? Ostindien.

Lancisia bipinnata P., v. Lasiospermum radiatum, p. 447, *L. lobata* Lam., *pectinata* Thbg., v. Lidbeckia lobata et pectinata, p. 461, *L. anthemoides* Mch., v. Cotula anthemoides.

Landia Commers., Domb., *astrographa* Commers. (= *stelligera* Commers.) et *lappacea* Dombey, v. Mussaenda arcuata et Landia, p. 535.

Lanipila capensis Burch., v. Lasiospermum radiatum, p. 447.

Lansium domesticum Correa (non Blume), v. Cookia punctata, p. 217.

Lantana L., Lantane.

albopurpurea Dsf., weifspurpurfarbige, ♄. t. w. ?

amethystina Otto et Dietr. (= *nivea* var. *mutabilis* Hook.), amethystfarbige, ♄. w. ?

Digitized by Google

Lantana

cinerea Lam., aschfarbige, ♄. w. ?

crenulata Otto et Dietr. (= ? *coccinea* Lodd.), gekerbte, ♄. w. ? Südamerika.

Geroldiana Otto et Dietr., Gerold's, ♄. m. t. w. Mexico.

inconspicua Tausch, unansehnliche, ♄. w. t. ?

inermis Mill., unbewehrte, ♄. w. Jamaika.

involucrata L. (= *lanuginosa* Mill.).

lamiifolia Otto et Dietr. (= ? *hirta* Grah.), bienensaugblätterige, ♄. t. w. Mexico.

latifolia Tausch, breitblätterige, ♄. w. ?

lilacina Dsf., lilafarbige, ♄. w. Brasilien.

Moritziana Otto et Dietr., Moritz's, ♄. w. Caracas.

multiflora Otto et Dietr., vielblumige, ♄. w. ? Westindien.

nivea Vent. (= *leucantha* Hort. = *lactea* Hort.), β) niveo-Camara Hort.

odorata L. (= *suaveolens* Dsf.).

parvifolia Dsf., kleinblätterige, ♄. w. ?

salviaefolia Jacq. (= *violacea* Dsf.)

scabrida Ait. (= *crocea* Jacq.).

Sellowiana Lk. et Otto (= *longifolia* Hook.).

stricta Sw. (= *angustifolia* Mill. = *suaveolens* Poir.).

teucriifolia Otto et Dietr., gamanderblätterige, ♄. t. w. Mexico.

undulata Schrank, wellenblätterige, ♄. w. Brasilien.

urticaefolia Mill., nesselblätterige, ♄. w. Vera Crux.

variegata Otto et Dietr., bunte, ♄. w. ?

? Gartenhybriden: aurantiaca, superba, (= *Youngii* Hort.).

abyssinica A. Dietr., *achyranthifolia* Dsf., v. Lippia Schimperi et purpurea.

Lapeyrousia Pourr., Ker, Lapeyrousie.

juncea Ker (= *Ixia Gawleri* Schrad. = *Gladiolus amabilis* Salisb. = *Meristostigma junceum* Steud.), simsenförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

juncea Pourr. (= *marmorata* Pourr.), *speciosa* Hort., v. Anomatheca juncea et cruenta, p. 61.

Laplacea inaequilatera Schott. (= *semiserrata* St. Hil. = ? *lanceolata* Hort.), v. Gordonia semiserrata, p. 272 [1]).

Lappa T., Klette.

macrosperma Wallr., grofssamige, 4. f. Deutschland.

tenella Fisch. et Mey., zarte, ⊙. f. Persien.

Larbrea St. Hil., (Delarbre, franz. Botaniker), X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

aquatica St. Hil. (= *uliginosa* Rchb. = *Stellaria Alsine* Reich., Hoffm. = *St. Dilleniana* Leers = *St. fontana* Wulf. = *St. hypericifolia* Wigg. = *St. lateriflora* Krock. = *St. graminea* γ L. = *St. uliginosa* Murr.), Wasserliebende, 4. f. Europa.

β) bracteata Rchb. (= *Stellaria bracteata* Richt.).

crassifolia Rchb. (= *Stellaria crassifolia* Ehr. = *dichotoma* Web.), β) helodes (M. B.).

glauca Godr. (= *Stellaria glauca* Withr. = *St. graminea* β L. = *St. palustris* Retz), β) Dilleniana Mch., Roth, Rch.

graminea Godr. (= *Stellaria graminea* L. = *urbensis* Hoffm.).

---

1) In L. J. Makoy Extrait du Catalogue des plantes wird eine L. Makoyi erwähnt, deren Vaterland etc. mir unbekannt ist.

Digitized by Google

Larbrea
media Godr. (= *Stellaria media* Vill. = *Alsine media* L. etc.), β) latifolia (DC.) (= *St. neglecta* Weihe), γ) brachypetala (Opitz), mittlere, ⊙. f. Europa etc. Vergl. p. 786.
aquatica Sering., v. Stellaria pentagyna.

Laserpitium T., Laserkraut.
aquilegifolium Murray (non Jacq.), (= *alpinum* W. K. = *carniolicum* Bernh. = *trilobum* Crantz, non L. = *Angelica triloba* Dsf. = *Siler alpinum* Baumg. = *S. trilobum* Scop., non Crantz), ackeleiblätteriges, 4. f. Oestreich, Ungarn, Frankreich.
gallicum T., L. (= *angustifolium* L. = *angustissimum* W. = *cuneatum* Mch. = *formosum* W. = *trifurcatum* Lam.).
gummiferum Dsf. (= *polygamum* Lam. = *thapsiaeforme* Brotero = *Thapsia gummifera* Spgl.), Gummigebendes, 4. f. b. k. Portugal, Spanien.
hispidum MB. (= *Archangelica* Hortul., non Jacq. = *pilosum* W. = *nitidum* DC. H. Genev. = *Caucalis hispida* Dsf. H. Par.), steifhaariges, 4. f. Taurien, Caucasus.
laxiflorum Fisch., lockerblumiges, 4. f. Sibirien.
nitidum Zanted. (= *hirtellum* Gaud. = *pilosum* Comollio), glänzendes, ♂. 4. f. Tyrol, Schweitz, Oberital.
peucedanoides L. (= *angustifolium* Scopol.), β) uliginosum (= *Selinum uliginosum* Lk.).
pratense Ledeb., Wiesen-L., 4. f. Sibirien.
Siler L. (= *montanum* Lam. = *trifoliatum* Sieb. = *Siler lancifolium* Mch. = *S. montanum* Crantz). β) ? *lineatum* Tausch.
Steveni Fisch. et Mey., Steven's, 4. f. Caucasus.
caucasicum MB., v. Cnidium carvifolium, p. 150, II. *Chironium* L., v. Opopanax Chironium, p. 562, *dahuricum* Jacq., v. Cnidium dahuricum, *dauceides* Dsf., v. Daucus laserpitioides, *ferulaceum* et *thapsioides* Dsf., v. Prangos ferulacea et thapsioides, *meifolium* Vent., v. Lophosciadium meifolium, *meoides* Dsf., v. Elaeoselinum meoides, p. 218, II., *silaifolium* Jacq., v. Cnidium apioides, *simplex* L. (= *lucidum* Ait.), v. Gaya simplex, *trilobum* L. (= *aquilegifolium* Jacq.), v. Siler trilobum.

Lasia Lour., Lasie, XXI. IX., Aroideae.
heterophylla Schott (= ? *Dracontium spinosum* L. = *Pothos heterophylla* Roxb.), verschiedenblätterige, 4. ♄. w. Bengalen, ? Ceylon.
Lourreirii Schott (= *aculeata* Lour. = *Pothos Lasia* Roxb.), Lourreiro's, 4. w. Ostindien.

Lasiagrostis Lk., Haargras, III. II, Gramineae.
Calamagrostis Lk. (= *Achnatherum argenteum* P. B. = *Agrostis Calamagrostis* L. = *A. stipata* Koel. = *A. speciosa* Auct. = *Arundo speciosa* Schrad. = *Calamagrostis argentea* DC. = *C. speciosa* Host = *Stipa Calamagrostis* Wahlbg. = *Streptachne Calamagrostis* Dumort.), rohrähnliches, 4. f. Südeuropäische Alpen.

Lasiandra DC., Haarfaden, X. I., Lythrariae-Melastomeae.
adenostemon DC. (= *Meriania adenostemon* Schrank), drüsiger, ♄. w. Brasilien.
argentea DC. (= *Melastoma argentea* Desv. = *M. cla-*

Digitized by Google

Lasiandra

vata P. (= *Pleroma holosericeum* Don = *Rhexia holosericea* Bonpl.), silberfarbiger, ħ. ħ. w. Brasilien.

coerulea Rchb. (= *Melastoma coerulea* Hort. = *Pleroma vimineum* Don, p. 635 = *Rhexia vimines* Spgl., Bot. reg.), blauer, ħ. ħ. w. Brasilien.

Fothergillae Chamiss. (= *Rhexia Fothergillae* Schrk., Mart.), Fothergill's, ħ. ħ. w. Brasilien.

macrochiton DC. (= *Rhexia macrochiton* DC.), grofskelchiger, ħ. ħ. w. Brasilien.

oxypetala DC. (= *Pleroma oxypetala* Don), schmalkroniger, ħ. ħ. w. Peru.

petiolata Grah., gestielter, ħ. ħ. w. Brasilien.

quadrangularis Makoy, vierkantiger, ħ. ħ. w. Südamerika.

Benthamiana H. Angl., *Fontanesiana* DC., v. Pleroma Benthamianum et Fontanesianum.

Lasiopetalum Sm., Haarblume.

cordifolium Endl., herzblätterige, ħ. t. Neuholland.

corylifolium H. Kew., haselnufsblätterige, ħ. t. Neuholl.

dasyphyllum Sieber, haarblätterige, ħ. t. Neuholland.

discolor Hook., verschiedenfarbige, ħ. t. Neuholland.

Van Houtte erwähnt noch argenteum, pulchellum, uniflorum, vergl. dessen Etablissement horticole.

dumosum Hort., *macrocarpum* Hort., v. Thomasia dumosa et macrocarpa.

Lasiopogon Cass., DC., Wollbart, XIX. 2., Compositae-Corymbiferae.

muscoides DC. (= *lanatum* Cass. = *Gnaphalium muscoides* Dsf.), moosähnlicher, ☉. f. Nordafrika.

Lasiopus sonchoides D. Don, v. Dubyaea sonchoidea, p. 212.

Lasiorrhiza cinerea Don, Less., *rosea* Putpp. etc., v. Chabraea cinerea etc., p. 134.

Lasiospermum Lagasca, Haarsame.

chrithmifolium G. Don (= *Santolina crithmifolia* Hornem.), meerfenchelblätteriger, 4. f. b. k. Macedonien.

pedunculare Lagasca (= *alpinum* Rchb. = *eriospermum* G. Don = *Eriocarpa pedunculario* Lagasca).

Lasthenia Bridgesii Steud. et *obtusifolia* Cass., v. Rancagua Bridgesii et Feuillei.

Latania Commers., Bourbonpalme.

Commersonii L., Mart. (= *rubra* Jacq. = *Cleophora lontaroides* G.), Commerson's, ħ. ħ. w. Mascarenas.

Loddigesii Mart. (= *Cleophora dendriformis* Lodd.), Loddiges's, ħ. w. Westafrika, Madagascar.

Lathyrus T., L., Platterbse.

alatus Sib., Sm., geflügelte, ☉. Sch. f. Kleinasien.

americanus Mill., amerikanische, ☉. Sch. f. Vera Crux.

articulatus L. (= *hispanicus* Mill. = *speciosus* Hort.).

azureus Hort., azurblaue, ☉. Sch. f ?

chilensis Steud. (= *sessilifolius* Hook., non Tenore), chilesische, 4 Sch. k. Chili.

crassipes Gill., Hook., dickstielige, ☉. Sch. f. Bonaria.

diversifolius Presl, verschiedenblätterige, ☉. Sch. f. Sicilien.

dubius Tenore, zweifelhafte, ☉. Sch. f. Neapel.

Engelmanni Bisch., Engelmann's, ☉. Sch. f. Nordamerika (Arkansas).

Gorgoni Parlat., Gorgoni's, ☉. Sch. f. Süditalien.

grandiflorus Sibth., Sm. (= *brutius* Tenore = *Pisum bifforum* Rafin.).

Digitized by Google

Lathyrus

Halberstainii Blumg., Halberstein's, 4. Sch. f. Siebenbürgen, Banat.

inconspicuus L. (= *cassubicus* Lam. = *microanthus* Loisel. = *stans* Vivian.).

lusitanicus Mart., portugiesische, ⊙. Sch. f. Spanien.

maritimus Bigel. (= *californicus* Dougl. = *pisiformis* Hook. = *venosus* Swt. = *Pisum maritimum* L.), Meerstrand's-P., Europa, Sibirien, Nordamerika.

mexicanus Wender., mexicanische, ⊙. Sch. f. Mexico.

nervosus Lam., Bot. mag., nervige, 4. Sch. t. Südamer.

odoratus L., c) purpureus [Sicilia], d) roseus [Ceylon].

parisiensis Mill., parisische, ⊙. Sch. f. Frankreich.

pubescens Hook. Arn. (= ? *acutifolius* Vogel), weichhaarige, 4. Sch. k. f. b. Buenos Ayres.

quadrimarginatus Bory et Chaub. (= *sativus* Sibth., Sm.), vierränderige, ⊙. Sch. f. Griechenland.

sativus L., β) semimaculatus Hort., γ) semipunctatus Hort.

sessilifolius Tenor. (non Hook.), (= *attenuatus* Tenore), stiellosblättèrige, 4. Kn. Sch. f. Neapel.

siculus Steud. (= *purpureus* Presl, non Dsf.), sicilianische, ⊙. Sch. f. Sicilien.

Unbestimmtere: Langii H. Prag., lutescens Hort., sinensis Mart. ⊙.

canescens E. Mey., *oroboides* E. Mey. etc., v. Orobus canéscens, lathyroides etc., *bithynicus* Lam. (= *tumidus* W. = *turgidus* Lam.), = Vicia bithynica.

Laugeria hirsuta R. et P. etc., v. Guettarda hirsuta etc., *L. tomentosa* Sw., v. Stenostomum tomentosum.

Laureatia Neck., DC., Michelii DC., micrantha DC., minuta DC., tenella DC., v. Lobelia, Sect. V., p. 471.

Laurus T., N. E., Lorbeer.

Canella Arrab., Canella-L., ♄. w. Brasilien.

rotundifolia Wall., rundblätteriger, ♄. t. w. China, Ostindien.

aestivalis Wangenh. (= *Benzoin* W. et Hort.), *Benzoin* L. (= *Pseudo-Benzoin* Mchx.), *Diospyros* Pursh, v. Benzoin aestivale etc., p. 65, II., *albiflora* Wall, *Borbonia* L., *indica* L. etc, v. Persea carolinensis etc., *Camphora* L., *chinensis* H. Berol., *gracilis* H. Berol., v. Camphora officinarum, chinensis etc., p. 114, II., *Cassia* Auct., *Cinnamomum* L. etc., v. Cinnamomum aromaticum, zeylanicum etc., p. 144 et 145, II., *Catesbyana* Mch., v. Gymnobalanus Catesbyanus, p. 277, II., *Chloroxylon* L., v. Ceanothus Chloroxylon Nachl., *cinnamomoides* H. Berol. (= *Burmanni* N. E. = *dubia* Roxb.), v. Cinnamomum dulce Nachl., *coriacea* Sw., *foetens* Ait. etc., v. Oreodaphne coriacea foetens etc., *crassifolia* Rich. Poir., v. Ocotea puberula, *geniculata* Walt., Mchx. etc., v. Tetranthera geniculata etc., *glauca* Thbg., v. Litsaea glauca, *glauca* H. Wirceb. (= *gracilis* H. Dresd.) etc., v. Daphnidium gracile etc., p. 191, II., *glandulifera* Wall., v. Camphora glandulifera Nachl., *gratilis* Hort., v. Camphora officin. β, p. 114, II., *macrophylla* Wall. (= *Tareira* H. Makoy.), v. Cinnamomum obtusifolium, p. 144, II., *nutans* Hornem., v. Oreodaphne

Digitized by Google

Laurus

cerasus, *pendula* Sw., *thyrsiflora* Poir., v. Hafelandia pendula et thyrsiflora, p. 207, II., *papyrifera* Hort. = ?, *salicifolia* Sw., v. Aydendron salicifolium, p. 55, II., *Sassafras* L. etc., v. Sassafras officinale etc., *Tinus* Hort., v. Viburnum Tinus. — L. Tawai Hort. Makoy. Ob zur Gattung Cinnamomum gehörig?

Lavandula L., Lavendel.

abrotanoides L. (= *canariensis* Mill. = *elegans* Dsf.).
dentata L. (= ? *serratifolia* Hort.).
hybrida W. (ex L. Spica L. et pinnata L.), (= *heterophylla* Poir., H. Par., non Viv.), Bastard-L., ♄. k. ?
ovata Steud. (= *latifolia* Dsf. h. Par., non Rhrh.), eiförmiger, ♄. f. ?
pedunculata Cavan. (= *Stoechas* β Lam. W. = *Stoechas pedunculata* Mill.), gestielter, ♄. k. Spanien, Portugal, Madeira.
pinnata L., β) formosa Dietr. (= β *pubescens* Benth.).
pubescens Decaisn., weichhaariger, 4. ♄. k. Berg Sinai.
Stoechas L., β) macrostachya Ging. (= *Pseudostoechas* Rchb.).
stricta Delil. (= *coronopifolia* Poir. = *multifida* Burm.), steifer, ♄. k. Aegypten.

Lavatera T., Lavatere.

crispa H. Berol., krause, ⊙. f. Peru.
maritima Gouan (= *hispanica* Mill.).
mollis Ehrbg., weiche, ⊙. f. Aegypten.
phoenicea Vent. (= *cocoinea* Dietr.).
septemloba Hffg. (= *lusitanica* Hort., ? non L.), siebenlappige, ♄. k. ? Portugal.
subovata DC., fasteiförmige, ♄. k. Mauritanien.
unguiculata Dsf. (= *tomentosa* Dum.Cours.).

Lavauxia centaurifolia Spach, *cuspidata* Spach, *mutica* Spach, *Nuttalliana* Spach (= *triloba* Spach), v. Oenothera centaurifolia, cuspidata, acaulis, triloba.

Lavoisiera DC., (Lavoisier, berühmter franz. Chemiker, †), X. 1., Lythrarie-Melastomeae.

alba DC. (= *Rhexia alba* Schrk., Mart.), weiße, ♄. w. Brasilien.
imbricata DC. (= *Rhexia imbricata* Thbg. = *R. blepharocentra*, *ciliata* et *floribunda* Mart. herb.), ziegeldachförmige, ♄. w. Brasilien.
β) cataphracta DC. (= *Rhexia cataphracta* Schrk., Mart.).
pulcherrima DC. (= *Rhexia pulcherrima* Schrk., Mart.), schönste, ♄. w. Brasilien.

Lavradia Velloz., Lavradie.

elegantissima St. Hil. (= *Sauvagesia elegantissima* St. Hil.), zierlichste, ♄. w. Brasilien.
montana Mart. (= *glandulosa* St. Hil., p. 450).

Lawrencella Lindl., Laurencelle, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

rosea Lindl., rosafarbige, ⊙. t. m. f. Neuholland.

Lawsonia L., Lawsonie.

alba Lam. (= *Alcanna spinosa* G.), weiße, ♄. w. Ostindien, Arabien, Aegypten.
α) inermis L., β) spinosa L.

purpurea Lam., v. Wendlandia Lawsoniae.

Digitized by Google

Laxmannia RBr., Laxmannie.

grandiflora Lindl., grofsblumige, 4. k. t. Neuholland.

minor RBr., ramosa Lindl., sessilis Lindl., squarrosa Lindl., scheinen noch nicht eingeführt.

Laxmannia potentilloides Fisch., v. Colnria potentilloides, *L. fasciculata* S. G. Gmel., v. Crucianella stylosa.

Lazarolus Aria Borckh. etc., v. Sorbus Aria etc., *oxyacanthoides* Borckh., v. Crataegas Azarolus, *pollvilleriana* Borckh. v. Pyrus Bollwylleriana.

Leachia crassifolia Cass., *trifoliata* Cass., v. Corcopsis auriculata et lanceolata.

Leandra Raddi, DC., Leandra, X. 1., Lythrariae-Melastomaceae.

sericea DC. (= *Raddii* Mart. = *Osbeckia brasiliana* Schrk.), seidenhaarige, ♄. w. Brasilien.

Lebeckia Thbg., Lebeckie.

nuda Ker (= ?*aphylla* Thbg. = ?*subnuda* DC. = *Indigofera nuda* G. Don), nackte, ♄. k. t. Cap d. g. H.

pungens Thbg. (= ?*subnuda* DC. = *Acanthobotrya pungens* Eckl., Zeyh. = *Genista cuspidata* DC. = *Stiza crioloba* E. Mey.), stechende, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subternata Lk., v. Cyclopia latifolia.

Lebretonia Schrk., N. E. et Mart., Lebretonia.

semiserrata DC. (= *Pavonia semiserrata* Steud. = *Schouwia semiserrata* Schrad.), halbsägezähnige, ♄. w. Brasilien.

Lecanocarpus cauliflorus N. E. (= *nepalensis* D. Don, Fisch.) v. Acroglochin chenopodioides, p. 16.

Lechea L., Lechea.

Drummondii Spach, Drummond's, ♄. k. Texas, Florida.

verticillata W., v. Bergia trimera, p. 65, II.

Lechenaultia RBr., Lechenaultie.

biloba Lindl. (= *coelestis* Hort.), zweilippige, ♄. t. Neuholland (Schwanenfl.).

β) major Hort.

Drummondii Lindl. (= *violacea* H. Cels.), Drummond's, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).

grandiflora Lindl., DC., grofsblumige, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).

Aufserdem wachsen in Neuholland noch folgende: expansa RBr., filiformis RBr., glauca Lindl., laricina Lindl., linarioides DC., tubiflora RBr., sämmtlich ♄. Ob von diesen welche in den Gärten eingeführt worden, ist mir nicht bekannt.

Lecythis Löfll., Deckelmyrte.

Ollaria L., topfförmige (Topfbaum), ♄. w. Cumana, Brasil.

bracteata W., v. Couroupita guianensis, p. 164, II.

Ledocarpum Dsf., Juss., Cistfrucht.

chilense Dsf., Juss. (= *argenteum* Presl = *Balbisia verticillata* Cav. = *Oenothera scoparia* R. et P.), chilesische, ♄. t. Chili.

pedunculare Lindl. (= *cistiflorum* Meyen = *Balbisia pedunculuris* D. Don, p. 110 = *Cruikshanksia cistiflora* Hook.).

Ledonia heterophylla Spach, *hirsuta* Spach, *pedunculuris* Spach, *populifolia* Spach, v. Cistus heterophyllus, hirsutus, salvifolius et populifolius, p. 200 et 201.

Digitized by Google

Ledum L., canadense Lodd. (= *rosmarinifolium* Hffg.).

Lehmannia Spgl., (Dr. J. G. C. Lehmann, Professor der Botanik etc. zu Hamburg), V. 1., Solanaceae.

tomentosa Spgl. (= *Nicotiana tomentosa* R. et P.), filzige, ♄. t. Peru.

Lehmannia ocymoides Jacq., v. Moschosma ocymoides, p. 532.

Leianthus Griseb., Glattblume, V. 1., Gentianeae.

cordifolius Griseb. (= *Lisianthus cordifolius* L., p. 469 = *Tachia cordifolia* Mart., G. Don).

exsertus Griseb. (= *Lisianthus exsertus* Sw., p. 469).

longifolius Griseb. (= *Lisianthus longifolius* L., p. 466 = *L. erectus* Hort. = *Tachia longifolia* Mart., G. Don).

exaltatus Lam. (= *glaucifolius* Jacq.), *glaucifolius* Nutt., non Jacq. (= *Russelianus* Hook.), v. Eustoma exaltatum et Russelianum, p. 239, II., *nigrescens* Griseb. et *saponarioides* Griseb., v. Petastylis nigrescens et saponarioides.

Leimanthium hybridum R. et S., *virginicum* W., v. Zygadenus hybridus et virginicus, *sibiricum* L., v. Anticlea sibirica, p. 40, II., — *luteum* W. (= *pallidum* W.), v. Amiantanthus Muscaetoxicum Nachl.

Leiophyllum P., Quendelblatt, p. 452.

Lyonii Swt. (= *prostratum* Loud. = *Ammyrsine* Lyonii Swt.).

serpyllifolium DC. (= *Ledum serpyllifolium* L'Her.), ächtes, ♄. *f.* Nordamerika.

thymifolium P. (= *buxifolium* Ell. = *Ammyrsine buxifolia* Pursh).

Leiospermum parviflorum D. Don, *racemosum* D. Don, *speciosum* Hort., v. Weinmannia parviflora etc.

Lembotropis nigricans Griseb., v. Cytisus nigricans.

Lemna gibba L., v. Telmatophace gibba, *polyrrhiza* L., v. Spirodella polyrrhiza.

Lemonia Lindl. (non Pourr.), Lemonie, V. 1, Tricoccae-Rutaceae-Diosmeae.

rosea Liudl., rosafarbige, ♄. w. Antillen.

spectabilis Lindl., ansehnliche, ♄. w. Antillen.

Lennéa Lk., Kl, Otto, (Lenné, k. preuss. Gartendirector), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

robinioides Lk., Kl., Otto, (= *Calomorphe Ehrenbergiana* Kunze), robinienähnliche, ♄. t. Mexico.

? superba v. Houtte, stolze, ♄. w. ?

Lens esculenta Mch. (= *sativa* Hell.), v. Ervum Lens.

Leochilus Knwl. et Westc. [1]), Löwenlippe, XX. 1., Orchideae.

oncidioides Knwl et Westc. (= *Oncidium macrantherum* Hook.), oncidiumähnliche, 4. w. Mexico.

Leonotis RBr., Löwenohr.

Raineriana Visian., Rainer's, 4. k. Nordafrika.

Leontice altaica Pall. (= *Olivieri* Steud.), *Chrysogonum* L., v. Bongardia Olivieri et Rauwolfii, p. 73, II. et p. 127.

Leontodon Juss., Löwenzahn.

annuum DC. (= *asperum* Forsk., non Rchb.), jähriger, ☉. f. Aegypten.

Berinii Rchb. (= *Apargia arenaria* Moretti = *A. Berinii* Jan, Bartl, = *A. canescens* Sieb.).

---

1) Richtiger Leontochilus.

Digitized by Google

Leontodon I

biscutellaefolium DC. (= *Andryala lanata* Habl. = *Apargia crispa* var. *macrorrhiza* Tenore = *A. hispanica* MB., non W.), brillenschotenblätteriger, ♃. f. Italien, Taurien.

crispum Vill., β) saxatile Rchb. (= *Apargia saxatilis* Tenore = *A. tergestina* Hoppe).

hispidum L. (= *Apargia hispida* Hoffm. = *Hedypnois hispida* Sm.), β) sudeticum (Lk.), γ) ericetorum (Klett et Richt.).

squamosum Lam. (= *Apargia alpina* W. = *A. pyrenaica* Suter = *Hedypnois pyrenaica* Vill. = *Picris saxatilis* All.), β) crepidiformis Lam. (= *Gouani* Schlchr.).

asperrimum Endl., v. Asterothrix asperrima p. 100.

Leontonix Cass., Löwenschüppchen.

spathulatus Less. (= *Gnaphalium spadiceum* Lam. = *G. spathulatum* Thbg.), spatelförmiges, ♄. k. t. Cap der guten Hoffn.

declinatus * *modestus* * v. Helichrysum declinatum et Helipterum gnaphalodes.

Leontopodium P., RBr., Löwenpfötchen (Edelweiſs).

sibiricum Cass. (= *Filago leontopodioides* W. = *Gnaphalium leontopodioides* W.), sibirisches, ♃. f. Dahurien, Mongolei.

Leonurus L., Löwenschwanz (Wolfstrapp).

canescens Steud. (= *Panzeria canescens* Bunge), grauliche, ♂. f. Altaisches Sibirien.

Cardiaca L. (= *campestris* Andrzy. = *illyricus* Hornem. = *Cardiaca vulgaris* Mch.).

β) villosus Dsf. (= *canescens* Dumort. = *condensatus* Hornem. = *lacerus* Lindl. = *neglectus* Schrk.), γ) capitatus Wender., δ) crispus Murray (= *Cardiaca crispa* Mch.).

glaucescens Bunge, Ledeb., blaugrünlicher, ♃. f. Altaisches Sibirien.

lanatus Spgl. (= *Ballota lanata* L. = *Panzeria lanata* P., p. 585 = *P. tomentosa* Mch.).

Marrubiastrum L. (= *Chaiturus leonuroides* W. = *C. Marrub.* Ehrh. = *Cardiaca Marrub.* Schreb.).

sibiricus L. (= *altissimus* Bunge = *heterophyllus* Swt. = *nepalensis* Fresen. = *occidentalis* Colla = *Panzeria multifida* Mch. = *P. sibirica* Hort.).

tataricus L. (= *altaicus* Spgl. = *Panzeria tatarica* Hort. = *P. tripartita* Mch.).

Leopoldia reticulata Herb., *striatifolia* Herb., v. Amaryllis reticulata et principis.

Lepachis pinnatifida Rafin., v. Rudbeckia pinnata.

Lepanthes Sw., Rindenstendel.

sanguinea Hook., blutfarbiger, ♃. w. Jamaica.

Lepechinia clinopodifolia W., v. Mentha dahurica.

Leperiza latifolia Herb., v. Crinum latifolium.

Lepia Bonanniana Presl, *campestris* Desv., *glastifolia* Desv., *hirta* Desv., *sativa* Desv., v. Lepidium Bonannianum, campestre etc., *oppositifolia* Desv., v. Eunomia oppositifolia.

Lepicaune albida Lap., *balsamea* Lap., v. Hieracium intybaceum et amplexicaule, *tomentosa* Lapeyr., v. Senecio Doronicum, *grandiflora* Lapeyr., v. Crepis grandiflora etc.

Digitized by Google

Lepidium T., RBr., Kresse.

affine Ledeb. (= *latifolium* L. var. = *sibiricum* Schweig., Hort., non Pall.).

Armoracia Fisch. et Mey., Meerrettig-K., 4. w. Abyssin.

Bonannianum Guss., Tenore, Bonanni's ⊙. ♂. f. Süditalien.

chilense Desf., chilesische, ⊙. f. Chili.

crassifolium W. K. (= *Candollei* Desv. = *salinum* Pall. = *verrucosum* DC., P. = *Cardaria crassifolia* Spach).

desertorum Ledeb., Wüsten-K., ⊙. f. Sibirien.

diffusum DC. (= *Dilepium diffusum* Rafin.), weitschweifige, ⊙. f. Louisiana.

Iberis L. (= *diandrum* Medic. = *exiguiflorum* Clairv. = *gramineum* Lam. = *graminifolium* L. = *miscellaneorum* Schult.), β) arcuatum DC., γ) Pollichii Roth.

incisum Roth (= *obovatum* Kit. = *virginicum* Auct., non L.), β) apetalum W.

intermixtum Tenore, untermengte, 4. f. Süditalien.

lacerum C. A. Mey., schlitzblätterige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

micranthum Ledeb. (= *decumbens* Desv. = *divaricatum* Hort. = *incisum* MB., non Roth).

propinquum Fisch. et Mey., verwandte, ♂. 4. f. Caucasus.

ruderale L. (= *ibericum* Schrad.).

vesicarium L., blasige, ⊙. f. Mittelasien.

Menziesii DC., *virginicum* L., v. Cynocardamum Menziesii et virginicum, p. 180, II.

Lepidosperma LaBill., Schuppennüschen.

Rottboellii Schrad. (= *involucratum* Schrad. = *Schoenus bromoides* Lam. = *S. dactyloides* N. E. = *S. thermalis* Rottb. = *Sclerochaetium Rottboellii* N. E.), Rottboell's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Lepidostephanus Bartl., Schuppenkrönchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

madioides Bartl., madiaähnliches, ⊙. f. Californien.

Lepigonum Fries, *canadense* Fisch. et Mey., *capense* Fisch. et Mey., *glandulosum* Fisch et Mey., *macrothecum* Fisch. et Mey., *marinum* Fr., *medium* Wahlbg., *mollugineum* Bartl., *rubrum* Fr., *salinum* Swt., *salsugineum* Fisch. et Mey. et var. *leiospermum* Fisch. et Mey., *segetale* Fisch. et Mey., *sperguloides* Fisch. et Mey., *villosum* Fisch. et Mey., v. Spergularia canadensis etc. — *glutinosum* Swt., v. Holosteum liniflorum, p. 304, II.

Lepismium Pfeiff., p. 455, v. Cacteae, p. 874 et p. 99, II.

Lepistemon muricatum Spanh., v. Ipomoea chryseides, p. 419.

Leptadenia RBr., Leptadenie, V. 1., Contortae-Apocyneae.

lancifolia Decsne. (= *Cynanchum lanceolatum* Poir. = *hastatum* P.), lanzettblätterige, ♄. w. Abyssinien.

Leptandra angustifolia Lehm. (= *Meyeri* G. Don = *tubiflora* Walp.), v. Veronica tubiflora.

Leptanthus graminens Mchx., v. Heteranthera graminea, p. 297, II.

Leptarrhena crassifolia Lilja, v. Saxifraga crassifol.

Leptasea aizoides Haw., v. Saxifraga aizoides.

Lepteranthus hygrometricus Cass. et *linifolius* Webb, v. Centaurea phrygia et linifolia, p. 178.

Leptinella Cass., Leptinelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

perpusilla Fisch. et Mey., niedrige, ⊙. f. Persien.

Digitized by Google

Leptocallis armata G. Don, v. Ipomoea armata, p. 418.

Leptocaulis Nutt., DC., Schlankstengel, V. 11., Umbelliferae.

divaricatus DC. (= *Aethusa divaricata* Nutt. = *Ammi divaricatum* Mchx. = *Daucus divaricatus* Walt. = *Ligusticum pusillum* Mchx. = *Sison divaricatus* Spr. (ex parte) = *Sison pusillus* Mchx. = *Spermolepis divaricata* Rafin.), ausgespreizter, ⊖. f. Carolina.

Leptochloa P. B., Schlankspelze.

dubia N. E. (= *obtusiflora* Trin. = *Chloris dubia* H. B. K. = *Festuca obtusiflora* W. herb. = *Leptostachys dubia* Mey.), zweifelhafte, ⊙. m. f. Mexico.

gracilis N. E. (= *Chloris gracilis* H. B. K., non Durande, = *Leptostachys gracilis* Mey.), schlanke, 4. w. Quito, Brasilien.

mucronata Kunth (= *Eleusine mucronata* Mchx. = *Oxydenia attenuata* Nutt.), stachelspitzige, ⊙. f. Nordamerika.

tenerrima R. et S. (= *capillacea* P. B. = *Agrostis chinensis* Koen. = *A. virgata* W. = *Cynodon virgatus* W. E. = *Cynosurus capillaceus* P. B. = *C. capillaris* Hort. = *Eleusine tenerrima* Hornem. = *Poa chinensis* Burm. = *P. malabarica* Klein = *P. sessilis* Lam.).

arabica Kunth, v. Dineba arabica, (= aegyptiaca), *polystachya* Kunth, v. Diplachne fascicularis.

Leptocyamus Benth., Schlankbohne, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Papilionaceae.

clandestinus Benth. (= *Leptolobium clandestinum* Benth. = *Glycine clandestina* Wendl. = *Teramnus clandestinus* Spgl.), heimlichblühende, ♄. Sch. t. Neuholl.

elongatus Benth. (= *Kennedynella elongata* Steud. = *Leptolobium elongatum* Benth.), verlängerte, ♄. Sch. t. Neuholland.

microphyllus Benth. (= *Kennedynella microphylla* Steud. = *Kennedya microphylla* et *minima* Sieber = *K. Sieberiana* Hort. = *Glycine minima* W. = *Leptolobium microphyllum* Benth.), kleinblätterige, ♄. Sch. t. Neuholland.

tomentosus Benth. (= *Kennedynella tomentosa* Steud. = *Kennedya tomentosa* Hort. = *Leptolobium tomentosum* Benth.), filzige, ♄. Sch. t. Neuholland.

Leptolobium Benth. (non Vogel), v. Leptocyamus.

Leptomeria RBr., Südseethesie.

Lehmanniana Miq., Lehmann's, ♄. t. k. Neuholland.

Leptopoda brachypoda Torr. et Gr. = ? Helenium quadridentatum.

Leptormus longifolius Eckl., Zeyh., *pendulus* Eckl., Zeyh. etc., v. Heliophila longifolia, pendula etc.

Leptorhabdos Schrenk, Dünnstab, XIV. II., Personatae.

brevidens Fisch., Mey. et Lallem., kurzzähniger, ⊙. f. Asiat. Rufsland (Berg Alatau).

micrantha Schrenk, kleinblumiger, ⊙. f. Soongaria.

Leptorhynchus Less., Schlankrachler.

gracilis Walp., schlanker, ⊙. 4. t. Neuholland.

L'hotskyanus Walp., L'hotsky's, ⊙. 4. t. Neuholland.

suaveolens Benth., v. Waitzia corymbosa Wendl.

Digitized by Google

Leptosema Benth., Schlankfahne, X. 3. Leguminosae. bossiaeoides Benth., Bossiaeenähnliche, ħ. ħ. Neuholland.

Leptosiphon Benth., p. 455 et Gilia, Sect. IX., p. 263, II.

Leptospermum Forst., Südseemyrte.

acicularе S. Schauer, nadelblätterige, ħ. ħ. t. k. Neuh.
α) majus S. Schauer, β) minus S. Schauer (= *juniperinum* H. Berol., W. E.).

amboinense DC. (= *Myrtus amboinensis* Rumpf), amboinische, ħ. ħ. w. Amboina. (Kaum eingeführt.)

angustifolium Endl., schmalblätterige, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

attenuatum Sm. (= *lucidum* Hort. Belved.).

baccatum Sm. (= *juniperifolium* Cav.), β) roseum S. Schauer (= *parsciflorum* Rchb. = ? *grandiflorum* Lodd. = *purpurascens* Hort. = ? *rubriflorum* H. Angl. = *scoparium* β *roseum* H. Berol.).

Candollei S. Schauer (= *perophyllum* DC., non Cav.), Candolle's, ħ. ħ. t. k. Neusüdwallis. (Noch nicht in den Gärten eingeführt).

Celsianum Tenore (= *Metrosideros pubescens* H. Cels.), Cels's, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

ciliolatum Otto et Dietr., gewimperte, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

crassipes Lehm., dickstielige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

cuneiforme Otto et Dietr., keilförmige, ħ. ħ. t. k. Neuh.

Cunninghami S. Schauer (= *thymifolium* A. Cunn., non Hort. Cels. = *sericophyllum* S. Schauer), Cunningham's, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

cupressinum Otto et Dietr., cypressenähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

emarginatum Wendl. fil. (= *Melaleuca nervosa* Hort.).

ericoides Rich., heideähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuzeeland. (Ob eingeführt?)

flavescens Sm. (= *Melaleuca* Thea, Wendl. et Schrad. = *porophyllum* Cav. = *polygalifolium* Salisb. = *virgatum* W. herb. ex parte).

glaucescens S. Schauer (= ? *sericeum* H. Berol.), blaugrüne, ħ. ħ. t. Van Diemens Land.

gnidiaefolium DC., gnidiablätterige, ħ. ħ. t. k. Neuholland. (Noch nicht eingeführt?)

grandiflorum Lodd. (= *buxifolium* Wendl. fil. et ? Dehnh. = *L. obovatum* et *aquaticum* Hort.), grofsblumige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.
β) minus S. Schauer.

grandifolium Sm. (= *lanigerum* Cunn.), α) argyreum S. Schauer, β) vestitum S. Schauer, γ) angustum S. Schauer.

juniperinum Sm. (= *baccatum* W. E., Lk., non Sm. = *pungens* Hffg. = *recurvifolium* Salisb. = *tenuifolium* Cav. = *multiflorum* Cav. = *obliquum* Colla = *Melaleuca tenuifolia* Wendl.).

lanigerum Ait. ed. 2. (= *trinerve* White = *pubescens* Spgl. ? Sm. = *Philadelphus laniger* Ait. ed. 1. var. α *canescens*), α) discolor S. Schauer, β) concolor S. Schauer.

myrtifolium Sieb., myrtenblätterige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

obovatum Swt., verkehrteiförmige, ħ. ħ. t. k. Neuholl.

Oxycedrus S. Schauer (= *arachnoideum* H. Berol., non Sm.), cederähnliche, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

parvifolium Sm. (= *eriocalyx* Sieb.), kleinblätterige, ħ. ħ. t. k. Neuholland.

Digitized by Google

Leptospermum

pubescens Lam., W. (= *lanigerum* Sm. = *lanigerum pubescens* Poir. = *Philadelphus lanuger β piliger* Ait. ed. 1. = *tomentosum* H. Carlsr. = *sericeum* Anct. = *canescens* Wendl.).

scoparium Sm., α) Forsteri S. Sch. (= *scoparium* Forst. = *rubricaule* Lk. = *Melaleuca mucronata* Cels. = *M. scoparia α dicomatifolia* Wendl. et Schrad.), β) myrtifolium W., P., DC. (= *macrocarpum* A. Cunn. = *squarrosum* G. = *Melaleuca scoparia β myrtifolia* Wendl. et Schrad. = *Philadelphus floribundus* Usteri), γ) microphyllum S. Schauer (= *humifusum* A. Cunn.), δ) grandiflorum Hook., ε) confertifolium S. Schauer [1]).

spinescens Endl., dornige, ♄. ♄. t. k. Neuholland. (Ob eingeführt?)

splendens S. Schauer, schimmernde, ♄. ♄. t. k. Neuholl.

stellatum Cav. (= *L. Thea* W. spec. excl. Syn. = *acuminatum* Wendl.).

styphelioides S. Schauer (= *aquaticum* Hort.), Styphelia-ähnliche, ♄. ♄. t. k. Neuholland (Moretonbay).

tonsum S. Schauer (= *pubescens* Hort. = *Fabricia minor* Hort. = ? *F. incana* Dum. Cours. = *F. sericea* W. herb.), geschorene, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

tortuosum Dehnh., gedrehte, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

villosum Otto et Dietr., zottige, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

virgatum S. Schauer, non Forst. (= *acutifolium* H. Vratisl. = *paludosum* H. Berol., nec Hort. Vindob.), ruthenförmige, ♄. ♄. t. k. Neuholland.

ambiguum Sm. (= *punctatum* Hort.) etc., v. Kunzea corifolia, p. 388, II. etc., *dubium* Spgl., v. Astartea Endlicheriana, p. 50, II., ? *ellipticum* Endl., *flexuosum* Lk. (= *glomeratum* Wendl. = *resiniferum* Bertol.), *hypericifolium* Otto et Dietr. (= *theaeforme* A. Cunningh.), *linearifolium* DC., *marginatum* LaBill. (= *ovatifolium* Swt.), *salignum* Steud., v. Billiotia elliptica, flexuosa etc., p. 69 et 70, II., *umbellatum* G. = Metrosideros umbellata Cav.

Leptostachys domingensis Meyer, *filiformis* Meyer, *virgata* Meyer etc., v. Leptochloa domingensis etc. *Leptostelma maximum* D. Don, v. Erigeron maximum.

Leptotes Lindl., Schlankstendel.

serrulata ? Lindl., sägezähniger, 4. w. Südamerika.

Leptothrium lineare Kunth, v. Isochilus linearis, p. 425.

Leptothis anthemoides Hffg., v. Sphenogyne anthemoides.

Lepturus RBr., Dünnschwanz.

III. Hemarthria Kunth (= *Lodicularia* P. B.).

fasciculatus Trin. (= *Lodicularia fasciculata* P. B. = *Rottboella altissima* Poir. = *R. articulata* Thbg. = *R. fasciculata* Lam., Dsf. = *R. spathulata* Tenore), büschelförmige, 4. k. Nordafrika, Spanien, ? Süditalien.

---

1) „Ist die Thea plant der Colonisten auf Neuholland." S. Schauer.

Digitized by Google

Lepyrodiclis Fenzl, Doppelmiere, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

holosteoides Fenzl (= *Gouffeia holosteoides* Fisch. et C. A. Mey.).

stellarioides Schrenk et C. A. Mey., Stellarienähnliche, ⊙. f. Asiat. Rufsland.

Lerchea Hall., Medic., *altissima* Medic., v. Schanginia altissima, p. 729, *frutiosa* Mch. (= *obtusifolia* Hall.), *salsa* Medic., v. Schoberia fruticosa, salsa.

Leria nutans DC. (= *lyrata* Cass., p. 457).

Leschenaultia RBr., Benth. = **Lechenaultia**.

Lespedezia fruticosa P. (= *frutescens* DC.), reticulata P. (= *angustifolia* Rafin., non Nutt. Ell. = *sessiliflora* var. Mchx.), p. 457.

Lessertia DC., Lessertie.

virgata Lk., Otto, ruthenförmige, ⊙. ♄. m. f. k. Cap der guten Hoffnung.

Lettsomia Roxb. (non R. et P.), *argentea* Roxb., *cuneata* Roxb., *hispida* Hook., *nervosa* Roxb., *pomacea* Roxb., *setosa* Roxb., *splendens* Roxb., *strigosa* Roxb., v. Argyreia argentea etc., p. 43 et 44, II., — *bona nox* Roxb., *ornata* Roxb., *uniflora* Roxb., v. Rivea bona nox, ornata et hypocrateriformis.

Leucadendron Herm., Boerh., RBr., Silberbaum.

callosum Hffg. (= *Protea callosa* Wendl.), schwieliger, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

flavescens Lk. (= *Protea flavescens* W. E.), gelblicher, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Levisanus Berg. (= *hirsutum* Hffg.).

lineare RBr. (= *Protea linearis* Houtt.), gleichbreitblätteriger, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

marginatum Lk. (= *Protea ciliaris* Wendl. = *P. ciliata* H. angl. = *P. marginata* W. E.).

odoratum RBr. (= *Protea odorata* Thbg.), wohlriechender, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

pyramidale Steud. (= *Protea pallens* γ Thbg.), pyramidenförmiger, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

salignum RBr. (= *inflexum* L. = *Euryspermum sericeum* Salisb.).

sessile RBr., ungestielter, ♄. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Leucaena Benth., Weifsfaden, XVI. VIII. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

diversifolia Benth. (= *Acacia diversifolia* Schltdtl. = *A. trichandra* Zuccar., p. 4, II.), verschiedenblätteriger, ♄. ♄. t. Mexico.

glauca Benth. (= *Acacia glauca* W., p. 3 = *A. biceps* W. = *A. frondosa* W. = *A. leucocephala* Lk. var.).

pulverulenta Benth. (= *Acacia pulverulenta* Schltdl.), bestaubte, ♄. ♄. t. Mexico.

trichodes Benth. (= *Acacia trichodes* W., p. 6, = *A. pseudo-trichodes* DC.).

Leucas RBr., Weifslippe.

decemdentata Sm. (= *stachyoides* Spgl. = *Ballota pilosa* Lour. = *Phlomis decemdentata* W. = *Stachys decemdentata* Forst.), zehnzähnige, ⊙. m. f. Südasien, Gesellschaftsinseln.

flaccida RBr. (= *melissaefolia* Benth. = *parviflora* Benth.).

helianthemifolia Dsf. (= *rufescens* Benth.), sonnenroseblätterige, ♄. w. Ostindien.

Digitized by Google

Leucas
hirta Spgl. (= *helianthemifolia* Benth., non Dsf.), rauhe, ☉. 4. m. f. w. Ostindien.
linifolia Spgl. (= *lavandulaefolia* Sm. = *Leonurus indicus* Burm.).
ovata Benth. (= ?*Hemistoma ovatum* Ehrenb.), eiförmige, ♂. 4. ♄. w. Ostindien.
Schimperi Hochst., Schimper's, ☉. m. f. Abyssinien.
urticaefolia RBr. (= *affinis* RBr. = *membranacea* Benth. = *Hemistoma ovatum* Ehbg. = *Phlomis urticaefolia* Vahl), nesselblätterige, ☉. m. f. Ostindien, Arabien.

Leuchaeria Lagasca (= *Leucaeria* et *Leuceria* Auct.), Leuchaerie, XIX. IV., Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).
senecioides Hook. Arn. (= *Chabraea elongata* Bertero = *Trixis senecioides* Hook.), kreuzkrautähnliche, ☉. f. Chili.
Bridgesii Hook., Arn., *cinerea* Don, *Cummingii* Hook. Arn., *runcinata* Gill. et Don, v. Chabraea tomentosa, cinerea etc., p. 134, II.

Leucocoryne Lindl., Weifsknöpfchen.
ixioides Lindl. (= *Brodiaea ixioides* Sims = *Anthocercosodorum* Bertero), p. 459.
Leucolaena rotundifolia Benth., v. Xanthosia rotundifolia.

Leucophyllum H. B. K., Weifsblatt, XIV. II., Personatae.
ambiguum H. B. K., zweifelhaftes, ♄. t. Mexico.

Leucopogon RBr., Weifsbart.
acuminatus RBr. (= *Styphelia acuminata* Spgl.), zugespitzter, ♄. t. Neuholland.
affinis RBr., ähnelnder, ♄. t. Neuholland.
angustatus Benth., verschmälerter, ♄. t. Neuholland.
attenuatus Cunn., verdünnter, ♄. t. Neuholland.
australis RBr., südlicher, ♄. t. Neuholland.
ciliatus Cunn., gewimperter, ♄. t. Neuholland.
Cunninghamii RBr., Cunningham's, ♄. t. Neuholland.
cuspidatus RBr. (= *Styphelia cuspidata* Spgl.), feinspitziger, ♄. t. Neuholland.
daphnoides H. angl. et belg., kellerhalsähnlicher, ♄. t. Neuholland.
Drummondii DC., Drummond's, ♄. t. Neuholland.
floribundus Hort. angl. et belg., blüthenreicher, ♄. t. Neuholland.
Fraseri A. Cunn., Fraser's, ♄. t. Neuholl., Neuseeland.
imbricatus RBr. (= *Styphelia imbricata* Spgl.), ziegeldachförmiger, ♄. t. Neuholland.
lanigerus Cunn., wolliger, ♄. t. Neuholland.
multiflorus RBr. (= *Styphelia multiflora* Spgl.), vielblumiger, ♄. t. Neuholland.
parviflorus Lindl. (= *lanceolatus* Sieb. = *polystachyus* Lodd., non RBr. = ?*Richei* RBr. = *Styphelia Gnidium* Vent. = *St. parviflora* Andr.), kleinblumiger, ♄. t. Neuholland.
polystachyus RBr. (= *Styphelia polystachya* Spgl.), vielähriger, ♄. t. Neuholland.
ramulosus Cunn., ästiger, ♄. t. Neuholland.
reflexus RBr. (= *Styphelia reflexa* Spgl. = *S. Brownii* Spgl.), zurückgebogener, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Leucopogon
revolutus RBr. (= *Styphelia revoluta* Spgl.), zurückgerollter, ♄. t. Neuholland.
rigidus Cunn., starrer, ♄. t. Neuholland.
squarrosus Benth., sparriger, ♄. t. Neuholland.
tamariscinus RBr. (= *Styphelia tamariscina* Spgl.), tamariskenähnlicher, ♄. t. Neuholland.
laurinus Hort., v. Trochocarpa laurina.

Leucorchis E. Mey., Weifsorche, XX. 1., Orchideae.
albida E. Mey. (= *Gymnadenia albida* Rich., p. 363 = *Peristylus albidus* Lindl. = *Habenaria albida* RBr. = *Orchis albida* Sw. = *Platanthera albida* Lindl. = *Satyrium albidum* L.).

Leucospermum RBr., Weifssaame.
buxifolium RBr. (= *Protea buxifolia* Poir. = *P. villosa* W. herb.), buchsbaumblätteriger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
diffusum RBr. (= *Protea heterophylla* Thbg.), weitschweifiger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
oleaefolium RBr. (= *Protea criniflora* L. = *P. crinita* Jacq. = *Leucadendron oleaefol.* Berg.), oelbaumblätteriger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Leucothamnus Lindl., Weifsstrauch, V. 1., Buettneriaceae.
montanus Lindl., Berg-W., ♄. t. Neuholland. (Ob kult.?)

Leuzea DC. (= *Leucea* Auct.), Leuzea.
carthamoides DC. (= *Cirsium carthamoideum* Lk. = *Cnicus cartham.* W. = *Halocharis carthamoides* MB.), *β*) altaica DC.
pinnatifida DC. (= *Malacocephalus pinnatifidus* Tausch), fiederspaltige, 4. f. ?
Leyssera ciliata Thbg., v. Mairia taxifolia, *polifolia* Thbg., v. Printzia Bergii.

Liatris Schreb., G., Prachtscharte.
aspera Mchx. (= *Anonymus ramosus* Walt.), rauhe, 4. f. b. Carolina.
cylindracea Mchx. (= *monocephala* Cass. = *stricta* Macnab).
elegans W. (= *Eupatorium speciosum* Vent. = *Serratula speciosa* Ait. = *Stachelina elegans* Walt.).
graminifolia W., *β*) pilosa Pursh, *γ*) turbinata Swt.
macrocarpa Hort. belg, grofsfrüchtige, 4. f. b. Nordam.
marginata Cass. (= *cylindracea* var. *glabra* Mchx.), berandete, 4. f. b. Nordamerika.
pilosa W. (= *hirsutissima* Poir. = ? *monocephala* Cass.).
propinqua Hook., verwandte, 4. f. b. ?
pycnostachya Mchx., b) fl. roseo.
secunda Ell., einseitige, 4. f. b. Carolina.
sphaeroidea Mchx. (= *scariosa* Bot. mag., non W. = *Suprago sphaerocephala* Cass.).
spicata W. (= *gracilis* Lodd., non Mchx. = ? *Linaria* Rafin. = *picta* Bartr. = *Suprago spicata* G.).
tomentosa Mchx., filzige, 4. f. b. Virginien, Carolina.

Libanotis Crtz., Hoffm., Weihrauchwurz.
athamanthoides DC. (= *Athamantha caucasica* Hort. = *Ligusticum athamanthoides* Spgl.), Vaterland unbekannt.
buchtormensis DC. (= *Athamantha cervariaefolia* Schrad. = *A. rigida* Fisch., Hornem. = *Bubon buchtormensis* Fisch. = *Seseli buchtormense* K., p. 749).
gracilis Rchb., schlanke, 4. f. Tyrol.

Digitized by Google

Libanotis
Patriniana DC. (= *graveolens* Don = *Seseli graveolens* Ledeb.), Patrin's, 4. f. Alt. Sibirien.
Stephaniana DC. (= *Athamantha compacta* Ledeb. = *A. monstrosa* Steph., W. = *Ligusticum athamanthicum* Adams), Stephani's, ♂. 4. f. Alt. Sibirien.
tenuifolia DC. (= *Athamantha tenuifolia* Pall. = *Peucedanum salinum* Spgl.), dünnblätterige, 4. f. Alt. Sibirien.
vulgaris DC. (= *athamanthica* G. M. S. = *daucoides* Scopol. = *montana* All. = *Riviniana* Scopol. = *Athamantha Libanotis* L. = *A. Riviniana* Host, = *Seseli Libanotis* K.), β) pubescens DC. (= *Athamantha pubescens* Retz), γ) daucifolia DC. (Rchb.), (= *Ammi daucifolium* Scopol. = *Athamantha crithmoides* Lapeyr. = *A. daucifolia* Host, = *A. Libanotis γ exaltata* Gaud. = *A. pyrenaica* Jacq. = *Crithmum pyrenaicum* L.), δ) condensata DC. (Fisch. et Mey.), (= *Athamantha condensata* L.), ε) sibirica K. (C. A. Mey.), (= *Athamantha sibirica* L. = *? Seseli athamanthoides* Ledeb.).
verticillata DC. (= *Athamantha verticillata* Sibth., Sm.), wirtelförmige, 4. f. b. Griechenland (Parnassus).
cachroides DC., v. Phlojodicarpus dahuricus, *rupestris* Scopol., v. Turbith Matthioli.

Lichtensteinia Cham., Schltdl. (Lichtenstein, Prof. zu Berlin, berühmt als Reisender u. Zoolog), V. 11., Umbelliferae.
inebrians Eckl., Zeyh. (= *Oenanthe inebrians* Thbg., p. 554).
lacera Cham., Schltdl. (= *Hermas rudissima* Rchb. = *Oenanthe exaltata* Thbg.), schlitzblätterige, 4. k. Cap der guten Hoffn.
Lichtensteinia laevigata W. et *undulata* W., v. Ornithoglossum glaucum et Lichtensteinii. — *Lichtensteinia oleaefolia* Wendl., v. Loranthus oleaefolius.

Lidbeckia lobata Thbg. (= *quinqueloba* Cass.), pectinata Berg. (= *capensis* Gmel.). Vergl. p. 461.

Lightfootia L'Her., Lightfootie.
subulata L'Her. (= *sessiliflora* Spgl. = *? Campanula fruticosa* L.).
tenella A. DC. (= *fasciculata* Eckl., non Spgl. = *Campanula tenella* L. fil. = *Roella filiformis* Poir., non Lam. = *R. glabra* Poir. = *R. recurva* Bank's herb.), zarte, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Ligularia Cass., Bandblume.
geifolia DC. (= *Cineraria geifolia* C. A. Mey.), Nelkenwurzblätterige, 4. f. Caucasus.
β) renifolia DC. (= *Cineraria renifolia* C. A. Mey.).
gigantea Sieb. et Zuccar. (= *Tussilago japonica* Hort., non L.), riesenhafte, 4. k. Japan.
Kämpferi Sieb. et Zuccar. (= *Senecio Kaempferi* DC. = *Arnica tussilaginea* Burm. = *Tussilago japonica* L.), Kämpfer's, 4. k. Japan.
Reichenbachii Steud. (non sibirica nec speciosa sec. Fisch. et Mey. = *Hoppea speciosa* Rchb.), Reichenbach's, 4. f. ?
robusta DC. (= *Cineraria robusta* Ledeb.), starke, 4. f. Alt. Sibirien.

Digitized by Google

Ligularia

speciosa Fisch. et Mey. (= *sibirica δ speciosa* DC. = *Cineraria Fischeri* Ledeb. = *C. speciosa* Fisch., Schrad.), prächtige, 4. f. Sibirien.

thyrsoidea DC. (= *Cineraria thyrsoidea* Ledeb. = *Senecio sibiricus* Lepech.), straussförmige, 4. f. Alt. Sibir. *Ligularia canescens* Swt., *hirta* Eckl., Zeyh., *trifida* Eckl., Zeyh., v. Pelargonium incisum, hirtum, tripartitum, p. 596 et 598. — *Ligularia sarmentosa* Duval, v. Diptera sarmentosa, p. 207 II. et 724.

Ligusticum T., K., Möhrenwurz.

discolor Ledeb. (= ? *peloponnesiacum* Pall.), verschiedenfarbige, ♂. f. Alt. Sibirien.

multifidum Sm., vieltheilige, 4. f. Sibirien.

pyrenaicum Gouan, K. (= *lucidum* Mill. = *Cnidium pyrenaeum* Spgl. = *Seseli aristatum* Ait. = *S. ferulaefolium* Poir. = *Thyselinum nigrum* Mch.).

tripartitum Dumort., dreitheilige, 4. f. Belgien.

actaeifolium Mchx. (= *barbinode* Mchx.), v. Thapsium barbinode, *alpinum* Spgl., v. Bunium alpinum, p. 82, II., *alsaticum* Lk., v. Peucedanum alsaticum, p. 610, *apiifolium* Dsf. (= *apioides* Lam. = *cicutaefolium* Vill. = *Lobelii* Vill. = *silaifolium* Gaud.), *dauricum* Jacq., v. Cnidium apioides et dahuricum, p. 208, *aquilegifolium* W., v. Physospermum aquilegifolium, *austriacum* L., v. Pleurospermum austriacum, *balearicum* L., v. Kundmannia sicula, p. 337, II., *Brunonis* Wall., v. Hymenolaena Brunonis, p. 309, II., *Bunius* Lk., v. Ptychotis heterophylla, *carniolicum* Host, v. Malabaila Hacquetii, *cicutarium* Lam., v. Molopospermum cicutarium, p. 528, *condensatum* Spgl., v. Libanotis vulgaris δ, *decussatum* Mch., v. Palimbia Chabraei, *divaricatum* Ledeb., *Fischeri* Lk. (= *longifolium* W.), v. Coenolophium Fischeri, p. 876, *Foeniculum* Roth, v. Foeniculum vulgare. *Meum* Lam., v. Meum athamanticum, p. 522, *minus* Lam., v. Cnidium Monnieri, p. 208, *Phellandrium* Crtz, v. Oenanthe Phellandrium, s. Phellandrium aquaticum, p. 614, *pusillum* Mchx., v. Leptocaulis divaricatus, p. 351, II., *sibiricum* Spgl., v. Libanotis vulgaris ε, *Silaus* Duby, Lk., *arenarium* Lk., v. Silaus pratensis et tenuifolius, *splendens* Lapeyr. (= *tenuifolium* Ram.), v. Wallrothia tenuifolia. Hiernach p. 462 zu ergänzen und zu berichtigen.

Ligustrum T., Rheinweide (Liguster).

bracteolatum D. Don, deckblätteriger, ħ. ħ. k. Nepal.

Perrottetii A. DC., Perrottet's, ħ. t. Ostindien. (Wohl noch nicht eingeführt.)

Unbestimmt: coriaceum Nois. Hortul.

Lilac persica Lam. (= *minor* Mch.), *vulgaris* G., v. Syringa persica et vulgaris.

Lilacum rothomagense Reyn., v. Syringa chinensis.

Liliastrum album Lk., v. Czackia Liliastrum.

Lilium T., L., Lilie.

Brownii v. Houtte, Lemaire, Scheidw. (= *japonicum* Auct.), Brown's, 4. Zw. f. b. Japan.

bulbiferum L., α) umbellatum Parkins., β) latifolium Fisch. et Mey. (= β *umbellatum* Ker = *latifolium* Lk. Enum.), γ) racemosum Besl. H. Eyst.

Digitized by Google

Lilium

callosum Zaccar. (= *pomponium* Thbg., non L.), schwielige, 4. Zw. f. b. k. Japan.

canadense L. (= *coccineum* Curt. = *flavum* Curt.), *β)* penduliflorum Red. (= *pendulum* Hort.).

candidum L., f) foliis marmoratis, g) foliis variegato argenteis, h) fol. varieg. aureis, i) flore sanguineo.

concolor Salisb., *β)* uniflorum Kunth.

croceum Chaix (= *aurantiacum* Don, H. Angl.), safranfarbige, 4. Zw. f. Schweiz, Norditalien, Frankreich.
b) foliis variegatis.
β) sevotianum Fisch., Mey., Lallem. (= *bulbiferum* Vill.), *γ)* humile Fisch., Mey. et Lallem. (Mill.), (= *pumilum* Hort.).

dauricum Ker (= *Catesbaei, pensylvanicum* et *philadelphicum* Hort.).

eximium Courtois (= *speciosum* Siebold, non Thbg. = *longiflorum, macranthum* et *speciosissimum* Hort.).

isabellinum Kunze (= *peregrinum* Hort., non Mill.), isabellfarbige, 4. Zw. f. ? Orient.

Loddigesianum R. et S. (= *monadelphum* Ker, Lodd., non MB.), Loddiges's, 4. Zw. f. Caucasus.

Martagon L., *e)* fol. aureo variegatis, *f)* superbum Hort.

pomponium L. (= *rubrum* Lam.), *β)* angustifolium Mill.

pulchellum Fisch., schöne, 4. Zw. f. Dahurien.

pumilum Redout. (= *linifolium* Hornem. = *uniflorum* H. Angl.), kleine, 4. Zw. f. Davuria.

pyrenaicum Gouan (= *flavum* Lam.), *α)* brevifolium Fisch., Mey. et Lallem., *β)* longifolium Fisch., Mey. et Lallem.

sibiricum W. (= *Buschianum* Lodd.).

speciosum Thbg. (= *versicolor* Kämpf.), *α)* albiflorum Hook. (= *Brousaartii* Hort.), *β)* punctatum Hort. (= ? *a Kaempferi* Kunth), *γ)* roseum Paxt., *δ)* rubrum Hort.

spectabile Fisch., Lk. (= *pensylvanicum* Ker = *bulbiferum γ* Ait.), ansehnliche, 4. Zw. f. Ostsibirien, Kamtschatka.

superbum Lam., *β)* pyramidale van Houtte.

Szovitsianum Fisch. et Lallem., Szovits's, 4. Zw. f. Colchis.

testaceum Lindl. (= *excelsum* v. Houtte), scherbengelbe, 4. Zw. f. b. k. Japan.

Thomsonianum Lindl. (= *roseum* Wall. = *Fritillaria Thomsoniana* Royle), Thomson's, 4. Zw. k. Nordindien.

tigrinum Ker (= *pomponium* Lour., non L. = *speciosum* Andr. = *sinense* Hort.).

venustum H. Berol., liebliche, 4. Zw. f. b. ? Japan.

Wallichianum R. et S. (= *longiflorum* Wall., Don), Wallich's, 4. Zw. k. Nepal.
β) suaveolens Kunth (= *uniflorum* Bot. reg.)

Gartenhybriden: hybridum Claudianum, coccineo-rubrum v. Houtte, croceo-rubrum v. Houtte, Don Juan, Duc de Devonshire, Duc de Wellington, fulgidum v. Houtte, grandiflorum v. Houtte, immaculatum v. Houtte, Louis Philipp, multiflorum, Napoleon, Prince Albert, pubescens Berah., punctatum v. Houtte, punctatum superbum v. Houtte, Rubens, Talisman, Titien, Vulcain, Voltaire.

Noch nicht eingeführte: cordifolium Thbg. (= *Hemerocallis cordata* Thbg.), 4. Zw. Japan, elegans Thbg.,

Digitized by Google

Lilium

4. Zw. Japan, giganteum Wall. (= cordifolium Don), 4. Zw. Nepal.

Unbestimmtere: persicum Fisch., praecox Lodd., recurvum H. Belved.

affine Schult., *camtschatcense* L. (= *quadrifoliatum* E. Mey.), *pudicum* Pursh, v. Fritillaria lanceolata, camtschatcensis, pudica, p. 338 et p. 248, II. *Limbarda* Adans., *tricuspis* Cass., v. Inula crithmoides L., p. 417 et p. 317, II.

Limnanthemum Gmel., Griseb., Schlammblümchen, V. r., Contortae-Gentianeae.

geminatum Griseb. (= ? *Villarsia geminata* RBr., p. 848 = *V. sarmentosa* Sims).

Humboldtianum Griseb. (= *Menyanthes brasilica* Arrab. = *M. indica* Aubl. = *M. meridionalis* W. herb. = *Villarsia Humboldtiana* H. B. K., p. 848. = *V. platyphylla* St. Hil. = ? β *V. cordata* Ell.).

indicum Griseb. (= *Menyanthes ceramica* Hamilt. = *macrophylla* Roth = *M. indica* L. = *sinuata* Hamilt. = *Villarsia indica* Vent., p. 848 = *V. macrophylla* R. et S.).

lacunosum Griseb. (= *Menyanthes punctata* Mühlbg. = *M. trachysperma* Mchx. = *Villarsia lacunosa* Vent., p. 848).

nymphoides Lk. (= *peltatum* Gmel. = *Menyanthes nymphaeoides* L. = *Nymphoides europaea* Fisch. = *Villarsia nymphoides* Vent., p. 848 = *Waldschmidtia nymphoides* Wigg.).

Thunbergianum Griseb. (= *Menyanthes indica* Thbg. = *Villarsia indica* Ait.), Thunberg's, 4. Wa. w. Cap d. g. Hoffn.

Limnanthes RBr., Douglasii RBr. (= *anemonefolius* Hort.), p. 464.

Limnia alsinoides Haw., *perfoliata* Haw., *sibirica* Haw., v. Claytonia alsinoides etc. p. 148, II. et 202.

Limnocharis H. B. K., Plumieri, L. C. Rich. (= *emarginata* H. B. K. = *Alisma flava* L. = *Damasonium maximum* Burm.), p. 464.

Humboldtii L. C. Rich., v. Hydrocleis Humboldtii, p. 308, II.

Limodorum T., Dingel.

falcatum Sw. (= *Orchis falcata* Thbg.), sichelförmiger, 4. t. w. Japan.

barbatum Lam. (= *pulchellum* Salisb. = *tuberosum* L.), v. Calopogon pulchellus, p. 149, *barbatum* Sw., *longicornu* Sw., *pulchrum* Pet. Thrs., *triste* Sw., v. Eulophia barbata etc., p. 319 et p. 236, II., *eburneum* W., *luridum* Sw., v. Aërides eburneum, luridum, p. 309, *ensatum* Thbg., v. Cymbidium ensifolium, p. 242, *Epipogium* W., v. Epipogium Gmelini, p. 291, *falcatum* Bot. Mag., v. Oeceoclades falcata, p. 553, *flos-aeris* Sw., v. Aërides arachnites, p. 21, *giganteum* Thbg., v. Cyrtopera gigantea, p. 184, II., *hyacinthinum* Don (= *striatum* Thbg.), v. Bletia hyacinthina, p. 125, *Incarvillei* Sw. (= *Tankervilliae* Ait.), v. Phajus grandiflorus, *nutans* Roxb., v. Geodorum purpureum, p. 352, *purpureum* Red. v. Bletia florida, p. 125 *retusum* Sw., v. Saccolobium retusum, *tuberosum*

Digitized by Google

Limodorum

Jacq. (= *verecundum* Sm.), v. Blatia verecunda, p. 125, *veratrifolium* W. (= *ventricosum* Steud.), v. Calanthe veratrifolia, p. 145.

Limonanthe Lk., v. Agraphis, p. 14, II.

Limonia L., Limonie.

acidissima L. (= *crenulata* Roxb.).

laureola DC., lorbeerähnliche, ♄. t. Nepal.

citrifolia Roxb. (= *parviflora* Sims = *parvifolia* Auct. = ?*microphylla* Voigt.), v. Glycosmis citrifolia, p. 267, II.

Limonium africanum Mill., *cordatum* Mill., *echioides* Mill., *fruticosum* Mill., *oleaefolium* Mill., *reticulatum* Mill., *siculum* Mill., *sinuatum* Mill., *tataricum* Mill. (= *latifolium* Mch.), *vulgare* Mch. (= *humile* et *narbonnense* Mill.), v. Statice Thouini, cordata, echioides, cylindrifolia, oleaefolia, reticulata, monopetala, sinuata, tatarica, Limonium, p. 785.

Linanthus dichotomus Benth., v. Gilia, Sect. VI., p. 263, II.

Linaria T., Frauenflachs (Leinkraut).

acutangula Tenore, spitzwinkeliger, ♃. f. Nepal, Griechenland.

aegyptiaca Dum. Cours. (= *spinescens* Spgl. = *Antirrhinum aegyptiacum* L. = *A. spinescens* Vivian.), aegyptischer, ♃. ♄. k. Nordafrika.

albifrons Spgl. (= *Antirrhinum albifrons* Sibth., Sm.), weifslicher, ⊙. f. Griechenland.

alsinaefolia Spgl. (= *Antirrhinum alsinaefolium* Viv.), mierenblätteriger, ⊙. f. Sardinien, Arabien, Kleinasien.

amethystea Hffg. et Lk. (= *multipunctata* Hffg. et Lk. = *Antirrhinum amethysteum* Lam. = *A. subalpinum* Brot. = *A. elegans* P. = *A. bipunctatum* Cavan., non L. = *A. multipunctatum* Brotero).

aparinoides Chav. (= *reticulata* Rchb., non Dsf. = *stricta* Gussone = *heterophylla* Dsf. = *Antirrhinum aparinoides* W. = *A. strictum* Sm. et Sibth. = *A. multicaule* Tenore, non L.), klebkrautähnlicher, ⊙. f. Griechenland, Sicilien, Nordafrika.

armeniaca Chav. (= *calcarata* Scheele = *segetalis* C. Koch), armenischer, ⊙. f. Armenien, Georgien, Caucasus.

Boissieri Walp. (= *ramosissima* Boiss.), Boissier's, ⊙. f. Spanien.

caesia DC. (= *Antirrhinum caesium* Lag., DC. = *A. aerugineum* Gouan), hechtfarbiger, ⊙. ♂. f. Spanien.

capensis Dsf., capischer, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

concolor Griseb. (= *Antirrhinum supinum* Sibth. et Sm.), einfarbiger, ♃. k. Macedonien, Thracien.

corifolia Dsf., corieblätteriger, ♃. f. Orient.

Cymbalaria Mill., b) foliis variegatis.

dalmatica Buchsb., Mill. (= *grandiflora* Dsf.).

delphinioides Gay, ritterspornähnlicher, ⊙. f. Spanien.

elegans Dsf. (= *Antirrhinum elegans* P.), zierlicher, ⊙. f. Spanien.

fasciculata Otto, büschelförmiger, ⊙. f. ?

fruticosa Dsf. (= *Antirrhinum fruticosum* W.), strauchiger, ♄. k. Nordafrika.

genistifolia Mill., β) procera Curt. (= *chloraefolia* Rchb.), γ) silenifolia Fisch., Rchb. (= *hians* Fenzl).

Digitized by Google

Linaria

glandulifera Tenore, drüsentragender, ⊙. f. ?

glauca Spgl. (= *bipunctata* Dum. Cours. = *Antirrhinum glaucum* L. = *A. bipunctatum* L., non Cavan. = *A. capitellatum* Lam.), blaugrüner, ⊙. f. Portugal, Spanien.

graeca Chav. (= *Antirrhinum graecum* Bory et Chaub.), griechischer, ⊙. f. Griechenland, Süditalien, Istrien, Nordafrika.

hepaticaefolia Duby (= *Antirrhinum hepaticaefolium* Poir.), leberkrautblätteriger, 4. f. Corsica.

Haelava Chav. (= *Antirrhinum Haelava* Forsk.), Haelava-F., ⊙. f. Aegypten.

hirta Mch. (= *villosa* Mill., non DC. = *Antirrhinum hirtum* L. = *A. viscosum* Bot. mag., non L.).

laxiflora Dsf. (= *Antirrhinum laxiflorum* W.), lockerblumiger, ⊙. f. Nordafrika.

linogrisea Hffg. et Lk. (= *incarnata* Spgl. = *Antirrhinum incarnatum* Lam. = *A. sapphirinum* β P.), leingrauer, ⊙. f. Spanien, Portugal.

macroura MB. (= *Antirrhinum linifolium* Pall. = *A. macrourum* MB.), β) Besseriana Chav., Rchb., γ) hepatica Bunge.

minutiflora C. A. Mey., kleinblumiger, ⊙. f. Caucasus.

odora Fisch. (= *juncea* Rchb. = *Loeselii* Schweig. = *maritima* Rchb. = *Antirrhinum junceum* Pall., non L. = *A. odorum* MB.), wohlriechender, 4. f. West-, Ost- u. Südeuropa, Altai.

β) minor Bunge (= *praecox* Bunge), γ) brachyceras Bunge.

pallida Tenor. (= *apennina* Tausch = *Antirrhinum pubescens* Tenor.), bleicher, 4. f. Süditalien.

pauciflora Bonpl., wenigblumiger, ⊙. f. Spanien, Portugal.

pedunculata Spgl. (= *transtagana* Spgl. = *Antirrhinum pedunculatum* L.), gestielter, 4. k. Südspanien.

persica Chavan. (= *rytidosperma* Boiss. = *Antirrhinum rytidospermum* Fisch. et Mey., p. 40, II. = *A. rytidocarpum* G. Don), persischer, ⊙. f. Sibirien, Caucasus, Syrien, Persien.

pilosa DC. (= *pubescens* Presl = *Antirrhinum pilosum* L.), β) pauciloba A. DC. (= *asquitriloba* Bot. mag. excl. synon. Vis.).

praecox Bunge, Ledeb., früher, 4. f. Alt. Sibirien.

purpurea Mill. (= *purpurascens* Hornem.).

ramosissima Wall., ästigster, ♄. t. Ostindien.

rubrifolia Rob. et Cast., rothblätteriger, ⊙. f. Südfrankreich, Sardinien, Sicilien.

sapphirina Hffg. et Lk., sapphirfarbiger, ⊙. f. Portugal.

saxatilis DC., Hffg. et Lk. (= *glutinosa* Hffg. et Lk. = *Peressii* Gay = *Antirrhinum saxatile* L. = *A. Tournefortii* Poir. = *A. lagopodioides* L. fil.).

semiglabra Salzm., halbkahler, ⊙. f. Malaga.

spartea Hffg., Lk., β) ramosissima Benth. (= *juncea* Chav. = *mesantha* Hffg., Lk. = *Antirrhinum virgatulum* Brotero).

striata DC. (= *Cymbalaria* Tausch = *decumbens* Mch. = *monspessulana* Dum. Cours. = *repens* Steud. = *stricta* Hornem. = *Antirrhinum monspessulanum* L. = *A. galioides* Lam. = *A. striatum* Lam. = *A.*

Digitized by Google

Linaria

repens L.), β) *conferta* Benth. (= *procera* DC. Cat. hort. monspel. (= *Antirrhinum confertum* Jan).
supina Dsf. (= *filiformis* Mch. = *glaucophylla* Hffg. et Lk.), β) pyrenaica DC., Duby (= *Antirrhinum dubium* Vill. = *A. pyrenaicum* Roem.), γ) maritima DC., Duby (= *Antirrh. maritimum* Poir.).
triquetra H. Hafn., dreiseitiger, ⊙. f. ?
tristis Mill., c) unicolor Hort.
venosa Lindl., aderiger, 4. f. Gegend des caspischen Meeres, Cabul.
vulgaris Mill. (= *speciosa* Tenore = *acutiloba* Fisch., Rchb. = *elongata* Dumort. = *pensylvanica* Scheele = *Antirrhinum Linaria* L. = *A. glandulosum* Lej.), γ) Biebersteinii Bess.

Lindenbergia Lindenbergie.
sinaica Bové, Benth. (= *Bovea sinaica* Dcne. = *Stemodia ruderalis* Vahl), sinaische, 4. k. t. Arabien.

Lindleya H. B. K., (J. Lindley, Prof. d. Botanik, zu London), XI. v., Rosaceae.
mespiloides H. B. K., mispelähnliche, ♄. t. Mexico.
Lindleya fruticosa N. E., v. Gordonia semiserrata, p. 272, II.

Linosyris Lobel., Cass. (= *Chrysocoma* L., Sect. III., p. 194), Leinkraut, XIX. II. (I.), Compositae-Corymbiferae.
divaricata DC. (= *Chrysocoma divaricata* Fisch.).
glabrata Lindl.
mexicana Schltdl., mexicanisches, 4. k. Mexico.
villosa DC. (= *Chrysocoma villosa* L. = *Conyza oleaefolia* Lam.).
vulgaris Cassin., DC. (= *foliosa* Cass. = *Chrysocoma Linosyris* L. = *Aster Linosyris* Bernh. = *Crinitaria Linosyris* Less.).
punctata Cass., DC., v. Aster, Sect. IX., p. 99 et p. 51, II.

Linum T., Lein (Flachs).
acuminatum Tenore, zugespitzter, 4. f. Süditalien.
aethiopicum Thbg., aethiopischer, ♄. t. Cap d. g. H.
austriacum L. (= *angustifolium* Lodd.).
arboreum L. (= *glandulosum* α Sering.).
Bartlingii Eckl., Zeyh. (= *aethiopicum* Spgl. = *africanum* β *latifolium* Bartl.), Bartling's, 4. ♄. t. Cap der guten Hoffnung.
bavaricum F. W. Schultz, baierischer, 4. f. Süddeutchl.
hispanicum Mill., spanischer, 4. f. Spanien.
hologynum Rchb. (= *monogynum* Hort., non Forst.), eingriffeliger, ♂. 4. f. Banaat.
juniperifolium Eckl., Zeyh., wachholderblätteriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
Leonii F. W. Schultz (= *montanum* Holand, non Schlchr.), Leon's, 4. f. Lothringen.
marginatum Poir. (= *affine* Panzer = *angustifolium* W. Kn. = *austriacum* Bot. mag. = *barbulatum* Lang = *perenne* Nutt.).
mexicanum H. B. K., mexicanischer, 4. t. k. Mexico.
Mülleri Moris (= *sardoum* Müll.), Müller's, 4. ♄. f. b. k. Sardinien.
Teneriffae Hffmsg., Teneriffa's, ⊙. f. Teneriffa.

Digitized by Google

Linum

tenue Dsf. (= *melianthum* Brotero = *virgatum* Schousb.), dünner, ☉. Nordafrika, Spanien.

Thunbergii Eckl., Zeyh. (= *quadrifolium* Thbg, non L.), Thunberg's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

trigynum Roxb., Sm. (= *boerhaviaefolium* Hortul.).

violascens Bunge, Ledeb., violetter, 4. f. Alt. Sibirien.

viscosum L. (= *sylvestre* Scopol.), β) hypericifolium Salisb. (= *venustum* Andr.).

Unbestimmtere: Biebersteinii Spgl., Hortul., depressum Hort., fasciculare Hort., flexuosum Hort., gracile Hort., monadelphum Mart., Hortul.

Liparia L., Liparie.

parva Vogel, kleine, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

β) angustifolia Bot. mag.

Lipostoma D. Don, campanulaeflora D. Don (= *capitata* D. Don, = *Aeginetia capitata* Graham = *Coccocypselum campanuliflorum* Chamiss., Schltdl. = *C. violaceum* Dsf. = *Hedyotis campanuliflora* Hook.).

Lippia L., Lippie.

asperifolia Rich. (= *Verbena globiflora* L'Her. = *V. globulifera* Auct. = *V. odorata* Dsf. = *Zapania lantanoides* Lam. = *Z. odorata* P. = *Z. odoratissima* Scopol.), rauhblätterige, ♄. w. Südamerika.

dulcis Trevir. (= *asperifolia* Rchb., non Rich. = ? *Verbena globiflora* L'Her.).

filiformis Schrad., fadenförmige, 4. w. t. Chili.

nodiflora Rich. (= *Blairia nodiflora* G. = *Verbena capitata* Forsk. = *V. nodiflora* L. = *Zappania nodiflora* Juss., P., p. 863), β) repens Spgl. (= *Verbena rrpens* Savi = *Zappania repens* Bertol.).

purpurea Jacq. (= *Lantana achyranthifolia* Dsf. Cat. hort. Par.).

Schimperi Hochst. (= *Lantana abyssinica* A. Dietr.), Schimper's, 4. ♄. w. t. Abyssinien.

stoechadifolia H. B. K. (= *Verbena stoechadifolia* L. = *V. suffruticosa* Aubl. = *Zappania reclinata* Lam. = *Z. stoechadifolia* Juss., P., p. 468).

chamaedryfolia Steud., *citriodora* Kunth, v. Aloysia chamaedryfolia et citriodora, p. 27, II. et p. 37.

Liquidambar Altingiana Blume, v. Altingia excelsa, p. 41.

Liriodendron liliifera L., v. Talauma pumila et Rumphii.

Liriope spicata Lour., v. Sanseviera spicata, p. 720.

Lisianthus exaltatus Lam. (= *glaucifolius* Jacq.), *Russelianus* Hook. = *glaucifolius* Nutt.), v. Eustoma exaltatum et Russelianum, p. 239, II, *cordifolius* L. mant., *exsertus* Sw., *latifolius* Sw., *longifolius* L., *umbellatus* Sw., v. Leianthus cordifolius etc., p. 348, II.

Lissanthe RBr., Glattblume.

Cunninghamii DC., Cunningham's, ♄. t. Neuholland.

stellata Knwls. et Westc., sternförmige, ♄. t. Neuholl.

verticillata Lindl., wirtelförmige, ♄. t. Neuholland.

Lissochilus RBr., Glattstendel.

roseus Lindl. (= *Dendrobium roseum* Sw.), rosafarbiger, 4. w. Sierra Leone.

streptopetalus Lindl. (= *Eulophia streptopetala* Lindl., p. 319).

Digitized by Google

Listera nidus avis Hook., v. Neottia nidus avis, p. 544.

Lita rosea W., v. Vohiria rosea, p. 853.

Lithachne axillaris P. B. (= *pauciflora* Poir.), v. Olyra pauciflora, p. 557.

Lithagrostis Lacryma Jobi G., v. Coix Lacryma, p. 210.

Lithocarpos cocciformis Targ., Tozz., v. Attalea funifera, p. 106.

Lithospermum T., Steinsaame.

arvense L., ? *β* caeruleseens DC.

calabrum Tenor., kalabrischer, ♄. k. Calabrien.

callosum Vahl (= *angustifolium* Forsk. = *niveum* Poir.), schwieliger, ♄. k. Aegypten.

β) latifolium DC.

discolor Martens et Galeotti, verschiedenfarbiger, ♄. k. t. Mexico.

Gasparinii v. Heldr., Gasparini's, ☉. f. Sicilien.

incrassatum Guss. (= *arvense β* Tenore), verdickter, ☉. f. Sicilien, Nordafrika, Dalmatien, Syrien, Cap der guten Hoffn.

oleaefolium Lapeyr., oelbaumblätteriger, ♄. k. Pyrenäen.

petraeum A. DC. (= *rosmarinifolium* Rchb., non Tenore = *Echium petraeum* Portenschl.), Felsen-St., ♄. 4. k. f. b. Dalmatien.

prostratum Loisel. (= *diffusum* Lag. = *ericetorum* Salzm. = *purpureo-coeruleum* Thore).

rosmarinifolium Tenor. (= *fruticosum* Sibth. et Sm. = *graminifolium β* R. et S.).

ruderale Dougl., Schutt-St., ☉. f. Columbia.

sericeum Lehm. (= *Anchusa virginica* L. spec. = *Batschia sericea* R. et S.), seidenhaariger, 4. ♄. f. Virginien.

spathulatum Martens et Galeotti, spatelförmiger, ☉. f. Mexico.

strictum Lehm., steifer, ☉. f. Mexico.

tenuiflorum L. fil. (= *aegyptiacum* Hortul. = ? *Myosotis tenuiflora* Viv.), *β*) albiflorum DC. (= *tenuiflorum* Jacq. = *Buglossoides ramosissima* Mch.).

Torreyi Nutt. (= *decumbens* Torr., non Nutt., nec Vent. = *Batschia Torreyi* G. Don), Torrey's, 4. f. Nordamerika.

calycinum Moris (= *apulum* Bertero = *chilense* Colla), v. Amsinckia angustifolia, p. 50, *clandestinum* Trev. etc., v. Myosotis, Sect. II. Eritrichium clandestinum etc., *cornutum* Ledeb. (= *decumbens* Vent.), v. Arnebia cornuta, p. 85, II., *dahuricum* Lehm. etc., v. Mertensia dahurica etc., *divaricatum* Sieb., v. Echiochilon fruticosum, p. 215, II., *longiflorum* Spgl. (= *incisum* Lehm.), v. Pentalophus longiflorus, *longifolium* W. herb., *molle* Mühlbg., *virginianum* L., v. Onosmodium strigosum, molle (carolinianum) et virginianum, *orientale* L. etc., v. Alkanna orientalis etc. Nachlese.

Lithoxylon Endl., Steinholz, XXI. v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

Lindleyi Steud. (= *Securinega nitida* Lindl., non W.), Lindley's, ♄. w. Taiti.

Litobrochia Presl, v. Pteris Sect.

Digitized by Google

Litsaea Juss., Lam., Litsaea, IX. r., Laurineae.
dealbata Steud., N. E. (= *Tetranthera dealbata* RBr., p. 802).
glauca N. E. (= *Cinnamomum glaucum* G. Don = *Camphora glauca* G. Don = *Laurus glauca* Thbg.), blaugrüne, ♄. k. Japan.
obovata N. E. (= *Laurus obovata* Hamilt. herb. = *Tetradenia obovata* N. E. = *Tetranthera Ovipala* Don = *T. obovata* Hamilt., Wall.), verkehrteiförmige, ♄. w. Ostindien.
Pseudo-culitlawan N. E. (= *Laurus Culitlawan* H. Berol. et Bonn,), unächte Culitlawan-L., ♄. w. ?
rufa N. E., fuchsrothe, ♄. t. Neuholland.
zeylanica N. E. (= *trinervis* Dict. de sc. natur., non Juss. = *Dais trinervis* Hrbr. madrit. = *Laurus involucrata* Lam. = *Tetradenia zeylanica* N. E. = *Tetranthera pulcherrima* C. Wall. = *Tomex trinervis* Hrbr. madrit.), zeylanische, ♄. w. Zeylon.
apetala P. (= *citrifolia* Juss. = *scbifera* P.), v. Tetranthera Roxburghii, *Myrrha* Mirb., v. Daphnidium Myrrha, p. 191, II.

Littaea Brignol., geminiflora Brign., v. Agave, Sect. II., p. 24 et p. 14, II.

Livistonia RBr., Livistonie.
australis Mart. = Corypha australis, p. 222.
chinensis RBr. (= *Latania borbonica* Lam. = *L. chinensis* Jacq., p. 447).
rotundifolia Mart. = Corypha rotundifolia Lam., p. 161, II.

Llagunoa R. et P., Llagunoa.
glandulosa Don (= *Amirola glandulosa* Hook.), drüsige, ♄. t. Chili.

Lloydia Salisb., Lloydia.
graeca Endl. (= *Anthericum graecum* L. = ?*A. trinervium* Visian. = *Phalangium graecum* Poir.), griechische, 4. k. Griechenland.
serotina Salisb., Rchb. (= *alpina* Salisb. = *striata* Swt. = *Necturobothrium striatum* Ledeb. = *Anthericum serotinum* L. = *Bulbocodium alpinum* Mill. = *Phalangium serotinum* Lam. et DC. = *Gagea striata* Swt. = *Ornithogalum striatum* W. = *O. serotinum* L.).

Loasa Adans., Loasa.
ambrosiaefolia Juss, ambrosiablätterige, ☉. m. f. Peru.
β) hispida L. (= *urens* Jacq.).
bryonaefolia Schrad. (= palmata Spgl.), zaunrübenblätterige, ☉. m. f. Chili.
lucida Lindl., glänzende, ☉. m. f. Südamerika.
Pentlandii Paxt., Pentland's, ☉. Sch. m. f. Peru.
xanthiifolia Juss., spitzklettenblätterige, ☉. m. f. ? Peru.
Hybride: Herberti H. angl.
lateritia Gill., Hook. (= *aurantiaca* Hort.), v. Cajophora lateritia, p. 103, II., *volubilis* Hort., v. Grammatocarpus volubilis *β*, p. 273, II.
Lobadium aromaticum Rafin., *suaveolens* Rafin., v. Rhus aromatica et suaveolens, p. 686 et 687.
Lobaria cernua Haw., *rivularis* Haw., *sibirica* Haw., v. Saxifraga cernua, rivularis, sibirica, p. 724 et 725.

Digitized by Google

Lobelia L., Lobelie.

I. Centropogon Presl, DC., Spitzbart.

Andropogon DC. (Cav.), (= *L. surinamensis* var. Cham. = *Siphocampylus Andropogon* G. Don), männlicher, ♄. w. Quito.

fastuosus Scheidw., prächtiger, ♄. w. Mexico.

grandis Presl (L. fil.), grofser, ♄. w. Neugranada.

hirtus Presl (Cav.), (= *Siphocampylus hirtus* G. Don), rauher, ♄. w. Quito.

surinamensis Presl (L.), (= *L. spectabilis* H. B. K. = *L. sphaerocarpa* Jacq. herb. = *Siphocampylus macranthus* Pohl = *S. spectabilis* G. Don = *S. surinamensis* G. Don).

II. Dobrowskya Presl, DC.

aspera DC. (Spgl.), (= *Eckloniana* Presl = *Zeyheriana* Presl = *Cyphia simplex* Spgl. = *Lobelia Chamaepithys* Spgl. = *L. scabra* Spgl.), raube, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

V. Laurentia Michel.

canariensis DC. (= *Solenopsis canariensis* Presl), canarische, ⊙. f. Teneriffa.

VI. Lobelia genuina (= *Rapuntium* T., Presl).

anceps L. (= *alata* LaBill. = ?*procumbens* Otto = *Schrankii* Swt. = *secunda* Schrk. = *Dobrowskia anceps* Presl).

Claytoniana Mchx. (= *goodenioides* W. herb. = *pallida* Mühlbg. = *spicata* Lam.), Clayton's, 4. f. Nordam.

depressa L. (= *Mezleria depressa* Presl exparte), niedergedrückte, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

discolor Kl. (= *picta* Hort.), verschiedenfarbige, 4. k. Mexico.

Dortmanna L., (= *Dortmanna palustris* G. Don).

Erinus L. (= *procumbens* Hort. = *Rapuntium Erinus* Mill.) var. grandiflora Paxt.

fulgens W., β) propinquua H. angl., γ) multiflora van Houtte, δ) pyramidalis v. Houtte.

heteromalla Schrad., verschiedenwendige, ⊙. m. Cap der guten Hoffn.

Heyneana Wall., Heyne's, ⊙. m. f. Ostindien.

ignea Arrabida feuerfarbige, 4. t. w. Brasilien.

minutiflora Kunze, kleinblumige, ⊙. m. f. Mexico.

pusilla DC. (= *Rapuntium pusillum* Presl), niedrige, ⊙. m. f. Mexico.

rugulosa Grah. (= *maculata* Penny = *Pratia rugulosa* Don = *Rapuntium rugulosum* Presl).

splendens W., β) atrosanguinea Hort., γ) princeps Otto et Dietr.

texensis Rafin. (= *punicea* Otto et Dietr. = *Schiedeana* *, *ignea* Hort. etc.).

thapsoidea Schott (= *Geniostoma brasiliense* Spgl. = *Rapuntium thapsoideum* Presl), königskerzenähnliche, 4. w. Brasilien.

Hybriden: altontoweriensis, aurantiaca, azurea, belgica, dracocephaloides, eximia, formosa, grandiflora, Jupiter, limburgensis, Makoyi, phoenicea, Richardsonii, sanguinea, topaz, Vulcain etc.

VII. Monopsis Salisb.

litigiosa Fisch. et Mey. (= ?*scintillaris* Hort. = *Lobelia conspicua, inconspicua, debilis* Hort.), bestrittene, ⊙. ♂. m. f. ?

Digitized by Google

Lobelia

XI. Siphocampylus Pohl, A. DC., G. Don.

barbatus G. Don (= *Lobelia barbata* Cav.), bärtige, ♄. Peru, Neugranada.

betulaefolius Hook., G. Don (= *Lobelia betulaefolia* Cham., Presl), birkenblätterige, ♄. t. Brasilien.

biccler G. Don (= *Lobelia laxiflora* H. B. K. = *Cavanillesiana* R. et S. = *persicaefolia* Cav.), zweifarbige, 4. ♄. k. t. Mexico.

β) angustifolia (A. DC.), (= *Cavanillesii* Hort. = *Lobelia Cavanillesii* Mart., Grah.).

biserratus DC. (= *Cavanillesianus* G. Don = *Lobelia biserrata* Cav.).

coccineus Hook., scharlachfarbige, ♄. t. Brasilien.

cordatus H. belg., herzförmige, ♄. t. ?Südamerika.

crenatifolius Pohl (= *Lobelia crenata* Presl), kerbblätterige, ♄. t. Brasilien.

duploserratus Pohl (= *Lobelia triphylla* Presl), doppelsägezähnige, 4. ♄. t. Brasilien.

giganteus G. Don (Cav.), (= *Lobelia Tupa* Donn = *L. Tupa coccinea* Hort.).

lantanifolius A. DC., lantanenblätterige, ♄. t. Caracas.

β) glabriusculus Bot. mag.

longepedunculatus Pohl (= *L. pedicellaris* Presl), langstielige, ♄. t. Brasilien.

Parthoni H. angl. et belg., Parthon's, ♄. t. Südamerika.

b) major.

revolutus Grah. (= *spicatus* Hort.), zurückgerollte, ♄. t. Caledonia.

rugosus A. DC. (Presl), runzelige, ♄. t. Peru.

umbellatus G. Don (H. B. K.).

verbascifolius A. DC. (Presl).

XII. Tupa Swt., A. DC., G. Don.

Feuillei G. Don (= *L. Tupa* L. = *Rapuntium Tupa* Presl).

mucronata A. DC. (Cav.), (= *T. Cavanillesiana* G. Don).

salicifolia Swt. (G. Don), (= *arguta* G. Don = *L. arguta* Lindl. = *L. Brandtii* H. Par. = *L. excelsa* Bonpl. Malm. = *L. gigantea* Sims, non Cav. = *L. neriifolia* Moris = *L. Tupa* Ait., non L.).

Ob L. amplexifolia Makoy Catal. zu dieser Abtheilung gehört, ist mir unbekannt.

Lobostemon Lehm., Buek, Schuppenfaden, V. 1., Asperifoliaceae.

argenteus Buek, (= *Echium argenteum* α Lehm. = ?*E. fruticosum* Jacq. hort. Schönbr.), silberfarbiger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

capitatus Buek, (= *Echium capitatum* Thbg., L. mant. = *E. hispidum* Burm.), kopfförmiger, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

ferocissimus A. DC. (= *Echium ferocissimum* Andr. = *E. ferox* P. = *E. argenteum* Roth), stachelborstiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fruticosus Buek, (= *Echium fruticosum* L. = *E. africanum* P.), strauchiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

β) Bergianus A. DC. (= *Echium Bergianum* E. Mey. = *E. fruticosum* Berg. = *E. scabrum* Lehm.).

glaber Buek, (= *Echium falcatum* Lam. = *E. glabrum* Vahl, non Thbg. = *E. Vahlii* R. et S.), kahler, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Lobostemon

glaucophyllus Buek, (= *Echium glaucophyllum* P. = *E. glabrum* Thbg., non Vahl = *E. laevigatum* Lam., non L.), blaugrünblätteriger, ♄. t. k. Cap d. g. H.

hispidus A. DC. (= *Echium hispidum* Thbg.), steifhaariger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

laevigatus Buek, (= *Echium laevigatum* L. = *E. Schwartzii* Drege, non alior.), glattlicher, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

lasiophyllus A. DC. (= *Echium lasiophyllum* Lk. Enum. = *E. longifolium* Hortul., non Delil.), haarblätteriger, ♄. t. k. ?

lucidus Buek, (= *Echium lucidum* Lehm.), spiegelnder, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

paniculatus Buek, (= *Echium paniculatum* Thbg., non Drege), rispiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

rosmarinifolius A. DC. (= *Echium rosmarinifolium* Vahl), rosmarinblätteriger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

sphaerocephalus Buek, (= *Echium sphaerocephalum* Vahl, = *E. capitatum* β Lam.), kugelköpfiger, 4. ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

strigosus Buek, (= *Echium strigosum* Sw.), striegeliger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Swartzii Buek, (= *Echium Swartzii* Lehm. = *E. angustifolium* Sw., non Lam., nec Mill. = *E. papillosum* Thbg.? non Lehm.), Swartz's, ♄. t. k. Cap d. g. H.

trichotomus A. DC. (= *Echium trichotomum* Thbg. = *E. canaliculatum* Drege), dreizinkiger, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

verrucosus Buek, (= *Echium verrucosum* Sw.), warziger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

formosus Buek, *spicatus* Buek, v. Echium formosum et spicatum.

Lobularia halimifolia Steud., *libyca* Meisn., *maritima* Desv., *nummularia* Steud., *pyrenaica* Steud., *rupestris* Steud., *spinosa* Steud., v. Koniga halimifolia etc., p. 439 et p. 336, II., *canescens* Steud. etc., v. Ptilotrichum canescens etc.

Lochnera rosea Rchb. (= *Catharanthus roseus* G. Don), v. Vinca rosea, p. 849.

Lodoicea Commers., Sechellarum LaBill. (= *maldivica* P.). *Loeselia Cervantesii* G. Don, *coerulea* G. Don, *coccinea* G. Don, *glandulosa* G. Don, v. Hoitzia Cervantesii etc., p. 402 et p. 303, II.

Loethainia * (R. B. v. Römer auf Löthain u. Neumark in Sachsen), vergl. p. 883.

floribunda * (= *Crotalaria floribunda* Lodd. = *Wiborgia floribunda* E. Mey. = *W. obcordata* Eckl., Zeyh., non Thbg.), blüthenreiche, ♄. t. k. Cap d. g. H.

Logania RBr., Loganie.

odoratissima Hort. belg., wohlriechendste, ♄. t. ? Neuholl.

Patersoniana v. Houtte, Paterson's, ♄. t. ? Neuholland. *ligustrina* Cunningh., v. Geniostoma ligustrifolium, p. 257, II.

Lolium L., Lolch.

arvense Wither. (= *annuum* Bernh. = *tenue* MB.).

Bouchéanum Kunth (= *italicum* A. Braun).

brasilianum N. E., brasilianischer, 4. k. Montevideo.

maximum W. (= *giganteum* Hort.), gröfster, ⊙. f. Jamaika.

perenne L., c) compositum Thuill. (= *cristatum* P., Hort.).

Digitized by Google

Lomandra angustifolia H. Cels. (= *longifolia* LaBill.), v. Xerotes longifolia, p. 860.

Lomaria W., Saumfarrn.

australis Lk. (= *minor* Lk. Hort. berol. excl. syn. Br. = *pumila* Kaulf. = *Blechnum australe* L., p. 124 = *B. auriculatum* W. = *B. rigidum* W.).

campylotis Kunze, krummöhriger, 4. w. Caracas.

capensis W., capischer, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Gilliesii Hook. et Grev., Gillies's, 4. w. Chili.

hastata Kunze (= *Blechnum hastatum* Kaulf., p. 125).

Meyeriana Kunze, Meyer's, 4. w. ? Cap d. g. Hoffn.

punctulata Kunze, (= *auriculata* Desv. = *densa* Kaulf. = *Blechnum auriculatum* Endl. = *B. punctulatum* Sw.), feinpunktirter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Lomatia RBr., Lomatie.

cordata v. Houtte, herzblätterige, ħ. t. Neuholland.

ferruginea RBr. (= *Embothrium ferrugineum* Cav. = ? *Rupala diversifolia* RBr. = *Tryeondylus ferrugineus* Knght. et Salisb.), rostfarbige, ħ. t. China.

ilicifolia RBr. (= *coccinea* Hort.), β) pinnatifida Bot. mag.

Lomatium Rafin., Saumdoldler, V. II., Umbelliferae.

villosum Rafin. (= *Cogswellia villosa* Schult. = *Ferula foeniculacea* Nutt. = *Pastinaca foeniculacea* Spgl.), zottiger, 4. f. Nordamerika.

Lomatogonium carinthiacum v. Braune, v. Pleurogyne carinthiaca.

Lonchitis repens L., v. Cheilanthes repens, p. 137, II.

Lonicera L., Dsf., Lonicere.

I. Caprifolium T.

albiflora Torr. et Grey, weifsblumige, ħ. Sch. f. Nordamerika (Arkansas).

Caprifolium L. (= *C. hortense* Lam. = *C. italicum* R. et S.), β) glauca Meerb. (= *italica* Schm.).

dimorpha Tausch (= *etrusca* Hort., non Savi), zweiförmige, ħ. Sch. f. ?

hispidula Dougl. (Lindl.), (= *microphylla* Hook.), steifhaarige, ħ. Sch. f. b. Nordwestl. Amerika.

oblongifolia Hook. (Swt.), (= *sempervirens* β Bot. mag.), länglichblätterige, ħ. Sch. f. Nordamerika.

parviflora Lam. (= *marylandica* Hort.).

pubescens Swt. (Hook.), (= *villosa* Mühlbg. = *Goldii* Spgl. = *hirsuta* Eaton).

II. Isika Adans.

discolor Lindl., verschiedenfarbige, ħ. k. Nordindien.

diversifolia Wall., verschiedenblätterige, ħ. f. b. Himalaya.

Ledebourii Eschsch., Fisch., Ledebour's, ħ. f. Californien.

Sieversiana Bunge, (= *alpigena* Sievers, = *microphylla* α *robustior* Ledeb.), Sievers's, ħ. f. Alt. Sibirien.

villosa Mühlbg. (= *coerulea canadensis* Lam. = *Xylosteum canadense* Duham. = *X. oblongifolium* Goldie *X. Solonis* Eaton = *X. villosum* Mchx.).

III. Nintoa Swt., Webb.

canescens Schousb., Webb (= *biflora* Dsf.).

japonica Thbg., Swt. (= *chinensis* Wats. = *flexuosa* Lodd. ? = *glabrata* Wall.).

confusa DC., Swt. (= *japonica* Andr., Ker).

longiflora DC., Swt. (= *Caprif. japonicum* D. Don = *C. longiflorum* Lindl. = *C. nepalense* G. Don).

IV. Xylosteum T.

nigra L., β) campaniflora Loud.

Digitized by Google

Lonicera
tatarica L., δ) lutea Lodd. (= *xanthocarpa* Hort.), ε) angustata Wender., ζ) caucasica Hort.
xylosteoides Tausch, heckenkirschähnliche, ħ. f.? (?Hybride).
Unbestimmtere: bonariensis Nois., rotundifolia Hort., speciosa Wender. — Hybriden oder Variet.? epsomensis Hort., Youngii Hort.

Lopezia Cav., Lopezie.
haematodes Kunze, blutfarbige, ♂. t. k. Mexico.
integrifolia DC., ganzblätterige, ⊙. m. f. Mexico.
lineata Zuccar., linirte, ħ. t. k. Mexico.
oppositifolia Lagasca (= *mexicana* Jacq. var. ? Spgl.), gegenblätterige, ⊙. m. f. Neuspanien.
pumila Bonpl., niedrige, ⊙. m. f. Mexico.
trichotoma Schltdl., dreizinkige, ⊙. m. f. Mexico.

Lophanthus Benth., Büschelblume.
chinensis Benth. (= *obtusifolius* * p. 477 = *Hyssopus Lophanthus* L. = *H. resupinatus* Mch. = *Nepeta lophantha* Fisch.), chinesische, 4. f. Nordchina, Sibirien.
multifidus Benth., v. Nepeta lavandulacea, p. 545.
Lophia phoenicea Desv., v. Alloplectus cristatus, p. 22, II.
Lophiolepis araneosa Cass., *calocephala* Cass., *dubia* Cass., *nutans* Cass., v. Cirsium fimbriatum, ciliatum, lanceolatum, cernuum, p. 198.

Lophira africana Banks, Loud. (= *alata* G. fil.).
Lophochloa phleoides Rchb., v. Koeleria phleoides, p. 439 et 336, II.

Lophoclinium Endl., Büschelköpfchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae (Senecioideae).
album Endl., weifses, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland.
citrinum Endl., citronfarbiges, ⊙. m. f. Südw. Neuholl.
hirtum Endl., rauhhaariges, ⊙. m. f. Südw. Neuholland.
Manglesii Endl., Mangles's, ⊙. m, f. Südw. Neuholland.

Lophopetalum Wight, Schopfkronenblatt, V. I., Celastrineae.
grandiflorum Wght. (= *Evonymus grandiflorus* Wall.), grofsblumiges, ħ. w. t. Ostindien.
lucidum Wght. (= *Evonymus lucidus* Don), spiegelndes, ħ. w. t. Ostindien.

Lophosciadium DC., Schopfdolde, V. II., Umbelliferae.
millefolium DC. (= *Ferula meoides* L. = *Laserpitium millefolium* Vent), garbenblätterige, 4. f. b. Orient, Taurien.

Lophospermum D. Don, Schopf-(Büschel-)saame.
erubescens D. Don (= *scandens* Bot. mag. et Bot. reg.).
scandens D. Don (= *mexicanum* Hort. = *Besleria scandens* Moç., Sess.).
Variet. oder Hybriden: grandiflorum Hort., Hendersonii Paxt., spectabile Paxt.
atrosanguineum Zuccar. (= *Rhodochiton* D. Don), v. Rhodochiton volubile, *physaloides* D. Don, v. Melasma hispidum.

Lophostemon Schott, Büschelfaden, XVIII. II., Myrtaceae.
arborescens Schott (= *Tristania arborescens* H. angl., p. 823).
depressa Schott (= *Tristania depressa* Lodd., Lk. Enum., p. 823).
robustum Schott, starker, ħ. t. k. Oestl. Neuholland.

Digitized by Google

Loranthus L., Riemenblume.

oleaefolius Cham., Schltdl. (= *Lichtensteinii* W. herb. = *speciosus* Dietr., non Pohl = *Lichtensteinia oleaefolia* Wendl.), oelbaumblätterige, ♄. t. Cap d. g. H.

Lorentea Less., DC., non Ortega (= *Lorentia* Swt.), (Lorente, spanischer Gelehrter etc.), XIX. 11.

canescens L. (= *Pectis canescens* H. B. K., p. 592 = *Stammarium hyssopifolium* W. herb.).

humifusa Less. (= *Chthonia humifusa* Cass. = *Pectis humifussa* Swt., p. 592).

saturejoides Less. (= *Aster saturejaefolius* Houst. = *Inula saturejae* Spgl. = *I. saturejoides* Mill.), satureiähnliche, 4. k. Mexico.

Loroglossum antropophorum Rich., v. Aceras antropophora, p. 9, *hircinum* Rich., v. Himantoglossum hircinum, p. 880.

Lotus T., L., Schotenklee.

albidus Loud. (= *albicans* Hort.), weifslicher, ♄. k. Neuholland.

americanus Bischoff, (= ? *Trigonella americana* Nutt., DC.), amerikanischer, ☉. f. Nordamerika (Arkansas).

Candolleanus Swt. (= *australis β angustifolius* DC.), Candolle's, ♄. k. t. Neuholland.

corniculatus L., *β*) arvensis Schkr. (= *tauricus* Hort.), *γ*) ciliatus Tenore, *δ*) villosus Thuill., *ε*) alpinus Schlchr., *ζ*) crassifolius P.

creticus L. (= *sericeus* Mch.).

cytisoides L. (= *diffusus* Schrk. = *glaucus* Mch.).

edulis L. (= *oligoceratos* Dsf., Scop. = *Krockeria oligoceratos* Mch.).

Gebelia Vent. (= *varians* Desv.).

glinoides Delil., vergl. p. 883.

obovatus Swt., verkehrteiförmiger, 4, k. t. Neuholland.

odoratus Schousb., wohlriechender, 4. ♄. k. Marocco.

peregrinus L. (= *Dioscoridis* All. = *oligocerutos* Lam. = *villosus* Forsk.).

suaveolens P. (= *odoratus* Curt., Sims, non Schousb.), feinriechender, 4. f. Südfrankreich.

tenuifolius Pall., non Presl, (= *decumbens* Forst. = *depressus* W. = *Forsteri* Swt. = *humifusus* W. = *tenuis* Kit. = *corniculatus* L. var. Auct.).

Aufserdem werden in den Verzeichnissen der botanischen Gärten noch erwähnt: adnatus H. Berol., fruticulosus Dsf., rotundifolius H. Lowan., strigosus H. Berol.

argenteus Brot., v. Argyrolobium Linnaeanum, p. 44, II., *microphyllus* Hook., v. Bonjeania microphylla, *medicaginoides* Retz, v. Trigonella Calliceras, p. 821, *ononoides* Lam. (= *persicus* Hort. = ? *odoratus persicus* Burm.)., v. Ononis aspalathoides, *subpinnatus* Lag., *Wrangelianus* Fisch. et Mey., v. Hosackia subpinnata et Wrangeliana, p. 305, II.

Loudonia anthylloides Bertero, v. Adesmia Loudonia, p. 10, II.[1]).

Loureira Cav., Loureira.

peltata Dsf. Hort. Par. (= *Mozinna peltata* Steud.), schildblätterige, ♄. t. w. ?

---

1) Loudonia aurea Lindl. Haloragеae. Neuholl., scheint bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Digitized by Google

Lowea berberifolia Lindl., p. 479, (= *Rosa monophylla* Hort. = *R. persica* Mchx. = *R. simplicifolia* Salisb. = *Hultheimia berberifolia* Dumort.), β) Hardyi (= *R. Hardyi* H. Par.), Hybride mit Rosa involucrata erzeugt, Hardy.

Loxidium galegifolium Vent., v. Swainsonia galegifolia, p. 793.

Lubinia atropurpurea Lk. et Otto, (= *purpurea* Swt.), v. Lysimachia nutans.

Luculia Swt., Luculia.

cuneifolia Don (= *Mussaenda cuneifolia* Don), keilblätterige, ♄. t. Nepal.

Pinciana Hook., Pinces, ♄. t. Nepal.

Lucuma Molin., Juss., Lucuma.

Caimito R. et S. (= *Achras Caimito* R. et S. = *Lobatia Caimito* Mart.), Caimito-L., ♄. w. Brasilien.

mammosa G., Juss. (= *Achras mammosa* L. = *A. Lucuma* Blanco), zitzenförmige, ♄. w. Südamerika, Westindien, Philippinen.

Rivicoa G. fil. (= *Achras glaucescens* W. herb. = *Bumelia nervosa* Vahl, p. 138, = *Chrysophyllum Cainito* Aubl. = *C. macrophyllum* Lam., nec alior.), Rivicoa-L., ♄. w. Guiana, Para.

Ludwigia L., Ludwigie, p. 479.

erigata L. (= *alternifolia* Burm. = *subtriflora* Desr. = *triflora* Spgl.), dreiblumige, ⊙. m. f. Ostindien.

parviflora Roxb. (= *diffusa* Hamilt. = *jussiaeoides* Hrb. Madr. = *oppositifolia* L. = *perennis* L., non Burm. = *zeylanica* P. = *Jussiaea caryophyllea* Lam.).

alternifolia L. etc., *hirsuta* L., v. Isnardia alternifolia et hirsuta, p. 323, II., *decurrens* Walt., v. Jussieua decurrens, p. 331, II.

Luetkea Bongard, (= *Luitkea* Auct. = *Lutkea* Auct.), Luetkea, X. H., Rosaceae-Spiraeaceae Bong. (Saxifrageae Meisn.).

sibbaldioides Bong. (= *Eriogynia pectinata* Hook. = *Saxifraga pectinata* Pursh), kammförmige, 4. f. Nordamerika. (Ob eingeführt?)

Luehea W., Lühea.

rosea v. Houtte, rosafarbige, ♄. w. ?Brasilien.

speciosa W. (= *Rhexia brasiliensis* Hffg.), prächtige, ♄. w. Brasilien.

Luffa T., Cavan., Luffa.

aegyptiaca DC. (= *arabum* Mill. = *Momordica Luffa* L.).

Jacquini Schrad. (= *foetida* Jacq. H. Vindob., non Cav. = *striata* Schrad.), Jacquin's, ⊙. m. f. Ostindien.

pentandra Roxb. (= *L. Cattu-picinna* Sering. = *Petola* Sering.), fünfmännige, ⊙. m. f. Ostindien.

Pluckenetiana Sering. (= *amara* Roxb. = *Cucumis acutangulus* β Lam. = *C. operculatus* Roxb.), Pluckenet's, ⊙. m. f. Ostindien.

Lumnitzera densiflora Spgl., v. Plectranthus rugosus, *prostrata* Spgl., v. Geniosporum prostratum, p. 257, II., *tenuiflora* Spgl., v. Ocymum sanctum, p. 553. Hinsichtl. d. übrig. s. Moschosma.

Lunaria halimifolia All., *libyca* Viv., v. Koniga halimifolia et libyca, p. 439 et p. 336, II., *Ricotia* Desv. (= *aegyptiaca* Mill.), v. Ricotia Lunaria, p. 691.

Digitized by Google

Lundia DC., non Thonn., Schum., (Lund, dänischer Botaniker und Entomolog, welcher Brasilien bereiste), XIV. 11., Bignoniaceae.

cordata DC. (= *Alsocydia lasianthera* Mart. = *Bignonia cordata* fl. flum. = *Tecoma lasianthera* Mart.), herztörmige, ħ. Sch. w. Brasilien.

Lupinaster albens Bess. etc., v. Trifolium albens etc., p. 818 etc.

Lupinus T., Wolfsbohne.

albescens Hook., Arn., weifsliche, 4. k. f. b. Chili.

albicaulis Dougl., weifsstengelige, ⊙. 4. f. b. Columbia.

alopecuroides Desr., fuchsschwanzähnliche, 4. ħ. k. Quito (Peru).

andicola Gill., Hook., Anden-W., ⊙. f. Chili.

argyraeus DC., silberige, 4. f. b. k. ?

arvensis Benth., Acker-W., ⊙. ♂. f. k. Peru.

aureo-nitens Gill., Hook., goldschimmernde, ⊙. f. Chili.

Barkeriae Knw. et Westc., Lindl., Barker's, ⊙. f. Mexico.

bilineatus Benth., doppeltlinirte, 4. f. b. k. Mexico.

Bivonii Presl (= *prolifer* Desr., nec Lam.), Bivone's, ⊙. f. Sicilien.

caespitosus Nutt., rasenartige, ? 4. f. Nordamerika, (Rocky mountains).

Chamissonis Eschsch. (= *sericeus* Hook.), Chamisso's, 4. f. Neucalifornien.

Consentinii Guss. (= *hirsutus* Bory, Sieb., non L.), Consentini's, Sicilien, Griechenland.

coriaceus Benth., lederartige, 4. ħ. k. Brasilien.

cytisoides Ag, geifsklecähnliche, ? 4. f. Californien.

decumbens Torr., niederliegende, 4. ħ. f. Nordamerika (Arkansas).

diffusus Nutt., weitschweifige, 4. f. b. Carolina.

elegans H. B. K., zierliche, ⊙. f. Mexico.

exaltatus Zuccar., hohe, ħ. ħ. k. Mexico.

flabellatus Bertol., fächerförmige, ? ħ. k. Guatimala.

glabratus Ag., kahle, 4. ħ. f. b. k. ?

gracilis Ag., non H. B. K., schlanke, ? 4. f. Californien.

graecus Boiss. et Sprun., griechische, ⊙. f. Griechenland (Sparta).

Gussoneanus Ag. (= *micranthus* Guss., non Dougl.), Gussone's, ⊙. f. Sicilien.

Hartwegii Lindl., Hartweg's, ⊙. 4. ħ. f. b. k. Mexico.

holosericeus Nutt., Torr. et Gr., sammethaarige, 4. ħ. f. b. Nordamerika.

integrifolius L., ganzblätterige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

Kunthii Ag. (= *microphyllus* H. B. K.), Kunth's, ħ. k. Quito.

laxiflorus Dougl., β) foliosus Torr. et Gr. (= *arbustus* Dougl.), γ) tenellus Torr. et Gr.

leptocarpus Benth., schlankfrüchtige, ħ. k. Mexico.

leucophyllus Lindl. (= *densiflorus* Nutt.).

leucopsis Ag., weifsschauende, 4. f. Nordwestl. Nordamer.

luteus L. (= *odoratus* Hort.).

macrocarpus Hook., Arn., grofsfrüchtige, 4. ħ. f. b. Californien.

macrophyllus Benth., grofsblätterige, 4. f. ?

microcarpus Sims, kleinfrüchtige, ⊙. f. Chili.

minimus Dougl., kleinste, ⊙. 4. f. Nordamerika.

montanus H. B. K., bergliebende, ħ. k. Neuspanien.

ramosissimus Benth., ästigste, ⊙. ħ. f. k. Chimborazo.

reticulatus Desv., netzförmige, ⊙. f. Frankreich.

Digitized by Google

Lupinus

sarmentosus Desr. (= *gracilis* H. B. K.), starkwurzelnde, 4. ♄. k. Peru.

Schiedeanus Steud. (= *leptophyllus* Cham., Schltdl., non Benth.), Schiede's, ♄. k. Mexico.

Smithianus H. B. K., Smith's, ♄. k. Quito.

subsessilis Benth., weniggestielte, 4. k. Brasilien.

succulentus Dougl., saftige, ? 4. f. Nordwestl. Amerika.

sulphureus Dougl. schwefelgelbe, ? 4. f. Nordamerika.

texensis Hook. (= *subcarnosus* Hook.).

trochophyllus Hffg., radblätterige, 4. f. ? (? Hybride.)

truncatus Nutt., abgestulzte, ? 4. f. Californien.

variegatus Fisch., non Poir., bunte, 4. f. Insel Sitka.

velutinus Benth., sammetartige, 4. k. Brasilien.

guadeloupensis Hort. (= *guatimalensis* Hort.), v. Dolichos fabaeformis.

Luthera virginica Schultz, v. Cynthia virginica.

Luxenburgia St. Hil., Luxenburgie, XVI. VIII. Violaceae.

ciliosa Gardener, (= *Plectanthera ciliosa* Mart.), gewimperte, ♄. w. Brasilien.

Luzula DC., Aftersimse.

hyperborea RBr., nördlichste, 4. f. Lappland, Norwegen. *β)* angustifolia Hook., *γ)* latifolia Hook.

maxima DC. (= *sylvatica* Bichen.), *β)* Sieberi Tausch.

multiflora Lej. (= *nemorosa* Presl = *pallescens* Weihe = *campestris* L. var. Auct.).

nivea DC., *β)* rubella M. et K., Fisch. et Mey. (= *β livida* Desv.).

Lycaste Lindl., Lycaste, XX. s., Orchideae.

gigantea Lindl. (= *Maxillaria Heynderickii* Morren), riesenförmige, 4. w. Guajaquil.

macrophylla Lindl., grofsblätterige, 4. w. ? Brasilien.

plana Lindl., flache, 4. w. Brasilien (Bolivia).

Skinneri Lindl., Skinner's, 4. w. Guatemala.

Lychnanthus volubilis S. G. Gmel. (= *scandens* Gmel.), v. Cucubalus bacciferus.

Lychnidea tomentosa Burm., v. Manulea tomentosa, p. 495.

Lychnis L., Lichtnelke.

I Eudianthe Rchb., Fenzl.

aspera Poir. (= *oculata* J. Backh. = *Viscaria oculata* Lindl.), rauhe, ⊙. f. Nordafrika.

Coeli rosa Desr., Fenzl, (= *clavata* Mch. = *Agrostemma coeli Rosa* L. = *Coronaria Coelirosa* Fr.), *β)* pusilla Poir. (= *Agrostemma pusilla* Dsf.).

II. Eulychnis DC. (= Genuina), (= *Agrostemma* W., G. Don, Swt.).

Bungeana Fisch. et Mey. (= *Agrostemma Bungeana* D. Don, Hook.), Bunge's, 4. k. China.

coronaria Desr., Lam. (= *coriacea* Mch. = *Agrostemma coronaria* L. = *Silene coronaria* Clairv.), *β)* mutabilis Rolliss. (? Hybride.)

diclinis Lagasc. (= ? *laeta* Ait. var. Spgl. = *Agrostemma diclinis* G. Don, Swt. = *A. dioica* Dufour), zweihäusige, ⊙. ♂. f. k. Spanien.

grandiflora Jacq. (= *coccinea* Hort. = *coronata* Thbg. = *Agrostemma Banksia* Meerb. = *Hedona sinensis* Lour.).

chalcedonica L., f) lateritia Hort., g) mutabilis Hort., h) nana fl. pleno Hort., corsica Lois. (= *laeta* Ait.

Digitized by Google

Lychnis . . .

var. Spgl. (= *Agrostemma corsica* G. Don, Swt), decumbens Steud. (= *Agrostemma decumbens* Denson), Densoni Steud. (= *Agrost. perennans* Dens.), flos Jovis Desr. (= *Agrost. fl. j.* L.), fulgens Fisch., laeta Ait. (= *palustris* Brot. = *Agrost. laeta* G. Don, Swt. = *A. parviflora* Hort.), ? media Hort., F. et Mey., nivalis Kit., pyrenaica Berger (= *Nummularia* Lapeyr. = *Agrost. pyren.* G. Don), saxatilis Turcz. (= *Agrost. saxat.* G. Don, Swt.), sibirica L. (= *Agrost. sibirica* G. Don, Swt.), gehören auch zu dieser Section. Vergl. p. 482 u. 883.

II[b]. Flos cuculi s. Coccyganthe Rchb.

Cyrilli Richt., Cyrillo's [1]), 4. f. ? Neapel

Flos cuculi L. (= *laciniata* Lam. = *Agrostemma flos cuculi* G. Don, Swt. = *Coronaria flos cuculi* A. Braun = *Melandrium flos cuculi* Röhl.).

III. Melandrium Clus., Röhl., Fenzl, (= *Gastrolychnis* Fenzl, Fr.).

soongarica Fisch., Mey., Lall., soongarische, 4. f. Soongaria.

tristis Bunge, Fenzl, traurige, 4. f. b. Altai.

apetala L., *β*) brachypetala Fisch., Fenzl, *γ*) pauciflora DC. (= *L. uniflora* et *pauciflora* Fisch. = *inclusa* Lehm.), divaricata Rchb., nemoralis Heuff., pratensis Spgl. (= *L. dioica β* L. = *alba* Mill. = *arvensis* Schk. = *vespertina* Sibth. = *Saponaria dioica* Mch.), sylvestris Hoppe (= *dioica α* L. = *diurna* Sibth.), p. 482 u. 883 gehören zu dieser Section.

M. noctiflorum Fr. et *M. Pumilio* Fr., v. Silene noctiflora, p. 758 et Hohenwarthia Pumilio, p. 303, II.

IV. Viscaria Riv., Röhl.

alpina L., *α*) lapponica et *β*) helvetica G. Don.

Viscaria L. (= *vulgaris* Röhl.).

Aufserdem werden in den Gärten unter folgenden Namen noch kultivirt: amoena fl. pleno, atropurpurea Roem., Fortunei, laciniata v. Houtte, lusitanica Mill., suecica Steud. (= *Agrostemma suecica* Maund), deren Stellung unter die Sectionen mir unbekannt ist.

Lyciopsis thymifolia Spach, v. Fuchsia thymifolia, *Lycioserissa capensis* R. et S., v. Plectronia ventosa *β*.

Lycium L., Bocksdorn.

auriculatum Brotero, geöhrter, ♄. ? ? ?

barbarum L. (= *halimifolium* Mill.).

chilense Miers, (= *nutans* Poepp.), chilesischer, ♄. k. f. b. Chili.

fuchsioides H. B. K., fuchsiaähnlicher, ♄. k. Südamer.

inerme Mill., ? Wender., unbewehrter, ♄. Sch. f. ?

lanceolatum Poir., *β*) turbinatum Duham. (= *barbarum* DC. = ? *halimifolium* Mill.).

aggregatum R. et P. (= *arborescens* Spgl.), v. Acnistus arborescens, p. 7, II., *barbatum* Thbg., v. Plectronia ventosa, *foetidum* L. (= *japonicum* Thbg.), v. Serissa foetida, p. 747.

Lycopersicum T., Mill., Liebesapfel.

dentatum Dun., gezahnter, ☉. f. m. ?

hirsutum Dun, rauhhaariger, ☉. f. m. Südamerika.

peruvianum Mill., *α*) parvifolium, *β*) commutatum Spgl.

pimpinellifolium Dun. (= ? *inodorum* Juss.).

---

1) Zwischen L. alpina u. flos cuculi in der Mitte stehend.

Digitized by Google

Lycopodium T., L., Bärlapp.

apodum L. (= *brasiliense* Raddi, = *Selaginella Apus* Spring.).

complanatum L., β) Chamaecyparissus A. Braun (= *anceps* Wallr.).

cuspidatum Lk., Hort. (= *circinale* Kunze, = *Selaginella cuspidata* Lk.), zugespitzter, 4. w. Mexico.

b) cordifolium Hort.

laxum Presl, Spring. (= *dichotomum* Hort.), lockerer, 4. w. Südamerika.

pumilum Schltdl., niedriger, ⊙. 4. w. Cap d. g. Hoffn.

stellatum Lk. (= *stoloniferum* Raddi et *sulcatum* Hort. = *Selaginella stellata* Spring.), sternförmiger, 4. w. Brasilien.

Lycopsis L., Krummhals.

erecta d'Urv., aufrechter, ⊙. f. Theodosia, Georgien, Armenien.

variegata L. (= *bullata* Cyril. = *Anchusa perlata* Lam. = *A. cretica* Mill. = *A. variegata* Lehm. = *A. Milleri* Biasol).

obtusifolia W., v. Nonnea obtusifolia.

Lycopus T., Wolfstrafs.

arkansanus Fresen., arkansanischer, 4. Nordamerika.

europaeus L. (= *aquaticus* Mch. = *palustris* Lam. = *vulgaris* P.), β) laciniatus Vahl, (= *exaltatus* Schrad.), γ) intermedius Schrad., G. Don.

exaltatus L. fil. (= *laciniatus* Mart. = *pinnatifidus* Pall.).

macrophyllus Benth. (= ?*virginicus* L. β *quercifolius* Pursh), grofsblätteriger, 4. f. Nordwestl. Amerika.

rubellus Mch., Wender., röthlicher, 4. f. Nordamerika.

sinuatus Ell. (= *americanus* Mlbg. = *angustifolius* Ell. = *bracteatus* Mhlbg. = *europaeus* Pursh = *vulgaris* Nutt.), buchtiger, 4. f. Nordamerika.

β) angustifolius Nutt. (= *longifolius* Rafin. = *pensylvanicus* Mühlbg.), γ) heterophyllus Rafin. (= *exaltatus* Ell.).

Lycoris hyacinthina Herb., v. Griffinia hyacinthina.

Lycotis leucanthemoides Hffg., v. Arctotis leucanthemoides, p. 73.

Lygistum axillare Lam., v. Manettia Lygistum, p. 495.

Lygodium Sw., Schlingfarrn.

cuneatum Lk., keilförmiger, 4. Sch. w. ?

hastatum Mart., non W., spontonförmiger, 4. Sch. w. Brasilien.

microphyllum RBr. (= *scandens* Sw. = *Ugena microphylla* Cav. = *Hydroglossum scandens* W. = *Ophioglossum scandens* L.), kleinblätteriger, 4. Sch. w. Inseln des indischen Oceans.

polymorphum H. B. K. (= *hirsutum* W. = *pubescens* Kaulf.), β) glabrescens Lk. (= *mexicanum* H. Berol. = ?*varium* Hort.).

volubile Sw. (= ?*semihastatum* Anglor.).

Lygodysodea R. et P., Geruchröthe, V. s., Rubiaceae.

ciliata Bartl. (= *mexicana* DC. mpt.), gewimperte, ħ. t. Mexico.

foetida R. et P. (= *Disodea foetida* P., non *Paederia foetida* L.), stinkende, ħ. t. Peru.

Lyonnetia DC., Lyonnetie, p. 485.

abrotanifolia Less. (= *Anacyclus anthemoides* Lagasc. = *Cotula abrotanifolia* W. = *Lasiospermum anthe-*

Digitized by Google

Lyonnetia

moides G. Don = *Santolina anthemoides* L.), stabwurzblätterige, ⊙. f. Südeuropa.

muricata DC. (= *Santolina muricata* Gmel.), weichstachelige, ⊙. f. Sicilien.

rigida DC. (= *Anacyclus creticus* L. var. Urv. = *Lasiospermum rigidum* G. Don = ? *Santolina rigida* Sibth., Sm., p. 883).

Lyperia Benth., Lyperie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrophularineae).

argentea Benth. (= *Manulea argentea* Thbg., p. 495).

fragrans Benth. (= *Erinus fragrans* Soland, Ait. = *E. lychnideus* Thbg., non W. = *Nycterinia fragrans* D. Don, p. 551).

incisa Benth. (= *Erinus incisus* Thbg.), eingeschnittene, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

microphylla Benth. (= *Manulea microphylla* Thbg.), kleinblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

simplex Benth. (= *Erinus simplex* Thbg.), einfache, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tristis Benth. (= *Erinus tristis* Thbg. = *Nycterinia tristis* D. Don, p. 551).

violacea Benth. (= *Manulea crystallina* Weinm. = *Manulea violacea* Lk., p. 496), violette, 4. ♄. k. t. Cap d. guten Hoffn.

Lyraea Lindl., Lyraea, XX. I., Orchideae.

prismatica Lindl. (= *Bolbophyllum prismaticum* Pet. Th.), prismatische, 4. w. Mascarenas.

Lysimachia T., Mch., Lysimachie (Gelbweiderich).

anagalloides Sibth., Sm., Gauchheilähnliche, 4. k. Creta.

brachystachys Bunge, kurzährige, 4. f. Nordchina.

ciliata L. (= *quadrifolia β ciliata* L. = *decipiens* Bertol.).

debilis Wall., schwache, 4. k. Nepal.

dubia Ait. (= *atropurpurea* Murr., non L. = *orientalis* Lam.).

lobelioides Wall. (= *secunda* Hamilt.), lobelienähnliche, 4. k. Nepal, Cachemyre.

nutans N. E. (= *purpurea* Hook. = *Lubinia atropurpurea* Lk. et Otto = *L. purpurea* Swt.), nickende, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Ungewifs: Vulneraria Nois.

adoensis Hochst. et Steud., v. Anagallis arvensis, p. 52, *thyrsiflora* L. (et *capitata* Pursh), v. Naumburgia thyrsiflora.

Lysinema RBr., Lysinema.

curvatum Lindl., gekrümmte, ♄. t. Neuholland.

spicatum Lindl., ährenförmige, ♄. t. Neuholland.

Lyssanthe Knght. et Salisb., *cana* Salisb., *cytisifolia* Salisb. (= *sericea* Salisb.), *linearifolia* Salisb., *speciosa* Salisb., v. Grevillea arenaria, sericea, linearis et purpurea.

Lythrum L. (= *Salicaria* T.), Weiderich.

alatum Pursh (= *acinifolium* Moç. Sess. = *Kennedyanum* H. B. K. = *virginicum* Kennedy, = *Vulneraria* Schrank.).

carthagenense Jacq., carthagenischer, ⊙. m. f. Carthagena.

divaricatum Colla, ausgespreitzter, ♄. k. t. Chili.

Gräfferi Tenore (= *acutangulum* Lag. = *alatum* Presl = *flexuosum* Lagasca, = *hyssopifolium* d'Urv. =

Digitized by Google

Lythrum
nummulariaefolium P. (= *punicifolium* Chamiss. = *thymifolium* Sieb.).
Gussoni Presl (= *Gräfferi* Tenor. var. DC.), Gussone's, ☉. f. Sicilien.
Hyssopifolia L. (= *parviflorum* Bast. = *Salicaria Gräfferi* H. Berol.).
lanceolatum Ell. (= *saturejaefolium* Moç. Sess. = *virgatum* Walt., ? Pursh), lanzettblätteriger, 4. f. Nordamerika.
Purshianum Steud. (= *diffusum* Swt., non Arrabida, = *virgatum* Pursh), Pursh's, 4. f. Nordamerika.
Salicaria L., *β*) gracile DC. (= *racemosum* Hort.).
virgatum L. (= *austriacum* Jacq.).
Gartenvarietäten: brachypetalum Hort., roseum superbum Hort.
ciliatum Sw., *cistifolium* L'Her., *Cuphea* L. (= *petiolatum* L.) etc., v. Cuphea decandra, ciliata, viscosissima etc., *flavum* Spgl., v. Heimia salicifolia.

Macbridea Ell., Macbridea, XIV. 1., Labiatae.
pulchella Ell. (= *pulchra* Auct. = *Melittis caroliniana* Spgl. = *Prasium incarnatum* Walt. = *Thymbra caroliniana* Walt.), schöne, 4. ♄. f. b. k. Nordamerika.
Machaerium P., Machaerium, XVII. 1v., Leguminosae-Papilionaceae.
aculeatum Raddi, (= ? *angustifolium β* Vogel, = *Nissolia aculeata* DC., Spgl., p. 549).
arboreum Benth. (= *Nissolia arborea* L. = *N. glabrata* Lk.), baumartiges, ♄. w. Südamerika.
micropterum Benth. (= *Nissolia microptera* Poir., p. 549).
robiniaefolium Vogel, (= *Nissolia robiniaefolia* DC., p. 549).
Macfadyena A. DC. (Dr. J. Macfadyen, Verfasser einer Flora von Jamaica), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.
uncinata A. DC. (= *Bignonia uncinata* G. F. W. Mey. = ? *Spathodea uncinata* Spgl.), hackiggekrümmte, ♄. Sch. w. Guiana.
Macleania Hook., Macleanie, VIII. 1., Vaccinieae.
angulata Hook., kantige, ♄. t. k. Peru.
coccinea ? Hook., scharlachfarbige, ♄. t. k. Südamerika.
floribunda Hook., blüthenreiche, ♄. t. k. Peru.
insignis Makoy, ausgezeichnete, ♄. t. k. ? Südamerika.
longiflora Lindl., langblumige, ♄. t. k. Cordilleren (Loxa).
Macreightia DC. (Dr. Macreight, hat ein Manual of british botany herausgegeben), XXII. x., Sapotaceae.
acapulcensis DC. (= *Diospyros acapulcensis* H. B. K. = ? *D. salicifolia* W.), acapulcische, ♄. t. Mexico.
Macroceratides Pseudostizolobium Raddi, v. Mucuna macroceratides, p. 583.
Macrochilus Fryanus Knowl. et Westc., v. Miltonia spectabilis.
Macrochloa arenaria Kunth, tenacissima Kunth, v. Stipa, Sect. III., p. 789.
Macrocnemum speciosum Jacq., v. Mussaenda speciosa, p. 535, *strictum* W., v. Randia stricta, *tinctorium* H. B. K., v. Condaminea tinctoria Nachl.
Macrolepis A. Rich., Schuppenstendel, XX. 1., Orchideae.
longiscapa A. Rich., langschaftiger, 4. w. Guiana.

Digitized by Google

Macrolinum paucifolium Kl., v. Syndesmanthus paucifolius.

Macrolobium bifolium P. (= *hymenaeoides* Vahl, W. = *Vouapa* Gmel.), v. Vouapa bifolia.

Macrostylis Bartl. et Wendl., Langgriffel.

cordata G. Don, herzförmiger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

obtusa Bartl. et Wendl., stumpfblätteriger, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

Macrozamia Miq., Zapfenpalme, XXII. XII., Cycadeaceae.

Preissii Lehm., Preiſs's, ♄. w. t. Neuholland.

spiralis Miq. (= *Encephalartos spiralis* Lehm. = *Zamia spiralis* Salisb., p. 862).

Zweifelhafte Art: Fraseri Miq. Neuholland.

Madaroglossa DC., Glattzüngelchen.

carnosa Nutt., fleischiges, ⊙. f. Californien.

Douglasii Walp., Douglas's, ⊙. f. Nordamerika.

elegans Nutt., zierliches, ⊙. f. Californien.

Madia Molin., Madie.

I. Genuina.

angustifolia H. Bonn. (= *viscosa* Hort.), schmalblätterige, ⊙. f. m., ? Chili.

glomerata Hook., knaulförmige, ⊙. f. m. Nordamerika.

quinqueradiata Fisch. et Mey., fünfstralige, ⊙. f. m. Chili, ? Westl. Nordamerika.

II. Madaria DC.

corymbosa DC. (= *racemosa* Nutt.).

elegans DC. (= *floribunda* Hort.).

Maelenia Dumort., Maelenie, XX. I., Orchideae.

paradoxa Dumort., wunderbare, 4. w. Brasilien.

Maesa Forsk., *argentea* DC., *indica* DC., *macrophylla* Don, Loud., *pubescens* Lodd., *tomentosa* Don, v. Baeobotrys argentea etc., p. 110.

Magnolia L., Magnolie.

acuminata L. (= *pensylvanica* Hort. = *rustica* Hort. = *virginiana* ε L.), d) longifolia Hort.

auriculata L. (= *auricularis* Salisb. = *Fraseri* Walt.).

dealbata Zuccar., weiſsliche, ♄. t. Mexico.

fuscata Andr. (= *fasciata* Vent. = *meleagrioides* Hort. = *versicolor* Salisb. = *Michelia fuscata* Wight), β) parviflora Blum., γ) annonaefolia Salisb.

glauca L. (= *fragrans* Salisb. = *virginiana* L.), β) Gordoniana Hort. (= *longifolia* Hort.), γ) Burchelliana Hort., δ) Thomsoniana Hort.

insignis Wall., ausgezeichnete, ♄. t. w. Ostindien.

mexicana DC. (= *glauca* Moç. Sess. = *grandiflora* Moç. Sess), mexicanische, ♄. t. Mexico.

obovata Thbg. (= *glauca* β Thbg.), β) discolor Vent. (= *atropurpurea* Hort. = *purpurea* Curt.), b) longifolia Hort., c) pallida Hort.

tripetala L. (= *umbellata* Hort. = *virginiana* δ L.).

? Hybride: Harwicus Hort. Makoy.

odoratissima Reinw. (= *pumila* Spgl., non Andr.), *Plumierii* Sw. (= *fatiscens* Rich.), *pumila* Andr., v. Talauma Candollei etc., p. 797.

Magydaris K. (= *Eriocachrys* DC. msp.), Wolfdolde, V. II., Umbelliferae.

panacina DC. (= *Athamantha panacifolia* Spgl., p. 104 = *Cachrys hungarica* Mill. = ? *C. panacifolia* Vahl, = *C. pastinacea* Lam.).

Digitized by Google

Magydaris
tomentosa K. (= *Athamantha panacifolia* var. Spgl. = *Cachrys panacifolia* Vahl, = *C. Panax Siculum* Ucria, = *C. tomentosa* Dsf.), filzige, 4. k. Sicilien, Nordafrika.

Mahernia L., Mahernie.
biserrata Cavan. (= *Hermannia biserrata* L.), doppeltsägezähnige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
diffusa Jacq. (= *odorata* Andr. = *Hermannia diffusa* L. fil.).
sessilifolia DC. (= *sessilifolia* Auct.), stiellosblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Mahonia Nutt., Mahonie.
Aquifolium Nutt. (= *Berberis pinnata* Banks, = *B. Aquifolium* Pursh), β) repens G. Don, (= *Berberis repens* Lindl.), γ) nutkana DC.
Ehrenbergii ? Kl., Ehrenberg's, ♄. ♄. k. t. Mexico.
fascicularis DC. (= *Berberis fascicularis* Schult. fil. = *B. fasciculata* Sims, = *B. pinnata* Lagasca), β) moranensis * (= *Berberis moranensis* Schult. fil. = *B. pinnata* H. B. K.).
glumacea DC. (= *Berberis nervosa* Pursh).
intermedia H. belg., mittlere, ♄. ♄. k. ? Westl. Nordamerika, ? Mexico.
pallida H. belg, bleiche, ♄. ♄. k. t. ? Mexico.
trifoliata Cham., Schltdl., (= *ilicifolia* Schltdl. = *Berberis trifolia* Schult. fil.), dreiblätterige, ♄. ♄. t. k. Mexico.
Unbestimmt: triangularis Hort.

Mahurea Aubl., DC. (? guianischer Name), XIII. 1., Ternstroemiaceae.
palustris Aubl. (= *Bonnetia meridionalis* Sw. = *B. palustris* Vahl), Sumpfliebende, ♄. w. Guiana, Brasilien.
speciosa Chois., DC. (= *Bonnetia racemosa* Sw. = *Marila racemosa* Sw., DC.), prächtige, ♄. w. Caribäen.

Maillea Parlatore, (Alphons Maille, botanischer Freund Parlatore's), III. 11., Gramineae.
Urvillei Parlat. (= *Phalaris crypsoides* Urv. = *Crypsis alopecuroides* ? Auct., non Schrad.), Urville's, ☉. f. Griechenland.

Mairia N. E., DC. (Lemaire, Professor etc. zu Gent).
crenata N. E. (= *Arnica crenata* Thbg. = *Aster crenatus* Less. = *Gerbera crenata* Ker, p. 489).
taxifolia DC. (= *Aster ciliaris* Thbg. = *A. filiformis* Eckl. = *A. taxifolius* L. = *Elphegea ciliata* Less. = *Leyssera ciliata* Thbg. = *Zyrphelis amoena* Cass. = *Z. taxifolia* Cass.), taxusblätterige, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Majorana Mch., Majoran, XIV. 1., Labiatae.
crassifolia Benth. (= *Origanum aegyptiacum* Auct., non L. = *O. Maru* L. spec., non Auct.), dickblätteriger, 4. ♄. k. Creta, Palästina.
hortensis Mch. (= *Origanum Majorana* L., p. 567 = *O. heracleoticum* Hort., non L. = *O. Onites* Lam., non L.), β) majoranoides (W.), γ) ? crassa Mch.
microphylla Benth. (= *Origanum Maru* Sibth., Sm., Auct., non L. = *O. microphyllum* Sieber), kleinblätteriger, 4. ♄. k. Creta.
neglecta Vogel, (= *Origanum Onites* W.), übersehener, 4. k. Creta.

Digitized by Google

Majorana
nervosa Benth. (= ? *Origanum syriacum* L.), nerviger, 4. ħ. k. Aegypten, Arabien.
Onites Benth. (= *Origanum Onites* L., p. 567 = *O. pallidum* Dsf. Catal. h. Par., P. = *O. smyrnaeum* L., p. 567).
Orega Vogel, Orega-M., 4. ħ. k. ?
turbinata Vogel, aufgetriebener, 4. k. ?
Malabaila Tausch, non Hoffm., (Graf Malabaila von Canal, Präsident der k. k. ökonom. Gesellschaft zu Prag), V. II., Umbelliferae.
Hacquetii Tausch. (= *Athamantha Galatia* Gmel. = *A. Golaka* Hacq. = *Hladnickia golacensis* K., p. 880 = *Ligusticum carniolicum* Host, = *L. Sprengelii* Sieb. = *Pleurospermum Golaka* Rchb.), Hacquet's, 4. f. Krain.
M. graveolens Hoffm. et *pimpinellifolia* Hoffm., v. Pastinaca graveolens et pimpinellifolia, p. 390 et 391. *Malachium aquaticum* Fr., v. Stellaria pentagyna, *manticum* Rchb., v. Mönchia mantica.
Malachra L., Weichmalve.
mexicana Schrad., mexicanische, ⊙. f. m. Mexico.
palmata Mch., handförmige, ⊙. f. m. ?
plumosa Desr. (= *Sida plumosa* Cav.), federige, ? ⊙. w. Brasilien.
rosea Hffg., rosafarbige, ħ. w. ?
triloba Dsf., dreilappige, ⊙. f. m. Südamerika.
Urena DC. (= *Urena Loureirii* Meisn. = *U. polyflora* Lour.), Urenaähnliche, ħ. w. China.
urens Poit., Ledeb., brennende, ? ħ. w. Domingo. (Ob kult.?)
Malacocarpus Fisch. et Mey., Weichfrucht, XI. I., Tricoccae-Rutaceae.
crithmifolius Fisch. et Mey. (= *Peganum crithmifolium* Eichw.), meerfenchelblätterige, 4. f. Oestl. Ufer des caspischen Meeres.
Malococephalus altaicus Tausch et *pinnatifidus* Tausch v. Leuzea salina, p. 460 et pinnatifida, p. 356, II. *Malacochaete litoralis* N. B., v. Scirpus litoralis, p. 733.
Malacothrix DC., Weichhaar, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.
californica DC., californisches, ⊙. f. Californien.
Malaxis caudata W., v. Brassia caudata, *monophyllos* Sw., *ophioglossoides* Mühlbg., v. Microstylis monophylla, ophioglossoides.
Malcolmia RBr., Malcolmie.
erosa DC. (= *triloba* var. Spgl. = *Hesperis erosa* Lag.), ausgebissene, ⊙. f. Baeotien.
graeca Boiss., griechische, ⊙. f. Griechenland.
incrassata DC., verdickte, ⊙. f. Griechenland.
runcinata C. A. Mey., schrotsägenförmige, ⊙. f. Caucasus.
triloba Spr. (= *Broussonetii* DC. = *lacera* DC. ex parte = *Cheiranthus trilobus* L. = *Hesperis pinnatifida* Dsf.), dreilappige, ⊙. f. Südeuropa.
turgida Hort., aufgetriebene, ⊙. f. ?
Malesherbia R. et P., Malesherbie.
tenuifolia G. Don, dünnblätterige, ⊙. f. m. Peru.
Mallea Adr. Juss., Mallea, XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.
Rothii Adr. Juss. (= *Ekebergia indica* Roxb. = *Melia*

Digitized by Google

Mallea
baccifera Roth, = *M. baccata* Heyne herb.), Roth's, ♄. w. Ostindien.

Malouetia A. DC. (Malouet hat statistische Notizen über die französischen Colonien herausgegeben), V. 1., Contortae-Apocyneae.
odorata A. DC. (= *Tabernaemontana odorata* Vahl, p. 796).
Tamaquarina A. DC. (= *Cameraria Tamaquarina* Aubl. = *lutea* Lam.), gelbe, ♄. w. Guiana.

Malope L., Malope.
malacoides L., β) sinuata Cav.
multiflora Triguer., vielblumige, ☉. f. Spanien.
stipulacea Cavan., afterblätterige, ☉. f. Mauritanien.
trifida Cavan., β) grandiflora Hort., b) fl. albo.
Unbestimmtere: ciliata Dietr., rotundifolia Gmel.

Malpighia Plum., Malpighie.
aquifolia L. (= *ilicifolia* Mill.).
coccifera L. (= *microphylla* Hort.).
grandiflora Jacq., grofsblumige, ♄. w. Martinique.
incana Mill. (= *campechiensis* Poir.), weifsgraue, ♄. w. Westindien.
malifolia N. E., Mart., äpfelblätterige, ♄. w. Brasilien.
myrtifolia Dsf., myrtenblätterige, ♄. w. Antillen.
nitida Mill., glänzende, ♄. w. Carthagena.
Unbestimmt: ferruginea Hort.

Malva T., Malve.
abyssinica A. Braun, abyssinische, ☉. f. m. Abyssinien.
Alcea L., γ) tenuifolia Rchb. (= *excisa* Rchb.).
alceoides Tenor. (= *Morenii* Hook., non Poll.), Alceaähnliche, 4. f. Italien.
althaeoides Cav., β) hirsuta Tenore.
americana L. (= *africana* Mill. = *curassavica* Desr. = *hispida* Mch.).
anomala Lk. et Otto, abweichende, ?☉. f. ?
arborea v. Houtte, baumartige, ♄. w. ?Südamerika.
Biasolettiana Kunze, Biasoletto's, ☉. f. ?Südeuropa.
bryonifolia L. (= *reflexa* Wendl. = *stellata* Thbg.).
commutata Rchb., verwechselte, ?☉. f. ?
cordifolia H. Berol., herzblätterige, ☉. f. ?
Creeana Hook., b) alba.
flexuosa Hornem. (= *verticillata* L. var.), gebogene, ☉. f. Südeuropa.
fragrans Jacq. (= *capensis* γ L. = *glutinosa* Desr. = *scabrosa* L.).
lucida Lindl., spiegelnde, ☉. f. Himalaya.
mauritanica Spgl. (= *mauritiana* L. = *obtusa* Mch.), β) glabra Desr. (= *sinensis* Cav.), γ) acutiloba H. Berol. (= *chinensis* Hort.),
miniata Cav. (= ? *lateritia* Hort. = *Sphaeralcea miniata* Spach), ?β) Creeana Hook, Hort.
Morenii Poll. (= ? *albulensis* Cav. = *Alcea* L. var., DC.), Moreni's, 4. f. Süddeutschland, Italien.
orientalis Mill., morgenländische, ☉. f. Orient.
oxyacanthoides Hornem. (= *divaricata* Hort. = *praemorsa* Hffg. = *Toxicodendron* Hort.).
polystachya Cav. (= *betulina* Desr.).
pulchella Bernh. (= *hybrida* Hort. = *nepalensis* Hort.), hübsche, ☉. f. China.
rugosa Desr. (= *virgata* Murr. var.), runzelige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Malva

scabra Cav. (= *Lagasceae* Hort. Taur.).

Schiedeana Steud. (= *ribifolia* Schltdl., non Vivian.), Schiede's, 4. k. Mexico.

stenophylla Hflg., schmalblätterige, ♄. k. ?

stricta Jacq. (= ?*grossulariaefolia* Cav.), steife, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

subtriflora Lagasca, fastdreiblumige, ♄. ♄ k. t. Neuspanien.

sylvestris L., *β*) albiflora Presl, (= *veneta* Hort.).

tenella Cav., zarte, ⊙. f. Chili.

Towardi v. Houtte, Toward's, ♄. k. t. ?

Tournefortiana Ait. (= *maritima* Lam. = *tenuifolia* Dsf.).

tricuspidata Ait. (= *jamaicensis* Hort. = *Sida betulaefolia* Hort. = *S. carpinifolia* Hort. = *S. carpinoides* DC. = *S. coromandelina* Hort.), *β*) antillarum Zucc.

verticillata L. (= *chinensis* Mill.).

Unbestimmtere: anglica Roem. hort. Turic., Columnae Tenore, glabrifolia Tenore, leptophylla Hort., lutea Roem. hort. Turic., pumila Retz, Rodigii Presl, tuberculata Lk.

abutiloides L., *angustifolia* Cav., *elegans* Cav., *lactea* Ait., *Munroana* Dougl., *obtusiloba* Hook., *rosea* Moç. Sess., *umbellata* Cav., v. Sphaeralcea abutiloides, angustifolia etc., *caroliniana* L., *decumbens* W., *prostrata* Cav., v. Modiola caroliniana etc. — *M. Papaver* Cav. (= *nuttallioides* Croom.), v. Nuttallia digitata et Papaver, p. 557.

Malvaviscus Dill., Adans., G., Cav., DC. (= *Achania* Sw., p. 9), Schampappel, XVI. VIII., Malvaceae.

arbòreus Cav. (= *Achania Malvaviscus* Sw. = *Hibiscus Malvaviscus* L.).

Balbisii DC. (= *cordatus* Balb. = *Achania* ? *cordata* Mart.), Balbis's, ♄. w. Brasilien.

cordatus DC. (= *Achania cordata* N. E., Mart.).

grandiflorus H. B. K. (= *Achania* ? *pilosa* Sw.), grofsblumige, ♄. w. Mexico.

mollis DC. (= *Achania mollis* Ait.).

pilosus DC. (= *Achania pilosa* Sw.).

Malvinda angustifolia Medik. Mch., *carpinifolia* Mch., *palmata* Mch., *spinosa* Mch., *umbellata* Mch., v. Sida angustifolia, carpinifolia, ricinoides, spinosa, umbellata, p. 752 et 753.

Mammea L., Mammea.

africana Sabine, africanische, ♄. w. Sierra Leone.

Mammillaria Haw., DC., p. 492, v. Cacteae p. 872 et p. 84, II.

Mandevillea suaveolens Lindl., v. Echites suaveolens, p. 215, II.

Mandragora T., Alraunwurz.

microcarpa Bertol. (= *autumnalis* Spgl. = *officinalis* Moris), kleinfrüchtige, 4. f. b. k. Sardinien.

officinarum Bertol. (= *autumnalis* Spgl. = *Atropa Mandragora* L.), gebräuchliche, 4. f. b. k. Griechenland, Sicilien.

Manettia Mutis, L., Manettie.

bicolor Lindl., zweifarbige, ♄. Sch. w. Brasilien.

cordifolia Mart. (= *glabra* Cham. et Schltdl. sec. Hook.).

Gärtneri DC. (= *glabra* Steud. = *Lygystum* Bank's, = *Nacibaea glabra* G. fil.), Gärtner's, ♄. w. ?

splendens Makoy, schimmernde, ♄. w. ? Brasilien.

Digitized by Google

Mangifera L., Mangobaum.

indica L. (= *Amba* Forsk. = *domestica* G. = *montana* Heyne, = *sativa* Hort. par.), ? *β*) elliptica Hort.

laxiflora Desr., lockerblumiger, ♄. w. Mauritius.

Manglesia Endl., (Mangles, englischer Naturforscher), IV. 1., Proteaceae.

cuneata Endl. (= *glabrata* Lindl. = *Anadenia Manglesii* Grah. = *Grevillea Manglesii* Hort.), keilblätterige, ♄. t. Südwestl. Neuholland.

Lawrenceana H. angl. (= *Grevillea Lawrenceana* Hort. angl., p. 274, II.).

tridentifera Endl. (= *trifurcata* Hort. belg.), dreizähnige, ♄. t. Neuholland.

M. vestita Endl., ♄. Neuholland, scheint noch nicht eingeführt.

Manglilla canariensis R. et S., v. Pleiomeris canariensis, *Milleriana* P. v. Sideroxylon mite.

Hinschtl. d. übrigen s. Myrsine.

Manihot Adans., Pohl, (= *Janipha* H. B. K. p. 428), Cassavabaum, XXI. 1., Tricoccae-Euphorbiaceae.

aesculifolia Pohl, (= *Janipha aesculifolia* H. B. K.).

angustifolia Pohl, (= *Janipha angustifolia* * = *Jatropha angustifolia* Steud.).

cajaniformis Pohl, (= *Janipha Löfflingii* H. B. K. var. Spgl. = *J. Yuguilla* H. B. K. = *Jatropha cajaniformis* Steud.), taubenkleeähnlicher, ♄. ♄. w. Brasilien.

digitata Swt. (= *Croton digitatum* Fisch. = *Jatropha Fischeri* Steud.), fingerförmiger, ♄. ♄. t. Neuholland.

foetida Pohl, (= *Janipha foetida* H. B. K. = *Jatropha foetida* Steud.).

Janipha Pohl, (= *Janipha Löfflingii* H. B. K. = *Jatropha carthagenensis* Jacq. = *J. frutescens* Auct. = *J. Janipha* L.), Janipha-C., ♄. ♄. w. Südamerika.

peltata Pohl, (= *Jatropha peltata* Steud., non H. B. K.) schildförmiger, ♄. ♄. w. Brasilien.

utilissima Pohl, (= *Janipha Manihot* H. B. K., p. 429 = *Jatropha Manihot* L.), nutzbarster, ♄. ♄. w. Südamerika.

Manisuris L., granularis Sw. (= *polystachya* P. B. = *Cenchrus granularis* L.).

Manna caspica Don, *hebraica* Don, v. Alhagi camelorum et maurorum, p. 28 et p. 18, II.

Mansoa DC., (P. da Silva Manso, brasilian. Botaniker, hat über die Materia medica Brasiliensis geschrieben), XIV. 11., Bignoniaceae.

hirsuta DC., rauhhaarige, ♄. ♄ Sch. w. Brasilien. (Ob eingeführt?)

Mantisalca elegans Cass., v. Microlonchus salmanticus, Centaurea Sect. III., p. 179 et p. 131, II.

Manulea L., Handblume.

Cheiranthus L. (= *rhynchantha* Lk. Enum. = *Lobelia Cheiranthus* L. = *Nemia Cheiranthus* Berg.).

incana Thbg., weifsgraue, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

parviflora Benth. (= *natalensis* Bernh.), kleinblumige, ♃. ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

rubra L., Thbg. (= *angustifolia* Lk. = *hirta* Desr. = *Nemia rubra* Berg.).

thyrsiflora L., Thbg., straufsblumige, ♃. ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Manulea
aethiopica Thbg., *capensis* Thbg., v. Polycarena aurea et capensis, *capitata* Thbg, v. Phyllopodium capitatum, *cordata* Thbg., *foetida* Andr. (= *alternifolia* P.), *hispida* Thbg. (= *oppositifolia* Vent.), v. Chaenostoma cordatum etc. Nachl. et p. 134, II., *crystallina* Weinm. (= *violacea* Lk.), *lychnidea* Desr., *microphylla* Thbg., *pedunculata* Andr., v. Lyperia violacea etc., p. 378, II., *viscosa* W., v. Sphenandra viscosa.

Mappa Adr. Juss., Mappa, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
jamaicensis Spgl. (= *Croton globosum* Sw. = *Ricinus globosus* W., p. 691), jamaicanischer, ♄. ♄. w. Jamaica.
moluccana Spgl. (= *Acalypha Mappa* W. = *Ricinus Mappa* L. = *Trewia hernandifolia* Roth), moluckischer, ♄. ♄. w. Molucken.
tanaria Spgl. (= *glabra* Juss. = *Ricinus tanarius* L., p. 691).

Maranta Plum, Maranta.
Allouya Aubl. (= *semperflorens* Hort. = *Calathea Allouya* Loud., p. 145, = *Curcuma americana* Lam. = *Phrynium Allouya* Rosc.), Allouya-M., 4. w. Mittägl. Amerika.
Arouma Aubl. (= *juncea* Lam. = *petiolata* Rudge, = *Calathea juncea* Spgl.), Arouma-M., 4. w. Guiana.
humilis Aubl., niedrige, 4. w. Cayenne.
racemosa Lk. (= *Thalia racemosa* Willd. herb.), traubige, 4. w. Mittägl. Amerika.
Tonchat Aubl. (= *angustifolia* Sims, = *graminifolia* R. et. P.).
trifasciata v. Houtte, dreibänderige, 4. w. ? Südamerika.
variegata Lodd., bunte, 4. w. Südamerika.
dealbata Dietr., *geniculata* Dietr., v. Thalia dealbata et geniculata, p. 804, *discolor* Hort. (= *picta* Hort. = ?) *Galanga* L., non Lam., *malaccensis* Burm., v. Alpinia Galanga et malaccensis, p. 37 et 38, *setosa* A. Dietr. (= *secunda* Grah.), v. Phrynium setosum, p. 618.

Marattia Sm., Marattie.
cicutaefolia Kaulf. (= *fraxinea* Raddi), Wasserschierlingblätterige, 4. w. Brasilien (Corcovado).
Kaulfussii J. Sm. sub Eupodio (= *laevis* Lk. an Sm.? = *macrophylla* Makoy, = ? *alata* H. Berol.), Kaulfuſs's, 4. w. Westindien.

Marcetia DC., (A. Marcet, Prof. d. Chemie zu Genf, † u. dessen Wittwe Jeanne Marcet), VIII., 1., Lythrariae-Melastomaceae.
excorticata DC. (= *Rhexia excorticata* Mart.), rindenlose, ♄. w. Brasilien.
glandulosa DC. (= *excorticata* DC. var. Cham. = *Rhexia quadrivalvis* Mart. herb.), drüsige, ♄. w. Brasilien.

Marginaria Lk., dimorhpa Lk., meniscifolia Presl, v. Polypodium Sect.

Margyricarpus R. et P., Perlfrucht.
alatus Gill. in Hook. (= *linearis* Steud.), geflügelte, ♄. t. k. Chili.

Digitized by Google

Marialva Vandell., Marialva, XIII. VI., Guttiferae.
fructipendula Chois. (= *Bonnharnoisia fructipendula* R. et P. = *Euthales peruviana* J. G. Dietr. = *Tavomita fructipendula* Poir.), fruchthängende, ♄. ♄. w. Guiana, Brasilien.

Marianthus Hügel, Klebblume, V. I. Pittosporeae.
candidus Hügel, weifsglänzende, ♄. t. Neuholland.
coelestis Putterl. (= *Billardiera variifolia* DC.), himmelische, ♄. Sch. t. Neuholland.
coeruleo-punctatus Lk., Kl., blaupunktirte, ♄. t. Neuholland (Van Diemens Land).
erubescens Putterl., floribundus Putterl., venustus Putterl. Sämmtl. ♄. Neuholland, scheinen noch nicht kultivirt zu werden.
Marica grandis v. Houtte, *Tigridia* Lehm., v. Cipura grandis et Tigridia Nachlese.
Marila racemosa Sw., v. Mahurea speciosa, p 381, II.

Mariscus Vahl, Bollsimse.
alternifolius Vahl, wechselblätterige, 4. w. Guiana.

Marrubium L., Andorn.
candidissimum L. (= *catariaefolium* Rchb., non Desr. = *flexuosum* Mch. = *peregrinum* Rchb. = *setaceum* Desr. = *uncinatum* Hornem.).
cinerascens Fisch., aschfarbiger, 4. f. ? Asiat. Rufsland.
circinnatum Desr. (= *velutinum* Sibth., Sm.), kreisförmiger, 4. f. Griechenland.
coerulescens Dsf., blaulicher, 4. f. Persien.
eriostachyum Benth. (= *Lagopus viridis* Bunge, = *Leonurus eriostachys* Turcz.), wollähriger, 4. f. Sibir.
incisum Benth. (= *Leonurus supinus* W.), eingeschnittener, 4. f. Sibirien, Nordchina.
lanatum Benth. (= *Lagopsis incana* Bunge, = *Moluccella laniflora* W. herb. = *M. Marrubiastrum* Stephan., Ledeb.), wolliger, 4. f. Altaisches Sibirien.
leonuroides Desr. (= *affine* Hornem. = *astracanicum* W. E., non Jacq.).
pannonicum Clus. (= *paniculatum* Desr., Rchb. = *peregrinum* Spgl., non L. = *remotum* Kit.).
peregrinum L. (= *creticum* Mill., Rchb. = *affine* Host, = *flexuosum* Mönch, = *pauciflorum* Wallr.).
plumosum C. A. Mey., federiger, 4. f. Caucasus.
Hinsichtl. d. übrigen s. Beringeria, p. 119 et p. 66, II.

Marsilea L., Marsilea.
Fabrii Dun. (= ? *pubescens* Tenore), Fabri's, 4. Wa. f. Süd- und Westeuropa.

Marsypianthus Mart., Gamanderblümchen, XIV. I., Labiatae.
hyptoides Mart. (= *Clinopodium Chamaedrys* Vahl, = *Hyptis Chamaedrys* W., Poit. = *H. inflata* Spgl. = *H. lurida* Spgl. = *H. Pseudo-chamaedrys* Poit.), amerikanisches, ⊙. w. Brasilien, Cayenne.

Martia Leand., Zuccar. (= *Martiusia* Schult.), (v. Martius, k. baier. Hofrath, Prof. u. Director d. botan. Gartens zu München, berühmt als Botaniker, Reisender etc.), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
brasiliensis Zuccar. (= ? *physodes* Leand., sec. Spgl. = *Martiusia physaloides* Schult., DC. = *Clitoria rubiginosa* P. = *C. tetragona* Poir. = *Crotalaria elliptica* Poir. = *Neurocarpum ellipticum* Desv.), brasilianische, ♄. w. Westindien, Brasilien.

Digitized by Google

Martia

mexicana Zuccar. (= *Neurocarpum mexicanum* Steud.), mexicanische, 4. ħ. t. Mexico.

M. campanulata Spgl., *petiolata* Spgl., *polyandra* Spgl., v. Elodea virginica, axillaris, aegyptiaca, p. 219, II.

Martinezia R. et P. (Martinez de la Rosa, spanischer Staatsminister), XXI. VI. (VI. I.), Palmae.

caryotaefolia H. B. K., brennpalmenblätterige, ħ. w. Südamerika.

lanceolata R. et P. etc., v. Chamaedorea gracilis, p. 186 et p. 135, II.

Martynia L., Martynie.

diandra Glox. (= *angulosa* Lam. = ? *louisiana* Mill.).

fragrans Lindl., wohlriechende, ☉. m. f. Mexico.

montevidensis Chamiss., Schltdl., montevideische, ☉. m. w. Brasilien.

triloba Chamiss., Schltdl., dreilappige, ☉. m. w. Vera Crux.

fallax Kunze, (= *Craniolaria* et *proboscidea* Hort.), *integrifolia* Steud., *spathacea* Spgl., v. Craniolaria fallax, integrifolia et unibracteata, p. 164, II.

Marumia Blum., non Reinw., Marumie, X. I., Lythrariae-Melastomeae.

stellulata Blume, (= *Melastoma stellulata* Jack.), sternförmige, ħ. ħ. w. Sumatra.

Maruta Cass., Stinkchamille, p. 498.

Cotula DC. (= *foetida* Cass. = *ramosa* Less. = *vulgaris* Bluff et Fingerh. = *Anthemis Cotula* L. = *A. cotuloides* Rafin. = *A. psorosperma* Tenore, = *A. ramosa* Lk.), β) lithuanica DC. (= *Anthemis lithuanica* Bess.).

fuscata DC. (= *Anthemis fallax* W. = *A. fuscata* Brot. = *A. praecox* Lk. = *Perideraea fuscata* Webb).

Masdevallia R. et P., Masdevallie.

caudata Lindl., geschwänzte, 4. w. Neugranada.

fenestrata Lindl., durchscheinende, 4. w. Westindien.

Massonia L., Massonie.

coronata Jacq., gekrönte, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

hirsuta Lk. et Otto, rauhhaarige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

longifolia Jacq., β) candida Burch.

nervosa Hornem., nervige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

obovata Jacq. (= ? *ovalifolia* Hort.).

sanguinea Jacq. (= *latifolia* Ker, non Jacq.).

Zeyheri Kunth, (= *lanceolata* Zeyh.), Zeyher's, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

corymbosa Sims, (= *linearis* Drege), v. Periboea corymbosa, *ensifolia* Ker, (= *violacea* Andr. = *ovalis* Drege), v. Polyxena pygmaea.

Mastacanthus Endl., Eisenklau, XIV. II., Verbenaceae.

sinensis Endl. (= *Barbula* Steud. = *Barbula sinensis* Lour.), chinesischer, ħ. k. t. China.

Mastrucium pinnatifidum Cass., v. Serratula coronata, p. 747.

Mataxa capensis Spgl., v. Lasiospermum radiatum, p. 447.

Mathewsia Hook. (Mathews, Botaniker u. Reisender in Peru etc. † 1841), XV. II., Cruciferae.

foliosa Hook., blattreiche, 4. k. Chili.

Matricaria T., DC., Mutterkraut.

disciformis DC., scheibenähnliches, 4. f. Caucasus.

Digitized by Google

Matricaria

glabrata DC. (= *Chrysanthemum glabratum* Thbg. = *Pyrethrum glabratum* Less.), kahles, ⊙. f. Cap d. g. H.

nigellaefolia DC., schwarzkümmelblätteriges, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.

tanacetoides Fisch. et Mey. (= *Artemisia matricarioides* Less. = *Cotula matricarioides* Bong. = *Tanacetum pauciflorum* Richards.), rainfarrnähnliches, ⊙. f. Nordamerika.

Chamomilla L. etc., v. Chamomilla officinalis etc., p. 136, II., wozu auch *M. suaveolens* L. zu stellen ist, *indica* Mill., Desr. etc., v. Pyrethrum indicum etc., p. 669, *pinnatifida* Desr., v. Chrysanthemum grandiflorum, pinnatifidum, p. 193.

Matthiola RBr., Matthiola.

bicornis DC. (= *Cheiranthus bicornis* Sibth., Sm. = *Notoceras Sibthorpii* Spgl.), zweihörnige, ⊙. f. Griechenland.

coronopifolia DC. (= *Cheiranthus coronopifolius* Sibth., Sm.), krähenfufsblätterige, ♂. 4. k. Griechenland, Sicilien, Spanien.

deflexa Bunge, (= *? odoratissima* RBr. var.), herabgebogene, ⊙. ♂. f. Altaisch. Sibirien.

fenestralis RBr. (= *vulgaris* β Spach, = *Cheiranthus fenestralis* L.), zwergige, ♂. Canar. Inseln, ? Creta.

graeca Swt. (= *viridis* Rchb. = *Cheiranthus graecus* Juss., P.).

humilis DC. (= *Cheiranthus humilis* Clark.), niedrige, ⊙. f. Aegypten.

livida DC. (= *Cheiranthus lividus* Delil. = *C. tristis* Forsk.), braunblaue, ⊙. f. Aegypten.

patens Presl, (= *sicula* Hort.), abstehende, ⊙. ♂. f. Sicilien.

saxatilis Bernh. (= *rupestris* Bernh. = *sicula* Hort. = *vulgaris* γ Spach).

incrassata Hort., v. Malcolmia incrassata, p. 382, II.

Mattia Schult. (Baronesse v. Matt, Beförderin der Botanik u. Gartenkunst in Oestreich), V. 1, Asperifoliaceae.

angustifolia G. Don, (= *Cynoglossum angustifolium* W. = *C. emarginatum* Lam. = *C. racemosum* Schreb. = *? Rindera emarginata* R. et S.), schmalblätterige, 4. f. b. Armenien.

cristata G. Don, (= *Cynoglossum cristatum* Lam. = *Omphalodes cristata* Schrk. = *Rindera cristata* R. et S.), kammförmige, ♂. 4. f. b. Armenien.

glastifolia G. Don, (= *Cynoglossum glastifolium* W. = *Rindera glastifolia* R. et S.), weidblätterige, 4. f. b. Armenien.

lanata Schult. (= *Cynoglossum lanatum* Lam.), wollige, 4. f. b. Armenien.

umbellata Schult. (= *Cynoglossum umbellatum* W. K. = *Symphytum regium* Gmel.), doldige, ♂. f. Banat, Sibirien.

laevigata Schult., v. Rindera laevigata.

Matthschkea aquatica Gmel., v. Saururus cernuus, p. 723.

Mauhlia africana Dahl, v. Agapanthus umbellatus, p. 22. — *M. ensifolia* Thbg., v. Polyxena pygmaea.

Digitized by Google

Maurandia Ortega, Maurandie.

antirrhiniflora W. (= *personata* Lag. = *Usteria antirrhiniflora* Poir.).

Barclayana Lindl. b) alba Hort. (? = *albiflora* Hort.), c) coccinea Hort.

juncea Benth., simsenförmige, 4. Sch. k. Californien.

semperflorens Ortega, Jacq. (= *scandens* P. = *Reichardia scandens* Roth, = *Usteria scandens* Cav.).

stricta Hook., steife, ⊙. f. Neucalifornien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: albiflora, Laceyana J. Booth, pulchella Hort.

Mauria H. B. K. (J. Mauri, Prof. d. Naturgeschichte in Mailand), ? V. III., Amyrideae-Terebinthaceae.

simplicifolia H. B. K. (= *Laurus caustica* Molina, = *Lithraea caustica* Hook., Arn. = *L. venenosa* Miers, = *Litria caustica* Hook. = *Mangifera axillaris* Desr. = *Persica caustica* Spgl. = *Rhus caustica* Hook. = *Spondias simplifolia* Auct.), einfachblätterige, ħ. t. Chili.

Mauritia L. fil., Mauritie.

aculeata H. B. K., stachelige, ħ. w. Südamerika.

Maurocenia Frangularia Mill., *Phillyrasa* Mill., v. Cassine Maurocenia et capensis, p. 171.

Maxillaria R. et P., Kerfstendel.

acicularis Lindl., nadelförmiger, 4. w. Brasilien.

acutipetala Lindl., spitzkroniger, 4. w. Mittelamerika.

alata R. et P. (= *Dendrobium alatum* Sw., P.), geflügelter, 4. w. Peru.

alba Lindl. (= *Broughtonia alba* Spgl. = *Dendrobium album* Hook.), weifser, 4. w. Südamerika.

aromatica Grah., Hook. (= *Colax aromaticus* Spgl.), b) cruenta Hort., c) lutea Hort., d) punctata Hort.

Batemanni Poep., Endl., Batemann's, 4. w. Peru.

chlorantha Lindl., grünblumiger, 4. w. Demerara.

ciliata R. et P. (= *Barringtoniae* Lodd. β Steud. = *Dendrobium ciliatum* Sw.).

costata Lindl., gerippter, 4. w. Mexico.

cyanocheile Hffg., kornblumenblaulippiger, 4. w. Brasilien.

Deppei Lodd., b) major Hort., c) pallida Hort., d) punctata Hort.

furfuracea Scheidw., kleiiger, 4. w. Brasilien.

grandiflora Lindl. (= ? *Skinneri* Batem. = *Broughtonia grandiflora* Spgl. = *Dendrobium grandiflorum* H. B. K.), grofsblumiger, 4. w. Peru.

guttata ? Lindl., getüpfelter, 4. w. Südamerika.

Harrisoniae Lindl. (= *Colax Harrisoniae* Lindl. = *Dendrobium Harrisoniae* Hook.), b) alba Lodd.

imbricata ? Lindl., ziegeldachförmiger, 4. w. Südamerika.

latifolia Lindl. (= *Cymbidium latifolium* Spgl. = *Dendrobium latifolium* H. B. K.), breitblätteriger, 4. w. Peru.

lentiginosa Lindl., linsenförmiger, 4. w. Brasilien.

leucocheile Hffg., weifslippiger, 4. w. Brasilien.

liliacea La Llav., lilienähnlicher, 4. w. Mexico.

longipetala R. et P. (= *Dendrobium longipetalum* Sw., P.), langkroniger, 4. w. Peru.

maculata Lindl. (= *Broughtonia maculata* Spgl. = *Dendrobium maculatum* H. B. K.), gefleckter, 4. w. Südamerika (Amazonenfluſs).

ornithoglossa Kl., vogelzungenähnlicher, 4. w. Mexico.

palmifolia Lindl. (= *Colax palmifolius* Lindl. = *Dendrobium palmifolium* Sw. = *Epidendron palmifolium* Sw.), palmenblätteriger, 4. w. Jamaica.

Digitized by Google

Maxillaria

paniculata R. et P. (= *Dendrobium paniculatum* P. = *D. plicatum* Dietr.), rispiger, 4. w. Peru.
pantherina Hffg., pantherfleckiger, 4. w. Brasilien.
phyllomega Steud. (= *macrophylla* Lindl., non ? Poepp. Endl.), langblätteriger, 4. w. Mexico.
picta Hook., b) pallida Booth.
Poeppigiana Steud. (= *crocea* Poepp., Endl., non Lindl.), Poeppig's, 4. w. Peru.
punctata Lodd., b) lutea.
Rollissonii Lindl., b) unicolor Makoy.
rugosa Scheidweiler, runzeliger, 4. w. Brasilien.
scabrilinguis Hartw., Hook., scharfzungiger, 4. w. Mexico.
spathacea Lindl., scheidiger, 4. w. Brasilien.
Steelii Hook. (= *flagellifera* Hort.).
stenopetala Lodd., schmalkroniger, 4. w. Südamerika.
subulata Lindl., pfriemiger, 4. w. Brasilien.
sulphurea Hort. belg., schwefelgelber, 4. w. Südamerika.
tricolor R. et P. (= *Dendrobium tricolor* Sw., P.), dreifarbiger, 4. w. Peru.
tyrianthina ? Lindl., buntblumiger, 4. w. Südamerika.
uncinata Lindl., widerhackiger, 4. w. Demerara.
variabilis Batem. (= *Henchmanni* Hook.).
virginalis Scheidw., jungfräulicher, 4. w. Mexico.
Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Handelsgärten noch folgende aufgeführt: atrorubens, cucullata, fulva, Kleei, marginata, nana, pedunculata, Pinellii, punctulata, Skinneri, xanthina.
atropurpurea Lodd., v. Bifrenaria atropurpurea, p. 68, II., *longifolia* Lindl. et *squalens* Hook., v. Xylobium longifolium et squalens, p. 861, *Heynderickii* Morren, v. Lycaste gigantea, p. 375, II.

Mayna Aubl., (? guianischer Name), XIII. 1., Bixaceae, (Flacourtiaceae Zuccar.).
brasiliensis Raddi, brasilianische, ħ. w. Brasilien.
Mazeutoxeron reflexum LaBill., *rufum* LaBill., v. Correa virens et rufa.
Meadea Adans., *Dodecatheon* Mill., v. Dodecatheon Meadea.
Medeola angustifolia Hort., v. Eustrephus latifolius, *M. angustifolia* L. et *asparagoides* L., v. Myrsiphyllum angustifol. et asparag., p. 538.

Medicago T., L., Schneckenklee.
aculeata W. (= *crassispina* Vivian. = *ovata* Carmig. = *spinulosa* DC. = *strumaria* Hornem.):
apiculata W. (= *ciliaris* Balb., non W. = *coronata* G., non L. = *echinata* Bouché, = *muricata* γ Desr. = *polycarpa* W. E. suppl. = *polycephala* Hortul.).
arenaria Tenore, Sandliebender, ⊙. f. Südeuropa.
Berteroana Moris, Bertero's, ⊙. f. ? Chili.
bimuricata Retz, zweifachweichstacheliger, ⊙. f. ?
brachycarpa Fisch. (= *brachyloba* Fisch.).
carstiensis Jacq. (= *Noccae* Balb. = *umbellata* Hortul.).
ciliaris W. (= *hirsuta* Schrk.).
cretacea MB. (= *M. Nummularia Steveni* Bess.).
cuspidata Tausch, langspitziger, ⊙. f. ?
diffusa Poir. (= *nigra* W. var. Spgl.), weitschweifiger, ⊙. f. Teneriffa.
distans Poir., abstehender, ⊙. f. Südeuropa.
falcata L., Fr. (= *intermedia* Schult. = *procumbens* Schult.).

Digitized by Google

Medicago

glabella Presl, kahler, ⊙. f. Sicilien.
globosa Presl, kugelfrüchtiger, ⊙. f. Sicilien.
Hornemanniana DC. (= *pubescens* Hornem., non DC.), Hornemann's, ⊙. f. Marocco.
lappacea Desr. (= *hispida* G. = *Histrix* Tenore).
litoralis Rohde, β) breviseta DC. (= *polymorpha rigidula* Bertol.).
lupulina L., ε) corymbosa Ser.
media P. (= *falcata* Lam. = *f. β versicolor* Wallr.), mittlerer, 4. f. Europa.
mexicana Swt., mexicanischer, 4. ħ. k. Mexico.
microdon Ehbg., kleinzähniger, ⊙. f. Aegypten.
minima L., β) mollissima Roth (= *hirsutissima* Cyril.).
Murex W. (= *olivaeformis* Tenore).
obscura Retz, (= *lenticularis* Desr.).
paradoxa Spgl., wunderbarer, ⊙. f. ?
pedunculata Ehbg., gestielter, ⊙. f. Aegypten.
pennata Schwägr., federiger, ⊙. f. ?
rigidula Lam., All., starrer, ⊙. f. Südamerika.
sardoa Moris, (= ? *microdon* Ehrbg.), sardinischer, ⊙. f. Sardinien.
sylvestris Fr. (= *falcata* Sm. et reliq. Auct.), Wald-S., 4. f. Europa.
Terebellum W. (= *aculeata* G, non W. = *conica* Schkr.).
tortuosa Schwägr., gedrehter, ⊙. f. ?

Aufserdem stellt Herr Prof. v. Trautvetter noch folgende früher zu Trigonella L. gerechnete Arten hierher, als:

arcuata Trautv. (= *Trigonella arcuata* C. A. Mey.), astroides Trautv. (= *Trigon. astroides* Fisch. et Mey., Turcz.), connivens Trautv. (= *Trigon. cancellata* Dsf. = *T. striata* L. suppl.), corniculata Trautv. (= *T. corniculata* L. = *T. esculenta* W.), Fischeriana Trautv. (= *Trigon. Fischeriana* Sering.), fissa Trautv. (= *Trigon. pinnatifida* Cav.), hybrida Trautv. (= *Trigon. hybrida* Pourr.), monantha Trautv. (= *Trigon. monantha* C. A. Mey.), monspeliaca Trautv. (= *Trigon. monspeliaca* L. = *T. elatior* Sibth. et Sm.), platycarpa Trautv. (= *Trigon. platycarpa* L.), polycerata Trautv. (= *Trigon. polycerata* L.), psilocarpa Trautv. nov. spec., pugionata Trautv. (= *Trigon. spinosa* L.), pungens Trautv. (= *Trigon. litoralis* Guss.), ruthenica Trautv. (= *Trigon. ruthenica* L.), stellata Trautv. (= *Trigon. aegyptiaca* et *elongata* Hort. = *T. microcarpa* Fresen. = *T. stellata* Forsk.), ⊙. f. Aegypten, tenuis Trautv. (= *Trigon. tenuis* Fisch.). Vergl. p. 821 et 822.

cretica Mill., v. Pocockia cretica.

Medicusia Mch., Rchb. (C. Medicus, churpfälz. Rath, Botanicus u. Gartendirector †), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

lappacea Rchb. (= *Crepis lappacea* W. = *C.? Sprengeriana* All. = *Picris pauciflora* W. = *P. pyrenaica* G., non L. = *P. Sprengeriana* Pourr. = *P. strigosa* Hort.), klettenähnliche, ⊙. f. Frankreich, Pyrenäen.

Sprengeriana Rchb. (= *aspera* Mch. = *Crepis rhagadioloides* L. = *C. Sprengeriana* All. = *Helminthia Sprengeriana* G. = *Hieracium Sprengerianum* L. = *Picris altissima* Ledeb. = *P. Sprengeriana* Lam., P., p. 623), Sprenger's, ⊙. f. Südeuropa.

Zu berichtigen p. 883.

Digitized by Google

Medinilla Gaudich., DC., Medinille.

eximia Blume, (= *Melastoma eximia* Jack.), ausgezeichnete, ♄. ♄. w. Java.

Medium saxifragum Fisch., et *sayanense* Fisch., v. Campanula Saxifraga et altaica, p. 155 et 162.

Medusea fructus pini Haw.. *major* Haw., *procumbens* Haw., *tessellata* Haw., v. Euphorbia fructus pini, caput medusae etc.

Meerburgia glomerata Mch., v. Pollichia campestris, p. 640.

Megapterium missouriense Spach. (= *Nuttallianum* Spach), v. Oenothera macrocarpa, p. 555.

Megasea ciliata Haw., *cordifolia* Haw., *crassifolia* Haw., *ligulata speciosa* Hort., *media* Haw., v. Saxifraga Sect. I. ligulata, cordifolia etc,, p. 724.

Megastegia speciosa Don, v. Astragalus Ammodytes, p. 104.

Melaleuca L., J. C. et S. Schauer, Kajeputbaum.

abietina Sm., tannenähnlicher, ♄. t. k. Neuholland.

brachyphylla Schauer, (= *tenuissima* Tausch), kurzblätteriger, ♄. k. t. Südwestl. Neuholland.

Cajuputi Roxb. (= *minor* Sm. = *M. Leucadendron* Lam., non L. = *Myrtus saligna* Gmel. system.).

Cunninghamii Schauer, ♄. k. t. Neuholl. (Ob eingeführt?)

cuticularis LaBill. (= *imbricata* Lk.).

decussata RBr. (= *pumila* Otto).

diosmaefolia Andr. (= *foliosa* Dum. Cours.).

divaricata Don, ausgespreitzter, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

Drummondii H. angl., Drummond's, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

epacridea H. angl., felsenbuschähnlicher, ♄. ♄. k. t. Neuh.

ericaefolia Sm. (= *axillaris* Hort. = *nodosa* Rchb. in Sieb. Herb., non Sm.).

erubescens Otto (= *diosmatifolia* Dum. Cours.).

incana RBr. (= *hypochondriaca* Dehnh. = *lanata* Nois. = ? *lanigera* Wendl.).

juniperoides DC. (= *Metrosideros juniperoides* Rchb., Spgl.), wachholderähnlicher, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

lanceolata Otto (= *polygonoides* Hffg. = *lucidula* Hffg.).

lateritia Lk. et Otto (= *callistemonea* Lindl.).

microphylla Sm., kleinblätteriger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

Ottonis Schauer, Otto's, ♄. k. t. Neuholland.

parviceps Lindl., kleinköpfiger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

parviflora Lindl., kleinblumiger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

propinquua Schauer, verwandter, ♄. ♄. k. t. Westl. Neuholland. (Ob eingeführt?)

pulchella RBr. (= *serpyllifolia* Dum. Cours. = *densa* Colla, non RBr.).

radula Lindl., raspelförmiger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

scabra RBr. (= ? *muricata* Hort.).

striata LaBill. (= *Fraseri* Hook. = *hispida* et *ulicina* Hort.).

spinosa Lindl., dorniger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

stricta Sm., Hort. Cels., steifer, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

tenuifolia DC., dünnblätteriger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

tetragona Lodd., vierkantiger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

thymifolia Sm. (= *calycina* Hort.), *β*) discolor Rchb. (= *elegans* Hornsch.).

thymoides LaBill. (= ? *lucidula* Hort.).

trichophylla Lindl., haarblätteriger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

viminea Lindl., ruthenförmiger, ♄. ♄. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Melaleuca

violacea Schauer, violetter, ħ. ħ. k. t. Neuholland.

viridiflora Sm. (= *angustifolia* G. = *M. Leucadendron* β L. fil.).

Noch werden in den Verzeichnissen der Handelsgärtner folgende aufgeführt: flavescens, pinifolia Hort. (= ? *Lechii* Colla), robusta, rubra, triformis.

M. conferta Steud., *laurina* Sm. (= *suaveolens* G.), *nereifolia* Sims, (= *salicifolia* Andr.), v. Tristania conferta etc., p. 823, *empetrifolia* Rchb., v. Beaufortia empetrifolia, p. 62, II., *sprengelioides* DC., v. Regelia ciliata, *teretifolia* Endl., v. Gymnagathis teretifolia, p. 277, II. Hinsichtl. der übrigen s. Leptospermum, p. 456 et p. 352—353, II.

Melampodium australe L., *humile* Sw., v. Acanthospermum xanthioides et humile, p. 5, II.

Melampyrum T., Wachtelweizen.

saxosum Baumg., Gesteins-W., ⊙. f. Siebenbürgen.

Melananthera Michx., Rich.

deltoidea Mchx. (= *urticaefolia* Cass. = *Calea aspera* Jacq.).

hastata Mchx. (= *Linnaei* Kunth, = *Bidens nivea* L.), p. 505.

Melanchrysum Pavonium Cass., *rigens* Cass., *spinulosum* Cass., v. Gazania Pavonia, rigens, speciosa, p. 256, II.

Melandrium Clus., Röhl., Rchb., Fenzl, Fr., v. Lychnis, Sect. III., p. 482 et p. 376, II.

Melanoloma humilis Cass. (= *pullata* Cass.), v. Centaurea pullata, p. 178.

Melanopsidium Cels, Schwarzröthe, V. i., Rubiaceae.

M. nigrum Cels, (= *Billiottia psychotrioides* DC. = *Viviania psychotrioides* Colla), psychotriaähnliche, ħ. ħ. w. ? (Zu berichtigen p. 565).

Melanopsidium nigrum Colla, v. Amajoua corymbosa Nachlese.

Melanosinapis abyssinica A. Braun, *communis* Spenn. et Schimp., v. Brassica carinata et nigra, p. 77, II.

Melanthesa rhamnoides Blume, v. Phyllanthus rhamnoides, p. 620.

Melanthium L., Kunth, Braunblümchen.

marginatum Schldtl. (= *capense* Lichtenst. herb. = *Schlechtendalianum* Schult.), berandetes, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

α) minor, β) major.

capense L. (= *aethiopicum* Desv.), *eucomoides* Jacq., v. Androcymbium leucanthum et eucomoides, p. 54, *densum* Lam., v. Chamaelirium carolinianum, p. 186, *gramineum* Cav. (= *angustifolium* W.), *punctatum* Cav., v. Erythrostictus gramineus et punctatus, p. 233, II., *indicum* L. mant., v. Iphigenia indica, p. 318, II., *Muscaetoxicum* Walt., v. Amiantanthus Muscaetoxicum Nachlese, *polygamum* Desr. (= *virginicum* L.), v. Zygadenus virginicus, *sibiricum* L., v. Anticlea sibirica, p. 40, II., *uniflorum* Jacq. (= *ciliatum* Jacq = *aethiopicum* Thbg. = *flavum* Sm.), v. Kolbea Breyniana, p. 439, *Sabadilla* Thbg., v. Xerophyllum Sabadilla, p. 860.

Melasma hispidum Benth. (= *Lyncea hispida* Cham., Schltdl.), v. Gastromeria physaloides, p. 255, II.

Digitized by Google

Melastoma Burm., L., Schwarzschlund.
Banksii Cunningh., Banks's, ♄. ♄. w. Neuholland.
erectum Jacq. (= *malabathr.* L. var. DC.), aufrechter, ♄. w. Sumatra, Java.
fragile L., zerbrechlicher, ♄. w. Mexico, Brasilien, Surinam.
hispidum Sw., steifhaariger, ♄. w. Jamaica.
Linkii R. Schomb., Link's, ♄. ♄. w. Guiana. (Ob eingef.?)
madagascariense Don, madagascarischer, ♄. ♄. w. Madagascar.
normale Don, (= *nepalense* Lodd.).
radulum Hffg., raspelförmiger, ♄. ♄. w. Brasilien.
robustum Hort., starker, ♄. w. ?
splendens Sw. (= *plantaginifolium* Mill.), schimmernder, ♄. ♄. w. Jamaica.
asperum L., *octandrum* L., v. Osbeckia aspera, octandra, *canescens* H. Cels, *cardinalis* Spgl., *villosa* Aubl., v. Chaetogastra canescens, cardinalis, hypericoides, p. 135, II., *coerulea* Hort., *argenteum* Desv. (= *clavatum* P.), v. Lasiandra coerulea, argentea, 343 u. 344, II., *discolor* L., v. Tetrazygia discolor, *grandifolium* Hort., v. Miconia grandifolia, p. 522, *granulosum* Desr., *heteromallum* Don, Sims, etc., v. Pleroma Fontanesianum, heteromallum etc., *rubro-limbatum* Lk. et Otto, v. Lachnopodium rubrolimbatum, p. 339, II., *stellatum* Vahl, v. Calycogonium stellatum Nachlese, superbum Bonpl. etc., v. Conostegia superba etc., p. 156 et 157, II., *vacillans* Blume, v. Dissochaeta vacillans Nachlese.
Melaxis (*Malaxis*) *lancifolia* Sm., Steud., v. Empusaria paradoxa, p. 220, II.

Melia L., Juss., Zedrach.
Candollei Juss. (= *composita* DC., non W.), Candolle's, ♄. w. Timor.
composita W. (= ? *dubia* Cav. = *robusta* Roxb. = *superba* Roxb.).
Azadirachta L., v. Azadirachta indica, p. 55, II., *baccifera* Roth, (= *baccata* Heyne), v. Mallea Rothii, p. 382, II.

Melica L., Perlgras.
caffrorum Schrad., Kaffern-P., 4. k. Cap d. g. Hoffn.
exasperata R. et S. (= *asperrima* Hort. = *exasperrima* Hort.), rauhes, 4. f. ?
minuta L. (= *aspera* Vivian. = *nutans* Cav., non L. = *ramosa* Lois. = *saxatilis* Sib., Sm.), kleines, 4. f. Italien, Griechenland.

Melichrus RBr., Honigstrauch.
adpressus Cunningh., angedrückter, ♄. t. Neuholland.
erubescens Cunningh., röthlicher, ♄. t. Neuholland.

Melicocca L., bijuga L. (= *carpoodea* Juss. = *Melicoccus bijugatus* Jacq.).

Melicope Forst., Honigraute.
simplex A. Cunningh. (= *Astorganthus Hügelii* Endl.), einfache, ♄. t. k. Neuzeeland.
Melidora pellucida Noronh., v. Encyanthus quinqueflorus.

Melilotus T., Steinklee.
arvensis Wallr. (= *Petitpierreana* Hayne, = *expansa* Hort. = *Kochiana* DC. = *diffusa* K. = *pallida* Bess. = *flava* Auct.), Acker-St., ☉. f. Europa.
dentata W. (= *Kochiana* Hayne, = *procumbens* Hort. = *olympica* Hort.).

Digitized by Google

Melilotus

elegans Salzm., zierlicher, ⊙. f. Corsica.

glomerata Fisch. (= *brachyloba* Fisch. = *Medicago brachycarpa* Fisch., p. 501, = *Trigonella glomerata* Hort. Par.), knaulförmiger, ⊙. f. Tiflis.

gracilis DC. (= *neapolitana* Tenore, = *globulosa* Stev. = *parviflora* Stev. = *glaucescens* God.).

graveolens Bunge, starkriechender, ⊙. f. Nordchina.

lupulina Trautv. (= *Medicago lupulina* L., p. 502 = *M. Willdenowii* Merat).

microcarpa Balb. (= ? *anomala* Ledeb. = *Trifolium micranthum* Viv., p. 819).

officinalis W. (= *macrorrhiza* P. = *palustris* Kit.).

parviflora Dsf. (= *Bonplandii* Hort. = *Baumerti* Hort. = *diffusa* Trevir. = *Fleischeri* Hort.).

ruthenica MB. (= *integerrima* Stev. = *laxa* Stev.).

sulcata Dsf. (= *longifolia* Tenore, = *mauritanica* W.).

taurica Sering., MB. (= *Besseriana* Sering. = *imbricata* Bess. = *plicata* Stev.).

vulgaris W. (= *alba* Thuill. = *leucantha* K. = *melanosperma* Bess. = *stricta* Hort. = *gigantea* Hort. = *angulata* Hort. = *rugulosa* Hort.).

coerulea Desv., *uncinata* Poir. (= *hamosa* Lk.), v. Trigonella coerulea et spicata.

Hiernach p. 507 u. 508 zu berichtigen.

Melinum palustre Lk., v. Hydropyrum esculentum.

Meliphlea Zuccar., Honigmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

vitifolia Zuccar., weinblätterige, ♄. w. Mexico. (Ob kult.?)

Melissa Sibth., Sm., Melisse.

altissima Sibth., Sm. (= *cordifolia* P. = *hirsuta* Balb. = *romana* Mill. = *taurica* Hortul. = *officinalis* L. *β villosa* Benth.).

officinalis L. (= *corsica* Hortul. = *occidentalis* Rafin.).

Unbestimmt: arborescens Dsf., ♄. ? ?

M. Acinos Benth., *alpina* Benth., *Calamintha* L. (= *intermedia* Baumg. = *umbrosa* Auct.), *caroliniana* Benth., *cretica* L., *grandiflora* L., *graveolens* Benth., *Nepeta* L. (= *aethees* Hortul.), *patavina* Benth., *purpurascens* Benth., *thymifolia* Benth., *umbrosa* MB., v. Calamintha Acynos etc., p. 144 et p. 104, II., *alba* W. K., v. Satureja *rupestris*. *M. Clinopodium* Benth., *origanifolia* Benth., v. Clinopodium aegyptiacum et vulgare, origanifolium, p. 206, *microphylla* Benth., v. Thymus *corsicus*, p. 809, *pyrenaica* Jacq., v. Horminum pyrenaicum.

Melissitus dentata Mch., v. Pocockia cretica, p. 638.

Melittis L., Melissophyllum L., *β*) album, p. 508, (*M. albida* Gussone).

Melocactus C. Bauh., T., p. 508, v. Cacteae, p. 89, II.

Melochia L., Melochie.

macrophylla H. B. K. (= *tomentosa* L. var. Spgl.), grofsblätterige, ♄. w. Neuandalusien.

mollissima Dsf., P., weichblätterige, ♄. w. Südamerika.

pyramidata L. (= *domingensis* Jacq.).

arenosa Benth., fasciculata Benth., lanceolata Benth., melissaefolia Benth., oblonga Benth., ulmifolia Benth., vestita Benth. Sämmtlich ♄. und in dem englischen Guiana heimisch, scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Unbestimmt: varroniaefolia Dsf., ♄. ? ?

Digitized by Google

Melodinus Forst., Beerendrehler.
monogynus Carrey, β) macranthus DC. (= *monogynus* Lindl., Sims).
parvifolius Lodd., Swt., kleinblätteriger, ♄. Sch. w. Ostindien.
undulatus Lodd., Swt., wellenförmiger, ♄. Sch. w. Ostindien.

Melolobium Eckl., Zeyh., Lappenklee, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
cernuum Eckl., Zeyh. (= *Cytisus aethiopicus* L. = *Lotus cernuus* L. = *Ononis aethiopica* Burm. = *O. cernua* L., p. 559, = *Sphingium viscidulum* E. Mey.), gebogenhülsiger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Melongena incurva Mill., *ovata* Mill., *spinosa* Mill., *teres* Mill., v. Solanum esculentum et ovigerum, p. 766 et 768.

Melothria L., Kümmerling.
monoica Schrad., einhäusiger, ⊙. Sch. f. m. Indien.

Memecylon L., Beerenbaum.
ramiflorum Lam. (= *tinctorium* W. = *umbellatum* Blume, = *Melaleuca bicolor* Poir.), astblühender, ♄. w. Mauritius, Zeylon.
Meneghinia asperrima s. *hispidissima* Endl., v. Arnebia hispidissima Nachlese.

Meniscium Schreb., Mondfarrn.
dentatum Presl, (= *palustre* Raddi, Lk. Hort.), gezahnter, 4. w. Brasilien.

Menkea Lehm. (C. Th. Menke, berühmt. deutscher Naturforscher), XV. II., Cruciferae-Camelineae.
australis Kunze, neuholländische, ⊙. f. Westl. Neuhollad.

Menochilus p. 510, v. Monochilus.

Mentha T., Münze.
aquatica L. (= *acute-serrata* Opiz, = *aurita* Weihe, = *brachiata* Weihe, = *bugulaefolia* Weihe, = *glabra* N. E. = *nigrescens* Weihe, = *origanoides* Lej., non Tenor. = *palustris* Mill. = *pedunculata* P.) α) nemorosa Fr. (= *capitata* Opiz, = *intermedia* Host, = *purpurea* Host), β) hirsuta L. (= *dubia* Vill. = *T dumetorum* Schult. = *riparia* Schreb. = *stricta* Beck.), γ) ballotaefolia Opiz, (= *paludosa* Sole, = *palustris* Sole, = *rivalis* Sole).
arvensis L., α Benth. (= *acutifolia* Sm., Rchb. = *badensis* N. E., Gmel. = *carinthiaca* Host, = *dalmatica* Tausch, = *diffusa* Lej. = *divaricata* Host, = *Ehrhardtiana* Lej. = *exigua* All. = *gentilis* Mill. = *intermedia* N. E. = *laxa* Host, = *melissaefolia* Host, = *montana* Host, = *mosana* Lejeun. = *multiflora* Host, = *Nessiana* Opiz, (= *nitida* Host), = *nummularia* Schreb. = *paludosa* N. E. = *parietariaefolia* Beck. = *parviflora* Host, = *parvifolia* Opiz, = *pilosa* Wallr. = *polymorpha* Host, = *procumbens* Thuill. = *rotundata* Opiz, = *rubro-hirta* Lej. = *scrophulariaefolia* Lej. = *stachyoides* Host, = *suaveolens* Host, = *tenuifolia* Host, = *varians* Host, *villosa* Beck.), β) gentilis Sm., γ) agrestis Sole, (= *lamiifolia* Host, = *ocimoides* Host, = *pumila* Host), δ) glabra Sole, (= *gentilis* Host, = *praecox* Sole).
breviscapa Lehm. (= *viridis* L. sec. Benth.), kurzschaftige, 4. f. Alt. Sibirien.
citrata Ehrh. (= *nigricans* Mill. = *odorata* Sm.).
crispata Schrad. (= *cordifolia* Opiz, = *hortensis* Opiz).

Digitized by Google

Mentha

dahurica Fisch., Benth. (= *Horminum clinopodiifolium* P. = *Lepechinia clinopodiifolia* W., p. 453), dahurische, 4. f. Sibirien.

gentilis L. (= *arvensis* var. Benth. = *austriaca* Host, *atrovirens* Host, = *elegans* Lejeun. = *gracilis* Sole, *grata* Host, = *pulchella* Host, = *resinosa* Opiz, = *rubra* Sole, = *sativa* Sole, = *variegata* Sole, = *virgata* Salisb.).

incana W. (= *cretica* Hort. = *persica* Hort. = *spicata* Forsk.).

piperita L., b) fol. variegatis.

Pulegium L. (= *exigua* L. = *simplex* Host, = *Pulegium erectum* Mill. = *P. vulgare* Mill.), β) gibraltarica W. (= *pulegioides* Rchb. = *tomentella* Lk. = *tomentosa* Sm. = *Puleg. tomentella* Presl).

reversa Rchb. (= *elata* Host, = *hirsuta* Auct. var. = *longifolia* Host, = *maculata* Host, = *nitida* Host, = *purpurascens* Host), zurückgekrümmte, 4. f. Europa.

rotundifolia L. (= *oblongata* Tenore, = *fragrans* Presl, = *Halleri* Dierb. = *mucronulata* Opiz, = *rugosa* Lam. = *serotina* Tenore, = *suaveolens* Ehrh.).

sativa L. (= *Agardhiana* Fr. = *angustifolia* Schreb. = *aquatica* var. Auct. = *arvensis* var. Benth. = *arguta* Opiz, = *carniolica* Host, = *coerulea* Opiz, = *crenata* Beck. = *dubia* Schreb. = *latifolia* Host, = *melissaefolia* Lej. = *nemorosa* Host, = *nobilis* Weihe, = *obtusata* Opiz, = *origanifolia* Host, = *ovalifolia* Opiz, = *paludosa* Schreb. = *palustris* Mch. = *pilosa* Spgl. = *plicata* Opiz, = *rivalis* Sole, = *Rothii* N. E. = *serotina* Host, = *Speckmoseriana* Opiz, = *tortuosa* Host, = *verticillata* Mill. = *villosa* Beck. = *viridula* Host).

suavis Guss. (= ? *balsamea* W. K. = ? *divaricata* Lag. = ? *emarginata* Rchb. = *glomerulata* Jan, = *Langii* Geiger, = ? *pubescens* W. E.), feinriechende, 4. f. Südeuropa.

sylvestris L., α) canescens Roth, β) candicans Crantz, (= *pallida* N. E.), γ) Eisenstadtiana Opiz, (= *Rosani* Tenore), δ) mollissima Borkh. (= *chalepensis* Mill.), ε) gratissima Wigg. (= *candicans* Mill. = *alopecuroides* Hull. = *Brittingeri* Opiz, = *Halleri* Gmel. = *hybrida* Schleich. = *Korteana* Beenningh. = *longifolia* Huds. = *niliaca* W., non Vahl, = *oblonga* Opiz, = *ratisbonensis* Opiz, = *reflexifolia* Opiz, = *spicata* L. = *suavis* Hoffm. = *tomentosa* Borkh. = *villosa* Huds., Sole, Sm. = *Wiersbickiana* Opiz), ζ) nemorosa W. (= *niliaca* Jacq. = *sapida* Tausch).

tomentosa Urvill. (= *canescens* Sieb. = *cretica* Hort.), filizige, 4. f. Süd- und Osteuropa.

undulata W. (= ? *crispa* Tenore, = *dulcissima* Dumort. = *Lamarckii* Tenore, = *tomentosa* Hoppe, = *foliosa* Opiz, = *velutina* Lej. = ? *hybrida* Schlchr.).

viridis L. (= ? *balsamea* Rchb. = ? *glabra* Mill. = *sylvestris* L. var. K.), β) Michelii Rchb. (= *Lejeunii* Opiz, = *tenuifolia* Opiz).

Auricularia L. mant., *pumila* Grah. etc., v. Dysophylla Auricularia etc., p. 213, II., *australis* RBr., v. Micromeria australis, *blanda* Wall., *incisa* Wall. etc., v. Elsholtzia blanda, incisa etc., p. 219, II.

Digitized by Google

Menizelia Lindleyi Torr. et Gr. (= *M. Bartonia* Steud.), et *ornata* Torr. et Gr., v. Bartonia aurea et ornata, p. 114.

Menyanthes T., trifoliata L., *β*) paradoxa Fr.

M. brasilica Arrabida, (= *indica* Aubl.), *ceramica* Hamilt., *nymphaeoides* L. etc., v. Limnanthemum Humboldtianum, indicum etc., p. 360, II., *exaltata* Sims, (= *excelsa* Hort.), *ovata* L., v. Villarsia parnassifolia, ovata, p. 848.

Meoschium aristatum P. B., *australe* P. B., v. Ischaemum aristatum, australe, p. 424.

Meratia fragrans N. E., v. Chimonanthus fragrans, p. 190.

Meratia Sprengelii Cass., v. Elvira biflora, p. 210, II.

Merciera A. DC. (Phil. Mercier, aus Martinique gebürtig, in Genf).

tenuifolia A. DC., p. 511, (= *Roella compacta* Thbg. = *R. pinifolia* Thbg. = *R. tenuifolia* Thbg. = *Trachelium tenuifolium* L. fil., Thbg.).

Merckia Fisch. (= *Wilhelmsia* Rchb.), Merckia, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

physodes Fisch. (= *peploides* G. Don, = *Arenaria physodes* Fisch.), blasige, 4. f. Nordasien, Nordamer.

Mercurialis T., Bingelkraut.

capensis Spgl. (= *tricocca* E. Mey.), capisches, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Merendera Ram., v. Bulbocodium, Sect. I., p. 81, II.

Meriandra Wall., Benth., Theilbeutler, II. I., Labiatae.

benghalensis Benth. (= *Salvia abyssinica* RBr., non L. nec Jacq. = *S. benghalensis* Roxb. = *S. dianthera* Roth, = *S. indica* Heyne, = *S. stachydea* W. herb. = *S. stellata* Hamilt. hrb. = S. *viscosa* Wight hrb.), bengalischer, ♄. k. t. Ostindien [1]).

Meriania Swt., Merianie.

rosea Juss. (= *leucantha* var. Spgl. = *Wrightia rosea* Hort. angl.), rosafarbige, ♄. w. Jamaica.

Meristostigma aculeatum Steud., *anceps* Dietr., *corymbosum* Dietr., *Fabricii* Dietr., *falcatum* Dietr., *fissifolium* Dietr., *heterophyllum* Dietr., *junceum* Steud., *silenoides* Dietr., v. Lapeyrousia aculeata, anceps, corymbosa, Fabricii, falcata, fissifolia, fasciculata etc., p. 445 et p. 342, II.

Meristotropis Fisch. et Mey., Theilkiel, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

triphylla Fisch. et Mey. (= *Glycyrrhiza triphylla* Fisch. et Mey.), dreiblätteriger, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

Mertensia Roth, Mch. suppl., G. Don, DC., non W., nec Thbg., nec H. B. K., (Mertens, ehem. Director der Handelsschule zu Bremen, ausgezeichneter Botaniker, V. I., Asperifoliaceae.

dahurica G. Don, (= *Casselia dahurica* et *gracilis* Dumort. = *Lithospermum davuricum* Lehm. = *Platynema dahuricum* * p. 634, = *Pulmonaria amoena* Stev. = *P. dahurica* Fisch. = *P. gracilis* W. = *Steenhammera dahurica* Turcz.).

---

1) Wird in den indischen Gärten häufig gebaut und wie unsere Salvia officinalis verwendet.

Digitized by Google

Mertensia

denticulata G. Don, (= *Lithospermum denticulatum* Lehm. = *L. sibiricum* Ledeb. = *Platynema denticulatum* * p. 634, = *Pulmonaria denticulata* R. et S. = *P. sibirica* Pursh), Nordam., Sibirien, Kamtschatka.

Drummondii G. Don, (= *Lithospermum Drummondii* Lehm.), Drummond's, 4. f. Nordamerika.

lanceolata DC. (= *Casselia lanceolata* Dumort. = *Lithospermum marginatum* Spgl. = *Pulmonaria lanceolata* Pursh, = *P. marginata* Nutt. = *Platynema marginatum* * p, 634), lanzettliche, 4. f. Nordamerika.

maritima Roth, Gray, Lk., G. Don, (= *parviflora* G. Don, = *Casselia maritima* et *parviflora* Dumort. = *Cerinthe maritima* Dill. = *Hippoglossum maritimum* Hartm. = *Lithospermum maritimum* Lehm. = *Platynema maritimum* * p. 634, = *Pulmonaria maritima* L. = *P. parviflora* Mchx. = *P. procumbens* Stok. = *Steenhammera maritima* Rchb.).

paniculata G. Don, (= *Casselia paniculata* Dumort. = *Lithospermum paniculatum* Lehm. = *Platynema paniculatum* Schrad., p. 634, = *Pulmonaria paniculata* Ait.).

pilosa DC., ? G. Don, (= *corymbosa* G. Don, = *Lithospermum corymbosum* L. = *L. denticulatum* Hook. et Arn. = *Pulmonaria pilosa* Chamiss. = *Steenhammera pilosa* Turcz), behaarte, 4. f. Nordamerika. (Ob kultivirt?)

sibirica G. Don, DC. (= *Pallasii* G. Don, = *Lithospermum sibiricum* Lehm. = *L. Pallasii* Ledeb. = *Platynema sibiricum* * p. 634, = *Pulmonaria bracteata* W. herb. = *P. sibirica* L. = *Steenhammeria Pallasii* Kar. et Kiril.).

stylosa DC. (= *Pulmonaria stylosa* Fisch. = *Steenhammera stylosa* Turcz.), langgriffelige, 4. f. Sibirien.

villosula G. Don, (= *Casselia villosula* Dumort. = *Lithospermum villosulum* Lehm. = *Pulmonaria villosula* R. et S.), zottige, 4. f. Carpathen.

virginica DC. (= *pulmonarioides* Roth, Mch. suppl. = *Casselia virginica* Dumort. = *Hippoglossum virginicum* Lilja, = *Lithospermum pulchrum* Lehm. = *Platynema pulchrum* * = *Pulmonaria virginica* L.), virginische, 4. f. Nordamerika.

Noch nicht kultivirte: kamczatica A. DC. (= *Lithospermum kamczaticum* Turcz. = *L. Schreberianum* Spgl.), Kamczatka, pubescens DC. (= *Pulmonaria pubescens* W.), kurilische Inseln, rivularis DC. (= *Lithosperm. rivulare* Turcz.), Sibirien, simplicissima G. Don, (= *Casselia simplicissima* Dumort. = *Pulmonaria simplicissima* Ledeb.), Ostsibirien, serrulata DC. (= *Lithospermum serrulatum* Turcz. = *Steenhammera serrulata* Turcz.), Sibirien.

Mertensia Iguanea R. et S., *laevigata* H. B. K., v. Bieneria Iguanea et laevigata Nachlese.

Mesembryanthemum Dill., L., Zaserblume.

acutangulum Haw., spitzwinkelige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

aguinum Haw. var. denticulatum, integrum Salm Dyck.

amoenum Salm Dyck, angenehme, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

aurantiacum Haw. (= *aurantium* W. = *glaucoides* Haw.).

Boerhavii Eckl., Zeyh., Boerhav's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

brevifolium Ait. (= *erigerifolium* Jacq.).

Digitized by Google

Mesembryanthemum

Burmanni Haw., Burmann's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
Candollei Haw. (= *helianthoides* DC., non Ait.), Candolle's, ⊙. f. m. Cap d. g. Hoffn.
caulescens Mill., Haw. (= *deltoides* γ W. β *simplex* DC.).
clavatum Jacq. (= *defoliatum* Haw.).
claviforme DC. (= *clavatum* Haw., non Jacq.), keulförmige, ⊙. f. m. Cap d. g. Hoffn.
corallinum Haw., non Thbg.
coralloides DC. (= *corallinum* Thbg., non Haw.), korallenähnliche, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
crispum Haw. (= *crispatum* Haw.), krause, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.
crystallinum L, β) glaciale Haw.
dolabriforme L., β) dolabriformoides Haw.
felinum Lam., Haw. (= *ringens* L.).
flaccidum Jacq., schlaffe, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.
geminiflorum Haw. (= *geminatum* Haw., non Jacq.), paarblumige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
glaucinum Haw. (= *tricolor* Jacq. hort., non Haw.).
gramineum Haw., grasartige, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.
grossum Ait. (= *aggregatum* Haw. = *carneum* Haw.).
hirtellum Haw. (= ? *hispidifolium* Haw. = *pilifolium* W.).
humile Haw., niedrige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
β) Petiverii Haw.
incurvum Haw. (= *multiradiatum* Jacq.).
junceum Haw. (= *aphyllum* Hort.? = *articulatum* Thbg.).
laevigatum Haw. (= ? *acinaciforme* L. var. Spr. = ? *virescens* Haw.), glattliche, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
lanceolatum Haw. (= ? *filiforme* Thbg. = *Volckameri* Haw.).
laurifolium Haw., lorbeerblätterige, ♄. k. Cap d. g. H.
Lehmanni Eckl., Zeyh., Ecklon's, ♄. k. Cap d. g. H.
longistylum DC. (= *pallens* Jacq. = *pallescens* Haw. = *reflexum* β Haw.).
multipunctatum Salm Dyck, vielpunktirte, ♄. k. Cap d. g. H.
notabile Lk., bemerkenswerthe, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
obtusum Haw. (= *fissoides* Haw.).
pallens Ait. (= *canaliculatum* Hort.).
papuliferum Haw., weichwarzigtragende, ♄. k. Cap d. g. H.
papulosum L., weichwarzige, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.
perfoliatum Mill., Haw., β) monacanthum Bradl. (= ? *edentulum* Haw.).
procumbens Haw. (= *dubium* Salm).
protractum Lk., verlängerte, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
purpureo-croceum Haw., purpursafranfarbige, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.
ramulosum Haw. (= *rostratoides* Haw. = *rostratum* L. var. Page).
repaceum Jacq., rübenartige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
retroflexum Haw. (= *deflexum* Salm, = *elegans* Jacq. *leptaleum* Haw.).
rostellatum Haw.
rostratum L., β) tuberculatum Mill.
Scholtii Salm, (= *aduncum* Jacq., W. E. = *recurvum* Haw.).
serratum L. (= *serratifolium* Hort).
spathulatum Thbg., W. (= *criniflorum* Thbg.).
subulatum Haw., weniggeflügelte, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
tetragonum Thbg., ? Mch., vierkantige, ♄. k. Cap d. g. H.

Digitized by Google

Mesembryanthemum

Thunbergii Haw. (= *laeve* Thbg., non Ait.), Thunberg's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

tricolorum W. (= *pyropaeum* Haw.).

turbinatum Jacq., aufgetriebene, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

validum Haw., starkbewehrte, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

violaceum DC. (= *parvifolium* Lam. = *puniceum* Jacq.).

viride Haw. (= *subaduncum* Haw.).

Unbestimmtere: ampullaceum Hort. Liverp., articulatum Jacq., connatum Hortul., coralliforme Vest, fuscum Hort., purpureum Fisch., recurvum Mch.

Mesodetra alata Rafin., v. Helenium quadridentatum.

Mespilus T., Mispel.

odorata Wendl., wohlriechende, f. Nordamerika.

pruinosa Wendl. fil. (= *carolinianaWendl.* Hort. Herrenh.). bereifte, ♄. Nordamerika.

pubescens Presl, weichhaarige, ♄. f. Sicilien.

Wendlandi Opiz, (= *pubescens* Wendl., non Presl), Wendland's, ♄, f. Nordamerika.

M. badiata Bosc, (= *Bosciana* Spach), *corallina* Dsf., *Fontanesiana* Spach, *stipulacea* Spach etc., v. Crataegus Bosciana, cordata, Fontanesiana, stipulacea etc., p. 165 et 166, II.

Messerschmidtia L., R. et Schult., v. Tournefortia Sect.

Mesua L. (= *Naghas* Mirb.), (J. Mesuach oder Mesue, alter arabischer Arzt eines Khalifen zu Kahiro), XVI. VIII., Guttiferae.

ferrea L. (= *Calophyllum nagassaricum* Burm.), eisenharte, ♄. w. Ostindien, Molucken.

speciosa Choisy, prächtige, ♄. w. Ostindien.

Metabasis DC., Nesselblatt, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

aethnensis DC. (= *Seriola aethnensis* L., p. 747, = *S. hispida* Mch. = *S. urens* All.).

cretensis DC. (= *Seriola cretensis* L., p. 747, = *S. rubescens* Tineo, = ?*urens* L.), cretaisches, ☉. ♂. f. Sicilien, Malta, Griechenland.

Metagnanthus Endl., Hautschüppchen, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

parviflorus * (= *Athanasia crithmifolia* Hort., non L. = *A. parviflora* L. = *Hymenolepis leptocephala* Cass. = *H. parviflora* DC. = *H. pinnata* Less. = *Tanacetum crithmifolium* L.), kleinblumiges, ♄. k. Cap der guten Hoffnung.

Metagonia Nutt., *corymbodendron* Nutt., *myrtifolia* Nutt., v. Vaccinium ovatum, myrtifolium, p. 834.

Metalasia RBr., Metalasie.

capitata Less. (= *ericoides* Sieb. = *Gnaphalium capitatum* Lam., non Thbg.), kopfförmige, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

cephalotes Less. (= *Endoleuca pulchella* Cassin. = ?*Gnaphalium carneum* Lam. = *G. cephalotes* Thbg. *Helichrysum cephalotes* Don), grofsköpfige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

distans DC. (= *Gnaphalium distans* Sckrk.), abstehende, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fasciculata Don, (= *Gnaphalium brevifolium* Lam. = *G. densum* Lam. = *G. fasciculatum* Thbg. = *G. muricatum β fasciculatum* Berg.), büschelförmige, ♄. t. Cap d. g. H.

Digitized by Google

Metalasia

glomerata Don, (= *cephalotes* β Less. = *Endoleuca sphaerocephala* Cass. = *Gnaphalium capitatum* Thbg. = *G. densum* Lam.), knaulförmige, ♄. t. Cap d. g. H.

muricata Don, (= *cymosa* Cass. = *fastigiata* RBr., Don, = *polyanthos* Don, = *Gnaphalium fastigiatum* Thbg. = *G. muricatum* L. = *G. polyanthos* Thbg. = *G. umbellatum* Schrk.).

Meteorina crassipes Cass., *gracilipes* Cass. (= *gracilis* Cass. = *lyrata* Less.), v. Dimorphotheca hybrida et pluvialis.

Methonica Herm., Prachtlilie, VI. r., Liliaceae.

Doniana Kunth (= *Gloriosa Doniana* Schult. fil. = *G. nepalensis* Lindl. = *G. simplex* Don), Don's, 4. Zw. Sch. w. Nepal.

superba Lam. (= *Gloriosa superba* L.).

virescens Kunth, (= *Gloriosa virescens* Lindl. = *G. simplex* L. mant. = *G. coerulea* Mill.), grünliche, 4. Zw. Sch. w. Senegambien.

Metrosideros G., RBr., Eisenmafs.

apocynifolia Salisb., Apocynumblätteriges, ♄. t. k. Neuholland (Port Jackson).

ciliata Sm. (= *Leptospermum ciliatum* Forst. = *Melaleuca ciliata* Forst. = *Stenospermum ciliatum* * p. 787), gewimpertes, ♄. ♄. t. k. Neucaledonien.

coriacea LaBill. (= *albida* Sieb.), lederartiges, ♄. t. k. Neuholland.

falcata Dehnh., sichelförmiges, ♄. t. k. Neuholland.

procera Salisb., hohes, ♄. t. k. Neuholl. (Port Jackson).

robusta Cunningh., riesiges, ♄. t. k. Neuholland.

tomentosa Rich., et ? Hort. angl., filziges, ♄. t. k. Neuzeeland.

umbellata Cav. (= *Melaleuca umbellata* Räusch.), doldiges, ♄. t. k. Neuholland.

villosa Sm. (= *spectabilis* G. = *Leptospermum collinum* Forst. = *Melaleuca aestuosa* Forst. = *M. spectabilis* Räusch. = *M. villosa* L. fil.), zottiges, ♄. t. Taheiti, scheint noch nicht eingeführt.

Unbestimmtere, zum Theil wohl zu Callistemon gehörige: aspera Makoy, buxifolia Hort., carinata Hort., connata Dsf., decurrens H. angl., gracilis Salisb., Dryan., longifolia H. Anglor., nana Gmel. Hort. Carlsr., pliniaefolia Dsf., scariosa Wendl., Hornem, trinervia H. angl., tubiflora Hort. Breit.

capitata Sm., *corifolia* Vent. (= *abietina* Hflg.) etc., v. Kunzea capitata etc., p. 337, *calycina* Cav., *hypericifolia* Salisb., *hyssopifolia* Cav., *armillaris* G., *juniperoides* Rchb., *nodosa* Cav. (= *pungens* Rchb.), *quinquenervia* Cav., v. Melaleuca thymifolia, hypericifolia, linearifolia, armillaris, juniperoides, nodosa, viridiflora, p. 503 et 504 u. p. 393, II., *aromatica* Salisb., *coriacea* Salisb., non LaBill., *gummifera* G. (= *propinqua* Salisb., non Endl.), v. Eucalyptus piperita, capitellata, resinifera, *australis* RBr. (= *pallida* Bonpl.), *crassifolia* Dum. Cours. (= *glauca* Bonpl. = *speciosa* Sims), *hybrida* Otto, *lanceolata* Sm. (= *citrina* Curt. = *decora* Salisb. = *lophantha* Vent. = *semperflorens* Lodd.), *linearifolia* Sims, Lk. (= *rigidifolia* Hffg.), *linearis* Sm. (*calyculata* Sieb.), *marginata* Cav., *pinifolia* Wendl.,

Digitized by Google

Metrosideros
rigida Hort. (= *linearis* W. E. = *viminalis* Hort.), *rugulosa* W. (= *aspera* Hffg. = *glandulosa* Dsf. = *macropunctata* Dum. Cours. = *rigida* Hort. = *scabra* Colla), *saligna* Sm., *viminalis* G., *viridiflora* Sm., H. Cels., v. Callistemon pallidus, speciosus, hybridus, lanceolatus et var., linearifolius, linearis, marginatus, pinifolius, rigidus, rugulosus, salignus, viminalis, viridiflorus, p. 148, et p. 107 u. 108, II., *flexuosa* W., v. Billiotia flexuosa, p. 69, II., *floribunda* Sm. (= *laurifolia* Dsf.), v. Acmena floribunda, p. 13, *cordifolia* P. (= *anomala* Vent. = *hirsuta* Andr. = *hispida* Sm.), *costata* G., P. (= *fulgens* G. = *splendens* G.), v. Angophora cordifolia et lanceolata, p. 869.
Metroxylon Rumphii Mart. (= *M. Sagus* Koen.), v. Sagus Rumphii, p. 710.

Metternichia Mikan, (Fürst v. Metternich, k. k. östreichischer Staatskanzler etc., grofser Beförderer der Botanik u. Gartenkunst), XIV. II. (V. I.), Solanaceae.
principis Mikan, fürstliche, ♄. w. Brasilien.

Meum T.
athamanticum Jacq. (= *anethifolium* G. M. S.).
Dalechampii Tenore, v. Trinia vulgaris, p. 822, *fatuum* P., v. Carum verticillatum, p. 168, *nudicaule* Mch., v. Seseli montanum, p. 749, *nutans* Mch., v. Carum rigidum, p. 122, II., *piperitum* R. et S., v. Foeniculum piperitum, p. 245, II., *pyrenaicum* Gay, v. Endressia pyrenaica, p. 222, II., *segetum* Gussone, v. Ridolfia segetum, *tenuifolium* Duby, v. Wallrothia tenuifolia.

Meyenia Schltdl., (Dr. u. Professor Meyen, früher in Bonn, dann in Berlin, Naturforscher u. Reisender †), V. Solanaceae-Cestrineae.
corymbosa Schltdl. (= *Habrothamnus corymbosus* Endl.), doldentraubige, ♄. t. Mexico.
cyanea * (= *Habrothamnus cyaneus* Lindl.), kornblumenblaue, ♄. t. Peru (Loxa).
fasciculata Schltdl. (= *Habrothamnus fasciculatus* Endl.), büschelförmige, ♄. t. Mexico.
purpurea * (= *Habrothamnus elegans* Scheidw. = *H. purpureus* Lindl.), purpurfarbige, ♄. t. Mexico.
tomentosa * (= *Habrothamnus tomentosus* Benth.), filzige, ♄. t. Mexico.
Meyenia Hawtayneana N. E., v. Thunbergia Hawtayneana, p. 808.
Meyna (= *Meynia* Schult.) *spinosa* Roxb., v. Vangueria spinosa, p. 836.

Mezoneuron DC., Mezoneuron, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.
enneaphyllum Wight, Arn. (= *Caesalpinia enneaphylla* Roxb.), neunblätteriges, ♄. w. Ostindien.

Mibora Adans., Zwerggras, III. II., Gramineae.
verna Adans., P. B. (= *Agrostis minima* L. = *Chamagrostis minima* Borkh. = *Knappia agrostidea* Sm. = K. *verna* Trin. = *Poa minima* Wither. = *Sturmia minima* Hoppe), Frühlings-Z., ⊙. f. Mittel- und Westeuropa.
Micambe Adans., *ornithopodioides* Medic., *violacea* Medic., v. Cleome Dilleniana et violacea, p. 204.

Digitized by Google

Michauxia L'Her., laevigata Vent. (= *decandra* Fisch. = *dodecandra* Steud.), p. 522.

Michelia L., Michelie.

Champaca L. (= *Rheedii* Wight, = *suaveolens* P.). oblonga Wall, längliche, ♄. w. Ostindien.

Miconia R. et P., Miconie.

albicans Steud. (= *Chitonia albicans* Don, = *Diplochita albicans* * p. 877, = *Melastoma albicans* Sw.).

argentea DC. (= *Melastoma argentea* Sw.), silberfarbige, ♄. w. Westindien

argyrophylla DC. (= *stenostachya* DC. = *Melastoma argyrophylla* Mart. = *M. stenostachya* Mart.), silberblätterige, ♄. w. Brasilien.

fulva DC. (= *Melastoma chrysophylla* Rich. = *M. fulva* Rich.), rothgelbe, ♄. w. Cayenne.

pyramidalis DC. (= *Chitonia pyramidalis* G. Don, = *Diplochita pyramidalis* * p. 877, = *Melastoma ? Acinodendron* L. = *M. pyramidalis* Desr.).

staminea DC. (= *Melastoma glabrescens* Mart. = *M. laevigata* L. = *staminea* Desr.), langfadige, ♄. w. Brasilien.

Micrantheum Spgl. (= *Micranthea* Dsf.), Asträutel, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

ericoides Dsf., heideähnliches, ♄. k. t. Neuholland.

Micranthus P., Eckl., Kleinschwertel, III. I., Irideae.

alopecuroideus P. (= *Gladiolus alopecuroides* L. = *G. ? micranthus* Schrk. = *G. plantagineus* P. = *Ixia plantaginea* Ait. = *I. triticea* Burm. = *Phalangium spicatum* Burm. = *Watsonia plantaginea* Ker, p. 856), fuchsschwanzähnlicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

spicatus * (= *Beilia spicata* Eckl. = *Gladiolus alopecuroides* P. = *G. fistulosus* Jacq. = *G. spicatus* L. = *G. tubulosus* Burm. = *Ixia alopecuroidea* L. fil. = *I. cepacea* Redout. = *I. fistulosa* Ait. = *I. spicata* W. = *teretifolia* Banks herb. = *Watsonia spicata* Ker, p. 856).

triticeus * (= *Beilia triticea* Eckl. = *Gladiolus triticeus* Thbg. = *Watsonia triticea* Spgl.), scheint nicht kultivirt zu werden.

Micranthus cochinchinensis Loud., p. 522, v. Macranthus cochinchinensis Nachlese.

Micranthus oppositifolius Wendl., v. Phaylopsis parviflora, p. 614.

Microcala pusilla * v. Cicendia Candollei et pusilla, p. 143, II.

Microcalia australis A. Rich., v. Lagenophora Forsteri, p. 443.

Microcarpaea cochlearifolia Sm., v. Peplidium humifusum, *M. montevidensis* Spgl., v. Scoparia flava. *Microchlaena* Wight, Arn. (= *Microlaena* Wall.), *spectabilis* Wall., v. Wallichia spectabilis.

Microcodon A. DC., Kleinglöckchen, V. I., Campanulaceae.

Candolleanum Buek, (= *glomeratum* DC. = *sparsiflorum* DC. = *Campanula hispida* Ecklon, = *C. Microcodon* Dietr. = *C. sparsiflora* Dietr. = *Wahlenbergia hispidula* Schrad.), Candolle's, ⊙. f. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Microdon Choisy, Kleinzahn, XIV. II., Globulariaceae-Selagineae.

Linkii Walp. (= *Selago spicata* Lk., p. 740), Link's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

lucidum Choisy, (= *Selago lucida* Vent. = *? rotundifolia* Thbg., L. fil.), glänzender, 4. ♄. k. Cap d. g. H.

ovatum Choisy, (= *Dalea Lippiastrum* G. = *Lippia ovata* L. mant. = *Selago capitata* Berg. = *S. ovata* Thbg., p. 740).

Microgenetes A. DC., Kleinfädler, V. I., Asperifoliaceae-Hydrophylleae.

Cumingii A. DC. (= *Eutoca Cumingii* Benth.), Cuming's, ⊙. f. Chili.

Microglossa DC., Kleinzüngel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

volubilis DC. (= *Conyza prolifera* Blume, = *C. volubilis* Wall.), windendes, ♄. Sch. w. Ostindien.

Microlicia DC., Kleinweidrich, VIII. I. (X. I.), Lythrariae-Melastomeae.

cordata Cham. (= *? variabilis* Mart. = *Rhexia cordata* Spgl. = *R. venusta* Mart. herb.), herzförmiger, ♄. w. Brasilien.

variabilis Mart., veränderlicher, ♄. w. Brasilien.

variolosa DC. (= *β Rhexia acicularis* Mart. = *R. baccharoides* Mart. = *R. enervia* Mart. = *R. euphorbioides* Mart. = *R. exul* Mart. = *R. fasciculata* Mart. = *R. hirsuta* Mart. = *R. thymifolia* Mart. = *R. venusta* Mart.), blatteriger, ♄. w. Brasilien.

Microlonchus Cass. (Centaurea Sect. III., p. 179 et p. 131, II.), Kleinlanzler, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

albispinus Bunge, weifsdorniger, ⊙. f. Ural.

salmanticus DC. (= *Centaurea salmantica* L. = *C. tenella* et *tenuiflora* Hort.), b) foliatus.

Microlophus alatus Cass., v. Centaurea alata, p. 176.

Micromeria Benth. (Satureja Sect. II., p. 722). Kleinquendel (Piperelle), XIV. I., Labiatae.

approximata Rchb. (= *Satureja approximata* Biv. = *S. fasciculata* Rafin. = *Thymus fruticulosus* Bertol.), genäherter, ♄. k. Südeuropa, Albanien.

australis Benth. (= *Mentha australis* RBr.), neuholländischer, 4. k. Neuholland.

barbata Fisch., Mey. et Lallem., bärtiger, 4. f. Neu-Californien.

canescens Benth. (= *Satureja canescens* Guss.).

densiflora Benth., dichtblumiger, ♄. k. Canarische Inseln.

Douglasii Benth. (= *Thymus Chamissonis* Benth. = *Th. Douglasii* Benth.), Douglas's, 4. f. Nördl. Californ.

filiformis Benth. (= *Cunila thymoides* Gouan, = *Piperella filiformis* Presl, = *Thymus filiformis* Ait.).

graeca Benth. (= *Satureja graeca* L. = *S. micrantha* Hffg. et Lk. = *Thymus micranthus* Brotero, = *T. hirtus* Russ.), β) longiflora Guss. (= *Satureja consentina* Tenore), γ) densiflora Benth. (= *Satureja congesta* Hornem. Hort. Hafn. = *S. hirta* Host, = *S. tenuifolia* Tenore, = *Thymus virgatus* Tenore).

inodora Benth. (= *Thymus inodorus* Dsf.), geruchloser, 4. ♄. k. Algier.

Juliana Benth. (= *Satureja Juliana* L. = *Sabbatia*

Digitized by Google

Micromeria

Juliana Mch.) β) hirsuta Benth. (= *S. Juliana* var. *canescens* Guss. = *S. hirsuta* Presl).

lanata Benth. (= *Satureja lanata* Lk.), wolliger, ♄. k. Canarische Inseln.

marifolia Benth. (= *Bystropogon marifolius* Juss. = *Calamintha cretica* Lam. = *C. fruticosa* P., Hort. = *C. marifolia* P., p. 144, = *Melissa cretica* Lam. = *M. fruticosa* L. = *M. marifolia* P. = *M. serpyllifolia* W. herb. = *Nepeta cretica* Dietr. = *N. parvifolia* Hortul. = *N. marifolia* Cav. = *N. serpyllifolia* MB. = *Thymus creticus* DC. = *Th. Barrelieri* Spgl. = *Th. marifolius* W. E.), Süd- u. Westeuropa, Taurien, Syrien.

microphylla Benth., α) glabriuscula Benth. (= *Satureja microphylla* α Guss. = *S. Teneriffae* Lk., Enum. = *Thymus Teneriffae* Hortul., non P.), β) villosa Benth. (= *Satureja microphylla* β. γ. δ. Gussone, = *S. filiformis* Dsf. = *Thymus microphyllus* d'Urv.).

nervosa Benth. (= *Satureja filiformis* Tenore, non Dsf. = *S. nervosa* Dsf. = *Thymus filiformis* Sieb., non Ait. = *Th. Mastichina* Sibth., Sm., non L.).

obovata Benth. (= *Satureja incana* Spgl. = *S. viminea* L. = *Mentha viminea* Patr. Brown, = *Xenopoma obovatum* W., Colla, p. 859, = *Zygis aromatica* Desv.), verkehrteiförmiger, ♄. k. t. Jamaika.

parviflora Rchb. (= *Satureja inodora* Host, nec Salzm. = *S. parviflora* Visiani).

Piperella Benth. (= *Calamintha croatica* Host. = *Thymus croaticus* P. = *T. marginatus* Sm. = *T. Piperella* All.).

Pulegium Benth. (= *Calamintha origanifolia* Host, = ? *C. subnuda* Host, = *Melissa Pulegium* Roch. = *M. subnuda* W. K., p. 144, = *M. nova* Stev., Portenschl. = *Nepeta nova* MB. = *Thymus subnudus* Spgl.), Polei-W., 4. f. Banat, Fiume.

spicigera C. Koch, ährentragender, 4. ♄. f. Asiat. Rufsland (Radscha). Ob kultivirt?

subcordata Visiani, Benth. (= *Thymus subcordatus* Vis.).

Teneriffae Benth. (= *Thymus Teneriffae* Poir. = *T. terebinthinaceus* W., Enum.).

tenuis Benth. (= *Satureja tenuis* Lk.), dünner, ♄. k. Canarische Inseln.

varia Benth. (= *Satureja thymoides* Lowe, = *S. varia* Benth. et Webb, = *Thymus ericaefolius* Roth, = *T. inodorus* Benth., non Dsf.).

M. montana Rchb., *pygmaea* Rchb., *spicata* Rchb., *variegata* Rchb., v. Satureja montana etc.

Micropus L., Falzblume (Kleinfüfsler).

erectus L. (= *conyzaeus* Duboi), β) multicaulis Duboi, (= *Filago multicaulis* Lam.).

minimus DC., kleinster, ☉. f. Mexico.

pygmaeus Dsf., v. Evax pygmaea.

Microrhynchium Less. (= *Microrhynchus* Less.), (Lactuca Sect. C. H. Schultz Bipont.), Kleinschnäbler, XIX. 1., Corymbiferae-Cichoriaceae.

nudicaule Less. (= *Chondrilla nudicaulis* L. = *Lactuca nudicaulis* Murr. = *Rhabdotheca sonchoides* Cass. = *Sonchus divaricatus* Delil., non Dsf.), nacktstengelicher, ♂. 4. k. Arabien, Aegypten.

Digitized by Google

Microrhynchium

β) dichotomum Less. (= *Lomatolepis radicaulis* Cass. = *Lactuca flava* Forsk? = *Scorzonera dichotoma* Vahl, = *Sonchus dichotomus* Savi, non MB.).

Microstachys Chamaelea Juss., v. Cnemidostachys Chamaelea, p. 207.

Microsorium Lk., irregulare Lk., v. Polypodium Sect.

Microstylis Nutt., Lindl., Kleingriffel.

histionantha Lk. et Kl., segelblumiger, 4. w. Caracas.

macrostachya Lindl. (= *Ophrys macrostachya* Llav.), grofsähriger, 4. w. Mexico.

monophyllos Lindl. (= *Epipactis monophyllos* Schmidt, = *Malaxis monophyllos* Sw., p. 489 = *Ophrys monophyllos* L.).

Parthonis Kl. (= *Malaxis Parthoni* Morren), Parthon's, 4. w. ? Südamerika.

Microtrema opulentum Kl., v. Erica opulenta.

Microtis RBr., Kleinöhrchen, XX. 1., Orchideae.

Banksii Hook. (= *porrifolia* Spgl.), Banks's, 4. w. Neuzeeland.

porrifolia RBr. (= *Epipactis porrifolia* Sw. = *Ophrys unifolia* Forst. = *Serapias porrifolia* W.), Porreeblätteriges, 4. w. Neuholland.

Microtropis Wall., non E. Mey., Kleinkiel, V. III., Aquifoliaceae (Ilicineae).

discolor Wall. (= *Cassine discolor* Wall. = ? *Evonymus garcinifolius* Roxb.), verschiedenfarbiger, ♄. w. Ostind.

Middendorfia Trautv. (A. v. Middendorf, Prof. an d. Universität zu Kiew, bereiste Sibirien), IV. 1., Lythrarieae-Salicariae.

borysthenica Trautv. (= *Ammannia borysthenica* DC., p. 47 = *Peplis borysthenica* Bess.).

hamulosa Trautv. (= *Peplis australis* Gay, = *biflora* Salzm.), hackige, ⊙. f. Nordafrika.

Miegia P., *macrosperma* P. (= *gigantea* Nutt.), v. Ludolfia macrosperma, p. 479.

Miersia Lindl. (Miers, ein Engländer bereiste Chili, auch in botanischer Hinsicht).

chilensis Lindl. (= *major* Kunth), p. 524.

Milium L., Milisgras.

confertum Guss., Link., gedrängtes, ⊙. f. Sicilien.

effusum L., β) confertum Mill. (= *scabrum* Merlet, = *vernale* van Hall., non MB.).

phleoides Sweet, lieschgrasähnliches, 4. w. Ostindien.

capillare Mch. etc., v. Panicum capillare etc., p. 583, *crus-galli* Mch. etc., v. Oplismenus Crus-galli, p. 563, *gaditanum* Hort. (= *pauciflorum* Hort.), v. Piptatherum frutescens et multiflorum, p. 629, *latifolium* Cav., v. Paspalum stoloniferum, p. 588, *muticum* Hort., v. Gastridium muticum, *punctatum* L., v. Helopus punctatus, p. 294, II., *velutinum* DC. (= *filiforme* Sessé), v. Paspalum velutinum.

Millefolium Adans., v. Achillea.

Millea s. *Milla uniflora* Graham, v. Triteleja uniflora.

Milleria L, Millerie.

glandulosa DC., drüsige, ⊙. f. Mexico.

biflora L., v. Elvira biflora, p. 219, II.

Digitized by Google

Millingtonia L. fil., non Roxb. (T. Millington, Prof. zu Oxford), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.

hortensis L. fil. (= *Mallingtonia hortensis* W. = *Bignonia suberosa* Roxb., p. 122), Garten-M., ħ. Sch. w. Ostindien.

Millingtonia pinnata Roxb., *simplicifolia* Roxb., v. Meliosma pinnata, simplicifolia Nachlese.

Miltonia Lindl. (Milton, berühmter englischer Dichter), XX. 1., Orchideae.

candida Lindl., schneeweifse, 4. Kn. w. Brasilien.

β) flavescens Lindl.

Clowesiana Lindl. (= *Odontoglossum Clowesii* Lindl.), Clowes's, 4. Kn. w. Brasilien.

β) grandiflora.

cuneata Lindl., keilförmige, 4. Kn. w. ? Brasilien.

flavescens Lindl. (= *Cyrtochilum flavescens* Lindl.), gelbliche, 4. Kn. w. Mexico.

odorata Lindl. (= *epidendroides* Hort. belg.), wohlriechende, 4. Kn. w. Südamerika.

Russeliana Lindl. (= *Oncidium Russelianum* Lindl., p. 558, = ? *Cyrtochilum Russelianum* H. Angl., p. 184).

spectabilis Lindl. (= *Macrochilus Fryanus* Knowl. et Westc., p. 487), ansehnliche, 4. Kn. w. Brasilien.

stellata Lindl. (= *Cyrtochilum stellatum* Lindl., p. 184, 11.).

In den Pflanzenverzeichnissen der belgischen Gärten wird noch eine M. Summidor aufgeführt.

Mimetes Salisb., RBr., Mimenstrauch.

myrtifolia RBr. (= *Protea myrtifolia* Thbg.), myrtenblätteriger, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

spectabilis R. et S. (= *Protea spectabilis* Lichtenst.), ansehnlicher, ħ. ħ. t. Südafrika.

vaccinifolia Sweet, (= *Diastella vaccinifolia* Knight).

Mimosa T., Sinnpflanze.

acanthocarpa Benth. (= *Acacia acanthocarpa* W., p. 1).

asperata L. (= *Bellatrix* Hffg. = *canescens* W. = *ciliata* W. = *hispida* W. = *pellita* W. = *polyacantha* W. = ? *procumbens* Schum. = *sicaria* Hffg. var.).

calocephala Mart., schönköpfige, ħ. w. Brasilien.

Cascabellilo Colla, DC., Cascabellilo-S., ħ. w., Südam.

kermesina Otto et Dietr. (= ? *coccinea minor* Hort.), kermesinfarbige, ħ. w. Brasilien.

latispinosa Lam. (= *Acacia latispinosa* Dsf.).

lutea Mill., gelbe, ħ. ħ. w. Südamerika.

madagascariensis Hort., madagascarische, ħ. w. Madagascar.

marginata Lindl., non Lam. (= *mexicana*, *prostrata* et *scandens* Hort.), Vaterland unbekannt, zu berichtigen p. 525.

nepalensis Hffg., nepalsche, ħ. w. Ostindien, Nepal.

obtusifolia W. (= *fervida* Mart.)

polyacantha W. (= *Acacia Habbas* Lk. = *Mimosa Habbas* Delile), vielstacheliche, ħ. w. Guinea, Abyssinien, Aegypten.

rubicaulis Lam. (= *octandra* Roxb. = *pennata* Russel, = *Rottleri* Spgl. = *spinisiliqua* Klein).

sensitiva L., b) fl. albo.

somnians H. B. K. (= ? *Acacia somnians* Hort.), einschlafende, ħ. ħ. w. Neugranada.

subtriceps Brotero, fastdreiköpfige, ħ. w. ? Brasilien.

Digitized by Google

Mimosa

violacea Bonpl. mss., Tenore, violette, ♄. w. Bonaria.

In van Houtte's Établissement horticole werden noch aufgeführt: Huisaki, lucida sensibilis, purpurea sensibilis, tenella sensibilis.

abstergens Roxb. (= *concinna* W. = *Saponaria* Roxb. = *tamariscifolia* Russ.), *ferruginea* Rottl., *nilotica* L., *stipulata* Roxb., v. Acacia concinna, ferruginea, vera et stipulata, p. 2 etc., *aquatica* P. (= *lacustris* H. B. K. = *natans* Roxb.), *plena* L., *virgata* L. (= *angustisiliqua* Lam.), v. Desmanthus natans, plenus, virgatus, p. 257 et 196, II., *cyclocarpa* Jacq., *dulcis* Roxb., *fastuosa* Jacq., *ligustrina* Jacq., *purpurea* L. etc., v. Inga cyclocarpa etc., p. 316 et 317, II. et p. 416 et 417.

Hinsichlich der übrigen s. Acacia, p. 1 u. s. w. und p. 2 u. s. w. II.

Mimulus L., Gaucklerblume.

alsinoides Dougl., mierenähnliche, ⊙. f. Nordamerika, (Oregongebiet).

β) minimus Benth.

brevipes Benth., kurzstielige, 4. k. f. b. Obercalifornien.

cardinalis Dougl., β) roseo-cardinalis Hensl., Benth. (= *Maclowianus* Bot. mag.), (Hybride).

floribundus Dougl. (= *pedunculoris* Dougl. = *Capraria pusilla* Torrey).

glabratus H. B. K. (= *andicola* H. B. K. = *Torenia obtusifolia* Sm.), glattliche, 4. k. Mexico, Chili.

gracilis RBr. (= *strictus* Benth.), schlanke, 4. k. t. Süd- u. Ostafrika, Ostindien, Neuholland.

Jamesii Torr. et Gr. (= *reniformis* Engelm.), James's, 4. f. Nordamerika (Missouriegebiet). (Ob kultiv.?)

β) Fremontii Benth. (= *alsinoides* Torr., non Dougl.).

javanicus Blume, javanische, ⊙. w. m. Java.

Lewisii Pursh, (= *roseus* Dougl., Lindl.).

luteus L. (= *guttatus* DC. = *aureus* Nutt. = *punctatus* Rchb.), β) rivularis Nutt., Lodd. (= *lyratus* Benth.), γ) variegatus Lodd., b) Wilsoni D. Don, c) Younganus Lodd. var. δ) punctatus Miers.

microphyllus Benth., kleinblätterige, ⊙. f. Nordamerika (Oregongebiet).

moschatus Dougl. in Lindl. bot. reg. Oregongebiet, p. 884.

nepalensis Benth. (= *assamicus* Griffith), nepalsche, ? 4. k. Nepal, Ostindien. (Ob kultivirt?)

parviflorus Lindl., β) Bridgesii Benth.

primuloides Benth., Schlüsselblumenähnliche, ? 4. k. f. Nordwestl. Amerika. (Ob kultivirt?)

propinquus Lindl., β) glandulosus Lehm. Nordamerika.

Scouleri Hook., Scouler's, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

Hybriden: atrosanguineus, Frazeri, maculatus, Parmentieri, purpureus, splendens, speciosissimus, striatus, Thompsoni superbus, Watsoni etc.

aurantiacus Curt. (= *glutinosus* Wendl.), *puniceus* Steud., v. Diplacus glutinosus, puniceus, p. 205, II., *perfoliatus* Hook., non H. B. K., v. Leucocarpus alatus, p. 459.

Digitized by Google

Mimusops L., Spitzenblume.

Bojeri DC. (= *Kauki* Boj.), Bojer's, ♄. Mauritius.

dissecta RBr. (= *Achras dissecta* Forst.).

fruticosa Boj., strauchige, ♄. w. Ostafrika, Mauritius.

Hookeri A. DC. (= *dissecta* Hook. bot. mag. excl. syn.), Hooker's, ♄. w. St. Vincent.

indica A. DC. (= *dissecta* herb. Hamilt., non RBr. = *hexandra* H. Madr. Heyne, Wight, non Roxb. = *Kauki* Wall., non L.), indische, ♄. w. Ostindien.

obtusifolia Lam. (= *Elengi* Boj. excl. Synon. = *Kauki* Sieb., non L.), stumpfblätterige, ♄. w. Mauritius.

B. Synarrhena Fisch. et Mey.

floribunda Mart. (= *Synarrhena floribunda* Fisch. et Mey.), blüthenreiche, ♄. w. Brasilien.

subsericea Mart. (= *S. subsericea* Fisch. et Mey.), seitenhaarige, ♄. w. Brasilien (Rio de Janeiro).

Zweifelhafte Arten:

Balata G. (= *Achras Balata* Aubl.), Balata-S., ♄. w. Guiana, Mauritius, Java (in Gärten).

cyanocarpa Cunningh., p. 526.

Manilkara G. Don (= *Metrosideros macassarensis* Rumpf. = *Imbricaria malabarica* Poir.), Manilkara S. China, Philippinen, auf Malabar kultivirt, (bei uns noch nicht eingeführt).

β?) cuspidata A. DC. (= *hexandra* Wall., non Roxb.).

Elengi Sieb., non L. (= *hexandra* Bout. et Boj., non Roxb. = *Imbricaria* Wall., non W.), v. Imbricaria coriacea, p. 315, II.

Mina Lall. et Lex., Minawinde, V. I., Convolvulaceae.

lobata Lall. et Lex. (= *Quamoclit Mina* G. Don), gelappte, ☉. Sch. m. f. Mexico.

Minuartia tenuifolia N. E., Mart., v. Alsine mucronata L., p. 39.

Miquelia Blume, (Dr. F. A. W. Miquel, Prof. d. Botanik in Rotterdam), XIV. II., Gesneriaceae-Cyrtandreae.

coerulea Blume, (= *Anomorhegmia Miquelii* Meisn.), blaue, ☉. w. Java.

Mirabilis L. (= *Jalapa* Adans., Medic. = *Nyctago* Roy., Juss.), Wunderblume.

ambigua Trautv., zweifelhafte, 4. Kn. f. m. k. ?

cordata Brouss. (= *hybrida* Lepell., non H. B. K.), herzförmige, 4. Kn. f. m. k. Südamerika.

dichotoma L. (= *odorata* L. = *parviflora* Targ. Tozz. = *Jalapa officinarum* Martin, = *J. undulata* Mch.).

β) major, γ) pallida.

divaricata Lowe, (= *hybrida* Lepel. var. Lowe?), ausgesperrte, 4. Kn. f. m. k. Madeira.

hybrida H. B. K., Bastard-W., 4. Kn. f. m. k. Neugranada.

Jalapa L. (= *Jalapa congesta* Mch. = *Nyctago hortensis* Curt. = *N. Jalapa* DC.).

planiflora Trautv., flachblumige, 4. Kn. f. m. k. ?

tardiflora Bernh., spätblumige, 4. Kn. f. m. k. Südamer.

Mirbelia Sm., Mirbelie.

angustifolia Grah., schmalblätterige, ♄. t. Neuholland.

floribunda Benth., blüthenreiche, ♄. t. Neuholland.

ilicifolia Hort. (= *undulata* Hort.), stechhülsenblätterige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Mirbelia

rubiaefolia G. Don, (= *Pultenaea rubiaefolia* Andr.), rötheblätterige, ♄. t. Neuholland.

triternata H. Hügel. (= ? *trifoliata* Hort.).

Baxteri Bot. reg., v. Podolobium scandens, p. 639, *grandiflora* Cunningh., v. Chorisema platylobioides Nachlese.

Mirobalanus bellirica G., *Chebula* G., *citrina* G., *fatraca* Poir., v. Terminalia Bellirica, Chebula, citrina et madagascariensis, p. 801.

Misandra juncea Dietr., v. Buonapartea juncea, p. 138.

Mistyllus Presl, *spumosus* Presl, *turgidus* Presl, v. Trifolium spumosum et turgidum, p. 820.

Mitella L., Bischofskapsel.

caroliniana H. angl., carolinische, 4. f. Carolina.

Mitellopsis Meisn., Bischofsmützchen, V. (X.) II., Saxifrageae.

pentandra Meisn. (= *Drummondiana* Meisn. = *Drummondia mitelloides* DC. prodr. = *Mitella pentandra* Hook., p. 527), fünfmänniges, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).

trifida Meisn. (= *Hookeri* Meisn. = *Mitella trifida* Grah., p. 527, = *Lithofragma nudicaule* Nutt.).

Mitina Adans., *lanata* Cass., v. Carlina lanata, p. 166.

Mitracarpum Zuccar., Mützenfrüchtchen, IV. I., Rubiaceae.

Fischeri Cham., Schltdl. (= *Spermacoce adscendens* Fisch. = *S. Fischeri* Lk., p. 776).

hirtum DC. (= *Spermacoce hirta* Sw., p. 776).

Schizangium DC. (= *Schizangium durum* Bartl.), hartes, ♄. k. t. Mexico.

senegalense DC. (= ? *scabrum* Zuccar. = *Oldenlandia verticillata* Bacle), senegalsches, ⊙. ♄. w. Senegal.

stylosum Cham., Schldl. (= *Spermacoce crassifolia* Hort. = *S. stylosa* Lk.), langgriffeliges, ⊙. w. m. Insel Manilla.

Torresianum Cham., Schltdl., Torres's, ⊙. w. m. f. Marianen.

villosum Cham., Schltdl. (= *Spermacoce hirta* Jacq. et ? L. = *S. villosa* Sw., p. 776).

Mitraria Commersoniana Gmel., v. Barringtonia speciosa, p. 114.

Mitrospora polyphylla N. E., v. Rhynchospora polyphylla, p. 688.

Mitscherlichia spectabilis Kunth, v. Neaea Mitscherlichia.

Mnemion Spach, *calcaratum* Spach, *cornutum* Spach, *elegans* Spach, v. Viola calcarata, cornuta, grandiflora, p. 849 et 850.

Mocinia mutisioides DC., v. Stiftia chrysantha.

Modecca Lam., Jacq., Modecca.

macrophylla Blume, grofsblätterige, ♄. Sch. w. Java.

Modiola Mch., Kleinpappel, XVI. VIII., Malvaceae.

caroliniana G. Don, (= *multifida* Mch. = *Malva caroliniana* L., p. 491).

decumbens G. Don, (= *Malva decumbens* W., Enum. = *M. prostrata* Bertero), niederliegende, ♂. 4. k. t. Südamerika.

prostrata G. Don, (= *Malva prostrata* Cav., p. 492).

Digitized by Google

Möhringia L., Fenzl, Möhringie.
diversifolia Dolliner, verschiedenblätterige, 4. f. Steyermark.
pendula Fenzl, (= *Arenaria pendula* W. K., p. 75).
pentandra Gay, fünfmännige, ⊙. f. Pyrenäen.
polygonoides M. et K. (= *Arenaria polygonoides* Wulf. = *Cerastium filifolium* Vest, = *Sabulina polygonoides* Rchb. = *Stellaria ciliata* Scopol.), knöterichähnliche, 4. f. Oestreich, Schweizer Alpen, Sibirien.
β) obtusa (All.).
Ponae Fenzl, (= *Arenaria bavarica* L. = *A. Ponae* Steud. = *Alsine bavarica* Crantz, = *Sabulina Ponae* Rchb.), Pona's, 4. f. Baier. Tyrol. Alpen.
sedifolia W. (= *muscoides sedoides* P.), mauerpfefferblätterige, 4. f. Südl. Tyrol, ital. Alpen.
sphagnoides Rchb., sumpfmoosähnliche, 4. f. Tyrol. Alpen.
trinervia Clairv. (= *Arenaria trinervia* L., p. 76).
umbrosa Fenzl, (= *Arenaria umbrosa* Bunge, Ledeb.), schattenliebende, 4. f. Alt. Sibirien. (Ob kultiv.?)
villosa Fenzl, (= *Arenaria villosa* Wulf., non Ledeb. = *A. Wulffeni* Steud.).

Mönchia Ehrh., Mönchie.
mantica Bartl. (= *Cerastium manticum* L. = *Malachium manticum* Rchb., p. 883, = *Pentaple mantica* Rchb. = *Stellaria mantica* DC. = *S. glauca* var. *tenuifolia* Frivald).
octandra Rchb. (= *Malachium octandrum* Gren. = *Sagina octandra* Salzm.), achtmännige, ⊙. f. Südfrankreich, Nordafrika.

Mogiphanes Mart., v. Teleianthera Sect. III.
Mogorium acuminatum Lam., *hirsutum* Poir. (= *multiflorum* Lam.), *myrtifolium* Lam., *Sambac* Lam. etc., v. Jasminum trinerve, hirsutum, undulatum, glaucum, Sambac etc., p. 429 et 329, II.

Mohria Sw., thurifraga Sw. (= *Adiantum Caffrorum* L. suppl. = *Polypodium Caffrorum* L. mant.).
Moldavica Adans., *elata* Mch., v. Nepeta macrantha, *punctata* Mch., v. Dracocephalum Moldavica.
Moldenhaueria floribunda Schrad., v. Tachigalia floribunda.
Molina Cav., *racemosa* Cav., v. Hiptage Madablota, p. 302, II.
Molinaea canescens Roxb., v. Cupania canescens.
Molinaea chilensis Berter., v. Jubaea spectabilis, p. 330, II.
Molineria plicata Colla = Curculigo sumatrana.

Molinia Sckrk., altissima Lk. (= *arundinacea* Schrk. = *sylvatica* Lk. = *Enodium litorale* Rchb.).
Mollia W., *alsinefolia* Spgl., Schult., *aristata* Ait., *corymbosa* W., *diffusa* W., *fragilis* Spgl., *gnaphalodes* W., *latifolia* W., *minuartioides* Schult., *Polycarpon* Spgl., *stellata* W., v. Polycarpaea alsinefolia, aristata, indica, Teneriffae, fragilis, gnaphalodes, latifolia, minuartioides, peploides, stellata, p. 641.

Mollugo L., Weichling, (et Pharnaceum, p. 612).
bellidifolia Sering. (= *Pharnaceum sperguloides* Poir. = *spathulatum* Sw.).
Cerviana Sering. (= *Pharnaceum Cerviana* L. = *P. glabrum* L.).
cordifolia Sering. (= *Pharnaceum cordifolium* L.).

Digitized by Google

Mollugo

dichotoma Sering. (= *Pharnaceum dichotomum* L.), zweizinkiges, ⊙. f. Cap d g. Hoffn.

glomerata Sering. (= *Pharnaceum glomeratum* Thbg., L. fil.).

hirta Thbg. (= *Pharnaceum hirtum* Spgl.).

Hoffmannseggiana Sering. (= ? *diffusa* W. = *Pharnaceum galioides* W. = *P. Hoffmannseggianum* R. et S.).

linearis Sering. (= *Pharnaceum lineare* Thbg., L. fil.).

mucronata Sering. (= *Pharnaceum mucronatum* Thbg.), stachelspitziger, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

oppositifolia L. (= *Pharnaceum oppositifolium* Spgl.).

Schrankii Sering. (= *Berteriana* DC. = *dichotoma* Schrk. = *verticillata* L. *β* Spgl.), Schrank's, ⊙. w. Brasilien.

sperguloides Sering. (= *Pharnaceum sperguloides* Poir.).

umbellata Sering. (= *Pharnaceum umbellatum* Forsk.).

verticillata L. (= *Pharnaceum verticillatum* Spgl.).

Molpadia suaveolens Cass., v. Buphthalmum (Sect. Telekia) cordifolium, p. 139.

Moltkia Lehm., Moltkie, V. 1., Asperifoliaceae.

coerulea Lehm. (= *Onosma coerulea* W.), blaue, 4. ♄. f. b. k, Caucasus, Armenien, Syrien.

Molucella L., Trichterkelch.

acutiloba Ledeb., C. A. Mey., spitzlappiger, ⊙. f. Caucasus.

diacanthophylla Pall. (= ? *grandiflora* Stephan., W.), v. Lagochilus diacanthophyllus, p. 340, *Marrubiastrum* Stephan., v. Marrubium lanatum, p. 387, II., *frutescens* L., v. Beringeria frutescens, p. 66, II., *scariosa* RBr., v. Otostegia scariosa, *tuberosa* Pall., v. Eremostachys tuberosa, p. 227, II.

Moluchia domingensis Medic. (= *fruticosa* Medic.) et *frutescens* Medic., v. Melochia pyramidata et tomentosa, p. 509.

Moly odorum et *speciosum* Mch., v. Allium odorum et magicum, p. 31 et 30.

Momisia denticulata Dietr., Hort., v. Mertensia denticulata, p. 400, II.

Momordica T., Balsamkürbis.

aculeata Poir. (= *acutangula* Steud.), stacheliger, ⊙. Sch. w. m. ?

Charantia L., *β*) zeylanica.

dioica Roxb. (= *hispida* Dennst. foem. = *Missionis* Wall. = *tuberosa* Dennst. mas.).

echinata W. (= *Sicyos lobata* Mchx.), igelstacheliger, ⊙. Sch. f. Nordamerika.

umbellata Roxb. (= *Bryonia umbellata* Klein).

mixta Roxb., v. Muricia cochiachinensis, *monadelpha* Roxb. (= *Cowel* Dennst.), v. Coccinia indica, p. 151, II., *pedata* L., v. Anguria pedatisecta, p. 36, II.

Monachanthus Lindl., Mönchs-(Kappen-)steudel.

atratus Hook. (= *Catachaetum s. Catasetum atratum*, p. 172).

Bushnani Hook., Bushnan's, 4. w. Südamerika.

longifolius Hook. (= *Catachaetum s. Catasetum longifolium* Hook.), langblätteriger, 4. w. Guiana.

roseo-albus Hook., weifslich-rosaer, 4. w. Para.

Monanthes polyphylla Haw. (= *spathulata* Cree), v. Sempervivum monanthum et micranthes, p. 741.

Digitized by Google

Monadenia Lindl., Monadenie, XX. 1., Orchideae.
prasinata Lindl. (= *Disa prasinata* Ker), lauchgrüne, 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffn.
rufescens Lindl. (= *Disa rufescens* Thbg. = *Satyrium rufescens* Sw.), fuchsrothe, 4. Kn. w. Cap d. g. H.

Monarda L., Monarda.
amplexicaulis Bisch. stengelumfassende, 4. f. Nordamer.
aristata Nutt. (= *citriodora* Cervant).
Beckii Eaton, Beck's, ♄. f. Nordamerika.
Bradburiana Beck, (= *fistulosa* Hook. Bot. mag. non L.).
fistulosa L. (= *affinis* Lk. = *allophylla* Mchx. = *altissima* W. = *barbata* Wender. = *coerulea* Hort. = *commutata* Wender. = *cristata* Hort. = *dubia* Hort. = *elongata* Lam. = *glabra* Lam. = *hybrida* Wender. = *involucrata* Wender. = *lilacina* Wender. = *longifolia* Lam. = *media* W. = *oblongata* Ait. = *purpurea* Pursh, = *undulata* Tausch, = *varians* Barton, *violacea* Dsf., gehören nach Bentham hierher, auch rugosa Ait.).
Kalmiana Pursh (= *didyma* β *angustifolia* Torrey).
mollis L. (= *fistulosa* β Benth. = *menthaefolia* Grah.).
rugosa Ait. (= *alba* Hort.).
Russeliana Nutt., Sims, b) fl. albo.
Weniger gekannte und noch nicht eingeführte:
oswegoensis Bart. (= *didyma* L. var. Benth.), pratensis Rafin., rigida Rafin., virgata Rafin.
ciliata L., *hirsuta* Pursh, v. Blephilia ciliata et hirsuta, p. 71, II.

Monardella Benth., Monardelle, XIV. 1., Labiatae.
caroliniana Benth. (= *Pycnanthemum Monardella* Mchx., p. 668).
montana Benth. (= *Pycnanthemum montanum* Mchx.), Berg-M., 4. f. Carolina.
odoratissima Benth., wohlriechendste, 4. ♄. f. b. Nordwestl. Amerika.
Monella angustifolia Herb., *carnea* Herb., *glauca* Herb., *lutescens* Herb., *ochroleuca* Herb., *odora* Herb., *pallida* Herb., *spiralis* Herb., *striata* Herb., *ventricosa* Herb., *vittata* Herb., v. Cyrtanthus angustifolius, carneus, collinus etc.

Moneses Salisb., grandiflora Salisb., v. Pyrola, Sect. II., p. 671.
Monnieria Brownei P., *cuneifolia* Mchx., v. Herpestes Monnieria et cuneifolia.

Monnina R. et P., Monnina.
obtusifolia H. B. K. (= *Hebeandra phillyraeoides* Bonpl.).
pubescens H. B. K. (= *Hebeandra pubescens* Bonpl.), weichhaarige, ♄. t. w. Caracas.

Monocaryum RBr., Einnüfschen, VI. 1., Colchicaceae.
fasciculare R. et S. (= *Colchicum fasciculare* RBr. = *Curculigo fascicularis* Spgl. = *Hypoxis fascicularis* W.), büschelförmiges, 4. Zw. k. Syrien.

Monocera Jack., non Ell., Einhorn, XI. 1., Tiliaceae-Elaeocarpeae.
I. Ganitroceras Endl.
reticulata Endl. (= *Elaeocarpus reticulatus* Sm. = *E. cyaneus* Sims), netzförmige, ♄. ♄. t. Neuholland.
II. Diceras Endl.
dentata Endl. (= *Dicera dentata* Forst. = *Elaeocarpus dentatus* Vahl), gezahnte, ♄. ♄. t. k. Neuseeland.

Digitized by Google

Monochilus Fisch. et Mey., Stahlkraut (Einlippler), XIV. 11., Verbenaceae.

gloxinifolius Fisch. et Mey., gloxinienblätteriges, 4. w. Brasilien.

Monochoria Presl, Einhäutler, VI. 1., Commelynaceae-Pontederieae.

dilatata Kunth, (= *Pontederia dilatata* Buchanan, Ait. ed. 2., p. 647).

hastaefolia Presl, (= *Pontederia hastata* L.), spontonblätteriger, 4. Wa. w. Ostindien.

vaginalis Presl, (= *Pontederia vaginalis* Burm), scheidiger, 4. Wa. w. Coromandel.

Monocosmia Fenzl, Einfranze, I. 1., Portulacaceae.

corrigioloides Fenzl, (= *Calandrinia monandra* DC., p. 145, = *Corrigiola deltoidea* Poepp. = *Talinum monandrum* R. et P.), uferlingähnliche, ⊙. f. Südamer.

Monolepis Schrad.[1]), Einschuppe, V. 11., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

trifida Schrad. (= *Chenopodium trifidum* Hort. Wratislaw.), dreitheilige, ⊙. f. Nordamerika.

Monolophus Wall., Einbüschler, I. 1., Scitamineae-Amomeae (Zingiberaceae).

elegans Wall. (= *Kämpferia elegans* Wall., p. 435).

secundus Wall. (= *Costus secundus* Spgl. = *Kämpferia secunda* Wall.), einseitiger, 4. w. Ostindien.

Monolopia DC., Monolopie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

californica Fisch. et Mey. (= *Hologymne californica* Bartl. = *Lasthenia californica* Lindl. Bot. reg., non DC.), californische, ⊙. f. Californien.

glabrata Fisch. (= *Hologymne glabrata* Bartl. = *Lasthenia glabrata* Lindl., DC., p. 447).

major DC. (= *Hologymne Douglasii* Hort. Petropol. = *Helenium Douglasii* Hort.), grofse, ⊙. f. Californien.

minor DC., kleine, ⊙. f. Californien.

Monomeria Lindl., Monomerie XX. 1., Orchideae.

barbata Lindl., bärtige, 4. w. Ostindien.

nitida ? Lindl., glänzende, 4. w. ? Ostindien.

Monopsis Salisb., Presl, DC., debilis Presl etc., v. Lobelia, Sect. VII., p. 473 et p. 367, II.

Monotoca RBr., Monotoca.

ledifolia Cunn., porstblätterige, ♄. t. Neucambrien.

patens Cunn., abstehende, ♄. t. Neuholland.

Monotropa Hypopitys L., *Hypophegea* Wallr., v. Hypopitys multiflora et glabra, p. 312.

Monsonia L. fil., Monsonie.

emarginata L'Her. (= *Geranium emarginatum* Thbg., L. fil.), ausgerandete, 4. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

pilosa W. (= *filia* H. Par. = *speciosa* Swt. = *tenuifolia* Hort. = *Geranium Monsonia* Thbg.).

speciosa L. (= *grandiflora* Burm. = *Geranium speciosum* Thbg.).

tenuifolia W. (= *Geranium grandiflorum* Cav., non Burm.), feinblätterige, 4. ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Burmanni DC. (= *Geranium speciosum* L , Burm.), *L'Heritieri* DC. (= *spinosa* L'Her.) et *Patersonii* DC., v. Sarcocaulon Burmanni etc. p. 721.

---

1) „Genus dubium" Endl.

Digitized by Google

Monstera Adans., Schott, Monstera, XXI. VI., Aroideae.

Adansonii Schott, (= *Calla Dracontium* Mey. = *C. pertusa* Kunth, p. 147, = *Dracontium pertusum* L.), Adanson's, 4. w. Westindien, Südamerika.

cannaefolia Schott, (= *Arum cannaefolium* L. fil. = *Pothos cannaefolia* Sims, p. 653, = *P. cannaeformis* H. B. K. = *P. odorata* Andr.).

lingulata Schott, (= *Arum lingulatum* L., p. 85).

M. caudata Schott, *decursiva* Schott, *gigantea* Schott, *officinalis* Schott, *Peepla* Schott, *pertusa* Schott, *pinnata* Schott, *pinnatifida* Schott, v. Scindapsus caudatus etc.

Montagnea DC. (= *Eriocarpha* Cass. = *Eriocoma* H. B. K. = *Montanoa* Llav. et Lexarg. = *Priestleya* Moç., Sess.), (Camille Montagne, M. Dr. zu Paris, ehem. Chirurgien-Major), XIX, IV., Compositae-Corymbiferae (Heliantheae).

floribunda DC. (= *Eriocoma floribunda* H. B. K.), blüthenreiche, 4. ♄. k. t. Mexico.

grandiflora DC. (= *Eriocoma grandiflora* Alam. = *Montanoa grandiflora* Llav. et Lex., p. 530, = *Priestleya longifolia* Moç., Sess.).

tomentosa DC. (= *heterophylla* Schrad. = *Eriocoma fragrans* Sweet, = *E. heterophylla* Schrad. = *Montanoa tomentosa* Llav. et Lex., p. 530).

Montbretia DC. (= *Bellendenia* Rafin. = *Tritonia* Ker, = *Waitzia* Rchb, non Wendl., p. 854 et 855), Montbretie.

aequimaculata * (= *Waitzia aequimaculata* Rchb.).

anigozanthaeflora * (= *Tritonia anigozanthaeflora* Swt. = *Waitzia anigoz.* Rchb.).

concolor * (= *Tritonia concolor* Swt. = *Waitzia concolor* Rchb.).

crispa * (= *Freesea crispa* Eckl. = *Gladiolus crispus* L. = *Tritonia crispa* Ker, = *W. crispa* Rchb.).

crocata Endl. (= *Gladiolus crocatus* P. = *Ixia crocata* L. = *I. hyalina* W. E. = *I. iridifolia* Delarb. = *I. Milleri* Berg. = *I. planifolia* Mill. = *T. crocata* Ker, = *W. crocata* Rchb.).

α) alba Endl., β) maculata Endl., γ) pallida Endl., δ) rosea Endl.

deusta Endl. (= *Ixia crocata* var. *nigro maculata* Andr. = *I. deusta* Ait. = *I. gibba* Salisb. = *I. miniata* Red. = *T. deusta* Ker, = *W. deusta* Rchb.).

fenestrata Endl. (= *Ixia crocata* β Ait. = *I. fenestrata* Jacq. = *I. hyalina* L. fil., (L. suppl.) = *T. fenestrata* Ker, = *W. fenestrata* Rchb.).

flava * (= *Freesea flava* Eckl. = *Gladiolus flavus* Ait. = *G. securiger* β P. = *T. flava* Ker, = *W. flava* Rchb.).

fucata * (= *Tritonia fucata* Lindl. = *Waitzia fucata* Rchb.),

lancea Endl. (= *Ixia fenestrata* var. Jacq. = *I. hyalina* Red. = *I. lancea* Thbg. = *I. similis* Salisb. = *I. squalida* var. α Ait. = *Tritonia squalida* Ker, = *Waitzia squalida* Rchb.), lanzettliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lineata * (= *Gladiolus lineatus* Salisb., Red. = *Ixia squalida* β Ait. = *T. lineata* Ker, = *T. crocata* Ker var. Herbert, = *W. lineata* Rchb.).

Digitized by Google

Montbretia

longiflora * (= *Freesea longiflora* Eckl. = *Gladiolus longiflorus* L. fil. = *Hexaglottis* Vent. = *Hyalis longiflora* Salisb. = *Tritonia longiflora* Ker, = *T. pallida* Ker, = *Waitzia longiflora* et *pallida* Rchb.).

β) tenuiflora * (= *Ixia longiflora β* W. = *I. tenuiflora* Vahl, = *T. tenuifl.* Ker, = *W. tenuifl.* *).

miniata * (= *Freesea miniato-lateritia* Eckl. = *Ixia deusta β. γ. δ. ε.* Vahl, = *I. miniata* Jacq. = *T. crocata* Ker var. Herb. = *T. miniata* Ker, = *W. miniata* Rchb.).

odorata * (= *Tritonia odorata* Lindl. = *W. odorata* *).

pectinata * (= *Ixia pectinata* Vahl, = *T. pectinata* Ker, = *W. pectinata* Rchb.).

purpurea * (= *Ixia crocata* var. c Thbg. = *I. purpurea* Lam. = *T. purpurea* Ker, = *W. fenestrata* b. *purpurea* *), purpurfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

refracta Endl. (= *Gladiolus refractus* Jacq. = *G. resupinatus* P. = *T. refracta* Ker, = *W. refr.* Rchb.).

Rocheana * (= *Gladiolus longiflorus* Thbg. = *G. rochensis* Schult. = *Ixia longiflora* Berg. = *I. paniculata* de la Roche, = *T. rochensis* Ker, = *T. Rocheana* Swt. = *W. rochensis* Rchb.).

rosea * (= *Gladiolus amoenus* Ehrh. = *G. roseus* Jacq. = *G. striatus* Banks, = *Houttynia capensis* Houtt. = *T. rosea* RBr. = *T. capensis* Ker, = *W. rosea* Rchb. = *Watsonia amoena* P.).

sanguinea * (= *Tritonia sanguinea* Eckl.), blutfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

securigera DC. in Red., p. 530, (= *Gladiolus securiger* Soland. in Ait. = *Ixia gladiolaris* Lam. = *T. securigera* Ker).

striata * (= *Gladiolus formosus* P. = *G. striatus* Jacq. = *Hebea formosa* P., Eckl. = *T. striata* Ker, = *W. striata* Rchb.).

viridis * (= *Gladiolus viridis* Ait. = *T. viridis* Ker, = *W. viridis* Rchb.).

xanthospila * (= *Anomatheca xanthospila* Ker, = *Gladiolus xanthospilus* DC. = *T. xanthospila* Spgl. = *W. xanthospila* Rchb.).

Moraea Mill., L., Moraea.

aurantiaca A. Dietr. (= *Bobartia aurantiaca* Swt., p. 126, = *Sisyrinchium aurantiacum* Zuccagni), orangefarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

ciliata Ker, (= *barbigera* Salisb. = *Iris ciliata* Thbg. = *Vieusseuxia ciliata* Eckl.).

crispa Thbg., non Ker, krause, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

edulis Ker, (= *vegeta* Jacq. = *Iris capensis* Burm. = *I. edulis* Thbg. = *I. longifolia* Schneev. = *Vieusseuxia edulis* Lk. = *V. fugax α* R. et S.).

β) odora Salisb.

fugax Jacq. (= *edulis γ* Bot. mag. = *Vieusseuxia fugax* de la Roche, p. 848, = *Iris imberbis* Hazen, = *I. longifolia* Andr.).

Gawleri Spgl. (= *crispa* Ker, non Thbg. = *Iris crispa* Thbg. = *Vieusseuxia crispa* Eckl.), Gawler's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

gracilis A. Dietr. (= *spathacea* Ker var. Spgl. = *Iris gracilis* Lichtenst. in R. et S. = *Vieusseuxia gracilis* Eckl.), schlanke, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Moraea
pilosa Wendl., haarige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
plumaria Ker, (= *iriopetala* W., Vahl, = *Iris plumaria* Thbg. = *Vieusseuxia plumaria* Eckl.).
Sisyrinchium Ker, (= *Diaphane edulis* Salisb. = *Iris Sisyrinchium* L.).
β) Tenoreana Swt. (= *Iris fugax* Tenore).
spathacea Ker, (= *Bobartia indica* L. = *B. spathacea* Sweet, p. 126, = *Sisyrinchium spathaceum* P. = *Iris spathacea* Thbg.).
tristis Ker, (= *iriopetala β* W. = *sordescens* Jacq. = *tricolor* Andr. = *vegeta* L. = *Iris tristis* Thbg., L. fil. = *Vieusseuxia tristis* Eckl.).
virgata Jacq. (= *Hexaglottis virgata* Swt. = *Ixia virgata* W.), ruthenförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
Zeyheri Lehm., Zeyher's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Candolleana Spgl. etc., v. Vieusseuxia iridioides, p. 848, *chinensis* Thbg., v. Pardanthus chinensis, p. 586, *Ferrariola* Jacq., v. Ferraria Ferrariola, *fimbriata* Hort., v. Iris chinensis, p. 422, *gladiata* Thbg., *aphylla* Thbg., *bermudiana* Thbg„ *flexuosa* L. (= *longifolia* P.) etc., v. Sisyrinchium gladiatum, aphyllum, bermudianum, flexuosum etc., p. 762 et 763, *Melaleuca* Thbg., *Aristea* Lam., *spathacea* Thbg., *spiralis* Thbg., *umbellata* Thbg. etc., v. Aristea Melaleuca, cyanea etc., p. 77 et 45, Il., *palmifolia* Thbg., non Jacq. (= *Pavonia* Thbg., non Ait., Ker), v. Tigridia Pavonia, p. 810, *vaginata* DC. (= *Northiana* Schneev.), v. Cipura Northiana, p. 197.

Moricandia DC., Moricandie.
sonchifolia Bunge, gänsedistelblätterige, ⊙. f. Nordchina.
teretifolia DC. (= *Brassica teretifolia* Dsf.), stielrundblätterige, ⊙. f. Nordafrika.

Morina T. (Dr. Morin, franz. Arzt und Botaniker), II. 1., Dipsaceae.
elegans Fisch. et Lallem. (= *longifolia* DC., non Wall.), zierliche, 4. f. b. k. Himalaya.
longifolia Wall. (= *Wallichiana* Royle), langblätterige, 4. f. b. k. Nepal, Cashmire.
persica L. (= *orientalis carlinaefolia* T. = *orientalis* Mill. = *verticillata* Mch.).
nana Wall. (= *nepalensis* Don), parviflora Karel. et Kiril., polyphylla Wall., scheinen bis jetzt noch nicht eingeführt zu sein.

Morinda L., Morindastrauch.
macrophylla Dsf., grofsblätteriger, ħ. w. ?
umbellata L. (= *Padavara* Juss. = *scandens* Roxb.), ħ. Sch. Zeylon.

Moringa Burm., Juss. (malabarischer Name), X. 1., Leguminosae-Cassieae-Moringeae.
aptera G. (= *Hyperanthera aptera* Steud.), flügellose, ħ. w. Ostindien.
pterygosperma G. (= *M. Nux eben* Dsf. = *oleifera* Lam. = *zeylanica* Lam., P. = *Hyperanthera Moringa* Vahl, = *Anoma Moringa* Lour. = *Guilandina Moringa* L.).

Digitized by Google

Morisia Gay, non N. E. (J. H. Moris, Prof. der Botanik und Director des botanisch. Gartens zu Turin), XV. 1. (III.), Cruciferae [1]).

hypogaea Gay, (= *Rapistrum hypogaeum* Duby, = *Sisymbrium monanthum* Vivian. = *Erucaria hypogaea* Vivian.), unterirdische, ⊙. f. Südcorsica.

Moritzia DC. (Alex. Moritzi, Prof. in Chur, Verfasser einer Flora d. Schweiz), V. 1., Asperifoliaceae.

ciliata DC. (= *Anchusa ciliata* Chamiss.), gewimperte, 4. w. Brasilien. (Ob kultivirt?)

Mormodes Lindl., Larvenstendel.

aromaticum Lindl., gewürzhafter, 4. w. Mexico.

atropurpureum Lindl.

Buccinator Lindl., trompetenförmiger, 4. w. Südamerika.

Cartoni Hook., Carton's, 4. w. Santha Martha.

lineatum Batem., linirter, 4. w. Mexico.

luxatum Lindl., ausgerenkter, 4. w. Mexico.

pardinum Batem. (= *Cyclosia maculata* Kl.), *β*) unicolor v. Houtte, (= *citrinum* H. belg.).

In van Houtte Établissement horticole werden noch aufgeführt: fulvum, ochraceum, olivaceum, wahrscheinlich in Mexico heimisch.

Morna nitida Lindl., *nivea* Lindl., v. Waitzia aurea et corymbosa.

Morocarpus Adans., Scop., *capitatus* Scop., *foliosus* Mch., v. Blitum capitatum et virgatum, p. 125 et 126.

Morphixia Ker, *aulica* Ker, *capillaris* Ker, *incarnata* Ker, *linearis* Ker, v. Ixia aulica etc., p. 425 et 427.

Morrenia odorata Hort., non Lindl., v. Roulinia versicolor.

Morus T., Maulbeerbaum.

alba L., a) macrophylla Morett. (= *Morettiana* Jacq. fil. = *chinensis* Bertol., Lodd., Loud. = *Morone indiana* Ital. = *Murier Dandolo*), b) latifolia Poir. (= *multicaulis* Perrot. = *tatarica* Dsf., non L. = *cucullata* Bonaf., non Moretti, = *indica* H. Patav. = *bullata* Balb. = *Murier Perrotetti* = *Murier de Philippines*), c) italica Poir., d) japonica Nois. (= *cucullata* Moretti, non Bonaf.), e) constantinopolitana Poir. (= *byzantina* Sieber), f) nervosa Delile, g) pumila Nois. (= *nana* Hort.), h) heterophylla Moretti, i) flexuosa Moretti, (= *tortuosa* Audib.), k) intermedia Perrotet, (= *alba sinensis* Bosc, = *Murier* de la Chine), l) venosa Delile, m) hispanica Hort., n) flava Hort., o) gentilis Hort., p) membranacea Hort., q) nigra Hort., r) rosea Hort., s) Columbassa Lodd., t) dura Hort., u) furcata Hort., v) Guzziola Hort., w) lucida Hort., x) italica rubra Lodd., y) romana Lodd. (= *ovalifolia* Hort.), z) subalba Hort., aa) Venaissaini Hort.

rubra L., a) canadensis Poir., b) scabra W., c) pensylvanica Nois., Lodd., d) missouriensis Audib.

Morysia Cass., *dentata* DC. (= *diversifolia* Cass.) etc., v. Saintmorysia dentata etc.

Moschifera pinnatifida Molin., v. Moscharia pinnatifida, p. 532.

---

1) Nicht mit Morysia Cass. p. 532 zu verwechseln.

Digitized by Google

Moschosma Rchb., Moschusbasilicum.

australe Benth. (= *Brownii* * = *Lumnitzera moschata* Spgl. = *Plectranthus moschatus* RBr.), neuholländischer, ⊙. m. f. Neuholland.

ocimoides Benth. (= *polycladon* Rchb. = *Lehmannia ocimoides* Jacq. = *Lumnitzera ocimoides* Jacq. = *Ocimum congestum* Spgl. = *O. polycladon* Lk.), vielästiger, ⊙. m. w. Ostindien.

polystachyum Benth. (= *tenuiflorum* * = *Lumnitzera polystachya* Jacq. = *Ocimum polystachyum* L. = *O. tenuiflorum* Burm.).

Moschoxylon Juss., Moschusholz, X. 1. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

elegans Juss. (= *Trichilia elegans* Juss.), zierliche, ♄. w. Brasilien.

odoratum Juss. (= *Trichilia moschata* β DC. = *T. odorata* Andr., p. 816).

Mougeotia H. B. K., *caracasana* H. B. K., *corchorifolia* H. B. K., *nodiflora* H. B. K., v. Riedlea caracasana, corchorifolia et nodiflora.

Moulinsia cupanioides Cambess. (= *rubiginosa* Don), v. Sapindus rubiginosus, p. 721.

Moutouchia Benth. (= *Moutouchi* Aubl.), (guianischer Name), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Draco Benth. (= *Pterocarpus Draco* L., p. 664, = *P. officinalis* Jacq. = *P. hemipterus* G.).

suberosa Aubl. (= *Griselinia* Scopol. Neck. = *Pterocarpus Moutouchi* Lam. = *P. suberosus* P.), korkige, ♄. w. Guiana.

Mucuna Marcgr., Adans., p. 532.

bracteata DC. (= *Carpopogon bracteatum* Roxb.).

monosperma DC. (= *Carpopogon monospermum* Roxb. = *Dolichos urens* Roxb.).

nivea DC. (= *Carpopogon niveum* Roxb.).

velutina Hassk., sammethaarige, ⊙. Sch. w. Java.

Mühlenbergia Schreb., Mühlenbergie.

aristata P. (= *Brachyelytrum* Trin. = *erecta* Schreb.).

ciliata Trin. (= *Agrostis ciliata* W. = *Podosaemum ciliatum* H. B. K. = *Polypogon ciliatus* Spgl. = *Trichochloa ciliata* R. et S.), gewimperte, ⊙. f. Mexico.

diffusa W. (= *multiflora* P. B. = *Schreberi* Gmel. system. = *Dilepyrum diffusum* P. B. = *D. minutiflorum* Mchx. = *D. multiflorum* P. B.).

glomerata Trin. (= *calycina* Trin. = *Cinna glomerata* Lk. = *Dactylogramma cinnoides* Lk. = *Podosaemum glomeratum* Lk.).

setosa Trin. (= *Agrostis setosa* Spgl. = *Podosaemum setosum* H. B. K. = *Trichochloa setosa* R. et S.), borstige, ⊙. f. Mexico.

stipoides Trin. (= *Agrostis aspera* W. herb. = *A. stipoides* Spgl. = *Podosaemum stipoides* H. B. K. = *Stipa patens* W. herb. = *S. rostrata* W. herb. = *Trichochloa stipoides* R. et S.), pfriemengrasähnliche, ⊙. f. Quito, Mexico.

Willdenowii Trin. (= *Achnatherum tenuifolium* P. B. = *Agrostis diffusa* Mühlbg. = *A. sylvatica* Torr. = *A. tenuiflora* W. = *Apera tenuifl.* P. B. = *Cinna tenuiflora* Lk. Enum. = *Podosaemum tenuiflorum* Lk. Hort. = *Trichochloa longiseta* Trin.).

Digitized by Google

Mulgedium Cass., Alpenlattich.
cyaneum DC. (= *Agathyrsus cyaneus* D. Don).
hirtum Schultz Bipont., kurzhaariger, 4. f. Nordamer.
hispidum DC., steifhaariger, 4. f. Sibirien.
macrorrhyzum Royle, grofswurzeliger, 4. k. f. b. Cashmire, Thibet.
tataricum DC. (= *runcinatum* Cass.).

Mundia Kunth, Mundie.
albiflora Eckl., Zeyh., weifsblumige, ħ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Munychia Cass., Cymbalariae N. E. (= *brachyglossa* Cass.) et hirsuta DC., v. Aster, Sect. XII., p. 99.

Muraltia Neck, Muraltie.
aspera Lehm., rauhe, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.
DeCandollei Eckl., Zeyh. (= *squarrosa* DC.), DeCandolles, ħ. t. k. Cap d. g. H.
macrocarpa Lehm., grofsfrüchtige, ħ. t. k. Cap d. g. H.
squarrosa Eckl., Zeyh., non DC. (= ? *pilosa* DC. = *Polygala squarrosa* Thbg., L. fil.).
thymifolia DC. (= *Polygala thymifolia* Thbg.), thymianblätterige, ħ. ħ. k. Cap d. g. Hoffn.

Murraya König, Murraya.
brasiliensis Brotero, brasilianische, ħ. w. Brasilien (Minas Geras).

Murucuja T., Murucuja.
orbiculata P. (= *Passiflora orbiculata* Cav.), kreisförmige, ħ. Sch. w. Domingo.
aurantiaca Forst., *Baueri* Lindl., v. Disemma aurantiaca, Baueriana, p. 208, II., *speciosa* Spgl., v. Tacsonia speciosa.

Musa T., Pisang.
acuminata Colla, zugespitzter, 4. w. Amboina.
Balbisiana Colla, (= *seminifera* var. Lour. = *M. Troglodytarum* β L.), Balbis's, 4. ħ. w. Amboina.
Berteroniana Colla, (= *Berterii* Spgl.), Bertero's, 4. w. Molucken.
Cavendishii Hook., Paxt. (= *chinensis* Sweet), Cavendish's, 4. ħ. w. China.
coccinea Andr. (= *Uranoscopus* Lour.).
Dacca Mak., Dacca-P., 4. ħ. w. ? Ostindien.
discolor Hort. Lovan., verschiedenfarbiger, 4. ħ. w. ?
paradisiaca L. (= *Cliffortiana* L. = *mensaria* Mch. = *sapientum* Roxb., non L.).
rosacea Jacq. (= *Carolinae* Sterl. = ? *ornata* Roxb. = *rubra* Hort.).
speciosa Tenore, prächtiger, 4. ħ. w. ? Ostindien.
Steelii H. angl., Steel's, 4. ħ. w. ?
textilis N. E. (= *seminifera* Lour. var. = *sylvestris* Colla), webiger, 4. ħ. w. Amboina, Molucken, Philippinen.
Troglodytarum L. (= *Uranoscopus* Colla), Troglodyten-P., 4. w. Molucken.
zebrina Hort. belg. (= ? *rosacea* Jacq. var.), scheckiger, 4. w. ? Mascarenas.

Muscari T., moschatum W. (= *ambrosiacum* Mch. = *Muscarimi* Medic.).
M. autumnale Guss., *botryoides* L. etc., v. Botryanthus autumnalis, vulgaris etc., p. 75, II., *ciliatum* Ker, *comosum* Mill. etc., v. Bellevalia ciliata, comosa etc., p. 64, II.

Digitized by Google

Muscaria acaulis Haw. (= *caespitosa* Haw. = *muscoides* Haw.), *atropurpurea* Haw., v. Saxifraga atropurpurea, muscoides, p. 725 et 726.

Mussaenda Herm., L., Mussaenda.

Afzelii ? Schum., v. Houtte, Afzelius's, ħ. w. Guinea.

arcuata Lam. (= *Landia* Bory, = *Landia astrogapha* Commers. = *L. stelligera* Commers.).

elegans Schum. (= *discolor* Thonn.), zierliche, ħ. w. Guinea.

frondosa L. (= *Belilla* Hamilt. = *Dovinia* Hamilt. = *flavescens* Hamilt. = *formosa* L. mant. = *zeylanica* Burm.).

Isertiana DC. (= *macrophylla* Schum.), Isert's, ħ. w. Guinea.

Landia Lam. (= *holosericea* Sm. = *latifolia* Poir. = *Landia lappacea* Domb., Vitm. = *Rondeletia Landia* Spgl.).

macrophylla Wall., grofsblätterige, ħ. t. Nepal.

cuneifolia Don, *Luculia* Hamilt., v. Luculia cuneifolia, p. 373, II. et gratissima, p. 479, *spinosa* Jacq. et *tetracantha* Cav., v. Randia armata et tetracantha. *Mussinia incisa* W. (= *pinnata* W., *speciosa* W., *uniflora* W., v. Gazania pinnata, speciosa, uniflora. *Mustelia arundinacea* Cav., v. Chusquea scandens, p. 143, II., *M. Eupatoria* Spgl., v. Stevia Eupatoria, p. 788.

Mutisia L. fil., Mutisie.

Berteriana Endl. (= *Berterii* DC.), Bertero's, ħ. Sch. k. t. f. b. Chili.

Bridgesii Endl., Bridges's, ħ. Sch. t. k. f. b. Chili.

grandiflora H. B. K., grofsblumige, ħ. Sch. t. Neugranada.

Hookeri Meyen, (= *linearifolia* Hook., non Cav.), Hooker's, ħ. Sch. t. k. f. b. Chili.

ilicifolia Cav. (= *spinosa* Hook., Arn. = *truncata* Don).

linifolia Hook., gleichbreitblätterige, ħ. Sch. t. k. f. b. Chili.

peduncularis Cavan., stielblumige, ħ. Sch. t. k. Peru.

speciosa Hook. (= *arachnoidea* D. Don).

spinosa R. et P. (= *auriculata* Poepp. = *hastata* Bert.), dornige, ħ. Sch. t. k. f. b. Chili.

Myagrum T., L., perfoliatum L. (= *amplexicaule* Mch. = *litorale* Scopol.).

M. alpinum Lapeyr. (= *auriculatum* DC. = *montanum* Berger, = *saxatile* β W.), v. Kernera saxatilis β, p. 437, *arborescens* Jacq., v. Crambe strigosa, *austriacum* Jacq., *aquaticum* Lam., *palustre* Lam., *pyrenaicum* Lam. etc., v. Nasturtium austriacum, amphibium, palustre, pyrenaicum, p. 543, *Bauhini* Gmel. (= *pinnatifidum* Ehrh.) etc., v. Camelina dentata etc., p. 151, *biarticulatum* Crantz, (= *perenne* L.), *orientale* L., *rugosum* L., (= *stylosum* Gochn.), v. Rapistrum perenne etc., p. 679, *bursaefolium* Thuill. (= *erucaefolium* Vill. = *irregulare* Asso, = *iberioides* Brotero), v. Calepinia Corvini, p. 147, *cornutum* Lam., v. Pugionium cornutum, *Erucago* Lam. (= *clavatum* Lam. = *asperum* Poir.), v. Bunias Erucago et β, p. 138, *prostratum* Poir., v. Muricaria prostrata, p. 534, *rostratum* Scopol. (= *rigidum* Pall. = *tataricum* Poir.), v. Euclidium syriacum etc., *sphaerocarpum*

Digitized by Google

Myagrum
Jacq., v. Crambe hispanica, *spinosum* Lam., v. Zilla myagroides, p. 863, *taraxacifolium* Lam., v. Laelia orientalis, p. 340, II., *verrucosum* Lam., v. Ochthodium aegyptiacum, p. 552.

Myanthus Lindl., Bartorche.
cristatus Lindl., kammförmige, 4. w. Südamerika.
cernuus Lindl. (= *Catasetum trifidum* Hook.).
deltoideus Lindl.
spinosus Hook., dornige, 4. w. Brasilien.

Mycaranthes Blum., Lindl., Pilzorche, XX. 1., Orchideae.
stricta Lindl. (= *Eria stricta* Lindl. = *Octomeria secunda* Wall. mpt.), steife, 4. w. Ostindien.
Mycelis Cass., *angulosa* Cass. (= *muralis* Rchb.), v. Lactuca murorum, p. 442 et p. 339, II.

Myginda Rhacoma Sw. (= *Crossopetalum* Räusch.).
Mylinum Carvifolia Gaud., v. Selinum Carvifolia, p. 740.

Myogalum Lk., Endl., Kunth, (= *Albucea* Rchb.), Bouchéanum Kunth, nutans Lk. etc., v. Ornithogalum, Sect. II.

Myonima Commers., Mausröthe, IV. 1., Rubiaceae.
multiflora Rich. (= *Faramea corymbosa* Sieb. = *Ixora micrantha* R. et S. = *ovata* Hort. = *parviflora* Lam., non Vahl.), vielblumige, ♄. w. Mauritius.

Myoporum Banks et Soland., Porenblatt.
caprarioides Benth., herzblumenähnliches, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).
floribundum A. Cunn., blüthenreiches, ♄. t. Neuholland.
insulare RBr. (= *Elaeodendron australe* Hort., non Vent.).
serratum RBr. (= *Pogonia tetrandra* LaBill.), sägezähniges, ♄. t. Neuholland.

Myosotis Rupp., Dill., Vergiſsmeinnicht (Mausöhrchen).
I. Genuina.
azorica H. C. Watson, azorisches, 4. k. Azoren.
caespitosa Schultz, *β*) macrocalyx H. Petropol.
chinensis DC. (= *peduncularis* Bunge, non Trevir.), chinesisches, ⊙. ♂. f. Nördl. China.
incrassata Guss. (= *pusilla* Guss., non Lois.), verdicktes, ⊙. f. Sicilien.
littoralis Stev., Ufer-V., ⊙. f. Ufer des caspischen Meeres, Taurien.
multiflora Merat, vielblumiges, ☉. f. Frankreich.
palustris Wither., *δ*) laxiflora Rchb., *ε*) caespititia DC. (= *caespitosa β grandiflora* Gaud.).
sicula Guss. (= *micrantha* Guss., Bertol., non Pall.), kleinblumiges, ⊙. f. Sicilien, Sardinien.
sylvatica Ehrh., *δ*) variabilis Angelis.
versicolor P., Rchb., *β*) lutea P. (= *Anchusa lutea* Cav.).
II. Eritrichium Schrad.
californicum DC. (Fisch. et Mey.)
clandestinum A. DC. (= *Lithospermum clandestinum* Trev. = *Cryptantha microcarpa* Fisch. et Mey.), heimlichblühendes, ⊙. f. Chili.
cryptanthum A. DC. (= *Cryptantha glomerata* Lehm.), verstecktblumiges, ⊙. f. Chili.
lineare DC. (= *M. linearis* Colla, = *M. granulosa* R. et P.), gleichbreitblätteriges, ⊙. f. Chili.
nanum Schrad. (Vill.), *α*) odontospermum K., *β*) leio-

Digitized by Google

Myosotis

spermum K. (= *Hacquetii* K. = *terglovіense* Putterl. et Endl. = *M. terglovensis* Hacq. = *M. nana* Wulf., non Vill.).

pedunculare DC. (Trevir.), (= *M. clavata* Blume).

rupestre DC. (Pall.), (= *Anchusa rupestris* R. et S.), Felsen-V., 4. f. Altaisch. Sibirien, Dahurien.

villosum Bunge (Ledeb.), (= *M. drabaefolia* Turcz. = *M. villosa* Ledeb. = *Anchusa villosa* R. et S.), zottiges. 4. f. Dahurien.

III. Strophiostoma Turcz.

propinquum Turcz. (Fisch. et Mey.).

sparsiflorum Turcz. (Mikan), (= *M. sepium* Bess.).

Zu ergänzen p. 536.

Myosoton aquaticum Mch., v. Stellaria pentagyna.

Myrcia DC., Gewürzmyrte.

coriacea DC. (= ? *Caryophyllus cotinifolius* Mill. = *Myrtus acris β* Sw. = *M. coriacea* Vahl, p. 538, = *M. cotinifolia* Poir.).

divaricata DC. (= *Eugenia divaricata* Lam. = *Myrtus divaricata* Hamilt. = *M. laurifolia* Hort. Par. = *M. virgultosa* Sw. var. Spgl.), ausgespreitzte, ♄. w. Westindien.

Linkiana DC. (= *Myrtus Linkiana* Mart.), Link's, ♄. w. Brasilien.

Mini Sweet, (= *splendens β* DC. = *Eugenia microcarpos* Lam. = *E. Mini* Aubl. = *Myrtus Mini* Spgl.), Mini-G., ♄. w. Guiana, Brasilien.

splendens DC. (= *Eugenia laxiflora* Poir. = *E. microcarpa α* Lam. = *E. periplocifolia* Jacq. = *Myrtus splendens* Sw.), schimmernde, ♄. w. Westindien.

M. acris DC. (= *pimentoides* DC. excl. syn.), v. Eugenia acris, p. 236.

Myriandra brachyphylla Spach, *galioides* Spach, *glauca* Spach, *Michauxii* Spach, *nitida* Spach (= *fasciculata* Spach), *prolifica* Spach (= *spathulata* Spach), v. Hypericum fasciculatum, galioides, myrtifolium, Michauxii, prolificum, p. 409, 414 et p. 311, 11.

Myrica L., Wachsmyrte, Gagelstrauch.

I. Gale T.

laciniata W. (= *incisa* Hort.).

pubescens Ait., weichhaarige, ♄. t. Neugranada.

II. Comptonia Banks.

asplenifolia Blume, (= *C. asplenifolia* Banks in Ait. Kew. ed. I.), p. 214.

Myrobroma fragrans Salisb., v. Vanilla planifolia, p. 837.

Myrodia Schreb., Balsammalve.

scabra Mart., scharfe, ♄. w. Brasilien.

turbinata Sw. (= *ovata* Moç. Sess. = *Quararibaea turbinata* Poir.).

Myrospermum Jacq., Balsamsaame.

peruiferum DC. (= *pedicellatum* Lam.), peruanischer, ♄. w. Südamerika.

toluiferum Rich., p. 538.

Myroxylon L. fil., *peruiferum* L. fil. et *toluiferum* H. B. K., v. Myrospermum peruiferum et toluiferum.

Digitized by Google

Myrrhidium DC., Eckl., Zeyh., *anemonefolium* Eckl., Zeyh., *betonicum* Eckl., Zeyh. etc., v. Pelargonium Sect. X. anemonefolium, myrrhifolium etc.
Myrrhis angelicaefolia R. et S., *aurea* Spgl., *aromatica* Spgl., *bulbosa* Spgl., *capensis* Spgl., *Cicutaria* Spgl., *colorata* Spgl., *hirsuta* Spgl., *humilis* R. et S., *millefolia* Spgl. (= *tenuifolia* Schrank, non Schult.), *procumbens* Spgl., *rosea* Spgl., *temula* G., *tenuifolia* Schult., v. Chaerophyllum angelicaefolium etc., p. 185, 186 et p. 135, II., *australis* All., *Pectenveneris* All., v. Scandix australis etc., p. 729, *chaerophyllea* Lam., *sylvestris* Spgl., *torquata* Spgl., v. Anthriscus vulgaris, sylvestris et var. torquata, p. 65 et p. 38, II., *canadensis* Nutt., v. Cryptotaenia canadensis, p. 174, II., *Claytonii* Torr. et *longistylis* Torr., v. Osmorrhiza brevistylis et longistylis, *gracilis* Spgl., v. Sphallerocarpus Cyminum.

Myrsine L.

africana L. (= *glabra* G.), *β*) retusa Ait. (= *rotundifolia* Lam.).

bifaria Wall., Roxb. (= *Potama* D. Don).

capitellata Wall., *β*) parvifolia A. DC. (= *lanceolata* Wall.).

crassifolia RBr., dickblätterige, ħ. t. Tropisches Neuholland, Norfolkinsel.

floridana A. DC. (= *Sideroxylum punctatum* Lam. = ?*Bumelia punctata* R. et S.), floridanische, ħ. k. Florida.

Manglilla R. et S. (= *Bumelia Manglilla* W. = *Chrysophyllum Manglillo* Lam. = *Caballeria oblonga* R. et P. = *Duhamelia Manglilla* Dombey, = *Manglilla Jussieui* P. = *M. peruviana* Gmel. = *M. oblonga* Spr. = *Scleroxylon Manglilla* W. = *Sideroxylon Manglilla* Lam.), Manglilla-M., ħ. w. t. Peru.

melanophleos RBr. (= *venulosa* Spgl. = *Chrysophyllum melanophleum* Lam. = *Heeria melanophleos* Meisn. = *Manglilla melanophleos* P. = *Roemeria melanophlea* Thbg. = *Scleroxylon melanophleum* W. = *S. venulosum* W. = *Sideroxylum laurifolium* Lam. = *S. melanophleum* Lam.), *β*) Jacquiniana A. DC. (= *Sideroxylon melanophleum* Jacq. H. Vindob.).

Rapanea R. et S. (= *Caballeria coriacea* Mey. = *Rapanea guianensis* Aubl. = *Samara floribunda* W. = *S. pentandra* Sw.), Rapanea-M., ħ. w. Südamerika.
canariensis Spgl., v. Pleiomeris canariensis, *excelsa* Lk. (= *Heberdenia* R. et S.), v. Heberdenia excelsa, p. 285, II., *insularis* Dietr., v. Badula insularis, p. 57, *mitis* Spgl., v. Sideroxylon mite.

Myrtus T., Myrte.

communis L., *ε*) lusitanica Mill. (= *acuta* Mill.). — minima Mill. (= *microphylla* Hort. = *mucronata* P., non Cambess. = *sponsalis* Hort.), angustifolia Hort., latifolia Hort., macrophylla Hort., media Hffg. Var.

elegans DC. (= *Psidium elegans* Mart.), zierliche, ħ. w. Brasilien.

pimentoides Lindl., Pimentaähnliche, ħ. w. Westindien.
acris Sw. (= *aromatica* Poir. = *caryophyllata* Jacq.), *Berteriana* Spgl., *brasiliana* L. etc., v. Eugenia acris, Berteriana, Michelii etc., p. 320 et

Digitized by Google

Myrtus

p. 236, II., *biflora* L., *dumosa* Vahl, *Greggii* Sw., *obscura* Lindl., *riparia* Mart., *trinervia* Sm., *virgultosa* Sw., v. Eugenia biflora, dumosa, Greggii, obscura, riparia, trinervia et virgultosa Nachlese, — *acuminatissima* Blume, *australis* Spgl., *cerasiformis* Blume, *Jambos* H. B. K. etc., v. Jambosa acuminatissima, australis, cerasiformis, vulgaris etc., p. 328, II. et p. 428, *coriacea* Vahl, *divaricata* Hamilt. (= *laurifolia* H. Par.) etc., v. Myrcia coriacea, divaricata etc., p. 425, II., *caryophyllata* L., *corticata* Spgl. (= *Cumini* L.), *obovata* Spgl., v. Syzigium caryophyllatum, Jambolanum et obovatum, *Caryophyllus* Spgl., v. Caryophyllus aromaticus, p. 168, *Leucadendron* L., *saligna* Burm., Gmel., v. Melaleuca Leucadendron et Cajuputi, p. 503 u. 504, *orbiculata* Spgl., v. Jossinia orbiculata, p. 431, *Smithii* Spgl., v. Acmena floribunda, p. 13, *Zuzygium* L., v. Calyptranthes Syzygium, p. 150.

Myscolus Cass., megacephalus Cass., microcephalus Cass., v. Scolymus, Sect. II., grandiflorus et hispanicus, p. 734.

Nabalus Cass., Natterlattich, XIX., 1., Compositae-Cichoriaceae.

alatus Hook. (= *Mulgedium hastatum* DC. = *Sonchus hastatus* Less.), geflügelter, ⊙. f. Nordwestl. Amerika.

altissimus Hook. (= *Chondrilla altissima* Lam. = *Harpalyce altissima* Don, = *Prenanthes altissima* L., p. 654, = *P. parviflora* Riddel).

cordatus Hook. (= *Harpalyce cordata* Don, = *Prenanthes cordata* W., p. 654).

crepidineus DC. (= *Harpalyce crepidinea* Don, = *Hieracium crepidineum* Fröl. mpt. = *Prenanthes crepidinea* Mchx. = *P. gigantea* Rafin.), pippauähnlicher, 4. f. Nordamerika.

deltoides DC. (= *Prenanthes deltoidea* Ell., non MB.), deltaförmiger, 4. f. Nordamerika.

Fraseri DC. (= *trilobatus* Cass. = *Prenanthes rubicunda* Pursh excl. Synon.), Fraser's, 4. f. Carolina.

integrifolius Cass. (= *Prenanthes alba* H. Par.), ganzblätteriger, 4. f. Nordamerika.

racemosa Hook. (= *Harpalyce racemosa* Don, = *Prenanthes racemosa* Mch., p. 654).

serpentarius Hook. (= *Harpalyce Serpentaria* Don, = *Prenanthes Serpentaria* Pursh, p. 655).

suavis DC. (= *albus* Hook. = *Chondrilla alba* Lam. = *Harpalyce alba* Don, = *Prenanthes alba* L., p. 654, = *P. suavis* Salisb.).

trifoliatus Cass. (= *Fraseri* DC. = *Harpalyce rubicunda* Don, = *Prenanthes alba* Ell., non L. = *P. rubicunda* W., p. 655), dreiblätteriger, 4. f. Nordam. [1]).

virgatus DC. (= *Harpalyce virgata* Don, Beck. = *Prenanthes simplex* Pursh, = *P. virgata* Pursh, p. 655, = *P. autumnalis* Walt. = *Sonchus virgatus* Dsf.).

Nabea Lehm., (J. Macnab, engl. Botaniker), VIII. 1., Ericaceae.

montana Lehm. (= *Macnabia montana* Benth.), bergliebende, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

1) Nach Walpers zu N. suavis gehörig.

Digitized by Google

Nacibaea coccinea Aubl., *glabra* G. fil., v. Manettia coccinea et Gärtneri, p. 695 et p. 384, II.
Nageja Putranjiva Roxb., Hamilt., v. Putranjiva Roxburghii.
Nahusia coccinea Schneev., v. Fuchsia coccinea.

Najas L., major Roth, All. (= *fluviatilis* Lam. = *muricata* Thuill. = *tetrasperma* W.).

Nama L., Namawinde, V. 1., Convolvulaceae-Hydroleaceae.
jamaicensis L. (= *Hydrolea decurrens* Moç. Sess. = *H. jamaicensis* Räusch.), jamaikanische, ☉. w. m. Jamaica.
sericea W., v. Evolvulus incanus, p. 241, II.

Napoleona P. B., (Napoleon Buonaparte, ehem. Kaiser der Franzosen etc.), XVI. 11., Belvisieae.
Heudelotii H. Par. [1]), (= *imperialis* ? *purpurea* DC.), Heudelott's, ♄. w. Guinea.
imperialis P. B. (= *Belvisia coerulea* Desv.), kaiserliche, ♄. w. Guinea.
Whitfieldii Hook., Whitfield's, ♄. w. Guinea.
Napus Medic., *oleifera* Spenn., *oleracea* Spenn., *Rapa* Spenn., v. Brassica Napus, oleracea, Rapa, p. 130.

Narcissus T., L., Narcisse.
I. Aiax Salisb. Herb.
major Curt. (= *A. luteus var. major* Herb. = *grandiflorus* Salisb.), a) propinquus Salisb. (= ? *glaucus* Hornem. = *lacinularis* Salisb.), b) obvallaris Salisb., Haw. (= *Sibthorpii* Haw.), c) lobularis Haw. var., d) cambricus Haw., e) rugilobus Haw.
minor L. (= *exiguus* Salisb. var. princeps Herb.), a) humilior Herb. (= *minimus* Haw.), b) cuneiflorus Salisb., Haw. (= *pumilus* Salisb.), c) erectior Herb. (= *A. minor* Haw.), d) nanus Herb. (= *A. nanus* Haw.), e) pumilus Herb.
moschatus L. (= *albus* Rudb. = *abscissus* Haw. = *candidissimus* Red. = *montanus* Ker, = *poculiformis* Salisb.), a) tortuosus Haw., Herb., b) cernuus Roth, Herb., Haw., c) albidus * (= *albicans* Herb. Haw.).
Pseudonarcissus L. (= *ryticarpos* Herb. = *hispanicus* Gouan), a) festalis Salisb., b) Pseudo-nobilis Haw., c) Telamonius Haw., d) Tratus Cantus Batav., e) Van Sion Batav., f?) Spofforthiae H. Angl. etc.
II. Assaracus Haw.
capax Salisb. (= *calathinus* Loisel., Redout. = *Queltia capax* Salisb.).
III. Chloraster Haw.
viridiflorus Schousb. (= *Hermione viridiflora* Herb.).
IV. Corbularia Haw.
Bulbocodium L., β) tardiflorus * (= *serotinus* Haw. = *turgidus* Salisb.).
V. Diomedes Haw.
Macleayi Lindl. (= *D. minor* Haw. = *Queltia Macleana* Herb.).
Sabini Lindl. (= D. *major* Haw. = *Ajax Sabinianus* Herb.).
Crichtoni H. Angl., Hybride.
VI. Ganymedes Haw.
concolor Haw., Herb. (= *homochroos* Schult.).

---

1) Heudelot Director d. k. Culturen am Senegal, reiste daselbst †.

Digitized by Google

Narcissus

nutans Haw. (= *effusus* Salisb.).

pulchellus Salisb. (= *triandrus* var. *luteus* Bot. mag.). *β*) striatulus Haw.

VII. Helena.

gracilis Salisb., Haw., Sabine, (= *laetus* Redouté).

tenuior Curt. (= ? *tenuis* Ag. = *uniflorus* Hort. = *Hermione tegulaeflora* Salisb. = *H. tenuior* Haw.). *β*) angustifolius W.

VIII. Hermione Haw.

bifrons Ker, Sims, (= *radiata* Red. var. Ker, = *stellaris* Salisb.).

breviflorus Haw. (= *Ajax breviflorus* Haw.). Spanien.

citrinus Haw., G. Don, (= *orientalis* var. Gmel. = *Tazetta bicolor* Redout. = *Grand Primo Citroniere* Batav.), citronfarbige, 4. Zw. f. b. ?

dubius Gouan, (= *pallidus* Lam.).

italicus Ker, (= *papyraceus β* Bot. mag. = *Tazetta* L. var. Sm. = *H. stylosa* Haw.).

niveus Loisel. (= *papyraceus α* Bot. mag. = *stellatus* Rchb. = ? *unicolor* Tenore), schneeweifse, 4. Zw. f. Südfrankreich, Spanien, Süditalien.

papyraceus Ker, (= *anceps* DC. = *Tazetta alba* Redout. = *unicolor* Vent., ? Tenor.), *β*) Cypri Sweet, Haw., *γ*) jasmineus Salisb., Haw.

patulus Lois. (= *orientalis* Bot. mag. = ? *radiatus* Red.), abstehende, 4. Zw. f. b. Südfrankreich, Italien.

polyanthos Lois. (= *orientalis* Dryand. Ait. = *Tuzetta Asso* = *tereticaulis* Haw.), vielblumige, 4. Zw. f. b. Südfrankreich, Spanien.

primulinus Haw. (= *bifrons β* Bot. mag. = *calathinus γ* Bot. mag.).

subalbidus Lois. (= *stellatus β subdiscolor* DC.), gelblichweise, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

Tazetta L. Als Varietäten zieht man hierher a) aperticoronus Haw., b) bicolor Red. (= *orientalis* Ker, = *Ta. sexlobata* Herb.), c) multiflorus Haw., d) grandiflorus Haw. (= *orientalis* Ker, = *crenularis* Salisb. = *Trevianus* Swt.), e) tereticaulis Haw. (= *leucojifolia* Salisb., H. = *brevistyla* var. Herb.), f) crenulatus Herb. etc.

? *β*) cupularis Bertol. (= *flavus* Lagasca, = ? *italicus* Tenore), *γ*) aureus Haw. (= *orientalis δ* Bot. mag.).

unicolor Tenore, einfarbige, 4. Zw. f. b. Gegend von Neapel (Vesuv u. Insel Caprea).

IX. Illus Haw.

triandrus L. (= *calathinus* Redout.).

X. Jonquilla Haw.

Jonquilla L. (= *Hermione Jonquilla* Haw. = *juncifolius* Salisb., non Loisel.).

juncifolius Loisel. (= ? *Assonianus* Dufour, = *Jonquilla β* Lapeyr.? = *J. uniflorus* Asso ?) simsenblätterige, 4. Zw. f. b. Südfrankreich, Spanien, Orient.

XI. Narcissus Haw.

biflorus Curt. (= *cothurnalis* Salisb. = *medio-luteus* Mill. = *orientalis* C. Tenore.)

majalis Curt. (= *longipetalus* Schlchr. = *poeticus* Sm. E. B.).

Digitized by Google

Narcissus

XIII. Philogyne Haw.

odorus L. (= *calathinus* Curt. = *conspicuus* Salisb. = *elatior* Haw. = *Infundibulum* Poir. = *lobatus* Poir.), b) flore pleno (Queen Anne's Jonquil).

XIV. Queltia.

incomparabilis Curt. (= *amplus* Salisb. = *Gouani* Roth, = *Nonpareille* Hort. = *Q. foetida* Herb.), a) aurantius G. Don, b) semipartitus Haw., c) concolor Salisb. (= *Haworthii* G. Don), d) albus Haw. (= *griseus* Auct. = *N. Queltia* G. Don), e) subconcolor H. angl. [1]).

Nardosmia Cass., fragrans Rchb. etc., v. Petasites, Sect. II., p. 609.

Nardurus Rchb., v. Vulpia, Sect. II., p. 853.

Naron iridioideum Mch., v. Dietes iridioides.

Narthecium Möhr.,

americanum Ker, (= *glutinosum* Ker, non Mchx.).

boreale Wahlbg., *calyculatum* Lam. (= *flavescens* Wahlb. = *iridifolium* Vill.), *glutinosum* Mchx., *pubens* Mchx., v. Tofieldia alpina, calyculata etc., p. 812.

Nasturtioides Medic., *inconspicuum* Mch., v. Lepidium ruderale, p. 454.

Nasturtiolum castratum Medic. (= *pinnatum* Mch.), v. Senebiera pinnatifida, p. 742.

Nasturtium C. Bauh., RBr., Wasserkresse.

armoracioides Tausch, (= ? *austriacum* β *lyratum* Wallr.), Meerrettigähnliche, 4. f. Sachsen, Böhmen.

atrovirens DC. (= *Sisymbrium atrov.* Hornem., p. 761).

bonariense DC. (= *Sisymbrium bonariense* Poir.), bonarische, ☉. f. Bonaria.

brachycarpum C. A. Mey., kurzschotige, ♂. f. Alt. Sibirien.

densiflorum Turcz., dichtblumige, ♂. f. Sibirien.

indicum DC. (= *apetalum* DC. = *Clandestinaria indica* Spach, = *Sisymbrium apetalum* Dsf. = *S. dubium* P. = *S. indicum* L.).

lippicense DC. (= *Wulfenianum* Host.).

micropetalum Fisch. et Mey. (= *tanacetifolium* Hook. et Arn. = *palustre* δ *tanacetifolium* DC.).

officinale RBr., γ) siifolium Rchb.

sylvestre RBr., β) rivulare Rchb.

Hybriden:

austriaco-sylvestre (Rchb.), (= *astylon* Rchb.), brachystylum Wallr., dentaculatum Wallr.

Bursa pastoris Roth, v. Capsella bursa pastoris, p. 158, *Draba* Crantz, *Iberis* G. M. S., *sativum* Mch., v. Lepidium Draba, Iberis, sativum, p. 454, *Halleri* Andrz., *ovirense* Andrz., *procurrens* Andrz., v. Arabis Halleri et var., A. procurrens, p. 70, *paniculatum* Crantz, v. Neslia paniculata, p. 546, *Thalianum* Andrzy., v. Sisymbrium Thalianum, p. 762.

Natrix crispa Mch., *fruticosa* Mch., *pinguis* Mch., *rotundifolia* Mch., v. Ononis crispa, fruticosa, Natrix, rotundifolia, p. 559 et 560.

---

1) Vergl. über diese in zu viele Abtheilungen und angebliche Arten zerspaltene Gattung und die damit verwandten: Ferdinand Neumann, „die Familie der Amaryllideen u. s. w. Weissensee, 1844."

Digitized by Google

Nauclea L., cordifolia Roxb. (= *sterculiaefolia* Rich.).

Naumburgia Mch.. (J. S. Naumburg, ehem. Prof. d. Botanik zu Erfurt †), V. 1., Primulaceae-Lysimachieae.

thyrsiflora Rchb. (= *guttata* Mch. = *Lysimachia thyrsiflora* L. = *Thyrsanthus palustris* Schrank), straufsblumige, 4. Wa. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

β) capitata Rafin. (= *Lysim. capitata* Pursh), Vergl. p. 486.

Nauplius aquaticus Cass., *maritimus* Cass., *sericeus* Cass., = Asteriscus aquaticus, maritimus, sericeus, v. Buphthalmum, Sect. I., p. 138.

Navarretia R. et P., Navarretie, V. 1., Polemoniaceae.

heterophylla Benth. (= *Collomia heterophylla* Hook., p. 211, = *Courtoisia bipinnatifida* et *daucifolia* Rchb.).

involucrata R. et P. (= *pusilla* Hort. = *Collomia Navarretia* G. Don, = *C. prolifera* Hort. = *Gilia eryngioides* Lehm. = *G. mucronata* Lehm. = *Asgochloa eryngioides* Benth.), eingehüllte, ⊙. f. Chili.

Nebelia Neck., *affinis* Sweet, *paleaca* Sweet, *phylicoides* Sweet, v. Berardia affinis, paleacea et phylicoides, p. 65, II.

Neckeria campestris Gmel., v. Pollichia campestris, p. 640.

Nectandra Rottb., N. E., Saftlorbeer, IX. 1., Laurineae.

floribunda N. E. (= *Laurus floribunda* Sw., p. 449).

sanguinea Rottb. (= ? *Borbonia globosa* G. = *Laurus Borbonia* Lam. *β* = *Laurus globosa* Aubl. = *L. martinicensis* Jacq. = *Ocotea globosa* Schltdl. = *Persea globosa* Spgl. = *P. sanguinea* Spgl.), blutfarbiger, ♄. w. Südamerika.

Nectarobothrium Lindl., *striatum* Ledeb., v. Lloydia serotina, p. 470 et p. 366, II.

Nectouxia H. B. K., (Nectoux, begleitete Napoleon Buonaparte als Botaniker nach Aegypten), V. 1., Solanaceae.

formosa H. B. K., non DC. (= *Atropa arenaria* W. herb.), schöne, ⊙. m. f. Mexico.

Neea R. et S. (= *Neaea* Auct.), (Louis Neé, franz. Botaniker, u. Reisender †), VIII. 1., Nyctagineae.

glabra Schott msc., Endl., kahle, ♄. w. Brasilien.

hirsuta Schott msc., Endl., rauhhaarige, ♄. w. Brasilien.

lancifolia Schott msc., Endl., lanzettblätterige, ♄. w. Brasilien.

Mitscherlichia Steud. (= *Mitscherlichia spectabilis* Kunth), Mitscherlich's, ♄. w. Südamerika.

Neesia Lupinaster Spgl., v. Trifolium Lupinaster, p. 819.

Negretia mitis R. et P., *sericea* W. herb., v. Mucuna mitis et urens, p. 533.

Negundo fraxinifolium Nutt., d) angustifolium.

Neja D. Don, DC., Neja.

ciliaris DC., gewimperte, 4. ♄. k. t. Rio grande.

falcata N. E. (= *Diplopappus pinifolius glaber* Hort. Berol.), sichelförmige, 4. ♄. k. t. Brasilien.

filiformis N. E. (= *Erigeron filiformis* Spgl. = *Diplopappus pinifolius* Less.), fadenförmige, 4. ♄. k. t. Südamerika.

gracilis D. Don, (= *Diplopappus graminifolius* Less.).

linearifolia DC, gleichbreitblätterige, ♄. k. t. Rio Grande.

Digitized by Google

Nelitris G., Myrtenbeere.

paniculata Lindl. (= *polygama* Spgl. = *Eugenia polygama* Roxb.), rispige, ♄. w. Molucken.

Nelsonia tomentosa Dietr., v. Rhaphidosperma vestita.

Nelumbium Juss., Nixblume(rose).

pentapetalum W. (= *Cyamus pentapetalus* Pursh, = *Nymphaea pentapetala* Walt.), fünfkronenblätterige, 4. Wa. w. Carolina.

Nemaconia graminifolia Knowl. et Westc., v. Ponera juncifolia, p. 647.

Nematanthus Schrad., Fadenblume, XIV. 11., Gesneriaceae.

chloronema Mart. (= ?*Columnea chloronema* Hort.), grünliche, ♄. w. Brasilien.

jonema Mart. (= *corticola* Schrad. = *longipes* DC. var. ?), veilchenblaue, ♄. Sch. w. Brasilien.

longipes DC., langstielige, ♄. Sch. w. Brasilien.

N. Guilleminianus H. belg., v. Columnea splendens, p. 154.

Nemauchenes Cass., Nackenpippau, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

aspera Endl. (= *aculeata* Cassin. = *Barckhausia aspera* Lk., Rchb., p. 115, = *B. muricata* Spgl. = *Crepis aspera* L. = *Endoptera aspera* DC. = *Seriola urens* Lam., non L.), rauher, ⊙. f. Italien, Griechenland, Orient.

β) ambigua Cass. (= *inermis* Cass.).

Nemesia Vent., Nemesie.

diffusa Benth., weitschweifige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

floribunda Lehm. (= *affinis* Benth.).

foetens Vent., stinkende, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

linearis Vent., gleichbreite, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Nemia Cheiranthus Berg., *rubra* Berg., v. Manulea Cheiranthus et rubra, p. 495, 496 et 385, II.

Nemopanthes Rafin., Hainstrauch.

Andersonii H. Cels., Anderson's, ♄. k. ?

Nemophila Barton, Hainblümchen(freund).

discoidalis Makoy, scheibenförmiges, ?♂. k. f. Californien.

insignis Dougl., Benth., β) Menziesii Hook. et Arn.

liniflora Fisch. et Mey., leinblumiges, ⊙. f. Californien.

phacelioides Barton, (= *nemorosa* Auct. = *Nuttallii* Colla).

Neottia L., Rich., Nestorche.

bracteosa Lindl. (= ? *Spiranthes bracteosa* Lindl., p. 779), deckblätterige, 4. w. Brasilien.

micrantha Swt., kleinblumige, 4. w. Westindien.

Neottidium Nidus avis RBr., v. Neottia Nidus avis.

Nepeta R., L., Benth., Katzenmünze.

Apulei Ucria, (= *rosea* Salzm. = *tuberosa* Dsf.), apulische, 4. Kn. f. b. k. Nordafrika, Spanien, Sicilien.

azurea RBr., azurblaue, ⊙. ? 4. m. f. w. Abyssinien.

betonicaefolia C. A. Mey., betonienblätterige, 4. f. Caucasus.

brevifolia C. A. Mey. (= *longiflora* Fisch.), kurzblätterige, 4. f. Caucasus.

calycina Fenzl, grofskelchige, 4. f. b. k. Mesapotamien.

cyanea Stev. (= *acinifolia* Spgl. = *incana* MB., non Ait. = *mollissima* Tausch.), himmelblaue, 4. f. Ost-Caucasus.

fissa C. A. Mey. (= *laxa* Benth. = *teucriifolia* W. herb.).

Digitized by Google

Nepeta

granatensis Boiss. (= ? *multibracteata* Lk. et Hffg.), granadaische, 4. f. Südl. Spanien.

grandiflora MB. (= *argentea* Hortul. = *colorata* W. Enum. = *grandis* Hortul. = *incana* Hortul. = *lamiifolia* Hffm. = *melissaefolia* P. = *teucriodes* Hortul. = *violacea* Hortul.).

heliotropifolia Lam., sonnenwendenblätterige, 4. f. b. Syrien.

italica L. (= *Calamintha* Tausch, = ? *canescens* Räusch. = *imbricata* Lag. = *macrostachya* Jan, = *marrubioides* W. Enum. = *orientalis* Mill. = *teucrioides* Lam., W.). Italien, Spanien, Caucasus.

latifolia DC. (= *coerulea* Ait. = *grandiflora* Lapyr.).

lavandulacea L. fil. suppl. (= *lobata* Rudolph. = *multifida* L. spec. = *Lophanthus multifidus* Benth. = *Saussurea pinnatifida* Mch.).

macrantha Fisch. (= *Dracocephalum sibiricum* L. = *Moldavica elata* Mch.), gröfstblumige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Meyeri Benth. (= *micrantha* C. A. Mey., non Bunge), Meyer's, 4. f. Caucasus.

Mussini Henkel, (= *argentea* Hortul. = *cyanotricha* Tausch, = *diffusa* Hortul. = *incana* Hortul. = *lamiifolia* Hortul. = *longiflora* Sims, non Vent. = *lancifolia* Hortul. = *salviaefolia* P. = *teucrioides* Hortul. = *violacea* et *Willdenowiana* Hortul.), Mussin's, 4. f. Iberien, Caucasus.

Nepetella L., *α*) major Benth. (= *amethystina* Dsf. = *paniculata* Mill.), *β*) humilis Benth. (= *angustifolia* Vahl, = *arragonensis* Lam. = *graveolens* Vill. = *humilior* H. Par. = *lanceolata* Lam.), *γ*) incana Ait.

nuda L., *α*) grandiflora Benth. (= *pannonica* Jacq. = *paniculata* Crantz, = *violacea* Vill.), *β*) parviflora Benth. (= *alba* Dsf. = *nuda* Jacq. = *panonnica* L. = *ucranica* MB.).

pusilla Benth. (= *Zizyphora pungens* Bunge), niedrigste, 4. f. Altai.

Reichenbachiana C. A. Mey. (= *racemosa* Rchb., non Lam.), Reichenbach's, 4. f. Ararat.

Scordotis L., *β*) viridis Benth. (= *hirsuta* L. = *procumbens* Mill. = *tomentosa* Sieb.).

septemcrenata Ehbg., siebenkerbige, 4. k. f. b. Aegypten, Arabien.

tuberosa L. (= *foliosa* Moris, = *lanata* Jacq. = *scabra* Tausch, = *violacea* Brotero), *β*) reticulata Dsf.

ucranica L., non MB. (= *sibirica* MB.).

aristata Rich. (= *pectinata* L.), v. Hyptis pectinata, p. 313, II., *croatica* Spgl., v. Satureja rupestris, *disticha* Blume, v. Anisomeles ovata, p. 61, *Glechoma* Benth., v. Glechoma hederacea, *marifolia* Cav. (= *serpyllifolia* MB. = *cretica* Dietr. = *parvifolia* Hortul.), v. Micromeria marifolia, *virginica* W., v. Pycnanthemum lanceolatum *β*.

Nephelium L. (= *Euphoria* Juss.), Nephelium, VIII. 1., Sapindaceae.

lappaceum L. (= *Euphoria Nephelium* DC. = *E. crinita* Steud. = *Dimocarpus crinitus* Lour. = *Scytalia crinita* Räusch.), klettenähnliches, ♄. w. China, Java.

Litschi Cambess., G. Don, (= *Euphoria Litschi* Dsf.

Digitized by Google

Nephelium
= *E. punicea* Lam. = *Dimocarpus Litschi* Lour. = *Laetji* Osbeck, = *Litschi chinensis* Sonner. = *Sapindus edulis* Ait. = *Scytalia chinensis* G. = *S. Litschi* Räusch.).
Longanum Camb. (= *benghalense* G. Don, = *Euphoria Longana* Lam. = *Dimocarpus Longana* Lour. = *D. longus* Dietr. = *D. undulatus* Wight, = *Sapindus benghalensis* Roxb. = *Scytalia Longan* Räusch.), wellenförmiges, ħ. w. China, Cochinchina, Bengalen. *β*) benghalense G. Don.
pupillum Wight, (= *Euphoria pupilla* Steud. = *Dimocarpus pupillus* Moon Catal.), kleines, ħ. w. Ostindien.
verticillatum G. Don, (= *Euphoria verticillata* RBr.), wirtelförmiges, ħ. w. Ostindien. (Kaum eingeführt).
Nephrandra dubia Sw., v. Vitex umbrosa, p. 852.

Nephranthera Blume, Nierenstaubbeutel, XX. 1., Orchideae.
matutina Blume, frühzeitiger, 4. w. Java.

Nephrodium L. C. Rich., Endl., v. Aspidium, Sect. III., p. 49, II. et p. 91.

Nephrolepis Schott, Kunze, (= *Nephrodium* Lk., non L., C. Rich., Endl.), Aspidium Sect. IV., p. 49, II.
neglecta Kunze, (= *Aspidium exaltatum* Hort., non Sw.).
pectinata Kunze, = Nephrodium Schkuhrii Lk. = Aspidium pectinatum W.
trepezoides (Sw.).
tuberosa Presl, = Nephrodium tuberosum Lk. = Aspidium tuberosum Bory.
Neptunia oleracea Lour. (= *stolonifera* Guillem. et Perott.), *plena* Benth., v. Desmanthus natans et plenus.

Neriandra A. DC., Grannenbeutel, V. 1., Apocyneae.
suberecta A. DC. (= *Echites suberecta* Andr., Sims, non Jacq.), fastaufrechter, ħ. w. St. Vincent.
(Wird von A. DeCandolle als eine species dubia zu dieser Gattung, die aus 2 Arten hancorniaefolia A. DC. in Bahia und angustifolia A. DC. in Chili heimisch, gebildet worden, gestellt).

Nerine Herb. (Töchter des Nereus).
lucida Herb. (= *laticoma* Ker, = *Amaryllis laticoma* Ker, = *Brunswigia laticoma* et *lucida* Herb., p. 135).

Nerium L., RBr. (= *Nerion* T.), Oleander, Lorberrose.
odorum Soland. in Ait. Kew. (= *grandiflorum* Dsf. = *indicum* Mill. = *odoratum* Lam.), *β*) flore pleno (= *latifolium* Mill.), a) fl. carneo, b) fl. albo, *γ*) luteum Targ., Tozz. (= *flavescens* Spin.).
Oleander L., *β*) flore pleno Soland. (= *splendens* Hort.), *γ*) Loddigesii A. DC. (= *fl. variegatis* Lodd.). — N. cupreum Hort., Duchesse d'Angoulême Hort., du Saulget Hort., Grangeanum Hort., Hacvillei Hort., Henry de France Hort., Jeanne d'Arc Hort., luteum novum Hort., purpureum fl. pleno Hort., Ragonoti Hort., Tanglé Paxton, variegatum Hort. etc. var.
mascatense A. DC. (in der Gegend von Mascate heimisch, scheint noch nicht eingeführt).
vaudatum Lam. (= *scandens* Lour.), v. Strophanthus dichotomus, p. 790, *coronarium* Ait. (= *divaricatum* L., non Lour.), v. Tabernaemontana

Digitized by Google

Nerium
coronaria, p. 796, *reticulatum* Roxb., v. Cryptolepis reticulata, *sibiricum* Medic., v. Apocynum hypericifolium, *tinctorium* Roxb., non Hort., *antidysentericum* L., *zeylanicum* L., v. Wrigthia tinctoria etc., p. 858.
Nesaea speciosa H. B. K., v. Diplusodon speciosus, p. 296, II.

Neslia Desv., Neslie.
apiculata C. A. Mey. (= *paniculata* Schimp., non Desv.), kurzspitzige, ⊙. f. Sinai.
Neuberia Ecklon, *humilis* Eckl., *pyramidalis* Eckl., *rosea* Eckl., v. Watsonia humilis, iridifolia et rosea, p. 855 et 856.
Neudorffia peruviana Adans., v. Nolana prostrata, p. 549.

Neumannia Brogn., (Neumann, Obergärtner am Jardin des plantes zu Paris; Ferdinand Neumann k. preuss. Bataillonsarzt zu Erfurt, thätiger u. talentvoller Bearbeiter der Gartenbotanik und Blumistik), VI. r., Bromeliaceae.
imbricata Brogn., ziegeldachförmige, 4. w. Mexico.
Neumeyera austriaca Rchb, *Villarsii* Rchb., v. Alsine austriaca et Villarsii, p. 38 et 39.

Neurada L. (= *Neuras* Adans.), Neurada, X. v., Aizoideae.
procumbens L. (= *Figaraea aegyptiaca* Vivian.), niederliegende, ⊙. f. Nordafrika.

Neurocarpum Desv., Nervenhülse.
falcatum DC. (= *Oliteria falcata* Lam.), sichelförmige, ♄. Sch. w. St. Domingo, Portorico.
ellipticum Desv., *mexicanum* Steud., Zuccar., v. Martia brasiliensis et mexicana, p. 387 et 388, II.

Neurogramma Presl, Lk., pedata Lk., rufa Lk., tomentosa Lk., v. Gymnogramme, Sect, V., p. 278.

Neuroloma Andrz., Nervensäumler.
nudicaule DC. (= *Arabis nudicaulis* DC. = *Cardamine nudicaulis* L.), nacktstengeliger, 4. f. Sibirien.
scapigerum DC. (= *arabidiflorum* DC. var. = *Cheiranthus scapiger* Adans. = *Hesperis scapigera* DC.), schafttragender, 4. f. Sibirien.
speciosum Steud. (= *Hesperis speciosa* Sweet, = *Parrya integerrima* G. Don), prächtiger, 4. f. Sibirien.
Neuroplatyceros Pluckn., v. Platycerium alcicorne.
Neurosperma cuspidata Raf., v. Momordica Balsamina, p. 528.

Nicandra physaloides G. (= *minor* Hort.)

Nicolsonia DC., Nicolsonie.
cayennensis DC. (= *Hedysarum barbatum* L. var. Spgl. = *H. lagocephalum* Lk. = *H. procumbens* Arrabida), cayennische, 4. ♄. w. Cayenne.

Nicotiana T., Tabak.
alata Lk. (= *brasiliensis* H. Berol.).
anisoloba Sweet, ungleichlappiger, ☉. m. f. Chili.
auriculata Agardh, (= *maxima* Hffg.), geöhrter, ⊙. 4. ♄. m. f. w. ?
Berteriana Hort. Par., Sweet, Bertero's, ⊙. m. f. Chili.
chinensis Fisch. (= *fruticosa* Lour. = *lancifolia* Ag. = *turcica* Haberl).

Digitized by Google

Nicotiana

commutata Fisch. et Mey., verwechselter, ⊙. ♂. m. f. w. ?

dilatata Lk. (= *Tabacum* L. var. Spgl.). Südamerika.

fastigiata N. E. (= *rotundifolia* Lindl.), gipfelständiger, ⊙. ♄. m. f. k. Neuholland, Schwanenfl.

fruticosa L. (= *frutescens* Lagasca, = *Lehmanni* et *petiolata* Agardh), β) angustifolia Ehrh., γ) crispula Hort., δ) albiflora Schltdl. Mexico.

glutinosa L. (= *militaris* L. = *Sailanthus glutinosus* G. Don, = *Tabacus viscidus* Mch.).

loxensis H. B. K. (= *Tabacum* L. var. Kunth), loxaischer, ⊙. m. f. Südamerika.

macrophylla Spgl. (= *gigantea* Ledeb. = *latissima* Mill. = *Tabacum macrophyllum* Schk.), (Tabaco de Havana), grofsblätteriger, ⊙. m. f. Südamerika.

β) sanguinea H. Petropol.

marylandica Schübler, maryländischer, ⊙. f. Maryland.

mexicana Schltdl., mexicanischer, ♂. ♄. k. Mexico.

micrantha Haw., Sweet, H. Par.

paniculata L. (= *viridiflora* Lagasca.).

rustica L., β) asiatica Schult. (= *scabra* Lagasca, = *sibirica* Hort. Panorm.), γ) brasiliensis Schrk., δ) hungarica Hort. Petropol., ε) pumila Schrk. (= *humilis* Hort.), η) tatarica Schult.

Sellowii Lk., Otto, Sellow's, ⊙. m. f. Montevideo.

sordida Lehm., schmuzigfarbiger, ⊙. m. f. Mexico.

Tabacum L., b) arborescens H. Petropol., c) attenuata Schrk. (= *angustifolia* Mill., non R. et P.), g) Verdon Schrk., R. et S., i) havanensis Lagasca, k) Paraguay H. Petropol., l) virginica H. Petropol. Die übrigen Var. s. p. 548.

Unbestimmtere: fragrans Bernh. ⊙., grandiflora H. Crac., pseudodecurrens Steud. (= *decurrens* Tausch). ⊙.

minima Molin., v. Nierembergia repens.

Nidorella Cass., Nidorella, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

foetida DC. (= *foliosa* Cass. = *Chrysocoma foetida* Lam. = *Conyza foetida* W. = *Erigeron foetidum* L. = *Jasonia foetida* Cass. = *Inula foetida* L. = *Solidago retusa* Burm.), stinkende, 4. f. k. Südafrika.

Niebuhria DC., (Niebuhr, bereiste mit Forskol Aegypten u. Arabien †), XII. I., Capparideae.

oblongifolia DC. (= *Capparis heteroclita* Roxb. = *C. heterogenea* Roxb. = *C. oblongifolia* Forsk. = *Crataeva oblongifolia* Spgl. = *Streblocarpus oblongifolius* Arn.), langblätterige, ♄. w. Arabien, Ostindien.

triphylla Wendl. (= *avicularis* DC. = *caffra* DC. = *Carparis triphylla* Thbg. = *Crataeva avicularis* Burch. = *Cr. caffra* Burchel), dreiblätterige, ♄. t. w. Cap der guten Hoffn.

Nierembergia R. et P. Nierembergie.

gracilis Hook., schlanke, ⊙. 4. ♄. f. k. t. Bonaria.

linariaefolia Grah. (= *filicaulis* Lindl.).

repens R. et P. (= *spathulata* R. et P. = *Nicotiana minima* Mol.), kriechende, ⊙. 4. ♄. f. k. t. Südamerika.

viscidula H. B. K. (= *graveolens* St. Hil. = *pubescens* Spgl.), schmierige, ♄. t. Sädamerika.

phoenicea G. Don, (= *punicea* Hort.), v. Petunia Mirabilis, p. 610.

Digitized by Google

Nigella T., Schwarzkümmel.
coarctata Gmel. (= *damascena humilis* Hort. = *sativa* β *pygmaea* P.), β) pygmaea Endl.
divaricata Beaupr. in DC. (= *arvensis* L. var. MB. = *laevis* Delile, = *latifolia* Mill.).
segetalis MB. (= *arvensis* Pall., non L. = *cretica* Mill.).

Nintoa Sweet, v. Lonicera, Sect. III., p. 370, II. et p. 467.
N. glauca Hort. = Lonicera japonica.
Niota Lam., *Commersonii* P. (= *Lamarkiana* Blume, = *tetrapetala* Lam.), v. Vitmannia elliptica, p. 853.

Niphaea Lindl., Niphaea (Häufchenblume), XIV. 11., Personatae-Gesnerieae.
oblonga Lindl. (= *alba* Hort. = *Achimenes alba* H. belg.). längliche, 4. w. Mexico.

Niphobolus Kaulf., Lingua, Spgl. (= *chinensis* Hort. = *Craspedaria chinensis* Lk.).

Nissolia Jacq., Nissolie.
Berteroana Steud. (= *aculeata* Spgl. nec Alior.), Bertero's, ♄. Sch. w. Südamerka (am Magdalenenfluſs).
aculeata DC., *arborea* L. (= *glabrata* Lk.), *microptera* Poir., *robiniaefolia* DC., v. Machaerium aculeatum etc., p. 379, II.
Nissolia Adans., *parviflora* Mch., *uniflora* Mch., v. Lathyrus inconspicuus et Nissolia, p. 447 et 148.
Nivaria Medic., *aestivalis* Mch. (= *monadelpha* Medic.), *verna* Mch., v. Leucojum aestivum et vernum, p. 459.

Nivenia RBr., Nivenie.
concava RBr. (= *spathulata* RBr. var. Spgl. = *Protea concava* Lam.), hohle, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
crithmifolia RBr. (= *Protea crithmifolia* Don, = *P. Lagopus* Andr., non Thbg.).
marginata RBr. (= *Protea marginata* Poir.), berandete, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
Nivenia Vent., *stylosa* Salisb., v. Witsenia corymbosa, p. 858.
Noccaea Cav., *helianthifolia* Cass. (= *macrophylla* Zucc. = *rigida* Cav.), *latifolia* Cerv., *mollis* Jacq., *rubra* Cass. (= ? *rigida* Cav.), *suaveolens* Cass., v. Lagascea helianthifolia, latifolia etc., p. 443.

Nolana L., Zymbelblume, V. 1., Convolvulaceae-Nolanaceae.
atriplicifolia D. Don, (= *grandiflora* Hornem., Lehm.).
coronata R. et P., gekrönte, ⊙. m. f. Peru.
inflata R. et P., aufgeblasene, ⊙. m. f. Peru.
prostrata L. (= *gallinacea* P. = *Neudorffia peruviana* Adans. = *Teganium procumbens* Schmid.).
revoluta R. et P., zurückgerollte, ⊙. m. f. Peru.
spathulata R. et P., spatelförmige, ⊙. m. f. Peru.
tenella Lindl. (= *paradoxa* Hook., non Lindl.).

Nolletia Cassin., Nolletie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
chrysocomoides Cass. (= *Aster chrysocomoides* Dsf. = ? *A. chrysocomifolius* Hort. = *Conyza chrysocomoides* Dsf. = *C. mauritanica* W. herb. = *Felicia Fontanesii* Cass.), goldschopf(haar)ähnliche, ♄. k. Nordafrika (Mauritanien).

Noltea Rchb., (Dr. Nolte, Prof. u. Director des botanischen Gartens in Kiel), V. 1., Rhamneae.
africana Endl (= *Ceanothus africanus* L. = *Hollia*

Digitized by Google

Noltea
africana * p. 880, = *Vitmannia africana* Wight et Arn. = *Willemetia africana* Brogn.), afrikanische, ♄. k. Cap d. g. Hoffn., Ostindien.

Nonnea Medic., Nonnea
alpestris G. Don, (= *Anchusa alpestris* Stev. = *Lycopsis alpestris* Lehm.), Vor-Alpen-N., ♂. 4. f. Ostcaucasus.
caspica G. Don, (= *Lycopsis caspica* Lehm. = *L. picta* Hohenack. = *Onosma caspica* W. excl. syn. Pall.), caspische, ⊙. f. Gegend d. caspisch. Meeres, Caucasus.
Colsmanniana DC. (= *Lycopsis Colsmanniana* Lehm.), Colsmann's, ♂. 4. f. ?
decurrens G. Don, (= *Lycopsis decurrens* C. A. Mey.), herablaufende, ♂. 4. f. Caucasus.
lutea Rchb., non DC. (= *Lycopsis lutea* Lam.), Taurien.
α) dubia DC. (= *Anchusa dubia* Nocca, H. Ticin. = *Asperugo divaricata* Murray), *β*) media DC. (= *lutea* Fisch. et Mey. = *Lycopsis lutea* Schult. = *Oskampia trichotoma* Mch. excl. syn.), *γ*) parviflora DC. (= *Anchusa lutea β* MB. = *Lycopsis lutea β* Lehm.).
micrantha Boiss. et Reut., kleinblumige, ⊙ f. Spanien.
nigricans DC. (= *decumbens* Mch. = *Echioides nigricans* Dsf. = *Lycopsis nigricans* Hffg. et Lk. = *L.* ? *vesicaria* L. spec.).
obtusifolia R. et S. (= *Lycopsis obtusifolia* W., p. 484).
picta Fisch. et Mey. (= *Anchusa picta* MB. = *Lycopsis picta* Lehm.). Astrachan, Oestl. Iberien.
pulla DC. (= *Anchusa tinctoria* Pall., non L. = *A. pulla* MB. = *Lycopsis pulla* L. = *L. vesicaria* Hornem. non L.), *β*) ochroleuca DC.
rosea Lk., Fisch. et Mey. (= *versicolor* Sweet, = *Anchusa latifolia* Lehm. = *A. versicolor* Stev. = *A. rosea* MB. = *Echioides grandiflora* Dsf., H. Par. = *Lycopsis rosea* Lehm.).
Viviani A. DC. (= *Anchusa ventricosa* Vivian. excl. syn.), Viviani's, ⊙. f. Nordafrika.
violacea DC. (= *Lycopsis vesicaria* L. = *Lithospermum vesicarium* Loisel.)
Zweifelhafte:
alba DC. (= *Echioides alba* Poir.), ⊙. Südfrankreich.
ciliata R. et S. (= *Lycopsis ciliata* W.), Orient.
rubra Steud. (= *Echioides rubra* Dsf.), ⊙. f. Italien.
lutea DC., v. Alkanna lutea Nachlese.
Nordmannia orientalis Hort. (= *cordifolia* et *cordata* Hort.), v. Trachystemon orientale.

Noronhia Stadtm. msc., Pet. Th. (= *Noronhea* Boj. = *Binia* Noronh.), (Ferdinand de Noronha, spanischer Naturforscher u. Reisender †), H. i., Sapotaceae-Oleineae (Oleaceae).
emarginata Poir. (= *chartacea* Stadtm. msc. = *N. Binia* Pet. Th., R. et S. = *Olea emarginata* Lam., p. 556, = *Linociera flavicans* Vahl, = *Notelaea flavicans* Dietr. = *Thouinia flavida* Willem.), ausgerandete, ♄. w. Madagascar [1]).
cernua G. Don, v. Olea cernua, p. 556.

---

1) „Arbor madagascariensis, in patria triginta pedalis, in insula Mauritii ob drupae carnem edulem sub nomine Ponay des

Digitized by Google

Noryska chinensis Spach., v. Hypericum monogynum.

Nothochlaena RBr., Wollfarrn.

Eckloniana Kunze, p. 550.

inaequalis Kunze, ungleicher, 4. w. Südafrika.

nivea Desv. (= *Acrostichum albidulum* Sw. = *Pteris nivea* Lam.).

pulchella Kunze, schöner, 4. w. t. Missouri.

pumila Lk. H. Berol., niedriger, 4. w. ?

rufa Presl, (= *Cheilanthes ferruginea* W., p. 187), braunrother, 4. w. Peru.

sericea H. Angl., seidenhaariger, 4. w. ? Südamerika.

sulcata Lk., gefurchter, 4. w. Südchina.

tenera Hook., Gill.

cordata Desv., *sinuata* Kaulf., v. Ceterach cordatum s. Gymnogramme cordata et G. sinuata, p. 277, II.

Nothoscordum Kunth, Zartlauch (unächter Lauch), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

evosmum Kunth, (= *Allium evosmum* Lk. et Otto, p. 30, = *nudicaule* Lehm.), gutriechender, 4. Zw. k. Südbrasilien.

flavescens Kunth, (= *Allium flavescens* Poepp., non Bess.), hellgelblicher, 4. Zw. k. Chili.

fragrans Kunth, (= *Allium fragrans* Vent., p. 30), β) gracile (Dryandr.), δ) nepalense (Bot. reg.). Virginien, Carolina, Mexico, Africa, Nepal.

ornithogaloides Kunth, (= *Allium ornithogaloides* Bosc), vogelmilchähnlicher, 4. Zw. f. Nordamerika.

? Poiretii Kunth, (= *Ornithogalum bonariense* P. = *O. spathaceum* Poir. = ? *Gagea bonariensis* R. et S.), p. 251, II.

striatellum Kunth, (= *Allium striatellum* Lindl., p. 31, = *Ornithogalum gramineum* Sims).

striatum Kunth, (= *Allium striatum* Jacq., p. 31, = *A. canadense* Mchx.).

Notoceras RBr., Hornschote.

cardaminaefolium DC. (= *Andrzeiowskya Cardamine* Rchb. = *Lepidium cornutum* Sibth., Sm.), Schaumkrautblätterige, ⊙. f. Kleinasien, Griechenland.

Notylia Lindl., Schwielenorche.

guianensis ? Lindl., Makoy, guianische, 4. w. Guiana.

laxiflora Hort., lockerblumige, 4. w. Südamerika.

incurva Lindl., β) angustifolia.

sagittifera Lk., Kl., Otto, pfeilförmige, 4. w. Caracas.

Nuphar Sm. (= *Nenuphar* Hayne), Seenixe (Nixen-mohn).

Advena Ait. (= *Nymphaea advena* Ait ed. 1. = *N. arifolia* Salisb.).

japonicum DC. (= *Nymphaea lutea* Thbg., non L.), japanische, 4. Wa. k. Japan.

intermedium Ledeb., mittlere, 4. Wa. f. Altaisch. Sibirien.

pumilum DC. (= *minimum* Sm. = *Nymphaea lutea* β *pumila* Timm. (β *minima* W.).

sagittaefolium Pursh, (= *longifolium* Sm.).

Nuttallia Bart., Hook., Nuttallie.

grandiflora Paxton, grofsblumige, 4. f. b. Nordamerika.

Indes culta." Endl. Catalogus horti academ. Vindobonensis I. p. 463. Desgl. Bojer Cat. h. maurit. p. 202, Hook. bot. misc. II. p. 167 (t. 88), DeCandolle prodr. s. n. r. v. Vol. VIII. p. 298.

Digitized by Google

Nuxia Commers., Lam., Nuxie, IV. 1., Personatae-Antirrhineae (Scrophulariaceae).

1. Genuina.

floribunda Benth., blüthenreiche, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

verticillata Lam. (= *Aegiphila Nuxia* W. = *Psiloxylon mauritianum* Pet. Th.), wirtelblätterige, ħ. ħ. t. Mauritius.

II. Chilianthus Burch., A. DC.

dysophylla A. DC. (Benth.), filzigblätterige, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

saligna Benth. (= *C. arboreus* A. DC. = *C. oleraceus* Burch. = *Callicarpa paniculata* Lam. = *Buddlea salicifolia* Jacq. = *B. saligna* W. Enum.), weidenähnliche, ħ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Nuytsia floribunda RBr., v. Loranthus floribundus, p. 477.

Nyctago Roy., Juss., v. Mirabilis, p. 526 et 411, II.

Nyctanthes acuminata Gmel., v. Tabernaemontana divaricata, *elongata* L., *glauca* L., *grandiflora* Lour., *hirsuta* L. (= *pubescens* Retz), *Sambac* L. (= *Goa* Hort.), *scandens* Retz, *undulata* L. (= *multiflora* Burm.), v. Jasminum elongatum, glaucum, arborescens, hirsutum, Sambac, scandens, undulatum, p. 431 et p. 329, II.

Nycterinia D. Don, Nachtlarvler.

africana Don, (= *Erinus africanus* L. = *Zaluzianskya villosa* Schm.), afrikanischer, ⊙. m. f. Cap d. g. H.

capensis Benth. (= *Erinus capensis* L. mant. = *E. aethiopicus* Thbg.), capischer, ⊙. ♂. m. f. k. Cap der guten Hoffnung.

divaricata Benth. (= *Manulea divaricata* Thbg.), ausgespreitzter, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

lychnidea Don, (= ? *Erinus lychnidea* L. = *E. gracilis* Lehm.).

maritima Benth. (= *Erinus maritimus* L. fil., Thbg.), meerstrandsliebender, ħ. k. t. Cap d. g. Hoffn.

natalensis Benth., natalischer, ⊙. ħ. m. f. k. Cap d. g. H.

selaginoides Benth. (= *Erinus selaginoides* Thbg.), grufskrautähnlicher, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

villosa Benth. (= *Erinus villosus* Thbg.), zottiger, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

fragrans D. Don, *tristis* D. Don, v. Lyperia fragrans et tristis, p. 378, II.

Nycterium Vent.

cornutum Lk. (= *cardaminaefolium* Vent. = *Solanum cornutum* Lam. = *S. heterandrum* Juss.).

heterandrum * (= *lobatum* Sweet, = *luteum* Torr. = *Androcera lobata* Nutt. = *Solanum heterandrum* Pursh).

Nymphaea T., L., Sm., Seerose.

biradiata Sommerauer, zweistrahlige, 4. Wa. f. Deutschland (Steyermark).

blanda Meyer, (= *glandulifera* Rodsch).

edulis DC. (= *Coteka* Roxb. = *esculenta* Roxb. = *Castalia edulis* Salisb.).

pauciradiata Bunge, (= *alba* Patrin), wenigstrahlige, 4. Wa. f. Sibirien.

pygmaea Ait. (= *tetragona* Georgi).

Rudgeana Meyer, (= *ampla* β DC.), Rudge's, 4. Wa. w. Surinam.

N. Amazonum Mart., Zuccar., lasiophylla Mart., Zuccar,

Digitized by Google

Nymphaea
speciosa Mart., Zuccar., in Brasilien heimisch, scheinen noch nicht eingeführt. Desgl. gracilis Zuccar., mexicana Zuccar., in Mexico heimisch, Bashiniana, (Basuiniana) Turcz. Baical, Dahurien.
Nymphanthus Nuriri Lour., v. Phyllanthus Nuriri, p. 620.
Nymphaerodia exaltata, tuberosa Hort., v. Aspidium Sect. IV., p. 49, II.
Nymphoides europaea Fisch., v. Limnanthemum nymphoides, p. 360, II.
Nymphosanthus vulgaris Rich., v. Nymphaea lutea.

Nyssa L., Tupelobaum.
angulosa Poir. (= *denticulata* Ait. var.? Poir.), kantiger, ħ. f. b. Nordamerika.
aquatica L. (= *biflora* Mchx. = *caroliniana* Poir. = *integrifolia* Ait. = ? *sylvatica* Marsh.).
glauca Dsf. (= *villosa* Mchx. var. P.), blaugrüner, ħ. f. b. Nordamerika.
montana G. fil., Berg-T., f. b. Nordamerika.
sylvatica Lodd., Wald-T., ħ. f. b. Nordamerika.
tomentosa Mchx., W. (= *denticulata* Ait. var. Poir. = *grandidentata* Mchx.).
villosa Mchx. (= *canadensis* Poir. = *montana* Hort. = *multiflora* Walt., Wangenh.).

Obaejaca sylvatica Cass., *viscosa* Cass., v. Senecio sylvaticus et viscosus, p. 746.

Oberonia Lindl., Oberonie.
brevifolia Lindl. (= *Cymbidium equitans* Sw. = *Epidendron equitans* Forst. = *Pleurothallis disticha* Rich.), kurzblätterige, 4. w. Gesellschaftsinseln, Mascarenas.
iridifolia Lindl. (= *Cymbidium iridifolium* Roxb. = *Malaxis ensiformis* Sm.), Schwertelblätterige, 4. w. Ostindien.
Myosuros Lindl. (= *Dendrobium Myosuros* Sw. = *Epidendrum Myosuros* Forst.), mäuseschwanzähnliche, 4. w. Gesellschaftsinseln, Ostindien.
Obione portulacoides Moq. Tand., v. Halimus portulacoides, *O. sibirica* Auct. (= *muricata* G.), v. Atriplex sibirica.
Ochna arborea Burch., *atropurpurea* DC., v. Diporidium arboreum et atropurpureum, p. 206, II.

Ochradenus Delile, Beerenresede, XI. III., Resedaceae.
baccatus Delile, aegyptische, ♂. ħ. k. Aegypten.

Ochranthe Lindl., Hypericaceae Lindl., Saxifrageae Cunoniaceae Meisn.
arguta Lindl., ħ. ħ. China. (Ob eingeführt?)

Ochrosia Juss., Bleichholz.
borbonica Juss. (= *Cerbera borbonica* Spgl. = *C. parviflora* Forst. = *Diderota amphicarpa* Commers. = *Ophioxylon Ochrosia* P. = *Rauwolfia striata* Poir.).
maculata Jacq. (= *Cerbera maculata* W. = *C. undulata* Andr.), gefleckte, ħ. w. Mascarenas.
elliptica LaBill., v. Cerbera Odollam, p. 182 et p. 133, II.

Ocimum T. (= *Ocymum* Auct.), Basilienkraut.
atrovirens Hort. Kew., immergrünes, ħ. w. ?
Basilicum L., α) pilosum W. Enum., Benth. (= *ciliatum* Hornem. = *hispidum* Lam. = *minimum* Burm.,

Digitized by Google

Ocimum

non L.), β) anisatum Hortul., γ) glabratum Benth. (= *caryophyllatum* Roxb. = *integerrimum* W. = *lanceolatum* Schum.), δ) majus Hortul., ε) album L. (= *americanum* Jacq. = *laxum* Vahl hrb.), ζ) difforme Benth. (= *bullatum* Lam. = *cochleatum* H. Par. = *fimbriatum* Hortul. = *maximum* Hortul. = *peltatum* Hortul. = *scutellarioides crispum* Burm., non L. = *urticaefolium* Hort., non Roth), η) densiflorum Benth. (= *Barrelieri* Roth), ϑ) purpurascens Benth. (= ?*medium* Mill. = *nigrum* Thouin), ι) thyrsiflorum L. mant., Benth.

Bojeri Benth. (= ?*cordifolium* Bojer), Bojer's, ♄. w. Madagascar.

canum Sims, (= *album* Roxb. = *americanum* L. = *hispidulum* Schum. = *incanescens* Mart. = *staminosum* Sims), ☉. ♂. w. China, Ostindien, tropisches Afrika.

carnosum Lk., Otto, (= *Lumnitzera carnosa* Spgl.), fleischiges, 4. ♄. w. Brasilien, Neuspanien.

citriodorum Visian. H. Patav., citronduftendes, 4. ♄. w. Nubien.

diffusum Benth., weitschweifiges, 4. ♄. w. Ostindien.

grandiflorum L'Her. (= *abyssinicum* Dsf. = *filamentosum* Forsk.).

gratissimum L. (= *frutescens* Mill. = *petiolare* Lam. = *zeylanicum* Burm. exparte).

graveolens Hort., starkriechendes, ☉. m. f. ?

macrostachyum Poir., grofsähriges, ♄. w. Ostindien.

micranthum W. Enum. (= *americanum* Auct. = *frutescens* Sieb. herb. = *montanum* Hook. = *peltatum* Hortul. = *pubescens* Mill.), kleinblumiges, ☉. ♄. w. Südamerika.

sanctum L. (= *frutescens* Burm. = *hirsutum* Benth. = *inodorum* Burm. = *monachorum* L. = *scutellarioides* W. herb. = *tenuiflorum* Auct., ?non L. = *tomentosum* Lam. = *villosum* Roxb. = *zeylanicum* Burm. ex parte. Nach Endlicher auch: = *ciliatum* Hornem. = *hispidum* Lam. = *pilosum* W. E. — *Lumnitzera tenuiflora* Spgl. = *Plectranthus monachorum* Spgl.), ☉. ♄. w. Ostindien Java.

Selloi Benth., Sellow's, ☉. ♄. w. Brasilien.

suave W. (= *gratissimum* Lam., non L. = *holosericeum* Hort. Breit. = *urticaefolium* Roth, = *villosum* Weinm., non Roxb. = *zeylanicum* Dsf. Hort. Par.), Madagasc.

viride W. (= *febrifugum* Lindl. = *heptodon* P. Beauv. = *viridiflorum* Roth).

asperum Roth, *scutellarioides* L. (= *peltatum* Schwägr.), v. Coleus barbatus, p. 211 et C. scutellarioides, p. 153, II., *capitatum* Roth, (= *capitellatum* L. = *cephalotes* Hamilt.), v. Acrocephalus capitatus, p. 16, *chinense* Hort., *Coetsa* Spgl., *densiflorum* Roth, *maypurense* Roth, (= *molle* Ait.), *punctatum* L., non Blume, *ternifolium* Spgl., v. Plectranthus nudiflorus, Coetsa, rugosus, cordifolius, punctatus, ternifolius, p. 634, *congestum* Spgl. (= *polycladon* Lk.), *polystachyum* L. (= *tenuiflorum* Burm.), v. Moschosma ocimoides et polystachyum, p. 532 et p. 421, II., *menthoides* Burm., L. fil. (= *prostratum* L.), v. Geniosporum prostratum, p. 257, II., *frutescens* L., v. Perilla ocimoides,

Digitized by Google

Ocimum
p. 607, *thymiflorum* Roth, v. Ortosiphon glabratus. Hiernach p. 553 zu ergänzen.

Ocotea Aubl., H. B. K. (? guianischer Name), IX. 1., Laurineae.
guianensis Aubl. (= *Laurus Ocotea* Rich. = *L. surinamensis* Sw. = *Nectandra bijuga* Rottb. = *Persea surinamensis* Spgl. = *Psychotria nutans* Sieb. martin.), guianische, ħ. w. Guiana, Martinique.
puberula N. E. (= *O. Maximilianea* Mart. = *Strychnodaphne puberula* N. E., *β Laurus crassifolia* Poir. = *L. puberula* Rich. = *Persea crassifolia* Spgl. = *P. Richardiana* Schltdl.), feinhaarige, ħ. w. Südam. *turbacensis* Auct., non H. B. K., v. Oreodaphne exaltata. *Octadenia libyca* RBr., v. Koniga libyca, p. 336, II. *Octogonia glabella* Kl., v. Simocheilus glabellus, p. 885.

Octomeria RBr., Achttheilorche.
Baueri Lindl., Bauer's, 4. w. Ostindien.
gracilis Lindl.
grandiflora Lindl., grofsblumige, 4. w. Brasilien.
lancifolia ? Lindl., lanzettblätterige, 4. w. Südamerika.
Loddigesii ? Lindl., Loddiges's, 4. w. Südamerika.
teretifolia Batem. (= *gracilis* Lodd., non Lindl.).
tridentata Lindl., dreizähnige, 4. w. Demerara.
truncata Hffg., abgestutzte, 4. w. Brasilien.
convallarioides Wall. (= *spicata* D. Don), *excavata* Wall., *flava* Wall. (= *pubescens* Spgl.), *rosea* Spgl., *stellata* Spgl., v. Eria convallarioides, excavata, pubescens, rosea et stellata, p. 293 et p. 228, II. *Octopera Bergiana* D. Don, v. Erica Bergiana.

Odontadenia Benth., Zahnblume, V. II., Contortae-Apocyneae.
speciosa Benth., prächtige, ħ. w. Guiana, Cayenne.

Odontarrhena C. A. Mey., alpestris Endl., Marschalliana C. A. Mey., microphylla C. A. Mey., muralis Endl., obovata C. A. Mey., obtusifolia C. A. Mey., tortuosa C. A. Mey., v. Alyssum, Sect. III., p. 28, II. et p. 41.

Odontites Hall., P., Zahntrost.
Bocconi Walp. (= *Euphrasia Bocconi* Gussone, = *E. frutescens* Sieb. = *Lasiopera Bocconi* Presl), Bocconе's, ħ. k. Sicilien, Creta.
glutinosa Benth. (= *Euphrasia glutinosa* MB.), klebriger, ☉. f. Iberien, Caucasus.
Holliana Benth. (= *Euphrasia Holliana* Lowe, = *Bartsia scordifolia* Steud. = *Trixago scordifolia* Rchb.), Holl's, ☉. f. Madeira.
lanceolata Rchb. (= *Euphrasia lanceolata* Gaud.), lanzettlicher, ☉. f. Savoyen, Süd-Ost-Frankreich.
lutea Rchb. (= *linifolia* Rchb., G. Don, = *Euphrasia lutea* L. = *E. linifolia* L. = *E. Coris* Crtz.).
purpurea G. Don, (= *Euphrasia purpurea* Dsf. = *E. squarrosa* Salzm.), purpurfarbiger, ☉. f. Nordafrika, Südspanien.
rubra P. (= *vulgaris* Stev. = *Euphrasia Odontites* L. = *E. serotina* Lam. et *verna* Bell. = *Bartsia Odontites* Huds.), *α*) verna Rchb., *β*) serotina Rchb.
viscosa Rchb. (= *Euphrasia viscosa* L.), schmieriger, ☉. f. Frankreich, Spanien.

Digitized by Google

Odontites glauca Spgl., *luteola* Spgl., *semicomposita* Spgl. (= *luteola* Hoffm.), *tenuissima* Spgl., v. Bupleurum glaucum, aristatum et Odontites, semicompositum, tenuissimum, p. 139.

Odontoglossum Humb., Bonpl. K., Zahnstendel.

I. Genuinum.

apterum LaLlav., flügelloser, 4. w. Mexico.

bictoniense Lindl. (= *Cyrtochilum bict.* H. belg.), bictonischer, 4. w. Mexico.

caudatum Makoy, geschwänzter, 4. w. ? Mexico.

Cervantesii LaLav., Lindl., Cervantes's, 4. w. Mexico (Oaxaca).

cirrhosum Lindl., wickelrankiger, 4. w. Peru.

Ehrenbergii Kl., Ehrenberg's, 4. w. Mexico.

elatum Makoy, hoher, 4. w. Südamerika.

grande Hort. belg., grofser, 4. w. Südamerika.

laeve Lindl., glatter, 4. w. Guatemala.

Lindleyi H. belg., Lindley's, 4. w. Mexico.

maculatum LaLlav., Lindl., gefleckter, 4. w. Mexico.

membranaceum ? Lindl., häutiger, 4. w. Südamerika.

Rossii Lindl., Rofs's, 4. w. Mexico.

II. Trymenium Lindl.

brevifolium Lindl., kurzblätteriger, 4. w. Mexico.

citrosmum Lindl. (= *Oncidium Galeottianum* Scheidw.), citronenduftender, 4. Kn. w. Mexico.

pulchellum Batem., Lindl., schöner, 4. Kn. w. Guatimal.

Clowesii Lindl., v. Miltonia Clowesiana, *Insleayi* H. belg., v. Oncidium Insleayi.

Odontolophus cyanoides Cass., v. Centaurea trinervia, p. 179.

Odontonema N. E., lucidum N. E., v. Justicia, Sect. VIII[b]., p. 332, II. et p. 434.

Odontotrichum Zuccar., Zahnhaar, Compositae.

cirsiifolium Zuccar., 4. Mexico. (Ob kultivirt?)

Oeceoclades Lindl., Aststendel.

falcata Lindl. = Angraecum falcatum, p. 869.

funalis Lindl. (= *Epidendrum funale* Sw. = *Limodorum funale* Sw.), 4. w. Jamaica.

maculata Lindl. (= *Angraecum maculatum* Lindl. = *A. monophyllum* Rich. = *A. parviflorum* Pet. Th.). Mascarenas.

paniculata Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.

Oedera L. fil, Thbg., Oedera.

latifolia Less. (= *imbricata* Lam. = *obtusifolia* Cass. = *Buphthalmum capense* L., ex parte), breitblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

prolifera L. (= ? *lanceolata* Cass. = *Buphth. cap.* L. ex parte).

Oedipachne punctata Lk., v. Helopus punctatus, p. 294, II.

Oedmannia lanceolata Thbg., v. Rafnia lancea, p. 675.

Oenanthe T., Rebendolde.

Filipendula Dumort., knollige, 4. Kn. f. Belgien.

Jordani Tenore, Jordani's, 4. f. Neapel.

Lachenalii Gmel., *β*) involucrata DC.

peucedanifolia Pollich, (= *peucedanoides* Roth, = *patens* Mch.).

Phellandrium Lam. (= *aquatica* Poir.) = Phellandrium aquaticum, p. 614.

Digitized by Google

Oenanthe

pimpinelloides L., *β*) chaerophylloides Pourr., DC., *γ*) rapacea K. (= *Karsthia* Hacq. = *australis* Wulf.).

silaifolia MB. (= *gymnorrhiza* Brignol. = *glauca* DC. H. Monsp. = *peucedanifolia* Sm., non Pollich. = *prolifera* Host, = *tenuifolia* Fröl. = *virgata* K.).

virgata Poir. (= *daucifolia* Lk. herb. = *pimpinelloides* *β* DC. = *prolifera* Hort. = *stylosa* P.), ruthenförmige, 4. Kn. k. f. b. Nordafrika.

exaltata Thbg., *inebrians* Thbg., v. Lichtensteinia lacera et inebrians, p. 357, II., *interrupta* Thbg., v. Annesorrhiza capensis et montana, p. 37, II., *Mutellina* Lam., v. Meum Mutellina, p. 522, *nodiflora* Schousb., v. Sclerosciadium humile, *rigida* Nutt., v. Archemora rigida, p. 42, II.

Oenocarpus Mart., Weinfrucht.

Bacaba Mart., Bacaba, ♄. w. Guiana.

regius Spgl., *Sancona* Spgl., v. Oreodoxa regia et Sancona.

Oenothera L., Nachtkerze.

acaulis Cav. (= *anisoloba* Swt., Don, = *grandiflora* R. et P.), *α*) cuspidata Endl. (= *O. acaulis* Lindl. = *Lavauxia cuspidata* Spach), *β*) taraxacifolia Swt., Endl. (= *Lavauxia mutica* Spach).

albicaulis Fras., non Pursh, (= *Nuttallii* Swt. = *Anogra Nuttalliana* Spach, = *Baumannia Nuttalliana* Spach).

biennis L. (= *Onagra biennis* et *chrysantha* Spach), *β*) muricata Murr., *γ*) grandiflora Ait. (= *suaveolens* Dsf. = *Lamarckiana* Sering.), *δ*) parviflora L., *ε*) cruciata Nutt., Torr. et Gray., *ζ*) canescens Walp., *η*) gauroides Hornem. (= *hirsuta* Dietr.).

bifrons Sweet, Don, (= *heterophylla* Spach).

Boothii Dougl., Hook., Booth's, ♂. f. Nordamerika.

centaureifolia Steud. (= *Lavauxia centaureifolia* Spach), flockenblumenblätterige, ♂. k. Montevideo.

cheiranthifolia Lindl., ? non Hornem. (= *Agassizia cheiranthifolia* Spach, = *Oenothera Agassizia* Steud.), lackblätterige, ⊙. f. Chili.

chrysantha Mchx. (= *ripuria* Lehm. = *Kneiffia chrysantha* Spach), goldblumige, 4. f. Nordamerika.

elata H. B. K. (= *crassipes* H. Berol. = *Onagra Kunthiana* Spach), hohe, ♂. 4. k. f. b. Mexico.

β) salicifolia Dsf. (= *Onagra salicifolia* Spach).

erosa Lehm. (= *Onagra erosa* Spach, = *O. Lehmanniana* Spach), ausgebissene, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

fruticosa L. (= *hybrida* Mchx. = *Kneiffia floribunda* et *fruticosa* Spach), *β*) ambigua Nutt., Spgl. (= *canadensis* Goldie), *γ*) phyllopus Walp. (= *serotina* Swt., Don, = *Kneiffia maculata* Spach), *δ*) incana Nutt., *ε*) hirsuta Walp. (= *pilosella* Rafin.).

glauca Mchx. (*Kneiffia glauca* Spach), *β*) Fraseri Pursh, (= *K. Fraseri* Spach).

macrantha Sellow in hort. Dyck., grofsblumige, ⊙. f. m. ? Südamerika.

media Lk. (= *Onagra Linkiana* Spach).

mexicana Spach, mexicanische, ?⊙. f. Texas.

micrantha Walp., non Presl, nec Hornem. (= *pinnatifida* Hort., nec H. B. K. = *Hartmannia parviflora* Spach), kleinblumige, ⊙. f. ? Nordamerika.

missouriensis Sims, (= *macrocarpa* Pursh, Swt. =

Digitized by Google

Oenothera

alata Nutt. (= *Megapterium missouriense* et *Nuttallianum* Spach).

nocturna Jacq. (= ?*albicans* Lam.).

odorata Jacq. (= *mollissima* Hook., Arn., non L. = *undulata* Ait. = *Onagra undulata* Mch.), α) glaucescens Ser., β) virescens Sering.

pallida Dougl., Hook. (= *Anogra Douglassiana* Spach, = *Baumannia Douglassiana* Spach).

pinnatifida H. B. K. (= *Hartmannia Kunthiana* Spach), fiederspaltige, ⊙. ♂. f. k. Mexico.

pumila L. (= *gracilis* Schrad. = *Kneiffia pumila* Spach).

Purshiana G. Don, Steud. (= *albicaulis* Pursh, non Fras., Nutt. = *pinnatifida* Nutt., non H. B. K. = *Anogra pinnatifida* Spach, = *Baumannia pinnatifida* Spach), Pursh's, ♂. f. Nordamerika.

rosea Ait. (= *purpurea* Lam. = *rubra* Cav. = *Hartmannia gauroides* Spach, = *H. rosea* Sweet).

serrulata Nutt. (= *Calylophis Nuttallii* Spach, = *C. Drummondiana* Spach, = *Meriolix serrulata* Rafin., Walpers).

Simsiana Sering. (= *corymbosa* Sims, non Lam.), Sims's, ♂. k. Mexico.

β) spectabilis Hort. (= *Onagra spectabilis* Spach).

Spachiana Torr. et Gr., Spach's, ⊙. f. Texas.

stricta Ledeb. (= *mutabilis* Dsf. = *striata* Sering.). Chili.

tetraptera Cav. (= *capensis* Hort. = *dubia* Hort. = *mutabilis* P. = *Hartmannia macrantha* Spach).

triloba Nutt. (= *rhizocarpa* Spgl. = *Lavauxia Nuttalliana* Spach).

valida Kunze, starkbewehrte, ♂. f. h. k. Mexico.

Unbestimmtere ohne Angabe des Vaterlandes:

crispa Schult., eminens Tausch, 4., globularis Hort., Chels. ♂., holosericea Tausch, maculata H. angl., micans Tausch, odoratissima Tausch, 4. ♄., subincana Hort.

Hinsichtl. der übrigen siehe die Gattungen Boisduvalia, p. 72, II., Godetia, p. 269, II. et p. 363, et Sphaerostigma, p. 777.

Oglifa arvensis Cass., v. Filago arvensis.

Ohlendorfia procumbens Lehm., v. Aptosimum procumbens Burch., p. 40, II.

Oileus Haw., v. Narcissus, Sect. XII.

Okenia (*Okea*) *speciosa* Dietr., v. Adenandra umbellata, p. 18.

Olax L., scandens Roxb. (= *Bodor* Hamilt. = ?*obtusa* Blume, = *O. Peittacorum* Vahl, = *Roxburghia baccata* Koen.).

Olbia Medic., *canescens* Mch., *deflexa* Mch., *hastata* Medic., *heterophylla* Mch. (= *thuringiaca* Medic.), *micans* Mch., *triloba* Medic., v. Lavatera maritima, punctata, Olbia, thuringiaca, micans, triloba, p. 450 et p. 346, II.

Oldenlandia biflora Lam., *corymbosa* Lam. etc., v. Hedyotis Burmanniana, corymbosa etc., p. 286, II.

Olea T., Oelbaum.

capensis L. (= *buxifolia* Mill.).

chrysophylla Lam. (= *ferruginea* Hort.). Mascar., Abyss.

Digitized by Google

Olea

cuspidata Wall. (= *ferruginea* Royle, = *asiatica* Dsf.), feinspitziger, ♄. t. w. Ostindien.

exasperata Jacq., wenigrauher, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

europaea L., *α*) Oleaster Lk., Hffg., *β*) sativa Hffg., Lk.

floribunda Benth., blüthenreicher, ♄. t. k. Neuirland.

glandulifera Wall. (= *glandulosa* Dsf.), drüsiger, ♄. t. Nepal.

undulata Jacq. (= *capensis β* Jacq. = *laurifolia* Lam.), *β*? intermedia Tausch.

verrucosa Lk. (= *europaea* Thbg. = *europaea β verrucosa* W. = *africana* Mill. = *sativa verrucosa* R. et S.).

Nicht hinlänglich bekannte:

microcarpa Vahl, (= *rigida* H. Cels. = *Phillyrea indica* Lour.), kleinfrüchtiger, ♄. t. Cochinchina.

nigra Lois., speciosa Hort. Vaterland unbekannt.

clavata G. Don, v. Visiania paniculata, *divaricata* Dsf., v. Phillyrea divaricata, *emarginata* Lam., Vahl, v. Noronhia emarginata, excelsa Ait. (= ?*maderensis* H. Cels.), v. Picconia excelsa, *fragrans* Thbg., v. Osmanthus fragrans.

Olearia Mch., dentata Mch. (= *tomentosa* DC.), phlogopappa DC., quercifolia DC., rotundifolia DC., stellulata DC., v. Aster, Sect. XIII.

Olfersia Radd., (Olfers, Consul in Rio Janeiro), XXIV. 1., Pteroideae.

cervina Presl, (= *Polybotrya cervina* Kaulf., p. 641).

conformis Presl, (= *Acrostichum conforme* Sw.), einförmige, 4. w. Cap d. g. H., Ostindien, Java.

corcovadensis Raddi, (= *Polybotrya Raddiana* Kaulf., Lk., p. 641, = *Acrostichum Olfersia* Endl.). Brasilien (Corcovado).

Oligocarpha nereifolia Cass., v. Brachylaena neriifolia, p. 129.

Oligolepis indica Cass., v. Sphaeranthus indicus, p. 777.

Oligomeris Cambess., Afterresede, XI. III., Resedaceae.

glaucescens Cambess. (= *Ellimia ruderalis* Nutt. = *Reseda dipetala* Ait., p. 680, = *R. subulata* Delile, = *Resedella dipetala* (= *subulata*) Webb et Berthel), blaugrünliche, ☉. f. Aegypten, Canarische Inseln, Californien.

Oligosporus campestris Cass., *condimentarius* Cass., *Marschallianus* Less., *mexicanus* Less., *monospermus* Decaisne, *scoparius* Less., v. Artemisia campestris, Dracunculus, inodora, mexicana, Delileana, scoparia, p. 81—83.

Olinia Thbg., Olinie.

acuminata Lk., Kl., Otto, zugespitzte, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

capensis Lk., Kl., Otto, capische, ♄. k. t. Cap d. g. H.

Oliveria decumbens Vent. (= *orientalis* DC.).

Olympia glauca Spach, v. Hypericum olympicum.

Olynthia disticha Lindl., v. Eugenia dist., p. 236, II.

Omalanthus Grah., v. Homalanthes, p. 304, II.

Ommatodium Lindl., Augenstendel, XX. 1., Orchideae.

Volucris Lindl. (= *Ophrys triphylla* Thbg. = *O. Volucris* L. = *Pterygodium Volucris* Sw., p. 666).

Digitized by Google

Omphalodes T., Venusnabel.

amplexicaulis Lehm. (= *brassicaefolia* Boiss., G. Don, = *lusitanica* Schrk.).

cappadocica DC. (= *cornifolia* Lehm. = *Cynoglossum cappadocicum* W. = *C. Omphalodes* β Lam. = *Picotia cappadocica* R. et S.), cappadocischer, 4. f. Klein-Asien.

cristata A. DC., non Schrk. (= *Echinospermum cristatum* Bunge), kammsaamiger, ⊙.♂. f. Altaisch. Sibirien.

linifolia Mch. (= *Cynoglossum linifolium* L.), β) obtusata DC., γ) coerulescens (Req.).

litoralis Lehm. (= *Cynoglossum lateriflorum* Aubr. = *C. linifolium* L. var. DC. fl. fr. suppl. excl. synon. = *C. litorale* Spgl. = *Picotia litoralis* R. et S.).

longiflora A. DC. (= *Cynoglossum longiflorum* Benth., Lindl.), langblumiger, 4. k. Cachemyre, Nordwestl. Indien.

myosotoides Schk., G. Don, (= *Cynoglossum lithospermifolium* Lam. = *C. myosotoides* LaBill. = *Picotia lithospermifolia* R. et S.).

verna Mch. (= *repens* Schrk. = *Cynoglossum Omphalodes* L. = *Picotia verna* R. et S.).

cristata Schrk., v. Mattia cristata, p. 389, II., *sempervirens* D. Don, v. Caryolopha sempervirens, p. 123, II.

Onagra T., *biennis* Mch., *chrysantha* Spach etc., v. Oenothera biennis etc., p. 554 et p. 445, II.

Oncidium Sw., Höckerstendel.

acaule Hffg., stengelloser, 4. w. Brasilien.

altissimum Sm. (= *Cymbidium altissimum* Sw. = *Epidendrum altissimum* Jacq.), β) Baueri Lindl.

bicallosum Lindl. (= ? *pachyphyllum* Lindl.), zweischwieliger, 4. w. Guatemala.

bifolium Sims, b) pallidum Booth.

bicolor Lindl., zweifarbiger, 4. w. Maynas.

brachyphyllum ? Lindl., kurzblätteriger, 4. w. Südamer.

Cavendishianum Batem. (= *pachyphyllum* Hort.).

Cebolleta Sw. (= *juncifolium* Lindl. = *Cymbidium juncifolium* W. = *Epidendrum Cebolleta* Jacq. = *E. juncifolium* L.).

celsissimum Hffg. (= *altissimum* H. Berol.), allerhöchster, 4. w. Brasilien.

ciliolatum Hffg., feinwimperiger, 4. w. Brasilien.

concolor Lindl., einfärbiger, 4. w. Brasilien.

crispum Lodd., b) marginatum van Houtte.

divaricatum Lindl., b) cupreum Makoy.

echinatum H. B. K., igelstacheliger, 4. w. Mexico.

fimbriatum Lodd., gefranzter, 4. w. Brasilien.

funereum LaLlav. et Lex., riemenähnlicher, 4. w. Mexico.

Ghiesbreghtii v. Hutte, Ghiesbreght's, 4. w. Südamer.

Henchmanni ? Lindl., Henchmann's 4. w. Südamerika.

Huntianum Hook., Hunt's, 4. w. Brasilien.

hyalinobulbum LaLlav., durchscheinendknolliger, 4. w. Mexico.

incurvum H. belg., einwärtsgekrümmter, 4. w. Südam.

inophyllum ? Lindl., faserblätteriger, 4. w. Südamerika.

intermedium Knowl. et Westc., mittlerer, 4. w. Cuba.

Insleayi Barker, Lindl., Insleay's, 4. w. Mexico.

leucostomum Hffg., weifsmundiger, 4. w. Brasilien.

luridum Lindl. (= *cuneatum* Lindl.).

Digitized by Google

Oncidium

macranthum Lindl., grofsblumiger, 4. w. Quayaquil.
microchilon Batem. (= *Funkii*, = *eriopterum*, = *macrophyllum* Hort.), kleinlippiger, 4. w. Guatemala.
nubigenum Lindl., wolkenähnlicher, 4. w. Peru.
nudum Lindl., nackter, 4. w. Caracas.
obovatum Presl, verkehrteiförmiger, 4. w. Mexico.
onustum Lindl., überladener, 4. w. Südamerika.
pachyphyllum Lindl., dickblätteriger, 4. w. Mexico.
panduriferum H. B. K., geigentragender, 4. w. Neu-Granada.
pantherinum Hffg., pantherfleckiger, 4. w. Brasilien.
Papilio Lindl., a) minus Hort., b) majus Hort., c) pallidum Hort., d) superbum Hort.
pentaspsilum Hffg. (= *Harrisonianum* H. Cels.), fünffleckiger, 4. w. ? Südamerika.
phymatochilon Lindl., geschwollenlippiger, 4. w. Südam.
pictum H. B. K. (= ? *Baueri* Lindl. = *altissimum* Sw. var.?), bemalter, 4. w. Neugranada.
Pinelianum H. Cels. et H. belg., Pineli's, 4. w. Südamerika.
polychromum Scheidw., vielfarbiger, 4. w. Brasilien.
puberum Spgl. (= *pubes* Lindl. = *bicornutum* Hook.).
reflexum Lindl., zurückgebogener, 4. w. Mexico.
sanguineum Lindl. (= *Huntianum* Hort.), blutfarbiger, 4. w. LaGuyara.
serpens Lindl., schlangenähnlicher, 4. w. Peru.
sphacelatum Lindl., brandfleckiger, 4. w. Südamerika.
spilopterum Lindl., (= *gallopavinum* Morren), fleckflügeliger, 4. w. Mexico.
stramineum Batem. (= *Columbae* H. belg.).
subciliatum Hffg., wenigwimperiger, 4. w. Brasilien.
Suttoni Lindl., Sutton's, 4. w. Südamerika.
tetrapetalum W. (= *quadripetalum* Sw. = *Cymbidium tetrapetalum* Sw. = *Epidendrum tetrapetalum* Jacq.).
tigrinum LaLlav., getigerter, 4. w. Mexico.
tricolor Hook., dreifarbiger, 4. w. Jamaika.
trulliferum ? Lindl., topftragender, 4. w. Südamerika.
unicorne Lindl. (= *monoceras* Hort.), einhörniger, 4. w. Brasilien.
uniflorum Lindl., einblumiger, 4. w. Südamerika.
urophyllum Lindl., schweifblätteriger, 4. w. Brasilien.
viperinum Lindl., viperscheckiger, 4. w. Paraguay.
volubile ? Lindl., windender, 4. w. Südamerika.

Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Handelsgärten noch folgende zum Theil wohl von H. Prof. Lindley bestimmte und in verschiedenen Gegenden Südamerikas heimisch, erwähnt:

Bondeanum, Cepula Hffg., excavatum, longifolium, macropetalum, macropterum, maxilligerum, pergameneum, Philipsianum, punctatum, roseum, Scyurus, tripartitum, Wrayae.

Galeottianum Scheidw., v. Odontoglossum citrosmum, p. 444., II.

Oncosporum Putterl. (= *Oncospermum* Hort.) [1]), Höckersaame, V. 1., Pittosporeae.
bicolor Putterl., zweifarbiger, ♄. Sch. t. k. Südw. Neuholl.

1) Nicht zu verwechseln mit Oncosperma Blume, einer zierlichen Palmengattung des ostindischen Archipelagus.

Digitized by Google

Oncorrhynchus tenellus Fisch. et Mey. (= *pinnatifidus* Lehm.), v. Orthocarpus australis.

Onobroma G., Kreuzdistel.

armenium Spgl. (= *Atractylis armena* Poir. = *Carthamus armenus* W. = *Heteracantha armena* Don), armenische, ⊙. f. Armenien, Persien.

helenioides Spgl. (= *Carthamus helenioides* Dsf.), alantähnliche, ⊙. f. Nordafrika.

persicum DC. (= *armenium* var. Spgl. = *Carthamus persicus* W.), persische, ⊙. f. Persien.

Onobrychis T., Esparsette.

aequidentata D'Urv. (= *Hedysarum aequidentatum* Sibth. et Sm.), gleichzähnige, ⊙. f. Creta, Melos.

alba Desv. (= *Hedysarum album* W. K.).

Bergeriana DC. (= *Hedysarum Bergerianum* Spgl.), Berger's, 4. f. Campanien.

Buxbaumiana Desv. (= *Pallasii* MB.).

conferta Desv. (= *Hedysarum confertum* MB.). Caucasus, Iberien, Podolien.

cornuta Desv. (= *orientalis* J. St. Hil., Spgl. = *Hedysarum cornutum* L.), gehörnte, ♄. f. b. k. Orient (Armenien).

Echinus DC. (= *Hedysarum Caputgalli* L. var.? DC. = *H. Echinus* Poir.), igelstachelige, ⊙. f. ?

Fontanesii Boiss. (= *conferta* β DC. = *Hedysarum confertum* Dsf., non MB.), Desfontaine's, 4. f. b. k. Spanien, Numidien.

foveolata DC., grubige, ⊙. f. Sicilien.

geminiflora Schrk., Mart., paarblumige, ⊙. w. m. f. Brasilien.

Michauxii DC. (= *circinnata* Desv.), Michaux's, 4. f. b. Orient.

ornata Desv. (= *Hedysarum coronatum* Poir. = *H. ornatum* W.), zierliche, 4. f. b. k. Galatia.

radiata MB. (= ? *circinnata* Desv. = *Hedysarum radiatum* Dsf. = *H. circinnatum* W.), stachelige, 4. f. Caucasus.

reticulata Opiz, netzförmige, ♂. f. ?

sativa Lam. (= *spicata* Mch. = *vulgaris* J. St. Hil. = *Hedysarum Onobrychis* L.), b. fl. albo, β) tanaitica Fisch. (= *tatarica* Fisch. = *subvillosa* DC.).

saxatilis Lam. (= *tenuifolia* Mch. = *Hedysarum microcarpum* Dufour, = *H. saxatile* L.).

supina DC. (= *Hedysarum herbaceum* Lapeyr. = *H. pallidum* Schlchr. = *H. supinum* Vill.).

Tournefortii Desv. (= *Hedysarum Tournefortii* W.), Tournefort's, 4. f. b. k. Armenien.

vaginalis C. A. Mey. (= *radiata* β MB.), scheidige, 4. f. Caucasus.

venosa Desv. (= *Hedysarum venosum* Dsf.), aderige, 4. k. Numidien, Cypern, Persien.

Onoclea L.

obtusilobata Schk. (= *Rhagiopteris obtusiloba* Presl). *attenuata* Sw., v. Lomaria attenuata, p. 475, *obtusilobata* Angl. (= *nodulosa* Mchx.), v. Woodwardia onocleoides, p. 858, *Struthiopteris* Sw., v. Struthiopteris germanica, p. 791.

Ononis T., Hauhechel.

alba Poir. (= *oligophylla* Tenore var.), weifser, ⊙. f. Nordafrika, Neapel.

Digitized by Google

Ononis

aspalathoides DC. (= *Anthyllis aspalathoides* Burm. = *Lotus ononoides* Desv., Lam.), Witschenähnlicher, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

β) Lotus persicus Desv., Burm., γ) Cytisus hirtus Burm.

biflora Dsf. (= *geminiflora* Lag.). Nordafrika, Spanien.

Broteriana DC. (= *lusitanica* Spgl. = *racemosa* Brot.), Brotero's, ⊙. f. Estremadura.

cenisia L. (= *cristata* Mill.).

elongata Thbg., verlängerter, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

fruticosa L. (= *purpurea* Mill.).

laxiflora Dsf., lockerblumiger, 4. f. Algier, Corsica.

Masquiellieri Bertol., Masquiellieri's, ⊙. f. An den warmen Porrectanaschen Bädern.

mollis Lagasca, (= ? *Desfontainii* Dufour), weicher, ⊙. f. Spanien, Italien.

racemosa Thbg., traubiger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

reclinata L. (= *Cherleri* Dsf. = ? *mollis* Lagasca).

Schouwii DC., Schouw's, ⊙. f. Sicilien.

serrata Forsk. (= *diffusa* Tenore, = *baetica* Clement. = *Dehnhartii* Tenore), sägezähniger, ⊙. f. Aegypten, Griechenland, Italien, Spanien.

tridentata L. (= *crassifolia* Dufour).

Onopordon V., Krebsdistel, (Eselsdistel).

Acanthium L., β? macroacanthum Schult., γ) viride Dsf., δ) platyphyllum Endl.

elongatum Lam. (= *ambiguum* Fresen. = *arabicum* Bové, = *illyricum* L. = *tomentosum* Mch.), verlängerte, ♂. f. Südeuropa, Arabien.

heteracanthum C. A. Mey., verschiedenkantige, ♂. f. Caucasus (Talüsch).

orientale Mill., morgenländische, ♂. f. Syrien.

pyrenaicum DC. (= *acaule* DC., ? L. = *uniflorum* Cav. var.? Poir.), pyrenäische, ♂. f. Pyrenäen.

virens DC. (= *elatum* Sibth., Sm. = *viscosum* Hornem.).

β) tauricum W.

Unbestimmtere: intermedium Schult., maximum Schult.

Onoseris W., Eselskraut.

adpressa Less. (= *Centroclinium adpressum* Hook.).

integrifolia Less. (= *Centroclinium albicans* Don), ganzblätteriges, ♄. t. Peru.

odorata Hook., Arn. (= *Chaetachlaena odorata* Don, = *Leyssera odorata* R. et P.), wohlriechendes, ⊙. f. m. Peru.

reflexa Cass. (= *Centroclinium reflexum* Hook.), zurückgebogenes, 4. t. Peru.

salicifolia H. B. K., ♄. Vergl. p. 561 (mit Ausschluss des Synonyms).

Onosma L., Lotwurz.

calycinum Stev., grofskelchige, ♂. 4. f. Taurien.

echinatum Dsf., igelstachelige, ♂. k. Nordafrika, Syrien, Nordpersien.

echioides L. (= *Tournefortii* Griseb. = *Gmelini* Ledeb.), β) Sibthorpi DC. (= *echioides* Sibth.), γ) helveticum DC. (= *echioides* Gaud. = *arenarium* Rchb.), δ) arenarium W. K. Ost-, Mittel- u. Westeuropa, Caucasus, Sibirien, Syrien, Soongaria, Ostindien.

frutescens Lam., strauchige, ♄. k. Syrien.

microcarpum Steven, kleinfrüchtige, ♂. 4. f. Caucasus.

Digitized by Google

Onosma

montanum Sibth. et Sm. (= *angustifolium* Lehm. = *erectum* Sibth., Sm. = *canescens* Presl, = *cinereum* Sieb.), bergliebende, ♂. 4. f. b. Schweiz, Wallis, Italien, Dalmatien, Griechenland.

rupestre MB. (= *tenuiflorum* W.).

rostellatum Lehm. (= ? *setigerum* Clarke, Spgl.), geschnäbelte, 4. ♄. k. Kleinasien.

sericeum W., seidenhaarige, 4. ♄. f. b. Caucasus, Kleinasien, Persien.

simplicissimum L. (= *simplex* G. = *sibiricum* Lam.).
β) suffruticosum Schrk.

stellulatum W. K. (= *tenuifolium* Tausch).

synantherum Fisch., Sweet, verbundenbeutelige, 4. f. b. Alt. Sibirien.

syriacum LaBill., syrische, 4. ♄. k. Syrien.

tauricum Pall. (= *stellulatum* β MB. = *orientale* Habl., non L.), taurische, ♂. 4. f. b. Taurien.
β) brevifolium DC. Syrien.

tinctorium MB., b) albidum. Taurien, Caucasus, Gegend des caspischen Meeres, Südpodolien, Ukraine.

Visianii Clementi, (= *echioides flore minore* Bess. in litt.), Visiani's, ♂. 4. f. Südpodolien, Taurien, Ukraine, Dalmatien.

Nicht hinlänglich bekannte Art:

tricerospermum Lagaca.

coeruleum W., v. Moltkia coerulea, p. 414, II., *divaricatum* Lehm. (= *orientale* Pall.), v. Arnebia cornuta, p. 45, II., *pulla* Schrk., v. Nonnea pulla, *saxatile* Lehm., v. Stenosolenium saxatile, *strigosum* H. B. K. (= *trinervium* Lehm.), v. Onosmodium strigosum.

Onosmodium Mchx., Eselszunge.

carolinianum DC. (= *molle* Mchx, p. 562, = *Lithospermum carolinianum* Lam. = *L. molle* Mühlb. = *Purshia mollis* Lehm.).

strigosum G. Don, (= *Onosma strigosum* H. B. K. = *O. trinervium* Lehm., p. 563, = *Lithospermum longifolium* W. herb.).

virginianum A. DC. (= *hispidum* Mchx., p. 562, = *scabrum* R. et S. = *Lithospermum virginianum* L. *Purshia hispida* Lehm.).

Onotrophe acaulis Cass., *oleracea* Cass., *palustris* Cass., v. Cirsium acaule, oleraceum, palustre, p. 197 etc.

Onychium Blume, *crumenatum* Blume, *flavescens* Blume, *japonicum* Blume, *mutabile* Blume, v. Dendrobium crumenatum, flavescens, japonicum, mutabile, p. 255 et p. 195, II.

Opercularia G., Deckelkelch.

hyssopifolia Juss., ysopblätteriger, ♄. k. t. Neuholland.

ligustrifolia Juss. (= *hyssopifolia* Juss. var.), liguster-blätteriger, ♄. k. t. Neuholland.

umbellata G. (= *Banksiana* Schult.), v. Pomax hirta.

Ophioglossum T., Natterzunge.

pedunculosum Desv. (= *petiolatum* Hort. = *lusitanicum* H. Berol., non L.), langstielige, 4. t. Nord- und Südamerika.

Digitized by Google

Ophiopogon Curt., Ker, Natterzauke.
pallidus Wall., bleiche, 4. t. Ostindien.
prolifer Journ. of the hort. Soc., sprossende, 4. t. Sincapore.
Ophioscorodon magicum Wallr., *tricoccum* Wallr., *ursinum* Wallr, v. Allium magicum, tricoccum, ursinum, p. 30, 31.
Ophiostachys virginica Redout., v. Chamaelirium carolinianum, p. 186.
Ophioxylon serpentinum L. (= *trifoliatum* G.).
Ophrys L., Ragwurz.
apifera Huds. (= *insectifera* L. var. = *rostrata* Tenore).
arachnites All., Hoffm. (= *arachnoides* Andr. = *bombylifera* Spgl. = *Arachnites fuciflora* Hoffm. = *Orchis arachnites* Scopol. = *O. fuciflora* Schrk.).
ciliata Biv. (= *Speculum* Lk., non Bertol. = *Scolopax* Tenore).
cornuta Stev. (= *bicornis* Sadl.), gehörnte, 4. Kn. f. b. k. Taurien, Dalmatien, Ungarn.
corsica Vivian., corsische, 4. Kn. k. Corsica.
fuciflora Hall. (= *apiculata* Rich. = *arachnites* Schlchr., Thom. = *crabronifera* Sebast., Mauri, = *exaltata* Tenor. = *oestrifera* Rchb., non MB.), hummelblumige, 4. Kn. f. b. k. Mittel- u. Südeuropa.
fusca Lk. (= *insectifera* ζ L. = *lutea* Bivon., Bern., non Cav.). Portugal, Nordafrika.
β) iricolor Dsf.
lunulata Parlotore, mondförmige, 4. Kn. f. b. k. Sicilien.
picta Lk., bemalte, 4. Kn. k. Portugal.
Scolopax Cav. (= *bombyliflora* Lk. = *insectifera* δ L. = *muscaria* Lam.).
tabanifera W. (= *bombyliflora* W. = *distoma* Biv., Bern. = *hiulca* Seb., Maur. = *insectifera biflora* Dsf. = *oestrifera* Stev., MB. = *picta* Salzm. = *pulla* Tenore), bremsenblumige, 4. Kn. f. b. k. Südeuropa, Taurien, Nordafrika.
β) bremifera Stev.
Tenoreana Lindl. (= *tenthredinifera* Tenore, non W.), Tenore's, 4. Kn. f. b. k. Süditalien.
tenthredinifera W. (= *grandiflora* Tenore, = *insectifera rosea* Dsf.).
vespifera W. (= *glabra* P. = *insectifera glaberrima* Dsf.), wespenblumige, 4. Kn. k. Nordafrika.
alata L. fil., v. Pterygodium alatum, p. 666, *cernua* L., *aestivalis* Balb. etc., v. Spiranthes cernua, aestivalis etc., p. 779, *densiflora* Dsf. (= *secundiflora* Steud.), v. Himantoglossum secundiflorum, p. 30, II., *liliifolia* L., *Loeselii* L., v. Sturmia liliifolia, Loeselii, p. 791, *monophyllos* L., v. Microstylis monophylla, p. 408, II., *paludosa* L., v. Malaxis paludosa, p. 489, *triphylla* Thbg. (= *Volucris* L.), v. Ommatodium Volucris, p. 447, II.
Oplismenus P., B., Grannenbart (Grannich).
A. Orthopogon RBr.
africanus P. B. (= ?*brasiliensis* Raddi, = *sylvaticus* R. et S. = *Panicum africanum* Poir. = *P. compositum* Trin. var. d. e. f. = *P. sylvaticum* Lam.). Mascarenas, Brasilien.
Burmanni P. B. (= *albus* R. et S. = *brasiliensis* Raddi, = *bromoides* P. B. = *Humboldtianus* N. E.

Digitized by Google

Oplismenus
= *Panicum album* Poir. = *P. bromoides* Lam. = *P. Burmanni* Retz, = *P. hirtellum* Burm. = *P. lappaceum* W. herb. = *Echinochloa hirtella* Schult.).
compositus RBr., R. et S. (= *remotus* Trin. = *Digitaria composita* W. Enum. = *Panicum compositum* L.).
dubius Kunth, (= *Echinochloa dubia* R. et S. = *Panicum dubium* Steud.), ⊙. w. Coromandel.
hirtellus RBr., R. et S. (= *Echinochloa hirtella* Schult. = *Milium undulatifolium* Mch.).
loliaceus P. B., Spgl. (= *foliaceus* P. B. = *latifolius* Haenke herb. = *Panicum loliaceum* Lam.).
undulatifolius R. et S., Kunth, Spgl. (= *Panicum Burmanni* MB. = *P. hirtellum* All., non L., Wulf. = *P. undulatifolium* Ard.).
B. Echinochloa PBr.
colonus H. B. K., β) P. zonale Guss.
echinatus Kunth, Spgl. (= *crus pavonis* H. B. K. = *Ehinochloa composita* Presl, = *E. crus pavonis* Schult. = *E. echinata* P. B. = *Panicum Crus galli* L. var. ε Steud. = *P. echinatum* W. = *P. muricatum* Hornem.).
hispidulus Kunth, (= *Orth. Retzii* Spgl. = *Echinochloa hispida* Schult. = *Digitaria hispidula* W. Enum. = *Panicum Crus galli* L. var. ζ Steud. = *P. hispidulum* Retz, = *P. hispidum* Forst.).
Zu ergänzen p. 563.

Opoidia Lindl., Opoidie, V. II., Umbelliferae.
galbanifera Lindl., Galbangebende, 4. f. b. k. Persien. *Oporanthus* Herb., *Clusianus* Herb., *colchiciflorus* Herb., *exiguus* Herb., *luteus* Herb. et var. *angustifolius* Herb., v. Sternbergia Clusiana, colchiciflora etc., p. 788.

Oporinia Don, autumnalis Don, DC., pratensis Less., v. Leontodon, Sect. II., p. 453.
Opsianthes gauroides Lilja, v. Clarkia gauroides, p. 202.

Opuntia T., v. p. 563 et Cacteae p. 874 et 99, II.

Orbignya Mart., Endl., (A. d'Orbigny, Reisender in Südamerika), XXI. VI. (VI. I.), Palmae.
Cuci Kunth, brasilianische, ħ. w. Brasilien. (Ob kult.?) *Orchidium* Sw., *americanum* Steud., *arcticum* Sw., v. Calypso americana et borealis, p. 150.
Orchidocarpum Mchx., *arietinum* Mchx., *grandiflorum* Mchx., *parviflorum* Mchx., *pygmaeum* Mchx., v. Asimina triloba, grandiflora etc., p. 88.

Orchis T., L., Knabenkraut (Kukuksblume).
acuminata Dsf. (= *lactea* Poir. = *militaris* var. Poir. = *parviflora* Tenore).
cassidea MB. (= *coriophora* MB., Pall.), haubiges, 4. Kn. f. Taurien.
condensata Dsf. (= *pyramidalis* Lk.), gedrängtähriges, 4. Kn. f. b. k. Nordafrika, Italien.
cordigera Fr. (= *cruenta* Roch.), herzförmiges, 4. Kn. f. Carpathen, Nordeuropa.
foliosa Soland., non Mass., blattreiches, 4. Kn. k. Madeira.
formosa Stev. (= *mutabilis* Stev.), schönes, 4. Kn. f. Ostcaucasus.

Digitized by Google

Orchis

hybrida Boenningh. (= *fusca plur.* Auct., non Jacq. = *militaris* L. var.), Bastard-K., 4. Kn. f. Deutschl.

incarnata L. (= *latifolia* Rchb.), fleischfarbiges, 4. Kn. f. Mittel- und Nordeuropa.

α) latifolia Fr., non L., *β*) angustifolia Fr. (Wimm. et Grab.), c) alba.

latifolia L. (= *majalis* Rchb.), *β*) atropurpurea Tausch, *γ*) carnea, *δ*) longebracteata Schm., *ε*) conica Lindl. (= ? *haematodes* Rchb.).

longicornu Poir. (= *picta* Loisel.).

macra Lindl. (= *tephrosanthos* Bicheno), grofses, 4. Kn. f. England.

mascula L., *γ*) speciosa Host, (= *signifera* Vest).

pallens L. (= *sulphurea* Curt.).

provincialis Balb., *β*) Cyrilli Tenore, (= *pallens* Savi, = *pauciflora* Tenore).

sambucina L., *β*) rubra Schlchr. (= *Schleicheri* Swt. = *mixta β* Retz, = *incarnata* Auct., non L.).

Simia Lam. (= *cinerea* Schrk., Schlchr. = *militaris* Sm. = *Smithii* Swt. = *tephrosantha* Vill. = *zoophora* Thuill.), ?*β*) galeata Lam. (= *mimusops* Thuill.).

taurica Lindl. (= *pyramidalis* MB., non L.), taurisches, 4. Kn. f. b. k. Taurien.

Traunsteinerii Saut. (= *angustifolia* Rchb. = ? *strictifolia* Opiz).

undulatifolia Bivone, (= *Simia* Lam. var. Spgl. = *tephrosanthos β undulatifolia* Bot. reg.).

abortiva L., v. Limodorum abortivum, p. **464**, *albida* Sw., v. Leucorchis albida, p. **356**, II., *alpina* L., v. Chamorchis alpina, p. **187**, *dilatata* Pursh, (= *acuta* Banks, = *agastachys* Fisch.), *fuscescens* Pursh, (= *herbiola* RBr.), *orbiculata* Pursh, *virescens* Zollik., Gaud., v. Platanthera dilatata, herbiola, orbiculata, chlorantha, p. **633**, *foliosa* Sw., v. Bonatea foliosa, p. **173**, II., *Hostii* Trat. (= *Nicodemi* Cyril.), *odoratissima* L., *pauciflora* Fisch., *tridentata* W. (= *clavellata* Mchx.) etc., v. Gymnadenia humilis, odoratissima, pauciflora, tridentata etc., p. **370** et p. **276**, II., *flexuosa* Sw. (= *undulata* Poir.), v. Schizodium flexuosum, *globosa* L., v. Traunsteineria globosa, *grandiflora* Heyne, *filicornis* Thonn., Schum., ? *foliosa* Sw. etc., v. Habenaria rotundifolia, filicornis, alata etc., p. **373** et p. **279** et **280**, II., *nigra* Sw. (= *miniata* Crtz.) et *suaveolens* Vill., v. Nigritella angustifolia et suaveolens, p. **548**, *Monorchis* Crtz., Scop., All., v. Herminium Monorchis, *parviflora* W. (= *secundiflora* Bertol. = *densiflora* Dsf.), v. Himantoglossum secundiflorum, p. **301**, II., *pectinata* Thbg., v. Bartholina pectinata, p. **114**, *viridis* Sw. (= *virens* Scop.), v. Peristylus viridis.

Oreodaphne N. E., Felsenlorbeer, IX. 1., Laurineae.

bullata N. E. (= *Laurus bullata* Burch., p. **449**, = *Quercus africana* Barrow).

cernua N. E. (= *Laurus nutans* Hornem.), übergebogener, ħ. w. Martinique.

coriacea N. E. (= *Laurus coriacea* Sw., p. **449**).

Digitized by Google

Oreodaphne
exaltata N. E. (= *Laurus exaltata* Sw., p. 449, = *Persea exaltata* Spgl.)
foetens N. E. (= *Laurus foetens* Ait., p. 449, = *L. maderensis* Lam. = *Perseu foetens* Spgl.).

Oreodoxa W., Felsenpalme, XXI. x. (VI. III.), Palmae.
acuminata W., zugespitzte, ♄. w. Südamerika.
oleracea Mart. (= *Areca oleracea* L. = *Euterpe caribaea* Spgl.), kohlgebende, ♄. w. Antillen, Caribäen.
regia H. B. K. (= *Oenocarpus regius* Spgl.), königliche, ♄. w. Cuba.
Sancona H. B. K. (= *Oenocarpus Sancona* Spgl.), Sancona-F., ♄. w. Südamerika.

Oreomyrrhis eriopoda Endl, v. Caldasia eriopoda, p. 106, II.
Orcophila apargioides Don, (= *picroides* Don), v. Achyrophorus apargioides, p. 7, II.
Oreoselinum Hoffm., *album* Hoffm., v. Silaus longifolius, *caucasicum* MB., v. Imperatoria caucasica, p. 315, II., *austriacum* Hoffm. (= *montanum* Hoffm. = *nigricans* Hoffm.), *Chabraei* MB. (= *podolicum* Bess.), *dahuricum* Bess., *staphobescum* Delarb., *humile* Bess., *latifolium* MB., *legitimum* MB. (= *nigrum* Delarb.), *rablense* Hoffm. (= *elegans* Hoffm.), v. Peucedanum austriacum, Chabraei, dahuricum, Cervaria, humile, latifolium, Oreoselinum, rablense, p. 610, *pyrenaeum* Hoffm., v. Angelica pyrenaea, p. 60.
Orfilea Sabadilla Desf., v. Xerophyllum Sabadilla, p. 860.
Oriba Adans., *palmata* Auct, *sylvestris* Wender. etc., v. Anemone palmata, sylvestris etc., p. 59.
Oribasia Schreb., *officinalis* Gmel., *racemosa* Gmel., *violacea* Gmel., v. Nonatelia officinalis, racemosa, violacea, p. 549.

Origanum T., L., Dosten.
compactum Benth. (= *glandulosum* Salzm., non Dsf.), dichter, 4. ♄. Nordafrika.
heracleoticum L. (= *creticum* Sieb. = *glandulosum* Dsf. = *smyrnaeum* Sm., Sibth., non L.).
β) parviflorum d'Urv.
hirtum Lk., *α*) genuinum Vog., *β*) prismaticum Vog. (= *oblongatum* Lk.).
paniculatum K. (= ?*smyrnaeum* Sibth., Sm.). Südeuropa, Griechenland.
sipyleum L. (= *hybridum* Mill.).
virens Lk. et Hoffm. (= *oblongatum* Lk. = *thymiflorum* Rchb. = *viride* W. herb. = *vulgare* var. Benth., Endl.).
vulgare L., *α*) vulgatissimum Endl., b) bracteis viridibus, floribus albidis Vog., *β*) prismaticum Gaud., Endl. (= *heracleoticum* Endl., Rchb. = *creticum* L. = ?*latifolium* Mill.), b) bracteis viridibus, floribus albidis Vog. (= *macrostachyum* et *megastachyum* Lk. = *creticum* Hayne), *γ*) humile Poir., *δ*) micranthum Colla, Hortul., orientale Mill., stoloniferum Bess., venosum W. herb. sind ebenfalls = mit der Hauptart oder nur Varietäten.
Unbestimmtere: punctatum Poir., salviaefolium Roth, Tragoriganum Zuccag.

Digitized by Google

Origanum

benghalense Burm., v. Pogostemon plectranthoides, p. 639, *calcaratum* Juss. (= *Tournefortii* Ait.) et *Dictamnus* L., v. Amaracus Tournefortii et Dictamnus, p. 29, II., *aristatum* Walt., *flexuosum* Walt., *incanum* Walt., v. Pycnanthemum aristatum, linifolium et incanum, p. 668.

Hinsichtl. der übrigen s. Majorana, p. 381 et 382, II.

Orithyja D. Don, (= *Orythyja* Auct.), Steratulpe, VI. 1., Coronariae-Tulipaceae.

biflora Kunth, (= *Tulipa biflora* L. suppl., p. 827). An der Wolga, Iberien.

β) byzantina (Clus.), *γ*) uniflora (Schrk.).

nutans Trautv. (= *Gagea uniflora* Turcz. = *Ornithogalum uniflorum* Bess., non Laxm. = *Tulipa altaica* Bess., nec Gmel.), nickende, 4. Zw. f. Sibirien.

oxypetala D. Don, Kunth, (= *Ornithogalum oxypetalum* Ledeb. = *Tulipa heteropetala* Ledeb.), spitzkronenblätterige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

uniflora D. Don, Sweet, (= *Gagea uniflora* Schult., p. 341, = *Ornithogalum uniflorum* Laxm. = *Tulipa altaica* Gebl.), einblumige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

Orium lanuginosum Desv., v. Clypeola eriophora, p. 207.

Ormiscus pendulus Spach, *tenuisiliqua* Eckl., Zeyh., v. Heliophila pendula et tenuisiliqua, p. 291, II.

Ormocarpum P. B., sennoides DC. (= ? *cassioides* Desv.).

Ornithidium Salisb., Vogelstendel.

parviflorum H. angl., kleinblumiger, 4. w. ? Mexico.

album Hook., v. Camaridium album et ochroleucum, p. 151 et p. 110, II.

Ornithochilus Wall., Vogellippe(orche).

fuscus Wall. (= *Aerides difforme* Wall., Lindl.), braune, 4. w. Ostindien.

Ornithogalum T., Vogelmilch.

I. Euornithogalum.

afrum Zucc., africanische, 4. Zw. k. Aegypten.

altissimum L. (= *giganteum* Jacq. = *Drimia altissima* Ker).

arcuatum Stev. (= *narbonense* Stev., non L.), bogenförmige, 4. Zw. f. Caucasus.

caudatum Ait. (= *corniculatum* H. Belved. = *Massoni* Gmel.), *β*) foliis variegatis R. et S.

collinum Gussone, (= *comosum* Sadl.), Hügel-V., 4. Zw. f. Sicilien, Dalmatien.

comosum L. [1])

contortum Tenore, gedrehte, 4. Zw. f. Neapel.

crenulatum Thbg. (= *unifolium* Retz, non Ker). Ecklonii Fisch. et Mey., p. 884.

exscapum Tenore, (= *minus* Bory et Chaub. = *pauciflorum* Rafin. = ? *siculum* Ucria), schaftlose, 4. Zw. f. Italien, Frankreich, Griechenland.

β) nanum H. Neapol.

? exuviatum Kunth, (= *Anthericum exuviatum* Jacq. = *Albuca exuviata* Ker), *β*) minus R. et S.

---

1) Nach Visiani gehören hierher collinum Rchb., garganicum Tenore, saxatile Visiani und tenuifolium Gussone.

Digitized by Google

Ornithogalum

filifolium Kunth, (= *Anthericum filifolium* Jacq. = *Albuca filifolia* Ker, p. 27).

filifolium Ledeb., fadenförmige, 4. Zw. f. Altai.

fragrans Kunth, (= *Anthericum fragrans* Jacq. = *Albuca fragrans* Jacq. = *A. fugax* Ker, p. 27).

garganicum Tenore, (= *saxatile* Visian.), garganische, 4. Zw. Dalmatien, Apulien, Sicilien.

Granatelli Parlatore, Granatelli's, 4. Zw. f. Sicilien.

Gussoni Tenore, (= *tenuifolium* Guss., non Redout.), Gussone's, 4. Zw. f. Neapel, Sicilien.

lanceolatum LaBill., lanzettliche, 4. Zw. k. Syrien.

marginatum Lindl., berandete, 4. Zw. Asiat. Türkey (Bosphorus).

montanum Cyrillo, (= *patulum* Rafin. = *umbellatum* L. var. Spgl.), bergliebende, 4. Zw. f. Neapel, Sicilien.

nanum Sm. (= *umbellatum* β *minus* Wahlbg.), zwergige, 4. Zw. f. Griechenland.

narbonense Dodon., L. (= *pyramidale* Visian., non L. = *lacteum* Vill. = *Scilla montana* Savi), β) caucasicum Endl.

nervosum Burch., nervige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

orthophyllum Tenore, geradblätterige, 4. Zw. f. Neapel.

praetextum Stev., ungewisse, 4. Zw. f. ?

pyrenaicum L. (= *flavescens* Lam. = *narbonense* Bertol. = *Stellaris erecta* Mch.), β) tauricum Endl.

refractum Kit. (= *umbellatum* L. var. Visian.).

ruthenicum P. C. Bouché, russische, 4. Zw. f. Brandenburg, ? Rufsland.

stachyoides Ait. (? excl. Synon. p. 569). Griechenland, Kleinasien.

sulphureum R. et S., Bertol., Rchb. (= ? *pyrenaicum* Lang, = *pyrenaicum* β Lam., DC., Roch. = *pyrenaicum* β *flavescens* Duby, = *stachyoides* Hort. = *Anthericum sulphureum* W. K., p. 64, = *Phalangium sulphureum* Poir. = *Scilla sylvestris* Savi), schwefelgelbe, 4. Zw. f. Ungarn, Illyrien, Italien, Schweiz, Frankreich.

Thunbergii Kunth, (= *Anthericum filifolium* Thbg. = *A. nematodes* R. et S.), Thunberg's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

? tuberosum Mill., knollige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

vittatum Kunth, (= *Albuca vittata* Ker, p. 27).

II. Myogalum Lk. (= *Albucea* Rchb.).

arabicum (L. spec.), DC. gall. Mittägl. und Westl. Europa, Nordafrika.

aureum (Curt.), (= *dubium* Houtt. = *thyrsoides* α Ait.), β) flavissimum Jacq.

Bouchéanum Kunth, (= *O. undulatum* Bouché), Bouché's, 4. Zw. f. ?

coarctatum Endl. (Jacq.).

flavescens Endl. (Jacq.), (= *arabicum* Redout. = *aureum* γ W. = *thyrsoides* Jacq. β Kunth), gelbliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

miniatum Jacq. (= *aureum* α W. = *flavescens* β Poir.), mennigrothe, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

nutans Lk. (L.), (= *hyalinum* Grenier, = *Albucea nutans* Rchb.).

thyrsoides Endl. (Jacq.), α) albidum Kunth, (= *arabicum* L. pro parte (excl. syn.) = *Grimaldiae* Nocca,

Digitized by Google

Ornithogalum
= *thyrsiflorum* Hort.), β) petalis subserratis Hornem. Hafn.
unifolium Ker, (= *nanum* Broter. = *Scilla unifolia* L. spec.), β) concinnum Salisb. (= *roccense* Lk.).
virens Lindl.
III. Chlorogalum Kunth.
divaricatum Kunth (Lindl.), ausgespreitzte, 4. Zw. k. f. b. Californien.
pomeridianum Kunth, (= *Anthericum pomeridianum* Ker, p. 64, = *Phalangium pomeridianum* Don, Swt. = *Scilla pomeridiana* DC.).
abyssinicum Hort. (= *albucoides* H. Par.), v. Albuca abyssinica, p. 27, *anthericoides* Lk., v. Urginia anthericoides, *autumnale* Lam. etc., v. Scilla autumnalis etc., p. 731, *capense* L., v. Eriospermum latifolium, *carolinianum* Hort. (= *bivalve* L.) et *gramineum* Sims, v. Nothoscordum striatum et striatellum, p. 439, II., *chinense* Lour. et *japonicum* Thbg., v. Barnardia scilloides, p. 113 et B. japonica, p. 60, II., *chloroleucum* Lindl. (= *gramineum* Poepp., non Sims), v. Scilla chloroleuca, *hirsutum* L., v. Hypoxis erecta, *ixioides* Ait., v. Calliprora lutea, p. 148, *maritimum* Lam., Brot. (= *Squilla* Ker), v. Squilla maritima, *nanum* Thbg., *punctatum* Thbg., *undulatum* Thbg., v. Eucomis nana, punctata et undulata, *speciosum* Rafin., *squamosum* Lam., v. Scilla peruviana et Lilio-Hyacinthus', p. 732, *serotinum* L. (= *altaicum* Laxm. = *striatum* W.), v. Lloydia serotina, p. 470 et p. 366, II., *uniflorum* Laxm., *oxypetalum* Ledeb., v. Orithyja uniflora et oxypetala.
Ornithoglossum Salisb. (= *Lichtensteinia* W., p. 460, non Cham., Schltdl.), Vogelzüngel, VI. III., Colchicaceae (Melanthaceae-Veratreae).
glaucum Salisb. (= *viride* Ait. = *Cymation laevigatum* Spgl. = *Lichtensteinia laevigata* W. = *Melanthium viride* L. suppl.), blaugrünes, 4. k. t. Cap d. g. H.
Lichtensteinii Schltdl. (= *undulatum* Spgl. = *Cymation undulatum* Spgl. = *Lichtensteinia undulata* W.), Lichtenstein's, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Ornithopodium Adans., All., *compressum* Mch., *scorpioides* All. (= *triphyllum* Mch.), v. Ornithopus compressus, p. 569 et Arthrolobium scorpioides, p. 46, II.
Ornithopus L., perpusillus L., β) intermedius Roth, (= *roseus* Dufour, = *sativus* Broter.). Hinsichtl. d. übrigen (Sect. II. p. 570) s. Arthrolobium, p. 46, II.
Ornithorynchium syriacum Röhl., v. Euclidium syriacum.
Ornithosperma serotina Rafin., v. Pharbitis serotina.
Ornithoxanthum Lk. = Gagea.
Ornithrophe Cobbe W. (= *asiatica* Hort.), *Cominia* W. (= *panigera* LaBill.), *occidentalis* W., *Schmidelia* P., *serrata* Roxb. (= *aporetica* Roxb.), v. Schmidelia Cobbe, Cominia, occidentalis, racemosa, serrata, p. 730.
Ornus Mch., P., Blüthenesche.
europaea P. (= *florifera* Hort. = *Fraxinus florifera* Scopol. = *F. paniculata* Mill. = *F. monspeliensis* Hort. = *F. Theoprasti* Duham.).

Digitized by Google

Ornus

obliqua (Tausch), (= *americana* Nutt. = *Fraxinus obliqua* Tausch, = *F. Pseudo-Ornus* Steud.), schiefblätterige, ♄. f. Nordamerika.

rotundifolia Mch., Lk. (= *mannifera* Hort. = *Fraxinus calabrica* Auct. = *F. halepensis* Auct. = *F. mannifera* Hort.).

Orobanche T., Sommerwurz, Hanfwürger.

arenaria Borckh. (= *coerulea* Auct. = *comosa* Wallr. = *laevis* Ehrh. = *purpurascens* Jacq.).

arvensis Dumort., Acker, ⊙. f. Belgien.

Avellanae Pfund, Haselnufs-S., 4. f. Böhmen.

caryophyllacea Sm., *δ*) torquata Rchb.

Cirsii Fr., Distel-S., 4. f. Schweden.

condensata Moris, (= *foetida* Bivon. = *speciosa* Moris), gedrängtblumige, 4. f. Dalmatien, Italien, Nordafrika.

Epithymum DC. (= *paradoxa* K. = *Serpylli* Vauch.).

foetida Dsf. (= *barbata* Brot. = *fusca* Lam. = *major* *β* Vahl, = ?*pubescens* Urv.), stinkende, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

fragrans K., wohlriechende, 4. f. Oestreich.

gallica Grenier, französische, 4. f. Frankreich.

Hederae Duby, Epheu-S., 4. f. Westdeutschl., Frankr.

labellata Dum. (= *gracilis* Wallr., non Sm.), kleinlippige, 4. f. Deutschland, Belgien.

loricata Rchb. (= *Artemisiae campestris* Gaud. = *elatior* et *gracilis* Schlchr. = *major* Bull.).

lucorum A. Br., Hain-S., 4. f. Baiern.

major L., grofse, 4. f. Schweiz, England, Spanien.

medicaginis Duby, (= *minor* var. *glaberrima* Gaud. = *racemosa* Schlchr.), Schneckenklee-S., 4. f. Schweiz, Frankreich.

nudiflora Wallr. (= *minor* Vahl, = *rigens* Lois.), nacktblumige, 4. f. Nord-, Mittel- und Südeuropa.

ramosa L. (= *Cannabis* Vauch.).

Rapum Thuill. (= *Cytisi scoparia* Vauch. = *foetida* Duby).

Scabiosae K. (= *platystigma* Rchb.).

variegata Wallr., bunte, 4. f. Deutschland, Italien.

Orobella vicioides Presl., v. ?Orobus atropurpureus *β*.

Orobus T., Walderbse.

I. Genuinus.

atropurpureus Dsf., *β*) siculus Rafn. (= *Rafinesquii* Presl).

aureus Stev., goldfarbige, 4. f. Taurien.

canescens L. suppl. (= *angustifolius* Vill. = *ensifolius* Lapeyr. = *filiformis* Lam. = *gracilis* Gaud. = *graminifolius* Becker, = ?*linifolius* Wender. = *setiformis* Schlchr. = *vicioides* Vill. = ?*Lathyrus attenuatus* Vivian.), b. fl. pleno.

coccineus Mill., scharlachfarbige, ♄. w. Vera Crux. (Kaum kultivirt u. zweifelhaft).

Denhardtii Tenore, Denhardt's, ?⊙. f. Neapel.

flaccidus Kit. (= *pauciflorus* Hort. = *stipulaceus* Hook. = *uninervius* Turczn. = *venosus* W. herb.), schlaffe, 4. f. Croatien, Sibirien.

Gmelini Fisch. (= *luteus* *β* *orientalis* Fisch. et Mey.).

hirsutus L., b) glabriusculus H. Pertopol.

intermedius Ledeb., mittlere, 4. f. Alt. Sibirien.

Digitized by Google

Orobus

Jordani Tenore, Jordani's, 4. f. Neapel.

laevigatus W. K., glatte, 4. f. Ungarn, Krain.

longifolius Nutt. (= *Psoralea longifolia* Pursh), langblätterige, 4. f. Missouri.

luteus L. (= *montanus* Scop. = *Tournefortii* Lapeyr.).

pisiformis Maund et ? Wender. (= *sylvestris* Wender.).

stenophyllus Steud. (= *Gmelini* Weinm., non Fisch.), dünnblätterige, 4. f. Sibirien.

subvillosus Ledeb.. wenigzottige, 4. f. Alt. Sibirien.

tuberosus L., γ) prostratus Host.

variegatus Tenor. (= *ruscifolius* W. herb. = *serotinus* Presl, = *vernus* β *ruscifolius* Sering. = *versicolor* MB.).

vernus L., c) albus, d) fl. pleno, e) azureus, f) Gezellei, g) roseus, h) ruber, i) speciosus Hort.

versicolor Gmel., b) lutescens, c) virgatus.

II. Platystylis Swt., p. 634.

cyaneus Stev.

digitatus MB. (= *pyrenaicus* Pall. = *sessilifolius* Sibth., Sm.).

Unbestimmtere: alpinus Hort., Merghelynckii Hort., purpureus Hort., repens Hort., semperflorens Hort. (= ? *canescens* L. suppl.), Smouthii, superbus.

Orontium P., non L., *arvense* P., *Asarina* P., *calycinum* P., *majus* P. etc., v. Antirrhinum Orontium, Asarina etc., p. 66.

Orostachys Fisch., *chlorantha* Fisch. (= *spinosa* Swt.), *malacophylla* Fisch., *serrata* Swt., *thyrsiflora* Fisch., v. Umbilicus spinosus, Malacophyllum, serratus etc., p. 830.

Orphium E. Mey., Orphium, V. 1., Contortae-Gentianeae.

frutescens E. Mey. (= *Chironia frutescens* L. = *Roeslinia frutescens* G. Don), strauchiges, ♄. t. Cap der guten Hoffnung.

β) decussatum Mey. (= *Chironia decussata* Vent. = *Roeslinia decussata* G. Don), γ) angustifolium Griseb. (= *Chironia caryophylloides* L. = *C. angustifolia* Curt. = *Roeslinia angustifolia* G., Don, = *C. frutescens glabra* Cham., Schltdl.), δ) orthostylis Griseb. (= *Chironia orthostylis* Rchb.). Vergl. p. 191.

Orsina camphorata Bertol., v. Jasonia glutinosa, p. 430.

Orthocarpus Nutt., Geradfrucht, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.

I. Triphysaria Benth., Fisch. et Mey.

erianthus Benth. (= *Triphysaria versicolor* Fisch. et Mey.), wollblumige, ⊙. f. Neucalifornien.

floribundus Benth., blüthenreiche, ⊙. f. Neucalifornien.

gracilis Benth., schlanke, ⊙. f. Neucalifornien.

II. Orthocarpus (genuinus) Benth.

hispidus Benth., steifhaarige, ⊙. f. Oregongebiet.

luteus Nutt. (= *strictus* Benth.), gelbe, ⊙. f. Nordam.

III. Oncorrhynchus Fisch. et Mey.

australis Benth. (= *Castilleja laciniata* Hook. et Arn. = *Oncorrhynchus pinnatifidus* Lehm. = *O. tenellus* Fisch. et Mey., p. 558), südliche, ⊙. ♂. f. k. Peru, Chili.

Digitized by Google

Orthocarpus

purpurascens Benth. (= *Physocheilus variegatus* Nutt.), purpurfarbige, ⊙. f. Neucalifornien.

Orthocentron glomeratum Cass., v. Cirsium polyanthemum, p. 199.

Orthopogon RBr., v. Oplismenus Sect. I.

Orthoselis pilosa Spach, v. Heliophila pilosa.

Orthosiphon Benth., Röhrenbasilicum, XIV. 1., Labiatae.

glabratus Benth. (= *Ocimum suffruticosum* Schum. = *O. Thonningii* Schum. = *O. thymiflorum* Roth, = *Plectranthus menthoides* W. herb. = *Pl. thymiflorus* Spgl.), kahler, ♂. ? 4. w. Ostindien, Arabien, Madagascar.

incurvus Benth., einwärtsgekrümmter, 4. w. Ostindien.

rubicundus Benth. (= *Lumnitzera rubicunda* Spgl. = *Plectranthus rubicundus* Don), röthlicher, 4. w. Ostindien.

Oryza L., Reifs.

perennis Mch., Dsf. (= *sativa* var. Desv.), ausdauernder, ♂. 4. w. ?

sativa L. (= *communissima* Lour.), ε) pumila Hort., ζ) rubribarbis Desv., η) emarginata Desv., ϑ) elongata Desv., ι) sorghoides Desv.

Oryzopsis Rich., Mchx., Reifsspelze.

asperifolia Rich. (= *Urachne asperifolia* Trin. = *U. leucosperma* Lk.).

melanocarpa Mühlbg. (= *asperifolia* Kunth ex parte, = *Milium racemosum* Sm. = *Piptatherum nigrum* Torrey, = *Urachne melanosperma* Lk. = *U. racemosa* Trin.), schwarzfrüchtige, 4. f. Nordamerika.

parviflora Nutt. (= *Milium pungens* Torr. = *Panicum firmum* Kunth, = *Stipa canadensis* Poir. = *S. juncea* Mchx. = *Urachne brevicaudata* Trin.), kleinblumige, 4. f. Nordamerika.

setacea Rich. (= *Stipa bicolor* β N. E. = *St. ovata* Trin. = *St. panicoides* Lam. = *St. setacea* Rich. = *Urachne setosa* Trin.), borstige, 4. w. Chili, Brasilien.

Osbeckia L., Osbeckie.

aspera Blume, (= *glauca* Benth. = *Melastoma asperum* L., p. 506).

canescens Grah., weifsgrauliche, ħ. w. Brasilien.

chinensis L., Spgl. (= ? *Melastoma osbeckioides* Ker).

Simsii DC. (= *Melastoma osbeckioides* Sims), Sims's, ħ. w. Mauritius.

stellata Don, (= *septemnervia* Hamilt.), β) stenosepala.

Oscaria chinensis Lilja, v. Primula praenitens, p. 656.

Oskampia trichotoma Mch., v. Nonnea lutea, p. 549.

Osmanthus Lour., Duftölbaum, II. 1., Sapotaceae-Oleineae.

fragrans Lour. (= *Olea fragrans* Thbg.), wohlriechender, ħ. t. k. Japan, China, Cochinchina.

Osmithopsis camphorina Less., v. Osmites camphorina, p. 573.

Osmophytum cochleatum Lindl., *lancifolium* Lindl., *marginatum* Lk., Kl., Otto, *radiatum* Lindl., v. Epidendron cochleatum, lancifolium etc., p. 223, II.

Digitized by Google

Osmorhiza Rafin., DC., Duftwurzel, V. II., Umbelliferae.

brevistylis DC. (= *Myrrhis Claytoni* Torr. = *Urospermum hirsutum* Bigel.), kurzgriffelige, 4. f. Nordam.

longistylis DC. (= *Myrrhis Claytoni* Mchx. = *M. longistylis* Torr. = *Scandix dulcis* Mühlbg. = *Urospermum Claytoni* Nutt.), langggriffelige, 4. f. Nordamerika.

Osmunda T., Traubenfarrn.

glaucescens Lk. (= *Claytoniana* H. Berol. excl. syn.), blaugrünlicher, k. f. b. Nordamerika.

gracilis Lk., schlanker, 4. f. b. k. Nordamerika.

palustris Schrad.

Osteomeles ferruginea H. B. K., v. Eriobotrya cordata, p. 229, II.

Osteospermum L., Beinsame.

coriaceum DC. (= *pisiferum* Burm., non L.), lederartiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

bipinnatum Thbg., *coeruleum* Jacq. (= *pinnatifidum* L'Her.), v. Garuleum bipinnatum et viscosum, p. 255, II., *perfoliatum* L., v. Venidium perfoliatum.

Osyris L., Osyris.

quadrifida Salzm. (= *lanceolata* Steud. et Hochst.), vierspaltige, ♄. k. Nordafrika.

alba Roch., non L., v. Thesium elegans, p. 807, *rhamnoides* Scop., v. Hippophae rhamnoides, *Schoberi* Pall., v. Nitraria Schoberi.

Otandra Salisb., Ohrstendel, XX. I., Orchideae.

cernua Salisb. (= *Cistella cernua* Blume, = *Geodorum dilatatum* RBr. = *Limodorum recurvum* Roxb. = *Malaxis cernua* W.), übergebogener, 4. w. Ostindien.

Othonna L., Cass., Othonna.

amplexifolia DC. (= *perfoliata* Jacq. hort., non L.), stengelumfassende, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

carnosa Less. (= *Cineraria cacalioides* Thbg.), fleischige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

cheirifolia L. (= *calthoides* Mill.).

cylindrica DC. (= *tenuissima* Haw., non L. = *Cacalia cylindrica* Lam., p. 151, = *Cineraria filifolia* Thbg. p. 884).

dentata L. (= *bulbosa* β L.), gezahnte, 4. ♄. Kn. k. Cap d. g. Hoffn.

digitata Thbg., L. fil. (= *bulbosa* γ L. = *Doria digitata* Less.).

quinquedentata Thbg., fünfzähnige, ♄. k. Cap d. g. H.

tuberosa Thbg. (= *bulbosa* L., W. α), knollige, 4. ♄. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

crassifolia L., v. Hertia crassifolia, p. 296, *ericoides* L., *Tagetes* L., v. Gamolepis ericoides et Tagetes, *retrofracta* Jacq., v. Doria retrofracta Nachl. *virginea* Thbg. (= *flabellifolia* Lodd.) et *linifolia* Burm. (= *tenuissima* L. = *speciosa* Spgl., Hort.), v. Euryops virgineus et tenuissimus, p. 239, II. *Otidia* Lindl., Swt., *alternans* Swt., *carnosa* Swt., *ceratophylla* Hffg., *dasycaulon* Eckl., Zeyh., *laxa* Swt., v. Pelargonium Sect. XI. alternans Wendl. etc., p. 601.

Otochilus Lindl., Oehrchenlippe, XX. I., Orchideae.

alba Lindl. (= *Broughtonia pendula* Wall.), weiſse, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Otochilus

fusca Lindl. (= *Broughtonia amoena* Wall.), braune, 4. w. Ostindien.

porrecta Lindl., hervorgestreckte, 4. w. Ostindien. (Ob eingeführt?)

Otostegia Benth., Ohrfaden, XIV. 1., Labiatae.

scariosa Benth. (= *Clinopodium fruticosum* Forsk. = *Moluccella scariosa* RBr. = *Phlomis moluccoides* Vahl), trockenhäutiger, ħ. w. Arabien, Abyssinien.

Ototropis sambuensis N. E., v. Dollinera sambuensis, p. 209, II.

Ottonia Spgl., Jaborandistrauch, (= *Serronia* Gaudich.), (Fr. Otto, ehem. Inspector d. botan. Gartens etc. zu Berlin), II. III., Piperaceae.

Anisum Spgl. (= *Jaborandi* Kunth, = *Serronia Jaborandi* Gaudich., Guillem.), ächter, ħ. w. Brasilien.

eucalyptifolia Kunth, schönnützenblätteriger, ħ. w. Brasilien.

laeta Kunth (= *Piper citrifolium* Lk. = *P. Hoffmannseggianum* R. et S.), freudiger, ħ. w. Brasilien.

b) Enckea Kunth.

glaucescens Endl. (= *Enckea glaucescens* Kunth, = *Piper glaucescens* Jacq. fil.), blaugrünlicher, ħ. w. Vaterland unbekannt.

plantaginea Endl. (= *Enckea plantaginea* Kunth, = *Piper medium* Jacq. = *P. plantagineum* Lam., p. 629), wegetrittähnlicher, ħ. w. Antillen Mexico.

unguiculata * (= *Enckea unguiculata* Kunth, = *Piper celtidifolium* Dsf., H. Par.? = *P. discolor* Balbis, = *P. dubium* A. Dietr.? = *P. terminale* H. B. K. = *P. unguiculatum* R. et P., p. 629), nagelförmiger, ħ. w. Peru.

Ourisia Commers., Juss., Ourisie, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

I. Ourisia Poepp. et Endl. (genuina).

magellanica Juss., G. fil. (= *Chelone rwelloides* L. fil. Suppl.), magellanische, 4. k. Magellanische Meerenge.

II. Dichroma (Cav.), Endl. et Poepp.

coccinea P. (= *Dichroma coccinea* Cav.), scharlachfarbige, 4. k. Chili (südl. Anden).

Oustropis microphylla Don, v. Lotus microphyllus, p. 478.

Ovieda L., Burm., *inermis* Burm. (= *mitis* L.), v. Clerodendron Siphonanthus, p. 205.

Ovieda Spgl., *anceps* Spgl., *corymbosa* Spgl., *Fabricii* Spgl., *falcata* Spgl., *fasciculata* Spgl., *fissifolia* Spgl., *silenoides* Spgl., v. Lapeyrousia anceps etc., p. 445.

Oxalis L., Sauerklee.

Acetosella L., γ) subpurpurascens DC. (= *lilacina* Hort.).

alata Mart., Zuccar. (= *ciliata* Spgl. = *mandioccana* γ *rhomifolia* DC.), geflügelter, 4. ħ. w. Brasilien.

Andrieuxii H. Cels., Andrieux's, 4. Kn. k. ? Mexico.

arcuata Jacq. (= *glandulitheca* Salisb.).

articulata Savigny, gegliederter, 4. Kn. k. t. Montevideo.

Barrelieri Jacq. (= *cajanifolia* St. Hil. = *cytisoides* Zuccar.), ?⊙. Brasilien.

bifolia Page, zweiblätteriger, 4. Zw. Cap d. g. Hoffn.

bifurca Lodd. (= ?*fuscata* Lodd.), zweigabeliger, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Oxalis

campestris Mart., Zuccar. (= *melilotoides* Zuccar.), Feld-S, ⊙. m. f. Brasilien.

caprina Thbg. (= *erecta* Thbg., Savigny).

conorrhiza Jacq., kegelwurzeliger, 4. Kn. k. Paraguai.

corniculata L. (= *Dillenii* Sieb. = *prostrata* Haw. = *monadelpha* Roxb. = *pusilla* Salisb. = *repens* Thbg., Jacq. = *Oxys lutea* Lam.), *β*) lupulina H. B. K., *γ*) pilosiuscula H. B. K. (= *humistrata* W. herb. = *micrantha* Boy. = *Lyoni* Pursh), *δ*) villosa M. B., *ε*) longepedunculata H. Berol.

crassicaulis Zuccar. (= *crenata* Dougl. = *Arracacha* G. Don, Hortul.), dickstengeliger, 4. Kn. k. f. h. Mexico, Peru.

crenata Jacq. (excl. syn. p. 575), ⊙. f. Peru.

Deppei Loddig. (= *esculenta* Otto et Dietr. = *tetraphylla* Lk. et Otto, non Cav.). Kn.

Dillenii Jacq., *β* florida Salisb. (= *glauca* Rafin. = *prostrata* Haw.).

discolor Kl., verschiedenfarbiger, 4. Kn. Mexico.

divaricata Mart., Zuccar., ausgespreitzter, ⊙. m. f. Brasilien.

Ehrenbergii Schltdl., Zuccar., Ehrenberg's, 4. Kn. k. Mexico.

eriorrhiza Zuccar. (= *autumnalis* St. Hil.), wollwurzeliger, 4. Kn. k. t. Montevideo.

exaltata Jacq., hoher, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

fabaefolia Jacq., *α*) alba Endl., *γ*) discolor Endl.

fontana Bunge, Quellen-S., ⊙. f. Nordchina.

grandifolia DC. (= *macrophylla* H. B. K., non Hornem. = *umbrosa* W. herb.), gröfstblätteriger, 4. Kn. t. Neuandalusien.

Hernandesii Moç. Sess., Hernandes's, 4. Kn. k. Mexico.

heterophylla DC., verschiedenblätteriger, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

hirta L., *β*) hirtella Jacq. (= *hirsuta* Jacq. = *sessilifolia* L.).

humilis Thbg. (= *purpurea* Jacq. var. Thbg. = *variabilis* Lindl.), niedriger, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

javanica Blume, javanischer, 4. Zw. w. Java.

lanceaefolia Jacq., *β*) alba Endl.

lasiandra Zuccar., Grah., wollbeuteliger, 4. Kn. k. t. Mexico.

lasiopetala Zuccar., wollkronenblätteriger, 4. Kn. t. Montevideo.

laxa Hook., lockerer, ? 4. Kn. k. Chili.

lilacina Kl., lilafarbiger, Kn. k. Mexico.

litoralis Eckl., Zeyh. (= *tenella* Lodd.), Uferliebender, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lobata Sims, (= *perdicaria* Bertero, = *tenera* Lindl. = *Sassia perdicaria* Molin.).

Loddigesiana Eckl., Zeyh., Loddiges's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

lunulata Zuccar., mondförmiger, 4. Kn. k. Mexico.

macrogonya Jacq., grofssprossiger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

macrophylla Hornem. (= ? *caprina* Thbg. var. Spgl.), 4. Zw. Cap d. g. Hoffn.

maculata Dsf., gefleckter, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

macrorrhiza Gill., Hook., starkwurzeliger, 4. Kn. k. Chili.

Digitized by Google

Oxalis

Martiana Zuccar. (= *bipunctata* Hook. = *brasiliensis* Lodd. = *floribunda* Lk., Otto, = *spectabilis* Hort. = *urbica* St. Hil. = *violacea* Savigny).
megalorrhiza Jacq. (= *bicolor* Savigny).
micrantha Bertero, kleinblumiger, ⊙. f. Chili.
Mirbelii Dehnh., Mirbel's, ? 4. Kn. k. ?
Neuwiedii Zuccar. (= *polymorpha* var. *polyantha* Zucc.), Neuwied's, ♄. k. t. Brasilien, Mexico.
nudiflora Moç. Sess. (= *violacea* L. var.), nacktblumiger, 4. Kn. k. Mexico.
papilionacea Hoffg. (= *delta* Arrab. = *truncata* W. herb.), schmetterlingsförmiger, 4. Kn. t. Brasilien.
pentantha Jacq., fünfblumiger, 4. ♄. w. Südamerika.
praecox Lehm., früher, ? 4. Zw. k. ?
quinata Savigny, fünfzähliger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
quinquepunctata Dsf., fünfpunktiger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
rubrocincta Lindl., rothgesäumter, 4. Kn. k. Guatemala.
sarmentosa Zuccar., sprossender, 4. Kn. w. Brasilien.
Schiedeana Zuccar., Schiede's, 4. Kn. k. Mexico.
speciosa Jacq., β) sugillata Jacq.
tetraphylla Cav. (= *esculenta* Hort. = *sonata* Dumort.).
tortuosa Lindl. (= *glomerata* Hook., Arn.).
tuberosa Mol., knolliger, 4. Kn. f. b. k. Chili.
versicolor L., β) sylvestris W., γ) gracilis Jacq.
Vespertilionis Zuccar., fledermausförmiger, 4. Kn. k. Mexico.
Unbestimmtere: biflora Hort., ericoides H. Angl., piscularia H. Angl., quadrifida H. Angl. 4. Peru.

Oxyanthus DC., Spitzenblume.

hirsutus DC. (= *speciosus* Sims, non DC.), rauhhaarige, ♄. w. Sierra Leone.
tubiflorus DC. (= *speciosus* Ait., non DC. = *Gardenia tubiflora* Ait.), röhrenkronige, ♄. w. Sierra Leone.

Oxybaphus L'Her., p. 578.

chilensis Steud. (= *Calyxhymenia chilensis* Dsf.).

Oxybasis Karel. et Kiril., Spitzmelde, V. r., Aizoideae-Atripliceae.

minutiflora Karel. et Kiril, kleinblumige, ⊙. f. Soongaria.
Oxyceros chinensis Lour., v. Randia sinensis, p. 675.
Oxydenia attenuata Nutt., *filiformis* Nutt., *virgata* Nutt., v. Leptochloa mucronata, filiformis, virgata, p. 455 et p. 351, II.

Oxygraphis Bunge, Spitzranunkel, XIII. VI., Ranunculaceae.

glacialis Bunge, (= *Caltha glacialis* Spgl. = *Ficaria glacialis* Fisch., DC. = ? *Ranunculus camtschaticus* DC.), Gletscher-S., 4. f. Altaisch. Sibirien.

Oxylobium Andr., Schmalblatt.

dilatatum Benth., verbreitertes, ♄. t. k. Neuholland.
Hügelii ? Benth., Hügel's, ♄. t. k. Neuholland.
obovatum Benth., verkehrteiförmiges, ♄. t. k. Neuholl.
β) angustatum Meisn. (= *cuneatum* Benth.).
obtusifolium Sweet, (= *angustifolium* Cunn.).
ovalifolium Meisn., eiförmiges, ♄. t. k. Neuholland.
parviflorum Benth., kleinblumiges, ♄. t. k. Neuholland (Schwanenfluſs).
purpuratum H. belg., purpurfarbiges, ♄. t. k. Neuholl.
scandens Benth. (= *Chorozema scandens* Sm. = *Ch. Baxteri* Grah. = *Mirbelia Baxteri* Bot. reg. = *Po-*

Digitized by Google

Oxylobium

dolobium scandens DC., p. 639), β) humifusum Benth. (= *Podolobium humifusum* Don).

sericeum Benth. (= *? argenteum* Hort. = *Chorozema sericeum* Sm. = *Podolobium sericeum* DC.), seidenhaariges, ♄. t. k. Neuholland.

spectabile Endl., ansehnliches, ♄. t. k. Neuholland.

Oxymyrrhine J. C. Schauer, Schmal-(Spitz-)myrte, VIII. 1., Myrtaceae.

gracilis J. C. Schauer, schlanke, ♄. t. k. Neuholland.

Oxypetalum RBr., Spitzenkrönchen.

coeruleum Decaisn. (= *Tweedia coerulea* D. Don, ≐ *T. versicolor* Hook., p. 828).

riparium H. B. K. (= *O. Gothofreda* R. et S. = *Gothofreda cordifolia* Vent.), Uferliebendes, ♄. Sch. w. Neugranada.

Oxyphaeria Andr., v. Humea.

Oxypogon elegans Rafin., v. Lathyrus venosus, p. 449.

Oxypolis rigida Rafin., *tricuspidata* Rafin., v. Archemora rigida et tricuspidata, p. 42, II., *triquinata* Mchx. v. Angelica triquinata, p. 60.

Oxyspora DC., Spitzsame, VIII. 1. (X. 1.), Lythrariae-Melastomaceae.

paniculata DC. (= *Artrostemma paniculatum* D. Don, p. 85, = *Rhexia paniculata* Spgl.).

vagans Wall., zerstreuter, ♄. w. Ostindien.

Oxytropis DC., Wirbelkraut, (Kielschote).

aciphylla Ledeb., spitzblätteriges, ♄. f. b. Alt. Sibirien.

ampullacea P. (= *physodes villosa* DC. = *Astragalus ampullaceus* Pall.), flaschenförmiges, 4. f. Sibirien.

argyraea DC. (= *argyrophylla* Ledeb.).

brevicaulis Ledeb., kurzstengeliges, 4. f. Alt. Sibirien.

caespitosa P. (= *physodes glabra* DC. = *Astragalus caespitosus* Pall. = *A. vesicarius* Pall.), rasenartiges, 4. f. Dahurien.

campestris DC. (= *Astragalus campestris* L. = *Phaca campestris* Whlbg.), ε) sulfurea Fisch.

coerulea DC. (= *curvirostris* Turcz. = *Astragalus baicalensis* Pall. = *A. coeruleus* Pall.).

deflexa DC. (= *Astragalus deflexus* Pall. = *A. hians* Jacq. = *A. parviflorus* Lam. = *A. retroflexus* Pall.).

floribunda DC. (= *Fischeri* DC. = *longicuspis* Ledeb. = *tenella* DC. = *teres* DC. = *versicolor* Fisch. = *Astragalus floribundus* Pall. = *A. teres* Spgl.), blüthenreiches, ♂. 4. f. b. Altaisch. Sibirien, Tatarei.

intermedia Bunge, mittleres, 4. f. Altaisch. Sibirien.

lanata DC. (= *Astragalus dasyphyllus* Pall. = *Phaca lanata* Pall. = *P. sibirica* L. fil.), wolliges, ♄. f. b. Sibirien.

leptophylla DC. (= *Astragalus leptophyllus* Pall., non Dsf.).

nigrescens Fisch. (= *Astragalus nigrescens* Pall.), schwärzliches, 4. f. Sibirien.

oligantha Bunge, wenigblumiges, 4. f. Altaisch. Sibirien.

pumila Fisch. (= *inaria* Ledeb., non DC.), kleines, 4. f. Altaisch. Sibirien.

soongarica DC. (= *Astragalus soongaricus* Pall.), β) caudata DC., Ledeb. (= *Astragalus caudatus* Pall. = *A. spicatus* Pall.).

Digitized by Google

Oxytropis

sordida DC. (= *campestris* β K. = *montana* var. DC.? *Atragalus sericeus* α Lam. = *A. sordidus* W. = *A. tyrolensis* Sieb. = *A. uralensis* Vahl), schmuzigfarbiges, 4. f. b. Norwegen, Schweiz, Tyrol.

squamulosa DC. (= *leucopodia* Ledeb. = *Astragalus squamulosus* Poir.), kleinschuppiges, 4. f. b. Dahurien.

stenophylla Bunge, (= *pumila* Ledeb.), schmalblätteriges, 4. f b. Altaisch. Sibirien.

subverticillaris Ledeb., fastwirtelförmiges, 4. f. b. Altaisches Sibirien.

sulphurea Ledeb., non Fisch., p. 579.

sylvatica DC. (= *Astragalus sylvaticus* W. = *A. sylvicolus* Pall. = *Phaca sylvatica* Pall.), Wald-W., 4. f. Dahurien, Sibirien.

tragacanthoides Fisch., traganthähnliches, ♄. f. b. Altaisches Sibirien.

triphylla P. (= *Astragalus triphyllus* Pall.), dreiblätteriges, 4. f. Inseln des Baicalsee's, Dahurien.

uralensis DC. (= *Astragalus uralensis* L.), β) sericea DC. (= *Atragalus uralensis* Jacq. = *A. velutinus* Sbr. = *Phaca uralensis* Whlbg.), γ) pumila Ledeb.

vaginata Fisch. (= *? floribunda* DC.), scheidiges, 4. f. b. Altaisches Sibirien.

alpina H. Dorpat., v. ? Phaca alpina, p. 611.

Oxyura DC., Spitzhülle.

Douglasii E. Mey. (= *chrysanthemoides* Hort., non DC. = *Calliglossa Douglasii* Hook., p. 875).

Ozophyllum foetidum Räusch. (= *trifoliatum* W.), v. Tricorea foetida.

Ozothamnus RBr., Strauchdosten.

diosmaefolius DC. (= *ericifolius* Cunn. = *Gnaphalium diosmaefolium* Vent. = *G. piluliferum* Hort. = *G. rosmarinifolium* Spgl. = *Helichrysum diosmaefolium* Less., Don, = *Metalasia diosmaefolia* et *rosmarinifolia* Auct.), göttergeruchblätteriger, ♄. t. Neuholland.

reticulatus DC. (= *Chrysocoma reticulata* LaBill. = *Faustula reticulata* Cass. = *Gnaphalium reticulatum* Spgl. = *Helichrysum reticulatum* Less.), netzförmiger, ♄. t. Van Diemens Land.

Pachira alba Parlat., *aquatica* Aubl. (= *? nitida* H. B. K.), *grandiflora* Tussac, Juss., *insignis* Savign., v. Carolinea tomentosa, princeps, grandiflora et insignis, p. 167 et p. 122, II.

Pachydendron Haw., v. Aloe, Sect. V. b. p. 26. II. et p. 35.

Pachycarpus crispus E. Mey., v. Gompholobus crispus.

Pachylepis Less., DC., Dickschüppchen, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

Kalmii Less. (= *Hieracium Kalmii* L. non Symons, = *Sclerolepis Kalmii* Monn.), Kalm's, ☉. f. Nordamer.

Pachylepis juniperoides Brogn., v. Taxodium juniperoides, p. 799.

Pachylophia Nuttalliana Spach, v. Oenothera caespitosa, p. 554.

Pachyneurum Bunge, Dicknervler, XV. 11., Cruciferae.

grandiflorum Bunge, (= *Braya Meyeri* Bunge, Ledeb. = *Draba grandiflora* C. A. Mey. = *Eutrema piliferum* Turcz.), grofsblumiger, ♂. 4. f. Altaisch. Sibirien.

Digitized by Google

Pachyphyllum H. B. K., Dickblatt, XX. 1., Orchideae.
distichum H. B. K., zweizeiliges, 4. w. Peru.

Pachyphytum Lk., Kl., Otto, Dickkraut, X. IV., Corniculatae-Crassulaceae.
bracteosum Lk., Kl., Otto, deckblätteriges, 4. ♄. w. t. Mexico.

Pachypleurum Ledeb., Dickrippler, V. II., Umbelliferae.
alpinum Ledeb., Alpenbewohnender, 4. f. Alt. Sibirien.
β. *simplex* Rchb., v. Gaya simplex, p. 878.

Pachypodium Lindl. (= *Belonites* E. Mey.), Dickfüßler, V. 1., Apocyneae.
bispinosum A. DC. (= *glabrum* G. Don, = *Echites bispinosa* Thbg. = *Belonites bispinosa* E. Mey.), zweistacheliger, ♄. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.
succulentum Lindl., A. DC. (= *tomentosum* G. Don, = *Belonites succulenta* E. Mey. = *Barleria rigida* Spgl. = *Echites succulenta* Thbg.), saftiger, ♄. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.
tuberosum Lindl. (= *Echites tuberosa* Haw.), knolliger, ♄. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.
β) Loddigesii A. DC.
Pachypodium Webb et Berth., *Columnae* Webb et Berth., Endl., *erysimoides* Webb et Berth., *pannonicum* Endl., v. Sisymbrium Sect. Columnae, erysimoides, pannonicum, p. **761**, **762**.

Pachypterygium Bunge, (= *Pachypteris* Karel. et Kiril.), Dickflügler, XV. 1., Cruciferae-Isatideae.
lamprocarpum Bunge, glanzfrüchtiger, ⊙. f. Soongaria.
multicaule Bunge, Karel. et Kiril., vielstengeliger, ⊙. f. Samarkand.

Pachyrachis H. Cels., Dickspindel, XX. 1., Orchideae.
Pinelliana H. Cels., Pinelli's, 4. w. Brasilien.

Pachyrrhizos Rich., Dickwurzler.
mollis Hassk., weicher, ♄. Sch. Kn. w. Java.
Pachysa G. et D. Don, *ardens* Don, *baccans* Don, *formosa* Don, *glomiflora* Don, *Lambertiana* Don, *physodes* Don, *Vernix* Don, (= *aristata* Don), *vesicularis* Don, v. Erica ardens, baccans, formosa, reflexa etc.
Pachysandra coriacea Hook., v. Sarcococca pruniformis, p. **722**.
Paddingtonia Hort., v. Piddingtonia Sect. IX. Lobelia, p. **473**.
Padus Mill., Mch., *avium* Mill. (= *germanica* Borckh. = *vulgaris* Host), *caroliniana* Mill., *eglandulosa* Mch., *Laurocerarus* Mill., *Mahaleb* Borckh., *nana* Borckh., *serotina* Borckh. (= *virginiana* Mill.), *virginica* Borckh. (= *oblonga* Mch.), v. Prunus Padus, caroliniana, lusitanica etc., p. 660.

Paederia L., Knackbeere.
Lingua Bojer, (= *Lygodysodea Lingua* Bojer), zungenförmige, ♄. w. Mauritius.
tomentosa Blume, filzige, ♄. ♄. w. Java.
Valli-kara Juss. (= *Hondbessen* Adans. = *Reussia tomentosa* Dennst.), malabarische. ♄. ♄. w. Malabar.
Paederota sibirica, *virginica* Walp., v. Veronica Sect. sibirica et virginica, p. **844**.

Paeonia T., Paeonie, Pfingstrose.
albiflora Pall. (= *edulis* Salisb. = *sinensis* Hort.). Varietäten: alba patens van Houtte, alba rubrotincta

Digitized by Google

Paeonia

van Houtte, amabilis grandiflora v. Houtte, amabilis lilacina Buyck, amabilis speciosa v. Houtte, anemoneflora striata Guérin, bicolor Buyck, bicolor triumphans v. Houtte, Buyckii v. Houtte, centripetala roseo-alba v. Houtte, claptoniensis Hort. belg., diversiflora Makoy, Duchesse de Nemours Guérin, elegans Guérin, elegans superbissima Buyck, festiva Hort belg., formosa Lémon, fragrans Hort., globosa amoena Buyck, globosa grandiflora alba plena Buyck, globosa grandiflora carnea plena Lémon, grandiflora Hort. belg., grandiflora nivea plena Lémon, grandiflora major Hort. belg., Hericartiana Guérin, Humei et alba et superba Hort., latipetala rosea v. Houtte, lilacina plenissima Buyck, lilacina plena v. Houtte, lilacina elegans et superba v. Houtte, Lowii Hort. belg., lutea variegata Guérin, nivalis Buyck, odorata Lémon, papaveriflora Lémon, plenissima rosea superba et variegata v. Houtte, Pottsii Hort., prolifera tricolor Lémon, pulcherrima Hort. belg., Queen's perfection et Victoria Hort. angl., Reevesii Sabine, Reine hortense Guérin, Reine des roses Guérin, Rosalba v. Houtte, rosea alba striata v. Houtte et amabilis Buyck, et delicatissima v. Houtte, et dilecta et lilacina et ligulata elegantissima et luteola elegantissima et pallida pulchra v. Houtte, rosea plenissima superba Buyck et speciosa et speciosissima et spectabilis et triumphans odorata v. Houtte, Rose de Gendbrugge v. Houtte, Rose double de Flandre v. Houtte, rubicunda albomarginata v. Houtte, rubescens amabilis Hort. belg., speciosa plena et striata Hort. belg., sulphureo-rosea v. Houtte, tricolor flavescens Buyck et grandiflora Buyck et grandissima v. Houtte, tricolor roseo-lilacina Buyck et extra Buyck, triumphans extra Buyck et rosea v. Houtte, variegata plenissima extra v. Houtte, versicolor extra Buyck et lutescens v. Houtte, Victoire Modeste Guérin, Victoire tricolor van Houtte, violacea grandiflora Guérin, Whitleji Hort angl. etc. etc., *β*) trichocarpa Bunge.

anomala L. (= *laciniata* Pall. = *lobata* Pall. = *quinquecapsularis* Pall. = *sibirica* Pall.), b) rosea plena.

arietina Anders., Andr. (= *cretica* Auct.), *α*) Andersonii DC., *β*) carnea DC.

banatica Rochel, (= *corallina* Pollini, non Retz, = *rosea* Host), banatische, 4. Kn. f. Banat, Croatien, Oberitalien.

Broteri Boiss. et Reut. (= *officinalis* Brotero), Brotero's, 4. Kn. f. Spanien, Portugal.

Brownii Dougl., Hook. (= *californica* Dougl.), Brown's, 4. Kn. f. Nortwestl. Amerika.

commutata Wender. (= *officinalis* L. var. Hort.), verwechselte, 4. Kn. f. ?

corallina Retz, (= *foemina* Mill. = *integra* Murray, = *mascula* Dsf. et Mill. = *officinalis β* L. = ? *triternata* Pall.).

coriacea Boiss. lederartige, 4. Kn. f. Spanien.

corsica Tausch, (= *paradoxa β leiocarpa* DC.), corsicanische, 4. Kn. f. Corsica.

Digitized by Google

Paeonia

decora Anders., Andr., β) elatior DC. (= *byzantina* Clus., Hort.)

elegans Sabine, zierliche, 4. Kn. f. ?

erecta Sabine, aufrechte, 4. Kn. f. ?

fimbriata H. angl., gewimperte, 4. Kn. f. Kleinasien.

flavescens Presl, (= *cretica* Bot. reg.), gelbliche, 4 Kn. f. Sicilien.

fulgida Sabine, leuchtende, 4. Kn. f. ?

humilis Retz, β) hirsuta Mill. (= ?*villosa* Dsf.).

intermedia C. A. Mey. (= *laciniata* Sievers), mittlere, 4. Kn. f. Sibirien.

lanceolata Salm Dyck, (= *foemina* Dsf.), lanzettförmige, 4 Kn. f. ?

lobata Dsf. (= *lusitanica* Mill.), gelappte, 4. Kn. f. Portugal.

macrophylla Sabine, grofsblätterige, 4. Kn. f. ?

microcarpa Salm Dyck, kleinfrüchtige, 4. Kn. f. ?

Moutan Sims, Variet. u. Hybrid.: alba simplex sericea v. Houtte, carnescens plenissima v. Houtte, Delachei H. belg., Duchesse d'Orléans Makoy, Fürstin Metternich v. Houtte, Imperatrice Joséphine Makoy, Liliputiana Hort., Napoleoniana Hort. gall., nivea fl. pleno, phoenicea fl. pleno odorato H. belg., purpureo-violacea superba Hort. belg., regia Makoy, rosea Hort. (plenissima) rosea Elisabethae Makoy, rosea plenissima Casoretti, rosea purpurea et superba Makoy, rosaeolens H. Gallor., Rosa gallica et Rosa mundi Hort. belg. et gall., rubescens, Triomph de Malines v. Houtte (pyramidale van Kiel), Triomph de Vandermaelen v. Houtte, Victoire Mathieu. etc. β) papaveracea Audr., Var.: alba plena Makoy, fimbriata carnea plena Hort., leodiensis H. belg., multiplex Makoy, Ottonis Hort., semiplena Hort.

multifida Salm Dyck, vieltheilige, 4. Kn. f. ?

officinalis L. spec. α, Retz, W. (= *foemina* Desf. = *mascula* Mill. = *nemoralis* Salisb. = *rubra* Hort.). Var.: alba pura fl. pl. Hort., anemoneflora fl. pl. Hort., carnea Hort., carnea plena Hort., Carolina Hort., exaltata Jacques, fimbriata rubra Hort., humilis latifolia Hort., lucida Hort., maxima-rosea plena Jacques, mutabilis alba Hort., nivea plenissima Hort, pallida Hort, papaveracea Smouth, papaveriflora Hort., paradoxa fimbriata Hort., rosea plena et pallida plena Jacques, rotundiflora fl. simpl. Jacques, sublineata fl. simpl. Jacques, subviolacea fl. simpl. Jacques., fol. variegat. et flore roseo pleno Smouth etc.

paradoxa Andrs., Andr. (= *peregrina* α DC. = *promiscua* Lobel., Rchb.), c) fimbriata plena Jacques.

peregrina Mill., DC. γ. (= *officinalis* plur. Auct., non Hort.).

subternata Salm Dyck, fastdreizählige, 4. Kn. f ?

tenuifolia L., Var. u. Hybrid.: daucifolia Hort., rubra plena Hort., Smouthii v. Houtte, Van de Wieli Hort.

triternata Pall. (= *daurica* Andr. = *rotundifolia* Hort.), b) flore pleno Hort., c) staminea simplex Jacques.

villosa Sweet, b) fl. albo Hort belg.

Wittmanniana J. Booth, Bot. reg., Wittmann's, 4. Kn. f. Caucasus.

Digitized by Google

Palafoxia Lagasca, Palafoxie.

fastigiata Less. (= *Hymenopappus integrifolius* Spgl. = *Paleolaria fastigiata* Less. = *Polypteris integrifolia* Nutt.), gipfelständige, 4. f. Nordamerika.

Palava scabra H. Bonpl., v. Saurauvia excelsa, p. 723.

Palavia Cav, Palavie.

malvaefolia Cav. (= *declinata* Mch. = *Malope parviflora* L'Her.).

moschata Cav. (= *prostrata* Hort.).,

Paleolaria carnea Cass, *fastigiata* Less., v. Palafoxia linearis et fastigiata.

Paleya albida Cass., v. Barkhausia albida, p. 870.

Palicourea Aubl., Palicourie.

Pavetta DC. (= *Cestrum nervosum* Mill. = *Pavetta pentandra* Sw. = *Psychotria Pavetta* Sw.), Pavettaähnliche, ħ. ħ. w. Jamaica.

pedunculosa DC. (= *cayennensis* Desv. = *Psychotria pedunculosa* Rich.), gestielte, ħ. ħ. w. Cayenne.

rigida H. B. K. (= *?strepens* Mart. = *Psychotria rigida* Bredemey, W., p. 663, = *P. byrsophylla* Spgl.).

Paliurus T., Stechdorn.

australis G. (= *aculeatus* Lam. = *clypeiformis* Medic. = *petasus* Dum. Cours. = *Spina Christi* Mill. = *P. vulgaris* Don, = *Rhamnus Paliurus* L. = *Zizyphus Paliurus* W.).

virgata Don, (= *Zizyphus incurvus* Bot. mag., non Wall. = *Z. virgata* Dietr.), p. 581.

Palladia atropurpurea Mch., v. Lysimachia atropurpurea, p. 485.

Pallasia capensis Houtt., v. Calodendron capense, p. 149.

Pallasia comosa Räusch., *caspica* L., v. Calligonum polygonoides et Pallasia, p. 147.

Pallenis spinosa Cass., v. Buphthalmum Sect. p. 139 et p. 92, II.

Palmaglossum Kl., Palmenzüngel, XX. 1., Orchideae.

crassifoliüm Kl., dickblätteriges, 4. w. Mexico.

Palmstruckia Retz fil., v. Chaenostoma, p. 134, II.

Panax L., Kraftwurz.

chrysophyllus Vahl, (= *Morototoni* Aubl. = *undulatus* P.).

digitatus Sweet, fingerförmige, ħ. w. Ostindien.

fragrans Roxb. (= *Aralia fragrans* Don, p. 71, = *Hedera fragrans* Spgl.).

Ginseng C. A. Mey. (= *coreense* Sieboldt, = *Schinseng* var. *coraiensis* N. E.), Ginseng-K., ħ. t. Corea.

japonicus C. A. Mey. (= *Schinseng* var. 2 *japonicus* N. E. = *Aureliana japonica* Sieboldt.), japanische, ħ. t. k. Japan.

Pseudo Ginseng Wall. (= *Schinseng* var. *nepalensis* N. E.), unächte Ginseng-K., ħ. t. Nepal.

simplex Forst. (= *simplicifolium* Dietr.), einfache, ħ. k. t. Neuzeeland.

speciosus W. (= *spinosus* Poir. = *undulatus* H. B. K.), prächtige, ħ. w. Südamerika.

trifolius L. (= *pusillus* Sims, = *Aralia triphylla* Poir.).

Panciatica purpurea Picc, v. Cadia purpurea, p. 142.

Pancratio-Crinum disticho-capense Herb., v. Crinum capense.

Digitized by Google

Pancratium L., Gilgen, (Machtlilie).

I. Hymenocallis Salisb. et Herb.

amoenum Salisb. (= *excisum* L. fil. = *fragrans* Redout. = *Hymenocallis sessilis* Salisb.).

caribaeum L. (= *declinatum* Jacq. = *fragrans* W. = *speciosum* Redout. = ? *americanum* Mill.).

carolinianum Catesb. (= *pluriflorum* Ker, = *Hymenocallis rotata quadriflora* Herb. = *Ismene Knigthii* Kn. et West.), carolinische, 4. Zw. Wa. k. f. b. Virginien, Carolina, Florida.

β) mexicanum Walt., L. (= *disciforme* Redout. = *rotatum* Ker, = *Hymenocallis lacera* Herb. = *H. mexicana* Herb. = *H. paludosa* Salisb.).

glaucum Zuccar., blaugrüne, 4. Zw. w. Mexico.

litorale Jacq. (= *Hymenocallis adnata* Herb. = *H. litoralis* Salisb.), α) Dryandri Ker, (= *P. mexicanum* Hort.), β) distichum Bot. mag. (= *Hymenoc. adnata disticha* Herb.), γ) acutifolium Sweet, (= *P. mexicanum* Lindl.), δ) Staplesii Herb.

ovalifolium (Herb.); eiblätterige, 4. Zw. w. Westindien.

ovatum Mill. (= *amboinense* β L. = *amoenum* Andr. = *Hymenocallis amoena* β *ovata* Herb. = *H. spiralis* Lee).

patens Redout. (= *declinatum* Redout.), β) Hymenocallis caymanensis Herb.

pedale Schult. (Herb.), fufshohe, 4. Zw. w. Brasilien.

quitoense Schult. (Herb.), quitoische, 4. Zw. w. Quito.

repandum (F. Otto), ausgeschweifte, 4. Zw. w. Mexico.

speciosum Salisb. (= *caribaeum* Curt. = *formosum* Hort. = *Crinum speciosum* Hort.), β) latifolium Mill.

tenuiflorum Herb., dünnblumige, 4. Zw. w. ? Südamerika.

tubiflorum Schult. (Herb.), röhrenblumige, 4. Zw. w. Guiana.

Aufserdem gehören zu dieser Abtheilung noch folgende: angustum Ker, expansum Sims, guianense Ker.

II. Schizostephanium Rchb.

aegyptiacum Lodd. (= ? *illyricum* Forsk.), aegyptische, 4. Zw. w. ? Aegyten.

illyricum L. (= *stellare* Salisb. = *Halmyra stellaris* Salisb.).

Hierzu die übrigen p. 582 verzeichneten Arten, welche unter voriger Abtheilung nicht erwähnt worden.

Zu welcher Section nachstehende gehören, ist mir unbekannt, als: abchasium Booth, guadelupense Hort., humile Cav., ornatum Bouché, parviflorum Dsf., Tagliabue Colla, uniflorum Don.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen Chlidanthus, Chrysyphiala, Eurycles, Ismene, Liriope und Stenomesson.

Pandanus L. fil., Schraubenbaum.

bromeliaefolius Lodd., Dsf., Bromeliablätteriger, ♄. w. Bourbon.

conoideus Pet. Th., kegelförmiger, ♄. w. Madagascar.

humilis Rumph, (= *montanus* Bory, = *polycephalus* Lam.).

maritimus Pet. Th., Meerstrandliebender, ♄. w. Mascarenas.

pygmaeus Pet. Th., zwergiger, ♄. w. Mascarenas.

reflexus Lodd., Dsf., zurückgebogener, ♄. w. Mascarenas (Bourbon), Ostindien.

Digitized by Google

Pandanus

sylvestris Rumph, (= *ceramicus* Rumph, = *conoideus* Lam.), wilder, ♄. w. Molucken.

utilis Bory, (= *odoratissimus* Jacq., non L. = *nudus* Pet. Thouars).

Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch folgende aufgeführt: amaryllioides Parment., Dsf., angustifolius Hort., graminifolius Hort. belg., mauritianus Hort. belg., proliferus Hort. belg., von welchen mir das Vaterland unbekannt ist. — P. fuscatus Hassk., Samak Hassk. auf Java heimisch, scheinen noch nicht eingeführt.

Panicum L., Hirse, Fennich.

aglutinans Kunth, (= *arborescens* Sieber, non L. = *divaricatum* var. Lam. = *glutinosum* Lam. = *orinocense* W.), anklebendes, 4. ♄. w. Südamerika.

altissimum DC., Hornem., non Mey., höchster, ⊙. f. ?

australe Spgl. (= *striatulum* Schult. = *striatum* RBr., non Lam. = *Paspalum patulum* Hornem.), neuholländischer, 4. k. Neuholland.

capillare Gronov., L. (= *strigosum* Mühlbg.), β) *philadelphicum* Bernh. (= *porphyrium* Trin.).

cayennense Lam. (= *floribundum* Rich. = *pedunculare* W. herb.), cayennischer, 4. w. Guiana, Brasilien.

denudatum Kunth, (= *Digitaria concinna* Schrad. = *D. denudata* Lk. = *Reimaria purpurascens* Lk., p. 680), nackter, 4. w. ? Südamerika.

eruciforme Sibth. (= *cruciforme* Auct.), raupenförmiger, ♂. 4. k. Griechenland.

Hoffmannseggii R. et S. (= *eriophorum* Lk. = *villosum* Hffmsg.), Hoffmannsegg's, 4. w. Brasilien.

jumentorum P., β) laeve Lam.

junceum N. E., simsenförmiger, ♄. w. Brasilien.

laxum Sw. (= *agrostidiforme* Raddi, = *diandrum* Kunth, = *tenuiculum* Mey.).

Maximiliani Schrad., Maximilian's, 4. w. Brasilien.

megiston Schult. (= *altissimum* Mey., N. E., non L. = *elatius* Kunth, non L. = *tuberculatum* Presl).

miliaceum L., c) aureum.

monostachyum H. B. K. (= *cultratum* Trin. = *Thrasya cultrata* N. E.), einähriger, 4. w. Orinoco.

monostichum H. Berol., einzeiliger, ⊙. m. f. Abyssinien.

muricatum Retz, (= *violaceum* Rottl. = *Isachne disparr* Trin. = *I. muricata* N. E.).

Myurus Lam. (= *amplexicaule* Rudge, = *caudatum* W. herb. = *interruptum* W. herb. = ? *Myosurus* Rich. = *Hymenachne amplexicaulis* N. E. = *H. Myosurus* N. E. = *H. Myurus* P. B.), mäuseschwanzähnlicher, 4. w. Südamerika.

nitidum Lam. (= *angustifolium* Trin. = *lacsolarium* Trin.).

pallens Sw. (= *agrostideum* Salzm. = *Agrostis nutans* Poir. = *Apluda Zeugites* Aubl. = *Vilfa nutans* P. B.), bleicher, 4. w. Westindien. Südamerika.

palmatifolium Poir. (= *plicatum* W. Enum. = ? Lam.), palmenblätteriger, 4 w. Ostindien.

paspaloides P. (= *affine* N. E. = *beckmanniaeforme* Mikan, = *brizoides* Lam. = *fluitans* Delil., Mey. = *truncatum* Trin. = *Digitaria affinis* R. et S. = *D. appressa* P. = *Paspalum appressum* Rich.), pfan-

Digitized by Google

Panicum

nengrasähnlicher, ⊙. 4. f. w. Nordafrika, Südamerika.

plantagineum Lk. (= *Leandri* Trin.), wegtrittähnlicher, ⊙. f. m. w. Brasilien.

prostratum Lam. (= ?*barbatum* Lam. = *caespitosum* Sw. = *grossarium* Auct., non L. = *marginatum* Vahl, = *procumbens* N. E. = *repens* Burm., Roxb. = *segiterum* Retz, = *Sieberi* Lk. = *subcordatum* Roth, = *umbrosum* Retz, = *Digitaria umbrosa* P. = *Echinochloa setigera* R. et S. = *Setaria barbata* Kunth, = *S. geniculata* Sieb. = *S. subcordata* N. E. = *S. umbrosa* P. B.), gestreckter, ♂. 4. w. Ost- und Westindien, Arabien, Aegypten.

pubescens Lam., Mchx. (= *angustifolium* Ell. = ?*consanguineum* Kunth, = *debile* Torr. = *Enslinii* Trin. = *hirsutum* β Lam. = *lanuginosum* Ell. = *laxiflorum* Lam. = *nitidum* Torr. = *pauciflorum* Bosc, = *pumilum* Bosc, = *velutinum* Bosc, = *villosum* Ell. ? Nutt. ?), weichhaariger, ⊙. f. Nordamerika.

pulchrum H. Berol., schöner, ⊙. f. Nepaul.

radicans Retz, (= *accrescens* Trin. = *hirsutum* Lam. = *multinode* Lam. = *obliquum* Roth, = *patens* Spgl., non L.), wurzelnder, 4. k. China, Nepal.

rectum R. et S. (= *depauperatum* Mühlbg. = *strictum* Pursh), gerader, ⊙. f. Pensylvanien.

Rudgei R. et S. (= *pilosissimum* Roth, = *scoparium* Rudge), Rudge's, 4. w. Südamerika.

scaberrimum Lagasca, (= ?*ligulare* N. E.), schärfster, 4. k. Mexico.

Schraderi Kunth, (= *bifasciculatum* Trin. = *fasciculare* Schrad. = *fasciculatum* Hort. = *Digitaria fascicularis* Lk. = *D. villosa* H. Vindob. = *Reimaria fascicularis* Lk.), Schrader's, ⊙. f. ?

stoloniferum Poir. (= *brachyclados* Rchb. = ?*caespitosum* Sw. = *frondescens* Meyer, = *olyraefolium* Raddi), sprossender, 4. w. Südamerika.

uncinatum Raddi (= *glandulosum* N. E. = *heteranthum* Lk. = *Echinolaena polystachya* H. B. K.), hakiggekrümmter, 4. w. Südamerika.

vimineum Schrad., ruthenförmiger, 4. w. Brasilien.

crusgalliforme Brotero, xiphostadeum Brotero, gehören wahrscheinlich zur Gattung Oplismenus Seet. Echinochloa, desgl. P. zonale Gussone, arborescens L. (= *glaucescens* Lam.), v. Ludolfia glaucescens, p. 479. Die übrigen anlangend siehe die Gattungen Cynodon, Digitaria, Oplismenus, Paspalum, Pennisetum et Setaria, Tricholaena.

Panke acaulis Molina, (= *tinctoria* Auct.), v. Gunnera scabra, p. 276, 11., *sonchifolia* W., v. Frankoa sonchifolia, p. 337.

Panopis hamelifolia Salisb., v. Rhopala sessilifolia, p. 686.

Panzeria canescens Bunge, *lanata* P. (= *tomentosa* Mch.), *multifida* Mch. (= *sibirica* Hort.), *tatarica* Hort. (= *tripartita* Mch.), v. Leonurus canescens, lanatus etc., p. 453 et p. 349, 11.

Papaver T., Mohn.

amoenum Lindl. (= *chinense* Hort.), lieblicher, ⊙. f. Nordostindien.

Digitized by Google

Papaver

apulum Tenore, apulischer, ⊙. f. Süditalien.

Argemone L. (= *clavigerum* Lam.), *β*) paucisetum H. Berol., *γ*) maritimum Wither.

argemonoides Cesati, argemoneähnlicher, ⊙. f. Italien.

caucasicum MB., *α*) genuinum, *β*) floribundum Dsf. (= *virgatum* Rees), *γ*) fugax Poir. (= *caucasicum* C. A. Mey.), *δ*) armeniacum Poir. (= *Argemone armeniaca* L.), *ε*) hispidum Dsf. (= *spectabile* Lk. = *ibericum* Hort.), *ζ*) persicum Hort. Dijon., *η*) ramosissimum H. Prag. Persien, Armenien, Caucasus.

croceum Ledeb. (= ? *alpinum* Sievers, = *alpinum δ croceum* Fisch. et Mey.), *β*) rubro aurantiacum Fisch. *γ*) microcarpum DC. (= *alpinum γ* Fisch. et Mey. = *miniatum* Rchb.).

dubium L. (= *parviflorum* Lam. = *segetale β* Spenn.), b) albiflorum.

gariepinum Burch. (= *aculeatum* Thbg.).

laevigatum MB. (= *glabellum* Stev. = *dubium β* Elkan).

nudicaule L. (= *alpinum α* Fisch. et Mey. = *radicatum* Rottb.).

pavoninum Fisch. et Mey. (= *hybridum* Karel. et Kiril.), Pfauen-M., ⊙. f. Soongaria.

somniferum L., A. seminibus nigris, *α*) setigerum DC., *β*) nigrum, B. seminibus albis, *γ*) album (= *officinale* Gmel. = ? *indehiscens* Dumort.), var. aegyptiacum Fisch. et Mey.

Gartenvarietäten: coccineum, Maximiliani H. Jenens., Murselli, tauricum etc. Zu ergänzen p. 585.

Papaya G., *Carica* G. (= *communis* Poir.), *cauliflora* Poir. etc., v. Carica Papaya etc., p. 166.

Pappophorum Schreb., Federgranne.

alopecuroideum Vahl, (= *Saccharum pappiferum* Lam.), fuchsschwanzähnliche, 4. w. Südamerika.

Papyrius Lam., *japonicus* Lam. (= *polymorphus* Cav.), v. Broussonetia papyrifera, p. 133.

Papyrus W. Thouars, H. B. [1]).

antiquorum W. (= *domesticus* Poir.).

Paranomus adiantifolius Salisb., *crithmifolius* Salisb., *sceptriformis* Salisb., v. Nivenia spathulata, spicata, media, p. 549.

Parapetalifera odorata Wendl., *serrata* Wendl., v. Barosma serratifolia et *β*, p. 114.

Parastranthus G. Don.

luteus DC. (= *simplex* G. Don).

variifolius G. Don, v. Lobelia Sect. VIII., p. 473.

Paratropia DC., Paratropie, V. v., Araliaceae.

terebinthinacea Arnot, (= ? *Hedera terebinthinacea* Vahl, = ? *Heptapleurum stellatum* G.), Terpentin-P., ħ. w. Ceylon.

Parietaria T., Glaskraut.

alsinefolia Delil., mierenblätteriges, ⊙. f. Aegypten.

cretica L. (= *bracteata* Mch.).

---

1) Zu dieser Gattung die wesentlich von Cyperus nicht verschieden ist, hat man außer den p. 586 verzeichneten Arten noch folgende Cyperi gestellt, als: P. comosus H. B. (= *Cyperus affinis* R. et S.), P. corymbosus N. E. (Rottb.), P. elegans Don (L.), P. latifolius W. (= *Cyperus eminens* Klein), P. madagascariensis W. (R. et S.), P. Pangorei N. E. (Rottb.), P. venustus N. E. (RBr.). Einige derselben werden kultivirt, vergl. p. 245 et p. 183, II.

Digitized by Google

Parietaria
diffusa M. et K. (= *judaica* Schkr. = *ramiflora* Mch.).
filiformis Tenore, fadenförmiges, ⊙. f. Insel Caprea.
arborea Ait., v. Gesnouinia arborea, p. 261, II., *prostrata* Spgl. (= *serpyllifolia* Poir.), v. Pilea serpyllifolia.
Parilium arbor tristis G., v. Nyctanthes arbor tristis, p. 551.

Paris L., Einbeere.
incompleta MB. (= *apetala* Hoffm. = *octophylla* Hoffm. = *Demidoria polyphylla* Hoffm.).
obovata Ledeb., verkehrteiförmige, 4. f. Sibirien.

Paritium Adr., Juss., St. Hil. (= *Pariti* Adans.), XVI. VIII., Malvaceae.
abutiloides G. Don, (= *Hibiscus abutiloides* W. = *pernambucensis* Bertol.).
gangeticum G. Don, (= *Hibiscus gangeticus* Roxb. = *Lampas* Cav.).
macrophyllum G. Don, (= *Hibiscus macrophyllus* Roxb., Hornem.).
tiliaceum Adr., Juss. (= *circinnatum* G. Don, = *Hibiscus cicirnnatus* W. = *guineensis* DC.).
β) elatum G. Don, (= *Hibiscus elatus* Sw.).
tricuspe G. Don, (= *Hibiscus tricuspis* Cav. = *hastatus* L. fil.).
Wrayae Walp. (= *Hibiscus Wrayae* Lindl.), Wraya's, ħ. t. w. Neuholland.

Parnassia T., Sumpfleberblume.
caroliniana Mchx. (= *americana* Mühlbg. = *ovata* Ledeb.).
grandiflora DC. (= *speciosa* H. angl.), grofsblumige, 4. f. b. Nordamerika.
palustris L. (= *europaea* P. = *vulgaris* Cours.).
β) pariflora DC., γ) tenuis Wahlbg.

Paronychia Adans., Juss., Nagelkraut.
arabica DC. (= *Corrigiola albella* Forsk. = *Illecebrum arabicum* L.), arabisches, ⊙. f. Arabien.
argentea Lam. (= *glomerata* Mch. = *hispanica* Lam. = *italica* Poir. = *narbonnensis* Poir. = *nitida* G. = *vulgaris* Dsf. = *Illecebrum italicum* P., Vill. = *I. narbonnense* Vill. = *I. Paronychia* L.), silberfarbiges, 4. k. Südeuropa.
bonariensis DC. (= *brasiliana* DC. = *Illecebrum brasilianum* Steud.), bonarisches, 4. k. t. Bonaria, Brasilien.
capitata Lam. (= *rigida* Mch.).
dichotoma Fenzl, non Nutt. (= *Anychia dichotoma* Rich., Mchx., p. 67, = *Queria canadensis* L.), β) capillacea Torr. (= *Anychia capillacea* DC., p. 870).
nivea DC. (= ? *arragonica* Schult. = *maritima* Auct. = *Illecebrum cephalotes* MB. = ? *I. maritimum* Vill. = *I. niveum* P.).
polycnemoides Schltdl. (= *ramosissima* Schltdl.), knorpelkrautähnliches, 4. k. Mexico.
Achyrantha Dsf., *ficoidea* Dsf., *frutescens* Dsf, v. Alternanthera Achyrantha, ficoides et frutescens, p. 40, *pubescens* DC., v. Herniaria pyrenaica, p. 296, II., *striata* DC., v. Polycarpon tetraphyllum, p. 641, *tenella* Dsf., v. Alternanthera tenella, p. 28, II., *verticillata* DC., v. Illecebrum verticillatum.

Digitized by Google

Parrotia C. A. Mey. (Parrot, k. russ. Hofrath u. Prof. zu Dorpat), V. (VII.) II., Hamamelideae.

persica C. A. Meyer, (= *Hamamelis persica* DC.), persische, ♄. f. Nordpersien, Caucasus.

Parrya RBr., Parrya.

stenoloma Schrenk et C. A. Mey., schmalsäumige, 4. f. Soongarien (Berg Tarbagatai).

Parsonsia corymbosa RBr. et *floribunda* RBr., v. Forsteronia corymbosa et floribunda, p. 246, II.

Parthenium luteum Spgl., Lk., v. Guizotia oleifera, p. 370.

Pascalia Ortega, Pascalie.

glandulosa Fisch., drüsige, ? 4. k. ?

baccata Spgl., v. Wulffia stenoglossa.

Pasithea Don, Pasithea, VI. 1., Liliaceae, Asphodeleae-Conanthereae Endl.

coerulea Don, (= *Anthericum coeruleum* R. et P. = *Phalangium coeruleum* Poir. = *Stypandra coerulea* RBr.), blaue, 4. k. Chili.

Paspalum L., Pfannengras.

barbigerum Kunth, (= *barbatum* N. E. = *Panicum excelsum* Spgl.), bärtiges, 4. w. Brasilien.

chrysotrichum Schrad., goldhaariges, 4. w. Brasilien.

commutatum N. E. (= *dissectum* L. syst. nec spec.), verwechseltes, 4. w. Brasilien.

conjugatum Berg. (= *ciliatum* Lam. = *supinum* Bosc, = *Panicum tenue* G.).

corcovadense Raddi, (= *lanceolatum* Mikan, Lk. = *plantagineum* N. E.), corcovadoisches, 4. w. Brasilien.

densum Poir. (= *millegranum* Schrad. = *virginicum Linnaeanum* Raddi, = *vulnerans* Salzm.), dichtes, 4. w. Brasilien.

dilatatum Poir. (= *ovatum* N. E. = *platense* Spgl. = *Selloi* Spgl. herb.), verbreitertes, 4. w. Montevideo.

β) eriophorum Schult. (= *lanatum* Spgl.).

dissectum L. spec. (= *Panicum dissectum* L.).

dubium DC. (= *pubescens* Hort. = *supinum* H. Hafn.).

elegans Flügge, *β*) robustum Lk.

exasperatum N. E. (= *aureum* H. B. K. = *Cabrera chrysoblepharis* Lagasca), rauhes, 4. w. Brasilien.

filiforme Flügge, (= *carolinianum* Poir. = *Agrostis jamaicensis* Poir. = *A. lenta* Ait. = *Axonopus paniceus* P. B. = *Digitaria filiformis* Mhlbg. = *D. pilosa* Mchx. = *D. villosa* P. = *Milium paniceum* Sw. = *Panicum filiforme* L. = *Syntherisma villosa* Walt.), fadenförmiges, ⊙. f. Nordamerika, Westindien.

glabrum Poir. (= *ischnocaulon* Trin.).

inaequale Lk. (= *Digitaria inaequalis* Spgl.), ungleiches, ⊙. f. Manilla.

incertum R. et S. (= *leptostachyum* DC. = *pubescens* Hort.), ungewisses, 4. w. ?

Lagascae R. et S. (= *ferrugineum* Trin. = *Meyerianum* Spgl. = *paniculatum* Lam. = *pubescens* Lagasca, = *quadrifarium* H. Berol. = *variegatum* Lk.), Lagasca's, 4. w. Havanna, Montevideo.

membranaceum Lam. (= *Commersonii* Zucc. = *elegans* Hort. = *Ceresia elegans* P. = *C. membranacea* P. B.).

paniculatum L. (= *compressicaule* Raddi, = *hemisphaericum* Poir. = *strictum* P.), rispiges, 4. w. Südamerika.

Digitized by Google

Paspalum

pulchellum H. B. K. (= *tristachyum* W. herb. = *Reimaria elegans* Flügge), schönes, 4. w. Südamerika.

scrobiculatum L. (= *Commersonii* Lam. = *coromandelinum* Lam. = *frumentaceum* Rottl. = *longifolium* Hort. = *venustum* Forst.).

undulatum Poir. (= *marginatum* Spgl. = *montevidense* Spgl. = *plicatulum* Mchx. = *plicatum* P. = *virgatum* Lecont.), wellenförmiges, 4. k. Nord- u. Südamerika.

velutinum Kunth, (= *Milium filiforme* Sessé, = *M. velutinum* DC.), sammthaariges, ⊙. f. Mexico.

Walterianum Schult. (= *membranaceum* Walt. = *vaginatum* Ell., non Sw.), Walter's, ⊙. f. Georgia.

Unbestimmt: polygonatum Brotero.

annulatum Flügge, v. Helopus annulatus Nachlese.

Passerina L., Spatzenstrauch.

annua Wickstr. (= *P Stellera* Ram. = *Stellera annua* Salisb. = *St. Passerina* L.).

calycina DC. (= *juniperifolia α* Lapeyr. = *Daphne calycina* Lapeyr.).

dichotoma Steud. (= *Stellera dichotoma* Fisch., Sweet), zweizinkiger, ⊙. f. Dahurien.

grandiflora L. fil. (= *uniflora β alba* Berg.).

spicata L. fil. (= *lateriflora* Wendl. = *Struthiola litoralis* Wendl.).

Unbestimmtere: cupressoides Hort., pubescens Wickstr. (= *Daphne pubescens* L. fil.), salsolaefolia Poir. *conglomerata* Thbg. (= *glomerata* Auct.), *eriocephala* Thbg., *purpurea* Wickstr., v. Lachnaea conglomerata, eriocephala, purpurea, p. 441, *uniflora* L., v. Cryptadenia uniflora, p. 173, II.

Passiflora L., Juss., Passionsblume [1]).

actinia Hook., actinienblumige, ♄. Sch. w. Brasilien.

alata Ait., b) Buonapartii H. gall. et belg., c) alato-coerulea Lindl.

alba Lk. et Otto, weifse, ♄. Sch. w. Brasilien.

bahiensis Kl., Bahia-P., ♄. Sch. w. Bahia.

bicornis Mill, zweihörnige, ♄. Sch. w. Carthagena.

brasiliensis Dsf., brasilianische, ♄. Sch. w. Brasilien.

capsularis L. (= *Granadilla capsularis* Medic.), kapselförmige, ♄. Sch. w. Westindien, Brasilien.

cephaleima Bory, kopfähnliche, ♄. Sch. w. Brasilien.

coerulea L., b) coeruleo-racemosa Sabine, c) angustifolia W. E. (= *stenophylla* Hffg.) etc.

---

1) Morren (Prof. d. Botanik zu Lüttich) berichtet in den Recherches littéraires sur les fleurs de la passion etc. im Bulletin de l'Academie royale des sciences etc. de Bruxelles: Dafs vor 1609 keine Passifloren in Europa kultivirt wurden, 1609 findet man P. incarnata in Bologna, 1625 in Rom, 1629 in England und 1682 in Belgien; 1625 kannte man P. coerulea. P. lutea (aus Virginien und Jamaika) ist 1640 in Padua, 1714 in England eingeführt worden; 1660 hatten die belgischen und holländischen Gärten schon P. hirsuta und minima, wovon die erste 1778, die zweite 1690 nach England kam. Im 17. Jahrhundert hatte man 5 Passifloren, im 18. Jahrhundert wurden 24 eingeführt, und im 19. Jahrhundert 46. Die Zeichen des Leidens Christi bemerkte man zuerst an der P. incarnata und der Jesuit Ferrari hat im 17. Jahrhundert am meisten dazu gedient diese Idee zu verbreiten. Die erste Abbildung von Passiflora ist von Joh. de Laet in Historia naturalis Brasiliae. Lugdun. Batav. 1698 nach der Zeichnung von Marcgrave, der 9 Arten entdeckte.

Digitized by Google

Passiflora

discolor Lk. et Otto, (= *Maximiliani* Bory, = *Vespertilio* Ker, non L.).
exsudans Zuccar., ausschwitzende, ħ. Sch. w. Mexico.
filamentosa Cav., b) odorata Hort.
Hermanni DC., Herrmann's, ħ. Sch. w. Curaçao.
hirsuta L., non Lodd. (= *parviflora* Sw.).
hispidula Knowl. et Westc., steifhaarige, ħ. Sch. w. ?
incarnata L. (= *rigidula* Jacq. fil. = *Granadilla incarnata* Med., Mch).
kermesina Lk. et Otto, b) Lemicheziana Neum. (kermesino-alata).
lancifolia Dsf., lanzettliche, ħ. Sch. w. Antillen.
litoralis Kunth, Seestrands-P., ħ. Sch. w. Peru.
lunata Sm., non Juss. (= *biflora* Lam. = *Vespertilio* Lawr., non L.).
minima L., Jacq. (= *glabra* Mill., non Wendl.).
Mooreana Hook., Moore's, ħ. Sch. w. Bonaria.
multiformis Jacq. fil. (= *caracasana* W. Enum.), vielgestaltige, ħ. Sch. w. Caracas.
phoenicea Lindl, hochrothe, ħ. Sch. w. Südamerika.
pseudo-suberosa Fisch., unächt-korkige, ħ. Sch. w. Brasilien.
Selloi Dehnh. (= ?*sanguinea* H. Berol. ? Colla), Sellow's, ħ. Sch. w. Brasilien.
sicyoides Cham., Schltdl. (= *odora* Lk., Otto), haargurkenähnliche, ħ. Sch. w. Mexico.
suberosa L. (= *hederaefolia* α Lam. = *nigra* Jacq. ? Lam. ? = *Cieca nigra* Medic. = *C. suberosa* Mch. = *Granadilla suberosa* G.).
subpeltata Ortega, fastschildförmige, ħ. Sch w. Neuspan.
theobromaefolia DC. (= *guazumaefolia* Jacq.), Cacaobaumblätterige, ħ. Sch. w. ?
tuberosa Jacq. (= *picta* Hortul. = *punctata* Lodd., non L.).
variegata Mill. (= *foetida* L. var. ?), bunte, ⊙. ♂. w. Westindien.
velutina DC., sammthaarige, ħ. Sch. w. Brasilien.
verruculosa Weinm., kleinwarzige, ħ. Sch. t. Neuholland.
verrucifera Lindl., warzentragende, ħ. Sch. w. Brasilien.
Vespertilio L. (= *Granadilla Vespertilio* Mch), fledermausblätterige, ħ. Sch. w. Südamerika.
violacea Jacq. fil., ? Arrabida, violette, ħ. Sch. w. Brasilien.
liinearis, longiglandulosa, microcarpa, Middletoniana (= *fragrans*), Neillii, Neumanni, nivea Stewardsiana, Wallichiana; sind wohl zum Theil Hybriden.
pinnatistipula Cav. (= *pinnipes* Sm.), v. Tacsonia pinnatistipula, p. 796.

Pastinaca T., Pastinac.

dasyantha C. K. (= *Malabeila dasyantha* F. et. Mey.), wollblumiger, ♂. Asiat. Rufsland.
dissecta Vent. (= *Sekakul* Russel).
divaricata Dsf. (= *graveolens* Salzm. = *Kochii* α Duby, = *sativa* Thomas, = *velutina* K.), ausgespreitzter, 4. f. Corsica.
intermedia Fisch. et Mey., mittlerer, ♂. 4. f. Asiat. Rufsland.
involucrata C. Koch, eingehüllter, ♂. 4. f. Armenien. (Ob kultivirt?)

Digitized by Google

Pastinaca
latifolia DC. (= *Kochii* var. *latifolia* Duby), breitblätteriger, 4. f. Corsica.
obtusifolia DC. (= *Ferula obtusifolia* Spgl. = *Peucedanum obtusifolium* Sib., Sm.), stumpfblätteriger, 4. f. Griechenland, Kleinasien.
panacifolia Fisch., Sweet, kraftwurzblätteriger, 4. f. Taurien.
rectistyla Cesati, (= *Heracleum aureum β multiradiatum* Cesati), geradegriffeliger, ♂. f. Italien, Griechenl.
selinoides Visiani, (= *Fleischmanni* Rchb., non Hladnik), silgenähnlicher, ♂. f. Dalmatien.
Patagonium hedysaroides Schrank, v. Adesmia muricata. p. 19.

Patrinia Juss., Patrinie.
heterophylla Bunge, verschiedenblätterige, 4. f. Nordchina.
intermedia R. et S. (= *nudiuscula* Fisch. = *Fedia intermedia* Hornem.).
sibirica Juss. (= *coronata* Fisch. = *Fedia sibirica* G., Vahl, = *F. ruthenica* Mirb., Sweet, = *Valeriana ruthenica* W. = *V. sibirica* L. = *Valerianella lutea* Mch.).
villosa Juss. (= *Fedia villosa* Vahl, = *Valeriana villosa* Thbg.), zottige, 4. f. b. k. Japan.
Patrisia pyrifera Rich., v. Ryanea speciosa, p. 709.
Pauletia Cav., *aculeata* Cav., *glaucescens* H. B. K., *inermis* Cav., *multinervia* H. B. K., v. Bauhinia Pauletia, glaucescens etc., p. 115.

Paulownia Sieboldt et Zuccar., (zu Ehren d. Königin von Holland so benannt), XIV. 11., Personatae-Scrofularineae-Digitaleae.
imperialis Sieb. et Zuccar. (= *tomentosa* Steud. = *Bignonia tomentosa* Thbg. = *Incarvillea tomentosa* Spgl.), kaiserliche, ♄. f. b. Japan.

Pavetta Rheed., L., Pavetta.
angustifolia R. et S. (= *indica* Burm. = *Ixora angustifolia* Lam.), schmalblätterige, ♄. ♄. w. Ostindien.
borbonica H. belg. et. gall., bourbonische, ♄. ♄. w. Mascarenas.
b) picta van Houtte.
Brunonis Wall. (= *mollis* Wall.), weiche, ♄. ♄. w. Ostindien.
caffra Thbg. (= *corymbosa* Houtt. = *thyrsiflora* Thbg. herb. = *Crinita capensis* Thbg. = *Ixora alba* Burm. = *I. caffra* Poir.).
fragrans Roxb., wohlriechende, ♄. ♄. w. Ostindien.
gracilis Rich., schlanke, ♄. ♄. w. Madagascar.
Griffithii ? Wall., Griffith's, ♄. ♄. w. Ostindien.
indica L. (= *alba* Vahl, = *Ixora Nunypapata* Roxb. = *I. paniculata* Lam. = *I. Pavetta* Roxb.).
odorata Blume, gutriechende, ♄. ♄. w. Java.
Opulina DC. (= *Chiococca Opulina* Spgl. = *Coffea Opulina* Forst.), wasserdoldenähnliche, ♄. ♄. w. Neu-Caledonien.

Pavia Boerh., Mill., Lam., Pavia.
macrostachya Lois., DC. (= *alba* Poir. = *edulis* Poir. = *Aesculus macrostachya* Mchx. = *A. nana* Dsf. = *A. parviflora* Walt., Mchx. = *Macrothyrsus discolor* Pursh).
mutabilis Spach, veränderliche, ♄. f. ?

Digitized by Google

Pavia
rubra Lam. (= *atropurpurea* Spach, = *Lindleyana* Spach, = *lucida* Spach, = *macrocarpa* Hort., Swt. *Michauxii* Spach, = *octandra* Mill. = *versicolor* Spach, = *Willdenowiana* Spach var.).
carnea Spach, *pallida* Spach, *Watsoniana* Spach, v. Aesculus carnea, pallida et Watsoniana, p. 22 et p. 12, II.
Pavinda capensis Retz, v. Audouinia capitata, p. 106.

Pavonia Cav., Pavonie.
hastata Cav., spontonförmige, ♄. w. Brasilien.
mollis H. B. K., weiche, ♄. w. Neugranada.
odorata W. (= *sidoides* Hornem. = *Hibiscus Chittle Benda* Roxb. = *H. morifolius* Rottl. = *H. odoratus* Roxb.).
pilosa W. Enum., behaarte, ♄. w. ?
platanifolia W. (= *acerifolia* Lk. = *Hibiscus acerifolius* DC. = *H. collinus* H. angl.).
Spinifex Cav., β) aristata Cavan.
pentacarpa Poir., Rchb. (= *venosa* Spgl.), v. Kosteletzkya pentacarpa, p. 337, II.
Pechea subcylindrica Pourr., v. Crypsis schoenoides.
Pectinatrum napifolium Cass., v. Centaurea napifolia, p. 178.

Pectis L., Kammfederchen.
angustifolia Torr. (= *Pectidopsis angustifolia* DC.). schmalblätteriges, ⊙. f. Nordamerika.
prostrata Cav. (= *fasciculata* Poir. = *Chihonia prostrata* P. B.).
canescens H. B. K., *humifusa* Sw., v. Loreatea canescens et humifusa, p. 372.

Pedicularis T., Scepterkraut.
abrotanifolia Steven, (= ?*myriophylla* Pall. = *verticillata* W.), stabwurzblätteriges, 4. f. b. Sibirien.
atrorubens Schlchr. (= *pennina* Gaud.).
elata W. (= *punicea* Pall.), hohes, 4. f. b. Sibirien.
elegans Don, Sweet, zierliches, 4. f. b. Sibirien.
gyroflexa Vill. (= *cenisia* Gaud. = *proboscidea* Gaud.).
lapponica L., lappländisches, 4. f. Nordeuropa.
longiflora Rudolph. (= *tubiflora* Fisch., Stev.), langblumiges, 4. f. b. Ostsibirien.
Portenschlagii Saut. (= *geminiflora* Portenschl.).
rubens Stephani, (= *comosa* γ Stev. = *incarnata* Pall. non Jacq. = *laciniosa* Pall. herb.), röthliches, 4. f. b. Sibirien.
speciosa Ledeb., prächtiges, 4. f. b. Sibirien.
uliginosa Bunge, (= *rubens* Ledeb., non Steph.), Sumpfliebendes, 4. f. b. Altaisches Sibirien.
uncinata Steph. (= *altissima* Pall.).

Pedilanthus Neck., Schuhblume.
angustifolius Poit. (= *cordatus* Spgl.), schmalblätterige, ♄. w. ? Westindien.
carinatus Spgl. (= *Crepidaria carinata* Haw. = *Euphorbia carinata* Don). Westindien.
cordellatus Haw. (= *Crepidaria cordellata* Haw. = = *Euphorbia cordellata* Haw.).
Zu berichtigen p. 594.
Pedilonia violacea Presl, v. Wachendorfia hirsuta, p. 954.
Pedilonum secundum Blume, v. Dendrobium secundum, p. 195, II.

Digitized by Google

Peganum crithmifolium Eichw., v. Malacocarpus crithmifolius, p. 382, II.
Peireskia Lem. = Pereskia.
Pekea Aubl., *ternata* Poir., *tuberculosa* Aubl., v. Caryocar glabrum et tomentosum, p. 168. *P. Couroupita* Juss., v. Lecythis bracteata, p. 451.

Pelargonium L'Her., Kranichschnabel.

I. Bossea Rchb. (= *Cynosbata* DC.).

cynosbatifolium W. (= *oxaloides* Ait. = *oxoniense* v. Eeden).

II. Campylia Sweet.

carinatum Sweet, (= *Geranium ovatum* Cav. = *G. tricolor ovalifolium* Andr.).
holosericeum Sweet, (= *Ciconium velutinum* Hffg.).

III. Chorisma Lindl.

tetragonum L'Her. (= *Geranium tetragonum* L. = *Jenkinsonia tetragona* Sweet), b) trigonum (Scopol.).

IV. Ciconium Sweet.

adulterinum L'Her., β) Curtisii Hort. (= *neapolitanum* v. Eeden).
alnifolium W. (= *betulinum latifolium* Hort.).
ardens Sweet, (= *Geranium ardens* Andr. = *?lobato-fulgidum* Hybrid.), zierlicher, ♃. k. t. Cap d. g. H.
balsameum Jacq. (= *cephalicum* Hffg.).
cordatum Ait. (= *cordifolium* Dietr. = *festivum* Hffg.).
crispum Ait., b) minus (= *Hospes* Hffg. = *pectinifolium* Sweet).
flavum Ait. (= *carotaefolium* Hffg.).
formosissimum Dsf. (= *acerifolium* L'Her. var. Spgl. = *angulosum formos.* P. = *angulosum speciosum* Hort. = *Boyleae* Sweet, = *formosum* Dsf. = *pulchrum* Hffg.), d) multiflorum v. Eeden, (= *fulgens* Hffg.).
glutinosum Ait., β) denticulatum Hort., γ) jatrophaefolium DC., δ) laciniatum Hort.
heterogamum Ait., L'Her. (= *homogamum* Hffg. = *quinquelobatum* Steud.).
incisum W. (= *monsoniaefolium* Fisch.).
laevigatum W., β) compositum L'Her.
lavateraefolium (Eckl., Zeyh.), Steud., Lavaterablätteriger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
malvaefolium Jacq., β) lateritium.
nothum W. (= *lividum* Dietr.).
penicillatum W. (= *Geranium elegans* Dum. Cours.).
pinguifolium Sweet, (= *hepaticaefolium* Hoffg. = *Geranium hederinum fl. albo* Andr.), fettblätteriger, ♄. k t. Cap d. g. Hoffn.
primulinum Sweet, (= *crassicaule* L'Her. Ait. var. Spgl.).
pumilum W. (= *humile* Hort. = *stenopetalum* Ehrh. var. Spgl.).
Radula Ait. b) revolutum Jacq., c) roseum W. (= *rosodorum* Hffg.), d) latifolium, e) terebinthinaceum, f) raduloides Hort.
rigidum Don, W. (= *strictum* Dietr.).
rubrocinctum Lk. (= *imperiale* Hffg.).
saepeflorens Sweet, (= *Geranium echinatum saepeflorens* Andr. = *P. echinatum rubrum* H. angl. = *erythraeum* Hffg., non DC. = *reniforme-echinatum* ?Hybrid.), oftblumiger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
saniculaefolium W. (= *cortusaefolium* Jacq., non L'Her.

Digitized by Google

Pelargonium

= *hippocrepis* L'Her. = *Geranium hederaefolium* Dum. Cours.).

scandens Ehrh. (= *Geranium acetosum roseum* Dum. Cours.).

scaposum DC. (= *tomentosum* L'Her. mpt., non Jacq. = *trichostemon* β W. = *Geranium glaucum* Cav.), schaftiger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

sidaefolium W. (= *rigidum* Wendl. = *spectabile* Hort.).

speciosum W. (= *candidum* Sweet, = *elegans* Wendl., non W. = *formosum* Dietr.).

splendens W. β) ignescens Sweet, (= *Geranium ignescens* Andr.).

spurium W. (= *Kalmianum* van Eden, = *retusum* Hort.).

stenopetalum Ehrh. (= *ribifolium* Dum.Cours., non Jacq.).

tomentosum Jacq. (= *Geranium menthaeodorum* Necca).

b) villosum Spin. (non Sweet).

trichostemon Jacq., haarfadiger, 4. ♄. k. t. Cap d. g. H.

trilobatum Schrad. (= *adulterinum* L'Her. var. Spgl. = *clandestinum* Spin.), dreilappiger, ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

tripartitum W. (= *Jenkinsonia* t. Hffg. = *Ligularia trifida* Eckl., Zeyh.), β) fragile W. (= *Geranium fragile* Andr.), ?γ) fraternum Schrank.

triste Ait. (= *tuberosum* Hort. = *Geranium triste* L. = *Polyactium triste* Eckl., Zeyh.), ?β) villosum Mill., ?γ) pastinacaefolium Mill., ?δ) moestum Hffg.

villosum Sweet, (= *majestum* Hort. = *Royal George* Hort. = *regale* Hffg. = *Ligularia villosa* Eckl., Zeyh.), zottiger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Watsoni Lk. (= *cucullatum expansum* van Eeden, = *serotinum* Hort.).

Willdenowii Lk. (= *formosum* Sweet, = *pulchellum* W. = *superbum* Dietr.).

zonale Ait., b) album (= *leucanthum* Hffg.), d) coccineum (= *coccinifiorum* Hffg.), l) clarum Hffg., m) crenatum Hffg., n) Rosula Hffg., o) speciosum Hort. Die übrigen Variet. s. p. 599.

V. Corthumia Rchb. (= *Peristera* DC.).

anceps Ait.

australe W., Jacq. fil. (= *inodorum* Dsf.).

?β) aemulum Hffg.

glomeratum Donn, Jacq. fil. (= *australe* Sweet β W. Enum. = *aemulum* Hffg. = *Ger. glomeratum* Andr.).

Rodneyanum Lindl., Rodney's, 4. k. t. Inneres Neuholl.

VI. Dimacria Lindl., Sweet.

affine Sweet, (= *Geranium affine* Andr.), ähnelnder, 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Andrewsii Sweet, (= *Geranium heterophyllum* Andr.), Andrew's, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

apioides Steud. (= *apiifolium* Sweet, = *Geranium apiifolium* Andr., non Jacq.), sellerieähnlicher, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

aristatum Sweet, (= *Geranium barbatum* var. *undulatum* Andr.).

astragalifolium P. (= *pinnatum* W. = *Geranium astragalifolium* Cav., Andr. = *G. pinnatum* L. = *Hoarea astragalifolia* Eckl., Zeyh.).

Digitized by Google

Pelargonium

foliolosum DC. (= *Geranium pinnatum* Andr. = *Hoarea foliolosa* Eckl., Zeyh.).

lanceolatum Sweet, Steud., lanzettblätteriger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

recurvatum Sweet, (= *Geranium barbatum* var. *minor* Andr.), zurückgekrümmter, 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

setigerum Sweet, (= *Geranium barbatum* Andr., nec alior.), borstentragender, 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Die übrigen stehen unter Section Hoarea.

VII. Grenvillea Sweet.

conspicuum Sweet, (= *Grenvilleanum* Hort. = *Geranium Grenvilleae* Andr.).

VIII. Hoarea Sweet.

dioicum RBr. (= *Geranium melananthon* Andr., non Jacq.).

hirsutum Ait. (= *heterophyllum* L'Her., non Jacq.).

nutans DC. (= *flavum* Ait. var. Spgl. = *rapaceum luteum* Sims, = *Sweetianum** p. 600, non DC. = *H. carinata* Sweet, Eckl., Zeyh.).

pilosum P. (= *Geranium pilosum* Andr.), b) bicolorum Sweet, c) blandum Sweet.

roseum DC. (= *condensatum* P. = *Geranium roseum* Andr.).

Sweetianum DC. (= *H. elegans* Sweet), Sweet's, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Zu dieser Section gehörige Hybriden sind p. 302, II. verzeichnet.

IX. Isopetalum Sweet.

Cotyledonis L'Her. (= *Geranium Cotyledonis* L.).

discipes Haw., Colv., scheibenstieliger, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

X. Jenkinsonia Sweet.

Endlicherianum Fenzl, Endlicher's, 4. k. Westl. Taurusgebirge.

quinatum Sims, (= *Geranium praemorsum* Andr.).

XI. Myrrhidium DC.

artemisiaefolium DC. (= *fruticosum* W.), beifufsblätteriger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

athamanthoides L'Her., hirschwurzähnlicher, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

bullatum Jacq. (= *canaliculatum* Zuccag.? = *myrrhifolium* β W. = *Jenkinsonia bullata* Sweet), bauschiger ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

coriandrifolium Jacq. (= *Geranium coriandrifolium* L. = *Jenkinsonia coriandrifolia* Sweet).

longicaule Jacq. (= *lacerum* W. = *Jenkinsonia longicaulis* Sweet, Hffg.). ♂.

myrrhifolium Ait. (= *betonicum* Jacq.).

XII. Otidia Lindl.

alternans Wendl. (= *alternatim pinnatum* Wendl.).

crithmifolium Sm. (= *paniculatum* Jacq.).

XIII. Phymatanthus Lindl.

elatum Sweet, (= *Histrio* Hffg. = *Campylia elata* Eckl., Zeyh. = *Ger. tricolor arboreum* Andr.).

Serra Hffg. (= *coronopifolium* Hort., non Jacq.), sägezähniger, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Hybriden: grandiflorum Sweet, intertinctum Sweet, laciniatum Hort., latifolium Colv., villosum Sweet.

XIV. Polyactium DC.

multiradiatum Wendl. (= *apiifolium* Jacq. fil.).

Digitized by Google

Pelargonium

XV. Seymouria Sweet.

dipetalum L'Her. (= *S. L'Heritieri* Sweet).

Hybriden und Gartenvarietäten.

A. Aeltere:

Abdalah Hort., abbreviatum Hort., Abron Hort., aciculare Hffg. (= *australe* β H. Berol.), acetosellum Hort., acinatum Hort., aconitifolium Hort., Actinogramma Hort., aculeatum Hort., Admiral Hort., Adonis Hort., adventitium Hort., aequaliflorum Colv., affine Sweet, Ahrenbergianum Hort. belg., aimable Rosette Hort., Albertine Hort., albidum Colv., albionense Hort., Alfred Hort., alienatum Hort., Aloysianum Dehnh., altum Hort., amaranthe Hort., amaryllopes Hort., ambiguum Schult., Amersleyi Hort., angelicum Hort., Anna Botyis Hort., Anna Maria Hort., Anna Paulowna Hort., Annleyanum Hort., anomalum Hort., Apollo Hort., arboreum Hort., arietinum Hort., armatum Sweet, atrolaceum Hort., aurantiodorum Hffg. (= *ribifolium* Baum.), auroreum Hort., Azalea Hort., bamburiense Hort., Banisterii Hort., Batscheka Hort., Bayleanum Hort., beau de vert Hort., Beauté supreme Hort., bella Donna Hort., belle Circassienne Hort., belle Henriette Hort., Berterianum Spin., Colla, (= *Nissonianum* Lecchi), Bethalina Hort., Bichonia Hort., Bischof of Salisbury Hort., Blandfordianum Sweet, (= *candidum* Lk. Enum.), Bluntianum Hort., Boila Hort., Boilese Hort., Bolivar Hort., Bristolianum Hort., Brown's Elisabeth Hort., Buls fine Sedling Hort., Burdini Colla, (= ? *elegantissimum* Hort. Burd.), Burnettianum Hort., Caledonia Hort., caleophyllum Hort., calycinum Sweet, (= *crateriformium* Hffg.), calographicum Hort., Camarum Hort., candidissimum Hort., Canedii Hort., Carolinianum Hort., caryophyllaceum Sweet, castaliaefolium Hort., castilioanum Hort., Catharina Stuart Hort., cephalotes Hffg., cerinum Sweet, chamaerhodon Hort., Chandleri Hort., clathratum Hort., Claudius Caesar Hort., Cleopatrae Hort., coecatum Hort., coerulescens Hort., Colleyanum Hort., coloratum Hort., conchyllatum Hort., confertifolium Hort., Constantin Hort., contiguum Hort., convolutum Hffg., coriaceum Hort., coronatum Hort., Couttsiae Hort., crassifolium Vent., crispolobum Hffg., crispum Sweet, crithmifolium Sweet, cruciforme Hffg., Cumadolianum Sweet, Cupido Hort., curinbetium Hort., cycloides Hffg., Czeonianum Hort., daedaleum Hort., Damssonia Hort., David Hort., Dawson Hort., Defience Hort., de galle Hort., degeneratum Hoffg., delectabile Hffg. (= *eximium* Hffg. = *spectabile pulcherrimum* v. Eeden), delicatum Hort., Denisianum Hort., diaphanum Hort., dichotomum Otto et Dietr., dilatilobum Hort., dilutum Hort., Dodonaei Hffmsg. (= *glutinosum* v. Eeden), Don Juan Hort., Don Niclas Hort., double Pinks Hort., Drakeae Hort., dubium Hort., Duc de Glochester Hort., Duc de Ruttland Hort., Duc de York Hort., Duchesse of Kent Hort., durum Hffg., Eclips Hort., echinum Hort., egregium Hort. Belved. (= *divaricatum* Dietr. = *Felderi* Wendl.), elatum Sweet, elegans maximum Sweet,

Digitized by Google

Pelargonium

elegantulum Steud. (= *Dimacria elegans* Sweet), Eleonore Hort., Elisabeth Hort., Emilius Hort., Erdens Hort., eriophorum Hort., eriophyllum Sweet, (= *cordatum* b *tomentosum* Hort.), euryphyllum Hort., exquisitum Hffg. (= *superbum latifolium* Breit.), Facronia Hort., familiare Hoffmsg., Fanny Fawkens Hort., fastuosum Hort., Ferdinandeum Hort., Ferdinandsii Hort., ficifolium Hffg. (= *vitifolium planum* Hort.), flabellatum Dsf., flammeum Colv., flamosum Hort., fleurs des Dames Hort., Flora Hort., flos jambeae Sweet, foliaceum Hort., Formanni Hort., Francisii Sweet, fulminans Hffg. (= *propugnatum* Hffg.), fusciflorum Hort., gangrenosum Hort., geifolium Hort., gemellum Hort., Generalicinum Hort., Generalissimus Hort., George Hort., germanum Hort., glabrum Hffg., glaciale Hort., gloria mundi Hort., gloria of the Wat Hort., grandeur Hort., grand Duc de Toscane Hort., grand Monarque Hort., grand Sultan Hort., grand Usurpateur Hort., grinianum Hort., Harriet Hort., Helas Hort., helenium Hort., heraldicum Hort., Herzog Wellington Hort., Hesilrigeae Hort., heterotrichum Hort., Hogart Hort., holosericeum Hffg. (non Sweet), (= *inquinans* Hort. = *Ciconium velutinum* Hffg.), homonymum Steud. (= *Dimacria fulgens* Sweet), homophyllum Hort., hortensiaeflorum Hort., hortensioides Hort., Huskinsonia Hort., hymaenopterum Hort., Hymsiva Hort., iconicum Hort., Illecebrum Hort., illustrissimum Hort., imbutum Hort. (Dimacria imbuta Sweet), impurum Hort., instratum Hffg., interruptum Hort., Iphigenia Hort., Irbyanum Hort., Josephinae Lee, Kents purpureum Hort., Kernhoferianum Hort., King George Hort., King of England Hort., Kingii Sweet, Kingoditsiae Hort., Klierianium Hort., Knipeae Hort., König Salomon Hort., Kolowratior Hort., Krappianum Hort., La Bouretii Hort., laciniatum Sweet, (Campylia l. Sweet), lacteum Stoeetneri Hort., Laconiae Hort., Lady Bordin Horn., Lady Brindel Hort., Lady Broughton Hort., Lady Cliffort Hort., Lady Clinton Hort., Lady Dawerby Hort., Lady Derby Hort., Lady Roccol Hort., Lady Rowdin Hort., Lady Sophie Hort., l'amitié Hort., Lamptonia Hort., lanceolatum Andr., laniflorum Hort., lanosum Hort., lanuginosum Hffmsg., lappaceum Hffmsg. (= *lobatum* Hort. = *platyphyllum* Hffmsg.), Lapparette Hort., lasiophyllum Hort., Lousadomium Hort., lautum Hort., laxulum Hort., Led sedling Hort., Le grand Hort., l'honneur d'Angleterre Hort., l'honneur d'Ahrenberg Hort., l'honneur de Bern Hort., l'honneur de l'Herme Hort., ligulum Hort., limbatum Hffg. (= *adulterinum* Wendl., non W.), limonium Hort., litigiosum Hort., longipes Hffg., longipetalum Hort., Lord Lee Hort., Lord Lauderdale Hort., Lord Lesalee Hort., Lord Louis Hort., Lord Wellworth Hort., Lord Withworth Hort., lotum Hort., Ludovicianum Hort., luisum Hort., luisante Hort., luridum Hort., lustrinum Hort., macrophyllum Voit., Madame La Valette Hort., Madame Cranthon Hort., magniflorum Hffg. (= *formosum grandiflorum* H. Cels. = *macranthum* Hffg., non Sweet), magnificum H. Cels. (= *magnificiens* v. Eeden),

Digitized by Google

Pelargonium

magsanthum Hort., Maidenblush Hort., Maid of Orleans Hort., majestuosum Hort., majestum Hort., malachraefolium Sweet, Mariane Hort., Maria David Hort., Marie Louise Hort., Markianum Hort., Medusatum Hort., melaneum Hort., melanophum Hort., micranthum Sweet, (Ciconium micr. Sweet), Miss arbutinor Hort., Miss Maitland Hort., Miss Ramster Hort., mollifolium Hort., mollissimum Hort., Mont Aetna Hort., Moreanum Hort., Morning Staar Hort., mucronatum Hort., Mühlenbergii Hort., multifidum Hffg., mundulum Hort., nanum Sweet, (= *ignescens* var. Hoare), neglectum Schult., Nigritea Hort., Nimrod Hort., Niveusa Hort., nitidum Hort., non plus ultra Hort., nummularifolium Andr. (non Salisb.), obcordatum Hort., oblatifolium Hort., obtusidentatum Hort., Octavis Hort., odontophyllum Hort., odoratum Hffg. (= *speciosum odoratum* Wendl.), optimum Hffg. (= *africanum* Hort. Cels. = *odoratissimum africanum* van Eeden), opulifolium Sweet, (= *?opulinum* Hffg.), pactum Fisch., pallidulum Hort., Pandora Hort., paradoxum Hort., Pavaeanum Hort., Perseverence Hort., phellodes Dietr. (= *quercifolium* H. Cels., non W.), Phyllis Hort., pilipes Hffg., Dietr., planiceum Hort., pleotrophyllum Sweet, politum Hort., polytrichum Hort., Porphyrio Hffmsg. (= *hybridum coccineum* Hort.), Poturi superbum Hort., praestantissimum Hort., princeps Episcopus Hort., princeps niger Hort., Princesse Auguste Hort., Princesse Charlotte Hort., Princesse de Galle Hort., Princesse Louise Hort., Princesse Mariane Hort., Princesse Sophie Hort., Principissae Hort., Prinz Blücher Hort., Prinz Charles Hort., Prinz de Coburg Hort., Prinz de Galle Hort., Prinz de Leopold Hort., Prinz of Oranien Hort., Prinz Regent Hort., Prinz royal de Würtemberg Hort., pudicum Hort., pullaceum Hort., Quendivii Hort., Quenii Hort., quercinum Hffg. (= *quercifolium* Hort., non Ait.), quinquecuspidatum Hort., quinquemaculatum Hort., Quin Schebas Hort., ranunculifolium Dietr., rarum Hffg. (= *speciosum* v. Eden), reformatum Hort., Reginae Hort., Reine d'Hongarie Hort., Reine de Paysbas Hort., repandum Hffg., rhodanthum Hort., Rhodiola Hort., rhodolentum Hort., ringens Sweet, Robertianum Hffg. Roccole Hort., Rochuter Hort., Roi Adonia Hort., Roi de Babylon Hort., Roi d'Angleterre Hort., Roi de Suabe Hort., Roi des Negres Hort., Roi George Hort., Rollissonii Hort., Rosamunde Hort., Rose brillant Hort., Rowanum Hort., Royanum Hort., rouge et noir Hort., rubrum Hort., rutaceum Hort., Salomon Hort., Scheridedon Hort., schizophyllum Hort., Schreiberianum Hort., Schwarzenbergianum Hort., schwarzer Prinz Hort., scutatum Hort., sericeum Voit. siccifolium Hffg., Dietr. (= *novum* Hort.), signatum Hort., Smith's Hort., Sophia Hort., Souverain Hort., speciosissimum Andr., speculum Hort., Stadthalter Hort., Sternianum Hort., suberectum Hort., Suprema Hort., Susanna Hort., Sussy Hort., ternatifidum Dietr., transcendens Hort., triflexum Hort., trifoliatum Hor., trilingue Hffg. (= *balsameum speciosum* Hort.), Triumphe de Flore Hort., Triumphe de Gand Hort.,

Digitized by Google

Pelargonium

trivulnerum Hort., undulifolium Hffg. (= *floribundum* Breiter), undulopetalum Hort., ursinum Hort., valpirum Hort., Vanberghianum Hort., Vandelium Hort., Van de six Hort., variifolium Hort., Veitchianum Hort., Venus Hort., vestitum Hffg. (= *conduplicatum crispum* Hort.), Violette du mond Hort., virginellum Hort., viridifolium Hort., volatiflorum Hort., Vulkan Hort., Wallnery Hort., Washington Hort., Waterloo Hort., Watsonianum Hort., Wellington Hort., Wellsianum Sweet, Wightinton Hort., William Prinz Hort., Youngii Sweet, Your fine scarlet Hort., Ypsilanti Hort., Zenobium Hort. etc.

B. Neuere:

Abbé Berlèze Hort. Par., Abbé Sicard Chauvière, Abderam Hort. Par., Absalon Hort. Par., Achilles Gaine's et Wilson, Achille Tatius Chauvière, Ackbar Hort. Par., Acme Hort., Acoris Hort. Par., Ada Hill et Ada Wilson, Adela Forster, Adèle Chauv., Adèle Banès Hort. Par., Adèle de Lacépede Lapersonne, Admirable Gaines, Admiral Hort., Adonis Chandler, Aeglator H. Par., Aetna Foster, Aglaja Foster, Ajax Chandler, Alarm Rendle, Alba perfecta de Jonghe et Thurtell, albidum Böckm., Alcide Hort. Par., Alexis de Jussieu H. Par., Alexandrinum Böckm., Alice Grey Wilson, Alicia Foster, Alicia superba Foster, Alonzo Gaines, Alpha Sheppard, Altensteinianum Hort., amabile Hort., Amélie Chauvière, Amethyst Garth, Amulet Foster, Anais Chauv., Angèle Hort. Par., Angola Beck, Anna Wilson, Annette Foster, Antiope Garth, Antoine Banès Hort. Par., Antonina Hort. Par., Appien Chauv., Apollo Hort., Arabella Gaines et Garth, Arabian Gaines, Aramis Hort. Par., Archbishop of Canterbury Master, Ariadne H. Par., Armeria Chauv., Armyntor, Ary Scheffer Chauv., Ascanio Hort. Par., Asfussia Wilson, Assasin Wilson, Astraea Hort., Athenais Hort. Par., Augusta Foster, Augustin Hort. Par., Aurèlie Hort. Par., Aurora Chandler et Wilson, Bacchus Beck, Baron de Sermet Chauv., Bathyanum Hort. Vindob., Baucis Hort. Par., Baverini Chauv., Beatrice Foster, Beauté de Paris Chauv., Beauté parfaite Dem., Beauty Foster, Beauty of Essex Hort. angl., Beauty of Ware Gaines, Beauty of Walthamstone Hort. angl., Beauty supreme Gaines, Bébé Chauv., Bélisaire Chauv., Belleperche Hort. Par., belle Adine Chauv., belle Gabriele Chauv., Bellona de Cannaert, Bellone Hort. Par., Bertha Foster, Bijou Garths, Bijou des Dames Böckm., Binoele de Jonghe, Blanche de Castille Hort., Black dwarf Garth, Black Knight Gaines, Black Prince Beck., Blanche Hort. Par., Blood royal Garth, Boileau Hort. Par., Boisjolin, Boissy Chauv., Bon ami Dubuisson Hort. Par., Bouquet tout fait Hort. Par., Bridegroom Foster, Bridesmaid Garth, Brillant Chauv., Britannia Garth, British Hero Henderson, Brutus Puxley, Byron Garth, Caffierii Hort. Par., Calypso Lem., Camilla Wilson, capitatum superbum Böckm., Captivation Gaines, Caroline Edge Chauv., Castiglione Hort. Par., Celestial Chandler et Thurtell, Céleste Hort, Cellini Chauv.,

Digitized by Google

Pelargonium

Cerrito Lumsden, Champion Chandler, Champion of Devon, Charles Chauv., Charles Poisot, Charles XII. Catleugh, Charlotte Léonard, Circe Garth, Citarius Hort., Clarissa Garth, Claude Lorrain Luscomb, Cleopatra Beck, Climax Garth, Clio Gaines, Clissoldi Smith, Clytie Hort., Colossus Foster, Columbus Garth, Commodore Hodges et Cunningham, comptum album et roseum Hort., Comte d'Alvarès Poisot, Comte de Lambertye Chauv., Comte de Paris Garth, Comte Dutertre Hort., Comus Foster, Condé Hort., Conflagration Foster, Conservative Garth, Consort (Lyne), Constellation Foster et Garth, Constance Gem, Coquette Garth, Coriolan de Jonghe, Cornelius Hort. Par., Cornet (Wightmann), Coronet Chauv., Corona Garth, Coronation Garth, Corticelli Hort., Cossack Gaines, Cotterstone Garth, Count d'Orsey Wilson, Countess Bathyany Hort., Countess Cowper Hort., Countess of Elden Gaines, Countess of Mount-Edgecombe Lyne, Countess of Munster Hort., Countess of Wilton Wilson, Creole Wilson, Cressida Morton's, Cuirassier Hort., Cupidon Hort., Cyclops Garth, Cynthia Hort., Cyrus Eyre, Daniel huet Hort., Daphné Hort., Decora Garth, Defiance Thurtell et Defiance Drury et Gaines, De Rougemont Alfred, Desdemona Beck et Thurtell, Diadematum roseum Böckm., Diadematum superbum novum Foster, Diadem Lyne, Diana Chandler, Dido Foster, Diodorus Hort., Diomède Hort., Discount Garth, diversum Böckm., Dobler Garth, Docteur Lindley Foster, Docteur Marjolin Chauv., Don Quichotte Hort., Douglasii Garth, Druid Hort. Par., Duc de Brabant de Jonghe, Duchesse de Nemours Chauv., Duhamel du Monceau Hort. Par., Duke of Cornwall Gaines et Foxs etc., Duke of Devonshire Foster, Dumont d'Urville Chauv., Dumoulin Chauv., Duquesnoy Hort. Par., Dutchess of Kent Hort. angl., Dutchess of Leinster Gaines, Dutchess of Portland Hort. angl., Dutchess of Roxboro Hort. angl., Dutchess of Sutherland Gaines et Catleugh, Eclipse Catleugh, Edith Gaines, Edmond Hort., effulgens Böckm., elegans novum Gaines, elegantissimum Hort., Eliza sauvage Cook, Eliza superba Foster, Elizabeth Chandler et Elizabeth Garth, Elize Miellez, Emily Foster, Emma Chandler, Emperor Hodges, Emperor of Russia Gaines, Emperor superb Gaines, Empereur du Maroc Hort. gall., Enchantress Nairn et Wilson, Erasme Hort. gall., Erato Hort. Par., Erebus Garth, erectum Foster, Erington Lyne, Ernest Comte de Talleyrand Chauv., Eucharis de Jonghe, Eurydice Chauv., Euterpe Hort., Eva Chandler, Evelina Foster, excelsum superbum Hort., Exquisite Basket et Exquisite Gaines, Fabris Chauv., Fair maid of Devon Veitch, Fair maid of Leyton Wilson, Fandango Garth, Fascination Russell, Faunus Foster, Favorite Foster, Fearless Gaines, Felicie Desmar., Fingal Hort., Fireball Gaines, Firebrand Foster, Firefly Foster, Flambeau Garth, Flamingo Garth, Flash Garth, Fleury Chauv., Flore Chauv., Florence Garth, Fontana Cherenu, formosissimum Gaines, Fosteri roseum et superbum, Free Briton Hort., fulgens Wilson,

Digitized by Google

Pelargonium

Fürchtegott Hort., Gasparino Hort. Par., Gassendi Hort. Par., Gauntlet Gaines, Gauntlet superbum Dufoy, Gazelle Hort., Gem Foster, Gem of the West Nairn, Général Cathelineau Baudry, Général Foy Dufoy, Général Washington DeCannaert, Georges Hort. Par., Gipsey Foster, Girod Hort. Par., Glansryk de Jonghe, Gloire d'Avranches Hort. gall., Gloria atrebatensis Dennis, Gloire de Bruxelles de Jonghe, Gloria mundi Hort., Gloria Parisiensis Chauv., Glory of the West Hort. angl., Glowworm Foster, Goliath Hort., Grace Darling Gaines, Grampion Hort., Grand Duke Gaines, Grand monarch Kinghorn, Grand monarque Lémon, Grenadier DeCannaert, Hamlet Lyne, Hébé Beck, Hector Coock et Hoyle, Helen of Troy Widnall, Henriette Chauv., Hercules Dennis et Eyres et Garth, Hero Wilson, Hesperus Wilson, Homère Hort. gall., Hybla Foster, Hylas Hort., Ibrahim Ch., Idomeneus Hort. Par., Impératrice Joséphine Hort. Par., imperialis Hort. Par., Indian chief Gaines, Inquisite Gaines, invincible Garth, Iphigénia Hort. Par., Irenae Hort., Isaurae Hort. Vindob., Isée Hort. Par., Isoline Hort., Italinski Chauv., Ivanhoe Wilson, Janthe Hort., Jeanne d'Albret Chauv., Jehu élégant Hort., Jehu superbum Hort., Jenny Colon de Jonghe, Jérémie Hort. Par., Jersey maid Blackford, Jessie Foster, Jew Foster, Jewess Foster, Joan of Arc Garth, John Bull Garth, Joséphine Hort. Par., Joséphine Oudin, Joséphine Beauharnois Hort., Josephinum Hort. Vindob., Juba Gaines, Jubilee Garth, Jules César Hort., Juno de Cannaert et Foster, Jupiter Garth, Kalos Hort., King Egbert Gaines, King Horny Gaines, King John Garth, King of Beauties Gaines, King of Geraniums (Gaines's King) Hort. angl., King of Hannover Hort. angl., King of Prussia Whale, King Rufus Hort. angl., King of Saxonii Hort. angl., Labrador Chauv., La Coquette Chauv, Lady Carlisle Foster, Lady Clifford Foster, Lady Cotton Sheppard Bennett, Lady Dillon Gaines, Lady Douro Foster, Lady Elizabeth Bulteel, Lady Essex Hort. angl., Lady Flora Hort., Lady Howich Foster, Lady Mary Hort. angl., Lady Mayoress Hort. angl., Lady Meriot de Jonghe, Lady of the Lake Chandler, Lady Palmer Hort. angl., Lady Sale Gaines, Lady Selkirk Groom, Lady Villiers Foster, Laelia Jones Gaines, Lamarque Chauv., Lampride Hort. Par., Lancerianum Hort., Lantara Hort. Par., Laura Catleugh, Laure Chauv., Laurens Coster Hort., L'aurore Chauv., Le diamant Ble., Le Floréal Chauv., Léon Hort. Par., Léonora Beck, Leilia Hort., Libéral de Jonghe, Liela Bainbridge's, Lifeguardsman Foster, lineatum superbum Gaines, Little Wonder Gaines, Lord Auckland Gaines, Lord Byron Gaines, Lord Chancellor Foster, Lord Ebrington Rendle, Lord Mayor Foster, Lord of the Isles Hort. angl., Louisa Wilson, Louis Bradford Hort., Louis de Lacépède Lapersonne, Louis XIV., XVI. et XVIII. Hort., Lucas Hort. Par., lucidum roseum Hort. Par. (zonale var.), Lucretia Hort., Luister van Brabant de Jonghe, Lydia Chandler, Lysippe Hort. Par., Mabel Hort., maculatum Dej., Madame la comtesse de Lambertye

Digitized by Google

Pelargonium

Hort. Par., Madame la comtesse de Ménon Chauv., Madame la comtesse de Rambuteau Chauv., Madame la duchesse Decazes Chauv., Madame la duchesse de Rohan Chauv., Madame La Marquise de Courtarvel Chauv., Madame de Tolozan Chauv., Madame Marjolin Chauv., Madame Sydenham Millet, Madame Trillon T., Madame Matthison Mieller, Madelina Lumsden, Mademoiselle Rachel Fowler, Magician Foster, Magicienne DeCannaert, Magnet Foster, Magnificent Lyne, Magog Foster et Garth, Maid of honour (Cook), Maid of Saragossa Hort. angl., Mammoth Garth, Mamouth Hort Par., Manto Hort., Marceline Hort. Par., Marchioness Garth, Marchioness of Lothian Hort. angl., Marciana Chauv., Marguèrite de Parme de Jonghe, Marguèrite de Valois Hort. Par., Marie Féurier Leseble, Marie Stuart Hort., Marie Thérése Hort. Par., Mark Anthony Beck, Marmion Hort., Marquis d'Albon Chauv., Marquis de Levis Chauv., Marsellor F., Martha Beck, Martial de Champflour Hort. Par., Mary C., Mary Guy de Jonghe, Master Humphrey Garth, Masterpiece Gaines, Mathilde Foster, Mazeppa Gaines, Mazeppa superbum, Medora Foster, Meduza Hort. Par., Melpomène Hort. Par., Melone Hort. Par., Menès Chauv., Meteor Chandler, Milo Coock, Mirabeau L., Miss Hawkey Stewart, Miss Herbert Hort. angl., Miss Holford Gaines, Miss Jephson Hort. angl, Miss Peel Foster, Miss Sebright Hort. angl., Mrs. Garth Catleugh et Foster, Mrs. General Andrews Hort. angl., Mrs. Jarrett Hort. angl., Mrs. Standart, Mrs. Stirling, Modesty Foster, Mogul Hort. Par., Mohrenkönig Hort. germ., Molière Hort. Par., Momus Garth, Monarch Chandler, Monarch Widnall, Monsigny Chauv., M. de Boismilon Hort. Par., M. de Saint Pierre Chauv., M. Leseble Chauv., M. Sydenham Millet, Mulatto Hort., Mulbery C., multiflorum Foster, Murillo Chauv., Nabob Foster, Napoléon Garth, Narcissus Hort. Par., Negro boy Hort., Nemésis Hort. Par., Neptune Miellez, Nestor Foster, nigritum Hort. Vindob., Nina de Jonghe, Niobe Foster, nitidum Garth, Nonsuch Garth, Norfolk Hero Hort. angl., Nosegay, Nymphe Foster, Oberon Hodges, Octavie Demay Oliver Twist, olympicum superbum Hort., Ophelia Garth, Orange Boven Garth, Orange perfection Gaines, Orion Cook et Foster, Oscar Chauv., Ovid L. C., Pandore Chauv., Paragon Dennis, Pauline Demay, Pearl Drury, Pearl of the West (Lyne), pelagineum superbum Hort., Pénélope Garth, Perfection Dennis et Garth, Philippe le bel de Jonghe, Phoeon Foster, Pixey Queen Hort. angl., Plantagenet Garth, Pline Hort. Par., Pluto Thurtell, Polyxène Hort. Par., Pomone Hort. Par., Porthos Desmarattes, Pre-eminent Catleugh, Premier Garth, Président Garth, Priamus Hort., Pride of Surrey Gaines, Prima Donna Garth, Prince Albert Foster, Prince Albert Gaines, Prince Eugène Hort., Prince Henry Gaines, Prince of Wales Gaines, Prince of Wales Wilson, Prince of Waterloo Wightman, Princesse Alice Gaines, Princ. Leopoldine de Jonghe, Princ. royal Rendle, Princ. Sophie d'Orange Déj.,

Digitized by Google

Pelargonium

Princesse Sophia Mathilda Baskett, Priory King Baskett, Priory Queen Pince, Priory Queen roseum Hort., Procris Chauv., Proserpine Garth, Prospéra Hort., pulchellum Foster, purpureum coeruleum Hort. germ., purpur. grandiflorum Gaines, purpur. perfectum Hort., Pythagore Chauv., Queen Parson, Queen Dowager, Queen of the Beauties Garth et Queen o. t. Beaut. Gaines, Queen of Bourbons Hort., Queen of Fairies Garth, Queen of Gipsy Gaines, Queen of the East Wilson, Queen of the Isles Angl., Queen of Sarum Low, Queen of the West Hort. angl., Queen Philippa Garth, Queen superb Foster, Queen Victoria Eyre et Queen Victoria Sheppard, Quellyn Chauv., Rachel Gaines, Radegonde Chauv., radiatum carmineum de Jonghe, Rainbow Thurtell, Rameau Hort. Par., Reedworth H. angl., refulgens Hort., Regulator Thurtell, Repeal Garth, Rhadamanthe Hort. Par., Rhoda Foster, Rienzi Garth, Rinzianum Hort. Vindob., Rising Sun Gaines, Rival King Hort. angl., robustum Foster, Rodolphe Hort. Par., Roi des blancs Chauv., Roi des lilaces de Jonghe, Roi de Rome Hort., Romulus Hort. Par., Rosabella Gaines, Rosa bicolor Hort. Par., Rosalia de Cannaerts, Rosalia Hoyles, Rose of Oxton Hort. angl., Rosetta Foster, Rosetta superb. Hort. Par., roseum elegans Garth, roseum erectum de Jonghe, roseum perfectum Hort. Par., Rosenkranz de Jonghe, Royal Adélaide Gaines, Sabilea Hort., Salace Hort. Par., Salmonium B., Salome H. Par., Salomon Hort. Par., Sapphir Foster, Sarah B., Sarah Lumsden, Satlight Thurtell, Saturne Hort. Par., Scarlet compactum, Emperor of the Scarlets Smith, Frogmore Scarlet, Giant Scarlet (= *Smiths superb. Scarlet*), Shrubland scarlet, Waterloo Scarlet, Scholastique Hort. Par., Scipion Chauv., Selim Hort., Selina Foster, Semiramis Hort. Par., Servilie Hort. Par., Severa Chauv., Shepherdess Hort., Shield of Achilles Foster, Sidonia DeCannaert, Silenus Hort. Par., Simile Garth, Simonis Hort. Par. (= *Simonianum* Hort.), Sirius Eyre, Sir J. Newton Wilson, Sir J. Sedbright Hort. angl., Sir Marnix Dej., Sir Robert Peel Foster, Sir Walter Scott Hort. angl., Sir William Stanley Gaines, Slaeproos de Jonghe, Soulangeanum Hort. gall., South-Western Garth, Souvenir Hort., Souvenir de Dubuisson Hort. gall., Speculum Garth, Speculum mundi Miller, Speculum mundi superbum Gaines, Spleenii Hort., splendidum Foster, splendidissimum Miller, Stadthalter Hort., Stainedwhite Miellez, Stanislas Hort. Par., Steerood Hort, striatum Chandler, striatum formosissimum Hort., Sultan Foster, Sultana or Perpetual Foster, Sunrise Lyne, Sunshine Foster, superbum Wilson, Suprema Walton, surpasse Garth, Suzanne Albert Chauv., Sweetianum germanicum Hort. germ., Sylph Foster, Symétrie Garth, Talisman Demay, Tam O'Shanter Hort. angl., Tancréde Hort. gall., Tasso Foster, Tempe de Jonghe, Thalie Chauv., the dandy Hort. angl.. the Cid Foster, the Pet Foster, Theresia Beck, Thetis Hort. Par., Thundere Blackford, Titania Garth, Tom Pouce Poisot, Tom Thumb Hort. Par., (zonale var.), Tournement Garth, Trafalgar Gaines,

Digitized by Google

Pelargonium

Triomphant Chauv., Triomphe d'Avranches Ble., Triomph de Bataille Hort. Par., Triomph supérieur Hort. Par., Ulysse Hort. Par., Una Garth, Unit Garth, Unique Hort. gall., Unique Thurtell, Uranie Hort. gall., Ursule Hort. gall., Van Amburgh Wilson, Van Dyck Foster, Vanguard Gaines, Vélie Chauv., Veleda Hort. Par., Venus Böckm., Vesta Foster et Wilson, Victoire Oudin, Victor Chauv., Victor Sydenham Millet, Victoria Edw., Victory Garth, Victory majus Hort. gall., Viola Foster, Vivid Foster, Vixen Foster, Volta Hort. gall., Vulcan Foster, Warrior Gaines, Werner C., Wildfire Foster, William IV. Rollisson, Witch Garth, Wizard Garth, Wonder Garth, Wonder of the West Thurtell, Xerxes Chauv., Yeatmannianum grandiflorum Hort., Zamzummin Beck, Zelia Oudin, Zenobia Pince, Zumzimmimum Foster [1]).

Hiernach p. 594—604 zu berichtigen u. zu ergänzen.

Pelecynthis E. Mey., Beilkiel, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

opposita E. Mey. (= *Crotalaria opposita* L. = *Cytisus capensis* Berg. = *Liparia opposita* Murr. = *Rafnia opposita* Thbg., p. 675, = *Spartium capense* L.), gegenblätteriger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Pelecyphora C. Ehrenb., aselliformis C. Ehrenb., v. Cacteae Sect. XIV., p. 103, II.

Peletanthus Endl., Lehmblume, II. I., Acanthaceae.

ciliaris Endl. (= *Justicia ciliaris* L. suppl. = *J. ciliata* Jacq., p. 434, = *Dianthera ciliata* Medic. = *Dicliptera ciliaris* W. herb.), gewimperte, ☉. w. m. Cumana.

Peliosanthes Andr., Schlagblaublume.

altissima Don, höchste, 4. w. Ostindien.

violacea Wall., violette, 4. w. Ostindien.

Pellaea atropurpurea Lk., *Calomelanos* Lk., *flexuosa* Lk. etc., v. Allosorus atropurpureus, Calomelanos, flexuosus etc., p. 22, II.

Peltandra Rafin., Schott, Endl., Schildbeutel, XXI. IX., Aroideae.

virginica Rafin. (= *Arum virginicum* L. = *Caladium virginicum* Hook., p. 143, = *Leontia virginica* Torrey, = *Rousseliaeria virginica* Beck), virginischer, 4. f. Nordamerika.

sagittaefolium Rafin., v. Xanthosoma sagittaefolium.

Peltaria glastifolia DC., v. Texiera glastifolia.

Peltidium apargioides Zollik., v. Willemetia apargioides, p. 857.

Penaea L., Penaea.

fucata L. (= *furcata* Murr. = *fuscata* Auct. = ?*punicea* Hort. = ?*Sarcocolla* Berg.), geschmückte, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

longiflora Meerb. (= ?*acuta* Thbg.), langlumige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Sarcocolla Berg. (= *Sarcocolla officinalis* Kunth).

Unbestimmt: punicea Hort.

---

1) Die Namen der Autoren und Züchter sind den meisten wo es zu ermitteln war beigefügt, als: Blackford, Chandler, Chauvière, DeCannaert, Dennis, Edward, Foster, Garth, Gaines, de Jonghe, Lumsden, Lucombe, Miellez, Nairn, Oudin, Thurtell, Wilmer, Wilson u. m. A.

Digitized by Google

Penicillaria Sw., Pinselgras.

elongata Schrad., verlängertes, ⊙. f. m. ?

spicata W. Enum. (= *Cenchrus spicatus* Cav. = *Holcus spicatus* L. = *Panicum americanum* L. = *P. spicatum* Roxb. = *Pennisetum cereale* Trin. = *P. spicatum* Delil.), β) gigantea Endl. (= *Pennisetum giganteum* Tenore), γ) involucrata Schult. (= *Panicum involucratum* Roxb.).

ciliata W. (= *cylindrica* R. et S.), v. Pennisetum Linnaei.

Pennisetum Rich., Federborstengras, Fennich.

I. Gymnothrix P. Beauv.

adoensis Hochst. et Steud., abyssinisches, ⊙. ♂. w. Abyssinien.

compressum RBr. (= *asperum* Lk. = *japonicum* Trin. = *Cenchrus purpurascens* Thbg. = *G. japonica* Kunth, = *G. purpurascens* Sw. = *Panicum alopecuroides* L. mant. = *P. hordeiforme* γ Thbg. = *Setaria compressa* Kunth), plattes, 4. w. Cap d. g. H., Mascarenas, Ostindien, Japan, Neuholland.

β) hordeiforme Spgl. (= *Alopecurus hordeiformis* L. = *Cenchrus hordeiformis* Thbg. = *Gymn. cenchroides* R. et S. = *Panicum aristidoides* W. herb.), γ) G. Thouarsii P. Beauv.

II. Pennisetum P. B., p. 605.

aureum Lk. (= *borbonicum* Kunth).

breve N. E. (= *setosum* Raddi), kurzes, ⊙. w. Brasilien.

cenchroides Rich. (= *ciliare* Lk. = *distylum* Guss. = *Cenchrus ciliaris* L. = *Panicum vulpinum* W. Enum. = *Setaria cenchroides* P. B.).

dichotomum Delil. (= *phalaroideum* Schult. = *Cenchrus ramosissimus* Poir. = *Panicum dichotomum* Forsk. = *Phalaris setacea* Forsk.).

fasciculatum Trin. (= *sinaicum* Decaisn.), büschelförmiges, ⊙. ♂. k. f. Caucasus, Persien, Arabien.

purpurascens H. B. K. (= *hirsutum* N. E. = *Richardi* Kunth, = *setosum* Rich. = *triticoides* R. et S. = *Cenchrus setosus* Sw. = *Panicum Alopecurus* Lam. = *P. triticoides* Poir.).

III. Setaria P. Beauv., p. 750, R. et S., Schrad.

affine (R. et S.), (= *Panicum purpurascens* Raddi, N. E. = *S. fuscescens* W. herb. = *S. glauca* β *purpurascens* Torrey, = *S. imberbis* R. et S. var. Trin. = *S. purpurascens* H. B. K.), ähnelndes, ⊙. f. Brasilien.

alopecurum Jacq. (= *Panicum compositum* N. E. = *P. macrostachyum* N. E. = *P. macrourum* Trin. = *S. Alopecurus* Fisch. = *S. composita* H. B. K. = *S. polystachya* Schrad.), fuchsschwanzähnliches, ⊙. ♂. f. m. w. Südamerika.

ambiguum (Schrad.), (= *Panicum holcoides* Hort., non Jacq. = *P. Pseudoholcus* Steud.), zweifelhaftes, ⊙. f. ? Südamerika.

cernuum (H. B. K.), (= *Panicum cernuum* W.), übergebogenes, ⊙. f. Quito.

corrugatum Nutt. (R. et S.), (= *Panicum corrugatum* Ell.).

geniculatum Jacq fil. (= *Panicum geniculatum* Lam. = *S. geniculata* R. et S.).

Digitized by Google

Pennisetum

glaucum RBr. (= *Panicum flavescens* Mch. = *P. glaucum* L. = *Setaria glauca* P. B.).

?*β*) holcoides (Jacq.).

helvolum RBr. (= *Oplismenus helvolus* P. B. = *Panicum geniculatum* Vahl, = *P. helvolum* L. = *S. helvola* R. et Schult.).

italicum RBr. (= *Panicum italicum* L. = *P. asiaticum* Hort. = *P. attenuatum* Hort. = *P. glomeratum* Mch. = *P. indicum* Hort., non L. = *P. malfrugum* Hort. *P. setarium* Hort. = *P. setosum* Hort. = *S. Melinis* Lk.), *β*) maritimum Endl. (= *Panicum sibiricum* Hort. = *S. maritima* R. et S.), *γ*) germanicum Endl. (= *Panicum germanicum* Roth, = *S. germanica* P. B.), *δ*) erythrospermum (Spgl.), (= *Panicum erythrospermum* Hornem. = *S. ?rubicunda* Dumort.), *ε*) compactum (Kit.), (= *Panicum serotinum* Hort., non Trin.), *ζ*) pumilum (Lk., R. et S.).

longifolium (Lk.), (= *Panicum Linkii* Steud.).

macrochaetum Jacq. fil. (= *Panicum macrochaetum* Lk. = *S. macrochaeta* Spgl.).

macrostachyum (H. B. K.), (= *Panicum cylindricum* Lk. = *P. setosum* Sw. = *P. tenax* Rich. = *S. cylindrica* R. et S. = *S. setosa* P. B.).

scandens Jacq. fil. (= *Panicum scandens* Schrad. = *S. Trinii* Kunth).

β) tenacissimum (N E., Schrad.).

sericeum (R. et S.), (= *Panicum sericeum* Ait.).

verticillatum RBr. (= *Panicum adhaerens* Forsk. = *P. alopecuroideum* Walt. = *P. asperum* Lam. = *P. verticillatum* L. = *S. verticillata* P. Beauv.).

β) nubicum (Lk.).

viride RBr. (= *Panicum viride* L. = *S. viridis* P. B.).

β) purpurascens (Opiz), (= *Weinmanni* R. et S.), *γ*) majus Gaud.

Unbestimmt: versicolor Schrad.

Pentagonaster Baxteri Kl., v. Callistemon microstachyus, p. 148 et p. 107, II.

Pentagonia Speculum Vent., v. Specularia Speculum, p. 776.

Pentalophus A. DC., Fünfschopf, V. 1., Asperifoliaceae (Borragineae).

longiflorus A. DC. (= *Batschia longiflora* Nutt. = *Lithospermum incisum* Lehm. = *L. longiflorum* Spgl.), langblumiger, ♂. f. Nordamerika, Texas.

Pentameris P. Beauv., Spaltgras.

papillosa N. E. (= *Andropogon asper* Kunth, = *Avena capensis* Steud. = *A. muricata* Spgl. = *A. papillosa* Schrad. = *Danthonia papillosa* Schrad. = *Holcus asper* Thbg. = *Sorghum asperum* R. et S.), weichwarziges, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Thouarsii P. Beauv. (= *tortuosa* N. E. = *Avena colorata* Steud. = *A. pallida* Thbg. = *Danthonia tortuosa* Trin. = *Trisetum villosum* Sieb.), Thouars's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Die übrigen p. 884 verzeichneten (mit Ausnahme airoides), scheinen nicht kultivirt zu werden.

Pentamorpha graveolens Scheidw., v. Erythrochiton brasiliense, p. 233.

Digitized by Google

Pentapetes L.

ovata DC. (= *parviflora* Fisch. = *Brotera ovata* Cav. = *Dombeya ovata* Cav. = *Melhania ovata* Spgl. = *Melochia ovata* Dsf. = *Sprengelia modesta* Schult.).

Pentaphyllum norwegicum G., v. Potentilla norwegica, p. 652.

Pentaphyllum Lupinaster P. (= *Ammanni* Ledeb.), *macrocephalum* Spgl., v. Trifolium Lupinaster et megacephalum, p. 819.

Pentaple mantica Rchb., v. Mönchia mantica, p. 413, II.

Pentaraphia longiflora Lindl., v. Conradia ventricosa, p. 157, II.

Pentas Benth., Fünfröthe, V. 1., Rubiaceae.

carnea Benth. (= *Sipanea carnea* Hort. belg.), fleischfarbige, 4. w. Tropisches Afrika.

Penthea Lindl., Penthea, XX. 1., Orchideae.

filicornis Lindl. (= *Disa filicornis* Thbg. = *D. patens* Sw. = *Orchis filicornis* L.), fadenhörnige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

patens Lindl. (= *Disa patens* Thbg., non Sw. = *D. tenuifolia* Sw. = *Ophrys patens* L. fil. = *Serapias patens* Thbg.), abstehende, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Pentstemon (Pentastemon) L'Her., Bartfaden.

albidum Nutt. (= *teretiflorum* Fras. = *Chelone albida* Spgl.).

alpinum Torr. (= *Chelone alpina* Spgl.), Alpen-B., 4. f. Nordamerika. (Ob eingeführt?)

ambiguum Torrey, zweifelhafter, ♄. f. b. k. Nordamer.
β) foliosus Benth.

barbatum Nutt., Lindl. (= *Chelone barbata* Cav. = *C. formosa* Wendl. = *ruelloides* Andr., p. 189).
b) alba Hort., c) antwerpensis Hort., d) major Hort. (fol. latioribus).

campanulatum W., Ait. (= *Chelone campanulata* Cav. = *Ch. campanuloides* Andr. = *Ch. elegans* H. B. K.), glockenförmiger, 4. k. Mexico, Guatimala.
α) purpureum Trautv., *β*) atropurpureum Lodd., G. Don, (= *Chelone atropurpurea* Swt.), *γ*) Kunthii G. Don, (= *Chelone angustifolia* H. B. K.), *δ*) roseum G. Don, (= *Chelone rosea* Cerv.), *ε*) pulchellum Lindl., Trautv. (= *elegans* G. Don, = *Chelone elegans* H. B. K.).

centranthifolium Benth. (= *Chelone centranthif.* Benth., p. 189).

cordifolium Benth., herzblätteriger, 4. f. Neucalifornien.

crassifolium Lindl. (= *Douglasii* Hook.), dickblätteriger, 4. ♄. k. Nordwestl. Amerika.

cristatum Fras. (= *eriantherum* Pursh, non Fras.), kammförmiger, 4. f. Nordamerika.

deustum Dougl., brandfarbiger, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

diffusum Dougl., weitschweifiger, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

dissectum Ell., schlitzblätteriger, 4. f. Nordamerika (Georgia).

Digitized by Google

Pentstemon

eriantherum Fras. (= *glabrum* Pursh, = *Chelone erianthera* Spgl.)

frutescens Lamb. (= *Chelone frutescens* Steud. = *Digitalis dasyantha* Pall. herb.). ♄. Unalaschka, Nordwestliches Amerika [1]).

Gairdneri Hook., Gairdner's, ♄. f. b. k. Nordw. Amerika.

gentianoides G. Don, (= *Chelone gentianoides* H. B. K.). b) album Hook., c) diaphanum Hort. (= *splendens* Hort. = *transparens* Hort. angl.), d) roseum Hort.

grandiflorum Fras. (= *Bradburii* Pursh, = *Chelone grandiflora* Spgl.), grofsblumiger, 4. f. Nordamerika (Missourigebiet).

Hartwegii Benth. (= *Colvillii* Hort. = *gentianoides* Lindl., non G. Don, = *coccineus* Hffg. = *puniceus* Lilja, = *fruticosus* Booth), Hartweg's, 4. k. Mexico.

imberbe Steud. (= *Humboldtii* G. Don, = *Chelone imberbis* H. B. K.), kahler, 4. k. Mexico.

Jamesii Benth. (= *albidus* Torr., non Nutt.), James's, 4. f. Nordamerika. (Kaum eingeführt).

lanceolatum Benth., lanzettblätteriger, 4. k. Mexico.

Menziesii Hook., Menzie's, ♄. f. b. k. Nootkasund.

nitidum Dougl., glänzender, 4. f. Nordamerika.

perfoliatum A. Brogn. (= *connatum* Deppe), verwachsenblätteriger, 4. k. Mexico, Nordamerika.

procerum Dougl. (= *micranthum* Nutt. = *Tolmiei* Hook.).

Richardsonii Dougl. (= *?rivularis* Dougl.).

pubescens Soland. (= *hirsutum* W. = *Chelone Pentstemon* L. = *C. hirsuta* L.), *β)* laevigatum Ait., *γ)* glaucum Grah. (= *gracile* Hook., non Nutt.), *δ)* Mackayanum Kn. et Westc.

Scouleri Dougl., Scouler's, ♄. f. b. Nordam. (Oregongeb.).

venustum Dougl. (= *amoenus* Kunze, = *suffruticosus* Dougl.), lieblicher, 4. f. Nordamerika.

Aufserdem werden in den Verzeichnissen der Handelsgärten noch erwähnt: decussatum Dougl., denticulatum, formosum Thomps., giganteum elegans H. angl., primulinum v. Houtte, virginicum etc.

Noch nicht eingeführte: antirrhinoides Benth. Californ., corymbosum Benth. Californ., laricifolium Hook. et Arn. (= *filifolium* Nutt.) Nordamerika, Lewisii Benth. (= *Gerardia fruticosa* Pursh) Nordwestl. Amerika, pumilum Nutt. Nordamerika, secundiflorum Benth. Nordamerika, serrulatum Menz. Nordwest. Amerika, strictum Benth. (= *micranthum* Torr.) Nordamerika, tenuifolium Benth. Mexico, Torreyi Benth. (= *coeruleum* Torrey, non Nutt. Nordam., tubiflorum Nutt. Arkansas. *mexicanum* Hort., v. Tetranema mexicanum, *nemorosum* Trautv., v. Chelone nemorosa, p. 189.

Peplidium Delile, Zwergfrüchtchen, H. s., Personatae-(Scrofulariaceae-)Gratioleae.

humifusum Delile, (= *Hedyotis maritima* L. fil. = *Microcarpaea cochlearifolia* Sm. = *Oldenlandia maritima* Roth, = *Paederota cochlearifolia* Koen. et Rottl.), niedergestrecktes, ⊙. Wa. f. w. Aegypten, Ostindien.

---

1) „Planta quoad affinitatem dubia, a botanicis hodiernis non visa" Bentham in DeCandolle prodrom. X. p. 321.

Digitized by Google

Peplis L., Wasserportulac.
alternifolia MB. (= *volgensis* Fisch.).
australis Gay, (= *biflora* Salzm.), *borysthenica* Bess., v. Middendorfia hamulosa et borysthenica, p. 408, *occidentalis* Spgl., v. Ammannia humilis, p. 47 et 32, II.
Pepo Mch., Rich., *lagenarius* Mch., v. Lagenaria vulgaris, p. 443 et p. 340, II., *macrocarpus* Rich., *Melopepo* Mch., *verrucosus* Mch., *vulgaris* Mch., v. Cucurbita maxima, Melopepo, verrucosa, Pepo.
Perdicium roseum Poepp., v. Chabraea runcinata, p. 134, II.

Pereskia Plum., p. 607, v. Cacteae, p. 102, II.
Pereuphora coronata Hffg., v. Serratula coronata, p. 747.

Pergularia L., Pergularie.
minor Andr. (= *odoratissima* Wight.).
odoratissima L., RBr. (= *purpurea* Vahl, = *Asclepias odoratissima* Roxb.).
Zweifelhaft: angustifolia Fisch. Hort. Gorenk.
divaricata Lour., v. Strophanthus divergens, p. 790.

Periandra Mart., Periandra, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
coccinea Benth. (= *Clitoria coccinea* Schrad., p. 206, = *C. falcata* N. E.), scharlachfarbige, ♄. Sch. w. Brasilien.
dulcis Mart., süfse, ♄. Sch. w. Brasilien.
β) angustifolia Mart.

Periboea Kunth, (eine Geliebte Neptuns), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
corymbosa Kunth, (= *Hyacinthus corymbosus* L. mant. = *Massonia corymbosa* Bot. mag. = *M. linearis* Drege, = *Scilla corymbosa* Ker), traubendoldige, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.
Gawleri Kunth, (= *Scilla brachyphylla* R. et S. = *S. brevifolia* Ker, (Gawl.), p. 732), Gawler's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.
? brevifolia Kunth, (= *Hyacinthus brevifolius* Thbg. = *Scilla brevifolia* R. et S.). Cap der guten Hoffn. Scheint nicht kultivirt zu werden.
Pericallis Tussilaginis D. Don, v. Senecio Tussilaginis.

Pericalymma Endl., Kreifsmütze, XII. 1., Myrtaceae.
crassipes Lehm. (= *Leptospermum crassipes* Lehm., p. 352, II.).
Periclymenum americanum Mill., *germanicum* Roel. (= *serotinum* Ait. = *vulgare* Mill.), *italicum* Mill., *sempervirens* Mill., v. Lonicera grata, Periclymenum, Caprifolium et sempervirens, p. 475, *racemosum* Mill., v. Chiococca racemosa, p. 190.
Periderace fuscata Webb, v. Maruta fuscata. p. 498.
Perilla fruticosa D. Don, *leptostachya* D. Don, v. Elsholtzia polystachya et incisa, p. 219, II.
Perimenium Schrad., v. Perymenium, p. 608.
Periphragmos foetidus R. et P., v. Vestia lycioides, p. 845.
Peristera DC., *althaeoides* Eckl., Zeyh., v. Pelargonium Sect. XII., p. 601 et Sect. V., p. 484, II.

Digitized by Google

Peristeria Hook., Lindl., Taubenstendel.
elata Hook., b) alba (= *erecta* Hort.).
guttata Know. et West. (= *stapelioides* Booth).
Humboldtii Lindl., Humboldt's, 4. w. Venezulea.
b) fulva Lindl. (= *Anguloa superba* H. B. K., p. 60 et p. 37, II.).
longiscapa v. Houtte, langschaftige, 4. w. Südamerika.

Peristrophe N. E., bicalyculata N. E., Lanceolaria N. E., speciosa N. E., tinctoria N. E., v. Justicia, Sect. IX., p. 435 et p. 332, II.

Peristylus Blum., Lindl., Cirkelgriffel, XX. 1., Orchideae.
bracteatus Lindl. (= *Gymnadenia bracteata* Presl, = *Habenaria bracteata* RBr. = *Orchis bracteata* W. = *Satyrium bracteatum* P.), deckblätteriger, 4. f. b. k. Nordamerika.
constrictus Lindl. (= *Herminium constrictum* Lindl. = *Platanthera constricta* Lindl.), verengerter, 4. w. Ostindien.
cordatus Lindl. (= *Habenaria cordata* RBr. = *Herminium cordatum* Lindl. = *Orchis cordata* W. = *Satyrium diphyllum* Lk.), herzförmiger, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.
goodyeroides Lindl. (= *Habenaria goodyeroides* Don, = *Herminium goodyeroides* Lindl.), goodyeraähnlicher, 4. w. Ostindien.
plantagineus Lindl. (= *Herminium plantagineum* Lindl.), wegtrittähnlicher, 4. w. Ostindien.
virescens Lindl. (= *Habenaria virescens* Spgl. = *Orchis virescens* Mühlbg.). grünlicher, 4. k. Pensylvanien.
viridis Lindl. (= *Coeloglossum viride* Hartm. = *Habenaria viridis* RBr. = *Himantoglossum viride* Rchb. = *Orchis batrachytes* Schrk. = *O. virens* Scop. = *O. viridis* Sw. = *Platanthera viridis* Lindl.).
albidus Lindl., v. Leucorchis albida, p. 356, II.
Perlebia triquetra DC., v. Colladonia triquetra, p. 154, II.

Pernettya Gaudich., Pernettye.
elliptica DC., elliptische, ♄. k. f. b. Nordamerika.
microphylla Gaudich. (= *Cavanillesiana* G. Don, = ? *myrsinites* G. Don), β? serpyllifolia DC. (= *Arbutus microphylla* Forst. = *A. serpyllifolia* Lam.).
Peroioa (= *Peroa* P.) *microphylla* Cav., v. Leucopogon microphyllus, p. 459.
Peronia stricta DC., v. Thalia dealbata, p. 804.

Perotis Ait.
latifolia Ait. (= *patula* N. E. = *spicaeformis* P. B. = *Agrostis spicaeformis* L. fil. = *Anthoxanthum spicaeforme* Auct. = *Saccharum spicatum* L. = *Xystidium barbatum* Presl).

Perotriche Cass., Zottenhaar, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
tortilis Cass., gedrehtes, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Perrottetia barbata DC., v. Nicolsonia barbata, p. 547.

Persea Mill., G., Avogatobaum.
carolinensis N. E. (= *Borbonia* Spgl. = *Laurus Borbonia* L. = *L. carolinensis* Mchx.), carolinischer, ♄. k. Carolina.
gratissima G. fil. (= *americana* Mill.).

Digitized by Google

Persea
indica Spgl. (= *Laurus americana* Hrb. Berol. = *L. indica* L., p. 449, = *L. Teneriffae* Poir.).
Camphora Spgl., v. Camphora officinarum, p. 114, II., *canariensis* Spgl., v. Laurus canariensis, p. 449, *Cassia* Spgl., *Cinnamomum* Spgl., *nitida* Spgl., *Tamala* Spgl., v. Cinnamomum aromaticum, zeylanicum, eucalyptoides, Tamala, p. 144 et 145, II., *caustica* Spgl., v. Mauria simplicifolia, p. 390, *exaltata* Spgl., *foetens* Spgl., v. Oreodaphne exaltata et foetens, p. 456, II., *globosa* Spgl. (= *sanguinea* Spgl.), v. Nectandra sanguinea, p. 431, II., *patens* Spgl., v. Phoebe patens, *Sassafras* Spgl., v. Sassafras officinale, *surinamensis* Spgl., *crassifolia* Spgl. (= *Richardiana* Schltdl.), v. Ocotea guianensis et puberula, p. 443, II.
Persicaria virginiana G., v. Polygonum virginianum, p. 644.

Persica T., v. Amygdalus Sect. II. p. 50, *ispahamensis* Thouin. (= *laevis* DC.), v. A. Nucipersica, p. 50.

Persoonia Sm., Persoonie.
Caleyi RBr., Caley's, ♄. t. Neuholland.
cornifolia Cunn., hartriegelblätterige, ♄. t. Neuholland.
Cunninghamii RBr., Cunningham's, ♄. t. Neuholland.
daphnoides Cunn. (= ?*revoluta* Sieber), kellerhalsähnliche, ♄. t. Neuholland.
ferruginea Sm. (= *laurina* P.).
Fraseri RBr., Fraser's, ♄. t. Neuholland.
glauca Sm. (= ?*articulata* RBr.), blaugrüne, ♄. t. Neuh.
gnidioides Sieber, (= *Chamaepithys* Cunn.), gnidiaähnliche, ♄. t. Neuholland.
lanceolata Andr. (= *ligustrina* Knight, Salisb.).
Laureola Lindl., Lorbeer-P., ♄. t. Neuholland.
linearis Andr. (= *angustifolia* Knight et Salisb. = *filifolia* Dietr.).
longifolia RBr. (= *Drummondii* Lindl.).
macrostachya Lindl., grofsährige, ♄. t. Neuholland.
marginata Cunn., geränderte, ♄. t. Neuholland.
microcarpa RBr., kleinfrüchtige, ♄. t. Neuholland.
myrtilloides Sieber, (= *oleaefolia* Cunningh.).
quinquenervis Hook., fünfnervige, ♄. t. Neuholland.
rigida RBr., starre, ♄. t. Neuholland.
salicina P. (= *latifolia* Knight et Salisb. = *Linkea laevis* Cav.).
thymifolia Cunn., thymianblätterige, ♄. t. Neuholland.
virgata RBr., ruthenförmige, ♄. t. Neuholland.
Unbestimmtere: fusca Hort., ledifolia Hort.
Persoonia Mchx., *angustifolia* Mchx., *lanceolata* Mchx., *latifolia* Mchx., v. Marshallea angustifolia, lanceolata, latifolia, p. 497 u. 598.
Persoonia guareoides W., v. Carapa guianensis, p. 160.

Peschiera A. DC., (Peschier, ein Genfer, hat mehrere chemisch botanische Abhandlungen herausgegeben), V. 1., Apocyneae.
muricata A. DC. (= *Tabernaemontana muricata* Lk., R. et S., p. 796), weichstachelige, ♄. ♄. w. Brasilien.
echinata A. DC. (= *Tabernaemontana echinata* Aubl.), Guiana; Hystrix A. DC. (= *Tubern. Hystrix* Steud. = *T. echinata* Arrab., Velloz. Flor. Flum.), Brasil., beide scheinen noch nicht eingeführt.

Digitized by Google

Petagnia Guss., (Petagna, neapolitanischer Botaniker etc. †), V. II., Umbelliferae.

saniculaefolia Guss. (= *Sison Gussonianum* Balb. = *S. Gussonii* Spgl.), Sanikelblätterige, 4. l. b. Sicilien.

Petalacte Don, DC., Garbenimmortelle, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

coronata Don, (= *Evax involucratus* Schrank, = *Gnaphalium Achilleae* Sieber, = *G. coronatum* L. = *Petalolepis coronata* Less.), gekrönte, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Petalidium N. E., Kleinblättler, XIV. II., Acanthaceae.

barlerioides N. E. (= *Ruellia barlerioides* Roth, = *R. bracteata* Roxb.), barleriaähnlicher, ♄. w. Ostindien.

Petasites C. Bauh., T., Pestilenzwurz.

I. Genuinus.

vulgaris Dsf. (= *officinalis* Mch.), b) hybridus G. M. Sch. (= *Tussilago hybrida* L.).

II. Nardosmia Cass., DC.

fragrans (Rchb.), (= *N. denticulata* Cass.).

laevigatus Rchb. (= *N. straminea* Cass.).

Petasostylis Griseb., Hutgriffel, V. I., Contortae-Gentianeae.

nigrescens Griseb. (= *Leianthus nigrescens* Griseb.), schwärzlicher, ⊙. ♂. k. Mexico.

saponarioides Griseb. (= *Leianthus saponarioides* Griseb. = *Lisianthus saponarioides* Cham. et Schltdl.), seifenkrautähnlicher, ⊙. ♂. k. Mexico.

Petesioides laurifolium Jacq., v. Wallenia laurifolia.

Petilium T., L., imperiale J. St. Hil., v. Fritillaria, Sect. II.

Petiveria Plum., Petiverie.

alliacea L. (= *octandra* Jacq.).

tetrandra Gomez, N. E. (= *alliacea* L. var. Spgl.), viermännige, ♄. w. Brasilien.

Petrea L. (= *Petraea* Auct.), Petrea.

arborea H. B. K., baumartige, ♄. w. Neugranada.

oblonga Spgl. (= *racemosa* N. E., Mart.), längliche, ♄. w. Brasilien.

volubilis L. (= ?*Stapplesii* Hort. angl.), windende, ♄. Sch. w. Westindien.

Petrobium RBr.

arboreum RBr. (= *P. Forsteri* Cass. = *Bidens arborea* Roxb. = *Drimyphyllum Helenianum* Burch. = *Laxmannia arborea* Forst. = *Spilanthes arborea* Forst. = *S. pseudogummifera* Forst. = *S. tetrandra* Roxb.).

Petrocarya campestris W., *excelsa* Steud., *macrophylla* Steud., v. Parinarium campestre, excelsum, macrophyllum, p. 586.

Petrocoptis A. Braun, Felsennelke, X. IV., Caryophyllaceae-Sileneae.

pyrenaica A. Braun, (= *Agrostemma pyrenaica* G. Don, = *Lychnis nummularia* Lapeyr. = *L. pyrenaica* Berg., p. 482).

Petrogeton Eckl., Zeyh., Felsendickblatt, V. IV., Corniculatae-Crassulaceae.

dentatum Eckl., Zeyh. (= *Crassula dentata* Thbg.), gezahntes, 4. k. t. Südafrika.

Umbella Eckl., Zeyh. (= *Crassula Umbella* Jacq. = *Septas Umbella* Haw., p. 746).

Digitized by Google

Petrophila RBr., Felsenprotea(freund).

brevifolia Lindl., kurzblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

Cunninghamii Meisn., Cunningham's, ♄. t. k. Neuholl.
α) major Meisn., β) brachyphylla Meisn., ?γ) gracilis A. Cunningh.

glanduligera Lindl., drüsentragende, ♄. t. k. Neuholl.

heterophylla Lindl., verschiedenblätterige, ♄. t. k. Neuh.

Hügelii ?Lindl. (= *Isopogon Hügelii* Hort), Hügel's, ♄. t. k. Neuholland.

juncifolia Lindl., simsenblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

longifolia RBr., langblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

phylicoides RBr., phylicaähnliche, ♄. t. k. Neuholland.

pulchella RBr. (= *fucifolia* Knight et Salisb. = *Protea dichotoma* Cav. = *Pr. fucifolia* Salisb. = *Pr. pulchella* Schrad., Wendl.).

seminuda Lindl., halbnackte, ♄. t. k. Neuholland.

teretifolia RBr., β) cornigera Meisn. (= *Isopogon cornigerus* Lindl.).

Petroselinum Hoffm., Peter-(Stein-)silge.

peregrinum Lagasca, K. (= ?*romanum* Sweet, = *Ammi petroselinoides* Haenke hrb. = *Apium latifolium* Poir. = ?*A. romanum* Zuccag. = *Bupleurum petroselinoides* Spgl. = *Ligusticum peregrinum* L. = *Sison peregrinus* Spgl.), fremde, ♂. f. k. Peru, Spanien, Portugal.

sativum Hoffm. (= *hortense* Hoffm.), β) crispum (Mill.), γ) latifolium (Mill.), δ) tuberosum (Bernh., Dsf.), ε) longifolium Hort., ζ) romanum Sweet (Zuccag.).

selinoides DC. (= *Selinum peregrinum* W.), Selinumähnliche, 4. f. ?

fractophyllum Lagasc. = ? Apium fractophyllum, p. 68.

Pettera graminifolia Rchb., v. Eremogone graminifolia, p. 878 et p. 227, II.

Petunia Juss., Petunie.

intermedia G. Don, (= *linearis* Paxton, = *Nierembergia intermedia* Grah., Sweet, = *Salpiglossis linearis* Hook.), 4. ♄. Bonaria.

viscosa Miers, schmierige, 4. k. t. Chili.

Hybriden und Varietäten, aufser den p. 610 verzeichneten noch eine grofse Anzahl, die zum Theil wieder jährlich durch neuerzeugte und schönere verdrängt werden: z. B. Adamsii, Alice Gray, Atkinsoniana D. Don, (= *Nierembergia Atkinsonia* Sweet), Baron de Pronay, Beauté de Gaud, Comte de Paris, Conservative, Couronne bicolore, Cupris, decora, Diégo Léon, Duc de Brabant, Dr. Lindley, Dumont d'Urville, Enchantress, formosa, Frédéric II., Goethe, Grand Mogul, Hildida, Lady Peel, Lord Byron, Magician, magnum bonum, Medora, ornatissima, Othello, Panacheé de Gendbrugge, Prince de Joinville, Prince Ferdinand, Princesse Palffy, Prinz Carl August v. Sachsen-Weimar, punctata, Redouté, rosea delicatissima, Schiller, Sir Henry Pottinger, triumphans, versicolor, Vésuve, Victoire panachée, Volney, Warscewitz, Walter Scott, Willmoreana u. v. a., deren Stammältern P. Mirabilis Rchb. (= *phoenicea* D. Don) und P. nyctaginiflora Juss. sind.

acuminata Grah., v. Nicotiana acuminata, p. 547.

Digitized by Google

Peucedanum T., Haarstrang.

alpestre L. (= *album* Dsf. = *minus* Poir. = *Silaus alpestris* Bess.).

alsaticum L. (= *pyrenaicum* Colla).

angelicaefolium Turcz., angelicablätteriger, 4. f. Sibirien.

baicalense K. (= *terebinthinaceum* Fisch. = *Pteroselium sibiricum* Rchb. = *Selinum baicalense* Redowsky, = *S. collinum* W. K. = *S terebinthinaceum* Trevir.).

Besserianum DC. (= *Ferula Besseri* Spgl.), Besser's, 4. f. Odessa.

canescens Ledeb., grauliche, 4. f. Alt. Sibirien.

Cervaria Cusson, Lapeyr. (= *glaucum* Dum. Cours. = *Cervaria glauca* Gaud. etc.).

β) laeve (Gaud.).

Chabraei Gaud. (= *Carvifolia* Vill. = *minus* All. = *Imperatoria Chabraei* Spgl. = *Palimbia Carvifolia* K. = *P. Chabraei* DC. etc.).

β) podolicum (Bess.), DC. (= *Oreoselinum podolicum* Hoffm. = *Selinum podolicum* Bess. = *Seseli pimpinelloides* Wall.).

dahuricum Turcz. (= *Oreoselinum dahuricum* Bess.).

elatum Ledeb., hoher, 4. f. Alt. Sibirien.

ferulaeoides Steud. (= *paniculatum* Ledeb., non Loisel.), steckenkrautähnlicher, 4. f. Alt. Sibirien.

gallicum T., P. (= *Latourettii* Cuss. = *parisiense* DC. = *refractum* Vill.).

humile Turcz. (= *Oreoselinum humile* Bess.), niedriger, 4. f. Baical. Sibirien.

Hystrix Bunge, igelstacheliger, 4. f. Alt. Sibirien.

involucratum K. (= *Oreoselinum peucedanoides* Hoffm. = *Pteroselinum peucedanoides* Rchb. = *Selinum argenteum* All. = *S. peucedanoides* Dsf.), eingehüllter, 4. f. Piemontesische Alpen.

italicum Mill., Rchb. (= *gallicum β luteum* Spgl. = *officinale β italicum* DC.).

laciniatum * (= *Ledebourii* Steud. = *dissectum* Ledeb., non DC.), schlitzblätteriger, 4. f. Alt. Sibirien.

latifolium DC. (= *Angelica laevigata* Fisch.), breitblätteriger, 4. f. Caucasus.

lativittatum Fisch., Mey. et Lallem., breitschleieriger, 4. f. Soongaria.

Ledebourii G. Don, (= *P. officinale* Ledeb., non L.), Ledebour's, 4. f. Altai.

longifolium W. K., β) majus.

montanum K. (= *Selinum palustre* L. spec.), Bergliebender, 4. f. Schweiz, Frankreich.

Morisoni Bess. (= ? *Ligusticum longifolium* W. spec.), Morison's, 4. f. Sibirien.

officinale L. (= *altissimum* Dsf.).

Petteri Visian. (= *coriaceum* Rchb. = *Pastinaca Petteri* Visian.), Petter's, 4. f. h. Dalmatien.

salsum Steud. (= *redivivum* Pall. = *Agasyllis salsa* Spgl. = *Ferula salsa* Ledeb. = *Palimbia salsa* Bess. = *Siler salsum* Spgl. = *Sison salsum* L. fil. *S. verticillatum* Pall. = *Sium nudicaule* Lam.), Salinen-H., 4. f. Süd- und Ostrufsland.

Schottii Besser. (= *glaucum* Auct., non DC. = *Imperatoria Chabraei* Bess. = *I. glauca* Bartl. = *Pastinaca glauca* Scop. = *Pteroselinum glaucum* Rchb.).

selinoides DC. (= *Selinum sibiricum* Retz, p. 740, =

Digitized by Google

Peucedanum

Thysselinum involucratum Mönch.), silgenähnlicher, ♂. 4. f. Sibirien.

sibiricum W. (= *Ferula sibirica* Spgl. = *F. tatarica* Fisch., MB.), sibirischer, 4. f. Sibirien, Caucasus, Bessarabien, Croatien.

sylvestre DC. (= *palustre* Mch. = *Athamantha flexuosa* Jacq. = *A. pisana* Savi, = *Selinum palustre* L. = *S. sylvestre* Jacq., non L. = *S. Thysselinum* Crtz. = *Th. angustifolium* Rchb. = *Th. palustre* Hoffm., p. 810, = *Th. Plinii* Spgl. = *Th. sylvestre* Rchb.), Wald- und Sumpfliebender, ♂. 4. f. Nord- und Osteuropa.

β) intermedium Bess. (= *Callisace Schiwereckii* Hoffm. = *Selinum Schiwereckii* Bess.), *γ)* cantabrigiense Fisch. (= *Callisace cantabrigensis* Hoffm.).

tenuifolium Thbg. (non Dsf.), dünnblätteriger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

vaginatum Ledeb., scheidiger, 4. f. Alt. Sibirien.

varium Fisch., Mey. et Lallem., bunter, 4. f. Soongaria.

venetum K. (= *alsaticum β palustre* Sieber, = *Selinum austriacum* Bertol. = *S. venetum* Spgl.).

album Hort., v. Coenolophium Fischeri, p. 876, *alpestre* Steven, non L. (= *tauricum* H. Par.), *Carvifolia* MB., non Vill., v. Bunium peucedanoides et virescens, p. 82, II., *arenarium* Hort. (= *Matthioli* Spgl. = *serotinum* P. = *tenuifolium* Dsf.), v. Silaus tenuifolius, *Bellardi* Lagasca, (= *imperatorioides* Lk.), *caucasicum* Endl., *Ostruthium* K., v. Imperatoria angustifolia, caucasica, Ostruthium, p. 415 et p. 315, II., *caspicum* Lk. (= *dubium* Ledeb. = *gracile α* Ledeb.), v. Ferula caspica, p. 243, II., *Petroselinum* Dsf., v. Cnidium Petroselinum, p. 150, II., *pratense* Lam. (= *Silaus* L.), v. Silaus pratensis, p. 755, *verticillare* K., v. Tommasinia verticillaris, *vocontiorum* Spgl., v. Heracleum minimum, p. 295, II.

Peumus fragrans P. (= *Boldus* Molin.), v. Boldoa fragrans, p. 72, II.

Phaca L., Berglinse.

alpina Jacq., *β)* dahurica Fisch. (= *membranacea* Fisch.), *γ)* sibirica Hort. Petropol.

astragalina DC. (= *minima* Vill. = *Astragalus alpinus* L.).

brachytropis Steven, (= *Astragalus brachytropis* C. A. Mey.), kurzkielige, 4. f. h. Ostkaucasus.

lapponica Wahlbg. (= *montana* Whlbg. = *Astragalus Cervini* Thomas, = *A. valesiacus* Thom. = *Oxytropis cyanea* Rchb. = *O. lapponica* Gaud., p. 579).

subverticillaris Fisch. et Mey. (= *Astragalus subverticillaris* Grah.), fastwirtelförmige, 4. f. Sibirien.

trigonocarpa Turcz., dreikantigfrüchtige, 4. f. h. Sibirien (Baical).

triflora DC. (= *Candolleana* H. B. K. = *pauciflora* P.), dreiblumige, ⊙. f. Peru.

villosa Nutt. (= *Astragalus villosus* Mchx.), zottige, 4. f. Nordamerika.

Phacelia Juss., Mchx., Phacelie.

ciliata Benth., gewimperte, ?⊙. f. Californien.

Digitized by Google

Phacelia

circinnata Jacq. fil. (= *californica* Cham. = *hastata* Dougl. = *heterophylla* Pursh, = *rudis* Dougl. = *Aldea circinnata* W. Enum. = *Hydrophyllum magellanicum* Lam. = *Heliotropium pinnatum* Vahl). Nortwestl. Amerika, Mexico, Peru, Chili und Magellanische Meerenge.

β) obtusiloba A. DC., *γ*) acutiloba A. DC., *δ*) paniculata A. DC. (= *peruviana* Spgl. = *Aldea peruviana* R. et P. = *Heliotropium pinnatum* W. herb. = *Hydrophyllum paniculatum* Poepp.).

congesta Hook. (= *conferta* G. Don).

ramosissima Benth., ästigste, ? ☉. f. Nordam. (Oregongeb.).

fimbriata Richard, Mchx., *parviflora* Pursh, v. Cosmanthus fimbriatus, p. 222 et parviflorus, p. 163, II. *Phacosperma peruviana* Haw. = Calandrinia Phacosperma, p. 105, II.

Phaecasium Cass., lampsanoides Cass., v. Crepis, Sect. III. p. 167, II.

Phaedranassa Herb., Glanzkönigin, VI. 1., Amaryllideae.

chloraea Herb., grünliche, 4. Zw. w. Peru.

Phaenocoma D. Don.

prolifera D. Don, (= *Phaenocoma prolifera* Auct., p. 617).

Phaenopus DC. (= *Phoenixopus* Cass.), Ruthensalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

acanthifolius Cass. (= *Chondrilla acanthifolia* Poir. = *Prenanthes acanthifolia* W.), bärenklaublätteriger, ♂. 4. k. Creta.

triqueter DC. (= *Lygodesmia triquetra* Don, = *Prenanthes triquetra* LaBill.), dreiseitiger, ♂. f. b. k. Syrien.

vimineus Rchb. (= *decurrens* Cass.), *β*) ramosissimus Rchb. (= *Chondrilla ramosissima* Zeyh. = *Prenanthes ramosissimus* All.), p. 884.

Phaeostoma Spach, *elegans* Lilja, (= *Douglasii* Spach), *unguiculata* Lilja, v. Clarkia elegans et unguiculata, p. 202 et p. 148, II.

Phagnalon Cass., Filzstrauch.

calycinum DC. (= *Bennetii* Lowe, = *Conyza calycina* Cav.), kelchiger, ♄. k. Madeira.

pumilum DC. (= *Conyza pumila* Sibt., Sm. = *C. pygmaea* Sieber), kleiner, ♄. k. Creta.

rupestre DC. (= *spathulatum* Cass. = *Tenorii* Presl, = *Conyza geminiflora* Tenore, = *C. rupestris* L. = *C. tomentosa* Forsk.).

saxatile Cass. (= *subdentatum* Cass. = *Conyza saxatilis* L.).

sordidum DC. (= *tricephalum* Cass. = *Conyza sordida* L. = *Gnaphalium conyzoideum* Lam. = *G. sordidum* L.).

Phajus Lour., Lindl., Prachtstendel.

albus Lindl., weifser, 4. w. Ostindien.

bicolor Lindl., zweifarbiger, 4. w. Ceylon.

Blumei Lindl. (= *Limodorum Incarvillei* Blume), Blume's, 4. w. Java.

flavus Lindl. (= *Limodorum flavum* Blume), hellgelber, 4. w. Java.

grandifolius Lour. (= *grandiflorus* Auct. = *Bletia Tankervilliae* RBr., p. 125, = *Limodorum Tankervilliae* Ait. = *L. Incarvillei* P. = *Pachyne spectabilis* Salisb.), grofsblätteriger, 4. w. China.

Digitized by Google

Phajus
indigoferus Hassk., Indigo-P., 4. w. Java.
maculatus Lindl. (= *Bletia flava* Wall. = *B. Woodfordii* Hook.), gefleckter, 4. w. Ostindien.
niveus v. Houtte, schneeweifser, 4. w. Ostindien.
veratrifolius Lindl. (= *Cymbidium veratrifolium* Roxb. = *Dendrobium veratrifolium* Roxb.), germerblätteriger, 4. w. Ostindien.
Wallichii Lindl. (= *intermedius* Hort. = *grandifolius* Lindl. in Wall. Catal.), Wallich's, 4. w. Ostindien.
Phalacrodiscus arvensis Fisch. et Mey., v. Pyrethrum arvense, *ceratophylloides* Less., *corsicus* Less., *graminifolius* Less., *lanceolatus* Less., *maximus* Less., *montanus* Less., v. Leucanthemum cebennense, corsicum, graminifolium, lanceolatum, maximum, montanum, p. 183.

Phalacroloma Cass., Kahlsaum, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
Beyrichii Fisch. et Mey. (= *Erigeron Beyrichii* H. Berol. = *E. strigosum* Beyr. = *Stenactis Beyrichii* Fisch. et Mey.), Beyrich's, ☉. ♂. f. Carolina.
obtusifolium Cass. (= *Erigeron carolinianum* L. = *E. hyssopifolium* Mchx.), stumpfblätteriger, 4. f. Nordam. *angustifolium* Cass., v. Stenactis annua, p. 786. *Phalangium bicolor* Redout., DC. (= *planifolium* P.), v. Simethis bicolor, *coeruleum* Poir., v. Pasithea coerulea, p. 478, II., *esculentum* Nutt. (= *Quamash* Pursh), v. Camassia esculenta, p. 151, *elatum* Poir. (= *fastigiatum* Poir.), v. Chlorophytum elatum, p. 192, *Liliastrum* Poir., v. Czackia Liliastrum, *paniculatum* Redout. (= *milleflorum* Hort.), *pendulum* Redout., v. Arthropodium paniculatum et pendulum, p. 85, *pomeridianum* Don, Sweet, v. Chlorogalum pomeridianum, Ornithogal. Sect. III., p. 459, II., *reflexum* Poir., v. Echeandia terniflora, p. 213, II., *serotinum* Lam., v. Lloydia serotina, p. 470 et p. 366, II., *sulphureum* Poir., v. Ornithogalum sulphureum, p. 458, II., *virgatum* Poir., v. Nolina georgiana, p. 549.
Hinsichtlich der übrigen s. überhaupt Anthericum, p. 63 und p. 38, II.

Phalaris L., Glanzgras.
I. Genuina.
angusta N. E. (= *laxa* Spgl. herb.), schmales, ☉. f. Brasilien.
brachystachya Lk. (= *canariensis* Brotero, non L. = *nitida* Presl, = *quadrivalvis* Lagasca).
dentata L. fil. (= *minor* var. *monstrosa* N. E. = *Chilochloa dentata* Trin. = *Phleum dentatum* P.), gezahntes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
gracilis Parlat., schlankes, ☉. f. Malta.
nodosa L. (= *aquatica* Brot., Sibth. = *bulbosa* Cav. = *tuberosa* L.).
paradoxa L. (= *praemorsa* Lam.).
truncata Gussone, abgestutztes, ☉. f. Sicilien.
II. Baldingera G. M. S. (= *Digraphis* Trin.).
americana Ell. (= *arundinacea* Mchx. = *Ludoviciana* Torr. = *Calamagrostis colorata* Nutt.).
arundinacea L. (= *colorata* P. Beauv. = *Arundo colorata* Ait. = *Baldingera arundinacea* Dumort. =

Digitized by Google

Phalaris

B. colorata Flor. Wetter. = *Calamagrostis colorata* Sibth. = *C. variegata* Wither. = *Digraphis arundinacea* Trin. = *Typhoides arundinacea* Mch.).

b) variegata (= *picta* Hort.).

alpina Hänke, (= *ciliata* Lagasca, = *Michelii* Savi, = *mucronata* Dsf. = *phleoides* Savi), *arenaria* W., *aspera* Retz, (= *paniculata* Ait. = *tenuifolia* Host), *Bellardi* W. (= *tenuis* Host, = *cylindria* DC. = *sativa* P. = *subulata* Savi,), *cuspidata* Hort. (= *trigyna* Host, = *mucronata* Dsf.), *phleoides* L., v. Phleum Michelii, arenarium, asperum, tenue, cuspidatum et Böhmeri, *Ammophila* Lk. (= *maritima* Nutt.), v. Psamma arenaria, p. 661, *aristata* Gouan, (= *cristata* Forsk.), v. Polypogon monspeliensis, p. 646, *aristata* Schousb., v. Alopecurus lasiostachyus, p. 37, *Barrelieri* Tenore, (= *pubescens* Lam.), v. Koeleria villosa, p. 499, *disticha* Forsk., v. Sporobolus pungens, p. 780, *erucaeformis* L., v. Beckmannia erucaeformis, p. 116, *explicata* Lk., *geniculata* Sibth., Sm., v. Crypsis alopecuroides et geniculata, *muricata* Forsk., v. Lappago racemosa, p. 445, *oryzoides* L., v. Leersia oryzoides, p. 351, *semineutra* R. et S., v. Poa semineutra, *setacea* Forsk., v. Pennisetum dichotomum, p. 605.

Phalerocarpus G. Don, Glanzheere.

serpyllifolius G. Don, (= *hispidulus* * p. 612, = *Arbutus filiformis* Lam. = *A. thymifolius* Ait. = *Chiogenes serpyllifolia* Salisb. = *Glyciphylla hispidula* Rafin. = *Gaultheria serpyllifolia* Pursh, = *Schollera hispidula* Roth, = *Vaccinium hispidulum* L.).

Phalocallis Hook., *plumbea* Lindl. = Cypella plumbea.

Phaloe nodosa Dumort., *saginoides* Dumort. (= *subulata* Dumort.), v. Spergula nodosa, saginoides, subulata, p. 776.

Pharbitis Choisy, Buntwinde.

acuminata Choisy, (= *Convolvulus acuminatus* Vahl, *C. mutabilis* Spgl. = *C. tomentosus* Velloz. = *Ipomoea mutabilis* Ker), zugespitzte, 4. Sch. w. Südamer.

β) congesta Choisy.

bogotensis Choisy, (= *Convolvulus bogotensis* H. B. K. = *Ipomoea bogotensis* G. Don), bogotaische, 4. ♄. Sch. w. Südamerika.

cathartica Choisy, (= *Convolvulus africanus* Nick. = *C. portoricensis* Spgl. = *C. pudibundus* Lindl. = *Ipomoea cathartica* Poir. = *I. pudibunda* G. Don), purgirende, 4. Sch. w. St. Domingo, Portorico, Mexico.

cuspidata G. Don, (= *mutabilis* Boj. = *Convolvulus peruvianus* Spgl. = *Ipomoea cuspidata* R. et P.), feinspitzige, 4. Sch. w. Mittägl. Amerika.

eriocalyx Mart., wollkelchige, ⊙. Sch. w. m. f. Brasilien.

fragrans Boj. (= *Ipomoea fragrans* Boj. = *? I. Lindleyi* Choisy), wohlriechende, 4. Sch. w. Madagascar.

hederacea Choisy, (= *barbata* et = *Forskohlei* G. Don, *Convolvulus hederaefolius* Spgl. = *C. hirsutus* Roem. non Stev. = *Ipomoea avicularis* Raf. = *I. barbata* Roth, non Choisy, = *I. hederacea* L. = *I. ? phymatodes* Spgl. = *I. scabra* Forsk., non Gmel.), epheu-

Digitized by Google

Pharbitis

ähnliche, ⊙. Sch. f. Nordamerika, Brasilien. China, Himalaya, Neuholland.

β) scabrida G. Don, (= *Ipomoea scabrida* R. et S.).

heterophylla Choisy, (= *Batatas heterophylla* et *Willdenowii* G. Don, = *Convolvulus heterophyllus* Spgl. = *Ipomoea bulbocastana* Moç. et Sess. = *I. heterophylla* Ortega), verschiedenblätterige, 4. Kn. Sch. w. Mexico, Cuba.

hispida Choisy, (= *githaginea* Hochst. = *Convolvulus mutabilis* Sal., non Spgl. = *C. glandulifer* Spgl. = *C. purpureus* L. = *Convolvuloides leucospermos* et *purpurea* Mch. = *Ipomoea discolor* Spgl. = *I. glandulifera* R. et P. = *I. intermedia* Schult. = *I. hispida* Zuccag. = *I. purpurea* Lam. = *I. Zuccagni* R. et S.), steifhaarige, ⊙. f. Mittägl. Amerika.

b) incarnata, c) leucantha, (= *Ipomoea philadelphica* Hort.), d) varia.

insularis Choisy, (= *Ipomoea insularis* Steud.), Insel-B., ⊙. Sch. m. f. Neuholland, Marianen, Norfolkinsel.

Learii Hook. (= *Ipomoea Learii* Paxt.), Lear's, 4. Sch. w. Mexico, Vera Cruz, Buenos Ayres, Ceylon.

medians Choisy, (= *villosa* G. Don, = *Convolvulus Ruizii* Spgl. = *Ipomoea villosa* R. et P. = *I. ? involucrata* Dietr.), mittlere, ⊙. Sch. w. m. f. Mascarenas, Peru.

mollis Choisy, (= *Convolvulus mollis*. H. B. K. = *C. cynanchifolius* W. msp. = *Ipomoea mollis* G. Don), weiche, 4. Sch. w. Neuandalusien.

Nil Choisy, (= *punctata*, *Purshii* et *scabra* G. Don, = *Convolvuloides triloba* Mch. = *Convolvulus coeruleus* Spgl. = *C. hederaceus* L. = *C. Nil* L. = *Ipomoea coerulea* Koen. = *I. Nil* Roth, = *I. punctata* P. = *I. scabra* Gmel.), himmelblaue, ⊙. Sch. w. m. f. Nord- u. Südamerika, Ostindien, Südafrika etc.

β) abbreviata Choisy, (= *Dillenii* G. Don, = *Convolvulus Dillenii* Desr. = *? Ipomoea bicolor* R. et S.), γ) integrifolia Choisy, (= *Convolvulus coelestis* Forst. = *? Ipomoea coerulescens* Roxb. et Wall.), δ) diversifolia Lindl. (= *? variifolia* Decaisne = *Convolvulus Lindleyi* et *? variifolius* Steud.).

pubescens Choisy, (= *varia* G. Don, = *Batatas Papirin* et *subtriloba* G. Don, = *Convolvulus pubescens* W. Enum. = *C. Papiria* Spgl. = *Convolvuloides pilosa* Mch. = *Ipomoea pubescens* Lam. = *I. Papirin* R. et P. = *I. Papiru* Poir. = *I. subtriloba* R. et P. = *I. varia* Roth), weichhaarige, 4. Sch. w. Peru, Brasilien.

rosea Choisy, rosafarbige, ⊙. Sch. w. m. f. Brasilien.

serotina Choisy, (= *Convolvulus serotinus* DC. h. msp. = *Ornithosperma serotina* Rafin. = *Quamoclit serotina* G. Don); spätblühende, 4. Sch. w. Mexico.

speciosa Choisy, prächtige, ⊙. Sch. w. m. f. Mexico.

tomentosa Choisy, (= *Convolvulus tomentosus* L., non Lour. = *C. jamaicensis* Pluk.), filzige, 4. Sch. w. Jamaica.

Weniger gekannte oder zweifelhafte Arten:

ostrina Lindl., purpurfarbige, 4. Kn. Sch. w. Cuba.

violacea Boj. (= *Convolvulus violaceus* Spgl., non Vahl,

Digitized by Google

Pharbitis

= *C. indicus* Mill. = *Ipomoea violacea* L.), violette, ⊙. Sch. w. m. f. Mittägl. Amerika.

bracteata Choisy, (= *Ipomoea bracteata* Rud., Ledeb. = *I. Rudolphi* R. et S.). St. Domingo.

Preauxii Webb, Canarische Inseln, werden nicht kultiv. *thrianthina* Hook., v. Ipomoea tyrianthina, p. 421 et p. 321, II.

Pharium elegans Steud. (= *fistulosum* Herb. = *Herberti* Steud.), v. Bessera elegans, p. 66, II.

Pharnaceum albens Thbg., *incanum* L. mant. (= *lineare* Andr.), *lineare* Ait., *pruinosum* Haw., v. Ginginsia albens, elongata, aurantiaca et pruinosa, p. 263, II., *Cerviana* L., *cordifolium* L., *dichotomum* L., etc., v. Mollugo Cerviana, cordifolia etc., p. 413 et 414, II., *depressum* L., v. Polycarpaea depressa, *Mollugo* L. spec. (= *glomeratum* Thbg.), v. Adenogramma galioides p. 9, II., *Mollugo* L. mant., v. Glinus Mollugo, p. 265, II., ?*suffruticosum* Pall., v. Geblera suffruticosa.

Pharus L., Cannagras.

brasiliensis Raddi, (= *pubescens* Spgl. = *Abildgardia polystachya* Spgl.), brasilianisches, 4. w. Brasilien.

scaber H. B. K. (= *lappulaceus* Aubl. = *latifolius* Lam. = *ovalifolius* Hamilt.), scharfes, 4. w. Südamer.

Phaseolus T., Bohne.

abyssinicus Savi, abyssinische, ⊙. Sch. f. Abyssinien.

aconitifolius L. fil., Jacq. (= *lobatus* Roxb. = *palmatus* Forsk. = *trilobus* Wall. = *Dolichos dissectus* Lam.).

anguineus Bunge, schlangenähnliche, ⊙. Sch. f. Nordchina.

angulosus Ortega, (= *vexillatus* Walt., non L. = *Dolichos angulosus* DC. = *Glycine angulosa* W. = *Strophostyles angulosa* Ell.), kantige, ⊙. Sch. f. Nordamerika.

asperrimus Schrank, raueste, ⊙. Sch. m. f. Brasilien.

bicolor Arrabida, zweifarbige, ⊙. Sch. w. m. f. Brasilien.

chlorospermus Tenore, grünsaamige, ⊙. Sch. f. ?

citrinus Savi, citronfarbige, ⊙. Sch. f. ?

farinosus L. (= *Phaselus lanatus* Mch.).

ferrugineus Salzw., Mediv. (= *Ervum mastichinum* Pall.), rostfarbige, ⊙. Sch. f. ?

ficifolius Schrad., feigenblätterige, ⊙. Sch. w. m. f. Ostindien.

formosus H. B. K., schöne, ⊙. Sch. m. f. Neuspanien.

glycinaeformis Weinm., glycinenähnliche, ⊙. Sch. f. China.

Hernandesii Savi, Hernandez's, ⊙. Sch. f. Mexico.

humifusus Savi, (= ?*glycinaeformis* DC.), niedergestreckte, ⊙. f. ?

inamoenus L. (= *macrocarpus* Mch. = ?*platyspermus* Haberl).

jonocarpus Fingerh., veilchenblaufrüchtige, ⊙. Sch. f. ?

lobatus Hook., gelappte, 4. Sch. w. Brasilien.

lupinoides Fingerh., lupinenähnliche, ⊙. Sch. f. ?

β) pisiformis Fingerh.

microcarpus Mart., kleinfrüchtige, ⊙. Sch. f. Mexico.

multiflorus Lam. (= *vulgaris coccineus* L.).

b) albiflorus Lam., c) variegatus Hort.

ovalispermus Fingerh., eisaamige, ⊙. Sch. f. ?

Digitized by Google

Phaseolus

pedunculoris H. B. K. (= *pedunculatus* Spgl.), langstielige, ⊙. Sch. m. f. Neugranada.

praecox Fingerh., frühe, ⊙. Sch. m. f. ?

Principessae Savi, Princessin-B., ⊙. Sch. m. f. ?

radiatus L. (= *pisiformis* Schrad.).

Ricciardianus Tenore, Ricciardi's, ⊙. Sch. m. f. ?

superbus A. DC., stolze, 4. Kn. Sch. w. m. f. ?

triangularis Fingerh., dreikantige, ⊙. Sch. f. ?

tunkinensis Lour., tunkinische, ⊙. Sch. w. m. f. Cochinchina.

violaceus Steud. (= ? *abyssinicus* DuRoi, = *Dolichos abyssinicus* Hort. = *D. violaceus* Hort. = *Phasiolus violaceus* Mch.).

vulgaris L. (= *lilac* Zucc. = *nigerrimus* Zucc.).

β) nanus L.

Hybriden und Varietäten:

aureus Hort., bicolor Hort. Vindob., bicornis Hort. Lugd., bipunctatus Jacq., Lam, Bocconi Thouin, carneus Haberle, compressus DC., cruentus Haberle, domingensis Zucc., Mart., durus Mart., elongatus Haberle, gonospermus Savi, h. pictus Cavan., grandispermus Hort. Lugd. batav., haematocarpus Savi, Hoffmanni Mart., incarnatus Mart, luteolus Balbis, Tenore, maculatus Mart., melaleucus Hort. Lugd. batav., melanospermus Mart., mesomelus Haberle, oblongus Savi, odoratus Hort., ornithopus Mart., Ourta e Caramenia Mart., paraguaiensis Tenore, retusus Mch., romanus Savi, rufus Jacq., saccharatus Mch., saponaceus Savi, scriptus Hort., sexpedalis Hort. Lugd. batav., sinensis Hort., sphaericus Savi, subrotundus Hort. monspel., Tenore, tumidus Savi, vitellinus Hort., Willot Mart., Xuarezii Zucc., Zebra Hort., zeylanicus Tenore etc.

Phaylopsis imbricata Sweet, = Aetheilema imbricatum, p. 12.

Phebalium Vent., Myrtenraute.

Billardieri Juss. (= *elaeagnoides* Sieber, = *Eriostemon squameum* LaBill.), Billardiere's, ♄. t. Neuholland.

correaefolium Juss. (= *ovatum* Sieber), correablätterige, ♄. t. Neuholland.

elaeagnifolium Juss. (= *anceps* Sieber), Oleasterblätterige, ♄. t. Neuholland.

phylicoides Sieb. (= *diosmeum* Juss.), phylicaähnliche, ♄. t. Neuholland.

Phellandrium ciliatum Herbar. et Hort., v. Spananthe paniculata, p. 774.

Philadelphus L., Pfeifenstrauch (wilder Jasmin).

affinis Schltdl., ähnelnder, ♄. k. f. b. Mexico.

coronarius L., e ? aromaticus Hort Par.

grandiflorus W. (= *inodorus* Hort. = *laxus* Hort.).

floribundus Schrad., latifolius Schrad. (= *pubescens* Cels), laxus Schrad. (= *humilis* Hort.), verrucosus Schrad. (= *grandiflorus* Lodd.) et Zeyheri Schrad. werden von Walpers als Abarten hierher gezogen.

intermedius Hort. Dyck., mittlerer, ♄. f. ?

mexicanus Schltdl., mexicanischer, ♄. f. b. k. Mexico.

pubescens Rafin., feinhaariger, ♄. f. Nordamerika.

speciosus Schrad. (= *grandiflorus* Hort., non W.).

triflorus Wall., dreiblumiger, ♄. k. f. b. Nepal.

corymbosus Wall., v. Deutzia corymbosa, p. 197, II.

Digitized by Google

Philadelphus

imbricatus Soland., v. Schidiomyrtus crenuluta, *laniger* Ait., *scoparius* Ait. et *floribundus* Usteri, v. Leptospermum lanigerum, pubescens et scoparium, p. 456 et 352, 353, II.

Philippia Kl., Philippie, VIII. 1., Ericacae.

abietina Kl. (= *Salaxis abietina* Salisb, W. = *S. imbricata* W. herb. = *S. mauritiana* Boj.), tannenähnliche, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

arborescens Kl. (= *Salaxis arborescens* Salisb., W.), baumartige, ħ. ħ. t. Mauritius.

Lecana Kl. (= *Erica absynthoides* E. Mey. msp. = *E. pedunculata* Lee, = *E. pistillaris* H. angl. = *E. virgata-nana* Wendl.), Lee's, ħ. t. Südafrika.

montana Kl. (= *Salaxis montana* Salisb., W. = ?*S. mauritiana* Boj.), Bergliebende, ħ. t. Mascarenas.

Philippodendron Poit. (Louis Philipp, König der Franzosen, Mäcen d. Wissenschaften u. Künste etc.), Philippsbaum, XXII. x., Büttneriaceae-Philippodendreae.

regium Poit. (= *Betula pulchella* Hort.), königlicher, ħ. t. k. Nepal.

Phillyrea T., Steinlinde.

angustifolia L., *α*) lanceolata Ait., Vahl, (= *mucronata linearis* Tausch), *β*) rosmarinifolia Ait., Vahl, (Mill.), *γ*) brachiata Ait., Vahl.

divaricata Visian. (= *Olea divaricata* Dsf.), ausgesperrte, ħ. ħ. k. ? [1])

latifolia L., *α*) laevis Vahl, (W. Enum.), (= *mucronata dentata* Tausch), *β*) ilicifolia W. Enum. (= *latifolia serrata* Poll. = *latifolia spinosa* Ait. = ?*longifolia* Lk. = *spinosa* Mill.), *γ*) obliqua Ait. (W. Enum.), (= *mucronata serrata* Tausch, = *coriacea* Lk.), ?*δ*) stricta Bertol. (= *latifolia* A. Tenor.). [2])

media L., *α*) ligustrifolia Ait. (= *mucronata lanceolata* Tausch), *β*) virgata Ait. (W. Enum.), *γ*) pendula Ait, Vahl, (W. Enum.), *δ*) oleafolia Ait., Vahl, (W. Enum.), (= *latifolia lanceolata* Tausch), *ε*) buxifolia Ait., Vahl, (= *latifolia buxifolia* Lk.).

Lowei DC. (= *Olea microcarpa* Lowe), ħ. ħ. auf Madeira heimisch, scheint nicht kultivirt zu werden.

paniculata Roxb., *robusta* Roxb. (= *terminalis* Roxb.), v. Visiania paniculata et robusta.

Philodendron Schott, Endl, Kunth, Zehrwurzstrauch (Baumfreund), XXI. IX., Aroideae.

arborescens Kunth, (= *Arum arborescens* L. = *Caladium arborescens* Vent., p. 143), baumartiger, ħ. w. Ostindien, Brasilien, Surinam.

bipinnatifidum Schott, (= *Arum pinnatifidum* Flor. Flumin. = *Sphincterostigma bipinnatifidum* Schott), doppelfiederspaltiger, 4. ħ. w. Brasilien.

cannaefolium Mart. (= *crassipes* Hort. belg. et gall. = *Caladium crassipes* Hortul. = *C. macropus* H. Petr.), blumenrohrblätteriger, 4. ħ. w. Brasilien.

corcovadense Kunth, (= *Arum arborescens* Flor. Flum.), corcovadoischer, 4. ħ. w. Brasilien.

crassinervium Lindl. (= ?*platyneuron* Hort. gall. = *Bauersia s. Baursea maculata* Rchb. = *B. nervosa*

---

1) Nach DeCandolle eine „species dubia".

2) Nach DeCandolle vielleicht eigne Art.

Digitized by Google

Philodendron

Hffg. = *Caladium Bauersia s. Baursea* Hffg., Rchb. = ? *Pothos platyneuron* Dsf. = *Caladium platyneuron* Salm Dyck. = *Arum lanceolatum* Flor. Flum.), dicknerviger, ♄. 4. w. Brasilien.

crinipes Ad. Brogn., mähnenstieliger, 4. ♄. w. Guiana, Mexico.

Fontanesii Kunth, (= *Caladium brasilienses* Dsf.), Desfontaine's, 4. w. Brasilien.

? fragrantissimum Kunth, Lindl. (= *Caladium fragrantissimum* Hook.), wohlriechenster, 4. ♄. w. Demerara.

grandifolium Schott, (= *Arum grandifolium* Jacq. = *Caladium grandifolium* W., p. 143).

hederaceum Schott, (= *Arum hederaceum* L., p. 85).

Imbé Schott, (= *Caladium Imbé* H. Berol. = *Colostigma Imbé* Schott), Imbé-Z., 4. ♄. w. Brasilien.

? inciso-crenatum Kunth, (= *laciniosum* Schott, = *Caladium lacerum* Hort. Berol.), schlitz-kerbiger, 4. ♄ w. Brasilien.

lacerum Schott, (= *Arum lacerum* Jacq. = *Caladium lacerum* W., p. 143).

? Linnaei Kunth, (= *Arum cannaefolium* L. suppl.), Linne's, 4. w. Surinam.

? luridum Kunth, (= *Acontias luridum* G. Don, = *Caladium luridum* Lodd.), bleifarbiger, 4. w. Brasilien.

? pedatum Kunth, (= *Caladium pedatum* Hook., p. 143, = *Dracontium laciniatum* Flor. Fluminens.).

pinnatifidum Schott, (= *Arum pinnatifidum* Jacq. = *Caladium pinnatifidum* W., p. 143).

? punctatum Kunth, (= *Arum punctatum* Dsf.), punktirter, 4. ♄. w. ?

Simsii Sweet, Kunth, (= *Caladium grandifolium* Sims, = *C. Simsii* Hook., p. 143).

speciosum Schott, (= *Meconostigma speciosum* Schott), prächtiger, ♄. w. Südamerika.

tripartitum Schott, (= *Arum tripartitum* Jacq. = *Caladium tripartitum* W., p. 143).

eximium Schott, ist H. Prof. Kunth zweifelhaft.

quercifolium Hort. belg. = ?

Philostyzus Fontanesianus Cass., v. Centaurea ferox, p. 177.

Philoxerus brasiliensis RBr., v. Teleianthera brasiliensis, Sect. Mogiphanes.

Phippsia RBr., algida RBr., v. Sporobolus Sect. I., p. 779.

Phleboanthe Laxmanni Tausch, v. Teucrium Laxmanni, p. 803.

Phleum L., Lieschgras.

asperum Vill. (= *Lima* Hort. = *odoratum* Schreb. = *paniculatum* Huds., Wither. = *sibiricum* Hort. = *ventricosum* Mch. = *viride* All. = *Chilochloa aspera* P. Beauv. = *C. paniculata* P. Beauv. = *Phalaris paniculata* Ait. = *Ph. tenuifolia* Hort.).

Bertolonii DC., Guss., Bertoloni's, 4. f. Italien.

cuspidatum W. Enum. (= *ambiguum* Tenore et Guss. = *Hostii* Jacq. fil. = *trigynum* Schrad. = *Chilochloa cuspidata* P. B. = *Phalaris cuspidata* Hort. = *Ph. mucronata* Dsf. = *Ph. trigyna* Host).

echinatum Host, (= *felinum* Sm. = *graecum* W. herb.). ⊙.

Digitized by Google

Phleum

pratense L. (= *arvense* Pourr. = *ciliatum* Gilib.).
β) nodosum L. (= *bulboeum* Host, = *tuberosum* Panz.), γ) stoloniferum Host.

tenue Schrad. (= *Bellardi* W. Enum. = *P. Mesopotamiae* Hort. = *Achnodonton Bellardi* et *tenue* P. B. = *Phalaris Bellardi* W. = *Ph. bulbosa* L. amoen. = *Ph. cylindrica* DC. = *Ph. sativa* P. = *Ph. subulata* Savi, = *Ph. tenuis* Host).

aculeatum Lam. etc., v. Crypsis aculeata etc., *Aegylops* Scopol., v. Aegylops ovata, *alatum* Hort., v. Phalaris aquatica, *crinitum* Schreb. (= *monspeliense* Koel.), v. Polypogon monspeliensis, *Gerardi* All., *vaginatum* Cyrill. (= *Gerardi* Sibth.), v. Alopecurus Gerardi et angustifolius, p. 37.

Phlogacanthus N. E., asperulus N. E., curviflorus N. E., guttatus N. E., thyrsiflorus N. E. (= *Justicia thyrsiflora* Roxb.), tubiflorus N. E. (= *Justicia tubiflora* Hamilt.), v. Justicia Sect. X. p. 435.

Phlojodicarpus Turcz., Doppelkorkfrucht, V. II., Umbelliferae.

dahuricus Turcz. (= *Cachrys sibirica* Steph. = *Libanotis cachroides* DC.), dahurische, 4. f. Dahurien.
β) nudiusculus Turcz.

villosus Turcz. Sibir. baical., wird kaum kultivirt.
Phlomidopsis tuberosa Lk., v. Phlomis tuberosa.

Phlomis T., L., Flammenlippe.

angustifolia DC., schmalblätterige, ♄. k. Italien.

bicolor Benth. (= *samia* β Vivian.), zweifarbige, ♄. k. Lybien.

cashmeriana Royle, Lindl., cashmirische, ♄. k. f. b. Ostindien, Cashmire.

flavescens Mill. (= *angustifolia* Mill.), gelbliche, ♄. k. Kleinasien.

fruticosa L. (= *ferruginea* Hort., non Tenore).
b) latifolia Mill.

italica Sm. (= *purpurea* L. spec. ed. II. = *rotundifolia* Mill.).

lanata W. Enum. Suppl. (= *fruticosa minor* Hort. = *microphylla* Sieber, = *parvifolia* Presl).

purpurea L. spec. ed. I., Sm. (= *ferruginea* Mill. = *salviaefolia* Jacq.).

Russeliana Lagasca, (= *lunariaefolia* β *Russeliana* Hook.), Russel's, 4. k. f. b. Syrien.

tuberosa L. (= *Leonotis tuberosa* Hffg. = *Phlomidopsis tuberosa* Lk. = *Phlomoides tuberosa* Mch.).

viscosa Poir. (= *virens* DC. Catal. Hort. monspel.), schmierige, ♄. k. Kleinasien.

Unbestimmt: condensata Mart. Hort. Erlang.
calycina Roxb., v. Roylea elegans, p. 702, *laciniata* L., *lanigera* Sivers, v. Eremostachys laciniata et molucelloides, p. 227, II., *aspera* W. Enum., *biflora* Vahl, *cephalotes* Roth, *chinensis* Retz., *decemdentata* W., *flaccida* Steud. (= *moluccana* Roxb.), *hirta* Roth, *indica* L., *linifolia* Roth, (= *zeylanica* Murray), *martinicensis* Sw. (= *caribaea* Jacq. = *mollis* Schum.), *Plukenetii* Roth, (= *esculenta* Roxb. = *zeylanica* Heyne herb.), *urticaefolia* Vahl, *zeylanica* L., (non Murr. Roxb.), v. Leucas aspera, biflora, cephalotes etc., p. 458 et p. 354, II., *Leo-*

Digitized by Google

Phlomis

nurus L., *Leonitis* L., *nepetaefolia* L., v. Leonotis Leonurus, ovata, nepetaefolia, p. 452, *moluccoides* Vahl, v. Otostegia scariosa, p. 464, II.

Phlox L., Flammenblume.

acuminata Pursh, (= *decussata* Lyon, = *corymbosa* Sweet).

caespitosa Nutt., rasenartige, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).

carolina L., β) nitida Pursh, (= *fruticosa* Hort. = *suffruticosa* W. Enum. Suppl.), γ) puberula Benth. (= *carolina* Bot. mag. = *triflora* Sweet).

divaricata L. (= *canadensis* Sweet).

Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. b. Nordwestl. Amerika.

floridana ? Nutt., Benth. (= ?*carolina* Sweet, non L.), floridanische, 4. f. b. Florida.

glaberrima L., b) carnea Sims.

Hentzii Nutt., Hentz's, 4. f. b. k. Südl. Nordamerika. (Scheint noch nicht eingeführt).

humilis Dougl. (= *speciosa* γ Hook. ?), niedrige, 4. f. b. k. Nordwestl. Amerika.

hybrida * (= *paniculato-undulata* *), Bastard, 4. f. Nordamerika.

longifolia Nutt., langblätterige, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).

muscoides Nutt., moosähnliche, 4. f. b. k. Nordamerika. (Kaum eingeführt).

reptans Mchx. (= *obovata* Mühlbg.), β) crassifolia Lodd.

Richardsoni Hook., Richardson's, 4. f. b. Nördlichstes Amerika.

rigida Benth., starre, 4. k. f. b. Nordwestl. Amerika.

Sabini Dougl. (= *speciosa* Hook.), Sabine's, 4. k. f. b. Nordwestl. Amerika.

setacea L., b) nivalis Sweet, c) latifolia Benth. (= *procumbens* Lehm.).

sibirica L., sibirische, 4. f. b. Dahurien, Sibirien, Nordwestl. Amerika.

suaveolens Ait. (= *alba* Mch. = *candida* P. = *maculata* β *candida* Mchx.).

triflora Mchx. (= *carolina* Auct.), dreiblumige, 4. f. Nordamerika (Ober-Carolina).

undulata Ait., b) fol. variegat.

Van Houttei Lindl. (= *caroliniano-suaveolens* v. H.), Van Houtte's, 4. f. Hybride.

Hybriden und Varietäten:

acutifolia Sweet, alba kermesina, alba magniflora, amabilis striatiflora Rendatler, Amphitrion R., amoenissima, Arsinoe, atrocaulis, Baron de Pronay, Beauty, Beau regard, Bella R., Belle reine R., Belgica, Beresnia, bicolor, blanc de Neilly, berolinensis candida Demmler, Borboniensis, brevifolia Baum., Hffmsg., Brownii Hort. Dyck., Broughtonii, Caldriana Courtois, Camille R., Cantorberiensis, canescens Hort. Dyck., carnea nova, Céleste R., clarkioides, Cleopatra, coerulea rubescens D., coerulescens, compacta alba et elegans et rosea, Comte de Flandre R., concinna rubra, congesta, corymbosa, Cromwell R., cruenta Curt., d'Artevelde R., Damon R., Decamps R., DeCandollei, Delachei, delecta R., delicata, densiflora D.,

Digitized by Google

Phlox

disticha Sabin., divergens Wender., Dodonaei, Donkelaarii superba, Duc d'Aumale et de Brabant et d'Orléans, dulcis R., Dumont d'Urville, Eclipse R., Egyptienne R., elegans, elata Penny, Emma R., excelsa, Penny, eximia striata, Feu rougeâtre R., Fidalgo van Houtte, Fleur de Marie R., floribunda D., formosa, formosissima, fortunata, Galathée R., germanica, Goethaelsii, graciosa, grandiflora, Hanno R., Helicon R., Henry II. R., Herma, Herman Kegel V. H., hortensiaeflora, Humanni, Humei, Ingramiana, incarnata, insignis R., invincible R., Jason R., Jenkinsonii, Jupiter R., Lambertiana, Laura R., laeta Penny, limburgensis, Limprechtii D., Linda V. H., Lobelii, Lowei, lugdunensis, Lullingstonii, macrantha, mariantha, Mathilde R., magniflora, Matthioli, mémorable, miniature Smouth, missourica Hort. Dyck., multiflora, Murrayana, Musard (= Musarion R.), omniflora coerulesceus, et dark lavender et lilacina picta et major et pallida et pale Lavender, et picta et purpurea et rosea, Ondine R., perfection, philadelphica, picta Mountjoy, pomponia D., Praga, Princesse Marianne et Pre. royale Knight, Prinz Maximilian von Neuwied, pulchella, pulcherrima, pyramidalis var. alba, Amante, Diane, Junon, Mars, Ninon, Ninon de Lenclos, Norfolkii, Paris, Princesse Adélaide, Pre. Louise, regalis, Reine du jour R., Régulus R., repanda R., Richilde R., Robert de Flandre R., Rosette R., Rosalba, rubens, sanguinea fol. aureo-variegat., sanguinolenta, Shepherdii Penny, Speculum Knight et Penny, suffruticosa var. Alphonsine, Athénais, Columelle, coeur tendre, Duchesse de Nemours, Grand Sultan, laxiflora major, rosa bella, tenella rubra D., tenera Emilia R., Thésée R., tigrina Wender., triflora formosissima, trifoliata, Triomphateur R., Triton R., Ulysse R., variegata superba Simon, Vénus, verna coerulescens, versicolor grata R., Vestale R., villosa, vincaeflora, Virginie, Vulcanie etc.

biflora R. et P. (= *linearis* Cav. = *unidentata* Bert.), v. Collomia coccinea, p. 211, *Hookeri* Dougl., *pinnata* Pav., v. Gilia Hookeri et glomeriflora, p. 263, II.

Hiernach p. 616 und 617 zu ergänzen.

Phoebe N. E., Phoebe, IX. 1., Laurineae.

patens N. E. (= *Laurus elongata* W. herb. = *L. patens* Sw., p. 449, = *Persea patens* Spgl.), abstehende, ħ. w. Jamaika.

Phoenix L., Dattelpalme.

dactylifera L. (= *excelsa* Cav.).

farinifera Roxb. (= *pusilla* Lour., non G. = *pygmaea* Räusch., Lodd.).

pusilla G., niedrige, ħ. w. Ostindien, Ceylon.

spinosa Thonning, (= *leonensis* Lodd. = *Fulchironia senegalensis* Lestib. in Dsf. Catal.), dornige, ħ. w. Cap, Guinea, Senegambien.

sylvestris Roxb. (= *Elate sylvestris* L. spec.).

Von P. ammonis Ehrbg. u. inaequalis Hort. Berol. ist mir das Vaterland unbekannt.

Phoenixopus decurrens Cass. (= *vimineus* Rchb.), *ramosissimus* Rchb, v. Phaenopus vimineus et var. *β.*

Digitized by Google

p. 506, II., *intybaceus* Less., v. Brachyramphus intybaceus, p. 76, II.

Phoenocoma Lindl. = Phaenocoma.

Pholidota Lindl., Schuppenorche.

aculeata Lindl., stachelige, 4. w. Ostindien.

articulata Lindl., gegliederte, 4. w. Ostindien.

conchoidea Hort. Booth., muschelförmige, 4. w. ? Ostind.

Gardneriana Wall., Gardner's, 4. w. Ostindien.

imbricata Lindl. (Bot. reg. t. 1777), ziegeldachförmige, 4. w. Ostindien.

pallida Lindl. (= *imbricata* Lindl. (Bot. reg. t. 1213, non 1777) = *Cymbidium imbricatum* Roxb. = *Ptilocnema bracteatum* Don), bleiche, 4. w. Nepal, Ostindien.

recurva Lindl., zurückgekrümmte, 4. w. Ostindien.

undulata Wall., wellenförmige, 4. w. Ostindien.

Phormium aloides L., *bulbiferum* Cyrill., *hyacinthoides* L., *orchioides* Thbg. etc., v. Lachenalia aloides, pendula etc., p. 441 et p. 338, II., *viride* Thbg., v. Uropetalum viride, p. 831.

Photinia Lindl., Photinie.

laevis DC. (= *Crataegus laevis* Thbg.), glatte, ♄. k. Japan.

Lindleyana W. A., Lindley's, ♄. t. Ostindien.

prunifolia Lindl. (= *serrulata* β Hook. et Arn.), pflaumenblätterige, ♄ k. China, Japan.

villosa DC. (= *Crataegus villosa* Thbg.), zottige, ♄. k. Japan.

Phragmites Trin., Teichrohr.

communis L., δ) altissima (Benth.).

giganteus Gay, riesenhaftes, 4. Wa. f. Südfrankreich.

Phryma leptostachya L. (= *carolinensis* Walt.).

Phrynium W., Wasseringwer.

flavescens Sweet, (= *Calathea flavescens* Lindl., p. 145, = *Maranta fl.* A. Dietr.).

grandifolium Sweet, (= *Calathea grandifolia* Lindl., p. 145, = *Maranta grandifolia* A. Dietr.).

litorale Ledeb., Ufer-W., 4. w. Brasilien.

longibracteatum Sweet, (= *Calathea longibr.* Lindl. = *Maranta longebracteata* Dietr.).

luteum Sweet, (= *Calathea lutea* Meyer, = *Maranta disticha* Buchoz? = *M. Cachibu* Jacq. = *M. lutea* Lam.), gelber, 4. w. Caracas.

macilentum Sweet, (= *Calathea macilenta* Lindl. = *Maranta macilenta* A. Dietr.), magerer, 4. w. Brasilien.

maximum Blume, gröster, 4. w. Java.

orbiculatum Sweet, (= *Calathea orbiculata* Lindl., Lodd., p. 145).

Rossii Sweet, (= *Calathea Rossii* Lindl., p. 145).

Allouya Roscoe et *trifasciatum* van Houtte, v. Maranta Allouya et trifasciata, p. 386, II.

Phycella Lindl., Rothschwertel.

biflora Lindl., zweiblumiger, 4. Zw. w. Chili.

brevitubata Herb., kurzröhriger, 4. Zw. w. Chili.

corusca Lindl., schimmernder, 4. Zw. w. Chili.

Zu berichtigen und zu ergänzen, p. 618.

Phylica L., Heidemyrte.

I. Genuina.

capitata Thbg., Commelini Spgl. (= *pubescens* W. = *strigosa* Berg.), cylindrica Wendl., excelsa Wendl.,

Digitized by Google

Phylica

horizontalis Vent. (= *plumosa* Spgl.), papillosa Wendl. (= ?*plumosa* L.), plumosa L., pubescens Lam. Ait., rosmarinifolia Lam. (= *secunda* Thbg.), squarrosa Vent., villosa Thbg.

II. Beckea Burm., Eckl., Zeyh.

imbricata Thbg. (= *Brunia imbricata* G. Don).

lancifolia Steud. (Eckl., Zeyh.), lanzettblätterige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

pinifolia L. fil. (= *B. africana* Burm. = *Brunia pinifolia* Brongn.).

racemosa L., Thbg. (Eckl., Zeyh.), (= *B. cordata* Burm.).

III. Petalopogon Reissek.

cuspidata Eckl., Zeyh. (Reissek), feingespitzte, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

IV. Soulangia Brongn., Eckl., Zeyh.

arborescens Steud. (Eckl., Zeyh.), baumartige, ♄. ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

axillaris Lam. (Brongn.), (= *rosmarinifolia* Thbg.).

buxifolia L. (Brongn.), cordata (Brongn.).

dioica L. (G. Don), zweihäusige, ♄. t. k. Cap d. g. H.

divaricata Vent. (= ?*ledifolia* Dsf.), ausgespreitzte, ♄. t. k. ?

hirsuta Thbg. (Eckl., Zeyh.), rauhhaarige, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ledifolia Dsf. (Eckl., Zeyh.), borstblätterige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

oleaefolia Vent. (Brongn.), (= *oleoides* Dsf. = *spicata* Lodd.).

orientalis W. (Sweet), paniculata W. (Brongn.), (= *angustifolia* Hort. = *longirostrata* Hort. = *myrtifolia* Poit. = *oblonga* Hort. = *sessiliflora* Hort.).

pinea Thbg. (Eckl., Zeyh.), kieferähnliche, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

rubra W. (Lindl.), (= *Trichocephalus ruber* Eckl., Zeyh.), rothe, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

thymifolia Vent. (Brongn.), thymianblätterige, ♄. t. k. Inseln des stillen Meeres.

V. Tylanthus Reissek., Endl.

acerosa W. (Endl.).

australis Lk., neuholländische, ♄. t. k. Neuholland.

bicolor L. (= *australis* Thbg.), ericoides L. (Endl.).

eriophora Berg. (= *arborescens* Lk. = *nitida* Lam.).

glabrata Thbg., glatte, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

imberbis Thbg. (= *brunioides* Lam. = *Trichocephalus imberbis* Eckl., Zeyh.).

lanceolata Thbg., lanzettliche, ♄. t. k. Cap d. g. Hffn.

parviflora L., pumila Wendl., reclinata Wendl.

secunda Thbg., einseitige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Willdenowiana Eckl., Zeyh. (= *rosmarinifolia* W. Enum.), Willdenow's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

VI. Walpersia Reissek, Endl. (= *Trichocephalus* Brongn., Eckl., Zeyh.).

callosa L. (= *reflexa* Lam. = *Trichocephalus callosus* Eckl., Zeyh.).

spicata L. fil. (Endl.), (= *Trichocephalus spicatus* Brongn.).

stipulāris L. (Endl.), (= *Trichocephalus stipularis* Brongn.).

Digitized by Google

Phylica

Unbestimmtere (deren Stellung unter die Sectionen auch nicht genau bezeichnet ist):

acuminata Nois., Loud. Cap d. g. Hoffn., cordifolia Lam., linearis Dsf. Cap d. g. Hoffn., ovata Hort. Cap d. g. Hoffn., superba H. Cels.

Phyllactis Schrad. (non P.).

zinnioides Schrad. (= *Philactis zinnioides* p. 614).

Phyllamphora mirabilis Lour., v. Nepenthes Phyllamphora, p. 545.

Phyllanthus L., Sw., Blattblume.

A. Niruri Adans.

acuminatus Vahl, (= *attenuatus* W. hrb. = *averrhoaefolius* Hort. = *cumanensis* W. hrb. = ? *lycioides* H. B. K. = *subglomeratus* Poir.), zugespitzte, ♄. w. Cayenne.

alatus Blume, geflügelte, ♄. w. Java.

distichus Hook., zweireihige, ♄. t. Sandwichinseln.

fraxinifolius Lodd., eschenblätterige, ♄. ♄. w. Ostindien.

introductus Steud. (= *Melanthesa chinensis* Blume), eingeführte, ♄. ♄. w. China, Java.

juglandifolius W. (= *grandifolius* Hort., non L.).

lucens Poir. (= *turbinatus* Sims, = ? *Nymphanthus rubra* Lour.).

Niruri L. (= *Nymphanthus Niruri* Lour. = *Urinaria erecta* Medic.).

obtusus Schrank., stumpfe, ♄. w. ? Guinea.

verrucosus Thbg., warzige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

villosus Poir. (= *chinensis* Hort. = *Nymphanthus chinensis* Lour.), zottige, ♄. t. w. China.

B. Xylophylla L., Ait.

Lucena Heyne, (= *lucidus* Hort. = *X. obovata* W.), spiegelnde, ♄. t. Ostindien.

angustifolius P. (= *X. angustifolia* Sw.), ceramicus P. (= *Xylophylla longifolia* L.), elongatus Lodd. (Jacq. fil.), falcatus Sw. (Ait), (= *Epiphyllanthus* L.), latifolius Sw. (L.), (= *Genesiphylla asplenifolia* L'Her.), linearis P. (Sw.), medius Lodd., montanus P. (Sw.), speciosus Jacq. (= ? *Genesiphylla asplenifolia* L'Her. = *X. Arbuscula* W. = *X. speciosa* Hort.).

Ungewifs: ellipticus Dsf.

ramiflorus P., v. Geblera suffruticosa.

Phyllartron DC. (= *Arthrophyllum* Boj.), Blattgliedler, XIV. 11., Bignoniaceae.

Bojeranum DC. (= *Arthrophyllum madagascariense* Bojer), Bojer's, ♄. w. Madagascar.

β) elongatum DC.

Noronhianum DC. (= *Bignonia articulata* Dsf.), Noronha's, ♄. w. Madagascar.

comorense Boj., Poivreanum DC., Thouarsianum DC., sämmtlich auf den südostafrikanischen Inseln (zumal Madagascar) heimisch, werden nicht kultivirt.

Phyllaurea Codiaeum Lour., v. Codiaeum chrysostictum, p. 876.

Phyllocladus Rich., Blattästler.

rhomboidalis Rich. (= *Brownetera* Rich. = *Podocarpus asplenifolia* LaBill. = *Salisburia ? Billardieri* Rich. = *Thalamia asplenifolia* Spgl.).

trichomanoides H. Cels., Haarfarnblätteriger, ♄. t. k. Neuseeland.

Digitized by Google

Phylloma Ker, Haw., *aloifolium* Ker, (*borbonicum* Haw.), *Jacquini* G. Don, *macrum* Lk., *rufocinctum* Sweet, v. Lomatophyllum borbonicum, Jacquini, macrum, rufocinctum, p. 475.

Phyllopodium Benth., Blattfüfsler, XIV. II, Personatae-Scrofularineae (Antirrhineae).

capitatum Benth. (= *Manulea capitata* Thbg., L. suppl. p. 495).

cuneifolium Benth. (= *Manulea cuneifolia* Thbg.), keilblätteriger, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

heterophyllum Benth. (= *Manulea heterophylla* Thbg., L. suppl.), verschiedenblätteriger, ⊙. m. f. Cap der guten Hoffnung.

Phyllota DC., Benth., Blattöhrchen, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

aspera Benth. (= *Pultenaea aspera* Sieber, p. 667).

barbata Benth., bärtiges, ♄. t. Neuholland.

comosa Benth. (= *Pultenaea comosa* Sbr., p. 667).

grandiflora Benth., grofsblumiges, ♄. t. Neuholland.

phylicoides Benth. (= *Pultenaea phylic.* Sbr., p. 667).

squarrosa Benth. (= *Pultenaea squarrosa* Sbr., p. 668).

Phymatanthus Lindl., Sweet, *coronopifolius* Sweet, *elatus* Sweet, *Serra* Hffg., *tricolor* Sweet, v. Pelargonium Sect. XIII. p. 601 et p. 485, II. P. grandiflorus Sweet, intertinctus Sweet, latifolius Colv., villosus Sweet, sind zu dieser Abtheilung gehörige Hybriden.

Phymatidium Lindl., Schwulststendel, XX. I., Orchideae.

denticulatum Lindl., gezahnter, 4. w. Insel St. Catharina.

falcifolium Lindl., sichelblätteriger, 4. w. Brasilien.

Phymatodes crassifolia Presl, *irioides* Presl etc., v. Polypodium crassifolium etc. Sect.

Phymosia abutiloides Desv., v. Sphaeralcea abutil.

Physalis L., Schlutte, (Judenkirsche).

chenopodiifolia Lam. (= *bulbosa* Hedw. in litt. = *incana* Dsf. = *tuberosa* W.).

cordata Mill., herzförmige, ⊙. m. f. Vera Crux.

curassavica L. (= *origanifolia* Lam.).

indica Lam. (= *angulata* W. (ex parte) = *Alkekengi* Lour. (non Lam.) = *minima* Mill., Roxb. = *parviflora* RBr. = *peruviana* Wall. = *pseudo-angulata* Blume, = *Nicandra indica* R. et S., p. 547).

β) divaricata D. Don.

lanceolata Mchx., lanzettförmige, 4. k. Carolina.

lanceifolia N. E. (= *laurifolia* David Dietr. = *angulata* R. et P.), lanzettblätterige, ⊙. f. Süd- und Nordamerika.

Linkiana N. E. (= *angulata* Hort. = *arenaria* Hort. = *dubia* Lk.).

maxima Mill., gröfste, ⊙. m. f. Vera Crux.

minima L. (= *abyssinica* Hort. = *angulata* Heyne hrb. = *barbadensis* Wright hrb. = *Lagascae* R. et S. = *micrantha* Lk. = *parviflora* Lagasca, = *peruviana* Wall. = *pubescens* W. hrb. = *Rothiana* R. et S. = *villosa* Roth).

patula Mill. (= *angulata* L. var.? N. E.), ausgebreitete, ⊙. m. f Vera Crux.

pensylvanica L. (= *Jacquini* Lk. = *virginiana* Mill. = *viscosa* Jacq.), pensylvanische, 4. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Physalis

peruviana L., N. E. (= *barbadensis* Lam. = *esculenta* W. = *latifolia* Lam. = *tomentosa* Medic. = *tuberosa* Zuccagn. = *Alkekengi pubescens* Mch.).
β) edulis Sims.

prostrata L'Her. (= *limensis* Retz, = *Cacabus prostratus* Bernh. = *Physaloides prostrata* Mch.).

pubescens L. (= *peruviana* Roxb., Wall. = *ramosa* Mill. = *Rothiana* H. Berol. = *staminea* Mühlbg. = *Alkekengi procumbens* Mch.).
β) barbadensis Jacq. (= *pruinosa* L. = *obscura β pubescens* Pursh, = *Alkekengi villosa* Mch.).

somnifera L., N. E. (= *arborescens* Thbg., non L. = *tomentosa* Sieber, Thbg. = *Physaloides somnifera* Mch.), *α*) flexuosa L., *β*) Alpini Jacq. fil., Südeuropa, Griechenland, Ostindien, Cap d. g. Hoffn. etc.

villosa Mill. (= *indica* ? Lam. sec. N. E.), zottige, ☉. m. f. Vera Crux.

Unbestimmtere: adulterina Fisch., bullata Brotero, lutea Medic., mucronata W. Enum. ♄., repens Brotero. *daturaefolia* Lam. (= *peruviana* Mill.), v. Nicandra physaloides, p. 547, *frutescens* DC. (= *suberosa* Cav.), *aristata* Ait., v. Withania frutescens et aristata, *Schraderiana* Bernh., *allegona* Kunze, v. Saracha viscosa, allogona.
Physarus Steud., v. Physurus.

Physematium Kaulf., Blasenhüllchen.

incisum Presl, (= *Woodsia incisa* Hook. et Grev.), eingeschnittenes, 4. w. Chili.

molle Kaulf. (= *Woodsia mexicana* RBr.), weiches, 4. w. Mexico.

Perrinianum Presl, Kunze, (= *Cystopteris Perriniana* Lk. Hort. = *Aspidium obtusum* W. spec. = *Polypodium obtusum* Sw. = *Woodsia Perriniana* Hook. et Grev., Torrey., p. 858), Perrin's, 4, k. t. Pensylvanien, Virginien, Georgien, St. Thomas.
Physianthus albens Mart. et Zuccar. et *albens* Lindl., v. Arauja sericifera et albens, p. 41, II., *undulatus* Hort. belg., v. Arauja undulata Nachlese, *auriculatus* Grah. (= *umbellatus* Hort.), v. Schubertia Grahamii.

Physochlaena G. Don, orientalis G. Don, physaloides G. Don, s. Hyoscyamus Sect. II. p. 310.

Physolepidium Schrenk et C. A. Mey., Blasenkresse, XV. 11., Cruciferae.

repens Schrenk et C. A. Mey., kriechende, ♂. 4. f. Soongaria.

Physolobium Benth., Blasenblatt.

carinatum Benth., kielförmiges, ♄. t. Neuholland.

elatum Hügel, Benth., hohes, ♄. Sch. t. Neuholland.

gracile Benth., schlankes, ♄. t. Neuholland.

Stirlingii Benth. (= *Kennedya Stirlingii* Lindl.), Stirling's, ♄. t. Neuholland.
Physophora sylvatica Hffmsg., Lk., v. Physospermum aquilegifolium.

Physosiphon Lindl., Blasenstendel(röhre).

carinatus Lindl. Südamerika.

Loddigesii Lindl. (= *Helis tubata* Lindl. = *Pleurothallis tubata* Lodd.), p. 621.

Digitized by Google

Physospermum Cusson, Blasensaame.

aquilegifolium K. (= *Danaa aquilegifolia* All. = *Henselera damaecornis* Lagasca, = *Ligusticum aquilegifolium* W. = ? *Smyrnium nudicaule* MB.), akeleiblätteriger, 4. f. Taurien, Italien, Spanien, Portugal.

cicutarium Spgl. (= *Ligusticum caucasicum* W. herb. = *Smyrnium cicutarium* MB.), wasserschierlingblätteriger, 4. f. Caucasus.

cornubiense DC. (= *commutatum* Spgl. = *Ligusticum cornubiense* L.), cornubischer, 4. f. England.

nudicaule C. A. Mey. (= *Pimpinella Danaa* MB. = *Smyrnium nudicaule* MB.), nacktstengeliger, 4. f. Caucasus.

acteaefolium Presl, 4., angelicaefolium Guss., 4. beide in Sicilien heimisch, scheinen nicht kult. zu werden.

Physostegia Benth., Blasenkelch.

truncata Benth., abgestutzter, 4. f. Nordamer., Texas.

virginiana Benth. (= *Dracocephalum lancifolium* Mch. = *D. obovatum* Ell. = *D. virginianum* L. = *Prasium coccineum* Walt.), β) denticulata G. Don, (= *Dracoceph. denticulatum* Ait. = *Prasium purpureum* Walt.), γ) imbricata G. Don, (= *Dracoceph. imbricatum* Hook.), δ) speciosa G. Don, (= *Dracoceph. speciosum* Sweet), ε) variegata G. Don, (= *Dracocephalum variegatum* Vent. = *Prasium incarnatum* Walt.), b. fl. albo. Nordamerika, Columbia, Texas, p. 621.

Physurus Lindl., Blasenschweiforche, XX. 1., Orchideae.

Blumei Lindl., Blume's, 4. w. Ostindien.

pictus ? Lindl. (= *Annoectochilus pictus* ? Blum.), bemalte, 4. w. Ostindien.

Phyteuma L., Rapwurzel.

Balbisii A. DC. (= *cordatum* Balbis, non Vill.), Balbis's, 4. f. Ital. Piemont. Alpen.

canescens W. K. (= *lanceolatum* β P. = *Campanula alopecuroides* W. herb. = *C. americana* Hort. = *C. canescens* Hort.).

β) salicifolium Kit. (= *saligneum* Bess.).

humile Schlchr. (= *armeriaefolium* Tausch, = *Carestiae* Birol. (non Loisel.) = *graminifolium* Sbr. = *hemisphaericum* β Vest).

limonifolium Sibth., Sm. (= *lanceolatum* Dsf. = *strictum* Sims, = *stylosum* Schrk. = *virgatum* Lodd.), Orient, Griechenland, Dalmatien, Süditalien.

β) collinum Guss. (= *Campanula virgata* Tenore).

nigrum Schm. (= *atropurpureum* Hoppe, = *ovale* Hoppe, = *ovatum* Hoffm. = *spicatum* L. var. β *coeruleum* Endl.).

orbiculare L. (= *capituliforme* Roch.), δ) ellipticum Vill., ε) cordatum Vill., η) brevifolium Schleich. (= *pilosum* Hegetschw.).

Scheuchzeri All. (= *charmelioides* Birol. = *Columnae* Thomas, = *corniculatum* Clairv. = *ovatum* Lam.).

scorzoneraefolium Vill. (= *betonicaefolium* Sims, non Vill. = *Michelii* Bertol. non All. = *Scheuchzeri* β P.).

serratum Vivian. (= *Carestiae* Loisel.), sägezähnige, k. f. b. Corsica.

Sieberi Spgl. (= *Charmelii* Sieb. = *intermedium* Jan, non Hegetschw.), Sieber's, 4. f. Tyroler-, Kärnthner-, Krainer-Alpen, Schweiz.

Digitized by Google

Phyteuma
stylosum Bess. (non Schrank), langgriffelige, 4. f. Galicien.
virgatum W. (= *Campanula virgata* LaBill.).
Phyteumopsis Juss., *angustifolia* Poir., *lanceolata* Poir., *latifolia* Poir., v. Marshallia angustifolia, lanceolata et latifolia, p. 497 et 498.

Phytolacca T., Kermesbeere.
abyssinica Hoffm. (= *dodecandra* L'Her. = *lutea* Marsigl.).
chilensis Miers, chilische, 4. k. Chili.
decandra L. (= *vulgaris* Mill.).
icosandra L. (= *triquetra* Mch.).
octandra L. (= *mexicana* Mill., non Sweet).

Piaranthus RBr., Fett-(Talg-)blume, V. II., Asclepiadeae.
aridus G. Don, Sweet, (= *Stapelia arida* Masson, p. 782).
incarnatus G. Gon, (= *Stapelia incarnata* L. suppl., Mass., p. 782).
parviflorus Spgl., G. Don, (= *Stapelia parviflora* Mass., p. 784).
piliferus Sweet, (= *Stapelia pilifera* Mass., p. 783).
pullus RBr. (= ? *fascicularis* R. et S. = *Stapelia fasciculata* Thbg. = *St. pulla* Mass., p. 784).
punctatus RBr. (= *Obesia punctata* Haw. = *Stapelia punctata* Mass., p. 784.).
ramosus Sweet, (= *Stapelia ramosa* Mass., p. 783).
Gussoneanus G. Don, v. Apteranthes Gussoneana.

Picconia DC. (= *Henslowia* Lowe, non Wall.), (J. B. Picconi hat über Gartenökonomische Gegenstände geschrieben), II. I., Sapotaceae-Oleineae.
excelsa DC. (= *Olea excelsa* Ait., Vahl, R. et S. (excl. Synon. Jacq.) = *O.* ? *maderensis* Hort. Cels.), hohe, ħ. k. Canarische Insela.

Picea D. Don, amabilis D. Don, balsamea D. Don etc., v. Pinus Sect. IV.
Picotia brassicaefolia R. et S., *cappadocica* R. et S., *linifolia* R. et S., *scorpioides* R. et S., v. Omphalodes amplexicaulis, cappadocica etc., p. 557 et 448, II.

Picridium Dsf., Bitterling.
arabicum Hochst. et Steud. (= *tingitanum* Dsf. var. Kunze), arabischer, ☉. f. Arabien.
dichotomum Fisch. et Mey. (= *Sonchus dichotomus* MB.), zweizinkiger, ☉. ♂. f. Caucasus.
hispanicum Vent., Lk. (= *pinnatifidum* Lagasca, = *Sonchus hispanicus* Jacq.).
orientale DC. (= *Scorzonera orientalis* L.), morgenländischer, ☉. f. Orient, Sinai.

Picris L., Bitterkraut.
coronopifolia Dsf. (= *Apargia coronopifolia* W. = *Spitzelia coronopifolia* Schultz), krähenfufsblätteriges, ♂. 4. k. Nordafrika.
dahurica Fisch. (= *camtschatica* Ledeb., ? Lodd. = *virens* Dsf. = *hieracioides* L. var. Spgl.).
hieracioides L. (= *Crepis hieracioides* Lam.), β) altissima Dsf., γ) ruderalis Schm., δ) humifusa W., ε) crepoides Saut. (= *sonchoides* Vest, = *hieracioides* β *brachypoda* DC.).
integrifolia Dsf. (= *aspera* Poir. = *Crepis aspera* Lam., non L.), ganzblätteriger, ☉. f. Südeuropa, Orient.

Digitized by Google

Picris

laciniata Vivian. (= *hieracioides β sinuata* Ledeb. ? = *hispidissima* K. = ? *scaberrima* Gussone, = *Crepis hispidissima* Bartl. = *C. laciniata* Schkhr. = *C. lappacea* Host), schlitzblätteriges, ♂. Dalmatien.

laevis C. A. Meyer, (= *Deckera canescens* C. A. Mey. = *Hypochaeris canescens* Stev.), glattes, 4. f. Caucasus.

lappacea Spgl. (= *altissima* Delil.), klettenähnliches, ⊙. f. Aegypten.

pilosa Delil. (= *nilotica* Shr. ? = *Spitzelia aegyptiaca* Schultz Bip.), behaartes, ⊙. f. Aegypten.

radicata Less. (= *lyrata* Delil. var. = *Crepis radicata* Forsk. = *Spitzelia Sieberi* Schultz, = *Thrincia canescens* Trevir., Spgl.), wurzelndes, ⊙. f. Aegypten.

scaberrima Gussone, schärfstes, ⊙. f. Sicilien.

taraxaciflora DC. (= *Apargia taraxaciflora* Vivian.), löwenzahnblumiges, ⊙. f. Nordafrika.

umbellata N. E. (= *hieracioides angustifolia* Wallr. = *hieracioides ε palvacea* DC. = *Apargia rigens* Mart. = *A. umbellata* Schrank, = ? *Hieracium sabaudum* Sm., Hook. = *Leontodon umbellatus* Schrank), doldiges, ♂. f. Mitteldeutschland, Elsafs.

aculeata Vahl, *asplenioides* L., *echioides* L., *spinosa* Poir., v. Helminthia aculeata, asplenioides etc., p. 293, II., *autumnalis* Vill., v. Leontodon (Sect. Oporinea) autumnale, *danubialis* All., *hirta* All., *hispida* All., *saxatilis* All., v. Leontodon hastile, Villarsii, hispidum, squamosum, p. 452, *pyrenaica* L., v. Crepis blattarioides, *rubra* Lam., v. Barkhausia rubra, p. 113, *Sprengeriana* Lam. (= *altissima* Ledeb.), *Sprengeriana* Pourr. (= *pauciflora* W. = *pyrenaica* G., non L. etc.), v. Medicusia Sprengeriana et lappacea, p. 392, II., *Taraxaci* All., v. Apargia Taraxaci, p. 67, *tuberosa* All., v. Thrincia tuberosa, p. 806.

Picrococcus Nutt., *elevatus* Nutt., *stamineus* Nutt., v. Vaccinium elevatum et stamineum, p. 833, 834.

Pictetia DC., p. 623.

squamata DC. (= *Caragana spinosa* Rich. = *Rathkea glabra* Schum. = *Robinia squamata* Vahl, = *Rob. squamosa* Poir.).

Piddingtonia A. DC., Nummularia A. DC., v. Lobelia Sect. IX. p. 473.

Pierardia Roxb., Euphorbiaceae-Buxeae.

racemosa Blume, traubige, ♄. w. Java.

sapida Roxb. (= *dulcis* Jack).

Piercea glabra Mill., *tomentosa* Mill., v. Rivinia laevis et humilis β canescens, p. 661.

Pieridia Rchb. (= *Pieris* D. et G. Don, p. 623).

phillyreaefolia D. et G. Don, DC. (= *Andromeda phillyreaefolia* Hook.), steinlindenblätterige, ♄. k. f. b. Florida.

sinensis Sweet, (= *Andromeda sinensis* Lodd.), chinesische, ♄. k. China.

Pilea Lindl., Haarnessel.

muscosa Lindl. (= *Parietaria microphylla* L. = *Urtica microphylla* Sw.).

serpyllifolia Lindl. (= *Parietaria prostrata* Spgl. = *P. serpyllifolia* Poir., P. = *Urtica serpyllacea* H. B. K.), quendelblätterige, 4. w. Südamerika.

Digitized by Google

Pilitis Lindl., Haarstrauch, V. 1., Epacrideae.
acerosa Lindl., nadelblätteriger, ♄. t. Van Diemens Land.
Pilocereus Lemaire, *Columna Traj.* Lem., *senilis* Lem., v. Cereus Sect. I. Cephalophorus, p. 93, II.

Pilogyne Schrad., Haargriffel.
Ecklonii Schrad., Ecklon's, 4. Sch. k. t. Cap d. g. H.
suavis Schrad. (= *Zehneria suavis* Endl.).
Pilophora testicularis Jacq., v. Manicaria saccifera, p. 495.

Pilumna Lindl., Pilumna, XX. 1., Orchideae.
fragrans Hook., wohlriechende, 4. w. Guatemala.
laxa Hook., lockere, 4. w. Guatemala.

Pimelea Banks, Soland. et Forst., Glanzstrauch.
affinis Hort. belg., ähnelnder, ♄. t. Neuholland.
angustifolia RBr., schmalblätteriger, ♄. t. Neuholland.
argentea RBr., silberfarbiger, ♄. t. Neuholland.
brachyantha Hort. Berol., kurzblumiger, ♄. t. Neuholl.
decussata RBr. (= *ferruginea* LaBill.).
floribunda Hort. belg., blüthenreicher, ♄. t. Neuholland.
globifera Hügel, kugelförmiger, ♄. t. Neuholland.
grandiflora Don, Hook., grofsblumiger, ♄. t. Neuholland.
Hendersonii Grah., Henderson's, ♄. t. Neuholland.
hypericina Hook., Cunningh. (= *hypericifolia* Hort.).
imbricata RBr., ziegeldachförmiger, ♄. t. Neuholland.
Lehmanniana Meisn., Lehmann's, ♄. t. Neuholland.
linifolia Sm. (= *filamentosa* Rudge, = *involucrata* Banks, = *Passerina involucrata* Thbg.).
longifolia Banks et Soland. (= *Passerina longifolia* Thbg.), langblätteriger, ♄. t. k. Neuzeeland.
Menkeana Lehm., Menke's, ♄. t. Neuholland.
myriantha Meisn., tausendblumiger, ♄. t. Neuholland.
nana Grah., zwergiger, ♄. t. Neuholland (Schwanenfl.).
pilosa W. (= *Banksia pilosa* Forst. = *B. tomentosa* Forst. = *Cookia pilosa* Gmel. syst. = *Passerina pilosa* L. fil.), behaarter, ♄. t. k. Neuzeeland.
Preissii Meisn., Preifs's, ♄. t. Neuholland.
prinifolia Nois., winterbeerblätteriger, ♄. t. Neuholland.
prostrata W., Vahl, (= *laevigata* G. = *novae Zeelandiae* Hort. = *Banksia prostrata* Forst. = *Cookia prostrata* Gmel. syst. = *Passerina prostrata* L. fil.), gestreckter, ♄. t. k. Neuzeeland.
punicea RBr. (= *Thecanthes punicea* Wickstr.), granatrother, ♄. t. Neuholland.
sericea RBr. (= *villosa* Banks, Soland. = *Passerina villosa* Thbg.), seidenhaariger, ♄. t. Van Diemens Land.
spathulata LaBill. (= *linifolia* Sm. var. Spgl.), spatelförmiger, ♄. t. Neuholland.
spectabilis Lindl., ansehnlicher, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).
suaveolens Meisn., gutriechender, ♄. t. Neuholland.
tinctoria Meisn., färbender, ♄. t. Neuholland.
virgata Vahl, (= *axillaris* Banks, Soland. = *Passerina axillaris* Thbg.), ruthenförmiger, ♄. t. Neuholland.

Pimpinella R., L., Bibernell.
Sect. I. Tragoselinum Mch. (genuina).
dichotoma L., zweizinkige, ☉. f. Spanien.
magna L. (= *major* Gouan, Mill. = *Tragoselinum magnum* Mch.), β) rubra Hoppe, (= *β rubens* DC.), γ) orientalis Gouan, (= *austriaca* Mill. = *media* Hoffm. = *laciniata* Wallr.), δ) dissecta Retz, (= *laciniata* Thore, = *hircina* Leers, = *peregrina* Lej.

Digitized by Google

Pimpinella

= *pratensis* Thuill. = *tenuifolia* Schweigger et Körte, = *Tragoselinum dissectum* Mch.), Europa, Orient.

Saxifraga L. (= *minor* Ehrh.), β) dissectifolia Wallr. (= *genevensis* Vill. = *hircina* Mch.), ε) nigra W. (= *media* Gener.), ζ) crispa Hornem.

Sect. II. Tragium Spgl. p. 814.

aromatica MB. (= *Tragium aromaticum* Spgl.). ♂. Iberien, Caucasus.

bubonoides Brotero, (= *anisoides* Guss., non Brignol. = *Athamantha lasiantha* W. herb. = *Bubon tortuosus* Lk. et Hffg. = *Tragium anisoides* Brigant. = *Tragium Broteri* Spgl. = *Tr. Gussoni* Presl), steineppigähnliche, ♂. 4. k. f. b. Portugal, Italien.

eriocarpos Russ. (= *tenuis* Sbr. = *Tragium eriocarpum* Schult. = *Tr. tenue* Lk.), wollfrüchtige, ♂. 4. k. Aleppo, Creta.

peregrina L. Mant. (= *hispida* Lois. = *taurica* Hort. = *Ledebouria pimpinelloides* Lk. Enum. = *Tragium peregrinum* Spgl. = *Tr. tauricum* Ledeb.), fremde, ♂. f. Südeuropa, Taurien.

tenuifolia DC. (= *Tragium tenuifolium* Spgl.), feinblätterige, ♂. k. f. b. Persien.

Tragium Vill., Lam. (= *canescens* Loisel. = *Tragium canescens* Hoffm.), Ziegen-B., ♂. 4. f. Süd- und Osteuropa, Caucasus.

β) glauca DC. (= *Tragium Columnae* Spgl. = *Tr. glaucum* Presl), γ) laciniata DC. (= *petraea* Beaupr.).

villosa Schousb. (= ?*bubonoides* Broter. = *Tragium depressum* Sbr. = *Tr. Schousboei* Spgl. = *Tr. villosum* Hoffm., Dsf.), zottige, ♂. 4. k. f. b. Marocco.

Sect. III. Anisum Adans., G., Mch.

Anisum L. (= *Anisum officinale* Mch. = *A. vulgare* G. = *Apium Anisum* Targ. Tozzetti, = *Sison Anisum* Spgl. = *Tragium Anisum* Lk., p. 814). Griechenland, Aegypten.

apula Bernh. (= *Anisum* L. var. ? Steud. = *Tragium apulum* * p. 814).

anethifolia D. Don, v. Ptychotis anethifolia, *dichotoma* Hort. (= *capillacea* Poir. = *dioica* Hort. = *lateriflora* Lk. = *leptophylla* P. = *ramosissima* Hort.), ?*nodiflora* Brotero, v. Helosciadium leptophyllum et nodiflorum, p. 294, II., *Danaa* MB., v. Physospermum nudicaule, *dichotoma* Spgl. (= *glauca* Hoffm., W. K.), *dioica* L. (= *glauca* L. = *multicaulis* Poir. = *pumila* Jacq.), v. Trinia Kitaibelii et vulgaris, p. 822, *segetum* Spgl., v. Petroselinum segetum, p. 610.

Pimpinella Adans., G., Hall., *agrimonoides* G., *major* Lam. (= *Sanguisorba* G.), *spinosum* G., v. Poterium hybridum, Sanguisorba et spinosum, p. 653, *officinalis* G., v. Sanguisorba officinalis, p. 719.

Pinalia Lindl., *alba* Hamilt., v. Eria convallarioides, p. 228, II.

Pinanga Rumph, Blume, Pinanga-Palme, XXI. x. (VI. III.), Palmae.

latiseeta Blume, breitschlitzige, ♄. w. Java.

Nenga Blume, javanische, ♄. w. Java.

Digitized by Google

Pinanga

sylvestris Blume, Kunth, (= *cochinchinensis* Blume, = *Seafforthia sylvestris* Mart., Kunth), wilde, ♄. w. Cochinchina.

Pinardia Cass., *anisocephala* Cass., *coronaria* Less., *frutescens* Less., *nodosa* Less., *Roxburghii* Less., v. Chrysanthemum viscosum, coronarium, carnosulum etc. p. 193 et p. 141, II.

Pinellia Tenore, *tuberifera* Dehnhardt, v. Atherurus ternatus, p. 54, II.

Pinguicula T., Fettkraut.

alpina L. (= *alba* Flörke, = *alpestris* P. = *brachyloba* Rchb. = *flavescens* Flörke, Schrad. = *purpurea* Vahl).

elatior Mchx. (= *coerulea* Walt.), hohes, 4. k. Georgien, Carolina.

grandiflora Lam. (= *longifolia* K.), *β*) longifolia DC., (non Gaud. et K.).

gypsophila Wallr., gypsliebendes, 4. f. Harz.

leptoceras Rchb. (= *longifolia* Gaud., non DC. nec K. = *grandiflora* K., Bertol.), schlanksporniges, 4. f. b. k. Süddeutsche Alpen, Schweiz, Piemont, Corsica, Spanien.

lutea Walt. (= *campanulata* Lam.), *β*) minor A. DC., *γ*) edentula Hook.

villosa L. (= *involuta* Sckrk., non R. et P.), zottiges, 4. f. b. k. Lappland, nördliches Schweden, Sibirien, Labrador.

vulgaris L. (= *grandiflora* Polli. = *hirtiflora* Tenore). Nord-, Mittel-, Süd- u. Westeuropa, Island, Grönland, Nordamerika, Sibirien, p. 624.

Pinus T., L., Fichte.

I. Abies T., D. Don, (= *Picea* Lk.), Pechtanne (Fichte).

Abies L. (= *Picea* DuRoi, = *Abies excelsa* Lam. = *Picea vulgaris* Lk.), b) nigra pumila, m) viminalis Alstroem.

alba Soland., Ait. (= *canadensis* DuRoi, Mill. = *glauca* Mch. = *laxa* Ehrh. = *tetragona* Mch. = *Abies curvifolia* Salisb.).

coerulea Pinet. Woburn. (= *rubra violacea* Loud. = *Picea coerulea* Lk.), blaue, ♄, f. ?

Morinda Lawson, (= *Khutrow* Royle, = *Abies Smithiana* Pinet. Woburn. = *Picea Morinda* Lk.), Morinda-F., ♄. k. f. b. Himalaya.

nigra Ait. (= *marylandica* Hort.).

obovata Ledeb. (Lk.), verkehrteiförmige, ♄. f. Altai.

rubra Lamb. (= *americana* G., Wangenh. = *Peuce rubra* Rich. = *Picea rubra* Lk.), *β*) gracilis Knight.

taxifolia Lamb. (= *Ab. Douglasii taxifolia* A. B., Loud. = *Picea taxifolia* Lk.), eibenblätterige, ♄. f. Nordam.

Unbestimmtere: elegans Hort., laxa Hort.

II. Cedrus Barrel. T.

Cedrus L. (= *Abies Cedrus* Rich. = *Larix Cedrus* Mill.).

III. Larix T. Lerchenbaum (Lärche).

microcarpa Lamb. (= *Larix nigra* DuRoi, = *Abies americana* Poir.).

sibirica Ledeb. (= *Pseudolarix* Steud. = *L. ? intermedia* Fisch.), sibirische, ♄. f. Sibirien.

leptolepis (Sieb. et Zuccar.), (= *Abies leptolepis* Sieb. et Zuccar.), Japan. Scheint noch nicht eingeführt.

Digitized by Google

Pinus

IV. Picea D. Don, Loud. (= *Abies* Lk.), Weifs- (= Edeltanne).

Apollinis Lk., Apollo's, ħ. f. Griechenland (Parnassas).

balsamea L. (= *Abies balsamea* Miller, = *A. balsamifera* Mchx.), b) longifolia A. B., c) prostrata Hort. angl.

cephalonica Steud. (= *Abies cephalonica* A. B., Loud. = *A. Luscombeana* Hort. = *A. taxifolia* Hort.).

Nordmanniana Hort. angl., Nordmann's, ħ. f. Adshar.

Picea L. (= *Abies* DuRoi, = *pectinata* Lam. = *Abies alba* Mill. = *A. candicans* Fisch. = *A. excelsa* Lk. = *A. pectinata* DC. = *A. Picea* Lindl. = *A. taxifolia* Dsf. = *A. vulgaris* Poir. = *Picea pectinata* Loud.).

Pindrow Royle, (= *Abies Pindrow* Royle, = *Taxus Lambertiana* Wall.).

Pinsapo Boissier, (= *Abies Pinsapo* Sweet), Pinsapo-T., ħ. f. Spanien (Sierra de la Nieve).

Webbiana Wall. (= *spectabilis* Lamb. = *tinctoria* Wall. = *Abies Webbiana* Pinet. Woburn).

Unbestimmtere: Hudsoni Hort. angl., monstrosa Hort. angl.

bifida Siebold et Zuccar., firma Sieb. et Zuccar., homolepis Sieb. et Zuccar., jezoënsis Sieb. et Zuccar., polita Sieb. et Zuccar. (= *Pinus Abies* Thbg.), Tsuga Sieb. et Zuccar., in Japan heimisch und daselbst Wälder bildend, scheinen noch nicht eingeführt.

V. Pinus T., Kiefer.

apulcensis Lindl., apulcoische, ħ. k. f. b. Mexico.

arabica Sieb., Spgl. (= *australis* Hort. Berol., non Mill.), arabische, ħ. k. f. b. Orient.

Ayacahuite C. Ehrenb., Ayacahuite-K., ħ. k. f. b. Mexico.

Devoniana Lindl., Devon's, ħ. k. f. b. Mexico.

filifolia Lindl., fadenblätterige, ħ. k. Guatimala.

halepensis Mill., Ait. (= *genuensis* Lodd. = *hierosolymitana* Duham. = *minor* Hort.), β) maritima Lam.

Harrisonii Hort. angl., Harrison's, ħ. k. f. b. Mexico.

Hartwegii Lindl., Hartweg's, ħ. k. f. b. Mexico.

Llaveana Schiede, (= *cembroides* Zuccar.).

lutea Walt., gelbe, ħ. k. f. b. Carolina.

macrophylla Lindl., grofsblätterige, ħ. k. Mexico.

Massoniana Lamb. (= *sylvestris* Thbg., Lour.), Masson's, ħ. k. f. b. Japan, China, Cochinchina.

nigricans Host, (= *austriaca* Höss, Loud. = *nigra* Lk. = *Pinaster* Rochel, Bluff et Fingerh. = *Laricio* β *austriaca* Ait.), schwarze, ħ. f. Mähren, Oestreich, Steyermark, Banat, Croatien, Dalmatien.

oocarpa Schiede, (= *Ocote* Loud.).

oocarpoides Hort. angl., Ocoteähnliche, ħ. k. Mexico.

Pallasiana Lamb. (= *taurica* Hort. = *Laricio* γ *Pallasiana* Antoin.), β) brevicona Hort Vindob.

Pinaster Soland., Ait. Kew., b) escarena Risso, (= *scarina* Hort. Cels.), c) Lemoniana Benth., d) chinensis Hort., e) nepalensis Hort., f) novae Zeelandiae Ait., Lodd., g) St. helenica Hort., h) Massoniana Hort. anglor. (non Lamb.).

Pinea L. (= *sativa* Lam. = *domestica* Auct.), e) chinensis Hort.

pseudohalepensis Dehnh., unächte, ħ. f. b. Neapel.

Digitized by Google

Pinus

Pseudostrobus Lindl., unächte Weymouths-K., ħ. k. f. b. Mexico.

Pumilio Clus., Hänke, (= *echinata* Hort. = *montana* Baum. = *Mughus* Scopol., non Jacq.), var. carpatica, gallica, pyramidalis Hort. Vindob.

pygmaea Fisch. (= *minima* Hort.), zwergige, ħ. f. Sibirien.

rubra Sieb. et Zuccar. (Sjo vulgo Maats Kämpf.), rothe, ħ. f. Japan.[1])

Russeliana Lindl., Russel's, ħ. k. f. b. Mexico.

serotina Mchx. (= *Taeda alopecuroides* Ait.).

Strobus L.[2]), e) laxa Hort. angl.

sylvestris L., a) rotundata Lk. (= *obliqua* Sauter, = *uliginosa* Neum. = *Mughus* Auct.), α) erecta, b) decumbens Lk. (= *Mughus* Jacq.), β) brevifolia Lk., γ) humilis Lk. (= *Pumilio* Lamb., et *Pinetum Woburnense*), δ) sibirica Ledeb. Außer denen p. 627 verzeichneten zu dieser Art gehörigen Abarten erwähnen die Pflanzenverzeichnisse noch folgende: borealis, rigensis (= *Pin de Russie*, *Pin de Matière*, *Pin de Riga* Dsf.), hagenoviensis (= *Pin de Hagenau*), rubra, scotica, tyrolensis, alba.

tatarica Mill. (= *sylvestris* γ W.), tatarische, ħ. f. Tatarei.

tenuifolia Lindl., dünnblätterige, ħ. k. Guatemala.

Teocote, Schltdl. et Chamiss. (= *Ocote* Hort.).

timoriensis Loud., timorische, ħ. k. t. Insel Timor.

variabilis Lamb. (= *echinata* Mill. = *mitis* Mchx. = *Taeda* γ *variabilis* Ait.), veränderliche, ħ. f. Nordam.

densiflora Sieb. et Zuccar., koraiensis (= *P. Strobus* Thbg.), parviflora Sieb. et Zuccar. in Japan heimisch, scheinen noch nicht eingeführt.

In den Catalogen der Handelsgärten werden noch folgende erwähnt: altissima, Aucklandiae Hort. Cels., brevifolia, Carica, ebennensis, eremita, indica H. Cels., Khytria, neglecta, nivea (= *incana*), lyrata, nootkatensis, novae Hollandiae, Pithyusa, romana.

Pinzona Mart., Zuccar., Pinzona, XIII. vi., Dilleniaceae.

coriacea Mart., Zuccar., lederartige, ħ. w. Brasilien.

Piper L., Pfeffer.

I. Peperomia R. et Pav.

amplexifolium Lk. (= *Peperomia talinifolia* Lk.).

asarifolium Endl. (Schltdl.), haselwurzblätteriger, 4. w. Mexico.

blandum Jacq. (= *Micropiper blandum* Miquel).

circinnatum R. et S. (= *circulare* Dsf.), kreiselförmiger, 4. w. Brasilien.

discolor Sw., verschiedenfarbiger, 4. w. Südamerika.

Guildingianum Spgl. (= *Peperomia reniformis* Hook.), Guilding's, 4. w. Insel St. Vincent.

humile Vahl, (= *brevicaule* Poir.).

maculosum L. (= *variegatum* P. = *Peperomia variegata* R. et P.).

---

1) Die gemeinste Conifere in ganz Japan, auf den Bergen bis zu 3500 F. Höhe.

2) „Weymouthskiefer", a Domino Weymouth, qui primus in Comitatu Wiltshire Angliae „circa a. 1705 sylvulam hujus arboris plantavit." Endlicher Catalogus horti acad. Vindob. I. p. 245.

Digitized by Google

Piper

mauritianum Schult. (= *Peperomia elliptica* Lk.), mauritanischer, 4. w. Mauritius.

obtusifolium L. (= *magnoliaefolium* Haw., non Jacq.). β) clusiaefolium Jacq.

pellucidum L. (= *Micropiper pellucidum* Miq.).

pubescens (R. et P.), (= *saxicolum* Vahl), weichhaariger, 4. w. Peru.

Roxburghianum Schult. (= *angustifolium* Roxb.), Roxburgh's, 4. w. Malayischer Archipelagus.

sarmentosum Roxb. (= *latifolium* Hunt), starkwurzelnder, 4. w. Malayischer Archipelagus.

secundum P., Poir. (R. et P.), (= *racemosum* Vahl, non Mill.), einseitiger, ħ. w. Peru.

II. Heckeria Kunth.

peltatum L. (= *pruinosum* H. B. K. = *umbellatum* Sbr. hrb. mart. = *Peperomia peltata* A. Dietr. = *P. pruinosa* Kunth).

scutatum W. (= *Peperomia scutata* A. Dietr.), wappenschildförmiger, 4. ħ. w. Brasilien.

sidaefolium Lk. et Otto, (= *peltatum* R. et P. = *umbellatum* Jacq. = *Peperomia sidaefolia* A. Dietr. = *Potomorphe sidaefolia* Miquel).

speciosum H. B. K. (= *Peperomia speciosa* Kunth), prächtiger, 4. ħ. w. Venezuela.

umbellatum L. (= *fasciculatum* R. et P. = *latifolium* Jacq.).

III. Piper R. et P.

abutiloides Kunth, (= *Schilleria abutiloides* Kunth), sammtmalvenähnlicher, ħ. w. Brasilien.

acutifolium R. et P. (= *velutinum* Opiz, = *Steffensia acutifolia* Kunth).

aduncum L. (= *scabrum* Lam. = *Artanthe adunca* Miquel, = *Steffensia adunca* Kunth).

amplum Kunth, (= *nigrum* Beyr. = *sylvestre* Arrabida, *Steffensia ampla* Kunth), voller, ħ. w. Brasilien.

Bredemeyeri Jacq. (= *lacunosum* H. B. K. = *rugosum* Bredem. in W. Enum.), Bredemeyer's, ħ. w. Südamerika.

catalpaefolium H. B. K. (= *Schilleria catalpaefolia* Kunth), Catalpablätteriger, ħ. w. Südamer. (Cumana).

caudatum Vahl, (= *Nhandi* Rich. = *Schilleria caudata* Kunth), geschwänzter, ħ. w. Brasilien, Guiana.

colubrinum Lk. (= ?*heterophyllum* R. et P. = *impunctatum* W. hrb. = *Schilleria colubrina* Kunth).

decumanum L. (= ?*marginatum* Jacq. = *Steffensia marginata* Kunth).

Fontanesianum * (= *discolor* Dsf., non Sw. nec alior.). Desfontaine's, ħ. w. ?

geniculatum Sw. (= *nitidum* Rchb. = *secundum* Poeppig, = *Steffensia geniculata* Kunth).

hirsutum Sw. (= *Steffensia hirsuta* Kunth).

Jacquinianum R. et S. (= *flexuosum* W. Enum., Jacq. fil. = ?*dichotomum* Hort. Par. = ?*nodulosum* Lk.), Jacquin's, ħ. w. Caracas.

laurifolium Mill., lorbeerblätteriger, ħ. w. Vera Crux.

laurinum R. et S. (= *laurifolium* H. B. K. = *Schilleria laurifolia* Kunth), lorbeerähnlicher, ħ. w. Peru.

macrophyllum Sw. (= *arboreum* Aubl. = *obliquum* R. et P. = *Schilleria macrophylla* Kunth).

Digitized by Google

Piper

Malamiri L., Malamiri-P., ♄. w. Westindien.

marginatum Jacq. (= *decumanum* Vahl, non L. = *Schilleria marginata* Kunth).

Milleri R. et S. (= *humile* Mill., Poir.), Miller's, 4. w. Jamaika, Barbados.

mollicomum Kunth, (= *acutifolium* Hort. Berol. 1835, = *Steffensia mollis* Kunth), weichschopfiger, ♄. w. Brasilien.

nigrescens Blume, schwärzlicher, ♄. w. Java.

nigrum L. (= *aromaticum* Poir., non W.).

prunifolium Jacq. (= *cuneifolium* Auct. = ?*Radula* H. B. K.), pflaumenblätteriger, ♄. w. Caracas.

purpurascens Dsf., purpurfarbiger, ♄. w. ?

racemosum Mill., non Vahl, (= *Staphyle* R. et S.), traubiger, ♄. w. Vera Crux.

rhomboidale Dum. Cours., Dsf., rautenförmiger, ♄. w. ?

spurium Lk. (= *glyphicum* Hffg. = *nigrum* Hort. Berol.), unächter, ♄. w. ?

tiliaefolium Hamilt., lindenblätteriger, ♄. w. Cayenne.

tomentosum Mill. (= *chelseanum* R. et S.), filziger, ♄. w. Vera Crux.

tuberculatum Jacq. (= *acutifolium* Poepp. = *macrourum* H. B. K. = *nutans* Opiz, = *scabrum* W. hrb. = *verrucosum* Sbr. hrb. Trinit. = *Steffensia tuberculata* Kunth), höckeriger, ♄. w. Südamerika.

β) Linkii A. Dietr. (= *obliquum* Balb., Bertero).

variegatum H. B. K. (= *albo-maculatum* Auct. = *secundum* W. hrb. = *Schilleria variegata* Kunth), bunter, ♄. w. Neugranada.

Unbestimmtere: canescens Hort., crassifolium Hort., tenuifolium Hort., transparens Fisch.

Hinsichtlich der übrigen s. Ottonia, p. 464, II.

Piptanthus D. Don, Sweet, Fallblume.

nepalensis D. D., Sweet, (= *Anagyris indica* Wall. = *Baptisia nepalensis* Hook. = *Thermia laburnifolia* Spgl. = *Thermopsis laburnifolia* D. Don, = *Th. nepaulensis* RBr.), p. 629.

Piptatherum P. Beauv., Fallgranne.

multiflorum P. B. (= *comosum* R. et S. = *Achnatherum miliaceum* P. B. = *Agrostis comosa* Poir. = *A. dispar* Hort. Par. = *A. graeca* Sibth. = *A. monandra* Hornem. = *A. montis aurei* Delarbre, = *A. oseroensis* Seenus, = *A. sepium* Jacq. = *Milium comosum* Poir. = *M. gaditanum* Hort. = *M. multiflorum* Cav. = *M. pauciflorum* Hort. Madrit. = *Urachne comosa* Trin. = *U. multiflora* Lk. = *U. pariflora* Trin.). [1])

β) frutescens Lk. (= *Milium arundinaceum* Sibth., Sm. = *Urachne frutescens* Lk.).

Thomasii Kunth, (= *Milium Thomasii* Duby), Thomas's, 4. f. b. Corsica.

annulatum Raddi, (= *flavescens* Sieb. = *punctatum* P. Beauv.), v. Helopus punctatus, p. 294, II.

Piptoceras Cass., *babylonicum* Cass., *Behen* Cass., v. Centaurea babylonica et Behen, p. 176.

---

1) Die hier aufgezählten Synonyme geben nebst manchen anderen einen Beleg zu der oft lästig werdenden und zum Theil widersprechenden Synonymie.

Digitized by Google

Piptocluinia supina G. Don, v. Heliotropium supinum. *Piptopogon decipiens* Cass., v. Seriola laevigata. *Pirigara* Aubl., *hexapetala* Aubl., *superba* H. B. K., v. Gustavia fastuosa et augusta.

Piriqueta Aubl., (guianischer Name), V. III., Turneraceae.

cistoides Mey. (= *Turnera cistoides* Hort., non L.), ciströschenähnliche, ⊙. w. Südamerika.

villosa Aubl. (= *Turnera rugosa* W. = *T. villosa* Räusch.), zottige, 4. w. Guiana.

racemosa Sweet, v. Turnera racemosa, p. 827. *Pisaura automorpha* Bonat., v. Lopezia mexicana, p. 477.

Pisonia Plum., Pisonie.

Brunoniana Endl., Brunoni's, ♄. t. Norfolkinsel.

coccinea Sw., scharlachfarbige, ♄. w. St. Domingo.

fragrans Dsf., Lk. Enum., wohlriechende, ♄. w. Antillen.

latifolia Dsf., breitblätterige, ♄. w. Antillen.

nigricans Sw., (= *inermis* Jacq.).

nitida Dsf., glänzende, ♄. w. Antillen.

Olfersiana Lk., Kl., Otto, Olfers's, ♄. w. Brasilien.

Pacurero H. B. K. (= *eucalyptifolia* Kunth), schönmützenblätterige, ♄. w. Neuandalusien, Brasilien.

subcordata Sw. (= *subovata* Poir.).

Pistacia L., Pistazie.

chinensis Bunge, chinesische, ♄. k. f. b. Nordchina.

mexicana H. B. K., mexicanische, ♄. k. Mexico.

mutica Fisch. et Mey. (= *Terebinthus* MB.), unbewehrte, f. b. k. Caucasus (Talysch).

narbonensis L. (= *reticulata* W. = *Terebinthus heterophylla* DC. = *vera γ narbonensis* DC.), narbonnische, ♄. k. Südfrankreich.

trifolia L. (= *macrophylla* P. = *officinarum* Ait. = *vera β trifolia* DC.), dreiblätterige, ♄. k. Südeuropa, Nordafrika.

Unbestimmtere: americana Mill. ♄. Westindien, Simarouba Mill. ♄. Jamaika.

Pistolochia Bernh., *intermedia* Bernh., *solida* Bernh., v. Corydalis fabacea et Halleri.

Pisum T., Erbse.

abyssinicum A. Braun., abyssinische, ⊙. Sch f. Abyssinien.

arvense L. (= *sativum* L. ε Poir. = *uniflorum* Mch. = *Lathyrus oleraceus β* Lam.), Var.: purpl, pod or Botany Bay Peas, Partridge or Gray.

elatius Stev., M. B., hohe, ⊙. Sch. f. Iberien.

sativum L. Var.: baclium Hort., borussicum Hort., chlorospermum Hort., coerulescens Hort., excorticatum Dsf., fertile Hort., humile Mill., macrocarpum Serin., macrospermum Hort., praecox Hort., prolificum Hort., quadratum Mill., L., roseum Hort., rugosum Hort., saccharatum Sering., sibiricum Hort., smyrnense Hort., umbellatum Mill., L., uniflorum Hort., variegatum Hort., viride Hort., zeylanicum Hort.

thebaicum W. (= *sativum* var. Endl.), thebaische, ⊙. Sch. f. ? Aegypten.

variegatum Presl, bunte, ⊙. Sch. f. Sicilien.

americanum Mill., *Aphaca* Brotero, *biflorum* Rafin., *maritimum* L., v. Lathyrus magellanicus, Aphaca, grandiflorus, maritimus, p. 447, 448 et p. 245, II., *Ochrus* L., v. Ochrus pallida, p. 552.

Digitized by Google

Pitcairnia L'Her., Pitcairnie.
albucaefolia Schrad., weifsblumenblätterige, 4. w. Westind.
angustifolia Ait. (= *tomentosa* Hort. = *Hepetis angustifolia* Räusch.).
bracteata Ait. (= *latifolia* Red. = *racemosa* Hort.).
caricifolia Mart., seggenblätterige, 4. w. Brasilien. (Ob kultivirt?)
furfuracea Hook. (= *? angustifolia* β Hornem. = *? farinosa* Hort. = *intermedia* Hort.), kleiige, 4. w. Südamerika.
Humboldtii Hort. Berol., Humboldt's, 4. w. Südamerika.
humilis Lodd., niedrige, 4. w. Südamerika.
integrifolia Ker, (= *graminifolia* Hort.).
Karwinskyana Schult., Karwinsky's, 4. w. Mexico.
lanuginosa R. et P., wollige, 4. w. Peru.
leioloma Hort. Petropol., glattsaumige, 4. w. Südamerika.
muscosa Mart., Schult., moosähnliche, 4. w. Brasilien.
Olfersii Otto, Olfers's, 4. w. Brasilien.
paniculata R. et P. (= *Pourretia paniculata* R. et P.), rispige, 4. w. Peru.
platyphylla Schrad. (= *latifolia* Andr., non Ait.), breitblätterige, 4. w. Jamaika.
pulverulenta R. et P., bestaubte. 4. w. Peru.
pungens H. B. K. (= *? angustifolia* Ait. var.), stechende, 4. w. Südamerika.
punicea Scheidweiler, hochrothe, 4. w. Südamerika.
ramosa Jacq. fil. (= *furfuracea* Jacq. fil.), ästige, 4. w. Südamerika.
Redouteana Schult. (= *angustifolia* Red.), Redouté's, 4. w. Westindien.
ringens Lk., Kl., Otto, rachenförmige, 4. w. Südamer.
sulphurea Andr. (= *bracteata* β Bot. mag.).
undulatifolia Hook., wellenblätterige, 4. w. Brasilien.
Vallisolitana Lexar., vallisolitanische, 4. w. Mexico.
Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch folgende: excelsa Lodd., odoratissima H. Cels., phoenicea Hort. belg., speciosa Hort., splendens H. Cels.
chilensis Lodd. (= *coarctata* P.), *crystallina* P., *furfuracea* W. (= *pyramidata* Lk.), *lanata* Dietr., *pyramidata* P., *recurvata* Hort. belg., v. Puya chilensis, lanuginosa, Bonplandiana, lanata, pyramidata, recurvata.

Pithacarpha Lindl., Pithacarpha, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
corymbulosa Lindl., traubendoldige, ⊙. t. m. f. Neuholland (Schwanenfluſs).
pulchella Lindl., schöne, ⊙. t. m. f. Neuh. (Schwanenfl.).

Pittosporum Soland., Banks, Klebsaame.
bicolor Hook., zweifarbiger, ♄. k. t. Neuholland.
commutatum Putterl. (= *viridiflorum* Eckl., Zeyh., non Sims), verwechselter, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
coriaceum Ait. (= *laurifolium* W.).
crassifolium Soland., dickblätteriger, ♄. k. t. Neuholland.
crenulatum Putterl., gekerbter, ♄. k. t. Neuzeeland.
Cunninghamii Hort. angl., Cunningham's, ♄. t. k. Neuh.
discolor Hort. angl., verschiedenfarbiger, ♄. t. k. Neuh.
eriocarpum Royle, wollfrüchtiger, ♄. t. Ostindien.
Hügelianum Putterl., Hügel's, ♄. t. k. Neuholland.
lanceolatum Putterl. (= *Senecia lanceolata* Lam. =

Digitized by Google

Pittosporum

Celastrus lanceolatus Spgl.), lanzettblätteriger, ♄. t. m. Mauritius.

ledifolium DC. (= *revolutum* DC., non Ait.?), porstblätteriger, ♄. t. k. Neuholland.

longifolium Putterl., langblätteriger, ♄. t. k. Neuholland.

microcarpum Putterl. (= *enkianthoides* Rich., Cunningh. = *umbellatum* A. Cunnigh.), kleinfrüchtiger, ♄. t. k. Neuzeeland.

nanum Hook., zwergiger, ♄. t. k. Neuholland.

oleaefolium A. Cunningh. (= *phillyraeoides* Cunn.).

pauciflorum Hook., Arn., wenigblumiger, ♄. t. k. China.

phillyraeoides DC., steinlindenblätteriger, ♄. t. k. Neuh.

pimeleoides A. Cunningh., glauzstrauchblätteriger, ♄. t. k. Neuholland.

revolutum Dryand., Ait. (= *fulvum* Rudge, = *hirtum* W. Enum. = *hirsutum* Lk. = *tomentosum* Bonpl.).

Senacia Putterl. (= ?*undulatum* β *latifolium* Hügel, = *mauritianum* Lodd. Catal. = *Celastrus undulatus* Lam. = *Senacia undulata* Lam., p. 742, = *Ornithrophe Meruluria* Commers.).

tenuifolium G. (= *translucens* Hook. = *Trichilia monophylla* Rich.).

Tobira Ait. (= *arbutifolium* Hort. = *chinense* Don, = *japonicum* Hort. = *Evonymus Tobira* Thbg.).

b) foliis variegatis.

umbellatum G. (= *eugenioides* A. Cunn. = *Pittosporoides umbellata* Soland.), doldiger, ♄. t. k. Neuzeeland.

viridiflorum Sims, (= *arbutifolium*, = *capense*, = *odoratissimum* Hort. = *sinense* Dsf.).

Unbestimmtere: Coreonopsis Hort., crispum Dsf., expense Nois., Loud., glomeratum compactum Hort., tuberculatum Zeyh., uniflorum Putterl.

hirtum Hort. Taurin., v. Syncarpia laurifolia, *procumbens* Hook., v. Bursaria procumbens, p. 83 II.

Placea Miers, Placea, VI. 1., Narcisseae.

chilensis Miers, chilesische, 4. Zw. w. Chili.

Plagiolobium glaucum Makoy, (= *cordatum* Hort.), v. Hovea ilicifolia, p. 306, II.

Plagiophyllum grandifolium Schltdl., *parvifolium* Schltdl., v. Centradenia grandifolia et rosea, p. 132, II.

Plagiostemon bicolor Kl., v. Simocheilus bicolor, p. 884.

Plagius L'Her., Balsamkraut, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

ageratifolius L'Her. (= *Balsamita ageratifolia* Dsf., p. 110, = *B. corymbosa* Salzm. = *B. flosculosa* Hort. = *Chrysanthemum flosculosum* L. = *Matricaria rigida* Desr. = ?*Tanacetum chrysanthemoides* G.), ageratumblätteriges, ♄. k. Sardinien, Corsica, Creta, Nordafrika.

grandiflorus Dsf. (= *Balsamita grandiflora* Dsf., p. 110, = *Tanacetum grandiflorum* Poir.).

virgatus DC. (= *Allionii* L'Her. = *Balsamita virgata* Dsf., p. 110, = *Chrysanthemum discoideum* All. = *Ch. flosculosum* β Murr. = *Chrysocoma denticulata* Jacq. = *Cotula grandis* L., Jacq. = *Matricaria grandis* Auct. = *M. virgata* Desv. = *Tanacetum virgatum* Loisel.), ruthenförmiges, 4. f., b., Mittägl. Frankreich, westl. Ligurien.

Digitized by Google

Planera J. F. Gmel., Mchx., Planera.
aquatica Gmel. (= *americana* Hort. = *Gmelini* Mchx. = *ulmifolia* Mchx. = *Anonymus aquatica* Walt.).
carpinifolia Watson, hainbuchenblätterige, ♄. f. Sibirien.
Richardi Mchx. (= *crenata* Dsf. = *Rhamnus carpinifolius* Pall. = *R. ulmoides* Güldenst. = *Ulmus campestris* Walt. = *U. crenata* Hort. Par. = *U. nemoralis* Ait. = *U. peregrina* Hort. = *U. polygama* Rich.).
Plantaginella aquatica Mch., v. Limosella aquatica, p. 464.

Plantago T., L., Wegetritt.
adspersa Bernh., angetüpfelter, ♄. k. f. b. Portugal.
albicans L. (= *ovata* Forsk.), weifslicher, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.
altissima Jacq. (= *lanceolata* DC. = *sylvatica* Mart.), *β)* dalmatica Schott, (= *Schottii* R. et S.), *γ)* irrigua Fisch. (= *capitata* Presl, = *Preslii* Tenore).
arborescens Poir., baumartiger, ♄. k. Canarische Inseln.
aristata Mchx., granniger, 4. f. Nordamerika (Illinois).
Bungei Steud. (= *pusilla* Bunge), Bunge's, ⊙. f. Altaisches Sibirien.
Candollei Rapin, (= *chilensis* Dsf. H. Par. = *d'Urvillei* Delile, = *média* Hook. et Arn., non alior.), Candolle's, 4. f. Chili, Californien.
β) californica Fisch. et Mey.
canescens Schrad., graulicher, ⊙. f. Südamerika.
capitata Tenore (non Hoppe), kopfförmiger, 4. f. Neapel.
Cornuti Gouan, (= *gracilis* Hort. = *maxima* Ruch.).
β) limosa Kit.
Coronopus L. (= *Columnae* Gouan, = *coronopifolia* Roth, = *integralis* Gaud. = *neglecta* Gussone).
cretica L. (= *Cataranche* Clark. = ?*decumbens* Forsk.), cretischer, ⊙. f. Griechenland, Kleinasien.
divaricata Zucc. (= *cynopidea* Schult. = *hirsuta* Kit. = *indica* L. var. = *rigida* Hort.), ausgespreitzter, ⊙. f. ?
eriophora Hffg., Lk. (= *altissima* Brot. = *argentea* Brot. = *lanceolata* Brot. = *Linkii* Schrad. = *variabilis* Lk.), wolltragender, 4. k. f. b. Portugal.
eriostachya Tenore, (= ?*aliena* Schrad. = *arvensis* Presl, = *intermedia* Lapeyr. = *Lagopus* L. var. R. et S.).
Eschscholtziana Fisch. et Mey. (= *tomentosa* Cham.).
firma Kunze, hartblätteriger, ⊙. f. Peru.
glauca C. A. Mey., blaugrüner, ⊙. f. Caucasus.
lanceolata L., *β)* abyssinica Hochst., *γ)* hungarica W. (= *decumbens* Rchb. = *humifusa* Berah.), *δ)* lanata Hort. (= *lanuginosa* Bast.), *ε)* nigricans Lk., *ζ)* sylvatica P., *η)* irrigua Bess.
linearis H. B. K. (= *eriorrhiza* W. hrb. = *scrulensis* H. B. K. var. *alpina* Chamiss.), gleichbreitblätteger, 4. k. Quito.
Lofflingii L. (= *carinata* Mch.), *β)* caspia Fisch. et Mey. (= *minuta* C. A. Mey.).
lusitanica L. (= *lagopodioides* Schrk.), *β)* pseudolusitanica Schrad., R. et S. (= *fruticosa* Hort. Par.).
micrantha Ledeb., kleinblumiger, 4. f. Sibirien.
microcephala Poir. (= *albicans* Hortul. = *argentea* Spgl. = *declinata* Hort. *madrit.* = *lanata* W. hrb.

Digitized by Google

Plantago

= *monspeliensis* W. Enum. = *villosa* Mch., Roth), kleinköpfiger, ⊙. f. Persien, Ostindien.

minor Fr., kleiner, 4. f. Nordeuropa.

minuta Pall., M. B., kleinster, ⊙. f. Caucasus.

montana Lam. (= *lanceolata* γ P. = *nigricans* Auct. = *quinquenervis* Schlchr.).

praecox C. A. Mey., früher, ♂. f. Caucasus.

Psyllium L. (= *Pseudopsyllium* Hort. Par. = *Psyllium annuum* Mirb. = *P. erectum* St. Hil.).

β) nitida R. et S.

pusilla Nutt. (= *elongata* Pursh, = *hybrida* Bartr. = *linearifolia* Mühlbg. = *oliganthos* R. et S. = *pauciflora* Pursh), niedrigster, 4. f. Nordamerika.

recurvata L. (= *incurvata* Murr.).

rigida H. B. K. (= *rigens* Schult. mant. = *rigidiuscula* Dietr.), starrer, 4. k. Quito.

serpentina Lam. (= *alpina* Sieber, = *aspera* Gaud. = *hirsuta* Pour. = *serrata* Hall. fil.).

stricta Schousb. (= *parviflora* Hortul. nec Dsf. = *Rosettana* Poir.).

subulata L. (= *brachyphylla* R. et S. = *triquetra* P.).

β) pungens Lapeyr.

tenuiflora W. K. (= *Löfflingii* MB.). Ungarn, Taurien, Mittelasien.

teretifolia Sieber, (= *crassifolia* Forsk. = *maritima* Delil.).

uliginosa Baumg., sumpfliebender, 4. f. Siebenbürgen.

velutina Poir. (= *albicans* Schousb. = *argentea* Tenor.), weifsshaariger, 4. k. Calabrien, Nordafrika.

virginica L. (= *connivens* Mch.).

xorulensis H. B. K. (= *graminea* W. hrb. = *mexicana* Lk.), xorulischer, 4. k. Neuspanien, Californien.

b) micrantha Hort. Petropol., c) californica Hort. Petropol.

Unbestimmtere: canaliculata Hffg., diffusa Presl.

Platanthera Rich., Breitbeutel.

bifolia Rich. (= *pervia* Peterm. = *solstitialis* Bönningh. = *Wankelii* Rchb. = *Orchis alba* Lam. = *O. bifolia* L. = *Habenaria bifolia* RBr. = *Satyrium bifolium* Whlbg.). 4. Kn. f. Europa.

β) brachyglossa Rchb. (Wallr.), (= *solstitialis* β *densiflora* Drej.).

blephariglottis Lindl. (= *Habenaria blephariglottis* Beck), doppelzungiger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

ciliaris Lindl. (= *Habenaria ciliaris* RBr. = *Orchis ciliaris* L.), gewimperter, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

crispa Lindl., krauser, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

cristata Lindl. (= *Habenaria cristata* RBr. = *Orchis cristata* Mchx.), kammförmiger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

dilatata Lindl. (= *Habenaria borealis* Chamiss. = *H. dilatata* Hook. = *Orchis acuta* Banks, = *O. agastachys* Fisch. = *O. dilatata* Pursh).

fimbriata Lindl. (= *Habenaria fimbriata* RBr. = *Orchis fimbriata* Ait.), gefranzter, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

fissa Lindl. (= *Habenaria fissa* RBr. = *Orchis fissa* W. = *O. incisa* Nutt., nec Alior.), gespaltener, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

Digitized by Google

Platanthera

flava Lindl. (= *Habenaria flava* RBr. = *Orchis flava* L.), hellgelber, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

grandiflora Lindl. (= *Habenaria grandiflora* Torr., Beck. = *Orchis grandiflora* Bigel.), grofsblumiger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

herbiola Lindl. (= *Habenaria herbiola* RBr. = *Orchis bidentata* Ell. = *O. fuscescens* Pursh, Lodd., non L. = *O. herbiola* Pursh, = ? *O. scutellata* Nutt.), kleiner, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

holopetala Lindl. (= *Habenaria blepharioglottis* Hook., nec alior.), ganzkroniger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

hyperborea Lindl. (= *Habenaria hyperborea* RBr. = *Orchis hyperborea* L.), nördlichster, 4. Kn. k. f. b. Nördlichstes Europa und Amerika.

japonica Lindl. (= *Orchis japonica* Thbg.), japanischer, 4. Kn. k. Japan.

incisa Lindl. (= *Habenaria incisa* Spgl. = *Orchis incisa* Mühlbg., W.), geschlitzter, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

leucostachys Lindl., weifsähriger, 4. Kn. k. f. b. Nordam.

obtusata Lindl. (= *Habenaria obtusata* Richards. = *Orchis obtusata* Pursh), stumpfer, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika, Schweden.

orbiculata Lindl. (= *Habenaria macrophylla* Hook. = *H. orbiculata* Torr. = *Orchis orbiculata* Pursh), kreisförmiger, 4. Kn. k. f. b. Canada.

psychodes Lindl. (= *lacera* Lodd., Sweet, = *Habenaria lacera* RBr. = *H. psychodes* Spgl. = *Orchis lacera* Mchx. = *O. psychodes* L.), 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.

radiata Lindl. (= *Habenaria radiata* Spgl. = *Orchis radiata* Thbg. = *O. Susannae* Thbg.), strahliger, 4. Kn. k. Japan.

Susannae Lindl. (= *gigantea* Lindl. = *Habenaria gigantea* D. Don, = *H. Susannae* RBr. = *Orchis gigantea* Sm. = *O. Susannae* L.), riesenhafter, 4. Kn. w. Ostindien, China.

viridis Lindl., v. Peristylus viridis, p. 500, II.

Platanus T., Platane, Kleiderbaum.

acerifolia W. (= *orientalis* β Ait. = *intermedia* Hort.), α) digitata Hort., β) hispanica Lodd. (= *grandifolia* Hort. Vindob.), γ) longiloba Hort. Vindob.

mexicana Moric., mexicanischer, ħ. f. b. Mexico.

occidentalis L. (= *lobata* Mch.), β) macrophylla Hort. Vindob.

orientalis L. (= *or. elongata* Ait. = *palmata* Mch.).

Platurium rubrum Juss., v. Holmskioldia sanguinea.

Platycerium Gaudich., Blume, Breitlappenfarrn, XXIV. 1., Polypodiaceae (Pteroideae).

alcicorne Gaudich., Blume, (= *Acrostichum alcicorne* Sw., p. 16, = *Neuroplatycerus* Plukn.).

grande J. Sm. (= *Acrostichum alcicorne* A. Cunningh.), grofser, 4. w. Neuholland.

biforme Blume, Java, scheint nicht kultiv. zu werden.

Platycodon A. DC., Pracht-(Breit-)glocke.

grandiflorum A. DC. (= *Campanula gentianoides* Lam. = *C. grandiflora* L. fil. = *Wahlenbergia grandiflora* Schrad.).

Digitized by Google

Platycodon

homallanthinum DC. (= *Campanula homallanthina* Ledeb. = *C. Redowskiana* Cham., Schltdl. = *Wahlenbergia homallanthina* A. DC. = *W. Krubsiana* Fisch.), flachkronige, 4. f. Sibirien.

Platylobium Sm., Breitlappe.

Drummondii Hort. Angl., Drummond's, ħ. t. Neuholland.

Fraseri Hort. Angl., Fraser's, ħ. t. Neuholland.

obtusangulum Hook., stumpfblätterige, ħ. t. Van Diemens Land.

Unbestimmtere: aphyllum Hort., gracile Hort. *lanceolatum* Andr., *microphyllum* Sims, (= *obcordatum* Vent.), *ovatum* Andr., Sm., *Scolopendrium* Vent., v. Bossiaea heterophylla, microphylla, ovata et Scolopendrium, p. 128 et p. 75, II., *reticulatum* Sieber, v. Chorisema platylobioides Nachlese. *Platynema paniculatum* Schrad. etc., v. Mertensia paniculata etc., p. 399 u. 400, II.

Platypetalum RBr., Breitkrönchen, XV. II., Cruciferae.

involucratum Bunge, hüllblätteriges, 4. f. h. Alt. Sibirien.

purpurascens RBr., purpurfarbiges, 4. f. h. Melville-Insel. *Platypteris crocata* H. B. K., v. Verbesina crocata. *Platyraphium Billardieri* Cass., *Jacquini* Cass., v. Chamaepeuce diacantha et afra, p. 186.

Platysema Benth., Breitfahne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

triquetrum Benth. (= *Vexillaria triquetra* Hffg.), dreiseitige, ħ. Sch. w. Brasilien. *Platyspermum litorale* K., *muricatum* Hoffm., *pulcherrimum* K. (= *orientale* Hoffm.), v. Daucus bessarabicus, muricatus, pulcherrimus, p. 192, II.

Platystemon Benth., Breitfädler.

californicum Benth., β) lineare Walp.

Platystylis Lindl. (non Sweet), Breitgriffel, XX. I., Orchideae.

atropurpurea Lindl. (= *Malaxis atropurpurea* Blume), schwarzpurpurfarbiger, 4. w. Java. *Platystylis* Sweet, v. Orobus Sect. II. p. 461, II. *Plazia brasiliensis* Spgl., v. Stiftia chrysantha. *Plectanthera ciliosa* Mart., v. Luxenburgia ciliosa, p. 375, II.

Plectranthus L'Her., Spornblume.

cordifolius D. Don, (= *divaricatus* Weinm. = *incanus* Lk. Enum. = *maypurensis* Spgl. = *mollis* Spgl. = *secundus* Roxb. = *Ocimum maypurense* Roth, = *O. molle* Ait.).

madagascariensis Benth. (= *Forskohlei* Vahl, (non W.) = *pubescens* W. herb. = *villosus* Sbr. = *Germanea Forskohlei* Poir. = *Ocimum Auricula* Forst. = *O. hadiense* Forsk. = *O. madagascariense* P.), madagascarischer, ħ. w. Madagascar, Südafrika, Arabien.

nudiflorus W. (= *Germanea nudiflora* Poir. = *Ocimum chinense* Hort.), nacktblumige, 4. w. China.

parviflorus W. (= *graveolens* RBr. = *paniculatus* Jacq. = *Germanea parviflora* Poir.), kleinblümige, 4. ħ. w. Wärmeres Neuholland, Sandwichinseln.

punctatus L'Her. (= *Galeopsis abyssinica* Hort. = *G. maculosa* Lam. = *Germanea maculosa* Lam. = *G. punctata* Poir. = *Ocimum punctatum* L. fil.).

Digitized by Google

Plectranthus
rugosus Wall. (= *Isodon plectranthoides* Schrad. = *Lumnitzera densiflora* Spgl. = *Ocimum densiflorum* Roth), runzelige, 4. ♄. w. Ostindien.
tomentosus E. Mey., filzige, 4. ♄. k. t. Cap d. g. H.
amboinensis Spgl. (= *aromaticus* Roxb. = *crassifolius* Hortul.), *asper* Spgl. (= *barbatus* Andr. = *comosus* Sims, = *monadelphus* Roxb. = *mysurensis* Heyne), *galeatus* Vahl, *scutellarioides* RBr. (= *ocimoides* Hrb. Madrit.), v. Coleus aromaticus, barbatus, galeatus et scutellarioides, p. 211 et p. 153 II. et Nachlese, *Barrelieri* Spgl., *monachorum* Spgl., v. Ocimum Basilicum η et sanctum, p. 442, II., *carnosus* Sm. (= *crassifolius* Hort. = *strobiliferus* Roxb.), v. Anisochilus carnosus, p. 37, II., *rubicundus* Don, *thymiflorus* Spgl. (= *menthoides* W. herb.), v. Ortosiphon rubicundus et glabratus, p. 462, II.

Plectritis DC., congesta DC. (= *capitata* Nutt. = *Valerianella congesta* Lindl. = *V. parviflora* Dougl.).
Plectrogyne variegata Lk., v. Aspidistra elatior β, p. 91 et p. 48, II.
Pleiogyne C. Koch, *anthemoides* C. Koch, *microcephala* C. Koch, *nudicaulis* C. Koch, *villosa* C. Koch, v. Cenia anthemoides, microcephala, nudicaulis et villosa, p. 129 et 130, II.

Pleiomeris A. DC., Vieltheiler, V. 1. (XXIII. 11.), Myrsineaceae.
canariensis A. DC. (= *Manglilla canariensis* R. et S. = *Myrsine canariensis* Spgl. = *Scleroxylon canariense* W.), canarischer, ♄. k. Teneriffa.

Pleopeltis H. B. K., iteophylla Lk., lycopodioides Presl, macrocarpa Kaulf., Lodd., percussa Hook. et Greville etc., v. Polypodium Sect.

Pleroma D. Don, Zellenbeere.
Benthamianum Hook., Lindl. (= *Lasiandra* spec. Cham. Schltdl.), Bentham's, ♄. w. Brasilien.
Fontanesianum Gardn. (= *granulosum* D. Don, = *Lasiandra Fontanesiana* DC. = *Melastoma granulosa* Sims, Desv. = *M. Fontanesii* Spgl. = *Rhexia alata* Raddi, = *R. dasystaminea* Schrank, = *R. Fontanesii* Bonpl.), Desfontaine's, ♄. w. Brasilien.
heteromallum D. Don, (= *Melastoma heteromalla* Sims).
Kunthianum Paxton, (= *Lasiandra Kunthiana* DC.), Kunth's, ♄. w. Brasilien.
mexicanum DC. (= *Melastoma aspera* Pavon), mexicanische, ♄. w. Mexico.
petiolatum Hort. angl., stielblätterige, ♄. w. Brasilien.
villosum DC. (= *Melastoma villosa* Sims), zottige, ♄. w. Südamerika.
holosericeum D. Don, *oxypetalum* D. Don, *vimineum* D. Don, v. Lasiandra argentea, oxypetala et coerulea, p. 344, II.
Pleurachne secunda Schrad. (= *Sieberi* Schrad.), v. Ficinia secunda.

Pleurandra LaBill., Rippenbeutel.
acerosa RBr., nadelähnlicher, ♄. t. Neuholland.
cistiflora Sieber, cistblumiger, ♄. t. Neuholland.
scabra RBr. (= *ovata* LaBill. var. DC.), scharfer, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Pleuranthe glastifolia Salisb., v. Protea humilis, p. 658.

Pleurogyne Eschscholtz, Griseb. (= *Lomatogonium* v. Braune), Rippen-(Saum-)narbe, V. 1., Contortae-Gentianeae.

carinthiaca Griseb. (= *Gentiana carinthiaca* Fröl. = *Lomatogonium carinthiacum* v. Braune, p. 883, = *Swertia carinithiaca* Wulf.), β) gracilis Griseb. (= *rotata* G. Don, = *Gentiana polyantha* Fisch.), γ) Stelleriana Griseb., G. Don, (= *Gentiana rotata* MB. = *G. Stelleriana* Cham. et Schltdl.). Sibirien, Caucasus.

rotata Griseb. (= *Gentiana rotata* Fröl. = *G. sulcata* W. = *Swertia rotata* L. = *S. sulcata* Rottb.), radförmige, ♂. f. Nördliches Amerika.

Pleurospermum Hoffm., Rippensaame.

Archangelica Ledeb., engelwurzähnlicher, 4. f. Alt. Sibirien.

uralense Hoffm., uralischer, 4. f. Ural. Sibirien.

cicutarium Auct., v. Molopospermum cicutarium, p. 258, *Golaka* Rchb., v. Malabaila Hacquetii, p. 382, II.

Pleurothallis RBr., Rippenstendel.

aurea Hort. belg., goldfarbiger, 4. w. Südamerika.

barbata G. Bark., Dickins, bärtiger, 4. w. Para.

caulescens Lindl., stengeliger, 4. w. Peru.

circumplexa Lindl., rundumflechtiger, 4. w. Mexico.

elongata Lindl., verlängerter, 4. w. Südamerika.

lanceolata Lindl. (= *lancifolia* Hort. = *Stelis lanceolata* W. = *Humboldtia lanceolata* R. et P.), lanzettlicher, 4. w. Peru.

laxa Lindl. (= *Dendrobium laxum* Sw. = *Epidendrum laxum* Sw.), lockerer, 4. w. Jamaika.

macrorrhiza Lindl., grofswurzeliger, 4. w. Peru.

muscoidea Lindl., moosähnlicher, 4. w. Brasilien.

pulchella Lindl. (= *Stelis pulchella* H. B. K.), hübscher, 4. w. Peru.

ruscifolia RBr. (= ? *laurifolia* H. B. K. = *Dendrobium ruscifolium* Sw. = *Epidendrum ruscifolium* Sw.).

sertularioides Spgl. (= *Dendrobium sertularioides* Sw. = *Epidendrum sertularioides* Sw.), sertulariaähnlicher, 4. w. Jamaika.

tribuloides Lindl. (= *Cymbidium tribuloides* Spgl. = *Dendrobium tribuloides* Sw. = *Epidendrum tribuloides* Sw.), bürzeldornähnlicher, 4. w. Jamaika.

triangularis Kl., dreikantiger, 4. w. Caracas.

tricarinata Poepp., Endl., dreikieliger, 4. w. Peru.

tridentata Kl., dreizähniger, 4. w. Südamerika.

Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der vorzüglichern Handelsgärten noch folgende erwähnt: lingua, mexicana, pubescens, robusta, tigrina.

distícha Rich., v. Oberonia brevifolia, p. 441, II., *foliosa* Hook., v. Rodriguezia suaveolens, *Lanceola* Spgl., v. Specklinia Lanceola, *punctata* Ker, v. Notylia punctata, p. 550, *tubata* Lodd., v. Physosiphon Loddigesii, p. 621.

Plinia rubra L. (= *pedunculata* L. fil.), v. Eugenia Michelii, *Plinthine aggregata* var. *tetraquetra* Rchb., v. Arenaria tetraquetra, p. 76.

Pluchea Cass., Pluchea, p. 885.

foetida DC. (= *marylandica* Cass., non DC. = *Baccharis foetida* L. = *Conyza* ? *camphorata* Pursh, = *C.* ? *marylandica* Pursh, = *Gynema dentata* Raf. =

Digitized by Google

Pluchea

Gynema viscida Rafin.), stinkende, ♂. ♃. f. Nordamerika.

marylandica DC. (non Cass.), (= *Baccharis foetida* Walt. non L. = *Conyza marylandica* Mchx. = *Stylimnus maritimus* Rafin.), maryländische, ☉. f. Nordam.

odorata Cassini, (= *Conyza odorata* L. = *Conyza carolinensis* Jacq.), wohlriechende, ♄. k. Florida, Carolina, Mexico.

subdecurrens Cass. (= *Baccharis adnata* W. = *Conyza adnata* H. B. K. = *C. asteroides* Dsf. Hort. Par., non L.). wenigherablaufende, ♄. k. Mexico.

Plumbago T., Bleiwurz.

coerulea H. B. K. (= *glandulosa* W. herb. = *Humboldtiana* Schult.).

europaea L. (= *lapathifolia* MB. non W. = *undulata* Mch.). Südeuropa, Caucasus.

occidentalis Sweet, (= *scandens* Hort., non L. = *zeylanica* β R. et S.).

rhombifolia Hook. (= *rhomboidea* Sweet).

zeylanica L. (= *flaccida* Mch. = ?*sarmentosa* Lam.).

Plumieria T. (= *Plumeria* Auct.), Plumierie.

acutifolia Poir. (= *acuminata* Dryand., Ait. = *alba* Hort. Par. = *obtusa* Lour. = *retusa* Bont.), spitzblätterige, ♄. w. Ostindien.

β) Gasparrinii A. DC. (= *acutifolia* Gasparr.).

alba L., β) Jacquiniana A. DC. (= *alba* Jacq.).

Berterii A. DC. (= *obtusa* Bert.), Bertero's, ♄. w. St. Domingo.

bicolor R. et P. (= *alba* L. var. *fragrans* H. B. K.).

bracteata A. DC., deckblätterige, ♄. w. Bahia.

carinata R. et P., kielförmige, ♄. w. Peru.

hypoleuca Gasparr. (= *alba* Hort.), unterseitsweifsliche, ♄. w. ? Ostindien.

β) angustifolia Gasparr., γ) Wallichiana A. DC. (= *alba* Hort. Calcutt.).

incarnata R. et P., β) Milleri G. Don, (= *incarnata* Mill.).

Lambertiana Lindl. (= *Gouani* D. et G. Don, = *mexicana* Lodd.).

megaphylla A. DC. (= *alba* ? var. *flava* Andr.), grofsblätterige, ♄. w. Mexico.

mollis H. B. K., weiche, ♄. w. Mexico, Orinoco.

obtusa L. (= *nivea* Mill.).

Tenorii Gasparr., Tenore's, ♄. w. ?

tuberculata Lodd.

xanthostoma Schltdl., gelbschlundige, ♄. w. Mexico.

Zu den weniger genau gekannten Arten zählt A. DC. folgende [1]): africana Mill., ♄. Senegal, angustifolia Aubl., ♄. Guiana, ? arborescens G. Don, ♄. Jamaika, articulata Vahl, ♄. Guiana, cuneata Sm. (= *alba* Aubl.), ♄. Guiana, inodora Jacq. (= *alba* var. G. Don), ♄. Carthagena, pudica Jacq., ♄. Curaçao, phagedaenica Mart., ♄. Brasilien (Rio Negro), xanthostoma Schltdl., ♄. Mexico.

Ebenso sind ihm folgende unbekannt: aurantiaca Lodd., Blandfordiana Lodd., Südam., conspicua Hort. angl., jamaicensis Lodd., leucantha Lodd., longifolia Bojer, („Culta in Mauritio, forsan e Madagascar"), macro-

1) Prodrom. syst. nat. reg. veg. VIII. p. 394.

Digitized by Google

Plumieria

phylla Lodd., Northiana Lodd., tenuifolia Lodd. Die gröfsere Anzahl derselben wird kultivirt. Vergl. p. 636, und daselbst zu ergänzen u. zu berichtigen.

Pneumonanthe Neck., Schmidt, Delarbre, *acaulis* Schm. (= *angustifolia* Schm.), *algida* Schm., *asclepiadea* Schm. (= *plicata* Schm.), *campanulata* Schm., *campestris* Schm., *frigida* Schm., *ochroleuca* G. Don, (= *villosa* Schm.), *pannonica* Schm., *Pseudo-Pneumonanthe* G. Don, *punctata* Schm., *purpurea* Schm., *Saponaria* Schm. (= *Catesbaei* Schm.), *septemfida* Schm., *vulgaris* Schm. etc., v. Gentiana acaulis, algida, asclepiada etc. etc.

Poa L., Rispengras.

alpina L. (= *Scheuchzeri* Pourr.), *δ)* frigida Gaud. (= *cenisia* Schrad. = *Molinieri* Sering., non Balb.), *ε)* flavescens Thom. (= *variegata* Lam.).

altaica Trin., altaisches, 4. f. Altai, Ostcaucasus.

arundinacea Lk. (= *tatarica* Hort. Gorink. = *Aira arundinacea* L., p. 26, = *Eragrostis collina* Trin.), rohrähnliches, 4. f. Mittelasien, Caucasus.

autumnalis Mühlbg. (= *campyle* Schult. = *cuspidata* Bast. = *Elliotii* Spgl. = *flexuosa* Mühlbg. = *pungens* Torrey), herbstliches, 4. f. Nordamerika.

cenisia All. (= *distichophylla* Gaud. = *flexuosa* Host, = *Halleri* Suter, = *stolonifera* Bellardi).

collina Host, (= *alpina* L. var. Auct. = *cenisia* Lk., non All. etc.).

flexuosa Wahlbg. (= *laxa* Whlbg., Lapp., non Hänke), hin- und hergebogenes, 4. f. Europäische Alpen, Nordamerika.

Halleridis R. et S. (= *pallens* Gaud, non Poir.), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen u. Alpen.

laxa Hänke, (= *coarctata* Kit. = *elegans* DC. = *frigida* Schleicher).

leptostachya RBr., schlankähriges, 4. k. Neuholland.

longifolia Trinius, (= *sudetica α* C. A. Mey.), langblätteriges, 4. f. Caucasus.

minor Gaud. (= *tenella* Hoppe, = *supina* Panzer).

nemoralis L., *β)* firmula Gaud. (= *Gmelini* Koeler, = *gracilescens* Schrad. = *rhenana* Lej. = *salebrosa* Panz.), *δ)* glauca Sm. (= *glaucanthos* Schlchr. = *glaucescens* Roth), *ε)* montana Gaud. (= *debilis* Thuill. = *glauca* Bast. = *petraea* Bell. = *rariflora* Dsf.), *ζ)* schoenosperma Gaud. (= *juncea* Suter, = *juncoides* Bot. helv. = *tenuis* Vill.), *η)* depauperata Kit. (= *Kitaibelii* Kunth), *ϑ)* variegata Host, (= ?*Aira helodes* Brignol.).

pellucida RBr., durchschimmerndes, ⊙. 4. f. k. Neuholl.

persica Trin., persisches, 4. f. Persien, Caucasus.

saxicola RBr., Felsen-R., 4. k. f. b. Neuholland.

scariosa Lagasca, trockenhäutiges, 4. f. Spanien.

semineutra Trin. (= *Aira semineutra* W. K. = *Phalaris semineutra* R. et S.), halbzwitterähnliches, 4. f. Ungarn.

stolonifera Mühlbg. (= *panicea* W. herb.), sprossendes, 4. f. Nordamerika.

trivialis L. (= *cilianensis* All. = *dubia* Leers, = *Kitaibelii* Schult. = *scabra* Ehrh. = *setacea* Huds.), gemeines, 4. f. Europa, Asien, America.

Digitized by Google

Hinsichtlich d. übrigen vergl. die Gattungen Aeluropus, Airopsis, Brizopyrum, Eragrostis, Glyceria, Koeleria, Leptochloa, Oreochloa, Sclerochloa, Tridens, Triodia etc.

Pocockia radiata Trautv., v. Hymenocarpus radiatus. *Podagraria* Adans., *Aegopodium* Mch., v. Aegopodium Podagraria, p. 21.

Podalyria Lam., Podalyrie.

calyptrata W., *α*) villosa Walp., *β*) styracifolia Sims, (= *myrtillifolia* Eckl., Zeyh., non W. = *Hypocalyptus calyptratus* Thbg. = *Sophora biflora* Houtt. = *S. calyptrata* Retz.).

coruscans Rchb., schimmernde, ♄. k. t. Cap d. g. H.

cuneifolia Vent. (= *albens* E. Mey. = *hirsuta* W. hrb.), *β*) latifolia Walp. (= *splendens* Eckl., Zeyh.).

lanceolata Benth. (= *calyptrata β lanceolata* E. Mey.), lanzettblätterige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

myrtillifolia W. (= *buxifolia* Eckl., Zeyh. = *lancifolia* Eckl., Zeyh. = *liparioides* DC. = *parvifolia* Benth. = *virgata* W. hrb. = *Sophora biflora* L. = *S. myrtilloides* Retz, = *S. rotundifolia* Berg.), *β*) parvifolia DC. (= *Crotalaria parvifolia* Thbg.).

Unbestimmt: mutabilis Jacq.

genistoides W., v. Cyclopia genistoides, *tetraptera* Hort., v. Edwardsia tetraptera.

Podocarpus L'Her., Stielfrucht.

chinensis Sweet, (= *Makoyi* Hort. = *Taxus chinensis* Roxb. = ? *T. nucifera* Telfair.).

coreanus Hort. belg., coreaischer, ♄. k. t. Corea.

dacrydioides Rich. (= *Dacrydium excelsum* et *taxifolium* Hort. belg. et anglor., p. 186, II.), gummitannenähnliche, ♄. t. k. Neuzeeland.

elongatus L'Her. (= *Taxus elongata* Thbg.).

Horsfieldii RBr., Horsfield's, ♄. t. Ostinden.

imbricatus Blume, ziegeldachförmige, ♄. t. w. Japan.

latifolius Blume, Wall. (= ? *Taxus verticillata* Thbg.), breitblätterige, ♄. t. Ostindien.

longifolius Hort. angl. et belg., langblätterige, ♄. k. t. Japan.

macrophyllus Lamb. (= *Taxus macrophylla* Thbg.).

Sprengelii Blume, Sprengel's, ♄. t. w. Java.

taxifolius H. B. K. (= *Yacca* G. Don, = *Taxus montana* W. = *pungens* Hort.).

verticillatus Wall. (= *Taxus verticillata* Thbg.).

zamiaefolius Rich., keulpalmenblätterige, ♄. k. t. Neuzeeland.

Aufserdem findet man in den Pflanzencatalogen der Handelsgärten noch nachstehende verzeichnet: coriaceus, Harringtonii, mucronatus, Purdieanus (Jamaica), spicatus (= *ferrugineus* Hort. = *pungens* Hort.) (Neuzeeland), Totara (Neuzeeland).

Podochilus Blume, Lindl., Stiellippe, XX. 1., Orchideae.

falcatus Lindl., sichelförmige, 4. w. Zeylon.

gracilis Lindl. (= *Platyema gracile* Blume), schlanke, 4. w. Java.

tenuis Lindl. (= *Apista tenuis* Blume), dünne, 4. w. Java.

Podolepis LaBill., Stielschuppe.

acuminata RBr. (= *Scalia jacaeoides* Sims).

auriculata DC., geöhrte, ☉. m. f. Neuholland.

Digitized by Google

Podolepis

chrysantha Endl. (= *Borolepis chrys.* Benth.), goldblumige, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland.

gracilis Grah. (= *Stylolepis gracilis* Lehm.).

b) hybrida Hort.

longipedata Cunnig., langstielige, 4. ♂. t. Neuholland.

Podolobium RBr., Hülsenfuss.

chorisemaefolium Hort. belg., chorisemablätteriger, ♄. t. Neuholland.

elegans Hort. belg., zierlicher, ♄. t. Neuholland.

oblongum DC., v. Chorisema Henchmanni, p. 192, *coriaceum* DC., *scandens* DC., *sericeum* DC., v. Oxylobium retusum, p. 572. O. scandens et sericeum, p. 466, 467, II., *salicifolium* Hort. = ? *Podocoenum lachnanthum* N. E., v. Agrostis lachnantha, p. 25 et p. 16, II. Hinsichtl. d. übrigen s. Mühlenbergia et Sporobolus.

Podospermum DC., Fussame.

Columnae DC. (= *Scorzonera Columnae* Guss.), Columna's, 4. f. Unteritalien.

Jacquinianum K. (= *octangulare* Roth, = *Scorzonera laciniata* Jacq., non L.).

molle Fisch. et Mey. (= *villosum* MB., Stev. = *Scorzonera mollis* MB. = ? *S. tomentosa* Pall.), weicher, 4. f. Taurien, Caucasus.

pumilum Loudon, v. Zollikoferia pumila, *purpureum* K., v. Scorzonera purpurea, p. 735.

Podotheca Cass., Stielbüchschen.

gnaphalioides Hook. (= ? *capitata* Hort.), ruhrkrautähnliches, ⊙. f. m. Neuholland (Schwanenfluss).

Poeppigia Kunze, (Poeppig, Prof. d. Naturgeschichte zu Leipzig, berühmt als Reisender durch mehrere Gegenden Amerikas), VI. 1., Narcisseae.

chilensis Kunze, chilesische, 4. Zw. t. w. Chili. (Ob eingeführt?)

Poeppigia procera Presl, v. Caesalpinia procera, p. 142. *Pogonanthum* G. Don, v. Rhododendron Sect. p. 686. *Pogonia aspera* Hort. (= *scabra* Hort. = *tuberculata* Hort.), *tetrandra* LaBill., v. Myoporum parvifolium, p. 536 et M. serratum, p. 424.

Pogostemon Dsf., Haarfaden.

paniculatum Benth. (= *Elsholtzia paniculata* W. = *Hyssopus cristatus* Lam.), rispenförmiger, 4. w. Ostindien.

Pogostoma Schrad., Bartmund, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

saxifragaefolium Schrad. (= *Capraria saxifragaefolia* Cham., Schltdl.), steinbrechblätteriger, ?⊙. m. f. w. Mexico, Vera Crux.

Poinciana L., Poincianie.

Gilliesii Hook. (= *Erythrostemon Gilliesii* Kl. = *Caesalpinia macrantha* Delile), Gillies's, ♄. w. Mendoza.

pulcherrima L. (= *alata* Burm. = *bijuga* Burm. = *Caesalpinia pulcherrima* Sw.), a) flava, b) rubra.

Poinsettia Grah., Poinsettie.

pulcherrima Grah. (= *Euphorbia heterophylla* Karw. = *E. Poinsettiana* Buist, = *E. pulcherrima* W. herb.), *β*) albida Hensl. (= ? *lutescens s. lutea* H. belg.).

cyathophora Bartl., v. Euphorbia cyathophora.

Digitized by Google

Poiretia Vent., Poiretie.

psoraleoides DC. (= *Psoralea tetraphylla* Poir. = *Robinia glandulosa* Spgl. = *Turpinia montevidensis* Spgl.), harzkleeähnliche, ħ. w. Montevideo.

punctata Desv. (= *scandens* Vent. = *Glycine punctata* Lam. = *Turpinia punctata* P.).

Poiretia cucullata Cav., v. Sprengelia incarnata, p. 780. *P. erecta* Gmel., v. Houstonia coerulea.

Poivrea Commers., Poivrea.

aculeata DC. (= *Combretum aculeatum* Vent. = *C. alternifolium* Spgl. = *C. secundum* Mich. = *Guira nudiflora* Rchb.), stachelige, ħ. w. Senegal.

alternifolia DC. (= *Combretum alternifolium P.* = *C. decandrum* Jacq. = *C. Guayca* Humb. = *C. spinosum* H. B. K. = *Genocarpus Jacquini* Hamilt.), wechselblätterige, ħ. w. Südamerika.

coccinea DC. (= *Combretum coccineum* Lam. = *C. purpureum* Vahl, = *Cristaria coccinea* Sonner.).

comosa Sweet, (= *Combretum comosum* Don, = *C. paniculatum* Vent.).

eriopetala DC., wollkronige, ħ. w. Domingo.

grandiflora Walpers, (= *Combretum Afzelianum* G. Don, = *C. grandiflorum* G. Don), grofsblumige, ħ. w. Sierra Leone.

pilosa Wight, Arn. (= *Combretum pilosum* Roxb.), haarige, ħ. w. Ostindien.

Roxburghii DC. (= *Combretum decandrum* Roxb. = *C. Roxburghii* Spgl.), Roxburgh's, ħ. w. Ostindien.

Hiernach p. 640 zu ergänzen und zu berichtigen.

Polanisia Rafin., Polanisie.

Chelidonii DC. (= *Leschenaultii* DC. = *Schraderi* DC. = *Corynandra pulchella* Schrad. = *Cleome Chelidonii* L. = *C. Leschenaultii et Schraderi* Schult.).

icosandra Wight et Arn. (= *viscosa* β DC. = *Cleome epilobioides* Jan, = *C. icosandra* L.), zwanzigfädige, ☉. m. w. Ostindien, China.

Auch die übrig. p. 640 verzeichneten sind ☉. nicht 4.

Polemonium T., Sperrkraut.

capitatum Eschsch. (= *coeruleum* var. Lindl. = *Richardsonii* Grah., Hook. = *speciosum* Fisch.), kopfförmiges, 4. f. Nördlichstes Asien u. Amerika.

grandiflorum Benth., grofsblumiges, 4. k. f. b. Mexico.

mexicanum Cervant. (= *muricatum* Schrk. et Hortul.).

micranthum Benth., kleinblumiges, 4. f. Nordw. Amerika.

pulchellum Bunge, schönes, 4. f. Altaisches Sibirien.

pulcherrimum Hook. (= *humile* Lindl., non ? Pall., W.).

sibiricum G. Don, Sweet, (= *dissectum* Rchb. = *lacteum* Lehm.), b) coeruleum.

villosum Georgi. (= *humile* R. et S. = ? *lanatum* Pall.).

Zweifelhafte Arten: acutifolium W., Nordwestl. Amerika, humile Pall., W., Ostsibirien.

bursifolium W. = Eutoca bursifolia Spgl. (wird kaum kultivirt), *ciliatum* W., *dubium* L., *pimpinelloides* W., R. et S. (= *achilleaefolium* W.), v. Cosmanthus fimbriatus etc., p. 222, mexicanus, parviflorus, p. 163, ll., *rubrum* L., v. Gilia coronopifolia, p. 262, ll.

Polianthes Tuberose.

maculata Mart., gefleckte, 4. Zw. t. Mexico.

mexicana Zuccar., mexicanische, 4. Zw. t. Mexico.

Digitized by Google

Polianthes
tuberosa L., b) foliis luteo-marginatis.
Polium Mill., *album* Mill., *angustifolium* Mill., *aureum* Mch., *capitatum* Mill. etc., v. Teucrium Polium, flavescens, aureum, capitatum etc., p. 903.
Pollichia africana Medic., *indica* Medic., v. Trichodesma africanum, indicum, p. 817.

Polyactidium DC., Vielstrahlchen.
delphinifolium DC. (= *Diplopappus delphinifolius* Cass. = *Erigeron delphinifolium* W. = *Polyactis delphinifolia* Less. = *Stenactis delphinifolia* Cass.).
Sprengelii DC. (= *Erigeron dubius* Spgl. = *E. resinosus* Spgl. = *Polyactis Sprengelii* Schltdl.), Sprengel's, ⊙. f. m. Brasilien.
Polyactium DC., *multiradiatum* DC., v. Pelargonium Sect. p. 691 et p. 485, II., *daucifolium* Eckl., Zeyh., *filipendulifolium* Eckl., Zeyh., *flavum* Eckl., Zeyh., *fulgidum* Eckl., Zeyh., *gibbosum* Eckl., Zeyh., *lobatum* Eckl., Zeyh., *triste* Eckl., Zeyh., v. Pelargonium daucifolium, filipendulifolium, flavum etc.
Polyarrhena reflexa Cass., v. Felicia reflexa DC., Aster Sect. VIII. p. 99.

Polybotrya H. B. K., Vieltraubenfarrn.
incisa Lk. (= *Acrostichum incisum* Endl.), eingeschnittener, 4. w. Brasilien.
pubens Mart., feinhaariger, 4. w. Südamerika (am Amazonenflufs).
trapezoides Kunze, trapezenförmiger, 4. w. ? Südamerika.
cervina Kaulf., *Raddiana* Kaulf., L., v. Olfersia cervina et corcovadensis, p. 447.

Polycarena Benth., Polycarena, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.
aurea Benth. (= *Manulea aethiopica* Thbg., p. 495, = *Buchnera aethiopica* L. = *Chaenostoma asthiopicum* Benth., p. 134, II.), goldfarbige, ♂. ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
capensis Benth. (= *Buchnera capensis* L. = *Chaenostoma villosum* G. Don, = *Manulea capensis* Thbg. p. 495, = *M. villosa* P.).

Polycarpaea Lam., Vielsaamler.
aristata Chr. Sm. (= *Illecebrum aristatum* Ait. = *Lahaya aristata* R. et S. = *Mollia aristata* Ait.).
brasiliensis Cambess., brasilianischer, 4. w. Brasilien.
corymbosa Lam. (= *indica* Lam. = *Achyranthes corymbosa* L. = *Celosia corymbosa* Roxb. = *Lahaya corymbosa* R. et S.), doldentraubiger, ⊙. ♂. w. Ostindien.
depressa DC. (= *Hapalosia Löfflingiae* Wight et Arn. = *Löfflingia indica* Retz, = *Pharnaceum depressum* L. = *Polycarpum pusillum* Roxb.), niedergedrückter, ⊙. m. f. Ostindien.
gnaphalodes Poir. (= *microphylla* Cav. = *Hagea gnaphalodes* P. = *Illecebrum gnaphalodes* Schousb. = *Lahaya gnaphalodes* Schult. = *Mollia gnaphalodes* Spgl.), ruhrkrautähnlicher, 4. ♄. k. Nordafrica, Canarische Inseln.
latifolia Poir. (= *Lahaya latifolia* Schult. = *Mollia latifolia* W.), breitblätteriger, ⊙. f. Teneriffa.
prostrata Decaisn. (= *Alsine media prostrata* P. = *A. prostrata* Forsk. = *Arenaria prostrata* Sering. = *Spergula prostrata* Dietr.), gestreckter, 4. k. f. Aegypten.

Digitized by Google

Polycarpaea
stellata DC. (= *Achyranthes stellata* W. = *Lahaya stellata* Schult. = *Mollia stellata* W.).
Teneriffae Lam. (= *divaricata* Poir. = *Hagea Teneriffae* P. = *Illecebrum divaricatum* Ait. = *Lahaya diffusa* Schult. = *Mollia diffusa* W. Hort. Berol.) ⊙.
tenuifolia DC. (= *stellata* DC. var. Spgl. = *Achyranthes tenuifolia* W. = *Lahaya tenuifolia* Schult. = *Mollia tenuifolia* W.), dünnblätteriger, ♄. w. Guinea.
alsinefolia * et *Bivoniana* * v. Polycarpon alsinefolium et peploides.

Polycarpon Loeffl., Wirtelkraut.
alsinefolium DC. (= *Hagea alsinefolia* Bivone, = *Holosteum tetraphyllum* Thbg. = ? *Illecebrum alsinefolium* L. = *Lahaya alsinefolia* Schult. = *Mollia alsinefolia* Schult.), mierenblätteriges, ⊙. f. Südeuropa, Cap d. g. Hoffn., Neuholland.
peploides DC. (= *Arenaria peploides* Lapeyr., non L. *Hagea polycarpoides* Bivon. = *Mollia Polycarpon* Spgl.), wasserportulakähnliches, ⊙. 4. f. Italien, Frankr.
tetraphyllum L. fil. (= *Alsine Polycarpon* Crantz, = *Mollugo quadrifolia* Mill. = *M. tetraphylla* L.).
β) diphyllum Cav., *γ*) caspium C. A. Mey.

Polycenia Choisy, Polycenie, XIV. 11., Globulariaceae.
cordata E. Mey. (= *Hebenstreitia cordata* L.), herzförmige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
hebenstreitiodes Choisy, (= *Hebenstreitia tenuifolia* plur. auct., non Schrad.), Hebenstreitiaähnliche, ⊙. m. f. Südafrika.
Polycephalus suaveolens Forsk., v. Sphaeranthus indicus, p. 777.

Polycnemum L., Knorpelkraut.
Heuffelii Lang, Heuffel's, ⊙. f. Ungarn.
brachiatum MB., *crassifolium* Pall. (= *alternifolium* Pall. = *oppositifolium* MB.), *glaucum* Pall. etc., v. Halimocnemis brachiata, crassifolia, glauca etc., p. 282, II.

Polygala T., L., Kreuzblume.
amara L., *β*) alpina Poir., *γ*) decipiens Bess. (= *lithuanica* Gilib.).
amblyptera Rchb. (= *amara* Auct. = *buxifolia* Rchb. = *thuringiaca* Spgl.), thüringische, 4. ♄. f. Mitteldeutschland.
amoena Thbg. (= ? *asbestina* Burch.), liebliche, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
attenuata Nutt. (= *graminifolia* Poir.), verdünnte, 4. f. Carolina, Florida.
bracteolata L. (= *bracteata* Thbg.), *β*) pilifera Hffg.
calcarea Schultz, (= *amblyptera* Schultz, = *vulgaris ε buxifolia* Schultz), kalkliebende, 4. ♄. f. Mittel- und Westdeutschland, Lothringen.
comosa Schk., b) fl. coeruleo.
cordifolia Thbg. (= *fruticosa* Berg. = *oppositifolia* W.).
Dalmaisiana Hort. belg., Dalmais's, ♄. t. k. ? Hybride.
depressa Wender, (= *badensis* Schimp. = *paludosa* Bönningh. = *serpyllacea et serpyllifolia* Weihe).
Ecklóniana Lehm., Ecklon's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
exilis DC. (= *linearis* Lagasca, = *nova* Boiss. = *parviflora* Loisel.), kleinste, ⊙. f. Spanien, Frankreich.
filifolia Mackay, fadenblätterige, ♄. t. k. Cap d. g. H.

Digitized by Google

Polygala

ligularis Ker, (= *graminea* Hort. = *Linkiana* Sweet, = *tenuifolia* Lk.).

microphylla L. (= ? *juniperina* Cav.), kleinblätterige, ♄. k. Portugal.

mutabilis Dumort., veränderliche, 4. ♄. f. Belgien.

paucifolia Mühlbg. (= *commutata* Sweet, = *purpurea* Ait., non Nutt. = *Trichosperma grandiflora* Rafin.).

rosea Dsf. (= *nicaeensis* Risso), rosafarbige, 4. ♄. f. b. k. Nordafrika, Italien.

saxatilis Dsf. (= *rupestris* Pourr.), Gesteins-K., ♄. f. b. k. Frankreich, Spanien, Nordafrika.

tetragona Burch. (= *attenuata* Nutt. = *oppositifolia* β *major* Lindl.).

Zeyheri Spgl., Zeyher's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

uva ursi Hort., v. Hallia imbricata, *villosa* Hort. = ?

Hinsichtlich der übrigen vergl. Mundia et Muraltia, p. 533 et p. 422, II.

Polygonastrum Mch., *compressum* Mch., *racemosum* Mch., v. Ophiopogon japonicus et Smilacina racemosa.

Polygonatum T., Weifswurz.

japonicum Morren et Decaisne, (= *Convallaria compressa* Steud. = *C. Polygonatum* Thbg., non L.), japanische, 4. Kn. f. Japan.

latifolium Dsf. (= *Convallaria latifolia* Jacq.).

β) tauricum H. Vindob.

macrophyllum Sweet, (= *latifolium* Pursh, non Dsf. = *Convallaria Polygonatum* Mühlbg. = *C. latifolia* Bot. amer. = *C. commutata* Schult.).

sibiricum Red. (= *Convallaria sibirica* Ker), sibirische, 4. Kn. f. Sibirien.

Thunbergii Morren et Decais. (= *Convallaria multiflora* Thbg., non L. = *C. Thunbergii* Steud.), Thunberg's, 4. Kn. f. Japan.

vulgare Dsf. (= *anceps* Mch. = *officinale* All. = *uniflorum* St. Hil. = *Convallaria Polygonatum* L.).

d) ? obtusifolium Weinm.

Polygonum T., Knöterig.

acidulum W. (= ? *crispum* W. = *divaricatum* β Meisn.).

acutatum Lehm. (= *cymosum* Trevir., non Dsf.), wenigspitziger, ⊙. f. Ostindien.

alpestre C. A. Mey., Voralpen-K., 4. f. Caucasus, Soongaria.

β) rupestre Karel. et Kiril.

alpinum All. (= *divaricatum* Vill.), β) undulatum Murr. (= *acidum* Pall. = *ciliatum* W. herb.).

arenarium W. K., β) giganteum Fisch.

argyrocoleon Steud., silberscheidiger, ⊙. f. Mosul.

Bellardi All. (= *centinodium* γ Lam. = *geniculatum* Poir. = *patulum* MB. = *spectabile* Lehm.).

capitatum D. Don, kopfförmiger, 4. k. Nepal.

crassifolium Murray, (= *hastatum* Murray, = *rumicifolium* Pall. = *sibiricum* Laxm., non L.), dickblätteriger, 4. f. Sibirien.

cymosum Dsf. (non Trevir.), afterdoldiger, 4. f. ?

decipiens RBr., täuschender, 4. k. Neuholland.

dubium A. Braun, (= *Braunii* Bluff et Fingerh. = ? *Hydropiper* L. var.), zweifelhafter, ⊙. f. Deutschland, Belgien.

Digitized by Google

Polygonum

dumetorum L. (= *Bilderdykia dumetora* Dumort. = *Fagopyrum dumetorum* Schreb. = *F. membranaceum* Mch.), Hecken-K., ⊙. Sch. 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) scandens L.

Hamiltonii Spgl. (= *Donii* Meisn., non Spgl. = *hispidum* Don, Hamilt.), Hamilton's, ⊙. f. Nepal.

Hydropiper L. (= *acre* Lam. = *glandulosum* Poir. = *hydropiperoides* Pursh, = *punctatum* Ell.). Europa, Asien, Nordamerika.

interruptum Bunge, unterbrochener, ⊙. f. Nordchina.

jucundum Meisn., lieblicher, ⊙. f. China.

Kitaibelianum Sadler, Kitaibel's, ⊙. f. Ungarn.

lapathifolium L. (= *pallens* P. = *pallidum* Wither. = *pensylvanicum* Curt. = *Persicaria* L. *γ* Meisn. = *scabrum* Mch. = *vernum* Rafin.).

Laxmanni Lepech. (= *davuricum* W. = *ramosum* Fisch., Hornem.).

maritimum L. (= *glaucum* Nutt.), *β*) flagellare Bertol. (= *litorale* Lk. = *romanum* Jacq., Guss.).

Meyeri Steud. (= *P. Paronychia* C. A. Mey., non Cham., Schltdl.), Meyer's, 4. f. Caucasus.

mexicanum Schltdl., mexicanischer, ⊙. f. Mexico.

muricatum Meisn., weichstacheliger, ⊙. f. Nepal.

nepalense Meisn., nepalscher, ⊙. f. Nepal, Abyssinien.

nodosum P. (= *turgidum* Thuill.), b) lapathifolio-nodosum Rchb.

ochreatum L. (= *divaricatum γ* Meisn.).

oxyspermum Meyer et Bunge, spitzsaamiger, ⊙. f. Sibirien.

Paronychia Cham., Schltdl., nagelkrautähnlicher, 4. ♄. f. Neucalifornien.

pulchrum Blume, schöner, ⊙. m. f. Java.

Robertii Req. Loisel., Robert's, ?⊙. 4. f. Frankreich.

strictum Ledeb. (non All.), steifer, ⊙. f. Alt. Sibirien.

tenue Mchx. (= *filiforme* Barton, = *linifolium* Mühlbg.), dünner, ⊙. f. Nordamerika.

adpressum LaBill., *complexum* A. Cunningh., Endl., v. Sarcogonum adpressum et complexum.

Polymnia L., Polymnie.

aspera Mart. (= *scabra* Zuccar.).

glabrata DC., kahle, 4. k. Chili.

maculata Cav. (= *Uvedalia* Hort. Par., non L.).

Uvedalia L. (= *Wedelia* Mill., non L.).

Unbestimmtere: dentata Mch., variabilis Poir. (= ?*Polymniastrum urticaefolium* Cass.).

carnosa L. fil., *spinosa* L. fil., v. Didelta carnosum et spinosum, *calendulacea* Poir. (= *benghalensis* Poir.), v. Wedelia calendulacea, *perfoliata* Poir. (= *revoluta* Auct.), v. Melampodium perfoliatum, p. 505, *Tetragonotheca* P., v. Tetragonotheca helianthoides, p. 802.

Polyotus longifolius G. Don, v. Gomphocarpus longifolius.

Polypappus Less., Vielfederchen, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

parviflorus DC., kleinblumiges, ⊙. ♄. k. Mexico.

triplinervis Less, (= *Ascaricida triplinervis* G. Don, = *Vernonia triplinervia* Spgl., p. 841).

Polypara cochinchinensis Lour., v. Houttuynia cordata.

Digitized by Google

Polypodium T., L., Tüpfelfarrn (Engelsüfs).

I. Anaxeton Schott.

crassifolium L. (Schott), (= *Phymatodes crassifolia* Presl).

II. Campyloneuron Presl, Lk.

brevifolium Lk., kurzblätteriger, 4. w. ?

caespitosum Lk., rasenartiger, 4. w. ?

decurrens Raddi, (Presl, Lk.), herablaufender, 4. w. Brasilien.

nitidum Kaulf. (= *Phyllitidis* H. Berol.).

Phyllitidis L. (Presl).

III. Chrysopteris Lk. (= *Phlebodium* RBr.).

aureum L. (Lk.), (= *Pleopeltis aurea* Presl).

Billardieri RBr. (Lk.).

longipes Lk. (= *alternifolium* Lk. Hort. (non W.) = *grossum* Langsd. et Fisch.), langstieliger, 4. w. Ostindien.

peltideum Lk., scheibenförmiger, 4. w. ?

Phymatodes L. (Lk.), (= *pleopeltifolium* Hort. Angl.).

pulvinatum Lk. (= *decumanum* H. Berol.), bestaubter, 4. w. Brasilien.

pustulatum Forst.

scandens Forst. (= *lepidopodum* Lk.), klimmender, 4. w. Südseeinseln.

sporodocarpum W. (Lk.), (= *areolatum* W.), gehäufelter, 4. w. Mexico.

terminale Lk., entständiger, 4. w. ?

IV. Craspedaria Lk., Kunze.

Sect. a. Craspedaria Lk.

ciliatum W. (Lk.), (= *cajenense* Desv.), gewimperter, 4. w. Brasilien, Guiana.

squamulosum Kaulf. (= *myrtillifolium* H. Angl.), feinschuppiger, 4. w. Südamerika.

vaccinifolium Langsd. et Fisch. (Lk.).

Sect. b. Niphobolus Auct. v. p. 548 et p. 437, II.

V. Drynaria Presl.

quercifolium L.

VI. Dictyopteris Kunze.

attenuatum W.

VII. Goniopteris Presl, Lk.

asplenioides Sw. (Presl), (= *compositum* Lk. Hort.), strichfarrnähnlicher, 4. w. Jamaica, Brasilien.

crenatum Sw. (Presl).

fraxinifolium Jacq. (Presl), (= *proliferum* H. Berol.).

β) polystichum Lk.

proliferum Kaulf. (= *diversifolium* Sw., non RBr. = *viviparum* Raddi).

VIII. Marginaria Lk.

dimorphum Lk., veränderlicher, 4. w. Mexico, ? Brasil.

β) angustifolium Lk. (= *ensifolium* ? W., Presl).

IX. Microsorium Lk.

irioides Lam., Poir. (= *M. irregulare* Lk.).

X. Pleopeltis Presl.

Brownianum Spgl. (= *attenuatum* RBr.).

lycopodioides L. (Presl).

iteophyllum Lk., weidenblätteriger, 4. w. ?

macrocarpum Bory, (Kaulf., Lodd.), grofsfrüchtiger, 4. w. Mascarenas.

percussum Cav. (Hook. et Grev.), langspitziger, 4. w. Brasilien, Surinam.

Digitized by Google

Polypodium

XI. Eupolypodium. Endl. et Goniophlebium Presl et Phegopteris Presl etc.

cambricum Desv., cambrischer, 4. f. k. England.
var. b. crispum, s. inciso-pinnatifidum (= *cambricum* L.).

concinnum W., netter, 4. w. Caracas, Chili.

decursive-pinnatum v. Hall, herablaufend-gefiederter, 4. w. t. China.

divergens W. (= *multifidum* Jacq.), divergirender, 4. w. Caracas.

grandidens Kunze, (= *attenuatum* Hort. Bonn., non Br.), grofszähniger, 4. w. ? Ostindien.

harpeodes Lk. (= *Marginaria harpeodes* Presl), sichelförmiger, 4. w. Brasilien.

inaequale Lk., ungleicher, 4. w. Brasilien.

laetum Raddi, freudiggrüner, 4. w. Brasilien.

loricatum L. (= *loriceum* Hort.), riemenförmiger, 4. w. Westindien.

maenurum Lk., geschweifter, 4. w. Brasilien.

meniscifolium Langsd. et Fisch. (non Lk.), (= *affine* Hort Angl. = *albopunctatum* Raddi), mondfarrnblätteriger, 4. w. Brasillen.

molliculum Kunze, weicher, 4. w. ?

Moritzianum Lk., Moritz's, 4. w. Caracas.

Otites L. (= *pectinatum* H. Anglor.).

Preslianum Spgl. (= *meniscifolium* Lk., non Lgsdf. et Fisch. = *longifolium* Presl, = *Marginaria meniscifolia* Presl), Presl's, 4. w. Brasilien (Insel St. Catharina).

pycnosorum Lk. (= *attenuatum* W. excl. Syn. = *juglandifolium* Auct.), ballfrüchtiger, 4. w. Südamerika.

ramosum Hort. Angl., ästiger, 4. w. ?

subtetragonum Lk. (= *tetragonum* Schk.), wenigvierseitiger, 4. w. Brasilien.

tetragonum Sw. (= *Aspidium cicutarium* H. Angl.).

uliginosum Kunze, (= *paludosum* H. Bonn.), Sumpfliebender, 4. w. ?

vacillans Lk. (= *repandulum* Kaulf.), schwankender, 4. w. Brasilien.

Zu dieser Abtheilung gehören unter andern: P. alpestre Hoppe, calcareum Sm., Catharinae Langsd. et Fisch., Dryopteris L., effusum Sw., hexagonopterum Michx., Sw., juglandifolium Humb., latipes Langsd. et Fisch., Paradiseae Langsd. et Fisch., pectinatum L., Phegopteris L., virginianum L., vulgare L., welche pag. 644—646 verzeichnet sind. Die übrigen daselbst aufgeführten Arten sind gröfstentheils hier unter die Sectionen, wohin sie gehören, gestellt und die neueren beigefügt worden, mit Ausnahme einiger, deren genauere systematische Vertheilung unter die Sectionen dem Verfasser unbekannt war; so auch z. B. von P. affine Forst., glaucum H. Angl., grandifolium Hort., LaBillardieri, pennigerum etc., welche ebenfalls in den Verzeichnissen der Handelsgärten vorkommen.

alsophilum Hort. Berol., v. Alsophila paleolata, p. 27, II., *Baranetz* Auct. et Hort. Angl., v. Cibotium glaucescens, p. 143, II., *falcatum* Thbg. (= *japonicum* Houtt.), v. Cyrtomium falcatum, Aspidium Sect. VI. p. 50, II.

Digitized by Google

Polypogon Dsf., Vielborstengras.

interruptus H. B. K., unterbrochenes, ⊙. f. Südamerika.

litoralis Sm. (= *elongatus* Lagasca, = *Lagascae* R. et S. = *Agrostis litoralis* Wither. = *A. lutosa* Poir. = *Vilfa lutosa* P. B.).

maritimus W. (= *pumilus* Clarke, = *spathaceus* Req. = *tataricus* Fisch. = *Alopecurus paniceus* L. = *A. maritimus* Poir. = *Phleum crinitum* Roxb.).

mexicanus Lk., mexicanisches, ⊙. f. Mexico.

monspeliensis L. (= *crinitus* Nutt. = *paniceus* Lagasca, = *Agrostis alopecuroides* Lam. = *A. crinita* Auct. = *A. panicea* Ait. = *A. triaristata* Knapp, = *Alopecurus aristatus* Huds. = *A. monspeliensis* L. = *A. paludosus* Crtz. = *Cynosurus paniceus* L. = *Panicum vagum* Scop. = *Phalaris aristata* Gouan, = *Ph. aristata* Forsk. = *Phleum crinitum* Schreb. = *Phl. monspeliense* Koel. = *Santia plumosa* Savi, = *Vilfa alopecuroides* P. B.).

glomeratus W. (= *setosus* Spgl.), *sericeus* Spgl., v. Mühlenbergia glomerata et capillaris, p. 533, *vaginatus* W., v. Alopecurus angustifolius, p. 37. *Polypteris integrifolia* Nutt., v. Palafoxia fastigiata, p. 472, II.

Polyspora axillaris Sweet, *nepalensis* Hort., v. Gordonia axillaris et nepalensis, p. 272, II.

Polystachya Hook., Vielährenstendel.

affinis Lindl, ähnelnder, 4. w. Sierra Leone.

bracteosa Lindl., deckblätteriger, 4. w. Sierra Leone.

fusiformis Lindl. (= *Dendrobium fusiforme* Pet. Th.), spindelförmiger, 4. w. Mascarenas.

luteola Hook. (= *mauritiana* Spgl. = *Cranichis luteola* Sw. = *Dendrobium polystachyum* Sw. = *Epidendrum minutum* Aubl.), *β*) zeylanica Lindl. (= *Dendrobium polystachyum* Pet. Th.).

In van Houttes Etablissement horticole wird noch eine P. cerea aufgeführt, vielleicht auch in Sierra Leone heimisch.

Polystichum Lk., Schott, *acrostichoides* Lk., *aculeatum* Schott, *angulare* Presl, *lobatum* Presl, *Lonchites* Schott, *pungens* Presl etc., v. Aspidium Sect. V. p. 49, *gymnogrammoides* Gaudich., v. Gymnogramme polypodioides, p. 278, II.

Polytaxis Bunge, Polytaxis, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ⊙. f. Asiatisch. Rufsland (Kisilkum).

Polyxena Kunth, (Tochter der Hecuba), VI. 1, Coronariae-Asphodeleae.

pygmaea Kunth, (= *Maublia ensifolia* Thbg. = *Agapanthus ensifolius* W. spec. = *Massonia violacea* Andr. = *M. ensifolia* Ker, p. 498, = *M. ovalis* Drege, = *Hyacinthus bifolius* Boutelow), zwergige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

Pomaderris LaBill. (= *Pomatoderris* Hffmg.), Wersenstrauch, V. 1., Rhamneae.

apetala LaBill., *β*) aspera Sieber, (= *scabra* Hort.).

discolor Vent. (= *acuminata* Lk. = *andromedaefolia* Cunningh.).

elliptica LaBill. (= *Kumerahe* Cunningh.).

β) phillyraeoides Sieber, *γ*) intermedia Sieber.

Digitized by Google

Pomaderris
ericifolia Hook., heideblätteriger, ♄. t. k. Neuholland.
ferruginea Sieber, (= *lanigera* β DC. = *viridiculfa* Sieb.), rostfarbiger, ♄. t. k. Neuholland.
Hügelii Hort. Vindob. ? Fenzl, Hügel's, ♄. t. k. Neuholl.
lanigera Auct. (non Sims), (= *obscura* Sieber, = *Ceanothus laniger* Andr.).
ligustrina Sieber, ligusterähnlicher, ♄. t. k. Neuholland.
malifolia Sieber, (= *discolor* Sieber, = *elliptica* Sims, = *multiflora* Fenzl), apfelblätteriger, ♄. t. k. Neuh.
myrtilloides Fenzl, heidelbeerähnlicher, ♄. t. k. Neuholl.
obcordata Fenzl, verkehrtherzförmiger, ♄. t. k. Neuholl.
obovata Hook., verkehrteiförmiger, ♄. t. k. Neuholland.
parvifolia Hook., kleinblätteriger, ♄. t. k. Neuholland.
phillyraeefolia Fenzl, steinlindenblätteriger, ♄. t. k. Neuh.
prunifolia Cunn., pflaumenblätteriger, ♄. t. k. Neuholl.
racemosa Hook., traubiger, ♄. t. k. Neuholland.
Simsii Sweet, (= *lanigera* Sims), Sims's, ♄. t. k. Neuh.
villosa Hort. belg., zottiger, ♄. t. Neuholland.
Wendlandiana Sweet, (= *Ceanothus microphyllus* Wendl. = *C. Wendlandianus* R. et S. = *Trymalium Wendlandianum* G. Don).
capsularis G. Don, v. Colubrina asiatica, *globulosa* Brogn., Don, *spathulata* G. Don, v. Trymalium globulosum et Billardieri.

Pomax Soland., Pomax, IV. 1., Rubiaceae.
umbellata Soland. (= *hirta* DC. = *Operculatia Banksiana* Schult. = *O. umbellata* G., p. 562), doldige, ♄. k. t. Neuholland.
Pometia pinnata Forst., *ternata* Forst., v. Schmiedelia pinnata et S. Cobbe.

Pongamia Lam., Vent., Pongamie.
chinensis DC. (= *Robinia mitis* Lour.), chinesische, ♄. w. China.
rosea Grah, rosafarbige, ♄. w. Ostindien.
triphylla Wight, (= *Galedupa uliginosa* Roxb. = *Dalbergia heterophylla* W.), dreiblätterige, ♄. w. Ostindien.
uliginosa DC. (= *religiosa* Wight).

Pontania Lemaire, (Jerome Pontanus, lebte im 15ten Jahrhundert u. war Lehrer König Alphons von Neapel, hat ein latein. Gedicht über die Pflanzen verfaßt), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.
Celsiana Lemaire, (= *Brachysema platypterum* Hort. anglor. et belg.), Cels's, ♄. Sch. t. Neuholland.

Pontederia L., Pontederie.
paradoxa Mart., wunderbare, 4. w. Brasilien.
rotundifolia L., rundblätterige, 4. w. Surinam.
azurea Sw., *crassipes* Mart. (= *azurea* Hook.), v. Eichhornia azurea et speciosa, p. 217, II., *dilatata* Buchan., *hastata* L., *vaginalis* Burm., v. Monochoria dilatata, hastaefolia et vaginalis, p. 415, II.
Populago Scop., *palustris* Mch., v. Caltha palustris.

Populus T., Pappel.
alba L., β) major Mill. (= *anglica* Hort.), γ) nivea Lodd.
angulata Ait., c) Boothii Hort. (= ? *Medusae* Booth).
australis Tenore, (= ? *tremula major* Duham.), südliche, ♄. f. Süditalien.
benzoifera Tausch, (= *graeca* W., non Ait. = ? *tremuloides* Mchx. = ? *villosa* Lang), benzointragende, ♄. fr. ?
β) pendula Hort. (= *sibirica* Hort.).

Digitized by Google

Populus

dilatata Ait., β) pannonica Jacq. fil.

diversifolia Schrenk, verschiedenblätterige, ♄. f. Asiatisches Rufsland.

euphratica Decaisne, euphratische, ♄. f. Syrien.

graeca Ait. (= *atheniensis* Hort.).

laurifolia Ledeb. (= *balsamifera* Pall.), lorbeerblätterige, ♄. f. Altaisches Sibirien.

longifolia Fisch. (= *salicifolia* Hort. = *viminalis* Lodd. = *balsamifera* var. Auct.), langblätterige, ♄. f. ?

lobata Fisch., gelappte, ♄. f. ?

monilifera Ait. (= *aciadesca* Lindl. = *canadensis* Burgsdorf, = *carolinensis* Mch. = *glandulosa* Mch. = *marylandica* Bosc, = *virginiana* Dsf.).

nigra L., d) serotina Endl.

pseudo-balsamifera Fischer, unächte Balsam-P., ♄. f. ?

rubra Poir. (= *dilatata* Ait. var.?), rothe, ♄. f. Südeuropa.

suaveolens Fisch. (= *balsamifera* Pall. pro parte, = *balsamifera intermedia et suaveolens* Laud.), gutriechende, ♄. f. Oestl. transbaical. Sibirien.

tristis Fisch. (= *candicans* Hort.), traurige, ♄. f. Sitcha.

viminea Dsf. (= *canadensis* Fouger.), ruthenförmige, ♄. f. Nordamerika.

Porana Burm., Porana [1]).

paniculata Roxb. (= *tomentosa* Leschen. = *Dinetus paniculatus* Sweet), rispige, ♄. Sch. w. Ostindien.

racemosa Roxb. (= *cordifolia* Ledeb. = *dichotoma* Hamilt. = *Dinetus racemosus* Sweet), traubige, ☉. Sch. w. f. Ostindien, Nepal.

volubilis Burm., p. 648.

Porcellites apargioides Less., *cretensis* Cass., *maculata* Cass., v. Achyrophorus apargioides, oxydontus et maculatus, p. 7, 11. *P. radicata* Cass., v. Hypochaeris radicata, p. 411.

Porophyllum Vaill., Porenblatt.

coloratum DC. (= *Kleinia colorata* H. B. K. = *K. ruderalis* Jacq. var. Spgl.), farbiges, ☉. f. Mexico.

decumbens DC. (= *Kleinia linearis* Dsf. Hort. Par. = *K. suffruticosa* Lodd., non W.), niederliegendes, 4. ♄. k. Mexico.

ellipticum Cass. (= *Cacalia Porophyllum* L. = *Kleinia Porophyllum* W.), elliptisches, ☉. m. f. Peru, Brasilien.

linifolium DC. (= *suffruticosum* Cass. = *Cacalia Linaria β pumila* Poir. = *C. linifolia* L. = *Kleinia suffruticosa* W.), gleichbreitblätteriges, ♄. t. Südam.

ruderale Cass. (= *Cacalia ruderalis* Sw. = *Kleinia ruderalis* Jacq.), schuttliebendes, ☉. m. f. Westindien.

tagetoides DC. (= *Kleinia ruderalis* Jacq. var. Spgl. = *K. tagetoides* H. B. K.), sammetblumenähnliches, ☉. f. Mexico.

viridiflorum DC. (= *Kleinia viridiflora* H. B. K.), grünblumiges, ♄. k. Mexico.

Porphyra dichotoma Lour., v. Callicarpa purpurea, p. 147.

---

1) Da Dinetus Sweet von Porona Burm. nicht verschieden ist, so wurden die zu letzterer Gattung gehörigen früher davon getrennten Arten hier noch einmal aufgenommen.

Digitized by Google

Porrum Mill., *amethystinum* Tausch, *Ampeloprasum* Mill., *arenarium* Rchb., *ascalonicum* Rchb., *commune* Rchb. (= *sativum* Mill.), *crinitum* Rchb., *descendens* Rchb., *oleraceum* Mch., *Ophioscorodon* Rchb., *paniculatum* Mch., *rotundum* Rchb., *Scorodoprasum* Rchb., *sphaerocephalum* Rchb., *strictum* Rchb., v. Allium amethystinum, Ampeloprasum, arenarium, ascalonicum, Porrum etc., p. 29 etc. et p. 1911.

Portlandia grandiflora H. Batav. (non L.), v. Solandra nitida, p. 765.

Portula diffusa Mch., v. Peplis Portula.

Portulaca T., Portulak.

grandiflora Hook. (non Cambess.), (= *megalantha* Steud.).

marginata H. B. K., berandeter, ☉. m. f. Caracas.

oleracea L., *β*) sativa Haw. (= *latifolia* Hornem.).

pilosa L., *β*) setacea Haw.

pilosissima Hook., behaartester, ☉. m. f. Lima.

quadrifida L. (= *linifolia* Forsk. = *repens* Roxb. = *Illecebrum verticillatum* Burm. = *Meridiana quadrifida* Poir.).

rostellata Brignol., geschnäbelter, ☉. m. f. Brasilien.

Thellussonii Lindl. (= *grandiflora* Hook. var. *rutila* Lindl.), Thellusson's, ☉. 4. f. w. (Hybride von P. Gilliesii Hook. u. grandiflora Hook.).

b) splendens Lindl.

Unbestimmt: carminea Hortul.

Anacampseros L., *arachnoides* Haw., *filamentosa* Haw., *lanceolata* Haw., *rubens* Haw., v. Anacampseros rotundifolia, arachnoides, filamentosa etc., p. 51 et p. 34, II., *fruticosa* Thbg., v. Portulacaria afra, p. 649.

Posoqueria Aubl., Posoquerie.

revoluta N. E. (= *insignis* N. E. = *Solena revoluta* Dietr.), zurückgerollte, ♄. w. Brasilien.

fragrans Roxb., v. Griffithia fragrans, p. 275, II., *longispina* Roxb., *nutans* Roxb., v. Randia longispina et nutans.

Possira arborescens Aubl. (= *triphylla* Gmel.), *grandiflora* Poir., *pinnata* Poir., v. Schwartzia triphylla, grandiflora et pinnata, p. 794.

Potentilla L., Fingerkraut.

adpressa H. B. K., angedrücktes, 4. k. Südamerika.

agrimonoides MB. (= *Biebersteiniana* Tratt.).

altaica Bunge, altaisches, 4. f. Altai.

apennina Tenore, (= *Bocconi* Nestl.).

approximata Bunge, Ledeb., genähertes, 4. f. Altaisches Sibirien.

arguta Pursh, (= *confertiflora* Torrey, = *Geum agrimonoides* Pursh, = *Bootia sylvestris* Bigelow.).

astracanica Jacq. (= *alterniflora* Mchx. = *corymbosa* Mch. = *divaricata* DC. = *taurica* Auct.).

astragalifolia Bunge, Ledeb., tragantblätteriges, 4. f. Altaisches Sibirien.

bifurca L. (= *bifida* Pall. = *bifurcata* Poir.).

Bigelowiana Wender. (= *confertiflora* Torrey var.? = *Bootia Bigelowii* Hort.). Bigelow's, 4. f. Nordamer.

bithynica Hornem. (= *obscura* W. var. Rchb. = *viminea* Rchb.).

chinensis Sering., chinesisches, 4. f. b. China.

concinna Richards., nettes, 4. f. Nördlichst. Amerika.

Digitized by Google

Potentilla

dealbata Bunge, weifsblätteriges, 4. f. Altaisch. Sibirien.
desertorum Bunge, Wüsten-F., 4. f. Sibirien.
diversifolia Lehm. (= *glaucophylla* Lehm. = *campestris* Nutt. = *dissecta* Nutt.), verschiedenblätteriges, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).
Drummondii Lehm., Drummond's, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).
Ehrenbergiana Schltdl. Ehrenberg's, 4. k. Mexico.
exaltata Bunge, hohes, 4. f. Nordchina.
formosa D. Don, (= *nepalensis* Hook. = *colorata* Lehm.), b) Gardneriana Hort., c) Mayana Hort. (= *nemoraliformosa* Loud. = *tormentillo-formosa* Tongue), d) Tonguei Hort., e) Russeliana Hort. anglor.
fusca Schltdl., braunes, 4. k. Mexico.
gariepensis Eckl., garepinisches, 4. k. Cap d. g. Hffn.
gelida C. A. Mey., eisiges, 4. f. Caucasus.
glabra Lodd. (= *fruticosa alba* Burch.), glattes, ħ. f. Dahurien.
glauca Moris, blaugrünes, 4. f. Sardinien.
gracilis Dougl., β) flabelliformis Lehm.
Güntheri Pohl, (= *argentea* L. var. Auct. = *canescens* Hartm. = *intermedia* L. sec. K. = *Lindackeri* Tausch, = *sordida* Fr. = *subargentea* Krock. = *Weinmanni* Bot. Cabin. = *Wiemanniana* Günth. et Schum.).
hirta L. (= *pilosa* Vill.), β) rubens All. (= *pedata* W. Enum.), γ) angustifolia DC.
hybrida Wallr. (= *Fragariastro-alba* Schiede).
inamoena Fisch. et Mey., unliebliches, 4. f. Asiat. Rufsland.
inclinata Vill. (= *adscendens* W. K. = *intermedia* Schult., Whlbg. = *recta* Jacq.), β) canescens Bess. (= *assurgens* Vill. = *hirta* Hänke, = *hungarica* W. herb. = *ornithopoda* Tausch, = ? *parviflora* Gaud.).
insignis Royle, Lindl., ausgezeichnetes, 4. f. Himalaja, chinesische Tatarei.
intermedia L. (= *Baukini* Hort. = *geranioides* Schlchr. = *heptaphylla* Mill. = *Nestleriana* Tratt. = *variana* Mch. = *villosa* Hall. fil.).
laciniosa W. K. (= *cardiopetala* Bess. = *hirta* L. η *laciniosa* Nestl. = *recta* γ *laciniosa* K.).
laeta Rchb. (= *hirta* Visian.), freudiges, 4. f. Dalmatien.
Lagasceana Sering. (= *incisa* Lagasca), Lagasca's, 4. f. ?
lanuginosa Fisch., wolliges, 4. f. Caucasus.
leptopetala Lehm. (= *frigida* Schiede et Deppe, = *hyemalis* Cham., Schltdl.), schlankkroniges, 4. k. Mexico.
leucophylla Pall. (= *angustifolia* W. herb., Lehm. = *betonicaefolia* Poir. = *nivea macrophylla* Sering. = *nivea pallidior* Sw. = *nivea prostrata* Retz).
megalontodon Lehm. (= *collina* Hort.), dickzähniges, 4. f. ?
minima Hall. fil. (= *Brauneana* Hoppe, = *frigida* β P. = *verna* γ DC.).
Millegrana Dougl., tausendkörniges, 4. f. Nordamerika.
mixta Nolte, gemischtes, 4. f. Nord- u. Mitteldeutschland.
nemoralis Nestl. (= *procumbens* Sibth. = *sylvestris* Renault, = *Tormentilla reptans* L., p. 813), Hain-F., 4. f. Europa.
β) Neumayeriana Tratt., γ) ? tormentilloides Mayer, (= *galiciana* Schult.).

Digitized by Google

Potentilla

Neumanniana Rchb. (= *Neumanni* Opiz), Neumann's, 4. f. Mitteleuropa.
nivalis Torr., schneeliebendes, 4. f. Nordamerika.
norwegica L., β) monspeliensis L. (= *hirsuta* Mchx. = *Morisoni* DC.), γ) ruthenica W. (= *diffusa* W. E. = *viscurgina* Weihe).
obscura W. (= *crassa* Tausch etc.).
pedunculariș Don, langstieliges, 4. f. Nepal.
pensylvanica L., α) communis Torr. et Gr. (= *missourica* Hornem., Schrad.), β) strigosa Pursh, (= *pectinata* Fisch. = *absynthifolia* Dougl.), γ) argata Lehm. (non Pursh), δ) pulcherrima Lehm. (= *bipinnatifida* Dougl.), ε) Hippiana Lehm. (= *dealbata* Dougl. = *leucophylla* Torr.).
petiolulata Gaud. (= *caulescens* β Sering.).
rubricaulis Lehm., rothstengeliges, 4. f. Nordw. Amerika.
Sadleri Rchb., Sadler's, 4. f. Ungarn.
sibirica Patrin, sibirisches, 4. f. Sibirien.
soongarica Bunge, soongarisches, 4. f. Soongaria.
splendens Ram. (= *alba* β var. Ser. = *emarginata* Dsf. = *semidentata* Juss.).
strigosa Pall., Ledeb. (= *conferta* Bunge), striegliches, 4. f. Sibirien.
subpedata C. Koch, wenigfußförmiges, 4. f. Mingrelien.
supina L. (= *prostrata* Hook.).
tanacetifolia W., Schltdl., rainfarrnblätteriges, 4. f. Sibirien.
Tormentilla Schrk. (= *sylvestris* Neck. = *tetrapetala* Hall. fil. = *Tormentilla erecta* L., p. 813, = *T. officinalis* Crantz, = *T. tuberosa* Renault).
b) fl. pleno, β) T. alpina Vill.
ucranica Lodd., ukrainisches, 4. f. Ukraine.
Vahliana Lehm. (= *hirsuta* Vahl), Vahl's, 4. f. Grönland.
viscosa Donn, (= *dentata* Forsk. = *hispida* Nestl. = *longifolia* et *nudicaulis* W. herb. = *pensylvanica* Hornem. = *pubescens* Mch.).
Wrangeliana Fisch. et Lallem., Wrangel's, 4. f. Neucalifornien.

Hybriden und Varietäten:

atrebatensis, atrosanguinea Cravenii, atros. lutea, atros. marginata, atros. Oliveriana, atros. pedata Maund., audomarensis, aurantiaca, bicolor, Brismii, Demayana, ferruginea Paxt., Fintelmanni, heptaphylla, Hoodii, Hopwoodiana, hybrida formosa, iberica, leucochroa, Mackayana Sweet, MacNabiana H. angl., nigra, ornithopodioides Sweet, Oswaldiana, picta, quinquevulnera, Russeliana Sweet, sulphurea, Tormentillo-formosa Tong. (= *Tonguei* Hort. = *nemoralis-formosa* Hort.), Traveni, trifurcata Hffg. etc.

Poterium L., Becherblume.

hybridum L. (= *agrimonifolium* β DC. = *agrimonoides* L. Hort. Upsal. = *Pimpinella agrimonoides* G.).
mauritanicum Boiss., mauritanische, 4. f. Nordafrica, Südspanien.
Sanguisorba L. (= *Sanguisorba minor* Scopol.), β) glaucescens Rchb. (= *guestphalicum* Böningh. = *polygamum* Lejeun., non W. K.).
verrucosum Ldl., Ehrbg. (= *polygamum* Hort. Par., non W. K.), warzige, 4. f. b. Steiniges Arabien.

Digitized by Google

Primula

elatior Jacq., β) Columnae Tenore, γ) variabilis aurea Tratt.

Gartenvarietäten: Barnardiana Sweet, Fletcheri Sweet, Shadiana Sweet, tricolor Hort. (= *multicolor*), plena etc.

farinosa L. (= *scotica* Hook.), var. lilacina Sweet, nivea Sweet, violacea Sweet.

floribunda Wall. (= *obovata* Wall. = *Androsace obovata* Wall.), blüthenreiche, 4. t. Ostindien.

Flörkeana Schrad. (= *intermedia* Tratt. = *minima hybrida* Rchb.).

inflata Lehm. (= *venis* β Rchb.), β) macrocalyx Bunge, Ungarn, Caucasus, Sibirien.

mistassinica Mchx. (= *pusilla* Goldie, non Wall. = *farinosa* Nutt.).

Polliniana Moretti, (= ?*venusta* Hort.), Pollini's, 4. f. b. Oberitalien.

praenitens Ker, (= *sinensis* Lindl., Hort. = *sertulosa* Kicks. = *Auganthus sinensis* Lk. = *Oscaria chinensis* Lilja).

b) albiflora Sweet, c) fl. albo pleno, d) dentiflora Lindl., e) rosea Bot. mag., f) fimbriata alba, g) fimbriata rosea, h) fl. rubro pleno.

purpurea Royle, (= *atroviolacea* Jack.), purpurfarbige, 4. k. Nepal.

sibirica Jacq. (= *intrusa* Rchb. = *rotundifolia* Pall.), β) minor Hook. (= *finnmarchica* Jacq. = *norwegica* Retz, = *egallicensis* Lehm.).

villosa Jacq. (= *viscosa* All. = *hirsuta* Vill. = *pubescens* Jacq. = *latifolia* Lapeyr. = *ciliata* Schrk., Lehm. (non Moretti) = *decora* Curt. = *pedemontana* Thom. = *graveolens* Hegetschw. = *rhaetica* Gaud. = *alpina* Schlchr. = *helvetica* Don, = *alba* Hffg. = *nivalis* Hort., non Pall.). [1])

a) purpurea, b) rosea, c) carnea, d) alba.

β) glandulosa Duby.

Unbestimmtere: bicolor Rafin., exscapa Hort., maxima Hort., minuta Banks, ornata Banks.

Prinos L., Winterbeere.

atomarius Nutt. (= ?*coriaceus* Pursh).

canadensis Lodd., canadische, ħ. f. Canada.

integrifolius Ell. (= *ambiguus* Nutt., non Lam.), ganzblätterige, ħ. f. Nordamerika.

longifolius Dsf., langblätterige, ħ. f. Nordamerika.

prunifolius Dsf., pflaumenblätterige, ħ. f. Nordamerika.

Ungewifs: cassineides Hort.

Printzia Cass., Printzie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

Bergii Cass. (= *Aster chamaedryfolius* Lam. = *A. papposus* W. herb. = *A. polifolius* L. = *A. tomentosus* R. Mey. = *Conyza verrucosa* Heath. = *Inula cornua* Berg. = *I. coerulea* L. = *Leyssera polifolia* Thbg., p. 460), Bergius's, ħ. k. s. Cap d. g. Hoffn.

Prionitis Adans., *Falcaria* Dumort., v. *Falcaria* Rivini.

---

1) Werden von Duby in DeCandolle prodr. syst. nat. reg. veget. VIII. p. 38 als Synonyme von P. villosa, nicht einmal als Abarten derselben angesehen.

Digitized by Google

Prionium E. Mey., Palmensimse, VI. 1., Juncaceae.
Palmita E. Mey. (= *Acorus Palmita* Lichtst. = *Juncus serratus* Thbg.), capische, k. t. k. Cap d. g. H. (Ob kultivirt?)

Prionotes RBr., Sägestrauch, V. 1., Epacrideae.
cerinthoides RBr. (= *Epacris cerinthoides* LaBill.), wachsblumenähnlicher, ♄. t. Van Diemens Land.
secunda Spgl., v. Dracophyllum secundum.

Prismatocarpus L'Her., Prismakapsel.
crispus L'Her. (= *Campanula crispa* Banks, = *C. longirostris* Banks, = *C. plicata* P.), krausblätterige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Pritzelia Walpers, (Dr. G. Pritzel, Verfasser einer Monographie der Gattung Anemone), V. 11., Umbelliferae.
didiscoides Walpers, didiscusähnliche, ⊙. ♂. m. f. k. Neuholland (Schwanenfluss).
Pritzelia Schauer (non Walp.), v. Scholtzia.

Priva Adans., Priva.
mexicana P. (= *hispida* Juss. = *Blairia cordifolia* Mch. = *B. mexicana* G. = *Verbena mexicana* L. = *Zapania mexicana* Lam.).
Mitchelii Endl. (= *Phryma leptostachya* L.), Mitchell's, 4. f. Nordamerika.
Roxburghii Endl. (= *Streptium asperum* Roxb., p. 790, = *Tortula aspera* W.), Roxburgh's, 4. w. Ostindien.
Proboscidea Jussieui Schmidel, (= *cordifolia* Mch.), v. Martynia proboscidea, p. 498.

Prockia P. Br.. Prockia.
racemosa H. Lecchi, Colla, traubige, ♄. w. ?

Procris Commers., Procris.
fagifolia Poir. (= *hypocrypta* Commers. = *Böhmeria fagifolia* P. = *Elatostemma fagifolium* Gaudich.), buchenblätterige, ♄. w. Mascarenas.

Pronaya Hügel, Pronaya, p. 657.
elegans Hügel, (= *Campylanthera Fraseri* Hook. = *Spiranthera Fraseri* Hook.).
speciosa Endl. (= ? *Billardiera rosmarinifolia* DC.), prächtige, ♄. t. Neuholland.

Prosartes Don, Endl., Prosartes, VI. 1., Sarmentaceae (Asparagineae) Smilaceae.
lanuginosa Don, (= *Streptopus lanuginosus* Mchx., p. 790, = *Uvularia lanuginosa* P. Ker in bot. reg.).
Menziesii Don, Menzies's, 4. f. b. Nordwestl. Amerika.

Prosopis L., Harzhülse.
dulcis H. B. K. (= *inermis* Gill. = *Acacia laevigata* W.).
humilis Gill., niedrige, ♄. t. Bonaria.
juliflora DC. (= *Acacia falcata* Dsf. = *A. juliflora* W. = *Mimosa piliflora* Sw.).
Siliquastrum DC. (= *Acacia Siliquastrum* Lagasca), langschotige, ♄. t. Chili.
elephantina E. Mey. (= *elephantorrhiza* Spgl. = *Acacia elephantorrhiza* Burch.), v. Elephantorrhiza Burchellii, p. 218, II.

Prostanthera LaBill., Geneigtfaden.
aspalathoides Cunningh., witschenähnlicher, ♄. k. t. Neuh.
grandiflora Hort. belg., grofsblumiger, ♄. k. t. Neuholl.
nivea Cunningh., schneeweifser, ♄. k. t. Neuholland.
ocimoides Hort. Berol., basilicumähnlicher, ♄. k. t. Neuholland.

Digitized by Google

Prostanthera

retusa RBr., abgestutzter, ♄. k. t. Neuholland.

thymifolia Benth. (= *retusa* Sbr., non RBr.), thymianblätteriger, ♄. k. t. Neuholland.

Prostea pinnata Cambess., v. Schmidelia pinnata.

Protea L., Wunderfichte (Silberfichte).

acaulis Thbg. (= *glaucophylla* Salisb. = *nana* Lam., non Thbg. = *Leucadendron acaulon* L.).

acerosa RBr., β) virgata Andr.

amplexicaulis RBr. (= *repens* Andr. = *Erodendron amplexicaule* Salisb.).

auriculata Tausch, (= *grandiflora affinis* Eckl.), geöhrte, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

canaliculata Andr. (= *polygaloides* W.).

coccinea RBr. (= *rangiferina* Hort.).

cordata Thbg. (= *cordifolia* Sims).

formosa RBr. (= *coronata* Andr. = *Erodendron formosum* Salisb.).

fulva Tausch, gelbrothe, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

grandiflora Thbg. (= *cynaroides* β L. = *nitida* Mill.).

latifolia RBr. (= *radiata* Andr. = *spectabilis* Lichtenst. = *Erodendron eximium* Knight, Salisb.).

Lepidocarpon RBr. (= *cristata* Lam. = *Lepidocarpodendron* β L. = *speciosa* Thbg. = *Leucadendron Lepidocarpodendron* L.).

longiflora Lam. (= *cristata* Lam. var.? Poir. = *lacticolor* Salisb. = *ochroleuca* Sm. = *Erodendron bombycinum* Salisb.), β) Mundii Lk., Kl.

macrocephala Thbg., grofsköpfige, ♄. t. Cap d. g. H.

melaleuca RBr. (= *Lepidocarpon* Curt. = ? *marginata* Thbg. = *speciosa nigra* Andr.).

mellifera Thbg. (= *repens* L. mant. = ? *staticaefolia* Hort. = *Erodendron melliferum* Salisb.).

mucronifolia RBr. (= ? *mucronata* Hort. = *odoratissima* Mass.).

obovata Andr. (= *Serruriae species* RBr. ?), verkehrteiförmige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

patens RBr. (= *speciosa patens* Andr.).

rosacea L. (= *acutifolia* Salisb. = *nana* Thbg. = *Leucadendron nanum* Berg.), rosenförmige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Scolymus Thbg. (= *angustifolia* Salisb. = *scolymocephala* L.).

speciosa L. (= *barbata* Lam. = ? *coronata* Lam. = *grandiceps* Trattin. = *Lepidocarpodendron* β L. = *Erodendron magnificum* Salisb. = *Leucadendron Lepidocarpodendron* L. = *P. speciosa rubra* Hort.).

turbiniflora RBr. (= *caespitosa* Andr. = *Erodendron turbiniflorum* Salisb.).

Unbestimmtere: arborescens Hort., asplenifolia Hort., brassicaefolia Hort., carinata Hort., carnosa Hort., cerifera Hort., concolor Hort., declinata Hort., densa Ait., dioica Hort., ericoides Hort., glauca Hort., glutinosa Hort., graminea Hort., grandis Hort., hirtella Hort., humifusa Hort., incana Hort., lanceolata Hort., leucantha Hort., micrantha Hort., mollis Hort., mollissima Hort., multifida Hort., Passerina Dsf., pinastrifolia Hort. (= ? *Pinaster* Hort.), pinnata Cav., radula Hort. (= *radulifolia* Don), reflexa Hort., retroflexa Dietr., setacea Hort., spiralis Hort., statice-

Digitized by Google

Protea
folia Hort., subacaulis Hort., tenella Hort., tenera Hort., tridentata Hort., viscosa Hort.
alba Thbg. (= *cinerea* Ait.), *arcuata* Lam. (= *plumosa* Ait. = *obliqua* Thbg. = *parviflora* L.), *ciliaris* Voigt, (= *ciliata* Hort.), v. Leucadendron cinereum, marginatum et plumosum, *argentiflora* Andr. (= *triternata* Thbg.), v. Serruria triternata, p. 748, *conifera* Andr., *decora* Hort., v. Leucadendron strictum et grandiflorum, p. 458, *dichotoma* Cav. (= *pulchella* Schrad., Wendl.), v. Petrophila pulchella p. 610, *dichotoma* Lam., v. Mimetes divaricata, p. 524, *diversifolia* W., *globosa* Andr. (= *strobilina* Don), v. Leucadendron salignum et concolor, p. 458, *heterophylla* Thbg., v. Leucospermum diffusum, p. 356, H., *imbricata* Wendl. (= *Wendlandi* Poir.), v. Leucadendron buxifolium, p. 457, *Lagopus* Andr. (non Thbg.), v. Nivenia crithmifolia, p. 549, *nectarina* Schrad., Wendl., v. Lambertia formosa, p. 444, *pallens* L. (= *stricta* Don), *pallens* Thbg., v. Leucadendron adscendens et decurrens, p. 458, *pedunculata* Lam., *phylicoides* Lam., *procumbens* L., v. Serruria glomerata, villosa et decumbens, p. 748, *prolifera* Thbg., v. Spatalla prolifera, p. 775, *saligna* Andr., v. Leucadendron floridum, p. 458, *Serruria* L., v. Serruria Burmanni, p. 748, *sphaerocephala* L., *sphaerocephala* Thbg., *sphaerocephala* W. herb, v. Serruria phylicoides, rubricaulis, arenaria, p. 748, *spicata* L., *spicata* Andr., v. Nivenia spicata et media, p. 549, *strobilina* L., v. Leucadendron squarrosum, p. 459.
Uebrigens sind noch die hierher gehörigen Synonymen p. 659 zu vergleichen, sowie überhaupt die Gattungen Aulax, Isopogon, Leucadendron, Leucospermum, Mimetes, Nivenia, Petrophila, Serruria, Sorocephalus, Spatalla.

Proustia Lagasca, Cass. (Proust, spanischer Naturforscher), XIX. II., Compositae-Eupatorineae (Perdicieae).
pungens Poepp. (= *cuneifolia* Don), stechende, ♄. k. Chili.
β) ilicifolia Hook.
pyrifolia DC., birnblätterige, ♄. k. Chili.

Prunella L., Brunelle.
alba Pall. (= *laciniata* L. = *grandiflora β* W. = *sulphurea* Mill. = *vulgaris* L. var. L., Benth.).
caroliniana Mill. (= *vulgaris* L. var. Benth.), carolinische, 4. f. Carolina.
grandiflora Jacq., Mch. (= *officinalis β* Crantz, = *speciosa* Wender.), *β*) hastaefolia Brotero, (= *hastata* Spgl. = *laciniata hastaefolia* Hffg., Lk. = *lusitanica* Perrault).
pensylvanica W. (= *angustifolia* Wender. = *australasica* Moric. = *latifolia* Don, = *? novae Angliae* Mill. = *vulgaris γ elongata* Benth.), *β*) macrophylla Hamilt. (= *ovata* Dsf., P.).
vulgaris L. (= *officinalis* Crtz. = *reptans* Dumort. = *surrecta* Dumort.), *β*) parviflora Poir., *γ* hirta Bernh. (= *? hirsuta* Wender. = *hispida* Benth.), *δ*) pinnatifida P. (= *dissecta* Wender. = *incisa* Lk. = *intermedia* Brotero, = *laciniata* Auct. quor. = *longifolia* P.), *ε*) aequinoctialis H. B. K.

Digitized by Google

Prunus L., Pflaume.

II. Cerasus T. (et Padus R.) Kirsche.

aspera Thbg., rauhe, ħ. k. f. b. Japan.
avium L. (= *sylvestris* P.), var. asplenifolia Hort., rubicunda Bechstein.
β) duracina DC., γ) mammillaris Sering. (= *macrophylla* Poir. = *nicotianaefolia* Loisel.).
brachybotrya Zuccar., kurztraubige, ħ. k. Mexico.
caroliniana Ait. (= *sempervirens* W. = *Bumelia serrata* Pursh, = *Padus caroliniana* Mill., Borkh.).
Cerasus L. (= *hortensis* P.), f) persiciflora Sering. (= *rosea* Hort.).
Chamaecerasus Jacq. (= *C. humilis* Host).
β) fruticans Weihe.
demissa Nutt., niedergedrückte, ħ. f. Nordamerika (Oregongebiet).
densiflora Spach, dichtblumige, ħ. f. ? Nordamerika.
divaricata Ledeb. (= ? *syriaca* Borckh.), ausgespreitzte, ħ. f. Caucasus.
Duerinckii Martens, Duerinck's, ħ. f. Nordam. (St. Louis).
elliptica Thbg., elliptische, ħ. f. Japan.
fimbriata Spach, gefranzte, ħ. f. ? Nordamerika.
glandulosa Thbg., drüsige, ħ. f. b. k. Japan.
graeca Dsf. (= *C. Fontanesiana* Spach), griechische, ħ. f. Griechenland.
hirsuta Ell., rauhharige, ħ. f. Nordamerika.
humilis Bunge (non Moris), niedrige, ħ. f. Nordchina.
hyemalis Mchx. (= *acinaria* Dsf. = *nigra* Ait. var. ? Poir.).
japonica Thbg. (= *sinensis* P.), β) chinensis G. Don, (= *Amygdalus pumila* L.), b) multiplex Sering.
incisa Thbg., eingeschnittene, ħ. f. b. Japan.
intermedia Host, mittlere, ħ. f. Oestreich.
Kerii Steud. (= *C. japonica* Ker, non Loisel.), Ker's, ħ. f. b. Japan.
Marasca Host, Maraschiner-K., ħ. f. Dalmatien.
micrantha Spach, kleinblumige, ħ. f. ?
Mume Sieb. et Zuccar., (= *Amygdalus nana* Thbg.), Mume-K., ħ. f. b. Japan.
Padus L. (= *Padus racemosa* Lam. = *P. avium* Mill. = *P. germanica* Borckh. = *P. vulgaris* Host), var. heterophylla Hort., variegata Hort.
paniculata Thbg., rispige, ħ. f. b. Japan.
persicifolia Dsf. (= *borealis* P. = *nigra* Ait. var. Spgl.).
prostrata LaBill. (= *Amygdalus prostrata* Sweet).
β) incana Steven, (= *A. incana* Pall.).
semperflorens Ehrh. (= ? *C. effusa* Host).
sphaerocarpa Sw. (= *brasiliensis* Schott).
tomentosa Thbg., filzige, ħ. f. b. Japan.
β) fructibus oblongis: trichocarpa Bunge, haarfrüchtige, ħ. f. b. Nordchina.

III. Prunus T., Pflaume.

Chicasa Mchx. (= *insititia* Walt.).
domestica L., var. cerea, minor, enucleata.
insiticia L., β) vinaria Bechst. (= *floribunda* Weihe).
Poiretiana * (= *pubescens* Poir. = *pubigera* Steud.).
spinosa L., var. semiplena, dulcis, viridis.

Unbestimmtere: italica Borckh., latifolia Räusch., montana Hort., virginalis Wender.

Digitized by Google

Psacalium Cass., Psacalium, XIX. s., Compositae-Corymbiferae.

peltatum Cass. (= *Cacalia peltata* H. B. K., p. 141, p. 871), schildförmiges, 4. ♄. t. Mexico.

Psephellus Cass., *calocephalus* Cass., *carthamoides* Fisch. et Mey., *phaeopappus* Fisch. et Mey., *spectabilis* Fisch. et Mey., v. Centaurea dealbata, p. 177 et Amberboa carthamoides, phaeopappa et spectabilis, p. 31, 32, II.

Pseudarthria Wight, Arn., Gliederhülschen, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

viscida Wight, Arn. (= *Desmodium viscidum* DC. = *Hedysarum prostratum* Roxb. = *H. viscidum* L. = ? *H. viscosum* Burm. = *Rhynchosia viscida* DC., p. 688), schmieriges, 4. ♄. Sch. w. Java, Ostindien.

Pseudocapsicum Medic., Mch., *diphyllum* Medic., *lancifolium* Mch., *torulosum* Mch., *undulatum* Mch., v. Solanum diphyllum, lanceolatum, aethiopicum, pseudocapsicum.

Pseudodictamnus Mch., *acutus* Mch., *emarginatus* Mch., v. Beringeria hispanica et africana, p. 119. *Pseudosophora alopecuroides* Sweet, *sericea* Sweet, v. Radiusia alopecuroides et sericea.

Psiadia Jacq., Tropfenpflanze.

glutinosa Jacq. (= *Conyza glutinosa* Lam., Spgl. = *Erigeron glutinosum* Dsf. Hort. Par. = *E. viscosus* Dsf. = *Solidago viscosa* Schrad., Wendl.).

penninervis DC. (= *glutinosa* Boj.), fiedernervige, ♄. t. Mauritius.

Psidium L., Guajavabaum.

amplexicaule P. (= *cordatum* Sims), stengelumfassender, ♄. w. Antillen.

Araça Raddi, (= *minus* Mart.), Araça-G., ♄. w. Brasil.

Cattleyanum Sabine, (= *coriaceum* Mart.). China, Brasil.

crassifolium Brotero, dickblätteriger, ♄. w. Brasilien.

dichotomum Weinm., zweizinkiger, ♄. w. Brasilien.

fluviatile Rich. (= *guianense* P.), flufsliebender, ♄. w. Guiana.

oligospermum Mart., wenigsaamiger, ♄. w. Brasilien.

pomiferum L. (= *Guajava β* Raddi, = *sapidissimum* Jacq.).

pyriferum L. (= *Guajava* Raddi, = *vulgare* Rich. = *Guajava pyriformis* G).

rubrum Lour., rother, ♄. w. t. China.

Psilathera Lk., tenella Lk., v. Sesleria Sect. II., p. 750.

Psilonema C. A. Mey., Borstenfaden, calycynum C. A. Mey., dasycarpum C. A. Mey., homalocarpum Fisch. et Mey., v. Alyssum Sect. IV. p. 28, II.

Psilothonna Tagetes E. Mey., v. Gamolepis Tagetes. *Psilotum* Sw., *complanatum* Sw. (= *dichotomum* Hort.), *dichotomum* Lk. (= *triquetrum* Sw. = *floridanum* Mchx.), v. Bernhardia complanata, p. 66, II. et B. dichotoma, p. 119.

Psittacoglossum LaLlave, Lindl., Papageienzüngel, XX. I., Orchideae.

atratum LaLlave, schwärzliches, 4. w. Mexico.

Psoralea L., Harzklee.

aculeata L. (= *acuminata* Lam.).

aphylla L. (= *decidua* Berg. = *denudata* Hffg. = *filifolia* Eckl., Zeyh. = *Jacquiniana* Eckl., Zeyh., non Endl. = *Ruderia decidua* Mch.).

Digitized by Google

Psoralea

bituminosa L. (= *Aspalathium bituminosum* Medic. = *Dorychium angustifolium* Mch.), β) frutescens Poir.

bracteata L. (= *cuneifolia* Brot. = *Ononis trifoliata* L. = *Trifolium fruticans* L.).

bracteolata Eckl., Zeyh. (= *bracteata* Jacq., non L. = = *bracteata* β *Jacquiniana* E. Mey.), kleindeckblätteriger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

capitata Thbg., L. fil. (= *astragalifolia* Poir. = *multicaulis* Jacq.).

cuspidata Pursh, (= *macrorrhiza* Fraser).

decumbens Ait. (= *mucronata* Thbg. = *ononoides* Poir. = *Ononis decumbens* Sieber).

fascicularis DC. (= *tenuifolia* Thbg., non L. = *Thunbergiana* Eckl., Zeyh. = *Lotus tenuifolius* Burm.), büschelförmiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

foetida Presl, stinkender, ☉. f. Sicilien.

glandulosa L. (= *Cullen* Poir. = *lutea* Molina), drüsiger, 4. ♄. k. Chili.

humilis Mill., niedriger, ♄. t. Vera Crux.

Jacquiniana Sweet, Endl., non Eckl. (= *hirta* Jacq., non L.), Jacquin's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Jaubertiana Fenzl, Jaubert's, ☉. ♄. f. k. Mesopotamien.

obtusifolia DC., stumpfblätteriger, ♄. k. Cap d g. H.

odoratissima Jacq. (= *pinnata* Andr., nec alior.).

striata Thbg. (= *Echlonis* Hort. Viadr. = *rupicola* Eckl., Zeyh.).

subacaulis Torr. et Gray., faststengelloser, 4. k. f. b. Nordamerika.

Tauschiana Steud. (= *parviflora* Tausch, non ? E. Mey. = *spicata* Hort.), Tausch's, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

triantha E. Mey. (= *hirta* Thbg. = *triflora* Poir., non Thbg.), dreiblumiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

verrucosa W. (= *angustifolia* Jacq. = *tenuifolia* W. herb. = *triflora* Eckl., Zeyh.), β) intermedia Bess. (= ? *axillaris* Poir.), ? γ) triflora Thbg.

Unbestimmtere: biflora Rudolph., genistoides Hort., lathyrifolia Balb.

alopecuroides Poir. (= *annua* Mill. = *Dalea* L.), *Lagopus* Cav. (= *leporina* Ait.) etc., v. Dalea alopecuroides etc., *candida* Poir., *carnea* Poir., *corymbosa* Poir., *violacea* Poir., v. Petalostemon candidum etc., p. 609, *cytisoides* L., v. Indigofera cytisoides.

Psorophytum undulatum Spach, v. Hypericum balearicum.

Psychotria L., Psychotria.

alba R. et P. (= *ardisiaefolia* H. B. K. = *decidua* Arrabida, = *densiflora* W. = *patula* W.), weifse, ♄. w. Südamerika.

carthagenensis Jacq., carthagenaische, ♄. w. Carthagena.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♄. ♄. w. Südamer.

sambucina Lk., hollunderähnliche, ♄. w. Brasilien.

undata Jacq. (= *undulata* Poir.).

Zweifelhaft: discolor H. belg.

Pavetta Sw., *pedunculosa* Rich., *rigida* Bredem., W. (= *byrsophylla* Spgl.), v. Palicourea Pavetta, pedunculosa et rigida, p. 472, II. Die übrigen Synonyme vergl. p. 663.

Digitized by Google

Psyllium Jüss., *aegyptiacum* Mirb., *arenarium* Mirb. (= *crassum* St. Hil.), *arenarium* Thuill., *generosum* Poir. (= *suffruticosum* St. Hil.), s. Plantago squarrosa, Psyllium, indica, Cynops, p. 631—633.

Ptarmica T., Bertramskraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

Bocconi Steud. (= *Achillea Bocconi* K. Hort. Erl.), Boccone's, 4, f. ? Sibirien.

borealis DC. (= *Achillea borealis* Bong.), nördliches, 4. f. Nordasien (Insel Sitcha).

ircutiana DC. (= *Achillea lenensis* Turcz.), ircutisches, 4. f. Dahurien.

mucronulata DC. (= *Anacyclus mucronulatus* Guss. = *Anthemis mucronulata* Bertol., p. 62).

multifida DC. (= *Achillea setacea* Auch., non W. K.), vieltheiliges, 4. f. b. Olymp, Bithynien.

oxyloba DC. (= *Anthemis alpina* L., p. 62, = *Chamaemelum alpinum* All. = *Chamomilla alpina* Hall.), spitzzipfeliges, 4. f. Oestreichische Alpen.

umbellata DC. (= *Achillea umbellata* Sibth., Sm.), doldiges, 4. f. b. Griechenland.

Aufserdem gehören zu dieser Gattung nach DeCandolle noch folgende früher zu Achillea gestellte p. 9—11 verzeichnete Arten:

alpina DC. (= *Achillea alpina* L. = *cristata* W., non Retz, = *punctata* Mch.), β) angustifolia H. Prag., atrata DC. (= *Achillea atrata* L. = *A. Halleri* Crantz, = *Anthemis corymbosa* Hänke), biserrata DC. (= *Achillea biserrata* MB.), Clavennae DC. (= *Achillea argentea* Visiani, = *A. capitata* W. = *A. Clavennae* L. = *A. sericea* Visiani, = *A. tyrolensis* Wender.), Clusiana Steud. (= *atrata* γ DC. = *A. Clusiana* Tausch, = *A. Clusii* Sauter), cristata DC. (= *Achillea cristata* Retz, non W.), grandiflora DC. (= *Achillea dracunculoides* Dsf. = *A. grandiflora* MB. = *A. leucanthema* P. = *Anthemis ptarmicaefolia* Adams, = *Chrysanthemum ptarmicaefolium* Muss. Puschk. = *Pyrethrum ptarmicaefolium* W.), Herba-rota DC. (= *Achillea cuneifolia* Lam. = *A. herba-rota* All. = *A. nana* Lam.), Impatiens DC. (= *Achillea Impatiens* L. = *A. nitida* Auct.), lingulata DC. (= *Achillea lingulata* W. K.), macrophylla DC. (= *Achillea macrophylla* L.), mongolica DC. (= *Achillea mongolica* Fisch.), moschata DC. (= *Achillea Genipi* Murr. = *A. livia* Scop. = *A. moschata* Wulf., Jacq.), β) A. impunctata Vest, nana DC. (= *Achillea lanata* Lam. = *A. nana* L.), serrata DC. (= *Achillea serrata* Retz), speciosa DC. (= *Achillea serrulata* Hornem. = *A. speciosa* Henckel), Thomasiana DC. (= *Achillea montana* Schlchr. = *A. Thomasiana* Hall. fil. = *A. Thomasii* C. C. Gmel.), valesiaca DC. (= *Achillea helvetica* Murray, = *A. incisa* Clairv. = *A. valesiaca* Suter), vulgaris DC. (= *Achillea Ptarmica* L.), β) multiplex DC. (= *Achillea multiplex* Renar. (Bonton d'argent Hort.), γ) A. pyrenaica Sibth., δ) linearis DC. (= *Achillea fragilis* Balb.), ε) cartilaginea DC. (= *Achillea cartilaginea* Ledeb. = ? *A. salicifolia* Besser).

Digitized by Google

Ptelea L. Lederblume.

monophylla Lam. (= *? caroliniana* Hort. = *microphylla* Dietr.), einblätterige, ħ. f. Carolina.

trifoliata L. (= *americana* Hort.), β) **pentaphylla** Münchh.

Pteranthus L., Flügelblümchen, IV. 1., Atzoideae-Atripliceae.

echinatus Dsf. (= *P. Forskahlei* Mirb. = *Camphorosma Pteranthus* L. = *Louichea cervina* L'Her. = *L. Pteranthus* Auct.), igelstacheliges, ☉. f. Nordafrika, Arabien, Cypern.

Pteris L., Saum-(Adler-)farrn.

allosora Lk. (= *Swartziana* Agardh), krauser, 4. w. Brasilien.

aquilina L. (= *caudata* Jacq.).

arachnoidea Desv. (= *lanuginosa* Spgl.), spinnenwebiger, 4. k. Nordamerika.

contracta Lk. (= *stenophylla* H. Berol., non Hook. et Grev.), zusammengezogener, 4. w. Brasilien.

crenata Sw. (= *chinensis* Lodd.), kerbiger, 4. w. China.

cretica L., β) caspica Fisch. et Mey.

decurrens Raddi, herablaufender, 4. w. Brasilien.

deflexa Lk., herabgebogener, 4. w. Brasilien.

edulis Hort. Berol. et Birmingh. (= *tremula* RBr. var.? Kunze), genießbarer, 4. w. ? Neuholland.

elegans Jacq. (= *arguta* Lk., non Vahl), zierlicher, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

emergens Lk. (= *angustata* Ag.), hervorragender, 4. w. Brasilien.

flabellata Thbg. (= *arguta* Schltdl., non Vahl), fächerförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

geraniifolia Raddi, (= *pedata* Sw. et Hort., non L.), storchschnabelblätteriger, 4. w. Brasilien.

grandifolia L. (= *vittata* Schk.).

lata Kaulf., Lk., breiter, 4. w. Brasilien.

leptophylla Sw. (= *spinulosa* Raddi, = *Cheilanthes spinulosa* Lk.).

longifolia L. (= *costata* Sw.).

macroptera Lk. (= *intermedia* Kaulf. = *? elata* Ag.), großflügeliger, 4. w. ?

nemoralis W., β) Plumierii W.

paleacea Roxb., spreuiger, 4. w. St. Helena.

pallida Raddi, bleicher, 4. w. Brasilien.

pedata L. (= *Litobrochia pedata* Presl).

polita Lk. (= *podophylla* Presl, Lk. = *propinqua* Ag.), geschmückter, 4. w. Brasilien.

repandula Lk. (= *biaurita* H. Berol., non L.), ausgeschweifter, 4. w. Brasilien.

semihirta Lk., halbrauher, 4. w. Cuba.

stenophylla Hook. et Grev., schmalwedeliger, 4. w. ? Brasilien.

sulcata Mey., gefurchter, 4. w. Südamerika.

tremula RBr. (= *chrysocarpa* Lk., non Hook. et Grev.).

Vespertilionis LaBill., var. γ aurita Ag., Hort. Bonn.

atropurpurea L., *auriculata* Sw., *Calomelanos* Sw., *cordata* Cav., Lk. (= *flexuosa* Hook.), *chrysocarpa* Hook et Greville, non Lk., *hastata* Sw. (= *Cheilanthes hastata* Kunze), *intramarginalis* Kaulf., *sagittata* Cav., *subverticillata* Sw. (= *peruviana* Poir. = *ternifolia* Cav.), v. Allosorus atropurpureus, auriculatus, Calomelanos, flexuosus etc., p. 22, II.

Digitized by Google

Pterocarpus Löffl., L., Flügelfrucht.

Adansonii DC. (= *crinaceus* Lam. = *senegalensis* Vahl), Adanson's, ♄. w. Senegal

Marsupium Roxb. (= *bilobus* Roxb.).

Draco L. (= *officinalis* Jacq. = *kenopterus* G.), *Moutouchi* Lam. (= *suberosus* P.), v. Moutouchia Draco et suberosa, p. 421, II.

Pterocarya Kunth, Flügelnufs.

caucasica Kunth, (= *fraxinifolia* Spach, = *Fraxinus laevigata* Hort. Par. = *Juglans fraxinifolia* Lamond, Duham. = *J. pterocarpa* Mchx. = *Rhus obscurum* MB.).

Pterocaulon Elliot, DC., Flügelstengel, p. 885.

pycnostachyum Ell. (= *Chlaenobolus pycnostachyus* Cass. = *Conyza pycnostachya* Mchx. = *Gnaphalium undulatum* Walt. = *Pluchea pycnostachya* Less.), dichtähriger, 4. f. Nordamerika.

virgatum DC. (= *Chlaenobolus virgatus* Cass. = *Conyza virgata* L. = *Gnaphalium virgatum* L. = *Pluchea virgata* Less.).

Pterocelastrus Meisn., Flügelcelaster, V. 1., Celastrineae.

tricuspidatus Meisn. (= *Asterocarpus tricuspidatus* Eckl., Zeyh. = *Cassine laevigata* Lam. = *Celastrus tricuspidatus* Lam., p. 174, = *Olea capensis* Buchoz.), dreispitziger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Pterocephalus Vaill., Coult., Federköpfchen.

brevis Coult. (= *Trichera brevis* Schult.), kurzes, ⊙. f. ?

dumetorum Coult. (= *Scabiosa dumetorum* Brouss. = *Trichera dumetorum* R. et S.).

lasiospermus Lk. (= *dumetorum* var. *pusilla* Coult. = *Scabiosa fruticulosa* Sm.), haarsaamiges, ♄. k. Canarische Inseln.

lusitanicus DC. (= ? *Asterocephalus intermedius* Lagasca, = *Cephalaria plumosa* R. et S. = *Scabiosa gramuntia* Brotero, = ? *S. intermedia* R. et S. = ? *S. maritima* Lagasca, = *S. plumosa* Hffg., Lk. = ? *S. tenuifolia* Lagasca), portugiesisches, ♂. 4. f. b. Portugal.

multisetus Endl. (= *Scabiosa multiseta* Visiani), vielborstiges, ⊙. f. Dalmatien.

niveus Coult. (= *spathulatus* Coult. = *Scabiosa nivea* Agardh), schneeweifses, 4. f. b. Spanien.

palaestinus Coult. (= *brachiatus* Spgl. = *Asterocephalus brachiatus* Rchb. = *Knautia palaestina* L. = *Scabiosa brachiata* Sm.), morgenländisches, ⊙. f. Dalmatien, Griechenland, Syrien.

β) calabricus.

papposus Coult. (= *involucratus* Spgl. = *Vaillantii* Lagasca, = *Scabiosa divaricata* Spgl. = *S. involucrata* Sibth., Sm. = *S. papposa* L.), hülliges, ⊙. f. Portugal, Spanien, Griechenland.

β) diandrus Lagasca, (= *Cephalaria diandra* R. et S. = *Scabiosa diandra* Lagasca).

perennis DC. (= *Parnassi* Spgl. = *Scabiosa pterocephala* L.), ausdauerndes, 4. ♄. f. b. k. Parnassus.

plumosus Coult. (= *marcescens* Mch. = *Cephalaria Willichii* R. et S. = *Knautia plumosa* L. = *Scabiosa papposa* G., Host, = *S. plumosa* Sibth. Sm. = *S. Willichii* Lk. = *Trichera Willichii* Schult. mant.).

Sibthorpianus Steud. (= *palaestinus* Coult. var. Coult.

Digitized by Google

Pterocephalus
= *Scabiosa decemaristata* Portenschl. = *S. Sibthorpiana* Sm.), Sibthorp's, ☉. *t.* Cypern.
tomentosus Coult. (= *Asterocephalus sphaciotious* Spgl. = *Scabiosa sphaciotica* R. et S. = *Scabiosa tomentosa* Sibth., Sm.), filziges, 4. *k.* Creta.

Pteroceras Hassk., Flügelhorn, XX. 1., Orchideae.
radicans Hassk., starkwurzelndes, 4. *w.* Java.

Pterochilus Hook., Flügellippe, XX. 1., Orchideae.
plantaginea Hook. (= *Microstylis plantaginea* Steud.), wegetrittähnliche, 4. *w.* Societätsinseln.
Pterochlamis Fisch., v. Panderia, p. 583.
Pterococcus aphyllus Pall., v. Calligonum Palasia, p. 147.

Pterodiscus Hook., Flügelscheibe, XIV. 11., Personatae-Pedalineae.
speciosus Hook., prächtige, 4. *t.* Südafrika.

Pterolobium RBr., Flügellappen, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
Kantuffa W. A. (= *Acacia Kantuffa* Bruce, = *Fillaea Brucei* Fresen. = *Mimosa Kantuffa* DC.), Kantuffa-Fl., ♄. *w.* Abyssinien.
lacerans RBr. (= *Caesalpinia lacerans* Roxb. = *C. ligulata* Rottl. = *Reichardia decapetala* Wight, = *R. hexapetala* Roth, Benth. = *Quartinia abyssinica* A. Rich.), zerschlitzte, ♄. *w.* Ostindien, Abyssinien.

Pteroloma Hochst., Steud., Flügelsaum, XV. 111., Capparideae.
arabicum Hochst., Steud. (= *Dipterygium glaucum* Decaisne), arabischer, 4. *t.* Glückliches Arabien.
Pterolophus lanceolatus Cass., *pinnatifidus* Cass., v. Centaurea Pterolopha et leucolepis, p. 178.
Pteromarathrum K., v. Prangos.

Pteroneuron DC., Flügelkresse.
bipinnatum Rchb., doppeltfiederspaltige, ♂. *f. b.* Dalmatien.
maritimum Rchb. (= *dalmaticum* Visiani, = *Cardamine maritima* Portenschl., p. 160, = *C. microphylla* Presl).

Pteronia L., Pteronie.
divaricata Less. (= *Chrysocoma oppositifolia* L. = *Eupatorium divaricatum* Berg.).
hirsuta L. fil., Thbg. (= *uniflora* Poir.), rauhhaarige, ♄. *k.* Cap d. g. Hoffn.
incana DC. (= *rigida* Berg. = *Chrysocoma incana* Burm. = *Eupatorium cinereum* Thbg.), weifsgraue, ♄. *k.* Cap d. g. Hoffn.
viscosa Thbg., schmierige, ♄. *k.* Cap d. g. Hoffn.
echinata Thbg., v. Felicia echinata, p. 99, Aster Sect. VIII., *Chamaepeuce* Spgl., *Chamaepeuce* Tenor., v. Chamaepeuce mutica et gnaphalodes, p. 187.
Pterophorus camphoratus Cass., *strictus* Less., v. Pteronia camphorata et stricta, p. 664.

Pterophylla Don, Flügelblatt, VIII. (X.) 11., Saxifrageae-Cunoniaceae.
fraxinea Don, (= *Weinmannia fraxinea* Sm.), eschenähnliche, ♄. *w.* Molucken.
Zweifelhaft: sessilis Hort. Dyck.
Pterophyton alatum Cass., *alternifolium* Cass., *procerum* Cass., v. Actinomeris tetraptera, alternifolia, procera, p. 17 et p. 9, 11.

Digitized by Google

Ptero pogon Fisch. et Mey., DC., Flügelbart, XIX. 11., Compositae-Helichryseae.

andicola N. E., Anden-F., ⊙. f. Chili.

australe N. E. (= *pygmaeum* DC.), neuholländischer, ⊙. f. Neuholland.

chilense Fisch. et Mey. (= *Gnaphalium eriospermum* Trevir.), chilesischer, ⊙. f. Chili.

α) minus Fisch. et Mey., *β*) majus Fisch. et Mey.

Pterospermum Schreb., Flügelkern.

glabrescens Wight, Arn. (= *aceroides* Wall. = *Heyneanum* var. Wall.), glatter, ♄. w. Ostindien.

Heyneanum Wall. (= *suberifolium* Auct. = *Velaga xylocarpa* G.), Heyne's, ♄. w. Ostindien.

suberifolium W. (= *canescens* Roxb. = *Pentapetes suberifolia* L.).

Pterostigma Benth., Flügelnarbe, XIV. 11., Personatae-Scrofularineae (Antirrhineae-)Gratioleae.

grandiflorum Benth. (= *Digitalis chinensis* Lour. = *Gerardia glutinosa* L. = *Spathestigma glutinosa* Hook. Arn.), grofsblumige, 4. k. China.

Pterostylis RBr., Flügelorche.

hirsuta Ait., rauhhaarige, 4. Kn. w. ? Neuholland.

squamata RBr., schuppige, 4. Kn. w. Van Diemens Land.

Pterostyrax Sieb. et Zuccar., Flügelstorax, X. 1., Sapotaceae-Styracineae.

corymbosum Sieb. et Zuccar., traubendoldiger, ♄. k. (Ob kultivirt?)

Pterygodium Sw., Flügelstendel.

acutifolium Lindl., spitzblätteriger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.

platypetalum Lindl., breitkroniger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.

venosum Lindl., aderiger, 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffn.

Volucris Sw., v. Ommatodium Volucris, p. 447, II.

Ptilimnium Rafin., *capillaceum* Rafin., *costatum* Rafin, v. Discopleura capillacea, costata, p. 877.

Ptilocnema bracteatum Don, v. Pholidota pallida, p. 517, II.

Ptilomeris californica Nutt., v. Hymenoxis californica, p. 310, II.

Ptilostemum appendiculatum Cass., *muticum* Cass., v. Chamaepeuce fruticosa, mutica, p. 186.

Ptilotrichum C. A. Mey., Federhaar, XV. 11., Cruciferae.

canescens C. A. Mey. (= *Adyseton Fischerianum* Swt. = *Alyssum canescens* DC. = *A. Fischerianum* DC. = *A. minutum* Patrin, = *A. sibiricum* Fisch., non W. = *A. tenuissimum* MB. = *Koniga sibirica α* Spach, = *Lobularia canescens* Steud.), grauliches, 4. ♄. f. Sibirien.

elongatum C. A. Mey. (= *Alyssum canescens β elongatum* DC. = *A. dauricum* W. herb. = *Lobularia elongata* Steud.), verlängertes, 4. ♄. f. Alt. Sibirien.

tenuifolium C. A. Mey. (= *Alyssum tenuifolium* Steph. = *Koniga sibirica β* Spach, = *Lobularia tenuifolia* Steud.), dünnblätteriges, 4. ♄. f. Sibirien.

Ptychosperma gracilis LaBill., v. Seafforthia gracilis.

Ptychotis K., DC., Faltendolde.

anethifolia DC. (= *Athamanta anethifolia* Wall. = *Pimpinella anethifolia* Don), dillblätterige, ⊙. f. Nepal.

coptica DC. (= *Ammi copticum* L. = *Bunium copticum* Spgl. = *Daucus copticus* P. = *Trachyspermum*

Digitized by Google

Ptychotis

copticum Lk., Enum., p. 814), coptische, ☉. f. Aegypten.

β) Seseli-ammoides Jacq. (= *Seseli foeniculifolium* Poir. = *Sison Ammi* Lam.).

heterophylla K. (= *Bunius* Rchb. = *Aethusa Bunius* Rchb. = *A. montana* Lam. = *Carum Bunius* Jacq. = *Critamus heterophyllus* DC. = *C. saxifragus* Rchb. = *Ligusticum Bunius* Lk. = *Meum Bunius* Loud. = *M. heterophyllum* Mch. = *Pimpinella genevensis* Vill. = *Seseli Bunius* Vill. = *S. saxifragum* L. = *Sison divaricatum* Spgl. ex parte, = *Sium saxifragum* Roth).

verticillata Duby, (= *ammoides* K. = *Ammi Matthioli* Auct. = *Seseli ammoides* Gouan, = *S. corsicum* Lk. = *S. pusillum* Brotero, = *S. Turbith* Tenore, = *S. verticillatum* Dsf. = *Sison Ammi* Ucria), p. 666.

Pugionium G., Dolchfrucht, V. II. (XV. I.), Atripliceae s. Chenopodeae A. v. Bunge, (Cruciferae s. Tetradynamae Lomentaceae Auct.).

cornutum G. (= *Bunias cornuta* L.), gehörnte, ☉. f. Orient.

Pulegium cervinum Mill., *erectum* Mill., *vulgare* Mill., v. Mentha cervina et Pulegium, p. 510.

Pulicaria G., Flöhalant.

arabica Cass. (= *villosa* Lk. = *Inula arabica* L. = *I. villosa* Vahl), arabischer, ☉. f. Nordafrika, Creta, Spanien.

calycina Presl, (= ?*odora* Rchb. var. = *Inula calycina* Spgl. = ?*I. conyzoides* Dsf. = *I. montana* Bivone, non L.), kelchiger, 4. f. Sicilien.

hydrabadensis Lindl. (= *Aster hydrabadensis* Wall.), ostindischer, ☉. f. Ostindien.

undulata DC. (= *Inula crispa* Sbr. = *I. undulata* L.).

vulgaris G. (= *germanica* Presl, = *Aster Pulicaria* Scopol. = *Inula cylindrica* Hall., Wither. = *I. Pulicaria* L. = *I. uliginosa* Sibth., non Stev.).

viscosa Lk. p. 666 ist zu streichen.

annua G. (= *bellidiflora* Wallr.), v. Stenactis annua, p. 786.

Pulmonaria T., Lungenkraut.

angustifolia L. (= *montana* Lejeune, = *tuberosa* Schrank).

officinalis L., *α*) albo maculata, *β*) immaculata.

Nicht hinlänglich bekannte Arten: alpina Mill., pendula Hort., undulata Lavy.

amoena Stev. (= *dahurica* Fisch. = *gracilis* W.), *denticulata* R. et S. (= *sibirica* Pursh), *lanceolata* Pursh, (= *marginata* Nutt.), *maritima* L., *paniculata* Ait. (= *elegans* Hort.) etc., v. Mertensia dahurica, denticulata etc., p. 399 et p. 400, II.

Pulsatilla Bauh., T., Mill., Küchenschelle.

alpina de l'Arbre, (= *alba* Rchb. = *Anemone alpina* L.), *β*) A. apiifolia Wulf., Hoppe, (= *Anemone sulphurea* Auct.), *γ*) Burseriana Rchb. (= *Anemone Burseriana* Scop. = *A. millefoliata* Bert. = *A. myrrhidifolia* Vill.), *δ*) micrantha Sweet, *ε*) grandiflora Hoppe.

ambigua Turcz., zweifelhafte, 4. f. Sibirien.

Bogenhardiana Rchb. (= *montana* Wirtgen, nec Hoppe, = *acutipetala* Schlchr. = *tenuifolia* Schlchr., nec Spgl. = *vulgaris* Mill. = *v. β. violacea* Botanic. gall.

Digitized by Google

Pulsatilla

= *v. media* Bogenh.), Bogenhard's, 4. f. Westdeutschland, Frankreich.

β) laciniata Bogenh.

Bungeana Ledeb., Bunge's, 4. f. Alt. Sibirien.

chinensis Bunge (non Hort.), chinesische, 4. k. f. b. China.

flavescens Zuccar., gelbliche, 4. f. Sibirien.

Halleri W. (= *Anemone Halleri* All.), *α*) villosissima Pritz., *β*) bohemica Pritz. (= *Hackelii* Pohl, = *Halleri* Presl, Tausch, = *hybrida* Mikan, = *Anemone Hackelii* Pohl, = *A. patens* Hoppe, Sturm.), *γ*) auricoma Pritz. (= *Hackelii* Rchb.), *δ*) styriaca Pritz., ? *ε*) Wolfgangiana Besser.

intermedia Fisch., mittlere, 4. f. Sibirien.

montana Rchb. (= *Anemone intermedia* Hoppe, = *A. montana* Hoppe, = *A. Pulsatilla nutans* Gaud.), Berg-K., 4. f. Südeuropa.

Nuttalliana Spgl. (= *Anemone ludoviciana* Nutt. = *A. Nuttalliana* DC. = *A. patens* L. var.? = *Clematis hirsutissima* Pursh).

patens Mill. (= *Anemone longipetala* Schlchr. = *A. patens* L.), *α*) patenti-pratensis Lasch, *β*) subintermedia Lasch, *γ*) flaccida Lasch, *δ*) multifida Pritz. (Sibiria), *ε*) elongata Pritz., *ζ*) ochroleuca Bot. mag.

pratensis Mill. (= *nigricans* Stoerk. = *Anemone pratensis* L.), *α*) affinis Lasch, *β*) cylindriflora Pritz., *γ*) patula Pritz., *δ*) minor Pritz. (= *intermedia* Schult., non Hoppe, Hornsch., nec Fisch.), *ε*) chlorantha Pritz. (= *helleboriflora* Richt.), *ζ*) alba Tausch., *ϑ*) sulphurea Tausch, *ι*) multiplex Tausch.

vernalis Mill. (= *Anemone sulphurea* All. = *A. vernalis* L.), *α*) vulgari-vernalis Rchb., *β*) patenti-vernalis Lasch, (= *intermedia* Lasch, nec Hoppe, Hornsch.), *γ*) vernalipratensis Lasch, *δ*) propinqua Lasch.

vulgaris Mill. (= *Anemone collina* Salisb.).

Unbestimmtere: grandis Wender., obsoleta Sweet, (= ? *pratensis* Mill. var. ?)

Pultenaea Sm., Pultenaea.

aciphylla Benth., spitzblätterige, ♄. t. Neuholland.

baeckeoides Cunningh., bäckeaähnliche, ♄. t. Neuholland.

biloba RBr., *β*) scabra RBr.

brachytropis Benth., kurzkielige, ♄. t. Neuholland.

Brunonis Benth., Brown's, ♄. t. Neuholland.

cordifolia Hook. (= *cordata* Grah.).

cuneata Benth., keilblätterige, ♄. t. Neuholland.

elliptica Sm. (= *tuberculata* P.).

ericaefolia Benth., heideblätterige, ♄. t. Neuholland.

eriophora Lodd., wolltragende, ♄. t. Neuholland.

fasciculata Benth., büschelförmige, ♄. t. Van Diemens Land.

foliolosa Cunningh., blattreiche, ♄. t. Neucambria.

Gunnii Benth., Gunn's, ♄. t. Van Diemens Land.

lanata Cunn. (non Sieb.), wollige, ♄. t. Neucambria.

laxa Kunze, lockere, ♄. t. Neuholland.

linophylla Sm. (= *glaucescens* Sbr.), *β*) amoena Sieb.

mollis Lindl., weiche, ♄. t. Neuholland.

montana Lindl., Berg-P., ♄. t. Neuholland.

mucronata Lodd., stachelspitzige, ♄. t. Neuholland.

myrtoides Cunn., myrtenähnliche, ♄. t. Neuholland.

parviflora Sieb. (= *stenophylla* Cunningh.).

peduncularis Hook., langstielige, ♄. t. Neuholland.

Digitized by Google

Pultenaea
petiolaris Cunn., stielblätterige, ♄. t. Neucambria.
setigera Cunn., borstentragende, ♄. t. Neuholland.
stipularis Sm. (= *proteoides* Sbr. = *psoraleoides* Sbr.).
styphelioides Cunn., styphelienähnliche, ♄. t. Neuholland.
Sweetii G. Don, (= *flexilis* Sweet, non Sm.), Sweet's, ♄. t. Neuholland.
uncinata Benth., hakiggekrümmte, ♄. t. Neuholland.
Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch folgende: alopecuroides, nana, obtusa, ovata, sericea, spathulata, tenuissima.
aspera Sbr., *comosa* Sbr., *phylicoides* Sbr., *squarrosa* Sbr., v. Phyllota aspera, comosa etc., p. 520, II., *euchila* DC., v. Spadostyles Sieberi, *juncea* W. (= *denudata* W.), v. Viminaria denudata, p. 849, *villosa* Andr., v. Aotus villosa, p. 40, II.

Punica T., Granatum L., b) grandiflora Hort., c) multiflora Hort.

Pupalia Mart., Pupalie, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.
densiflora Mart. (= *Desmochaeta achyranthoides* H. B. K. = *D. densiflora* H. B. K. = *D. uncinata* W.), dichtblumige, 4. w. Südamerika.
prostrata Mart. (= *Achyranthes prostrata* R. et S. = *Cyathula geniculata* Lour. = *C. prostrata* Blume, = *Desmochaeta prostrata* DC.), gestreckte, 4. w. Ostindien.

Puschkinia Adams, Puschkinie.
?dubia Kunth, (= *Hyacinthus spicatus* Sm., Lindl.), zweifelhafte, 4. Zw. f. b. Griechenland.
libanotica Zuccar., libanonische, 4. Zw. f. b. k. Libanon.

Putoria P., DC., Stinkröthe, IV. 1., Rubiaceae.
calabrica P. (= *Asperula calabrica* L. fil. = *Ernodea montana* Sibth., Sm. = *Lonicera sicula* Ucria, = *Pavetta foetidissima* Cyril. = *Sherardia foetida* Lam.), calabrische, ♄. k. Calabrien, Creta, Syrien.

Putranjiva Wall., (? ostindischer Name), IV. 1. (XXII. IV.), Tricoccae-Euphorbiaceae.
Roxburghii Wall. (= *Nageja ? Putranjiva* Roxb., Hamilt., p. 539), Roxburgh's, ♄. w. Ostindien.

Putterlickia Endl., (Putterlick, östreich. Botaniker), V. 1., Celastrineae.
pyracantha Endl. (= *Celastrus pyracanthus* L. = *C. bullatus* Hort. = *C. Colpoon* Hort. = *C. octogonus* Hort.), rothdornige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Puya Molin., Puya, (einheimischer Name), VI. 1., Bromeliaceae.
Altensteinii Lk., Kl. (= *Pitcairnia Altensteinii* Schweidw.), Altenstein's, 4. w. Caracas.
Bonplandiana Schult. (= *Pitcairnia furfuracea* W. = *P. pyramidata* Lk, = *Pourretia Bonplandiana* Dietr. = *P. pyramidata* H. B. K.).
chilensis Molina, (= *suberosa* Molina, = *Pitcairnia chilensis* Lodd., p. 630, = *P. coarctata* P. = *Pourretia coarctata* R. et P.), chilesische, 4. w. Chili.
coerulea Steud. (= *Pourretia coerulea* Miers), blaue, 4. w. Chili.
heterophylla Hort. belg., verschiedenblätterige, 4. w. Südam.
lanata Schult. (= *Bromelia lasiantha* W. = *Pitcairnia lanata* Dietr. = *Pourretia lanata* H. B. K.), wollblumige, 4. w. Peru.

Digitized by Google

Puya

lanuginosa Schult. (= *Pitcairnia crystallina* P. = *Pourretia lanuginosa* R. et P.), wollige, 4. w. Südamer.

pyramidata Schult. (= *Pitcairnia pyramidata* P. = *Pourretia pyramidata* R. et P.), pyramidenförmige, 4. w. Peru.

recurva Hort. belg., zurückgekrümmte, 4. w. Südamer.

rubricaulis Steud. (= *Pourretia rubricaulis* Miers), rothstengelige, 4. w. Chili.

saxatilis Mart., v. Encholirium spectabile, p. 221, II.

Pycnanthemum Mchx., Ballblume.

aristatum Mchx. (= *verticillatum* Pursh, = *Origanum clinopodioides* Walt.).

arkansanum Fresen., arkansanische, 4. f. Nordamerika.

hyssopifolium Benth. (= *aristatum* Pursh, = *setosum* Nutt.), ysopblätterige, 4. f. Nordamerika.

lanceolatum Pursh, *α*) latifolium Benth. (= *verticillatum* P. = *Brachystemum verticillatum* Mchx. = *Thymus verticillatus* Poir.), *β*) angustifolium Benth. (= *virginicum* P. = *Brachystemum lanceolatum* W. = *B. virginicum* Mchx. = *Nepeta virginica* W. = *Thymus lanceolatus* Poir.).

linifolium Pursh, (= *? tenuifolium* Schrad. = *Brachystemum linifolium* W. Enum. = *Koellia capitata* Mch. = *Origanum flexuosum* Walt. = *O. lineare* Hort. = *Thymus virginicus* L.).

Loomisii Nutt., Loomis's, 4. f. Nordamerika.

muticum P. (= *pilosum* Nutt. = *Brachystemum muticum* Mchx. = *Satureja virginiana* L. = *Thymus serratus* Poir.), unbewehrte, 4. f. Nordamerika.

ovatum West., Sweet, eiförmige, 4. f. Nordamerika.

Torreyi Benth. (= *virginicum* Nutt.), Torrey's, 4. f. Nordamerika.

Tullia Benth. (= *Tullia pycnanthemoides* Leavenw.), Tullia-B., 4. f. Nordamerika.

Pycnocephalum DC., Ballköpfchen, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

plantaginifolium DC. (= *Vernonia plantaginifolia* Less.), wegetrittblätteriges, 4. t. w. Brasilien.

spathulaefolium DC. (= *Vernonia montevidensis* Hort. = *V. spathulaefolia* Mart.), spatelblätteriges, 4. t. w. Brasilien.

Pycnocoma rutaefolium Hffg., Lk., v. Scabiosa urceolata, p. 728.

Pycnomon Adans., Cass. (= *Picnomon* Auct.), Balldistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

Acarna Cass. (= *Carduus Acarna* L. = *Carlina Acarna* MB. = *Carthamus canescens* Lam. = *Cirsium Acarna* Mch. = *Cnicus Acarna* L.), grauliche, ⊙. f. Süd- und Westeuropa, Orient.

Pycreus P. B., *flavescens* Rchb. etc., v. Cyperus flavescens etc.

Pyrethrum Hall., G., Bertramwurz.

arvense Salzm. (= *tingitanum* Hort. = *Chrysanthemum praecox* Hort. = *Ch. tingitanum* Bernh. = *Phalacrodiscus arvensis* Fisch. et Mey., p. 612).

chiliophyllum Fisch. et Mey. (= *Achillea pauciflora* W. herb.), zahnblätterige, 4. f. Caucasus.

conicum Less., kegelförmige, ⊙. f. Asiat. Rufsland.

defloratum Engelm., blüthenarme, ⊙. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Pyrethrum

elongatum Fisch. et Mey., verlängerte, 4. f. Persien.

indicum Cass. (= *Arctotis elegans* Cass. = *Chrysanthemum indicum* L. = *Ch. japonicum* Thbg. = ? *Ch. procumbens* Lour. = *Ch. purpureum* P. = *Ch. tripartitum* Sweet).

Kirilowii Turcz., Kirilow's, ⊙. f. Baical.

macrophyllum W. (= ? *Achillea* Wendl. = ? *hybridum* Wender. = *Achillea macrophylla* Pill. et Mitterb., non L. = *A. sambucifolia* Dsf. = *A. sambucina* Thouin, = *Chrysanthemum macrophyllum* W. K. = *Gymnocline leucocephala* Cass. = *G. macrophylla* Bluff et Fingerh.).

multicaule W. (= *Chrysanthemum multicaule* Dsf.), vielstengelige, 4. f. b. k. Nordafrika.

myriophyllum C. A. Mey. (= *β Achillea bipinnata* L. = *Tanacetum myriophyllum* W. = *T. setaceum* Tausch), vielblätterige, 4. f. Caucasus.

pulchrum Ledeb., schöne, 4. f. Altaisches Sibirien.

pulverulentum Lagasca, (= *Chrysanthemum minimum* Brot. = *Ch. pallens* Lam. = *Ch. pallidum* Lag., Mill. = *Ch. pulverulentum* P. = *Matricaria minima* *β* Lam. = *M. pallida* Poir.).

sinense DC. (= *Anthemis artemisiaefolia* DC. = *A. grandiflora* DC. = *A. stipulacea* Mch. = *Chrysanthemum indicum* Thbg., Lour., non L. = *Ch. sinense* Sabin.). Gartenvarietäten: album semiduplex, atropurpureum, aurantiacum, aureum, bicolor, blandum, chryseides, chrysocomum, cupreum, discolor, expansum, fasciculatum, flammeum, fulvescens, fulvum, involutum, leucanthum, lilacinum, mutabile, ornatum, pallens, pallidum, papyraceum, parvulum, Parkii, purpurascens, purpureum, Sabini, salmoneum, serotinum, stellatum, stramineum, sulphureum, superbum, tesselatum, tubulosum, variabile, verecundum, versicolor, Waratah. Andere vergl. p. 670.

tanacetoides DC. (= *incanum* Ledeb. = *millefoliatum* Ledeb., non W.), rainfarrnähnliche, 4. f. Alt. Sibirien.

Tanacetum DC. (= *Balsamita major* Dsf. = *B. suaveolens* Dsf. = *B. vulgaris* W., p. 110, = *Chrysanthemum apetalum* Hort. = ? *Matricaria apetala* Hort. = *Tanacetum Balsamita* L.), Rainfarn-B., 4. f. Südeuropa.

trifurcatum W. (= *Chrysanthemum macrocephalum* Viv. = *Ch. trifurcatum* Dsf.).

uliginosum W. K. (= *Chrysanthemum uliginosum* P. = *Matricaria incisa-serrata* Poir.).

uniflorum Fisch. et Mey. (= ? *orientale* W.), einblumige, 4. f. Persien.

Unbestimmtere: heterospermum Brotero, lusitanicum Brotero, Maundianum Hort.

adauctum Lk. et *Broussonetii* *β* Chois. (= *grandiflorum* W. = *pinnatifidum* Chois. = *speciosum* W. = *coronopifolium* W. etc.), v. Chrysanthemum grandiflorum var. p. 193 et p. 141, II., *breviradiatum* Hort. (= *indicum* Roxb. = *senecioides* Dun.), v. Chrysanthemum Roxburghii, p. 193, *inodorum* Sm., *praecox* MB., v. Chamomilla inodora et praecox, p. 136, II., *ceratophylloides* W., *latifolium* W. Enum. (= *maximum* Hffg.), v. Chrysanthemum

Digitized by Google

Pyrethrum

Sect. II. latifolium, p. 193, *chrysanthemifolium* Hort. angler., v. Anthemis parthenioides Nachlese.

Pyrethrum Acmella Medic., *Spilanthus* Medic., v. Spilanthes Pseudacmella et oleracea, p. 778.

Pyrgosea Haw. (= *Purgosea* Sweet, = *Purgosia* Loud. = *Turgosea* Haw. = *Turgosia* Loud.), Dickblatt, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

aloides Haw. (= *Crassula aloidea* Ait.), aloëähnliches, ♂. k. t. Südafrika.

capitellata Haw. (= *Crassula capitella* L. fil. = *Crassula capitellata* DC.), kopfförmiges, ⊙. ♂. f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

corymbosula Loud. (= *pertusa* Haw. = *Aloe pertusa* Haw. = *Crassula corymbosula* Lk.), doldentraubiges, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

linguaefolia Haw. (= *Crassula linguaefolia* Haw. = *C. tomentosa* L. var.? Haw.), zungenblätteriges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

obovata Haw. (= *Crassula obovata* Haw.), verkehrteiförmiges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

sediflora Eckl., Zeyh. (= *Crassula sediflora* D. Dietr.), mauerpfefferähnliches, 4. ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

thyrsiflora Haw. (= *Crassula thyrsiflora* L. fil. = *Orostachys thyrsiflora* Fisch.), straufsblumiges, ♂. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tomentosa Haw. (= *Crassula tomentosa* L. fil. = *Sphaeritis tomentosa* Eckl., Zeyh.), filziges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Turrita Haw. (= *Crassula Turrita* Thbg.), thurmkrautartiges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Pyrola T., Wintergrün.

I. Genuina.

dentata Sm., gezahntes, 4. f. b. Nordamerika.

elliptica Nutt. (= *reticulata* Rafin.).

secunda L., *β)* hybrida Vill.

II. Chimophila Pursh, Nutt. (= *Chimaphila* Auct.).

Menziesii RBr., Menzies's, 4. f. b. Nordamerika.

Pyrolirion Herb., Flammenlilie, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

aureum Herb. (= *Amaryllis aurea* R. et P. = *A. peruviana* Lam., Ker, = *A. tubiflora* L'Herit.), goldfarbige, 4. Zw. w. Peru.

flammeum Herb. (= *Amaryllis flammea* R. et P., p. 44).

flavum Herb. (= *aureum* Bot. reg. = *Amaryllis flava* R. et P.), hellgelbe, 4. Zw. w. Peru.

tataricum Herb., v. Ixiolirion Pallasii Fisch., p. 327, II.

Pyrrhopappus DC., Flammenfederchen, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

carolinianus DC. (= *Barckhausia caroliniana* Nutt. = *Chondrilla laevigata* Pursh, = *Leontodon carolinianus* Walt. = *Scorzonera pinnatifida* Mchx.), carolinisches, 4. f. Nordamerika.

Pyrus T., L., Birne, Apfel.

I. Pyrophorum Neck. DC.

amygdaliformis Vill. (= *communis* Gou. = *cuneifolia* Guss. = *elaeagnifolia* Pall. var. Spgl. = *nivalis* Lindl. = *salicifolia* Loisel., non L.).

Digitized by Google

Pyrus

communis L. (= *Achras* G. = *Pyraster* Hort. = *sylvestris* Mch. = *Sorbus Pyrus* Crtz.). Var.: pompejana Hort., favoria Hort., valerna Hort., sinensis Hort. (non Lindl.), liquescens Hort., rufescens Hort., pyramidalis Hort. etc., vergl. p. 671.

crenata D. Don, (= *vestita* Wall.).

dasyphylla Borckh. (= *Pollveria* Lejeun., non L. = *communis* L. var. β *tomentosa* K. = *upsaliensis* Hort.), rauchblätterige, ♄. f. Siebenbürgen, Belgien.

elaeagnifolia Pall. (= *nivalis* Pall. = *orientalis* Hornem. = *persica* P. = *salicifolia* Habl.).

eriopleura Rchb. (= *parviflora* Welden), wollrippige, ♄. f. Dalmatien.

Michauxii Bosc, (= *sinaica* Guimp. et Heyn., non Thouin).

nepalensis Lodd., nepalsche, ♄. f. b. k. Nepal.

Pollveria L. (= *Bollwylleriana* DC. = *irregularis* Münchh., DuRoi, = *Pollvilleria* Hort. = *tomentosa* Mch. = *Lazarolus Pollvilleriana* Borckh.).

II. Malus T., Apfel.

angustifolia DC. (= *coronaria* Wangenh., non L. = *sempervirens* Dsf.).

baccata L. (= *microcarpa* Wendl., Mch. = *Malus sibirica* Borckh. = *Mespilus baccata* Dum.Cours.).

β) hyemalis, γ) major, δ) pyriformis, ε) xanthocarpa.

cerasifera Tausch, (= *Malus baccata* Loisel., Duham., non Dsf. = *Malus prunifolia* Dsf., non W.), kirschentragender, ♄. f. Sibirien.

Fontanesiana Spach, (= ? *M. astracanica* Dum.Cours. = *M. hybrida* Dsf., non Lois.), Desfontaine's, ♄. f. ?

heterophylla Spach, verschiedenblätteriger, ♄. f. ?

Malus L. (= *M. communis* Dsf. = *M. sylvestris* Mill., Mch. = *Sorbus Malus* Crtz.), α) mitis Wallr. (pommier à couteau), β) austera Wallr. (pommier à cidre), γ) paradisiaca Hort. (= *praecox* Pall., Borckh. Hort. = *pumila* Mill., Hort.), δ) prasomila Hort., ε) rubelliana Hort., ζ) cestiana Hort., η) cavillea Hort., ϑ) epirotica Hort., ι) apiosa Hort., κ) sinensis Hort., λ) upsaliensis Hort.

prunifolia W., γ) major Hort., δ) xanthocarpa Hort.

spectabilis Ait. (= *Malus sinensis* Dum.Cours. = *Mespilus spectabilis* Hort.), b) flore pleno.

tomentosa Dum.Dours., DC., filziger, ♄. f. Sibirien.

Unbestimmtere: canescens Spach, ceratocarpa Wender., florentina Tozzetti, glutinosa Madiot, graeca Hort., malifolia Spach, oblongifolia Spach, pensylvanica Fisch., sphaerocarpa Wender., suaveolens Wender.

Bartramiana Tausch, (= *Aronia praecox* Neum.), *Neumanniana* Tausch, (= *Aronia affinis* Neum.), *Wangenheimiana* Tausch, (= *P. Botryapium* Wangenh. = *Aronia nivea* Neum.), v. Amelanchier Nachlese, hinsichtl. d. übrig. vergl. Sorbus, p. 772.

Pythagorea cochinchinensis Lour., v. Blackwellia padifolia, p. 124.

Pythagorea alata Rafin., *linearis* Rafin., *virgata* Rafin., v. Lythrum alatum, lineare, virgatum, p. 486.

Pythion campanulatum Mart., v. Amorphophallus campanulatus, p. 33, II.

Digitized by Google

Pythonium Schott, Endl., Kunth, Drachenstaude, XXII rr., Aroideae.

Wallichianum Schott, (= *Thompsonia nepalensis* Wall.), Wallich's, 4. w. Nepal.

Hookeri Kunth, (= *Caladium petiolatum* Hook. bot. mag.), Hooker's, 4. w. Neuguinea.

Letztere wird von H. Prof. Kunth nur fraglich zu dieser Gattung gestellt.

bulbiferum Schott, Endl., v. Amorphophallus bulbifer, p. 33, 11. (= *Arum bulbiferum* Roxb., p. 85). *Pyxipoma polyandra* Fenzl, v. Trianthema polyandra.

Quadria heterophylla R. et P. (= *Avellana* G.), v. Guevina Avellana.

Qualea Aubl., Qualea.

coerulea Aubl., blaue, ħ. w. Guiana.

grandiflora Mart., grofsblumige, ħ. w. Brasilien.

macroptera Lk., A. Dietr., grofsflügelige, ħ. w. Brasilien.

rosea Aubl. (= ? *violacea* Mart. et Zuccar.), rosafarbige, ħ. w. Guiana, Brasilien.

Quamoclit T., Mch., Choisy, G. Don, Quamoclitwinde, V. r., Convolvulaceae.

angulata Boj. (= *Convolvulus angulatus* Spgl. = *Ipomoea angulata* Lam. = *I. dentata* W.), kantige, ☉. Sch. w. Mascarenas, Madagascar.

coccinea Mch. (= *Q. cholulensis, dichotoma* et *Ruiziana* G. Don, = *Convolvulus coccineus* et *cholulensis* Spgl. = *C. indivisus* Vellozo, = *Ipomoea coccinea* L., p. 419, = *I. stylosa* Hort. Madrit. = *I. cholulensis* et *dichotoma* H. B. K. = *I. acuminata* et *angulata* R. et P. = *I. dubia* R. et S. = *I. mexicana* et *erythraea* Moç. et Sess.), scharlachfarbige, ☉. Sch. m. f. Mittägl. Amerika, Georgia, Carolina, Java, Ostind.

β) luteola G. Don, (= *Ipomoea luteola* Jacq., p. 429), Guatimala, γ) pubescens Choisy, Cham. et Schltdl., Jalapa.

hederaefolia Choisy, G. Don, (= *hastigera* G. Don, = *pallescens* Auct. = *Convolvulus hederaefolius, hastigerus* et *sanguineus* Spgl. = *Exogonium curviflorum* Moç., Sess. = *Ipomoea hederaefolia* L., p. 419, = *I. sanguinea* Vahl, Ker, = *I. hastigera* H. B. K. = *I. Humboldtiana* R. et S. = *I.* ? *peduncularis* Bertol.), epheublätterige, ☉. Sch. m. f. Mexico, Brasilien, Guiana, Caribäen.

phoenicea Choisy, (= ? *Ipomoea angularis* W. = *I. phoenicea* Roxb., Wall. = *Convolvulus phoeniceus* Spgl.), hochrothe, ☉. Sch. w. m. f. Ostindien.

solanifolia Plum. (= *Convolvulus solanifolius* Spgl. = *Ipomoea solanifolia* L., non Burm., p. 421).

vitifolia G. Don, (= *globosa* G. Don, = *Calboa vitifolia* Cav. = *Macrostemma vitifolia* P. = *Exogonium umbellatum* Moç., Sess. = *Convolvulus Neei* Spgl. = *Ipomoea funis* ? Schltdl. et Cham. = ? *Morenoa globosa* Llav. et Lex.), weinblätterige, ♂. ☉. Sch. w. m. f. Mexico.

vulgaris Choisy, (= *pinnata* Boj. = *Ipomoea Quamoclit* L., p. 420, = *Convolvulus pennatifolius* Salisb. = *C. pennatus* Lam. = *C. Quamoclit* Spgl.), gefiederte, ☉. Sch. w. m. Ostindien, Mascarenas, Südamerika etc.

Digitized by Google

Quamoclit

Q. acutangula Choisy, (= *Convolvulus acutangulus* Spgl. = *Ipomoea acutangula* R. et P.), Peru, mutica Choisy, (= ? *Ipomoea serotina* R. et P.), Peru, sagittaefolia Choisy, (= *Ipomoea sagittaefolia* Burm., non Pursh, Ker, = *I. hastata* L. mant. = *Convolvulus javanicus* Garc.), Java, scheinen nicht kultivirt zu werden.

Als „species minus notae" werden dieser Gattung von Choisy Morenoa grandiflora Llav. et Lex. et globosa (vergl. Qaumoclit vitifolia Choisy) Llav. et Lex. zugetheilt. Vergl. p. 531.

leucantha G. Don, *triloba* G. Don, v. Ipomoea leucantha et triloba, p. 419 et 421, *longiflora* G. Don, v. Calonyction speciosum var. *α* p. 109, II., *Mina* G. Don, v. Mina lobata, p. 411, II., *serotina* G. Don, v. Pharbitis ? serotina, p. 509, II.

Quararibea turbinata Poir., v. Myrodia turbinata, p. 538.

Quercus T., L., Eiche.

acuminata Roxb. (= *glabra* Hamilt. herb.), zugespitzte, ħ. k. Ostindien.

acutifolia Nee, spitzblätterige, ħ. k. Neuspanien.

ambigua Humb. (non Mchx., W.), (= *Bonplandiana* Sw.).

Ballota Dsf. (= *Q. Ilex Brotero*).

β) rotundifolia Brotero.

calophylla Cham., Schltdl., schönblätterige, ħ. k. Mexico.

castaneaefolia C.A.Mey., kastanienblätterige, ħ. f. Caucasus.

chrysophylla H.B.K., goldblätterige, ħ. k. t. Neuspanien.

conferta Kit., Schult. (= ? *glomerata* Lam.), gedrängte, Slavonien.

confertifolia H.B.K., gedrängtblumige, ħ. k. t. Neuspanien.

crassifolia H. B. K. (= *pedunculatis* Nee, = *tomentosa* W.), dickblätterige, ħ. k. t. Neuspanien.

dilatata Lindl., Wall., verbreiterte, ħ. k. t. Ostindien.

Esculus L. (= *Secondati* P.).

exoniana Bosc, exonische, ħ. f. Nordamerika.

falcata Mchx. (= *discolor* Ait. ed. I. = *elongata* W. = *rubra montana* Marsh.), sichelförmige, ħ. f. Nordam.

β) triloba Mch. (= *cuneata* Wangenh.).

gemelliflora Blume, (= ? *spicata* Auct., non Wall., nec H. B. K.), paarblumige, ħ. t. Java.

Ghisebrechtii Hort. belg., Ghisebrecht's, ħ. k. t. Mexico.

glaberrima Blume, kahlste, ħ. t. Java.

glabra Thbg., kahle, ħ. k. Japan.

glauca Thbg., blaugrüne, ħ. k. Japan.

hispanica Lam. (= *aegilopifolia* P. = *crenata* Lam. = *exoniensis* Lodd. = *Lucombeana* Sweet, = *Pseudo-suber* Dsf.), spanische, ħ. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

humilis Lam. (= *Brossa* Bosc, = *fruticosa* Brotero, = *prasina* Bosc), niedrige, ħ. f. Spanien, Frankr.

insignis Hort. belg., ausgezeichnete, ħ. w. t. ? Ostindien.

Lezermiana Bosc, Poir. (= *Ilex* L. var. Spgl.), Lezermische, ħ. f. Südeuropa.

Lindleyana Wall., Lindley's, ħ. w. t. Ostindien.

lusitanica Lam. (= *australis* Lk. = *canariensis* W. = *faginea* Lam. = *hybrida* Brotero, = *Ilex* L. var. Spgl. = *infectoria* Oliv. = *Turneri* W. = *valentina* Cav.), portugiesische, ħ. f. h. k. Portugal, Spanien, canarische Inseln, Kleinasien.

Digitized by Google

Quercus

macranthera Fisch. et Mey., grofsbeutelige, ħ. f. Caucasus.
macrophylla Nee, grofsblätterige, ħ. t. Neuspanien.
mexicana H. B. K. (= *callosa* Hort. belg.).
Michauxii Nutt. (= *bicolor* W. = *discolor* Lodd. = *Prinus discolor* Mchx. fil. = *P. tomentosa* Mchx.), Michaux's, ħ. f. Nordamerika.
var. b. pendula (= *pannosa* Bosc).
mongolica Hort., mongolische, ħ. f. Mongolei.
nepaulensis Dsf., nepalsche, ħ. k. Nepaul.
obovata Bunge, verkehrteiförmige, ħ. f. China.
pendulina Kit., Schult., überhängende, ħ. f. Ungarn.
petiolaris Benth., gestielte, ħ. t. k. Mexico.
Phellos L., β) brevifolia Lam. (= *humilis* Wangenh.).
prasina P. (= *glauca* Bosc, = *pseudococcifera* Dsf. var.? P.), lauchgrüne, ħ. f. b. k. Spanien.
Prinus L. (= *platanoides* Lam.).
Pseudo-coccifera Dsf. (= *coccifera* L. var. Spgl.), unächte Kermes-E., ħ. k. f. b. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
pubescens W. (= *hungarica* et *pannonica* Hort.).
repanda H. B. K., ausgeschweifte, ħ. t. k. Neuspanien.
Robur L. suec. (= *sessiliflora* Sm.), e) subintegra, f) variegata.
rotundifolia Lam. (= *Ilex* L. var. Gmel. Spgl.), rundblätterige, ħ. k. f. b. Spanien.
rugosa Nee, runzelige, ħ. t. k. Neuspanien.
salicifolia Nee, weidenblätterige, ħ. t. k. Neuspanien.
Sideroxylon H. B. K., Eisenholz-E., ħ. t. k. Neuspanien.
spicata H. B. K. (= *Bonplandiana* Sweet).
squamata Roxb. (= *spicata* Wall., non H. B. K.), schuppige, ħ. t. k. Nepal.
sublobata Kit., Schult. (= ? *Robur platyphylla* Lam.), fastgelappte, ħ. Ungarn.
Tauzin P. (= *Cerris* γ DC. = *crinita* ε Lam. = *humilis* Bosc, = *nigra* Thore, = *pubescens* Brotero, non W. = *pyrenaica* W. = *stolonifera* Lapeyr. = *Tauza* Dsf. = *Toza* Bosc), mähnige, ħ. f. Frankr., Spanien.
Tournefortii W. (= *Cerris* Oliv. = *crinita* Oliv., Sibth., Sm. = *haliphleos* Bosc), Tournefort's, ħ. f. Armenien, Griechenland.
undulata Torrey, wellenblätterige, ħ. f. Nordamerika.
villosa Walt., zottige, ħ. f. Carolina.
virens Ait. (= *obtusifolia* Lam. = *Phellos* β L. = *sempervirens* Walt. = *virginiana* Mill.).
xalapensis H. B. K., xalapaische, ħ. t. k. Mexico.

Aufser diesen führen die Pflanzen-Cataloge der belgischen Gärten noch eine castaneifolia du Mexique (= *dealbata* Hort.) und Skinneri auf, wahrscheinlich letztere auch in Mexico heimisch.

Unbestimmtere: abelicea Lam., candida Hort., expansa Poir. (= *Ilex* L. var. Spgl.), lobulata Sm. Nordamerika, paleacea Desv., Phellodrys Lk.

Queria L., Querie, p. 674.

chilensis Steud. et Hochst. (= *Donatia fascicularis* Bertero), chilesische, ⊙. f. Chili.
hispanica L. (= *Alsine hispanica* Fenzl).
canadensis L., *capillacea* Nutt., v. Paronychia dichotoma et β capillacea, p. 477, II.

Digitized by Google

Quillaia Molina, (? einheimischer Name), M. VI, Rosaceae.

Smegmadermos DC. (= *Q. Saponaria* Poir. = *Smegmadermos emarginata* R. et P. = *Smegmaria emarginata* W.), seifegebende, ħ. t. Chili.

Quinaria Lancium Lour., v. Cookia punctata.

Quisqualis L., Röhrenkelch.

sinensis Lindl. (= ?*indica* Lour.), indischer, ħ. Sch. w. China.

villosa Roxb. (= *indica* L. var. W. A.), zottiger, ħ. Sch. w. Pegu.

Quivisia Commers., Quivisie.

oppositifolia Cav. (= *Gilibertia oppositifolia* W.), gegenblätterige, ħ. w. Mascarenas.

ovata Cav. (= *heterophylla* Sieb. = *Gilibertia ovata* W. = *G. rutilans* Sm.), eiförmige, ħ. w. Mascarenas.

racemosa P. (= *decandra* Cav. = *Gilibertia decandra* W.), traubige, ħ. w. Mascarenas.

Radicula Hall., Mch., *lancifolia* Mch., *palustris* Mch., *pinnata* Mch., v. Nasturtium amphibium, palustre, sylvestre, p. 543.

Radiusia Rchb. (Dr. Radius, Prof. d. Medicin zu Leipzig), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides Rchb., Endl. (= *Pseudosophora alopecuroides* Sweet, = *Sophora alopecuroides* L., p. 772, = *S. albicans* Jaum.).

chinensis * (= *Sophora chinensis* Lodd.), chinesische, ♃. ħ. f. b. China.

flavescens Endl. (= *Sophora flavescens* Ait., p. 772, = *S. glabra* Mch. = *S. macrosperma* Jaum.).

galegoides * (= *Sophora galegoides* Pall. = *S. flavescens* β DC.).

sericea * (= *Sophora sericea* Nutt., p. 772, non Andr. et Jaum. = *Astragalus carnosus* Pursh, non Nutt. = *Pseudosophora sericea* Sweet).

Rafnia Thbg., Rafnie.

cordata Mart. (= ?*Hallia cordata* Thbg.).

filifolia Thbg. (= *angulata* γ E. Mey.), fadenblätterige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.

triflora Thbg. (= *diffusa* Eckl., Zeyh. = *intermedia* Vogel, = *Borbonia cordata* Andr. = *B. triflora* Hort. = *Crotalaria triflora* L.).

Ramondia Rich., p. 675, Cyrtandraceae DC.

pyrenaica Rich. (= *R. Myconi* Rchb. = *scapigera* St. Hil. = *Chaixia Myconi* Lapeyr. = *Myconia boraginea* Lapeyr. = *M. pyrenaica* Auct. = *Verbascum Myconi* L.).

Rancagua Poepp. et Endl., Rancagua, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

Bridgesii Poepp., Endl. (= *Lasthenia Bridgesii* Steud. = *L. obtusifolia* β *Bridgesii* DC.), Bridges's, ☉. f. Chili.

Feuillei Poepp., Endl. (= *Lasthenia obtusifolia* Cass. = *Tagetes Feuillei* Bertero, Colla), Feuillée's, ☉. f. Chili.

Randia L., Randie.

aculeata L. (= *latifolia* Lam. = *Gardenia aculeata* Ait. = *G. lycioides* Hort. = *G. Randia* Sw.), β) mitis L. (= *Gardenia Randia* β *mitis* Sw.).

Digitized by Google

Randia

armata DC. (= ? *Foscarenia spinosa* Vand. = *Gardenia armata* Sw. = *G. tetracantha* Lam., non Cav. = *Mussaenda spinosa* L.), bewaffnete, ♄. w. Ostindien.

capitata DC., kopfförmige, ♄. w. Mexico.

dumetorum Lam. (= *spinosa* Blume, = *Canthium coronatum* Lam. = *Ceriscus malabaricus* G. = *Gardenia dumetorum* Retz, = *G. spinosa* L. fil. = *Posoqueria dumetorum* Roxb.), Hecken-R., ♄. w. Ostindien.

longiflora Lam. (= ? *sinensis* R. et S. = *Gardenia multiflora* W. = *Posoqueria longiflora* Roxb. = *P. multiflora* Blume).

longispina DC. (= *Gardenia longispina* Spgl. = *Posoqueria longispina* Roxb.), langdornige, ♄. w. Ostindien.

Mussaenda DC. (= *Gardenia maritima* Vahl, = *G. Mussaenda* L. = *Mussaenda formosa* Jacq.), Mussaenda-R., ♄. w. Südamerika.

nutans Roxb. (= ? *Ceriscus malabaricus* G. = *Gardenia nutans* Spgl. = *Posoqueria nutans* Roxb.), nickende, ♄. w. Ostindien.

obovata H. B. K. (non R. et S.), verkehrteiförmige, ♄. w. Neugranada.

oxypetala Lindl., spitzkronige, ♄. w. Ostindien (Saharumpur).

parviflora Lam. (= ? *Gardenia micrantha* Thbg. = *G. Sonneratii* Spgl.).

propinquua G. Don, (= *Gardenia propinqua* Lindl.), verwandte, ♄. w. ?

pubescens R. et P. (= *obovata* R. et P. = *Gardenia obovata* Dietr.), weichhaarige, ♄. w. t. Peru.

rigida DC. (= *Gardenia spinosa* Thbg.), starre, ♄. t. Nepal.

stricta Roxb. (= *Hyptianthera stricta* W. A. = *Macrocnemum strictum* W. = *Rondeletia stricta* Roth), steife, ♄. w. Bengalen.

tetracantha DC. (= *Gardenia armata* Bartl. = *G. tetracantha* Spgl. = *Mussaenda tetracantha* Cav.), vierstachelige, ♄. w. Südamerika.

uliginosa DC. (= *Gardenia uliginosa* Retz, = *Posoqueria uliginosa* Roxb.), sumpfliebende, ♄. w. Coromandel.

malabarica Lam., v. Griffithia fragrans, p. 275, II., *racemosa* Roxb., v. Petunga Roxburghii Nachlese.

Ranunculus C. Bauh., T., Ranunkel.

I. Batrachium DC., Godron, Dumort., Wasserranunkel.

aquatilis L. (= *capillaris* Gater. = *diversifolius* Gilib., Schrk. = *heterophyllus* Hoffm.), *β*) peltatus Mch., Schrk., *γ*) capillaceus Thuill., Hoffm. (= *flaccidus* P. = *foeniculaceus* Gilib. = *pantothrix α capillaceus* DC. = *pectinatus* Duby, = *trichotomus* Chaix., Vill. = *tripartitus* Nolte, non DC.), *δ*) paucistamineus DC., *ε*) Bauhini Tausch).

Boudotii Godr., Boudot's, 4. Wa. f. Elsafs, Lothringen.

divaricatus Schrk. (= *abrotanifolius* Auct. etc., p. 676). *β*) caespitosus Thuill.

fluitans Lam., hederaceus L. (= *hederaefolius* Salisb.).

Lenormandii Schultz, (= *tripartitus* Lenorm., non DC.), Lenormand's, 4. Wa. f. Frankreich, Spanien.

longirostris Godr., langschnäbelige, 4. Wa. f. Missouri.

Digitized by Google

Ranunculus

marinus Fr., meerliebende, 4. Wa. f. Schweden.
rigidus Godr. (non Hoffm.), starre, 4. Wa. f. k. Cap der guten Hoffnung.
tripartitus DC. (= *aquatilis* L. var. Spgl. = *hederaceus* β DC. syn.).

II. Ranunculastrum DC. etc., Hahnenfuß, Ranunkel.

aconitifolius L., δ) platanifolius L. (= *palmatus* Mauritii), ε) dealbatus Lapeyr.
alpestris L. (= *crenatus* Baumg. = *magellensis* Tenore).
amoenus Ledeb., lieblicher, 4. f. Altaisches Sibirien.
amplexicaulis L. (= *plantaginifolius* Salisb.).
arachnoideus C. A. Mey., spinnewebiger, 4. f. Caucasus.
belgicus Stoffels, Dumort., belgischer, 4. f. Belgien. (Wahrscheinlich Hybride von graminifolius und platanifolius).
binatus Kit., zweizähliger, 4. f. Siebenbürgen.
bonariensis Poir. (= *heterophyllus* Sm. = *phyteumaefolius* Spgl. = *Casalea ficariaefolia* St. Hil.).
bulbosus L. (= *flabellatus* Bivone, = *lastus* Salisb.).
chinensis Bunge, chinesischer, 4. f. China.
constantinopolitanus d'Urv. (= *lanuginosus* γ DC.), constantinopolitanischer, 4. f. Constantinopel.
cortusaefolius W. (= *creticus* var. b. Biria, = *boucheraefolius* Presl, = *Tenoriffae* P.).
Cymbalariae Pursh, (= *hederaceus* Pall. = *nanus* Fisch. = *saxifragaefolius* Stephan.).
flabellifolius Heuff., fächerblätteriger, 4. f. Ungarn.
glacialis L., γ) gelidus Hffg.
Hornemanni Schltdl. (= *tuberosus* Hornem., non Lapeyr.).
insubricus Cesati, mailändischer, 4. f. Mailand.
lasiocarpus C. A. Mey., wollfrüchtiger, 4. f. Alt. Sibirien.
lateriflorus DC. (= *Nendtwichii* Frivald. = *nodiflorus* L. var. Spgl.), seitenblumiger, ☉. f. Orient.
lomatocarpus Fisch. et Mey. (= *tuberculatus* C. A. Mey.).
longicaulis C. A. Mey., langstengeliger, 4. f. Alt. Sibirien.
major Dumort. (= *acris* L. var. ?), großer, 4. f. Belgien.
montanus W. (= *nivalis* Jacq. = *polymorphus* Roch.), β) gracilis Schlchr. (= *tenuifolius* Schlchr.), γ) Gouani Auct. (= *trilobatus* Kit.).
muricatus L. (= *lobatus* Mch.), δ) ventricosus Vent.
neapolitanus Tenore, neapolitanischer, 4. f. Neapel.
nepalensis Spgl. (= *nepaulensis* DC. = *trilobatus* Don), nepalscher, 4. f. b. k. Nepal.
nitidus Mühlbg., Hook. (= *carolinianus* DC. = *septentrionalis* Pursh), glänzender, 4. f. Nordamerika.
obtusifolius Hornem., stumpfblätteriger, 4. f. Spanien.
ophioglossifolius DC. (= *cochlearifolius* Hornem. = *cordifolius* Bast. = *fistulosus* Brign. = *humilis* P. = *minimus* Hortul. = *ophioglossoides* W. = *pusillus* Poir. = *telonensis* Robert), β) uliginosus Tenore.
palustris L., Sm. (= *corsicus* DC.), Sumpf-R., 4. f. Orient, Corsica.
pensylvanicus L. (= *canadensis* Jacq. = *triflorus* Mch.).
platyspermus Fisch., breitsaamiger, 4. f. Alt. Sibirien.
propinquus C. A. Mey., verwandter, 4. f. Alt. Sibirien.
pulchellus C. A. Mey., schöner, 4. f. Altaisch. Sibirien.
radicans C. A. Mey. (= *Purshii* Hook.), starkwurzelnder, 4. f. Altaisches Sibirien.

Digitized by Google

Ranunculus

rhoeadifolius DC., klatschrosenblätteriger, 4. k. Mogador. Canarische Inseln.

salsuginosus Pall. (= *plantaginifolius* Murray, = *ruthenicus* Jacq.).

segetalis Kit., Saat-H., ⊙. f. Ungarn.

spicatus Desf., ährenförmiger, 4. k. f. b. Portugal, Algier.

Thomasii Tenore, Thomas's, 4. f. Italien.

tomentosus Poir. (= *lanuginosus* var. Pursh, = *sanicaefolius* Mühlbg.), filziger, 4. f. Carolina.

trilobus Desf. (= *ammoides* Pall. = *parviflorus* L. var. Bivone, = *Rosani* Tenore, = *verrucosulus* Poir.).

tuberculatus Kit., C. A. Mey. (= *arvensis* L. var. Spgl.), höckeriger, ⊙. f. Ungarn, Caucasus, Taurien.

velutinus Tenore, sammthaariger, 4. f. Neapel.

Nicht hinlänglich bekannte: depressus Fisch., fruticosus Hort., triternatus Sm. (= *Commersonii* Poir.).

Rapa Adans., Mill., *Napus* Mill., *oblonga* Mill., *rotunda* Mill., v. Brassica Napus, Rapa, oleracea, p. 130.

Raphia P., Beauv., Nadelpalme, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

Ruffia Mart. (= *Metroxylon Ruffia* Spgl. = *Sagus Ruffia* Jacq.), madagascarische, ħ. w. Madagascar.

vinifera P. Beauv. (= *Metroxylon viniferum* Spgl. = *Sagus Palma-Pinus* G. = *S. Raphia* Poir. = *S. Ruffia* β W. = *S. vinifera* P.), weingebende, ħ. w. Südamerika.

Raphidophora Hassk., Nadelträger, XXI. IX., Aroideae.

lacera Hassk., schlitzblätteriger, 4. ħ. w. Java. (Ob kult.?)

Raphiolepis Lindl., Hagestrauch.

japonica Sieb. et Zuccar., japanischer, ħ. ħ. k. Japan. (Ob kultivirt?)

Mertensii Sieb. et Zuccar., Mertens's, ħ. ħ. k. Japan. (Ob kultivirt?)

phaeosteinon Lindl. (= *indica* Bot. reg., non Lindl. = = *Loureiri* Spgl. = *Crataegus indica* Lour., non L.).

Raphisanthe lateritia Lilja, v. Cajophora lateritia, p. 103, II.

Rapistrum Boerh., Rapsdotter.

clavatum DC. (= *Cakile clavata* Spgl. = *Myagrum clavatum* Poir.), keulförmiger, ⊙. f. Syrien.

hirtum Host, (= *rugosum* All. var. K.), rauhhaariger, ♂. f. Steyermark.

rugosum All., Berg. (= *hirsutum* Host, = *Arthrolobus rugosus* Andrzy, = *Cakile rugosa* L'Her. = *Myagrum orientale* Pall. = *M. rugosum* L.).

arvense All. (= *Raphanistrum* Crantz), v. Raphanistrum arvense, *bursaefolium* Berg., v. Calepina Corvini, *filiforme* Mch., *hispanicum* Medic. (= *scabrum* Mch.), v. Crambe filiformis et hispanica, *glandulosum* Berg., v. Laelia orientalis, p. 340, II., *maritimum* Berg., v. Cakile maritima, *perfoliatum* Berg., v. Myagrum perfoliatum.

Rapunculus Hall., Mill., Mch., *comosus* Mill., *hemisphaericus* Mill. etc., v. Phyteuma comosum, hemisphaericum etc.

Rapuntium Mill., *acuminatum* Presl, v. Lobelia, Sect. XII. Tupa acuminata, p. 473, *amoenum* Presl etc., v. Lobelia amoena etc.

Digitized by Google

Rauwolfia Plum., Rauwolfie.

canescens L. (= *hirsuta* Jacq. = *subpubescens* L.).

nitida L. (= *nitidissima* Jacq.).

psychotrioides H. B. K. (= ? *nitida* L. = *viridis* W. herb.), psychotriaähnliche, ♄. w. Südamerika.

Ravenalia Adans., Sonner., Ravenalie, VI. 1., Scitamineae.

guyanensis Rich. (= ? *amazonica* Hort.), guyanische, 4. ♄. w. Guyana.

madagascariensis Sonner., Poir. (= *Uranie madagascariensis* Räusch. = *U. Ravenalia* Rich. = *U. speciosa* W.), madagascarische, 4. ♄. w. Madagascar.

Razoumowskia caucasica Fisch., v. Viscum Oxycedri, p. 852.

Razumowia paniculata Spgl., v. Humea elegans.

Reaumurea L.

hypericoides W., p. 679, (= *cistoides* Adam, = *linifolia* Salisb. = *verniculata β latifolia* MB. = *Hypericum alternifolium* LaBill.).

Reboulea Kunth, (Reboul, franz. Botaniker), III. II., Gramineae.

gracilis Kunth, (= *Aira mollis* Mühlbg. = *A. nitida* Spgl. mant. = *A. obtusata* Mchx. = *A. pensylvanica* Spgl. = *A. truncata* Mühlbg. = *Airopsis obtusata* Desv. = *Eutonia purpurascens* Rafin. = *Koeleria pensylvanica* DC. = *Poa obtusata* P. Beauv. = *Trisetum lobatum* Trin. = *T. pensylvanicum* Trin.), schlanke, 4. f. Nordamerika.

Redoutea heterophylla Vent. = Fagosia heterophylla, p. 250, II.

Regelia J. C. Schauer, (Eduard Regel, *Inspector* am botan. Garten zu Zürich), XVIII. II., Myrtaceae.

ciliata J. C. Schauer, (= *Melaleuca sprengelioides* DC.), gewimperte, ♄. t. k. Westl. Neuholland.

Reichardia hexapetala Roth, (= *decapetala* Wight), v. Pterolobium lacerans, p. 570, II.

Reichardia integrifolia Mch. (= *picroides* Roth), *runcinata* Mch. (= *tingitana* Roth), v. Picridium vulgare et tingitanum, p. 623.

Reimaria elegans Flügge, v. Paspalum pulchellum, p. 479, *fasciculatis* Lk., *purpurascens* Lk., v. Panicum Schraderi et denudatum, p. 475 et p. 474, II.

Reinwardtia Dumort. (non Spgl.), *indica* Dumort., v. Linum trigynum, p. 468.

Relhania L'Her., Relhanie.

microphylla L'Her., kleinblätterige, ♄. k. Cap d. g. H.

paleacea L'Her. (= *ericoides* Cass. = *Eclopis paleacea* G. = *Leyssera ericoides* Berg. = *L. paleacea* L.).

squarrosa L'Her. (= *Athanasia squarrosa* L. = *Santolina squarrosa* L. amoen.).

cuneata L'Her., *pungens* Ker, v. Eclopes cuneata et trinervis, p. 217, II.

Remijia DC., Remijia, V. 1., Rubiaceae.

Hilarii DC. (= *Cinchona Remijiana* St. Hil.), Hilar's, ♄. w. Brasilien.

Remusatia Schott, Endl. (Rémusat, berühmter Orientalist, † 1832 in Paris).

vivipara Schott, (= *Arum viviparum* Roxb. = *Caladium viviparum* N. E. = *Maravara Tsjembo* Rheede), lebendiggebährende, 4. w. Malabar, Nepal.

Digitized by Google

Renanthera Lour., Lindl., Strauchstendel, XX. 1, Orchideae.

elongata Lindl. (= *Aerides elongata* Blume), verlängerter, 4. w. Java.

matutina Lindl. (= *Aerides matutina* Blume), frühblühender, 4. w. Java, Philippinen.

Renealmia RBr., *grandiflora* Banks, *paniculata* RBr., *pulchella* RBr., v. Libertia grandiflora, paniculata, pulchella, p. 461.

Renealmia capensis Houtt., v. Villarsia ovata, p. 848.

Renealmia calcarata Andr. (= *minor* Dsf.), *mutica* Salisb., *nutans* Andr., v. Alpinia calcarata, mutica, nutans, p. 37 et 38.

Requienia DC., Requinie.

sphaerosperma DC. (= *Borbonia sphaerosperma* Spgl.), kugelsaamige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Reseda T., Reseda.

crystallina Webb, crystallartige, ⊙. f. Canarische Inseln.

globulosa Fisch. et Mey., kugelige, ♂. f. Caucasus.

gracilis Tenore, schlanke, 4. f. Neapel.

incisa Tenore, geschlitzte, ⊙. f. Süditalien.

inodora Rchb., *β)* macrocarpa Fisch. et Mey. (= *macrosperma β natalica* Fisch. et Mey.), Süd- und Osteuropa.

laevigata G. Don, glatte, ♂. f. Aegypten.

lutea L. (= *undulata* Habl. = *vulgaris* Mill.).

β) crispa Mill.

macrosperma Rchb., grofssaamige, ⊙. f. Portugal.

mediterranea L. (= *difformis* Mch. = *hexagyna* Forsk.).

Phyteuma L. (= *calycinalis* Lam. = *media* Lagasca).

podocarpos Vivian. (= *canescens* Fresen. = *hexagyna* Forsk.), fufsfrüchtige, ♂. f. Aegypten.

undata L. (= *alba* L. var. Delil. = *bipinnata* W. En. = *decussiva* Forsk. = *ochracea* Mch.).

Clusii Spgl. (= *stellata* Lam.), *sesamoides β* DC. (= *purpurascens* L.), v. Astrocarpus sesamoides et purpurascens, p. 53, II., *subulata* Delile, (= *dipetala* Ait.), v. Oligomeris glaucescens, p. 447.

Retama Boiss., Retamaginster, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angulata Griseb. (= *Genista parviflora* DC. = *Spartium angulatum* L.), kantiger, ♄. f. b. Bithynien.

monosperma Boiss. (= *Genista monosperma* Lam. = *Spartium Clusii* Spach, = *S. monospermum* L. ex parte, Bot. mag.), einsaamiger, ♄. f. b. Spanien, Portugal.

sphaerocarpa Boiss. (= *Spartium sphaerocarpum* L. mant.), kugelfrüchtiger, ♄. f. b. Südeuropa.

Retzia Thbg., Retzie.

roelloides Spgl. (= *Polemonium roelloides* Thbg.), roellaähnliche, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

spicata Thbg. (= *capensis* Thbg.).

Reuteria Boiss., (F. G. Reuter, Conservator d. Boissierschen Herbariums), V. II., Umbelliferae.

Fontanesii Boiss. (= *Pimpinella lutea* Dsf., p. 624), Desfontaine's, ♂. 4. f. b. Nordafrika.

Rhabarbarum palmatum Mch., *Rhaponticum* Mch., *Ribes* Mch., v. Rheum palmatum, Rhaponticum, Ribes.

Rhabdotheca soncheides Cass., v. Microrhynchium nudicaule, p. 407, II.

Digitized by Google

Rhagadiolus T., Sichelsalat.

edulis G. (= *intermedius* Tenore, = *lampsanifolius* Mirb. = *lampsanoides* Dsf. = *stellatus* MB., G. var. DC. = *Lapsana lampsanaefolia* Mill. = *L. Rhagadiolus* L. = *L. stellata* Pall.).

Koelpinia Lam. (= *Koelpinia linearis* Pall. = *Lapsana Koelpinia* L.), gleichbreitblätteriger, ⊙. f. Caucasus, Sibirien.

stellatus G. (= *Lapsana stellata* L.).

Rhagadiolus creticus All., *Hedypnois* All., *radiata* All., *scaber* All., v. Hyoseris cretica, Hedypnois, radiata, scabra, *R. taraxacoides* All., v. Thrincia hispida, *R. Zazintha* All., v. Zazintha verrucosa. *Rhamnoides Hippophae* Mch., v. Hippophae rhamnoides.

Rhamnus T., L., Juss., Wegdorn.

Alaternus L., *β*) balearicus H. Par. (= *rotundifolius* Dum.Cours.).

alnifolius L'Her. (= *franguloides* Mchx. = ? *Frangula americana* Mill.).

alpinus L. (= *Frangula latifolia* Mill.), *β*) hydriensis Hacq.

cuneatus Hook., keilförmiger, ħ. f. Californien.

infectorius L. (= *R. Lycium* Scop. = *minor* Mill. = *saxatilis* Hort.).

integrifolius DC. (= *coriaceus* Brouss., N. E. = *R. Teidis* Brouss. = *Condalia coriacea* Rchb.).

oleaefolius Hook., ölbaumblätteriger, ħ. f. Californien.

Pallasii Fisch. et Mey. (= *Erythroxylon* MB., non Pall. = *lycioides* Pall., non L.).

persicaefolius Moris, (= *amygdalinus* Moris), pfirsichblätteriger, ħ. f. Sardinien.

prunifolius Sib., Sm. (= ? *amygdalinus* Dsf.), pflaumenblätteriger, ħ. f. b. Creta.

pumilus L. (= *repens* Hort. ? = *hydriensis* Hacq. = *Frangula rotundifolia* Mill.). *β*) rupestris Vill.

pusillus Tenore, (= *pumilus δ neapolitanus* DC.).

terniflorus Moç., Sess., dreiblumiger, ħ. k. Mexico.

Wulfenii Hoppe, (= *pumilus* Wulff. = *pumilus* var. *ε* DC. = *rupestris* Scopol., non Vill. = *Frangula Wulfenii* Rchb.), Wulfen's, ħ. f. Oestreichisches Litorale.

Unbestimmt: virginicus Page.

theezans L. (= *R. Thea* Osb.), v. Sageretia theezans, *umbellatus* Cav., v. Karwinskia umbellata, p. 333, II.

Rhaphiodon Schauer, Nadelkraut, XIV. II., Verbenaceae.

Echinus Schauer, (= *Lippia Echinus* Spgl. = *Zappania Echinus* Mart.), igelstacheliges, 4. w. Brasilien.

Rhaphiolepis Lindl. = Raphiolepis.

Rhapis L. fil., Fächerpalme.

cochinchinensis Mart. (= *Chamaerops cochinchinensis* Mart.), cochinchinaische, ħ. w. Cochinchina.

Die Pflanzen-Verzeichnisse der belg. Gärten führen noch eine R. Sierotsik auf, ob in Japan heimisch?

arundinacea Ait., v. Chamaerops Hystrix, p. 136, II.

Rhaponticum Scop., DC., Flockendistel.

atriplicifolium DC. (= *Carduus atriplicifolius* Trevir. = *Cirsium atriplicifolium* Fisch. = *C. filifolium* Fisch. = *Onopordon deltoides* Ait. = *Silybum atri-*

Digitized by Google

Rhaponticum

plicifolium Fisch. = *Stemmacantha ficifolia* Turcz. = *Stephanocoma atriplicifolia* Turcz.).

cynaroides Less. (= *Cnicus centaureoides* L. = *Cnicus Cynara* Lam. = *Serratula cynarifolia* Poir. = *S. cynaroides* DC. = *Stemmacantha cynaroides* Cass.), *β*) inerme * (= *Carduus inermis* P. = *Cirsium inerme* Lk. = *Cnicus inermis* W. = *Serratula inermis* Poir.).

dahuricum Fisch., Sweet, dahurische, 4. f. Dahurien.

doronicaefolium Fisch., Sweet, gemswurzblätterige, 4. f. Sibirien.

ficifolium Fisch., feigenblätterige, 4. f. Sibirien.

nitidum Fisch., glänzende, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

Rheum L., Rhabarber.

crassinervium Fisch., Lindl., dicknerviger, 4. f. ?

dentatum Mart., gezahnter, 4. f. ?

leucorrhizon Pall. (= *compactum* L. var. Spgl. = *nanum* Sievers).

Rhaponticum L. (= *sibiricum* Pall. = *undulatum* Pall.).

rotundifolium Fisch., rundblätteriger, 4. f. ?

rugosum Dsf., runzeliger, 4. f. ?

soongaricum Fisch. et Mey., soongarischer, 4. f. Soongaria.

tetragonopus Mart., vierkantigstieliger, 4. f. ?

Rhexia P. Br., Rhexie.

glabella Mchx., kahle, 4. k. Carolina, Georgia.

jussiaeoides L. fil., Jussiaeaähnliche, ♄. w. Surinam.

lutea Mchx. (= *linearifolia* Poir.), gelbe, 4. k. Florida, Georgia.

Nicht hinlänglich bekannte: aspera Voigt, cognata Weinm., Venezuela Hort.

canescens Bonpl., *cardinalis* Bonpl., *hypericoides* W., v. Chaetogastra canescens, cardinalis, hypericoides, p. 135, II., *grandifolia* Schltdl., *inaequilateralis* Cham., Schltdl., v. Centradenia grandifolia, inaequilateralis, p. 142, II., *imbricata* Thbg. (= *blepharocentra*, *ciliata* et *floribunda* Mart.), *alba* Schrk., Mart., *pulcherrima* Schrk., Mart., v. Lavoisiera imbricata, alba, pulcherrima, p. 346, II., *holosericea* Bonpl., *Fothergillae* Schrk., *viminea* Spgl. etc., v. Lasiandra argentea, Fothergillae, coerulea etc., p. 344, II., *Fontanesii* Bonpl. (= *alata* Raddi, = *dasystaminea* Schrk.), v. Pleroma Fontanesianum, p. 539, II., *diversifolia* Domb., v. Heteronema diversifolium, p. 298, II., ?*variabilis* Mart. (= *cordata* Spgl. = *venusta* Mart.) etc., v. Microlicia cordata etc., p. 406, II., *quadrivalvis* Mart., *excorticata* Mart. etc., v. Marcetia glandulosa, excorticata etc., p. 386, II., *semiserrata* Schrk., Mart., v. Huberia semiserrata, p. 306, II., *Hilariana* H. B. K. (= *galioides* Mart., Schrk. = *suberosa* Spgl.), v. Rhynchanthera Hilariana.

Rhigozum Burch. (= *Rhizogum* Rchb.), Büschelblatt, XIV. 11., Bignoniaceae.

obovatum Burch., verkehrteiförmiges, ♄. t. k. Cap d. g. H.

trichotomum Burch. (= *brachiatum* E. Mey.), dreizinkiges, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Rhinacanthus N. E., communis N. E., v. Justicia, Sect. XI., p. 435.

Digitized by Google

Rhinactina Less., Spornstrahl, XIX. n.; Compositae-Corymbiferae.

limonifolia Less. (= *Aster obovatus* C. A. Mey.), wegerichaelkenblätteriger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

uniflora Bunge, (= *Aster arenophilus* Bunge), einblumiger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Rhinanthus L., MB., Nasenblume.

orientalis L., morgenländische, ⊙. f. Caucasus, Kleinasien. Hinsichtl. d. übrigen s. Alectorolophus u. Trixago.

Rhipsalis G., DC., v. Cactoae Sect. XII., p. 784 et p. 98, 99, H.

Rhizobolus G., *glaber* Correa, (= *Souari* Auct.), *Pekea* G. (= *tuberculosum* Räusch.), v. Caryocar glabrum et tomentosum, p. 168.

Rhizobotrya Tausch, Wurzelträubchen, XV. n., Cruciferae.

alpina Tausch, (= *Draba Rhizobotrya* Steud. = *D. stellata* Sieb., non Jacq.), Alpen-W., 4. f. Oestreichische Alpen.

Rhodax Chamaecistus Spach, *dichotomus* Spach, *polyanthos* Spach, v. Helianthemum Rhodax, dichotomum, polyanthum, p. 389 et p. 288, H.

Rhodea Endl. = **Rohdea** japonica, p. 693.

Rhodiola L., Rosenwurz.

asiatica Don, (= *Sedum asiaticum* DC.), asiatische, 4. k. f. b. Nepal.

elongata Schrenk, C. A. Mey. (= *Sedum elongatum* Ledeb. = *S. Ledebourii* Hort. Berol.), verlängerte, 4. f. Soongaria.

rosea L. (= *odorata* Lam. = *officinarum* Crtz. = *Sedum Rhodiola* DC. = *S. roseum* Scop.).

β) minor Mill.

sibirica Fisch. (= *Sedum altaicum* Don).

Rhodochiton Zuccar., Rothhülle, XIV. n., Personatae-Antirrhineae (Scrofularineae).

volubile Zuccar. (= *Lophospermum atrosanguineum* Zuccar. = *L. Rhodochiton* D. Don), windender, ħ. ħ. Sch. k. Mexico.

Rhododendron L., Alpenrose (Alpenbalsam).

I. Buramia DC. (= *Booram* D. Don).

arboreum Sm. Var. u. Hybriden: Alberti, album Wall., (= *ferrugineum magnum*, = *niveum* Sweet), albidum, Admiral de Ruyter, Berg Vesuvius, biburgense, Boddaertii, Boerhavei, Beauté de Flandre van Houtte, cardinale Knight, Carmin duc d'Arenberg. cinnamomeum Lindl. fl. roseis, cinnamoemum rubricaule Lodd., Clyto Knight, Comte d'Egmont, diadematum, favorite Knight, Hartoppii Knight, Hercule v. Houtte, Héroine, medio-pictum argenteum, papilionaceum, Pardoloton Pince, puniceum purpureum fl. pleno, Rollissonii, roseo-purpureum, rubiniflorum Knight, strictopetalum superbum Pince, Sultan Achmet, Triomphe de Gand v. Houtte, Victorie Pince, Zizianum etc.

barbatum G. Don, Wall., β? totibarbatum v. Houtte.

III. Eurhododendron DC. (= *Brachycalyx* Swt. = *Ponticum* et *Lepipherum* G. Don).

Aprilis Lindl. (= *dahurico-ponticum*), Frühlings-A., ħ. f. Hybride.

campanulatum D. Don, Wall., Var.: Hibbertii, strictum etc.

Digitized by Google

Rhododendron

catawbiense Mchx., β) hybridum robustissimum fastuosum Hort. belg. (= *fastuosum fl. pleno* Hort. = *Van Houtteanum* Hort. = *ponticо-catawbiense*). Andere Var.: fol. aureo-variegatis, imbricatum etc.

caucasicum Pall. Var.: β) arboreum, γ) hybridum. (Mit einer Azalea pontica alba erzeugt).

citrinum * (= *Azalea citrina* Hassk. = ? *Vireya javanica* Blum. var), citrongelbe, ħ. t. Java.

hirsutum L., b) fol. marginatis (= *variegatum*), β) hybridum (= *ferrugineo-hirsutum* = *intermedium* Tausch).

maximum L. Var.: decorum v. Houtte, new white Cunn., pyramidatum fl. semipleno v. Houtte.

ponticum L. Var.: guttatum, medio-pictocitrinum, multimaculatum, nazarethinum fol. argent. var., nereifolium, nereifolium Smithii, nereifol. fol. variegatis.

Andere Hybriden von verschiedenen Arten: hybridum robustissimum fastuosum (= *Van Houttei fl. semipleno*) s. R. catawbiense, hyb. album superbum, hyb. amoenum, hyb. carneum, hyb. albo-roseum, hyb. atropurpureum, hyb. elegans, hyb. Pehmölleri Booth, hyb. puniceum, — Barkerii, Cavendishii, Cunninghamii et Knigthii, et Nobleanum, et venustum, Gibsonii, Herbertii, reticulatum etc.

Andere Varietäten oder Hybriden sind p. 684—686 verzeichnet.

V. Tsutsusi G. Don, (= *Beverningia* Salisb. = *Loiseleuria* Rchb. = *Azalea indica* L. etc.).

Hybriden u. Varietäten v. R. indicum Sweet, ledifolium G. Don, pulchrum Sweet. Vergl. p. 686.

Adolphe van Houtte, alba insignis et macrantha, et insignis Rinz, et plena, et rotunda Baron de Pronay, et striata Knight et Perry, amabilis, Apollo Knight et Perry, atropurpurea splendida, augustissima Knight et Perry, aurantiaca grandiflora et superba, Baron de Pronay Rinz, bella Knight et Perry, Bellérophon Baron de Pronay, Benno Rinz, blanda Kn. et Perr., bright pink, Briza Kn. et Perr., Broughtonii Kn. et Perr., Calypso Kn. et Perr., candida, candidissima maxima, coccinea elegans, et grandiflora et superba, coerulescens, colorans Kn. et Perr., color di lacca (= *couleur de lacque*) Bar. Pr., comosa, concolor, conspicua, coronaria grandiflora, coronata Kn. et Perr., coruscans Bar. Pr., crimson, cuprea Bar. Pr. et splendens Rinz, et violacea Bar. Pr., Cunninghamii, Dalstonii, Danielsiana amabilis Rinz et concessa Rinz et fasciculata Bar. d. Pron. et superba Rinz, dark crimson, decora Kn. et Perr., Diana, dilecta Kn. et P., Duc de Brabant v. Houtte, Egertonii Kn. et Perry, elata flore pleno, exornata superba v. Houtte, exquisita Kn. et Perr., Fiona, Flora Kn. et Perr., floribunda elegans, formosa, formosa aurantiaca Kn. et Perr., formosissima, Frostii Kn. et Perr., fulgens et superba Kn. et Perr., Garland Kn. et Porr., Gleedstanesii, Goliath Rinz, gracilis Kn. et Perr., grandiflora rosea, Helena Kn. et Perr., Hellyana, Hertha Rinz, Hibbertii Rinz, Hookeri, Holfordii Kn. et Perr., ignea Kn. et Perr., ignescens, Jenkinsonii, Knightii, lacteola superba, large salmon, lateritia et grandiflora, Lehmanni, Leucomagiste, light purple, lilacina grandi-

Digitized by Google

Rhododendron

flora, et semiplena, et macrantha, lilac perfection, liliiflora nova, longifolia, lovaniensis, magnifica Kn. et Perr., magniflora Kn. et Perr., maxima, Moritz v. Bethmann Rinz, multiflora J. Makoy, mundula Kn. et Perr., Murrayana Kn. et Perr., nec plus ultra (tricolor) Verschaff., nereiflora, nereiflora rubra, Nerissonii, New large white Lucombe et Pince, optima Kn. et Perr., ornatissima (= *Arnamatia*) Kn. et Perr., Ottonis, ovata, pallida, papillosa, Perryana Kn. et Perr., phoenicea et alba Kn. et Perr. et semiplena, picturata Kn. et Perr., pilosa Kn. et Perr., praecipua Lucombe et Pince, praeclara Kn. et Perr., praestantissima Kn. et Perr., Prima Donna Kn. et Perr., Prince Albert Kn. et Perr., princeps Kn. et Perr., pulcherrima, pulchra, punctata superba Kn. et Perr., purpurea plena et maculata, Reddingii Kn. et Perr., Reewesii, refulgens Kn. et Perr., Reyndersiana v. Houtte, Robertsonnii, robusta, Rosa Mundi Rinz, rosea bicolor nova, rosea superba, rotundifolia, rotundiflora Kn. et Perr., rubicunda, Smiths coccinea et elegans, et grandiflora, et fine pink, et large pink, et fine large pink, et large purple, et light purple, et orange pink, et pink, et speciosa, et splendens nova, et superba duplex, et triflora, et variegata, splendida Kn. et Perr., squamata, striata Kn. et Perr., striata formosissima v. Houtte, Sylph Rinz, tricolor (= *nec plus ultra*), triumphans, Urseli, variegata, Vesta Kn. et Perr., vestita Kn. et Perr., Wadii, Warreana, White van Houtte, Woodsfordii etc. etc. etc.

Hybriden von Rhododendrons der ersten Abtheilungen mit Rhododendron indicum etc. (= *Azalea indica* L. etc.) u. versch. Azaleen: rhododendroides, aureum, carneum elegantissimum Sm., decorum, norbitonense Sm., yellowish etc. Zu ergänzen p. 684—686.

Rhodomyrtus tomentosa Hassk., v. Myrtus tomentosa, p. 528.

Rhodostoma Scheidw., Rothschlund, V. 1., Rubiaceae.

gardenioides Scheidw., gardenienähnlicher, ħ. w. ? Südamerika.

Rhombifolium canescens Rich., v. Neurocarpum guianense, p. 547.

Rhopala Aubl. (= *Rupala* Auct.), Rhopala.

elegans Schott, Pohl, zierliche, ħ. w, Brasilien.

Rhus T., Sumach.

angustifolia L. (= *argentea* Mill., non Eckl., Zeyh.).

aromatica Ait. (= *canadensis* Marsh. = *? serotina* Ait. = *Lobadium aromaticum* Rafin. = *? Myrica trifoliata* Hortul. = *Schmalzia aromatica* Desv. = *Turpinia aromatica* Rafin.).

dioica Brouss. (= *? Oxyacantha* Cav. = *oxyacanthoides* Dum.Cours., non Schousb.).

diversiloba Torr. et Gray, verschiedenlappiger, ħ. f. Californien.

erosa Thbg., ausgebissener, ħ. k. Cap d. g. Hoffn.

filicina DC., farrnähnlicher, ħ. k. Mexico.

glabra L., *α*) hermaphrodita DC. (= *Toxicodendron glabrum* Mill.), *β*) dioica Lam., DC.

laevigata L., *β*) elongata Jacq. (= *trifoliata* W. Enum. Suppl.).

Digitized by Google

Rhus

Meerburgiana Schult. (= *pumila* Meerb.), Meerburg's, ħ. f. b. Nordamerika.

pruinosa Hffg., bereifter, ħ. w. t. Ostindien.

semialata Murr., β) Osbeckii DC. (= *javanica* L.), γ) Roxburghii DC. (= *Amela* Don, = *Bucki Amelam* Roxb.).

suaveolens Ait. (= *Lobadium suaveolens* Rafin. = *Myrica trifoliata* Hort. = *Schmaltzia suaveolens* Desv. = *Toxicodendron crenatum* Walt. = *Turpinia suaveolens* Rafin.).

undulata Jacq. (= *theezans* Hort.).

varielobata Steud. (= *lobata* Hook., non Poir.), verschiedenlappiger, ħ. f. b. Columbia, Californien.

vernicifera DC. (= *juglandifolia* Wall., Don, = *Vernix* L. mat. med., Thbg., non L. spec. plant. = *Wallichii* Sweet).

villosa L. (= *atomaria* Jacq. = *incana* Mill.).

Cacodendron Ehrh. (= ? *canadensis* Mill. = *hypsilodendron* Mch.), v. Ailanthus glandulosa, p. 25, *caustica* Hook., v. Mauria simplicifolia, p. 390, II., *Cobbe* L., *Cominia* L., v. Schmidelia Cobbe et Cominia, *obscura* MB., v. Pterocarya caucasica, p. 665 et p. 569, II., *odorata* Nois. = ?, *Thunbergii* Hook., v. Heeria argentea, p. 287, II., *zeylanica* Burm. (= *R. Raedaetijavel* Mill.), v. Omphalobium indicum, p. 557.

Rhynchanthera DC., Schnabelbeutel, X. 1. (V. 1.), Melastomaceae.

grandiflora DC. (= *Melastoma Aubletiana* Vahl, = *M. grandiflora* Aubl. = *Osbeckia Aubletiana* Spgl. = *Rhexia grandiflora* Bonpl.), grofsblumiger, ħ. w. Guiana.

Hilaireana (DC.), (= *Cambessedia Hilareana* DC. = *Rhexia galioides* Mart., Schrk. = *R. Hilariana* Kunth), St. Hilair's, ħ. w. Brasilien.

Schrankiana DC. (= *pentanthera* DC. = *Rhexia pentanthera* Sering. = *R. Schrankiana* Mart.), Schrank's, ħ. w. Brasilien.

Rhynchocarpa Schrad., Schnabelfrucht, XXI. 11., Cucurbitaceae.

foetidissima Schrad. (= *Melothria foetida* Desr., p. 509, = *Trichosanthes foetidissima* Jacq.), stinkende, ☉. Sch. w. m. f. Guinea.

Rhynchocarpus lateriflorus Less., v. Rhynchopsidium lateriflorum.

Rhynchoglossum Blume, (= *Rhincoglossum* Auct. = *Antonia* RBr. = *Loxotis* RBr. = *Wulfeniae* spec. Wall.), Schnabelzunge, XIV. 11., Cyrtandraceae.

obliquum DC. (= *Loxotis obliqua* RBr. = *Wulfenia obliqua* Wall.), schiefe, ☉. ♂. w. Nepal, Ostindien.

zeylanicum Hook., zeylanische, ☉. ♂. w. Zeylon.

Rhynchopsidium Cass., DC., Schnabelkraut.

pumilum DC. (= *Athanasia pumila* L. fil. = *Eclopes pumila* Less. = *Nanophytum pumilum* Less. = *Relhania pumila* Thbg.), niedriges, ☉. f. Cap d. g. Hffn.

Rhynchosia Lour., Schnabelschiffchen.

biflora DC. (= *scarabaeoides* DC. = *Dolichos scarabaeoides* L. = *Cantharospermum pauciflorum* W. et A. *Stizolobium scarabaeoides* Spgl.).

Digitized by Google

Rhynchosia

cana DC. (= *Glycine cana* W. = *flexuosa* Heyne), grauliches, 4. ♄. Sch. w. Ostindien.

β) suaveolens DC.

caribaea DC. (= *Copisma caribaeum* DC. = *Glycine caribaea* Jacq. = *G. reflexa* Nutt. = *G. sublobata* Schum.).

medicaginea DC. (= *nuda* Wall. = *rhombifolia* DC. = *Dolichos medicagineus* Lam. = *D. scarabaeoides* Roxb. = *Glycine rhombifolia* W.), schneckenkleeähnliches, ☉. m. f. Ostindien.

Memnonia DC. (= *Dolichos Memnonia* Del. = *Glycine Memnonia* Spgl.), Memnon's, 4. Sch. t. w. Aegypten, (Theben).

precatoria DC. (= *Glycine* prec. H. B. K. = *Indigofera volubilis* Wendl.), Paternoster-S., ♄. Sch. w. Neugranada.

angustifolia DC., v. Chrysoscias calycina, p. 143, II., *viscida* DC., v. Pseudarthria viscida, p. 565, II.

Rhynchopera Kl., Schnabelstendel, XX. 1., Orchideae.

pedunculata Kl., gestielter, 4. w. ?Mexico.

Rhynchospermum jasminoides Hort., v. Gardenia scandens.

Rhynchospora Vahl, Schnabelriet.

aurea Vahl, (= *surinamensis* N. E. = *Chaetospora aurea* H. B. K. = *Schoenus corymbosus* P. = *?S. longirostris* Sbr., non Ell. = *S. surinamensis* Rottb. = *Scirpus corymbosus* L.).

paraensis Schrad., parasoles, 4. w. Brasilien.

polyphylla Vahl, (= *gracilis* W. = *Mitrospora polyphylla* N. E. = *Schoenus polyphyllus* Vahl).

sylvatica N. E. (= *comosa* Lk. = *Schoenus comatus* Lk.), Waldliebendes, 4. w. Brasilien.

Rhynchostylis Blum., Schnabelgriffel, XX. 1., Orchideae.

papillosa * (= *Aerides undulata* Sm. = *Cymbidium praemorsum* Sw. = *Epidendrum praemorsum* Sw., Roxb. = *Sarcanthus praemorsus* Lindl., p. 721, = *Sarcochilus praemorsus* Spgl. = *Saccolabium papillosum* Lindl., p. 709).

praemorsa Blume, (= *Aerides praemorsa* Sw. = *Epidendrum indicum* Poir. = *Saccolabium praemorsum* Lindl.), abgestutzter, 4. w. Java.

retusa Blume, (= *Aerides guttata* Roxb. = *A. retusa* Sw. = *Cymbidium retusum* Hamilt. = *Epidendrum retusum* L. = *Limodorum retusum* Sw. = *Sarcanthus guttatus* Lindl., p. 721, = *Saccolabium guttatum* Lindl.), abgestutzter, 4. w. Ostindien.

Rhyssocarpus Endl., Runzelfrucht, V. 1., Rubiaceae.

pubescens Endl. (= *Cinchona pubescens* Hort. Makoy, non Vahl), weichhaarige, ♄. ♄. w. Tropisch. Amerika.

Rhytidanthe scabra Benth., v. Waitzia aurea.

Ribes T., L., Johannisbeere (Stachelbeere).

I. Grossularia T., Stachelbeere.

caucasicum Adams, (= *Uva crispa* L. var. DC.), caucasische, ♄. f. Caucasus.

Grossularia L., var. Groseillier cerise.

hirtellum Mchx. (= *saxosum* Hook. = *triflorum* Bigelow).

rotundifolium Mchx. (= *triflorum* W. Enum. = *gracile* Pursh).

triflorum W. (= *stamineum* Hornem. = *Grossularia triflora* Spach), dreiblumige, ♄. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Ribes

II. Botryocarpum Rich., DC.

Dikuscha Fisch. (= *boreale* Turctsch.), nördliche, ħ. f. Sibirien.

orientale Dsf. (= *punctatum* Lindl. = *resinosum* Bot. mag.).

III. Ribesia Berland. DC., Johannisbeere.

albinervium Mchx. (= *rubrum* L. var. Spgl.).

alpinum L. (= *dioicum* Mch. = *multiflorum* Hort.), δ) Fleischmanni Rchb., ε) grossulariaefolium Rchb., ζ) Hladnickianum Freyer, Rchb. (= *alpinum* Lodd.), η) leucocladon Rchb., ϑ) pilosum Rchb., ι) tortuosum Rchb., κ) viridissimum Rchb.

cereum Dougl. (= *inebrians* Lindl. = *pumilum* Nutt. = *Cerophyllum Douglasii* Spach).

floridum L'Her. (= *americanum* Mill. = *campanulatum* Mch. = *Dillenii* Medic. = *nigrum americanum* Mch. = *pensylvanicum* Lam. = *Coreosma florida* Spach), β) recurvatum Mchx.

fragrans Pall. (= *suaveolens* Turctsch.).

glutinosum Benth., klebrige, ħ. f. Californien.

heterotrichum C. A. Mey., verschiedenhaarige, ħ. f. Altaisches Sibirien.

malvaceum Sm. (= *tubulosum* Eschsch. = *tubiflorum* C. A. Mey.), malvenblätterige, ħ. f. Nordw. Amerika.

multiflorum Kit. (= *spicatum* Schult.), β) vitifolium Host.

opulifolium Loud., wasserholderblätterige, ħ. f. ? Rußland.

prostratum L. (= *glandulosum* Ait. = *rigens* Mchx.).

sanguineum Pursh, var. albidum, flore pleno.

IV. Symphocalyx Berl.

aureum Pursh, (= *fragrans* Lodd.), var. album, Jeffersonii.

tenuiflorum Lindl., var. atropurpureum, luteum, rubrum.

Unbestimmtere ohne nähere Angabe des Vaterlandes: bullatum Otto et Dietr., callibotrys Wendl., holosericeum Otto et Dietr., intermedium Tausch, macranthum Lodd., pallidum Otto et Dietr., Schmidtianum Tausch, (= *floridum* Hort. Schönbr.), urceolatum Tausch, (= *petraeum* Hort. Prag.).

fuchsioides Berland. (= *speciosum* Pursh, = *stamineum* Sm.). v. Robsonia speciosa.

Richardsonia Kunth, Richardsonie.

rosea St. Hil. (= *emetica* Mart.), rosafarbige, 4. ħ. w. Brasilien.

scabra St. Hil. (= *pilosa* Kunth, = *Richardia scabra* L. = *R. pilosa* R. et P. = *Spermacoce hexandra* Rich. = *S. hirsuta* W.).

Richea RBr., (F. J. Riché, Oberaufseher des Jardin des plantes zu Paris, † 1838), V. 1., Epacrideae.

dracophylla RBr., drachenbaumblätterige, ħ. Van Diemens Insel.

Richea glauca LaBill., v. Craspedia uniflora, p. 164.

Ricinocarpus Dsf., Ricinusfrucht, X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

glaucus Endl., blaugrüne, ħ. t. Neuholland.

pinifolius Dsf. (= *Roeperia pinifolia* Spgl.), kieferblätterige, ħ. t. Neuholland.

Ricinus T., Wunderbaum.

communis L. (= *vulgaris* Mill.), β) armatus Andr., γ) minor Mill., δ) undulatus Hort., ε) Krappa Hort., ζ) macrocarpus Hort.

glaucus Hffg., blaugrüner, ☉. ♂. ħ. m. f. t. Nepal.

Digitized by Google

Ricinus
inermis Jacq. (= ? *rugosus* Mill.).
integrifolius W. (= *dioicus* Chevall., non Jacq.), ganzblätteriger, ⊙. ♂. ♄. m. f. t. Mauritius.
laevis DC., glatter, ⊙. ♂. ♄. m. f. t. ?
lividus Jacq. (= *perennis* Hort.).
medicus Forsk. (= *communis* L. var. Delil. Poir.), heilender, ⊙. ♂. ♄. m. f. t. Arabien.
megalospermus Caill., Delil., grofssaamiger, ⊙. ♂. ♄. m. f. t. Aegypten.
paniculatus Lk., Otto, rispiger, ⊙. m. f. ?
rutilans Hort. Berol., röthlicher, ⊙. m. f. ?
spectabilis Blume, ansehnlicher, ♄. w. Java.
tunetensis Dsf. (= *tunessensis* Auct.), tunetanischer, ⊙. ♂. ♄. m. f. t. Tunis.
Unbestimmtere: leucocarpus Hort. Bologn., macrophyllus Hort. Bologn.
globosus W., *Mappa* L., *tanarius* L., v. Mappa jamaicensis, moluccana, tanaria, p. 386, II.

Ridolfia Moris, (Cosmus Ridolfio, Prof. d. Agronomie zu Pisa), V. II., Umbelliferae.
segetum Moris, (= *Anethum segetum* d'Urv., non L. = *A. arvense* Bess. = *A. graveolens* Ucria, = *A. ? pusillum* Hort. = *Foeniculum segetum* Presl, = *Meum segetum* Gussone, Tenore), Saat-R., ⊙. f. Süd- u. Osteuropa, Persien.

Riedleia Vent., Ridlea.
hirsuta DC. (= *Melochia hirsuta* Cav. = *Mougeotia hirsuta* H. B. K. = *Visenia hirsuta* Spgl.), rauhhaarige, ♄. w. Südamerika.
odorata DC. (= *Melochia odorata* Forst. = *Visenia indica* Houtt. = *V. umbellata* Spgl.), wohlriechende, ♄. w. t. Neue Hebryden.
truncata DC. (= *Dictyocarpus truncatus* Wight, = *Melochia truncata* W. = *Sida cuneifolia* Roxb. = *S. retusa* Roxb.).

Rigidella Lindl., Steifling, III. I., Irideae.
flammea Lindl., feuerfarbiger, 4. Zw. k. Mexico.
immaculata Lemaire, ungefleckter, 4. Zw. k. Mexico.
orthantha Lemaire, geradblumiger, 4. Zw. k. Mexico, *Rindera cristata* R. et S. (= ? *emarginata* R. et S.), *glastifolia* R. et S., v. Mattia cristata, angustifolia, glastifolia, p. 389, II, *lateriflora* R. et S., v. Pectocarya lateriflora Nachlese.

Rinzia J. C. Schauer, (Sebastian u. Jacob Rinz, Handelsgärtner in Frankfurt am Main), ? VIII. I., Myrtaceae.
Fumana J. C. Schauer, ciströschenähnliche, ♄. t. Westl. Neuholland (Ob kultivirt?)

Ripogonum Forst.
parviflorum RBr. (= *scandens* Forst. = *Smilax Ripogonum* Forst.).

Rissoa W. Arnot. (A. Risso zu Nizza, Versasser einer Naturgeschichte d. Orangenbäume u. a. naturh. Werke), X. I., Hesperideae-Aurantiaceae.
ceylanica W. Arnot. (= *Limonia citrifolia* Moon, non Roxb., W.), ceylonische, ♄. w. Ceylon.

Rivea Choisy, (Rive, Auguste-Arthur de la, Prof. der Physik zu Genf), V. I., Convolvulaceae.
bona-nox Choisy, (= *Argyreia bona-nox* Sweet, p. 77, = *Lettsomia bona-nox* Roxb.).

Digitized by Google

Rivea

brasiliana Mart., brasilianische, ♄. Sch. w. Brasilien.

hypocrateriformis Choisy, (= *Argyreia uniflora* Sweet, = *Convolvulus candicans* R. et S., non Roth, = *C. hypocrateriformis* Desr. = *C. hypoleucus* R. et S. = *Lettsomia uniflora* Roxb.).

ornata Choisy, (= *Argyreia ornata* Sweet, p. 77, = *Convolvulus candicans* Roth, = *Lettsomia ornata* Roxb.).

tiliaefolia Choisy, (= *Convolvulus gangeticus* Roxb. = *C. grandiflorus* Hort. brit. = *C. leucanthus* Herb. Madrit. = *C. marginalis* Hamilt. = *C. melanosticles* Schltdl. = *C. platyphyllus* Juss. = *C. spectabilis* Hort. brit. = *C. tiliaefolius* Desr. = *Ipomoea bacciferа* Russ. = *I. benghalensis* Roth, = *I. gangetica* Sweet, = *I. campanulata* Arn. = *I. melanosticta* Don, = *I. tiliaefolia* R. et S.), lindenblätterige, 4. ♄. Sch. w. Ostindien, Polynesien, Philippinen, Mascarenas, Madagascar, Caribäen, Peru.

Rivinia Plum., L., Rivinie.

acuminata H. B. K. (= *laevis* L. var. Spgl. = *lanceolata* W.), zugespitzte, ♄. w. Südamerika.

affinis N. E., Mart., ähnelnde, ♄. w. Brasilien.

humilis L. (= *Solanoides pubescens* Mch.), *β*) canescens Don, (= *Piercea tomentosa* Mill.).

laevis L. (= *humilis* Mill. = *Piercea glabra* Mill. = *Solanoides laevis* Mch.).

latifolia Lam. (= *laevis* L. var. Spgl.), breitblätterige, ☉. ♄. w. Westindien.

octandra L. (= *dodecandra* Jacq. = *Mutisii* W. = *scandens* Mill.).

tetrandra Dsf., viermännige, ♄. w. ?

Robertia pinnatifida Spgl., v. Achyrophorus pinnatifidus, p. 7, II.

Robertia hyemalis Merat, v. Eranthis hyemalis.

Robertsonia Haw., *crenata* Haw., *cuneifolia* Haw., *dentata* Haw., *micranthifolia* Haw., *polita* Haw., *serrata* Haw., *sphaeroidea* Haw., *umbrosa* Haw., v. Saxifraga Sect. III., S. umbrosa, cuneifolia, hirsuta, erosa, polita, serrata, hirsuta et umbrosa, p. 724.

Robinia L., Schotendorn.

davurica Lodd., dahurischer, ♄. f. Dahurien.

Ehrenbergii Schltdl., Ehrenberg's, ♄. k. Mexico.

glabra Mill., kahler, ♄. t. Campeche.

latifolia Mill., breitblätteriger, ♄. t. Campeche.

nana Ell., zwergiger, ♄. f. b. Carolina, Georgien.

Pseudacacia L., var. echinata, humilis, myrtifolia, nigra, subtortuosa, variegata.

pyramidata Mill., pyramidenförmiger, ♄. w. Campeche.

rosea Mill., ? Ell., rosafarbiger, ♄. k. Campeche, Carolina.

viscosa Vent., *β*) alba, *γ*) pendula.

Unbestimmtere: geminiflora, pinnata Hort., radicans Sw., Fisch.

Robsonia Berland. (Ed. Robson, englischer Botaniker), V. 1., Grossularieae (Ribesiaceae).

speciosa Spach, (= *fuchsioides* Berland. = *Ribes speciosum* Pursh, p. 689, = *R. stamineum* Sm. = *R. fuchsioides* Sessé), prächtige, ♄. k. f. b. Californien.

Rocama Forsk., *arabica* Gmel. (= *digyna* Forsk.), v. Trianthema pentandra.

Digitized by Google

Rochea DC. (= *Larochea* P., p. 446 et *Kalosanthes* Haw., p. 436).

I. Franciscea DC.

bicolor Steud. (= *odoratissima β bicolor* DC. = *Dietrichia bicolor* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes bicolor* Haw.), β) capitata (= *Crassula capitata* Lodd.).

biconvexa DC. (= *Crassula biconvexa* Haw. = *Kalosanthes biconvexa* Haw.).

Burmanniana Steud. (= *Crassula Burmanniana* D. Dietr. = *Cyrtogyne Burmanniana* Eckl., Zeyh.), Burmann's, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

coccinea DC. (= *Crassula coccinea* L. = *Dietrichia coccinea* Tratt. = *Kalosanthes coccinea* Haw.).

cymosa DC. (= *Crassula capitata* Lam. = *C. cymosa* L. = *Kalosanthes cymosa* Haw.).

dejecta Steud. (= *Crassula dejecta* Jacq. = *C. undata* Haw. = *Cyrtogyne dejecta* DC. = *C. undata* Haw.), veränderte, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fascicularis DC. (= *Crassula fascicularis* Lam.), büschelförmige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

flava DC. (= *Crassula flava* L. = *Kalosanthes flava* Haw.).

jasminea DC. (= *Crassula jasminea* Sims, = *C. jasminiflora* Haw. = *C. obtusa* Haw. = *Dietrichia jasminea* Eckl, Zeyh. = *Kalosanthes jasminea* Haw.).

media DC. (= *Crassula media* D. Dietr. = *Dietrichia media* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes media* Haw.).

odoratissima DC. (= *Crassula odoratissima* Andr. = *Dietrichia odoratissima* Tratt. = *Kalosanthes odoratissima* Haw.).

undosa Steud. (= *Cyrtogyne undosa* Haw., Dietr.), wellige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

undulata Steud. (= *Crassula undulata* Haw. = *Cyrtogyne undulata* Haw.), wellenförmige, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

versicolor DC. (= *Crassula versicolor* Burch. = *Dietrichia versicolor* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes versicolor* Haw.).

II. Danielia DC.

albiflora DC. (= *Crassula albiflora* Sims, = *Cyrtogyne albiflora* Eckl., Zeyh.), weifsblumige, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

falcata DC. (= *Crassula falcata* W. = *C. obliqua* Andr. = *C. retroflexa* Meerb.).

perfoliata DC. (= *Crassula perfoliata* L.).

Rochelia Rchb. (Anton Rochel, Wundarzt u. ehemaliger Gartenmeister in Pesth, sehr thätiger Botaniker), V. 1., Asperifoliaceae.

stellulata Rchb. (= *saccharata* Auct. = *Cynoglossum dispermum* L. fil. = *Lithospermum dispermum* L. = *L. retortum* Pall. = *Messerschmidia cancellata* Asso), sternförmige, ⊙. f. Spanien, Griechenland, Ungarn, Podolien, Taurien, Sibirien.

barbata R. et S., *deflexa* R. et S., *Lappula* R. et S., *Redowskii* R. et S. etc., v. Echinospermum barbatum, deflexum, Lappula etc.

Rodigia alliata G. Don, *laevigata* Spgl., v. Seriola laevigata, cum variet.

Rodriguezia R. et P., Rodriguezie.

Batemanni Lindl., Batemann's, 4. w. Peru.

candida ? Lindl., weifsglänzende, 4. w. Südamerika.

Digitized by Google

Rodriguezia

ensiformis R. et P., schwertförmige, ♃. w. Peru.

lanceolata R. et P., lanzettförmige, ♃. w. Peru.

macrostachya ? Lindl., grofsährige, ♃. w. Südamerika.

recurva Lindl. (= *Gomezia recurva* RBr.), zurückgekrümmte, ♃. w. Brasilien.

secunda H. B. K., *β*) latifolia Hort. belg.

stricta Steud. (= *Gomezia stricta* Spgl. = *Physanthera callistachys* Bertero), steife, ♃. w. Jamaika. (Ob kultivirt?)

suaveolens Lindl. (= *Pleurothallis foliosa* Hook.), feinriechende, ♃. w. Brasilien.

Rodschiedia Bursa pastoris Flor. Wetter., v. Capsella Bursa pastoris, p. 158.

Roea Hügel, (= *Hügelroea* Steud.), Roea, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

linophylla Hügel, leinblätterige, ♃. t. k. Neuholland.

Roella L., Roella.

ciliata L. (= *reticulata* Lam., non L.).

cinerea Alph. DC. (= *glabrella* Banks, = *Campanula cinerea* Thbg., L. fil.), aschgraue, ♄. t. Cap d. g. H.

squarrosa Thbg., L. fil. (= *filiformis* Lam. = *rigidula* Banks).

Thunbergii A. DC. (= *Campanula ciliata* Thbg. = *C. Thunbergii* R. et S.), Thunberg's, ♃. t. Cap der guten Hoffnung. [1])

filiformis Poir., non Lam., (= *glabra* Poir. = *recurva* Banks), v. Lightfootia tenella, p. 357, II., *pinifolia* Thbg. (= *compacta* Thbg. = *tenuifolia* Thbg.), v. Merciera tenuifolia, p. 399, II.

Roemeria Medic., DC., Roemerie.

bivalvis DC. (= *Glaucium mesopotamicum* Spgl.), zweiklappige, ☉. f. Mesopotamien.

Roemeria polygonoides Mch., v. Amaranthus polygonoides, p. 43.

Roemeria Thbg., *argentea* Thbg., *inermis* Thbg., v. Heeria argentea et inermis, p. 287, II., *melanophleos* Thbg., v. Myrsine melanophleos, p. 426, II.

Roemeria Zea, *Zeae* R. et S., v. Corycarpus arundinaceus.

Roeperia pinifolia Spgl., v. Ricinocarpus pinifolius.

Roeslinia Mch., *angustifolia* G. Don, *decussata* G. Don, *frutescens* G. Don, v. Orphium frutescens cum var. p. 461, II., *baccifera* G. Don, (= *tetragona* Mch.), v. Chironia baccifera, p. 191.

Rohdea nutans Schult., *Tupistra* Schult., v. Tupistra nutans et squalida, p. 827.

Rohria Thbg., *cuneata* Thbg., *cynaroides* Thbg., *grandiflora* Thbg. (= *ilicifolia* Vahl), *incana* Thbg., *lanceolata* Thbg. (= *revoluta* Vahl), *obovata* Thbg., *palmata* Thbg., *spinosissima* Thbg., *monanthos* Thbg., v. Berkheya cuneata, cynaroides, grandiflora, incana, obovata, palmata, spinosissima, uniflora, p. 118 et 119, *ciliaris* Thbg., *patula* Thbg., *pectinata* Thbg., *sulcata* Thbg. etc., v. Cullumia ciliaris etc., p. 230 et p. 175, II.

---

1) elegans Paxt., v. Houtte, Lem., Scheidw., gehört kaum zu dieser Gattung.

Digitized by Google

Rokejeka capillaris Forsk. (= *deserti* Poir.), v. Gypsophila Rokejeka.
Romulea Bulbocodium Sebast. et Mauri, *Columnae* Sebast. et Mauri, *filifolia* Eckl., *Linaresii* Parlat., *ramiflora* Tenore, v. Trichonema Bulbocodium, Columnae etc., p. 817, *fragrans* Eckl., v. Sparaxis fragrans, p. 774, *minuta* Eckl., v. Galaxia minuta, p. 152, II.

Rondeletia Plum., Rondeletie.
americana L. (= *dichotoma* P.).
buxifolia Vahl, (= *Catesbaea inermis* Spgl. = *C. parviflora* Spgl. = *Ixora buxifolia* Spgl.), buchsbaumblätterige, ħ. w. Brasilien.
elongata Bartl., verlängerte, ħ. ħ. t. Mexico.
jasminiodora Makoy, jasminduftende, ħ. ħ. w. Südamer.
longiflora Cham., langblumige, ħ. w. Brasilien.
odorata Jacq. (= *coccinea* Moç., Sess. = *obovata* L. = *speciosa* Lodd.), wohlriechende, ħ. w. Cuba, Havana, Mexico.
β) major Hort. belg. [1])
triflora Vahl, (= *pilosa* Sw. = *Hedyotis longiflora* Spgl. = *Oldenlandia longiflora* Lam.), dreiblumige, ħ. w. Caribäen, Martinique.
Landia Spgl., v. Mussaenda Landia, p. 535 et p. 423, II., *paniculata* Roxb., v. Wendlandia paniculata. *Ropala* Auct., v. Rhopala.
Roripa Scop., *amphibia* Spach, *armoracioides* Tausch, *austriaca* Spach, *Camelinae* Spach, *nasturtioides* Spach, *pyrenaica* Spach etc., v. Nasturtium amphibium, armoracioides, austriacum etc., p. 543 et 430, II.

Rosa T., Rose.
Acharii Billb. (= *pratensis* Sw.), Acharius's, ħ. f. Schweden.
acuta Fisch., spitze, ħ. f. Caucasus.
alba L. (= *Boreykiana* Bess. = *canina* L. var. K. = *cannabina* Pellet. = *digitaria* Bosc, = *usitatissima* Gater.), *β*) carnea Dum.Cours. (= ? *incarnata* Mill.).
Gartenvarietäten: Agate magnifique, Agate Marie Louise, Agate nouvelle, Agate prolifère, Agate royale, Agate superbe, Agate Thalie, Angelin, Angélique, Astrée, Belle de Ségur, belle Henriette, Belle Thérèse, blanche a coeur vert, Cocarde, fausse unique (cuisse de Nymphe en bouquets), Félicité Parmentier, Florine, full double white, gracilis, Jeanne d'Arc, Marie de Bourgogne, Naissance de Vénus, Pompon Bazar, Pompon carné, Princesse Lamballe, Remarquable, rosea, Royale, Séduisante, semidouble white, Sophie de Bavière, Sophie de Marcilly, vix bifera etc.
albiflora Steven, (= ? *alba* L. var. MB. = ? *montana* Steven), weifsblumige, ħ. f. Taurien.
alpina L., var. hybrida gracilis.
amoena Waitz, Lk., liebliche, ħ. f. ?
amygdalifolia Sering., mandelblätterige, ħ. k. China.
Andrewsii Tratt. (= *inermis* Andr.), Andrew's, ħ. f. ?

---

1) L. van Houtte führt in seinen Établissement horticole 1846 p. 5 noch eine species nova mit folgender Bemerkung auf: „De la Havane, à longues fleurs jaunes; elle diffère toto coelo de la plante que M. Decaisne a déterminée sous le nom de Bouvardia flava (V. la Flore des serres et des jardins de l'Europe)." Auch Makoy erwähnt selbige als „species de la Havane".

Digitized by Google

Rosa

arvensis Huds. (= *glauca* Dierb. = *montana* Vill.), α) bibracteata Bast., β) repens Scop., W. (= ? *fusca* Mch. = *ovata* Lejeune, = *procumbens* Sering. = *serpens* Wib. = *sylvestris* Herm. = *tugurierum* W.), γ) prostrata DC., δ) Ayreshirea Sering. (= *capreolata* Neill), var. A fleurs pleines, A fleur blanches, rubra plena.

Banksiae RBr., d) alba plena, e) Diadème, f) lutescens spinosa, g) philadelphiflora, h) Roi de blancs.

blanda Ait. (= *alpina* β *laevis* Red. = *cinnamomea* ζ *blanda* Red. = *corymbosa* Bosc, Poir. = *fraxinifolia* Sering. = ? *sinica* Dsf.), β) Heritieriana Red., γ) turgida P. (= *fraxinea* W. = *fraxinifolia* Borkh. Dum.Cours. = *turneps* Hort. = *virginiana* Mill.).

bracteata Roxb., Wendl. (= *lucida* Lawr., non Ehrh.), var. alba odorata, alba venusta, lucida duplex, Maria Leonida, Victoire modeste.

californica Schltdl., californische, ħ. f. Californien.

campestris Dumort., Feld-R., ħ. f. Belgien.

camtschatica Vent., camtschatkaische, ħ. f. Kamtschatka. β) ferox Ait. (= *echinata* Dupont, = *horrida* Bess., Fisch. = *kamtschatika* Redout. = *provincialis* MB.).

canina L. (= *Cynorrhodon* Wallr. = *polymorpha* Schimp. et Spenn.), var. armata Stev., calycina MB., stipularis Merat, Swartziana Afzel., Fr., venosa Sw., verticillacantha Desv., Gloriette Hort.

carolina L. (= *balearica* Dsf. = *corallina* W. Enum. = *corymbosa* Ehrh. = *elongata* Roess. = *enneaphylla* Rafin. = *euratina* Bosc, = *florida* Don, = *fraxinifolia* Roess. = *Hudsoniana* Redout. = *orthosepala* var. Schimp. et Spenn. = *palustris* Roess. = *pensylvanica* Mchx. = *virginiana* du Roi).

caucasica MB., β) leucantha MB. (= *canina* L. var. K.), γ) montana Steven.

centifolia L., var. anemonoides Thory, *apifolia* W., burgundica P., carnea Dum.Cours., caryophyllea Poir. hollandica P., lacteola Waitz, maxima Dsf., meldensis Dum.Cours., minor Dum.Cours., monstrosa Hort., nivea Hort. prolifera Sering., remensis Dsf., unguiculata Dsf., unica Hort. etc.

a) genuina (Rosiers Centfeuilles).

Adèle Prévost, Carné ou Robin, Cristata, d'Anjou, Désirée Parmentier, Des Peintres (Rose), Diable Boiteux (Le), Duc de Brabant, Foliacée carnée, Grande Renoncule violette, Grand Maman, Horatius Coclès, Lieter, Lucile Mathieu, Madame A. Labbey, Mutabilis, Oeillet, Pauline, Petite Hollande, Pompon de Bourgogne, Pompon a fleur blanche, Pompon Kingston, Princesse de Portugal, Reine des Centfeuilles, Reine des Pays-Bas, Seleron, Unique blanche, Unique panachée.

b) hybrida (Centfeuilles hybrides).

Adèle de Sénanges, Adeline ou Unique admirable, Admiration, Anais Segalas, Athénais, Bailly de Suffren, Bretonne (La), Chérie (La), Christine de Pisan, Clélie, Délices de Flander, Duc d'Angoulème, Duchesse d'Orléans, Duchesse d'Ursel, d'Yébles, Elisa Leker, Feu d'Enghien, Fiancée (La), Gloire de France (M.), Hypatia, Illustre Beauté, Inès de Castro, la Tour

Digitized by Google

d'Auvergne, Laure, lilacea variegata, Madame Henriette, Madame Malibran, Mahieux, Nicolette, Petite beauté, Petite grenade, Pompon bizarre, Pompon de la Queue, Rachel, Salmacis, Simplicité (La), Sulkowski, Wilberforce, Zérah.

c) muscosa Ait. (Centfeuilles mousseuses).

A feuilles d'Agathe, A feuilles pourpres, A feuilles de Sauge, A feuilles luisantes, A gros fruits, Alice Leroy, Angélique Quétier, Asepala (oeillet), Blanche, Blanche Anglaise, Carnée, Celina ou la Gracieuse, Charlotte de Sor, de Colmar, Comtesse de Murinais, Commune, Cristata, de la Flèche, Diane de Colmar, d'Orléans, Ferrugineuse du Luxembourg, Flagellipetala, Globuleuse, Hélène Mauget, Lancel, Lansezeur ou Panaget, Louise Collet, Malvina, Marbrée (La), Mauget, Metz (de), minor ou gracilis, Mistriss Wood, Ordinaire, Oscar Foulard, Panachée pleine, Perpétuelle Mauget, Picciola, Pompon feu, Pompon Mousseux, Ponctuée, Pourpre, Précoce, Prolifère, Pyracanthe, rose foncé, rosinella, Rouge, Sanguine, Sans sepales ou Asepala, semi-double, Unique de Provence, Zoé.

d) pomponia Lindl., DC. (= *burgundica* P. = *provincialis* Ait.), (Rosiers provins).

Abbesse, Abeilard, Adèle Courtois, Adèle Heu, Adèle Lepetit, Adieu de bortier, Admirable, Adorée, A fleurs de rose-trémière de la Chine, Agathe de Montmorency, Agenor, Agnodice, Aimable Amie, Aimable Fanny, Aimée (rose), Alexandre Chartry, Alexandre von Humboldt, Alfieri, Alicia, Aline, Alcine, Alphonse de Coster, Alphonse de Lamartine, Althéer, Alvarès, Amarante (L'), Ambassadeur (L'), Amédée Foucquier, Amélie Mansfeld, Ami Derair (L'), Admiral Dupetit-Thouars, Amphitryon, André, André Foucquier, Antoine Dorimont, Apollon, Argus, Ariane, Ariel, Asmodée, Auristus, Avenant, Avocat Sauzet, Avocat Sirey, Bachelier, Baron de Vicq de Cumptich, Baronne de St. Cyr, Baronne de Stael, Baronne d'Ivry, beauté parfaite, beauté pourpre, beauté sauvage, Bellard (rose), belle Adélaïde, belle cramoisie, belle de Marly, belle desbrosses, belle dévide, belle d'Hyvré, belle d'Yèbles, belle Ecossaisse, belle Elodie, belle Inconnue, belle Kaloos, belle Louisa, belle Octavie, belle Rosalie Delacroix, belle Rosine, belle Virginie, Benjamin Mary, Béranger, Bérénice, Berryer, Bijou des amateurs, Bizarre changeant, Blanche Hocédé, Blucher, Bonheur du jour, Bossuet, Bougainville, Boula d'Auteuil, Bouquet charmant, Brennus, Briséis, Buffon, Cadisché, Cagliostro, Cambronne, Camille-Desmoulins, Capitaine William, Caranjean, Cardinal d'Amboise, Casimir Bonjour, Caspar Hauser, Caura, Cellier, Cerise d'Orlin, Champion, Chapeau noir, Chapelain d'Aremberg, Charles de Mils, Charles Lemaire, Charlotte Corday, Charmante Louise, Chateaubriand, Chou (rose), Cicéron, Clorinde, Cocquereau, Colonel Loix, Columelle, comte de Nanteuil, comte d'Epernon, comte Foy (de Rouen), comte Lacépède, comte Walsh, comtesse Almaviva, comtesse d'Alvilliers, Coq de Biez, Coq de Village, Cordon bleu (Le), Couleur de Brennus, Couronne d'Amour, Couronne des Roses, Couronne im-

Digitized by Google

Rosa

périale, Couronne tender, Cramoisi des Alpes, Cramoisi nuancé, Cramoisi velouté, Curé de Biez, Curvier, Cimodocée, Cynthie, d'Aguesseau, Damoisel, Darius, Daubenton, Delaborde, du Maitre d'Ecole, Delauny, de Bortier, de Theux (rose), diable boiteux, Diderot, Didon, double brique, duc d'Aremberg, duc de Beaufort, duc de Bordeaux, duc de Guiche, duc de Guise, duc de Fitz James, duc de Trévise, duc de Valmy, Duchesse d'Abrantès, Duchesse d'Aremberg, Duchesse de Buccleugh, Duchesse de Berry, Duchesse de Nemours, Duchesse de Richmond, Duguesclin, Dumortier, Dupuytren, Eclat des Roses, Edouard Van Rullen, Eglé, Elisa de Vicq, Elisa Novella, Elisa Lemaire, Elodie, Emile Nelson, Enchanteresse, Enfant de France, Enfant de l'Ouragan, Ernest Bachelier, Ernestine Miellez, Eucharis, Eugéne Janvier, Eugénie, Eurydice, Evelina, Evraerts, Extase (L'), Fanny Bias, Fanny Marshal, Félicité Ruelens, Ferdinand de Buck, Feu brillant, Feu de Buck, Fina Soetmans, Flora Prévost, Franklin, Gain d'Héverlé, Gazelle, Général Bertrand, Général Brias, Général Damremont, Général de Léry, Général Donnadieu, Général Junot, Général Moreau, Gendebien, Gentille (La), Gigantesque, Gérardon, Girodet, Gloire de France, Glorieuse (La), Gonsalve, Grande impériale, Grand cramoisi de Vibert, Grand Monarque, Grand Palais de Fontainebleau, Grand Palais de Laeken, Grande Renoncule, Grotius, Guillaume Tell, Harpagon, Hennequin, Hélène de Lobkowitz, Héliodore Dober, Helvétius, Henrion de Pansey, Henri V., Henri de Buck, Henri Foucquier, Henri Lemaire, Hercule, Hermione, Heureuse surprise, Hippolyte, Hybride van Rullen, Inconnu, Infante, Inflexible, Isoline, Jacques Dessaillis, Jean, Jean de Puydt, Jean Bart, Jeanne Sellier, Jeanne Seymour, Jenny Duval, Jenny Vertpré, Jéricaut, Jolie Parmentier, Joseph Wettecampe, Joséphine Foucquier, Juanita, Juive (La), Juli d'Etanges, Juli Everaerts, Juliette, Justine, Lambert (rose), Laomédon, Latone, Lée, Legouvé, Leonel Desmoustier, Léopold I., Leisel, Lord Byron, Lord Londonderry, Louis Carlier, Louis Parmentier, Louis Philippe, Louis Philippe Foucquier, Louis van Tilt, Ma clochette, Madame Cottin, Madame Dacier, Madame Damoreau, Madame de Coster, Madame de Fabernier, Madame Desbouilières, Madame Desmoutiers, Madame Saportas, Madame Ville, Mademoiselle Berryer, Mademoiselle Montessu, Mademoiselle Sonntag, Maitre d'Ecole, Malesherbes, Malinois, Mariquita, Marguérite Lansezeur, Marie Antoinette, Marie Louise, Marie Tudor, Marjolin, Marquis de Dreux-Brézé, Marquise d'Exeter, Marquise de Trazegnies, Mathieu Molé, Maximilian d'Aremberg, Meunière de Senlis, Moïse, Moïse Parmentier, Montigny, Monthyon, Napoléon, National, Nausica, Néala, Nec plus ultra, Nelly, Nestor, Ninon de Lenclos, Niobé, Noble cramoisi, Noble pourpre, Nouveau Feu, Nouveau Vulcain, Nouvel Evéque, Nouvelle Pivoine, Nouvelle Redouté, Nouvelle transparente, Oberlin, Olivier de Clisson, Olympe, Ombrée parfaite, Oracle du Siècle, Paganini, Palais de Laeken, Paméla, Pa-

Digitized by Google

Rosa

quita, Parthon de Von, Pergolèse, Perle de Brabant, Pérou de Gossart, Petite Orléanaise, Pharamigus, Phoebus, Pierre Corneille, Pierre Janssens, Pierre Sterckmans, Pindare, Placidie, Président de Sèze, Prince Alexander, Prince Frédéric, Prince Normand, Poniatowski, Princesse de Siam, Professeur Michaux, Professeur Sterckmans, Provins éclatant, Prunelle (rose), Pucelle de Lille, Pucelle Jolie, Pucelle Sadeur, Quesné, Rebecca, Reine de Prusse, Reine des Amateurs, Reine d'Espagne, Revenante (La), Robert le diable, Roi d'Angleterre, Roi de France, Roi des Amateurs, Roi des Pays-Bas, Roi de Rome, Roi des Pourpres, Romulus, Rose de wez, Rose Foucheaux, Samson, Sanchette, Semis de Coster, Serinka, Simon Lebouck, Soeur hospitalière, Sophie Cottin, Splendens, Stéphanie Chevrier, Surlet de Chokier, Supérieure (rose), Surpasse tout, Surprise Hoebaerts, Sydonie, Taffin, Tatius, Tète de Maure, Théodolinde, Thérèse Lemaire, Tombeau de Napoléon, Tombeau des amateurs, Transon Gombault, Triomphe d'Aubey, Triomphe de Borgerhout, Triomphe de Flore, Triomphe de Louvain, Triomphe de Parmentier, Triomphe de Sterckmans, Triomphe de Vibert, Valenciennoise, Van Dyck, Vélonie, Velours d'Enghien, Velours noir, Veneux (rose), Vétusie, Vicomte de Spoelberg, Villageoise parée, Vilmorin, Vingt-huit Juin, Vingt-sept Mai, Violette blanche (La), Violette de Canterbury, Violette incomparable, Virgile, Virginie, Walter Scott, Washington, Zénobie.

Aeltere: Abbé Robert, Adèle Gérard, Admirable (L'), Adrien, Aglaé Adanson, Agnès Sorel, Aimable Tastu, Amiral Coligny, Anacréon, Anémone du Luxembourg, Antonine d'Ormois, Aspasie, Bel Alexandre, Belle de Ségur, Blanche de Castille, Blanche fleur, Boule de Neige, Calaisienne (La), Clémence Isaure, Cléopatre, Coriane, Cupidon, Desbordes Valmore, Duboys Dessauzais, Duc de Luxembourg, Duchesse de Berry, Elisa Lemesle, Émérance, Félicité Parmentier, Flora, Grand Sultan (Le), Jeanne d'Urcé, Laetitia, Ledonau le Blanc, Lisbeth, Madame Asselin, Madame Campan, Madame Dubarry, Madame Fontaine, Madame Sandeur, Madame Sommeson, Mélanie Waldor, Mon Protocole, Nouvelle Rose-Pavot, Odette de Champdivers, Princesse Clémentine, Reine des Belges, Sophie de Bavière, Théodora, Vestale (La), Ville de Londres (La).

e) pomponia striato-punctata (Rosiers provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées et panachées).

Abbé Berlèze, Agamède, Agar, A feuilles et fleurs marbrées, Aimable Henriette, Alcine, Anacréon, André Thouin, Anna Czartoriska, Antiope, Aréthuse, Artémise, Arlequin, Bance, Beauté de la Malmaison, Belle de Fontenay, Belle Esquermoise, Belle Herminie, Bizarre marbrée, Baron Louis, Camayeux, Casseret foncé, Catinat, Cosimo Ridolfi, Changeante (La), Chateau de Namur, Comte de Murinais, Cramoisi picoté, Cuvier, d'Assas, Delphine Gay, Donna Sol, Duc de Bassano, Duc de Nemours, Duc d'Orléans, Eulalia Lebrun,

Digitized by Google

Rosa

Euphrasie, Fanny Essler, Fatime, Fénélon, Fontenelle, Fornarina, Gil blas, Hospital (L'), Hersilie, Hortense de Beauharnois, Hypatia, Insigne d'Estèkles, Iphigénie, Isabelle de Lorraine, Jeanne de Laval, Jeanne Hachette, Jean Bart, Kettley, Lavoisier, Lucile Duplessis, Lycoris, Madelon Friquet, Malesherbes, Minos, Monime, Nelson, Nouvelle rubannée, Oeillet parfait, Omphale, Othello ou Maure de Venise, Panachée a fleurs pleines (rubannée), Panaché (Vibert), Panaché a fleurs doubles, Phénice, Pourpre strié de blanc, Régent (Le), Renoncule ponctuée (Vibert), Rosemary, Rouget de L'isle, Royale marbrée, Sombreuil, Ste. Adelgonde (rose de), Sthéphanie Chévrier, Talbot, Tibule, Tricolore de Flandre (Van Houtte), Tricolore de Wazemmes, Tricolore ou Reine Marguèrite, Tricolore (Vibert), Triomphe de beauté, Tulie, Uniflore marbrée, Violette de Douai.

cinerascens Dumort., aschfarbige, ♄. f. Belgien.

cinerea Sw. (= *cinnamomea* L. var. Spgl.), aschgraue, ♄. f. Schweden.

cinnabarina Wrede, zinoberfarbige, ♄. f. ?

cinnamomea L. (= *acuminata* Sw. = *aristata* Lapeyr. = *collinocola* Ehrh. = *fluvialis* Flor. dan. = *majalis* Retz, Herrm. = *mutica* Flor. dan. = *orthosepala* γ Schimp. et Spenn. = *spinosissima* Whlbg.), β) foecundissima Münchh., γ) turbinella Sw., δ) gemella W. (= *daburica* Pall.).

clinophylla Redouté, (= *cinnamomea pallida* Sering.), geneigtblätterige, k. ? Ostindien.

Clusiana Waitz, (= *blanda* Ait. var. ? Rchb.), Clusius's, ♄. f. ?

collina Jacq. (= *canina* L. var. Desv., K., DC. = *campestris* Sw.). Var.: bractescens Woods, caucasica MB., fastigiata Bast., flexuosa Rau, Friedländeriana Bess., glandulosa Bess., non Bell., humilis Bess., Jundzilliana Bess. (= *Jundzilli* MB.), leucantha MB., nitidula Bess., platyphylla Rau, psilophylla Rau, puberula Desv., Ratomsciana Rau, Ravi Tratt., trachyphylla Rau.

concavifolia Waitz, Lk., hohlblätterige, ♄. f. ?

concinna Hort., Hamb., nette, ♄. f. ?

coriifolia Fr. (= ? *calycina* MB. = *canina fulgens* Lemeunier, = *canina grandiflora* Red. = *collina* γ Whlbg. = *crassifolia* Liljebl. = *sepincola* Sw. = *sepium* Sw.).

cuspidata MB. (= *pseudorubiginosa* Lejeun. = *spinulifolia* β *Foxyana* Thory Red. = *tomentosa* Sm. var. K.).

damascena L. (= *belgica* Mill. = *bifera* P. = *calendarum* Borckh. = *gallica portlandica* Bosc, = *monstrua* Andr. = *myropolarum* Duham. = *semperflorens* Dsf., non Curt.), α) coccinea Red. et Thor., β) officinalis Ser., γ) variegata Ser.

Gartenvar. a) (Rosiers des quatre saisons et Portlands dits Perpétuelles.

Adrienne, Antinous, Belle Fabert, Belle Italienne, Bernard, Bifera venusta, Bigard, Billiard, Carmin royal, Claire du Chatelet, Coelestine, Couronne de Béranger, Damas monstrueux ou la Magnanime, Dame Rose, d'Angers, de Rennes, d'Esquermes, du Roi (rose),

Digitized by Google

Rosa

du Roi strié, Duc d'Enghien, Ebène, Emilie Duval, Ernestine Odiot, Fanta, Féburier, Ferox, Florin, Foulard, Gentilhomme, Gracieuse, Grand Papa carré, Gris cendré, Isaure Lahlé, Jenny Audio, Joséphine Antoinette, Lady Seymour, Laurence de Montmorency, Lodoiska Marin, Loïsa Puget, Madame Aimée, Madame Féburier, Madame Tellier, Marie Denise, Marjolin, Mienne (La), Minerva, Mogador ou rose du Roi, Momus, Monstrueuse, Montmorency (De), Noël, Odeur (A) de Jacinthe, Page (Le), Palmyre, Palotte picotée, Pauline de Mondeville, Philippe I., Phoebus, Portland blanc ou Quatre-Saisons magnifique, Portland double, Portland pourpre, Portland rose a grandes fleurs, Preval, Prince de Galles, Prud Homme, Pulchérie, Quatres-Saisons a feuilles bullées, Quatres Blanc, Quatres mousseux, Quatres Rose, Reine des Perpétuelles, Réquien, Saint-Barthélemy, Saint-Fiacre, Surpasse Antinous (Thierry), Taffin, Thiers, Torrida, Van Mons, Waratah, Zelpha.

b) Rosiers Damas.

Admirable bordée rouge, Angèle, Arlinde, Atala, Atalante (*Damas hybride*), Blanche Davillers, Blanche Hocédé, Bouvet, Calypso, Cardinal d'Amboise, Césonie, Comtesse Odouard, Constance (La), Déesse de Flore, Douceur (La), Duc de Sussex, Elise Voiart, Fiancée (La), Léda, Les 221 de 1830, Les trois Mages, Louis XVI., Madame Deshouilières, Madame Hardi du Luxembourg, Madame Lambert, Madame Zoutmann, Malvina, Marguèrite de Flandre, O'Eillet parfait, Pénélope, Pompon Toussaint, Princesse Amélie, Princesse de Portugal, Rose Verhux, Sémiramis, Soyeuse (La) ou Grand Edouard, Triomphe de Rouen, Ville de Bruxelles (La).

dumetorum Thuill. (= *affinis* Rau, = *agrestis* Rau, = *arvensis* Wib. = *Borreri* Woods, = *Forsteri* Sm. = *laciniata* Lejeun. = *platyphylla* Rau, = *sepium* Borckh. = *solstitialis* Bess. = *sylvestris* Schultz, = *umbellata* Lejeun. = *uncinella* Bess.), var. sylvestris Rchb.

erubescens Andr., bleichrothe, ♄. f. ?

Fischeriana Bess., Lk., Fischer's, ♄. f. Rufsland.

flexuosa Rafin, (non Rau), (= *Rafinesqueana* Tratt.), hin- und hergebogene, ♄. f. Nordamerika.

fragariaefolia Sering., erdbeerblätterige, ♄. k. f. b. China.

gallica L. (= *varia* Schimp. et Spenn.). Var.: agrestis Gmel., arvina Rau, basilica Roess., belgica Mill., bourbonica Roess., Candolleana Thor., cardinalis Lawr., cordifolia Hort., episcopalis Hort., formosa Roess., geminata Rau, Mundi Hort., papaverina Mch., Polliniana Spgl., praenaestina Mill., striata Wrede, versicolor Hort. β pumila Jacq. var. cuprea Jacq., holosericea Roess., humilis Tausch, Makeka Dupont., mutabilis Dum. Cours., olympica Don, sanguinea Roess. etc.

glaberrima Dumort., kahlste, ♄. f. Belgien.

glabra Andr., kahle, ♄. f. ?

globosa Rafin., kugelblumige, ♄. f. Nordamerika.

Gmelini Bunge, (= *canina* Sievers), Gmelin's, ♄. f. Sibirien.

Digitized by Google

Rosa

Grevillei Hort., Greville's, ħ. f. China.

Hystrix Lindl. (= *nivea* DC.).

inodora Fr., Hook. (= *Borreri* Woods, = *dumetorum* Sm. = *grandiflora* Wallr. = *rubiginosa inodora* Fr.), geruchlose, ħ. f. Europa.

Lawrenceana Sweet, (= *semperflorens minima* Sims). Var.: Blanc, de Chartres, Désirée (La), Dieudonné, Gloire des Lawrenceanas (La), Jenny, Laponne (La), La Mouche, Miniature (La), Multiflore, Pompon ancien, Pompon Bijou, Pourpre brun, Retour de Printemps.

Lindleyi Spgl. (= *carolliniana* ε Ait. = *laxa* Lindl. = *pseudolucida* Bess.).

microphylla Roxb. Var. (Rosiers microphylles ou à petites feuilles), Ancien a fleurs pleines, Pourpre ancien, Pourpre du Luxembourg, Rose cendrée, Triomphe de Macheteaux.

moschata Mill. Var.: Comtesse de Nassau, Comtesse Platre (La), Double ancienne, Nantaise (La).

multiflora Thbg. (= *florida* Poir., Curt. = *floribunda* Hort. = *prolifera* Hort.).

a) Rosiers multiflores.

A fleurs blanches, Coccinée, de la Grifferaie, Graulhié, Laure Davoust, Rose.

b) Rosiers multiflores Américains.

Beauté des Prairies, Rubifolia elegans, Rubifolia purpurea, Rubifolia superba, Rubifolia belle de Baltimore.

purpurascens Fisch., purpurfarbige, ħ. f. Sibirien.

Raffinesquii Sering., Raffinesque's, ħ. f. Nordamerika.

Redowskyana Bess., Redowsky's, ħ. f. Sibirien.

Roxburghii Hort. (= *alpina* Pall. = *Candolleana* DC. = *pendulina* Roth, = *polyphylla* W.), Roxburgh's, ħ. f. England.

rubiginosa L. Gartenvariet.: double massy sweet briar, double red sweet briar, double rosy sweet briar, double rosy sweet briar, double tree sweet briar, eglantine sweet briar, Eglanteria alba, evergreen sweet briar, large blus sweet briar, maiden sweet briar, Mannings sweet briar, monstrous sweet briar, royal sweet briar, scarlet sweet briar, semidouble dwarf, semidouble white sweet briar etc.

rugosa Thbg., runzelige, ħ. k. Japan.

rupicola Fisch., Felsen-R., ħ. f. Altaisches Sibirien.

semperflorens Curt. (= *indica* L. var. Auct. = *longifolia* W. = *sinica* Sm.). Var.: Noisettiana Red. (= *paniculata* Hort. Genev.), odoratissima Swt. (= *Thea* Hort) etc.

Hybriden: a) Rosiers Bengales.

Abbé de Lacroix, Abbé Mioland, A bois strié, Adeline Come, A feuilles luisantes, A odeur d'Anis ou Egine, Aimé Plantier, Aimé Desprez, Alcine, Alphonsine, Amiral de Rigny, Amiral Duperré, Anaïs, Annette Gysels, Antoinette d'Orgot, Archiduc Charles, Arsinoé, Assuérus, Atropurpurea, Augustine Hersant, Azaïs, Baronne Delaage, Beau Carmin du Luxembourg, Beau Narcisse, Belle de Monza, Bernard de Montbyon, Bleu de la Chine, Boisnard, Bolivar, Bonheur du jour, Bouquet

Digitized by Google

Rosa

des Dames, Brillant Email, Buret, Caméléon (Desprez), Camellia (Lelieur), Camellia (Orly), Camelliaeflora, Camoens (Le), Carmin du Luxembourg, Carmin d'Yèbles, Caryophyllata, Charles Maurice, Charmante (La), Clara, Clarisse, Comble de Gloire, Comtesse de Méloré, Confucius, Conquête heureuse, Couronne des pourpres, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, d'Allemagne (rose), Darius, David, de Créqui, Desfontaines, Don Carlos, Doux Espoir, Duc de Bordeaux, Duchesse de Kent, Elisa Mercoeur, Etna (L'), Eugène de Beauharnois, Eugène Hardy, Fabvier, Fanny Duval, Faucheux, Fénélon, Fénélon (du Luxembourg), Flore, Fraiche Elisa, Frédéric Weber, Futardo, Général Lowestine, Général Soyer, Général Gerson, Gloire de Modeste, Gloire de Peley, Gouvion de St. Cyr, Gracilis, Grandidier, Hanneloup, Hardi, Henriette, Henry V., Hermine, Hermite, Hortensia, Hospitalière, Hippolyte, Icteros, Indica superba, Isidore (d'Angers), Jacques Plantier, Jeanie Deans, Jean Marie, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Joubert, Jules Janin, Lacépède, Lemesle, Léonidas, Louis XII., Louis Philippe (d'Angers), Lucile, Madame Bréon, Madame Bureau, Madame de Créqui, Madame Desprez, Madame Desrongé, Madame Fries Morel, Marjolin (du Luxembourg), Marquis de las Marismas, Mars, Maxima rosea, Mazerati, Menès, Miellez, Miranda, Mistriss Clarendon, Modeste, Molière, Mont St. Bernard, Mousseaux, Némésis, Paillet, Parfaite (La), Pajol, Parure de flore, Pépin, Perfection, Petite Nini, Philippe I., Pluton, Pompon Parfait, Pourpre (Lelieur), Prince Charles (Luxembourg), Prince Eugène (Luxembourg), Régulière (La), Reine Blanche, Reine de Lombardie, Rhadamiste, Roi des Belges, Roi des Pourpres, Romain Desprez, Roméo, Rouge transparent, Rubens, Saint-Priest de Breuze, Saint-Samson, Sanguin, Snelgrave, Superba ou belle Marguérite, Superba purpurea, Superbe (La), Superbissima, Taglioni, Tancrède, Thérésia Stravius, Thétis, Triomphant, Triomphe des Bengales, Triomphe de Gand, Unique, Valentina, Vésuve (Le), Victoire (d'Angers), Victoire d'Aumy, Vincent Couturier, Virginale, Virginie Lebon, Zèlie, Zirko.

b) Rosiers Noisettes.

A grandes fleurs pourpres, Aimable Fanny, Aimée Vibert, Anatole de Montesquieu, Anémone du Luxembourg, Antonine, Angelica, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Belle Sarah, Bernard, Biche (La), Bizarre, Blanche de Chatenay, Blanche d'Orléans, Bougainville, Boulogne, Bourdon blanc de Chatenay, Camellia (rose), Charles X., Chloris, Chromatelle (Cloth of Gold), Clara Wendel, Clarisse Harlowe, Comtesse de Tolosan, Comtesse Orloff, Coronis, Corymbosa, Désiré Roussel, Despalais, Desprez, Donna Maria, Duc de Nemours, du Luxembourg (rose), Ducreux, Edmond Garat, Elisa Lemaire, Eugène Pirolle, Eugénie Dubourg, Euphrosine, Fellemberg, Fleur du jeune age, Galaxie, Halingen (D'), Henri, Holopherne, Jeanne d'Arc, Jules Deschiens, Julie de Loynes, Julienne Lesourt, Juliette, Lactans, Lady Stanhope, Lamarque, Lascaris, Lée,

Digitized by Google

Rosa

Lerby, Maculée de Buret, Madame de Chalogne, Madame Guérin, Madame Jouvain, Majestueuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons, Monstrueuse, Morphée, Narcisse, Némésis, Nymphe Echo (La), Ophirie, Paniculée, Pauline, Pauline Henry, Petit, Philomèle, Pourpre de Tyr, Princesse d'Orange, Pumila, Rotanger, Similor, Solfatare, Spectabilis, Tendresse (La), Théobaldine, Uranie, Victoire d'Aumy, Victorieuse (La), Vitellina, Zobéide.

c) Rosiers thés ou rosiers de l'Inde.

Abricotée, Adam, Adelina Camille, Afranie, A grandes fleurs, Albion, Alexandre Rohard, Aline, Amona, Anthérose, Arabella, Arance de Navarra, Archinto, Archiduchesse Thérèse Isabelle, Aurore, Barbot, Bardon, Bause, Belle Allemande, Belle Archinto, Belle Fédore, Belle Georgine, Belle Mélanie, Belle Traversi, Bergmann, Besnier, Blanc Lelieur, Bocage, Boidron, Bou Silène, Bougère, Bourbon, Boutelaud, Boutrand, Buret, Caennaise (La), Caroline, Cassio, Charles V., Charles Raybaud, Chevalier d'Amour, Chrysocome, Clara Sylvain, Clarisse Desarbres, Claudia Gourd, Comte de Paris (Luxembourg), Comte d'Osmond, Corinne, Curieuse (La), Delicatissima, Delphine Gaudot, Desfontaines, Devoniensis, Douceur d'Henri IV., Duc de Grammont, Duc d'Orléans, Duchesse de Kent, Duchesse de Lavallière, Duchesse de Mecklembourg, Duchesse d'Orléans, d'Yèbles, Eclair de Ju, Élisa Mercoeur, Élisa Sauvage, Esther Duval, Eugène Hardy, Eugénie Desgaches, Eugénie Jovin, Fanny Boytd, Favorit, Fiancée d'Abidos, Flavescens, Fleur de Cypris, Floralie, Fragoletta ou Roi des Belges, Framina vera, Galathée, Gama, Général Valazé, Général Vallée, Georges Sand, Gigantesque, Gonda, Goubault, Grandidier, Guillaume II, Hamon, Hétéroclite, Honneur de Flandre, Hortensia, Hyménée, Jaunatre, Jaune ancien, Jeune Arcole, Joseph, Joséphine Malton, Jules Félice, Julie Massais, Lady Palmer, Lady Warender, Lawson Gower, Lebreton, Lucile Dubourg, Lutescens mutabilis, Lyonnaise, Madame Astaix, Mad. Chavant, Mad. de Rohan, Mad. Dupuis, Mad. Féray, Mad. Goubault, Mad. Guérin, Mad. Jacqueminot (du Luxembourg), Mad. la princesse Adèlaide, Mad. Roussel, Mad. Tissot, Mad. Villerand, Mademoiselle de Salvandy, Magnus Ladulus, Malibran, Malmort, Mansais, Maréchal Bugeaud, Maréchal Vallée, Marguèrite, Marie de Médicis, Ma tante Aurore, Maximilien, Mélesville, Merlet de Laboulay, Mirabilis, Moirée, Mondon, Morphée, Narcisse (*Mansais*), Néreide (La), Nid d'Amour, Nina, Niphétos, Nisida, Nitida, Olympie, Originale, Orphaline, Pactole (Le), Pair de France, Paris, Pauline Plantier, Pellonia, Pépin le Bref, Perfection, Pharaon, Prince d'Esterhazy, Princesse Adelaide du Luxembourg, Princesse Charlotte, Princesse Hélène (Luxembourg), Princesse Marie, Stéphanie, Reine de Golconde, Reine de Paestum, Reine des Belges, Reine Victoria, Rénommée (La), Rêve de Bonheur, Romain, Rose du Luxembourg, Rubis, Safrano, Scholastique, Sémélé, Siléne, Smith, Soliman, Solitaire, Souvenir du 30. Mai, Strombio, Sylphide (La), Taglioni, Thémistocle, Thouin,

Digitized by Google

Triomphe de la Guillotière, Triomphe du Luxembourg, Valentine, Vandael, Venusta, Victoire modeste, Victoria, Virginie, Walter Scott.

sempervirens L. (= *fusca* Flor. Wetter. = *prostrata* DC.). β) Leschenaultiana Redout. (= *Wallichii* Sabine). Var. (Rosiers toujours verts): Adèlaide d'Orléans, Blanc a fleurs pleines (Vibert), Donna Maria, Félicité Perpétuel, Madame Plantier, Princesse Louise, Princesse Marie, Rose de Laffay.

sepium Thuill. (= *balsamea* Bess. = *glutinosa* Schultz, = *Kluckii* Bess. = *resinosa* Lej. = *rubiginosa glabra* Rau, = *rubiginosa resinosa* Wallr. = *rubiginosa sepium* Sering. = *stipularis* Merat), Zaun-R., ♄. f. Europa.

Serafinii Visiani, (= *rubiginosa* L. var. Spgl.), Serafini's, ♄. f. Corsica.

serrulata Rafin., sägezähnige, ♄. f. Nordamerika.

setosa Bess., Lk., borstige, ♄. f. Podolien.

sicula Trattin., sicilianische, ♄. f. Sicilien.

Sielverhielmii Hort. Petropol., Sielverhielm's, ♄. f. Sibirien.

sinica RBr. (= *macarthnea* Dum. Cours).

soongarica Bunge, soongarische, ♄. f. Soongaria.

spinosissima L., δ) sanguisorbaefolia Donn, (= ?*sorbifolia* Hort.). Var.: hispida argentea Redout., Candolleana flavescens Redout. — (Rosiers pimprenelles) Blanche double, Cénomane (La), Estelle, Jaune double, Scotch perpetual, Stanwell, Victoria. — (R. Pimprenelles hybrides), Gracieuse (Peltier).

sulphurea Ait. Var.: Ancien Jaune a fleurs doubles, Minor ou Pompon jaune.

tomentosa Sm. (= *Borkhausenii* Tratt. = *polymorpha tomentosa* Schimp. et Spenn. = *villosa* Auct., non L.).

Ventenatiana Redout, Ventenat's, ♄. f. ?

Wallichii Sabine, Wallich's, ♄. k. Ostindien.

Webbeana Wall., Webb's, ♄. k. Ostindien.

Wilsoni Don, Wilson's, ♄. f. England.

Wolfgangiana Bess., Wolfgang's, ♄. f. Galicien.

Wulffenii Tratt., Wulffen's, ♄. f. Kärnthen.

Unbestimmtere: Belladonna Hort., Clusiana Waitz, concinna Hort., echinata Waitz, Lk., elliptica Tausch, (= *rubiginosa* Guimp.), georgina Hort. Hamb., grisea Wrede, hemisphaerica Spgl., Hillebrandtii Weitenw., hispanica Mill., Krockeri Tratt., japonica Waitz, (= *multiflora* Auct.), Leeana Swt., Longii Swt., maritima Wrede, marmorea Roess., massiliensis Hort., Maukschii Schult., Ungarn, miniata Wrede, minuta Hort. anglor., missourensis Hort., muricata Waitz, polyantha Roess, Portenschlagiana Tratt. (= *alpina* L. var. Wallr.), praecox Hort. angl., procera Hort., Sibirien, pubescens Fisch., pyramidalis Wrede, ranunculiformis Hort., reclinata Hort., repanda Hort. angl., Schottland, Roxburghii Hort., rubricans Roess. (= *reginae* Hortul. = *virginalis* Wrede), rubripetala Roem., ruficaulis Ehrh. (= ?*portlandica* Hortul.), Russeliana Hort. Lond., simplex Scopol. (= *Scopoliana* Tratt.), Sprengeliana Tratt. (= *virginica* Curt., Spgl.), subalba Hort., China, superbissima Waitz, sylvatica Tausch, Böhmen, teneriffensis Hort., trichocarpa Waitz, verecunda Waitz, (= *damasena* Mill. var.?), Waitziana Rchb., versicolor et violacea Hort. (var. R. gallic.).

Digitized by Google

Hybriden verschiedener Abstammung, welche man unter folgende Abtheilungen gebracht hat:

I. Topfrosen.

A. Rosiers perpétuelles de l'Ile Bourbon.

Abbé Plantier, Abrabanelle, Acidalie, Aliza, Alfred Colomb, Amarantine, Aménaïde, Amourette, Anaïs (R. Thibaut), Anomala, Antoine, Armanda, Astaroth, Astérodie, Auguste de Chalonges, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Béluze, Belzunce (Dorizy), Bizarine, Bossue, Bouquet de Flore, Bréon, Cardinal Fesch, Carnée de Montmorency, Célimène, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cérès, Charles Desprez, Charles Souchet, Charméide, Chatenay, Clémentine, Comice de Seine et Marne, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comte de Troyes, Comtesse de Colbert, Cythérée, Delamartine, Delille, Desgaches, Deuil du duc d'Orléans, Docteur Blandin, Docteur Roques, Don Alvar, Duc de Chartres, Duc de Grammont, Dumont de Courset, Dupetit Thouars, d'Yèbles, Edouard Desfossé, Elvire, Emile Courtier, Emile Plantier, Enfant d'Ajaccio, Fafait, Faustine, Fédora, Fin Rubis, Fleur de Nérium, Gantin, Georges Cuvier, Gloire de la Guillotière, Gloire de Paris, Hennequin, Henri Lecoq (Lacharme), Henri Plantier, Hermosa, Hersilie, Ida Percot, Ida Sisley, Impératrice Joséphine, Jacquard, Joséphine Garnier, Julie de Fontenelle, Julie de Loynes, Julie Sisley, Justine (Rousseau), Lavinie d'Ost, Lady Canning, Le Camée (Béluze), Le Creps, Le Grenadier, Lord Grey, Louis XIV., Lychas (Guillot), Madame Angélina, Mad. Aubis, Mad. Aude, Mad. Desprez, Mad. Hobetz, Mad. Lacharme, Mad. Margat, Mad. Nérard, Mad. Plantier, Mad. Rachel, Mad. Tripet (Margottin), Madeleine, Mademoiselle de Montesquiou, Manteau de Jeanne d'Arc, Maréchal de Villars, Maréchal du Palais (Béluze), Marianne, Marie Duleau (Renard Courtin), Marquis de Moyria (Lacharme), Marquis d'Osseray (Boyau), Marquise d'Ivry, Meldoise (La), Menoux (Lacharme), Méris, Miss Fanny, Mistriss Bosanquet, Mistriss Lane, Napolèon, Néphis (R. Thibaut), Nérine, Neumann, Nicolas Rollin (Dorisy), Ninon de l'Enclos, Palatine, Pallas (R. Thib.), Panachée (R. Thib.), Pandore (R. Thib.), Parfaite (La), Parquin, Phoenix (Le), Paul Joseph, Pauline Leclerc, Pierre de St. Cyr, Pourpre Fafait, Prémices des Charpennes (Et. Armand), Prince de Croy, Prince de Salm, Princesse Clémentine, Princesse de Joinville, Proserpina, Reine des Iles-Bourbon, Reine du Congrès, Rémond (Sylvain Jean), Roblin, Sepintarus (Guillot), Souchet, Souvenir d'Anselme, Souvenir de la Malmaison, Souvenir de Dumont d'Urville, Stavius, Terenta, Thérèse Margat, Thérésita, Triomphe de la Guillotière, Triomphe de Plantier, Valérie, Véléda, Vicomte de Cussy (Margottin), Victoire argentée, Virgile, Zélinda, Zuléma.

B. Rosiers hybrides remontants.

Abbé Raynal, Aricie, Aubernon, Augustine Mouchelet, Baronne Prévost, Blanche Lamouroux, Clémentine Duval, Clémentine de Neuilly, Comte de Paris, Comte d'Eu, Comtesse Taneguy Duchatel (Laffay), Coquette

Digitized by Google

de Montmorency, Coquette de Bellevue, Descrivieux, Deuil de l'amiral Dumont d'Urville, Docteur Jobert, Docteur Marjolin, Docteur Marx, Duc d'Alençon, Duc d'Aumale, Duchesse de Montmorency, Duchesse de Nemours, Duchesse de St. Quentin, Duchesse de Sutherland, Edouard Jesse, Elisa Balcombe, Enfant d'Ajaccio, Ernestine de Barante, Fulgorie, Général Merlin, Gloire de Guérin, Julie Dupont, La Bouquetière, Lady Elphinstone, Lady Alice Peel, Lady Fordwich, Lane, La Reine, Laure de Montmorency, Liliacée (Lacharme), Louis Bonaparte, Louis Napoléon, Louis XIV., Madame Damème, Mad. Daresmes, Mad. Emma Dampierre, Mad. Jobez Desgaches, Mad. Laffay, Mad. Lucy Astaix, Mad. Morel, Mad. Oudin, Maréchal Soult, Marjolin, Marquis d'Ailsa, Marquesa Boccella, Mélanie Cornu, Mérope, Miroir (Le), Mistriss Cripps (Laffay), Mistriss Elliot, Newton, Pauline Plantier (Clémentine Seringe, Baronne Aymer, Mistriss Wood), Pauline Levaneur, Perpétuelle indigo (Laffay), Perpétuelle de Neuilly, Perpétuelle ponctuée (Laffay), Prince Albert, Prince Bonaparte, Princesse de Salerne (Margottin), Princesse Hélène, Prudence Rieser, Reine de Fontenay, Reine de la Guillotière, Reine de Lyon, Reine Victoria, Renoncule (La) (Margottin), Rivers, Roch Plantier, Rose de la Reine, Sisley, Talbot, Thibault, Yolande d'Aragon.

C. Variétés ayant rapport aux rosiers de l'île Bourbon.

Cadoudal (Dorisy), Duc d'Isly (Lacharme), Madame Gros.

D. Variétés ayant rapport aux Portlands ou Perpétuelles.

Amanda Patenote (Vibert), Cornet (Lacharme), Lindley (Oudin, aîné et fils), Madame Verdier (E. Verdier, fils), Mardonius (Béluze), Reine du Matin (Béluze), Renufe d'Osmond (Cornu).

II. Landrosen.

A. Rosier hybrides incertains.

Agathe Porukez, Amandine, Ancelin (rose), Blanc de M. Dubus, Catherine Guislaine, Charles Foucquier, Comtesse Lacépède, Comtesse Plater, Emmeline, Géorgienne (La), Hélène Maret, Michaela, Reine de Belges (La), Sextus Pompilius, Targélie.

B. Rosiers hybrides de Bengale. (non remontants).

Abondante, Adèle Ancelin, Adolphe Cachet, A fleurs blanches, Alphonse Maille, Alzire, Ami Decoster, Admiral de Rigny, Ancelin, A odeur d'Anisette, A odeur de Pate d'Amandes, A pètales frangés, Archevêque de Besançon, Arpajon, Aspidie, Assuérus, Anzon, Beauté du jour, Bellard, Belle de Parny, Belle de Rosny, Belle d'Yvrée, Belle Ecossaise, Belle Hélène, Belle Héloise, Belle Thuraite, Béquet, Béranger, Bombelina, Bonne Geneviève, Brennus, Camuzet carné, Célestial, Charles Louis, Chateaubriand, Claude Lorrain, Clef d'or, Colonel Fabvier, Comte Coutard, Comte de Breteuil, Comte de Colbert, Comtesse de Lacépède, Comtesse de Montalivet, Cornélie, Coupe d'Hébé,

Digitized by Google

Rosa

Couture, Dandigné de la Blanchaie, Daubenton (Laffay), Dauphine, David (Vibert), DeCandolle, Delaage, Delaborde, Desmarchais, Deuil du maréchal Mortier, Docteur Billiard, Dollon, Duc de Choiseuil, Duc de Devonshire, Duc de Richelieu, Duc de Sussex, Duchesse de Montebello, Duvivier, Edelmonde, Edouard van Maelen, Ernest Féray, Eucharis, Euphrosine, Eynard, Fenner, Ferdinand St. Esseille, Fleurette, Flora Mac-Yvor, Fontaine Yolande, Fraiche Erigone, Frédéric de Prusse, Général Athalin, Général Bernard, Général Dauménil, Général Kléber, Georges IV., Georgine, Gloire de Colmar, Gloire des Helènes, Gloire d'un parterre, Grand Edouard, Grand Hubert, Henri Barbet, Hortense Leroi, Hortensia, Jacques, Jeanne Seymour, Kléber, Lady Stuart, Laharpe, Lascases, Lastente, Le 29. Juillet, Lord Kelt, Lord Nelson, Louis Grand, Luxembourg, Madame Poncey, Magnagnime, Magna rosea, Marbrée, Maréchal Duroc, Maréchal Lannes, Maréchal Mortier, Marie de Champlouis, Météore (Le), Miralba, Miss Rosalie, Mistriss Rivers, Moyenne, Manteau de l'Evêque d'Angers, New white, Ninon, Noémi, Nubienne (La), Pallagi, Parny, Petit Pierre, Plantier, Ponceau Capiaumont, Poncey, Pourpre (rose), Quintinie (La), Reine des Belges, Reine des Hybrides, Richelieu, Rodriguez, Roi des Hybrides, Sans égale, Saphirine, Saudeur, Tragélie, Titus, Vandael, Vanhuissen, Vauban, Velours épiscopal, Vibert, Violette Billard, Violette sans Aiguillon, Volney, Zelineda, Zéphyrine.

C. Rosiers hybrides de Noisettes.
(non remontants).

Adolphe, A fleurs blanches, Belle Parabère, Briséis, Claire d'Olban, Colombienne (La), Comtesse Baillet, Dauphine (La), Egérie, Elisabeth Fry, Hybride parfaite, Madame Plantier, Madeleine, Nathalie, Plantier, Pompon carmin, Rachel Ruich, Rosalba, Sophie d'Houdetot, Ursule Deveaux.

D. Rosiers hybrides de l'ile Bourbon.

Admiration (L'), Andrieux, A pétales mucronés, Athalin, Brennns, Brown, Capitaine Sisolet, Charles Duval, Chatelain, Coeline, Daphné, Dauphine, Duc Decazes, Esméralda, Helvétius (Laffay), Horatius, Lascases, Legouvé, Lord John Russell, Louis Philippe, Milton, Moyenne, Paul Perras, Riégo, Striée, Superbe (La), Sylvain Chaubert, Victor Hugo, William Jesse.

E. R. hybrides de l'ile Bourbon mousseux.

Delphinie, Princesse Adelaide (Laffay). —

Rosiers Capucines Hortul. sind = mit Rosa lutea Dalech., Mill., deren wenige Varietäten p. 698 verzeichnet sind.

berberifolia Pall. (= ***monophylla*** Hort. = ***persica*** Mchx. = ***simplicifolia*** Salisb.), (Rosiers à feuilles d'epine-vinette) et hybrid. Hardyi, v. Lowea berberifolia, p. 479 et p. 373, II.

Pag. 693—701 zu ergänzen und zu berichtigen. [1])

1) Was die neueren Rosenvarietäten und Hybriden, die viele der älteren verdrängt haben, anlangt, so habe ich dabei vor-

Digitized by Google

Roscyna Spach, *americana* Spach, *Gebleri* Spach, *Gmelini* Spach, v. Hypericum pyramidat., Gebleri, Ascyrum.
Rosea elatior Mart., v. Iresine elatior, p. 421.
Rosmarinus chilensis Molin., v. Sphacele campanulata.

Rospidios A. DC., Dattelkirsche, XXII. XII., Sapotaceae-Ebenaceae.

vaccinioides A. DC. (= *Diospyros vaccinioides* Hook., Lindl.), heidelbeerähnliche, ♄. ♄. t. China, Malacca.

Rostellaria N. E., diffusa N. E., procumbens N. E. (= *Justicia hirtella* Wall.), v. Justicia Sect. XII., p. 435.
Rostraria laevis Trin., v. Avena (Sect. IV. Trisetum) neglecta, p. 107. *R. pubescens* Trin., v. Koeleria phleoides, p. 439.
Rotala Roxburghiana Wight, v. Ammannia pentandra, p. 47.
Rothia trifoliata P., v. Westonia humifusa.
Rothia Schreb., *andryaloides* G., *argentea* L., *cheiranthifolia* Roth, *runcinata* Roth, v. Andryala Rothia, ragusina β lyrata, sinuata et integrifol., p. 58.
Rothmannia capensis Thbg., v. Gardenia Rothmannia.

Rottboellia L. fil., RBr.

hirsuta Vahl, (= *Coelorhachis hirsuta* Brogn. = *Ischaemum hirsutum* N. E. = *I. mastrucatum* Trin. = *Triticum aegilopsoides* Forsk.), rauhhaarige, 4. k. Aegypten, Arabien.

perforata Roxb., p. 701, (= *Hemarthria perforata* Kunth, = *Ophiurus perforatus* Trin.), wird kaum kultivirt.
dimidiata Thbg., v. Stenotaphrum americanum, *fasciculata* Lam. (= *altissima* Poir. = *articulata* Thbg. = *spathulata* Tenore), v. Lepturus fasciculatus, p. 353, II. — *biflora* Roth, (= *pannonica* Host, = *salina* Spgl. = *salsa* Fisch.), *filiformis* Roth, (= *compressa* Guss. = *erecta* Savi, = *incurvata* β DC. = *gracilis* Mill.), *incurvata* L. fil. *subulata* Savi, (= *adscendens* Brotero, = *cylindrica* W.), v. Lepturus pannonicus, filiformis, incurvatus, cylindricus, p. 456.

Rottleria Roxb., Rottlera.

fulva Kl., Hffg., rothgelbe, ♄. w. Java.
Rubieva multifida Moq., Tand., v. Chenopodium multifidum, p. 189.
Roucela Erinus Dumort., v. Campanula Erinus, p. 153, *hederacea* Dumort., v. Wahlenbergia hederacea, p. 854.

Roulinia Decaisne, (Dr. Roulin, hat über naturhistorische Gegenstände Nordamerikas geschrieben), V. II., Asclepiadeae.

Jacquini Decaisne, (= *Cynanchum foetidum* H. B. K. = *C. racemosum* Jacq. = *Asclepias foetida* Cav.), Jacquin's, ♄. t. Mexico.

versicolor Decaisne, (= *Morrenia odorata* Hort., non Lindl.), verschiedenfarbige, ♄. Sch. t. w. Buenos Ayres.

---

züglich auf van Houttes reichhaltige Sammlung in Gent, deren sorgfältiges Verzeichniss in dessen „Etablissement horticole" (Prix-courant pour l'automne de 1846, le printemps et l'été 1847) enthalten ist, Rücksicht genommen, und selbiges hier dankbar benutzt. Die wissenschaftliche Kritik vieler Arten (species) aber betreffend, so hat dieselbe noch eine eben so schwierige Aufgabe als bei der Gattung Rubus zu lösen.

Digitized by Google

Roumea coriacea Poit., v. Drypetes crocea,
Roupala Aubl., v. Rhopala, p. 686 et 592, II.
Rourea Aubl., *frutescens* Aubl., v. Conarus pubescens, p. 214.

Rousseauxia DC., (Desrousseaux, franz. Botaniker u. Mitarbeiter an Lamarck's Encyclopaed. botanique), X. 1., Lythrariae-Melastomaceae.

chrysophylla DC. (= *Melastoma ? bicolor* Mill. = *M. chrysophylla* Desr.), goldblätterige, ħ. w. Madagascar.

Roxburghia Jon., Roxburghiaceae Endl.

gloriosoides Roxb. (= *gloriosa* P. = *viridiflora* Sm.), p. 701.
Roxburghia Koen., *baccata* Koen., v. Olax scandens, p. 556.

Royena L., Royena.

cuneata Poir. (= *pubescens* W.), keilförmige, ħ. k. Cap der guten Hoffnung.
myrtifolia Wendl., myrtenblätterige, ħ. k. Cap d. g. H.
villosa L. (= *scabra* Burm.).
Unbestimmtere: latifolia W., media Hort.
ambigua Vent., *polyandra* L., v. Euclea elliptica, p. 235, *lycioides* Dsf., v. Diospyros lycioides.
Rubentia Boj., *angustifolia* Boj., v. Toddalia angustifolia, p. 812.
Rubentia Juss., *angustifolia* Colla, (= *longifolia* Juss. = *mauritiana* Dsf. = *olivina* Gmel.), v. Elaeodendron orientale.
Rubeola heterophylla Mch., *linearifolia* Mch., *maritima* Mch., v. Crucianella monspeliaca, angustifolia, maritima.

Rubia T., Röthe.

cordifolia L. (= *secunda* Moon), *β*) alata Wall. Sibirien, Nepal.
fruticosa Ait. (= *canariensis* Poir.), *β*) galioides Poir.
longifolia Poir. (= *Requienii* Duby, = *tinctorum* L. var. Spgl.), langblätterige, 4. f. Corsica.
lucida L. (= *peregrina* Latour., non L. = ? *rotundifolia* Poir. = *tenuifolia* Urvil.).
Munjista Roxb. (= *cordata* Thbg. = *cordifolia* L. var. Don, = *Manjith* Roxb.), Munjista-R., 4. k. f. Ostindien, Japan.
Olivieri A. Rich., Olivier's, 4. f. Insel Scio.

Rubus T., Brombeere.

acerifolius Wall. (= *moluccanus* Wall., non L.), ahornblätterige, ħ. w. Ostindien.
altheaefolius Host, wintermalvenblätterige, ħ. f. Oestreich.
amoenus Portensch. (= *discolor* Weihe, = *sanguineus* Friw.), b) fl. pleno (= *fruticosus fl. roseo pleno* Auct.). Aufser in Süd-, West- und Osteuropa, auch auf den Canarischen Inseln und in Brasilien heimisch.
apiculatus Weihe, feinspitzige, ħ. f. Westphalen.
arduennensis Lejeune, Ardennen-B., ħ. f. Belgien.
argenteus Weihe, silberfarbige, ħ. f. Westphalen.
canus Kit., graue, ħ. f. Banat.
castoreus Laest., Fr. (= *arcticus β* Laest. = *arctico-saxatilis* *), bräunliche, ħ. f. Schweden, Lappland.
cordatus Bluff. (= *cordifolius* Presl, non Weihe), herzförmige, ħ. f. Böhmen.
Douglasii Steud. (= *leucostachys* Dougl., non Schlchr.), Douglas's, ħ. f. Nordwestl. Amerika.

Digitized by Google

Rubus

dumetorum Weihe, (= *Fieberi* Ortm. = *mollis* Presl, = *ulmifolius* Presl, non Schott, = *ferox* Vest), Hecken-B., ħ. f. Deutschland.

glandulosus Bellardi, (= *Bellardi* Weihe, = *flagelliformis* Koehl.).

hispidus L. (= *flagellaris* W. = *procumbens* Mühlbg. = *prostratus* Seidel, = *trivialis* Mch.).

Histrix Weihe, igelstachelige, ħ. f. Deutschland.

humifusus Weihe, niedergestreckte, ħ. f. Deutschland.

Idaeus L., γ) semperflorens.

Lejeunii Weihe, Lejeun's, ħ. f. Nord- u. Westdeutschl.

leucostachys Schl. (= ? *Wiegmanni* Weihe).

paniculatus Sm (non Schltdl.), (= *cordifolius* Don), rispige, k. f. b. Nepal.

rosaefolius Sm. (= *borbonicus* P.), β) Commersonii Poir. (= *coronarius* Sims, = *sinensis* Hortul.).

rugosus Sm. (= *alceaefolius* Poir.).

saxatilis L., β) americanus P. (= *canadensis* Pursh).

smilacifolius v. Houtte, stechwindenblätterige, ħ. k. ?

Sprengelii Weihe, (= *suberectus* var. Baer, = *villosus* β *vulpinus* Sering. = *vulpinus* Dsf.).

thyrsiflorus Weihe, (= *floribundus* Weihe), straußblumige, ħ. f. Westphalen.

tomentosus Borkh. (= *Thuillieri* Poir.), β) canescens DC.

triphyllus Thbg. (= *parvifolius* Ker, non L.), dreiblätterige, ħ. k. China, Japan.

urticaefolius Poir., nesselblätterige, ħ. t. k. Peru.

velutinus Hook., sammethaarige, ħ. f. Californien.

vulgaris Weihe, (= *villicaulis* Koel.), β) carpinifolius Weihe, γ) Wimmeri Weihe, δ) mollis Weihe

Außerdem hat man noch folgende in Deutschland und Ungarn wildwachsende angebliche Arten dieser Gattung aufgestellt, deren specifische Aechtheit zum Theil, so wie auch mehrerer vorstehender deutscher Arten (oder Formen), wovon der größte Theil schon im ersten Bande p. 702—704 verzeichnet ist, von mehreren Botanikern, so auch vom H. Hofrath Koch, sehr in Zweifel gezogen wird. Als: agrestis W. K. (= *tomentosus* W. var. Spgl.), albicans Kit., amoenus Köhl. (non Portenschl.), appendiculatus Tratt., carpinifolius Presl, (= *Preslii* Weitenw.), erectus Köhl., fuscus Weihe, Grabowskii Weihe, Güntheri Weihe, (= ? *glandulosus* Bellard. var.), heptaphyllus Opiz, holosericeus Vest, infestus W. K., intermedius Ortm., Lingua Weihe, macroacanthus Weihe, Menkei Weihe, (= *glandulosus* Menke, = *velutinus* Vest), Mikani Köhl., montanus Lejeune, pubescens Vest, pygmaeus Weihe, (= *microphyllus* Rchb. = *petraeus* Köhl.), Radula Weihe, (= *villicaulis* Köhl. var. Wimm. = *villosus* Lasch), rhombifolius Weihe, rosaceus Weihe, (= *pallescens* Weihe), Schummelii Weihe, senticosus Köhl., Treviranii Köhl., trifoliatus Weihe, ulmifolius Presl (non Schott), vestitus W. K., Weigelii Köhl., Weihei Köhl etc.

Rudbeckia L., Rudbeckie.

Drummondii Paxt., Drummond's, 4. f. Nordamerika.

fulgida Ait. (= *aspera* Dsf. = *discolor* Ell. = *gracilis* Nutt. = *spathulata* Pursh, = *chrysomela* Mchx.).

β) Neumanni Loud. (= *Centrocarpha acutifolia* Don, Spgl.), b) chrysantha Dens.

Digitized by Google

Rudbeckia
glabra DC., kahle, 4. f. Nordamerika (Georgia).
laciniata L., β) quinata Mill.
mollis Elliot, weiche, 4. f. Nordamerika (Georgia).
speciosa Wender. (= *fulgida* Nutt., non Ait.).
tomentosa Ell. (= ?*subtomentosa* Pursh, = ?*triloba* var. *tomentosa* Mchx. = *C. subtomentosa* Don).
triloba L. (= *aristata* Pursh, = *Centrocarpha aristata* Don).

Rudolphia W., Rudolphie.
volubilis W. (= *scandens* Poir. = *Butea volubilis* P.), windende, ♄. ♄. Sch. w. Portorico, Mexico.
β) portoricensis Sweet, (= *Erythrina cordifolia* Juss. = *E. portoricensis* Dsf.).
dubia H. B. K., v. Centrosema hastatum Nachlese, *frondosa* Poir., *superba* Poir., v. Butea frondosa et superba, p. 140.
Rudolphia edulis Medic., v. Malpighia urens, p. 490.

Ruellia Plum., L., N. E., em. Ruellie.
achyranthifolia Dsf., spreublumenblätterige, ♄. w. ?
brasiliensis Spgl., brasilianische, ♄. w. Brasilien.
cayennensis Spgl. (= *longifolia* P., Rich., non Vahl, = *longifolia* Räusch. = *ventricosa* Poir.), cayennische, ♄. w. Cayenne.
cernua Heyne, Roxb. (= *Adenosma Thymus* N. E.).
ciliatiflora Bot. mag., wimperblumige, ♄. w. Buenos Ayres.
curviflora N. E., Mart., gekrümmtblumige, ♄. w. Brasilien.
Hoffmannseggii Steud. (= *divaricata* Hffg. = *lactea* Hort. Berol., non Cav.), Hoffmannsegg's, 4. w. ? Ob zu Cryphiacanthus p. 173 II. gehörig?
lilacina Hook. (= *Justicia glabrata* Hort.), lilafarbige, ♄. w. ?
longiflora Vahl, (= *grandiflora* P., non Poir. = *Camellia grandiflora* Forsk.), langblumige, ♄. w. Arabien.
nova Colla, (= *discolor* Lecchi), neue, ♄. w. ?
ocimoides Cav. (= *concavifolia* Ortega).
ovata Cav. (= *Dizygandra ovata* Meisn.).
pulchella Schott, (= ?*foetida* H. B. K.), hübsche, ♄. w. Brasilien.
tetragona Lk. (= ?*quadrangularis* Arrabida).
tubiflora H. B. K., röhrenblumige, 4. w. Südamerika.
barlerioides Roth, (= *bracteata* Roxb.), v. Petalidium barlerioides, p. 502, II., *biflora* L. (= *oblongifolia* Mchx.), *ciliata* Hornem., *ciliosa* Pursh, *hybrida* Pursh, *repens* L. mant., *patula* Jacq. (= *aromatica* Roxb.), *brasiliensis* Hort. (non Spgl.), *strepens* L., *stricta* H. Cels., *viscidula* Mart., v. Dipteracanthus biflorus, ciliatus etc., p. 207, II., *glabrata* Wall., v. Strobilanthes glabrata, *lactea* Cav., *clandestina* L. et *tuberosa* L., v. Cryphiacanthus lacteus et barbadensis, p. 173. II., *longifolia* Roth, *obovata* Roxb., *salicifolia* Vahl, *undulata* Vahl, v. Hygrophila longifolia, obovata, salicifolia, undulata, p. 309, II., *imbricata* Forsk. (= *dorsiflora* Retz), v. Aetheilema imbricatum, p. 12, II., *angustifolia* Sw., *Blechum* L., *blechoides* Sw., v. Blechum angustifolium, Brownei et laxiflorum, p 125, *fulgida* Andr., v. Geissomeria fulgida, p. 246, II.

Ruizia Cav., Ruizia.
aurea H. Angl., goldfarbige, ♄. ♄. w. Insel Bourbon.

Digitized by Google

Ruizia
integrifolia H. Angl., ganzblätterige, ♄. h. w. Insel Bourbon.
variabilis W. (= *diversifolia* Jacq. = *palmata* Cav.).
β) laciniata Cav.
Ruizia fragrans Pav., v. Boldóa fragrans, p. 72, II.

Rulingia RBr. (non Ehrh., Haw.), (J. P. Rüling, ehem. in Göttingen, hat über natürliche Pflanzenfamilien geschrieben), V. 1., Büttneriaceae.
corylifolia Grah., Cunn. (= *Büttneria corylifolia* * p. 136, non H. B. K., p. 80, II.), haselnufsblätterige, ♄. t. Neuholland.
dasyphylla Sweet, (= *Büttneria dasyphylla* Gay, p. 136).
grandiflora Endl., grofsblumige, ♄. t. Neuholland.
hermanniaefolia RBr., Sweet, (= *Büttneria hermanniaefolia* Gay, p. 136).
pannosa RBr. (= *Büttneria pannosa* DC., p. 136, = *B. australis* Sbr. = *B. inodora* Gay. = *Lasiopetalum tomentosum* Cels).
parviflora Endl., kleinblumige, ♄. t. Neuholland.
Rulingia Ehrh., Haw., *Anacampseros* Ehrh., *angustifolia* Haw., *arachnoides* Haw., *filamentosa* Haw., *polyphylla* Haw., *rufescens* Haw., *varians* Haw., v. Anacampseros rotundifolia, angustifolia, arachnoides etc., p. 34, II. et p. 51, *patens* Ehrh., *triangulare* Ehrh., v. Talinum patens et triangulare, p. 797 et Nachlese.

Rumex L., (Acetosa T. et Lapathum T.), Ampfer.
alismaefolius Fresen, (= ? *nervosus* Vahl), wasserwegerichblätteriger, 4. k. Abyssinien.
aquaticus L. (= *acutus* Ehrh. = *Hippolapathum β* Fr.).
arifolius L. suppl. (non All. nec Ait.), (= ? *abyssinicus* Dsf. = *macrophyllus* Campd.), zehrwurzblätteriger, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
bipinnatus L. fil. (= *Acetosa bipinnata* Mill.), doppeltgefiederter, 4. w. Mauritius.
brasiliensis Lk. (= *incomptus* Weinm. = ? *litoralis* H.B.K.).
Britannica L. (= *Clayloni* Campd. = *xanthorrhizus* Hfig. = *Lapathum bienne* Mch.).
bucephalophorus L. (= *lacerus* Hort. = *leucocephalus* Hort.), *β*) membranaceus Poir.
chalepensis Mill., aleppischer, ♄. k. f. b. Aleppo.
chinensis Campdera, (= *denticulatus* Dunal, = *Loureiri* Campdera).
comosus Forsk. (= *aegyptiacus* Rchb., Sbr.), schopfiger, ☉. f. Aegypten.
confertus W., gedrängter, 4. f. Sibirien, Volhynien.
conglomeratus Murr., Roth, (= *dubius* Retz, = *tauricus* Hort. = *undulatus* Schrk., non Dsf. = *virgatus* Haenke), *β*) campestris Savi, (= *divaricatus* Thuill. = *pycnocarpus* Wallr. = *Winterli* Haberl), *γ*) pusillus Delarbre.
cordifolius Hartm. (= *alpinus* L. var. Sm. = *cristatus* Hort. = *rheifolius* Hort.), herzblätteriger, 4. f. Nördliche europäische Alpen, Sibirien.
crispus L. (= ? *longifolius* H. B. K.), *β*) elongatus Guss.
cristatus DC. (= *confertus β* Poir.), *β*) undulatus Dsf. Volhynien.
cuneifolius Campd. (= *montevidensis* Spgl.), keilblätteriger, 4. k. Centralamerika.
dentatus Murr. (= *multiflorus* P.).

Digitized by Google

Rumex

distans Dumort., abstehender, 4. f. Belgien.

domesticus Hartm. (= *aquaticus* β Wahlbg. = *crispus* α L. = *Hippolapathum* Fr. = *strepens* Hort.). Nordeuropa, Asien u. Amerika.

Fischeri Ledeb., Rchb., Fischer's, 4. f. Sibirien.

garipensis Meisn., garipischer, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Gmelini Turcz., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

hamatus Trevir. (= *nepalensis* Spgl. = *Roxburghianus* Schult. = *tuberosus* Roxb., non L.), hakiggekrümmter, 4. Kn. f. Nepal.

β) uncinulatus Schrad. (= *uncatus* Hort.).

laevigatus W. (= *obtusifolius* L. var.?) Polen.

longifolius H. B. K. (= *Kunthianus* Campd.).

lucidus Campd. (= *atriplicifolius* Rchb.), schimmernder, 4. k. Nordafrika.

Lunaria L. (= *polygamus* Cav. = *Lapathum arborescens* Mch.).

montanus Dsf. (= *Acetosa* var. L. et plur. Auct. = *arifolius* All., non L. = *hispanicus* Gmel. fl. bad. = *italicus* H. Par.), Berg-A., 4. f. Europäische Voralpen.

nemorosus Schrad. (= *acutus* β Huds., Curt. = *condylodes* MB. = *exsanguis* Kit. = *Nemolapathum* Whlbg., et pl. auct. = *sanguineus* β *viridis* Sm., K. = *sylvaticus* Auct. = *viridis* Sibth.), Hain-A., 4. f. Europa.

orientalis Bernh., morgenländischer, ♂. 4. f. Orient.

palustris Sm. (= *Steinii* Beck.).

polygonifolius Loud., knöterichblätteriger, 4. f. Rufsland.

pratensis M. et K. (= *acutus* W. et plur. Auct. = *ambiguus* Gay, = *cristatus* Wallr., non DC. = *obtusifolius* G, non L. = *Oxylapathum* Wallr.), Wiesen-A., 4. f. Europa.

reticulatus Bess., netzförmiger, ⊙. f. Caucasus.

salicifolius Weinm. (= *pallidus* Bigel. = *verticillatus* Rich.), 4. Californien („adportum St. Francisci").

scutatus L., β) glaucus Jacq. (= *alpestris* Jacq.).

γ) hastaefolius MB., δ) luxurians Hort., ε) oxyotus Campd.

soongaricus C. A. Mey., soongarischer, ⊙. f. Soongaria.

stenophyllus Ledeb., schmalblätteriger, 4. f. Alt-Sibirien.

Steudelii Hochst., Steudel's, 4. k. Abyssinien.

thyrsoides Dsf. (= *intermedius* Gussone), straufsblumiger, 4. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

tingitanus L. (= *sinuatus* Hort.).

ucranicus Fisch., Bess. (excl. Synon.).

verticillatus L. (= *polygonoides* Hort.).

Unbestimmtere: afer Bert., alexandrinus Hort., americanus Campd., auritus Campd., bulbosus Campd., calthaefolius Campd. Aegypten, creticus Camp., monticola Schult. (= *montanus* Campd.) Toscana, nebroides Campd., oblongus Campd., peregrinus Schult. (= *uncatus* Hort.), retroflexus Lagasca, subrotundus Campd., trifidus Campd. etc.

Rumia Hoffm., Rumie.

athamantoides DC. (= *Athamanta Cervifolia* W. herb. = *Cachrys athamantoides* MB., p. 142, = *Stenocoelium athamantoides* Ledeb.). Sibirien, Taurien.

microcarpa Hoffm. (= *Cachrys microcarpa* MB., p. 142, = *C. sicula* Güldenst.).

Digitized by Google

Rumia

seselioides Hoffm. (= *Cachrys seselioides* MB., p. 142, = *Seseli glabratum* W. herb. = *Stenocoelium divaricatum* Turctsch. = *Trinia dahurica* Turctsch. = *T. seselioides* Ledeb.).

taurica Hoffm. (= *Artedia squamata* Pall., non L. = *Cachrys taurica* W., p. 142, = *Sanicula crithmifolia* W.), p. 70[2].

Rumohrea aspidioides Raddi, v. Aspidium (Sect. VII.) coriaceum, p. 50, II. et p. 91.

Rungia N. E. (Dr. F. Runge, Prof. zu Oranienburg, früher in Breslau, berühmt als Phytochemiker), II. 1., Acanthaceae.

pectinata N. E. (= *Dicliptera coerulea* Blum. = *D. pectinata* Juss. = *Justicia ciliaris* Retz, = *J. parviflora* Retz, = *J. pectinata* L.), kammförmige, ♄. w. Ostindien.

repens N. E. (= *Adhadota spicata* Burm. = *Dicliptera repens* Juss. = *Justicia repens* L.). 4. Ostindien. Scheint nicht kultivirt zu werden.

Rupala W., v. Rhopala.

Ruscus T., L., Mäusedorn (Korallenblatt).

racemosus L. (= *Danae Laurus* Medic. = *D. racemosa* Mch. = *Danaidia racemosa* Lk.).

β) ?laurifolius Hort.

Russelia Jacq., Russelie.

polyedra Zuccar., vielkantige, 4. ♄. t. Mexico.

verticillata H. B. K., wirtelförmige, ♄. t. w. Neuspanien.

Ruta T., Raute.

acutifolia DC., spitzblätterige, 4. ♄. f. b. k. Persien.

divaricata Tenore, (= *intermedia*, *montana* Auct. = *graveolens* L. var. Tausch).

? Fernandesia Colla, Fernandesische, 4. ♄. f. b. ? Südeuropa. Ungewifs: diversifolia Wender.

Buxbaumii Poir., *dahurica* DC., *linifolia* L., *patavina* L., *spathulata* Sibth. (= *suaveolens* DC.) etc. v. Haplophyllum Buxbaumii etc.

Ruyschiana Adans., Mill., *laciniata* Mill., *spicata* Mill., *verticillata* Mill., v. Dracocephalum austriacum, Ruyschiana, peregrinum.

Rymia polyandra Endl., v. Euclea elliptica, p. 235.

Rytidophyllum Mart., DC., Grübchenblatt.

auriculatum Hook., p. 709.

crenulatum DC. (= *Gesneria crenulata* DC. fil. = *G. tomentosa* Jacq., H. B. K., non L.), gekerbtes, ♄. w. Cuba.

grande Mart. (= *Gesneria grandis* Sw.), grofses, ♄. w. Westindien.

prasinatum Mart. (= *Codonophora grandiflora* Lindl. = *Columnea speciosa* Wendl. = *Gesneria prasinata* Ker, p. 354, = *Orobanche racemosa* Arrabida).

tomentosum Mart. (= *Codonophora lanceolata* Lindl. = *Gesneria tomentosa* L., p. 354).

Rytilix glandulosa Rafin., v. Manisuris granularis, p. 495.

Sabadilla caricifolia Schltdl., *officinalis* Schltdl., Brandt, v. Schoenocaulon caricifolium, officinale.

Sabal Adans, Sabalpalme.

Adansonii Guerns. (= *caroliniana* Hort. = *minor* P. = *pumila* Ell. = *Chamaerops acaulis* Mch. =

Digitized by Google

Sabal

? *Ch. glabra* Mill. = *Corypha minor* Murr., Jacq. = *C. pumila* Walt. = *Raphis acaulis* W.).

Moçini Otto et Dietr. (= ? *Chamaerops Moçini* H. B. K.), Moçino's, ♄. w. Westl. Amerika.

Palmetto Lodd. (= *Chamaerops Palmetto* Mchx., p. 187, = *Corypha Palmetto* Walt.).

umbraculifera Mart. (= *Blackburniana* Kirkland Glazebrook, = ? *gigantea* Fulchir. = *Corypha umbraculifera* Jacq.), schirmtragende, ♄. w. Westindien.

glaucescens Lodd., blaugrüne, ♄. w. Trinidad.

graminifolia Lodd. (= *Woodfordii* Lodd.). Südamerika.

Beide sind H. Prof. Kunth als Angehörige zu dieser Gattung zweifelhaft.

Hystrix Nutt., *serrulata* Nutt., v. Chamaerops Hystrix et serrulata, p. 187 et p. 136, II., *rubra* Hort., v. Latania Commersonii, p. 344, II.

Sabbatia Adans., Sabbatie.

gracilis Salisb. (= *campanulata* Torrey).

paniculata Pursh, (= *corymbosa* Baldw., Ell. = *Chironia cymosa* Lam. = *Ch. paniculata* Mchx. = *Swertia difformis* L.).

stellaris Pursh, (= *gracilis* Ell., non Salisb.), sternförmige, ♂. f. b. k. Carolina.

Sabbatia corymbosa Mch., v. Micromeria Juliana, p. 722 et p. 406, II.

Sabicea Aubl. (= *Schwenkfeldia* Schreb.), (einheimischer Name), IV. 1., Rubiaceae.

aspera Aubl. (= *Schwenkfeldia aspera* W.), rauhe, ♄. w. Guiana.

cinerea Aubl. (= *Schwenkfeldia cinerea* Sw.), aschgraue, ♄. w. Guiana, Westindien.

Sabinea DC. (Joseph Sabine, Stifter des Vereins für Gartenkultur in London, † 1837), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

dubia DC. (= *Robinia dubia* Lam. = *R. martinicensis* P.), zweifelhafte, ♄. ♄. w. Martinique.

florida DC. (= *Robinia florida* Vahl), blüthenreiche, ♄. ♄. w. Westindien.

Saccharum L., Zuckerrohr.

caudatum Mey. (= *contractum* Poir. = *Anatherum portoricense* Spr. = *Imperata caudata* Trin.).

edule Hassk., genieſsbares, 4. w. Java.

exaltatum Roxb. (= *arundinaceum* Retz, = *Imperata exaltata* Brongn.), hohes, 4. ♄. w. Ostindien.

polystachyum Sw., p. 709, (= *polydactylon* W. herb. = *Paspalum saccharoides* N. E. = *Panicum saccharoides* Kunth), wird kaum kultivirt.

Saccolabium Blume, Sackstendel.

calceolare Lindl. (= *Aerides calceolaris* Sm. = *Gastrochilus calceolaris* Don), pantoffelförmiger, 4. w. Ostindien.

Cumingii Lindl., Cuming's, 4. w. Ostindien.

dasypogon Lindl. (= *Aerides dasypogon* Sm. = *Epidendrum umbellatum* Hamilt.), rauchbartiger, 4. w. Nepal.

gemmatum Lindl., keimtragender, 4. w. Ostindien.

giganteum Lindl., riesenhafter, 4. w. Ostindien.

racemiferum Lindl. (= *Aerides racemifera* Wall.), traubiger, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Saccolabium
ramosum Lindl. (= *Aerides ramosa* Wall.), ästiger, 4. w. Ostindien.
rubrum Lindl. (= *ampullaceum* Lindl.), rother, 4. w. Ostindien.
Wightianum Lindl. (= *lineare* Lindl.), Wight's, 4. w. Ostindien.

guttatum Lindl., *papillosum* Lindl., *praemorsum* Lindl., v. Rhynchostylis retusa, papillosa, praemorsa, p. 594, II.

Saelanthus glandulosus Forsk., *quadragonus* Forsk., v. Cissus glandulosa et quadrangularis, p. 200.

Sageretia Brongn., Sageretie, V. 1., Rhamneae.
theezans Brongn. (= *Rhamnus theezans* L.), theegebende, ħ. k. t. China.

Sagina L. (et Spergella Rchb., p. 776), Mastkraut.
apetala L. (= *erecta* β Lam.), β) ciliata Fr. (= *depressa* Schultz).
decumbens Torr. et A. Gr. (excl. Syn.), (= *Spergula decumbens* Ell.), niederliegendes, ☉. f. Nordamerika.
glabra Fenzl, (= *Spergula glabra* W. = *S. saginoides* All. = *S. subulata* β P.).
laricina Fenzl, (= *Alsine laricina* Crantz, = *Spergula laricina* L.).
Linnaei Presl, (= *Spergula saginoides* L. = *Phaloe saginoides* Dumort.).
muscoides Frön., K. (= *bryoides* Frön.).
nodosa Fenzl, (= *Phaloe nodosa* Dumort. = *Spergula nodosa* L.), β) glandulosa Bess.
pilifera Fenzl, (= *Spergula pilifera* DC.), haartragendes, ☉. f. Corsica.
subulata Presl, (= *Spergella* Fenzl. = *Spergula saginoides* Retz, = *Phaloe subulata* Dumort.).

Sagittaria L., Pfeilkraut.
mexicana Steud. (= *macrophylla* Zuccar., non Bunge), mexicanisches, 4. Wa. t. w. Mexico.

Sagraea DC., Sagraea, X. I., Melastomaceae.
columneaefolia DC. (= *Melastoma columneaefolia* Schrk.), columneablätterige, ħ. w. Peru.
sessiliflora DC. (= *Clidemia heteromalla* Bonpl. = *C. rubra* G. Don, = *Melastoma rubra* Aubl., Rich. = *M. sessiliflora* Vahl), stiellosblumige, ħ. w. Südamerika.

Saguerus Rumphii Roxb. (= *Gomuto* Houtt.), v. Gomutus saccharifer, p. 364.

Sagus Palma Pinus G. (= *Raphia* Poir.), *Ruffia* Jacq., v. Raphia vinifera et Ruphia, p. 585, II.

Saintmorysia Endl. emend. (= *Morysia* Cass., DC.).
dentata Endl. (DC.), (= *M. diversifolia* Cass.) etc., v. p. 532.

Sairanthus glutinosus G. Don, v. Nicotiana glutinosa, p. 547.

Salacca edulis Reinw., v. Calamus Zalacca, p. 145.

Salacia L., DC. (= *Calypso* Pet. Th. = *Johnia* Roxb., p. 430, = *Tonsella* Schreb. = *Tontelea* Aubl.), Salacie, III. 1, Evonymeae-Hippocrateaceae.
prinoides DC. (= *Wightiana* Wall. = *Johnia coromandelina* Roxb. = *Tonsella prinoides* Roxb.), winterbeerähnliche, ħ. Sch. w. Ostindien.

Digitized by Google

Salacia

pyriformis Steud. (= *Calypso pyriformis* G. Don, = *Tonsella pyriformis* Sweet), birnförmige, ♄. w. Sierra Leone.

Roxburghii Wall. (= ? *chinensis* L. = *Johnia salacioides* Roxb.), Roxburgh's, ♄. w. Bengalen.

Salaxis Salisb., Salaxis.

artemisioides Kl. (= *Erica artemisioides* E. Meyer), beifufsähnliche, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

micrantha Benth., kleinblumige, ♄. t. k. Cap d. g. H.

Salicaria Adans., Lam., *Graefferi* Hort. Berol., *hyssopifolia* Lam., *spicata* Lam., *Thymifolia* Lam., v. Lythrum Graefferi, hyssopifolia, Thymifolia, p. 486.

Salicornia T., Glasschmalz.

foliata L. (= *foliosa* Auct. = *strobilacea* G. = *Halocnemum foliatum* Spgl.), beblättertes, ♄. f. Sibirien.

radicans Sm. (= *biennis* Afz. = *europaea* β Huds. = *herbacea* β Sm.).

caspica L., *fruticosa* L., *strobilacea* Pall., W. (= *caspica* Stev. = *glauca* Delil. = *mucronata* Lagasc.), v. Halocnemum caspicum, fruticosum et strobilaceum, p. 283, 11.

Salisburya Smith, (R. A. Salisbury, berühmter engl. Botaniker).

adiantifolia Sm. (= *Ginkgo* Rich. = *Ginkgo biloba* L.). *Billardieri* Rich., v. Phyllocladus rhomboidalis, p. 620.

Salix T., Weide.

acuminata Sm. (= ? *phlomoides* MB. = *Smithiana* K. = *longifolia* Host).

acutifolia W. (= *caspica* Hort. = *daphnoides* Vill. var. = *pruinosa* Wendl., Rchb. = *violacea* Andr., Sm.).

ambigua Ehrh. (= *aurito-repens* Wimm. = *uliginosa* Sering. = *Schultziana* W.).

Arbuscula L., Wahlbg., α) Waldsteiniana W. (= *alpestris* Host, = *Hostеana* W.), β) Weigeliana W. (= *Dicksoniana* Sm.), γ) humilis W., δ) Croweana Sm., ε) tetrapla Walk., ζ) Schraderiana W. (= *discolor* Schrader).

betulifolia Forb., Sweet, (= *myrsinites* Sm., non L.), birkenblätterige, ♄. f. England.

betulina Hort. angl., birkenähnliche, ♄. f. ?

cinerea L. (= *dumetorum* Suter, = *glaucescens* Mch. = *Rothii* Hoppe, = *Timmii* Schkr.), β) cinereo-repens Wimm.

cochleata Dumort., löffelförmige, ♄. f. Belgien.

comosa Fr. (non Tausch), schopfige, ♄. f. b. Canarische Inseln.

corylifolia Turctsch., haselnufsblätterige, ♄. f. Alt. Sibirien.

cuspidata Schultz, (= *Ehrhartiana* Sm. = *hexandra* Ehrh. = *pentandra* β L. flor. suec. = *tetrandra* L. = *tinctoria* Sm.), β) Meyeriana W.

finnmarchica Fr. (= *aurito-myrtilloides* Wimm.).

floribunda Forb., blüthenreiche, ♄. f. England.

fragilis L. (= *androgyna* Roth, = *antifebrilis* Auct. = *decipiens* Hoffm. = *excelsior* Host, = *fragilior* Host, = *fragilissima* Host, = *gracilenta* Tausch, = *palustris* Host, = *persicifolia* Schleich. = *Treviranii* Spgl. = *Wargiana* Lejeun.).

Digitized by Google

Salix

hastata L. (= *alpina* Schlchr. = *cerasifolia* Schlchr. = *cinerascens* Schlchr. = *coruscans* W. = *Ludwigii* Sckkhr. = *majalis* Wahlbg. = *malifolia* Sm. = *pilosa* Schl. = *Pontederae* Vill. = *serrulata* W. = *tenuifolia* Sm. = *viburnoides* Schleich.).

japonica Thbg., japanische, ħ. f. b. Japan.

Kochiana Trautv. (= *Pontederiana* Ledeb.), Koch's, ħ. f. Sibirien, Caucasus.

Lambertiana Sm. (= *monandra* Hoffm. = *mutabilis* Host, = *oppositifolia* Host, = *ramulosa* Hort. angl. = *Wolgariana* Sm.), Lambert's, ħ. f. Europa, Sibirien.

Ledebouriana Trautv. (= ?*caspica* Pall. = *pallida* Ledeb.), Ledebour's, ħ. f. Alt. Sibirien.

lenta Fr., zähe, ħ. f. b. Nepal.

ligustrina Mchx., ligusterähnliche, ħ. f. Nordamerika.

microstachya Turcz., Trautv., kleinährige, ħ. f. Sibirien.

nigra Mühlbg. (= *caroliniana* Mchx. = *flavovirens* Hornem. = *pentandra* Walt.).

nigricans Sm., a) phylicifolia K. Whlbg., b) paludosa Schlchr.

nobilis Fr., edle, ħ. k. f. b. Nepal.

Otites Schrad. (= *monandra* Brotero), geöhrte, ħ. f. Portugal.

proteaefolia Schlchr., proteablätterige, ħ. f. Schweiz.

purpurea L., ζ) purpureo-repens Wimmer.

pyrolaefolia Ledeb., wintergrünblätterige, ħ. f. Alt. Sibirien.

repanda Dumort., ausgeschweifte, ħ. f. Belgien.

Reuteri Moritzi, Reuter's, ħ. f. Schweiz.

rhamnifolia Pall. (= *hastata* L. var.), wegdornblätterige, ħ. ħ. f. Sibirien.

sericans Tausch, (= *conifera* Hort. = *holosericea* Hort. = *stipularis* Hort.), seidenhaarige, ħ. f. ?

spectabilis Host, ansehnliche, ħ. f. Bukowina.

Starkeana W. (= *Arbuscula* β L. = *Besseriana* Host, = *bicolor* Fr. = *depressa* L. suec. = *foliolosa* Afz. = *livida* Whlbg. = *malifolia* Bess.), Starke's, ħ. f. Nordeuropa, Sibirien.

subserrata W. (= *fragilis* Forsk. = *octandra* Sbr. = *Sassaf beledi* Forsk.), wenigsägezähnige, ħ. f. Aegypten.

tuberculata Dumort., höckerige, ħ. f. Belgien.

undulata Ehrh. (= *alopecuroides* Tausch, = *speciosa* Host).

Wilhelmsiana MB. (= *angustifolia* MB., W.).

Salmalia Schott et Endl., Salmalie, XVI. VIII., Bombaceae.

insignis Schott, Endl. (= *Bombax insigne* Wall.), ausgezeichnete, ħ. w. Ostindien.

malabarica Schott, Endl. (= *Bombax Ceiba* Burm. = *B. heptaphyllum* Cavan. = *B. malabaricum* DC., p. 127, = *Gossampinus rubra* Hamilt.).

Salmea DC. (J. Fürst von Salm Dyck Reifferscheid, ausgezeichneter Kenner u. Bearbeiter der sogenannten Fettpflanzen).

Eupatoria DC. (= *grandiceps* Cass. = ?*Bidens scandens* Sw. = *Eupatorium Gouani* et *Houstonis* Hort., non L. = *Hopkirkia Eupatoria* Spgl.).

hirsuta DC. (= *oppositiceps* Cass. = *Bidens hirsuta* Sw. = *Eupatorium vestitum* Spgl. = *Hopkirkia hirsuta* Spgl.).

Digitized by Google

Salmea

scandens DC. (= *parviceps* Cass. = *Bidens frutescens* Mill. = *B. scandens* L. = *Calea Amellus* L. = *Hopkirkia scandens* Spgl. = *Isocarpha Amellus* Spgl. = *Santolina Amellus* L. amoen.).

Salmia W., Spgl., *angustifolia* W., *funifera* Spgl., *jamaicensis* Steud., *latifolia* W., *palmaefolia* W., *palmata* W., v. Carludovicia angustifolia, funifera, jamaicensis, latifolia, Plumieri et palmata, p. 167 et p. 122, II.

Salmia Cav., *ebracteata* Cav., *guineensis* Cav., *spicata* Cav., v. Sanseviera lanuginosa, guineensis, spicata, p, 720.

Salpiglossis R. et P., Zungenröhre, Personatae-Scrophularineae-Salpiglossideae.

sinuata R. et P., Var.: atropurpurea Grah., coccinea, fulva Court., Barclayana Penny, (= *intermedia* Swt.), picta Sw., straminea Hook., p. 716. [1])

integrifolia Hook., *linearis* Hook., *parviflora* G. Don, v. Petunia Mirabilis etc., p. 610 et p. 503, II.

Salpi(g)xantha Hook., Trompetenblume, XIV. II., Acanthaceae.

coccinea Hook., scharlachfarbige, ♄. w. Jamaika.

Salsola L., Salzkraut.

anomala Eichw. et C. A. Mey., abweichendes, ♂. f. Gegend des caspischen Meeres.

brachiata Pall. (= *Pallasiana* Vest.).

brevifolia Dsf., kurzblätteriges, 4. ♄. k. Nordafrika.

collina Pall. (= *Kali* γ Pall.), Hügelliebendes, ☉. f. Altaisches Sibirien.

ericoides MB. (= *dendroides* Pall. = *ericaefolia* Adams), heideähnliches, ☉. ♄. f. Kleinasien.

foliosa Schrad., Schult. (= *baccifera* Pall. = *clavifolia* Pall. = *Anabasis foliosa* L.).

genistoides Juss., Poir., ginsterähnliches, ♄. k. Spanien.

incanescens Ledeb., C. A. Mey., graulliches, ♄. f. b. Caucasus.

oppositifolia Dsf. (= *fruticosa* Cav. = *longifolia* Forsk.).

rosacea L. (= *rosea* Falk, = *Kali rosacea* Mch. = *Tragum rosaceum* Medic.).

Soda L. (= *longifolia* Lam. = *Kali inermis* Mch. = *Kali Soda* Scopol.).

subaphylla Ledeb., C. A. Mey., fastblattloses, ♄. f. b. Caucasus.

turgida Dumort., aufgeschwollenes, 4. f. Holland, Belgien.

vermiculata L. (= *laricina* Pall. = *prostrata* Pall.).

africana Hort. (= *aphylla* L. fil.), v. Caroxylon Salsola Nachlese, *altissima* L., *baccifera* Schrad., *fruticosa* MB., *hortensis* Dsf. (= *divergens* Poir. = *trigyna* Cav.), *maritima* MB., *monoica* Poir., *salsa* L., *setigera* Lagasca, *spicata* W. (= *strobilifera* Hort.), *trigyna* W., v. Suaeda altissima, baccifera etc., *eriophora* Spgl. (= *eriantha*, *lanata* et *laniflora* Hort.), *hyssopifolia* Pall. (= *muricata* L.), *sedoides* Pall., v. Echinopsilon eriophorum, lanatum etc., p. 214, II., *arenaria* W. K., *dasyantha* Pall. (= *lanifloru* Gmel. = *prostrata* Ortega, = *tenui-*

1) Nach Bentham (DeCandolle prodrom. X. p. 202) nur Varietäten von Salpiglossis sinuata.

Digitized by Google

Salsola

folia MB.), *prostrata* L., *scoparia* MB., *sericea* Ait. (= *canescens* Dsf. = *diffusa* Thbg.), *Sieversiana* Pall. (= *soongarica* Sievers), v. Kochia arenaria, dasyantha etc., p. 438 et p. 336, II., *pilosa* Pall. (= *arboretcens* L.), v. Halimocnemis malacophylla, p. 282, II., *platyphylla* Mchx. (= *radiata* Dsf. = *atriplicifolia* Spgl.), v. Cycloloma platyphylla, p. 119, II., *tamariscifolia* Lagasca, *glomerata* Steph., *monandra* Pall., v. Halogeton tamariscifolius, glomeratus etc., p. 283, II.

Salvadora surinamensis Spgl. fil., v. Weigeltia myrianthos.

Salvia T., L., Salbei.

acetabulosa L., säuerliche, ♄. f. b. k. Orient.

aegyptiaca L. (= *Melissa perennis* Forsk. = *Thymus hirtus* Viviani).

affinis Schltdl., ähnelnde, ♄. t. Jalappa.

africana L. (= *barbata* Lam. = *colorata* Vahl, = *integerrima* Mill.).

amarissima Ortega, (= *amara* Jacq. = *circinnata* Cav. = *nepetoides* H. B. K.).

argentea L. (= *atlantica* P. = *candidissima* Gussone, non Vahl, = *orientalis* H. Par. = *patula* Dsf. = *pyramidalis* Petagna, = *Sclarasa argentea* Mill.). Südeuropa, Creta, Nordafrika.

axillaris Moç., Sess., achselblumige, 4. ♄. t. Mexico.

azurea Lam. (= *acuminata* P. = *acuminatissima* Vent. = *angustifolia* Mchx. = *elata* Poir. = *mexicana* Walt., non L.).

bicolor Lam., Dsf. (= *crassifolia* Jacq., Cav.).

canariensis L. (= *Schraderia hastata* Mch. = *Sclarasa tomentosa* Mill.).

Candelabrum Boiss., kronenleuchterförmige, ♄. k. Spanien.

ceratophylloides L. (= *ceratophylla* Tenore et plur. Auct, non L.).

chamaedryoides Cav. (= *chamaedryfolia* Andr. = *Chamaedrys* W. Enum.).

chinensis Benth., chinesische, 4. f. b. China.

clandestina L. (= *acutata* Lk. = *clandestinoides* Lk. = *micrantha* Dsf. = *oblongata* Rchb. = *obtusata* Lk. = *pallidiflora* St. Am. = *parviflora* Lk. = *polymorpha* Hffg. et Lk. = *praecox* Savi, = *variabilis* Lois. (ex parte) = *verbenaca* Vahl, = *verbenacoides* Brotero, = *Viviani* Spgl. = *Sclaraea decidua* Mch.), *β*) multifida Sibth., Sm. (= ? *ceratophylla* Mey. = *ceratophylloides* W., non L. = *crosa* Dsf. = *clandestina* Vahl, = *laciniata* W. Enum. suppl.).

coccinea L. (= *glaucescens* Pohl, = *Horminum coccineum* Mch.), *β*) rosea Vahl.

coerulea Benth., blaue, 4. w. Brasilien.

compressa Vahl, platte, 4. f. Orient.

concolor Lamb., einfarbige, ♄. t. k. Mexico.

confertiflora Pohl, gedrängtblumige, ♄. w. t. Brasilien.

controversa Tenore, (= *clandestina* = *lanigera* Poir., Bové), streitige, 4. f. Südeuropa.

corymbosa Wall. (= ? *plebeja* RBr. var.), traubendoldige, 4. w. Ostindien.

Cruikshanksii Benth. (= *rhombifolia* *β* Hook.), Cruikshank's, 4. w. t. Peru.

Digitized by Google

Salvia

discolor H. B. K. (= *Bonplandiana* Dietr.), verschiedenfarbige, ♄. t. Peru.

dominica L. (= *commutata* Benth.), verwechselte, 4. f. ? Syrien, ? Italien.

dumetorum Andryz., Bess. (= *pratensis* L. var. Auct.), Hecken-S., 4. f. Altai, Mittelasien, Cashmire, Volhynien.

β) flore albo.

elegans Vahl, (= *incarnata* Cav. = *microcaulis* Poir.), zierliche, ♄. t. Mexico.

eriocalyx Bertero, Sshult., wollkelchige, ♄. w. Jamaica.

excelsa Benth., hohe, 4. w. t. Guatimala.

Forskohlei L. (= *bifida* Forsk.).

fruticulosa Benth., strauchige, ♄. t. k. Mexico.

Gilliesii Benth., Gillies's, ♄. t. k. Chili.

gesneriflora v. Houtte, gesnerienblumige. ♄. t. ? Südamer.

glabrata H. B. K., glattliche, 4. t. k. Neuandalusien, Mexico.

grandiflora Ettl. (= *tomentosa* Mill.).

hians Royle, klaffende, 4. ♄. t. Ostindien.

hirsuta Jacq. (= *bracteata* Poir. = *ciliata* Hort. Par. = *crypthanthos* Schult. = *nepetifolia* Poir. = *phlomoides* Cav. = *praecox* Hortul. = *Sideritidis* Vahl, = *tetragona* Hortul.).

hispanica L. (= *prismatica* Cav. = *tetragona* Mch.).

Horminum L. (= *colarata* Thore, = *Horminum coloratum* Mch. = *H. sativum* Mill.).

involucrata Cav. (= *laevigata* H. B. K.).

Karwinskyi Benth., Karwinsky's, ♄. t. Mexico.

Kotschyana Endl., Kotschy's, 4. f. b. k. Taurus (Asien).

lanceolata Brouss., Jacq. fil. (= *aspidophylla* R. et S. = *reflexa* Hornem. = *trichostemmoides* Pursh).

lamiifolia Jacq. (= *amoena* Sims, = *azurea* Hort. = *Boosiana* Jacq. fil. = *Boosii* Trat. = *coerulea* Hort. = *cyanea* Fisch. = *cyaniflora* Hort. = *hyemalis* Boos, = *latifolia* Anders. = *melissaefolia* Dsf. = *thymiflora* W. Enum. = *violacea* Hortul.), taubnesselblätterige, 4. ♄. w. Peru, St. Vincent, Trinidad.

lavanduloides H. B. K. (= *Humboldtiana* R. et S. = *lavandulaefolia* Spgl., non Vahl), lavendelähnliche, 4. t. Neuspanien.

leucanthera Visiani, (= *tinifolia* Hort.), weifsbeutelige, ♄. k. t. ?

longiflora R. et P., langblumige, ♄. w. t. Peru.

lyrata L. (= *Cunila lyrata* Schrk. = *Horminum lyratum* Mill., Mch. = *H. virginicum* L.).

macrophylla Benth. (non Tausch), grofsblätterige, 4. w. t. Peru.

mexicana L. (= *melissaefolia* Dsf. = *Jungia altissima* Mch. = *Sclarasa mexicana* Mill.).

β) nitidifolia Ortega (= *papilionacea* Cav.).

multicaulis Dsf., Vahl, vielstengeliche, 4. f. b. Orient.

napifolia Jacq. (= *verticillata β* P. = *Covola napifolia* Medic.).

nilotica Murray, Vahl, (= *abyssinica* L. fil., Jacq. = ? *applanata* W. Enum. = *intermedia* Schult. = *nepetaefolia* Plur. auct. et Hortul., non Jacq. = *nubia* Murray, = ? *spinosa* Mch. = ? *Horminum napifolium* Mill. = *H. niloticum* Mch.).

Digitized by Google

Salvia

nivea Thbg. (= *lanceolata* Lam., non Brouss.), schneeweifse, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

nubia Ait. (= *abyssinica* Hochst.), nubische, 4. k. Abyssinien.

nutans L., W. K. (= *acutifolia* Lam. = *betonicaefolia* Ettl. (ex parte) = *hastata* Ettl. = *pendula* Bess., non Vahl).

occidentalis Sw. (= *procumbens* Lam. = *radicans* Poir. = *Hyptis glandulosa* Sieb. fl. mart.).

odorata W. Enum. (= *albida* Jacq. = *argentea* Hort., non L.).

officinalis L. (= *grandiflora* Tenore, non Ettl. = ? *papillosa* Hffg.).

oppositiflora R. et P. (= *grata* Vahl), gegenblumige, ♄. t. Quito.

paniculata L. (= *chamaelaeagna* Berg.).

parviflora Vahl, (= *varia* Vahl), kleinblumige, 4. k. Syrien.

patens Cav., Benth. (= *grandiflora* Nee, = *macrantha* Schltdl. = *spectabilis* H. B. K.).

phoenicea H. B. K. (= *hirtella* Vahl), hochrothe, ♄. t. Quito.

plebeja RBr. (= *brachiata* Roxb. = *parviflora* Roxb., non Vahl, = *Lumnitzera fastigiata* Spgl. = *Ocimum fastigiatum* Roth), unansehnliche, ♄. t. w. Neuholland, Ostindien. Vergl. S. corymbosa.

polystachya Ortega, (= *caesia* H. B. K. = *lineatifolia* Lagasca, = *breynitica*, *eremetica*, *spicata* et *tetragona* Hort.), vielährige, ♄. k. Mexico.

pratensis L. (= *agrestis* L.). Var.: Barrelieri Tenore, (= *Tenorei* Spgl. = *virgata* Savi), haematodes L., variegata W. K. (= *tricolor* Hortul.), alba, rubicunda Wender. (= *rubra* Hort.), rostrata Schm.

prunelloides H. B. K., prunellaähnliche, ♄. t. k. Mexico.

pseudococcinea Jacq., b) filamentosa Tausch.

pulchella DC. (= *coccineo-fulgens hybrida* Uechtr. = *doliostachya* Lagasca).

rectiflora Visiani (= *Karwinskyi* Hort., non Benth.), geradblumige, 4. ♄. k. t. ?

Regla Cav. (= *deltoidea* P. = *regina* Hort.), deltablätterige, ♄. t. k. Mexico.

rhombifolia R. et P. (= *foliosa* Benth. = *pilosa* Vahl), rautenblätterige, ♂. ♄. t. Peru.

rosaefolia Sm. (= *orientalis* Mill., non Hort.).

runcinata L. fil. (= *erosa* Dsf., Poir. = *scabra* Benth.).

Russelii Benth., Russel's, 4. f. b. k. Syrien.

ruthenica Weinm. (= *sylvestris* L. var.), russische, 4. f. Südl. Rufsland.

sagittata R. et P., pfeilförmige, 4. ♄. k. Peru.[1])

salicifolia Pohl, (= *arguta* Benth. in Hrb. Berol.), weidenblätterige, ♄. w. Brasilien.

scabiosaefolia Lam. (= *Hablisiana* Pall., W. = *pinifolia* Pall. = *Scabiosae* P. = *taurica* Habl. = *vulnerariaefolia* W.).

Sclarea L. (= *bracteata* Bot. mag. = *Simsiana* R. et S. var. = *haematodes* Scop. = *Sclarea vulgaris* Mill., Mch.).

---

1) Von den Eingebornen „Salvia real" genannt, wird daselbst wie unsere Salvia officinalis angewendet.

Digitized by Google

Salvia

scutellarioides H. B. K., schildkrautähnliche, 4. ħ. w. t. Quito.

semiatrata Zuccar., halbschwärzliche, ħ. t. k. Mexico.

Sibthorpii Sm. (= *amplexicaulis* Hort. = *Barrelieri* Hort. = *campestris* MB., Rchb. = *caucasica* Hort. = *hypanica* Andrzy., Bess. = *mollis* Jacq. fil. = *praecox* Loisel. = *pratensis* Haberl. = *taurica* et *virgata* Hort.), Sibthorp's, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

spicata R. et S. (= *Humboldtiana* Dietr. = *Humboldtii* Spgl. = *pulchella* H. B. K. = *saligna* W. herb.), ährenförmige, ħ. t. k. Neuspanien.

spinosa L. mant. (= *abyssinica* L. fil. = *aegyptiaca* L. mant. = *praecox* Dsf. Hort. Par., et ? Vahl).

stachyoides H. B. K. (= ?*elongata* H. B. K. var. Benth. = *longifolia* W. hrb.), ziestähnliche, 4. k. t. Mexico.

sylvestris L. (= *alpestris* Hort. = *asperula* Hort. = *desertorum* (= *deserta*) Schangin, = *taurica* Hort.), *β*) nemorosa L. (= *elata* Host, = *Sclaraea nemorosa* Mill. = *S. punctata* Mch. = *S. syriaca* Mill.), var. alba, rosea.

sylvicola Burch., waldliebende, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

triangularis Thbg. (= *tenuifolia* Burch.), dreikantige, 4. ħ. k. Cap d. g. Hoffn.

triloba L. suppl. (= *auriculata* Mill. = *baccifera* Ettl. = *Clusii* Jacq. = ?*fruticosa* Mill. = *marrubioides* Vahl, = *subtriloba* Schrk. = *sypilea* Lam.).
β) ovata Dietr.

tuberifera Cav. (= *longiflora* W., non R. et S.).

tubiformis Lk., Kl., Otto, röhrenförmige, 4. ħ. t. w. Mexico.

Verbenaca L. (= *byzantina* Hort. = *heterophylla* Hort. = *horminoides* Pourr. = *illyrica* Schult. = *micrantha* Dsf. = *Spielmanni* W. Enum., non Scopol. = *Spielmanniana* MB. = *variabilis* Poir.), *β*) oblongifolia Benth. (= *betonicaefolia* Lam., non Ettl. = *oblongata* Vahl).

verticillata L. Var.: floribus albis, lampsanaefolia Vahl, mollis Don (non Jacq. fil.).

virgata Ait. (= *affinis* Spgl. = *Barrelieri* Hort. = *Bauhini* Hort. = *caduca* Hornem. = *caucasica* Schrk. = *garganica* Tenore, = *gigantea* Dsf. = *grandidentata* Tenore, = *quercifolia*, *taurica* et *taurina* Hort. = *pyrenaica* L. = *tiberina* Mauri, = *Sclarasea virgata* Mch.), b) rubra Spgl. Süditalien, Kleinasien etc.

viridis L. (= ?*Rosani* Tenore, = *Spielmanni* Scopol., non W. = *truncata* W. = *Horminum viride* Mch.), ♂. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

Unbestimmtere: antirrhiniflora Dehnh., arborescens Hort. (= *arborea* Hort.) crispa Tenore, dulcis Hort., flavescens Juss, Delil., Halleri Fisch., neglecta Tenore, scorodoniaefolia Dsf., tiliaefolia Brot. (non Vahl), undulata Wender.

Pag. 715—719 zu ergänzen und zu berichtigen.
Salzwedelia sagittalis Flor. Wetter., v. Genista sagittalis.
Samadera indica G., v. Vittmannia elliptica, p. 853.
Samara floribunda W., ***coriacea*** Sw., v. Myrsine coriacea, p. 538.

Digitized by Google

Sambucus T., L., Hollunder.
hirta Tausch, rauher, ♄. f. ?
japonica Thbg., japanischer, ♄. f. b. Japan.
lucida Tausch, spiegelnder, ♄. f. ?
mexicana Presl, (= *bipinnata* Ch. et Schltdl.), mexicanischer, ♄. k. Mexico.
pubens Mchx., *β*) leucocarpa Nutt., *γ*) arborescens Nutt.
racemosa L., *γ*) praecox.
Sameraria armena Desv., v. Isatis armena, p. 424.

Samolus T., p. 719, Pungen, Primulaceae-Samoleae.
campanuloides RBr. (= *porosus* Thbg. = *Campanula porosa* Thbg.).
litoralis RBr. (= *repens* P. = *Sheffieldia repens* L. fil.).
β) S. incana LaBill.
Valerandi L. (= *aquaticus* Lam.).

Samyda L., (griechischer Name für Birke).
grandiflora Spgl., grofsblumige, ♄. w. Brasilien.
multiflora Cav., vielblumige, ♄. w. Caribäen.
pubescens L. (= *rosea* Sims, = *serrulata* Andr., non L.).
serrulata L. (= *denticulata* Poir.).
spinulosa Vent., dorniger, ♄. w. Caribäen.
tinifolia Vent., lorbeerblätterige, ♄. w. Ostindien.
Unbestimmt: S. lucida Hort., ♄. w. Westindien.

Sanguinaria Dill.,
canadensis L. (= *acaulis* Mch. = *virginiana* G.).
β) stenopetala Otto.
grandiflora Bosc, (= ? *Bartonis* Auct.).

Sanguisorba Riv., L., Wiesenschopf.
alpina Bunge, Ledeb., Alpen-W., 4. f. Alt. Sibirien.
Andersonii Don, Anderson's, 4. f. Sibirien.
angustifolia Fisch., schmalblätteriger, 4. f. Sibirien.
annua Nutt. (= *Poterium annuum* Nutt.), jähriger, ⊙. f. Arkansasgebiet.
carnea Fisch. (= *cernua* Bess. = *officinalis* L. var. Spgl. = *rubra* Schrk.), fleischfarbiger, 4. f. Galicien.
dodecandra Morett. (= *macrostachya* Comolli), mehrfädiges, 4. f. Oberitalien.
mauritanica Dsf., mauritanischer, 4. k. f. b. Nordafrika.
officinalis L, *β*) altissima Mill. (= *auriculata* Scopol., All. = *cordifolia* Opiz, = *praecox* Bess.), *γ*) sabauda Mill., *δ*) hispanica Mill., *ε*) ? neglecta G. Don, *ζ*) ? ingrica Sweet.
tenuifolia Fisch., Lk., dünnblätteriger, 4. f. Dahurien.

Sanicula T., Sanikel.
elata Hamilt. (= *canadensis* Thbg., non L. = *hermaphrodita* Don), hoher, 4. f. b. k. Nepal.

Sanseviella Rchb., p. 720, Coronariae-Aloineae Endl. (Aroideae-Taccaceae Rchb.).
carnea Rchb. (= *Aletris chinensis* Hort. = *Sanseviera carnea* Andr. = *S. rosea* Dietr. = *S. sarmentosa* Jacq. = *S. sessiliflora* Ker).

Sanseviera Thbg, Sanseviera.
flexuosa Blume, gebogene, 4. w. Java.
glauca Haw., blaugrüne, Sierra Leone.
guineensis W. (= *hyacinthoides* Hort. = *thyrsiflora* Thbg. = *Acyntha guineensis* Medic. = *Aletris* et *Aloe guineensis* Jacq. = *Salmia guineensis* Cav.).
polyphylla Haw., vielblätterige, 4. w. Sierra Leone.
Roxburghiana Schult. (= *zeylanica* Roxb.), Roxburgh's, 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Sanseviera

zeylanica W. (= ?*aethiopica* Thbg. = *Aletris hyacinthoides* α L. = *A. zeylanica* Mill. = *Aloe hyacinthoides* L. = *A. zeylanica* Jacq.).

Unbestimmtere: striata Don, venosa Don.

fragrans Jacq., v. Dracaena fragrans.

Santia plumosa Savi, v. Polypogon monspeliensis, p. 646 et p. 552 II.

Santolina T., Heiligenpflanze (Cypresse).

Chamaecyparissus L. (= *cupressiformis* Lam. = *dentata* Mch. = *incana* Lam.), β) tomentosa Moris, (= *squarrosa* P.), γ) ericoides Poir. (= *squarrosa* W. = *villosa* Mill.), δ) villosissima Poir.

elegans Boiss., zierliche, ♄. k. Spanien.

fragrantissima Forsk., wohlriechendste, ♄. k. Aegypten, Arabien, Syrien. [1])

β) ptarmicoides Lam. (= *simplicifolia* L'Her.).

rosmarinifolia L. (= *tuberculosa* Lam.).

β) canescens Lagasca, (= ?*minor* Mill.).

Unbestimmtere: chamaemelifolia Mill., decumbens Mill. *crithmifolia* Hornem., *eriosperma* P. (= *alpina* Bertol. = *erecta* Murr., Lam.), v. Lasiospermum crithmifolium et pedunculare, p. 447 et p. 344, II., *muricata* Guss., *anthemoides* L., ?*rigida* Sibth., Sm., *montana* Sibth., Sm., v. Lyonnetia murlcata, abrotanifolia, rigida et tenuiloba, p. 485, 883 et 377, II., *Amellus* L., v. Salmea scandens, p. 715, *jamaicensis* L., v. Calea jamaicensis, p. 146, *maritima* L., v. Otanthus maritimus, p. 573, *oppositifolia* L., v. Isocarpha oppositifolia, p. 425 et p. 323, II., *squarrosa* L., v. Relhania squarrosa, p. 680 et p. 586, II., *terrestris* Forsk. (= ?*rigida* Sibth., Sm.), v. Cyrtolepis monantha, p. 184, II., *tinctoria* Molina v. Cephalophora glauca, p. 180.

Sanvitalia Gualt., Cav., Sanvitalie.

acinifolia DC., bergmünzenblätterige, ⊙. m. f. Mexico.

Saouari glabra Aubl., v. Caryocar glabrum, p. 168.

Sapindus T., L., Seifenbaum.

esculentus St. Hil., genieſsbarer, ♄. w. Brasilien.

guineensis Don, guineischer, ♄. w. Guinea.

laurifolius Vahl, (= *acutus* Roxb. = *trifoliatus* L.).

Rarax DC. (= ?*pinnatus* Mill. = *Saponaria* Lour.), chinesischer, ♄. t. w. China, Ostindien.

rubiginosus Roxb. (= *alternifolius* Hamilt. = *fraxinifolius* DC. = *longifolius* Hamilt. = *Moulinsia cupanioides* Camb. = *M. rubiginosa* Don).

Sapium Jacq., Saftbaum.

ilicifolium W. (= *Hippomane spinosa* L.).

indicum W. (= *bingerium* Roxb.).

laevigatum Lam., glatter, ♄. w. Insel Bourbon.

Laurocerasum Dsf., Kirschlorbeer-S., ♄. w. Antillen.

Aufser diesen werden in van Houtte Établissement horticole et Makoy's Extrait du Catalogue des Plantes noch folgende aufgeführt: berberidifolium (= *Coelobogyne berberifol.* Hort. angl. = *Stillingia berberifol.* Hort.),

1) „Flores sicci odoratissimi, apud pharmacopolas kahirenses loco Anthemidis nobilis, nomine „Bobouny s. Zeysoun" venales prostant. Endl. Hort. acad. Vindob. I. p. 359.

Digitized by Google

Sapium

ħ. t. w., Drummondii ħ. t., heterophyllum ħ. t., Manglesii ħ. t., deren Vaterland mir unbekannt ist.

sebiferum Juss., Mirb., v. Stillingia sebifera, p. 789.

Saponaria L.. Seifenkraut.

astroides Fenzl, sternförmiges, ⊙. f. Mesopotamien.

caespitosa Sm. (= *Smithii* Sering.).

officinalis L. (= *Bootia vulgaris* Neck. = *Lychnis officinalis* Scopol.), d) foliis eleganter variegatis.

β) hybrida Mill

prostrata W., gestrecktes, 4. k. Orient.

pungens Bunge, stechendes, ħ. k. Altaisches Sibirien.

acaulis Fenzl, v. Silene acaulis, p. 755.

Sapota Adans, Mill. (= *Achras* L.), Breiapfel, VI. 1., Sapotaceae.

Achras Mill. (= *Achrus Sapota* L., p. 11).

β) Zapotilla Jacq.

costata A. DC. (= *Achras costata* Endl.), gerippter, ħ. t. Norfolkinsel, Neuzeeland.

mammosa Mill., v. Lucuma mammosa, p. 479 et p. 373, II.

Saraca indica L. (= *arborescens* Blume), v. Jonesia Asoca, p. 430.

Saracha R. et P., Saracha.

allogona Schltdl. (= *Physalis allogona* Bernh., Kunze), krauskantige, ⊙. 4. m. f. k. Südamerika.

biflora R. et P. (= *procumbens* R. et P. var. Spgl. = *Atropa biflora* P. = *Bellinia biflora* R. et S.), zweiblumige, ⊙. 4. m. f. k. Peru.

brasiliensis Kl., brasilianische, ⊙. 4. m. f. w. Brasilien.

Jaltomata Schltdl. (= *Jaltomata edulis* Schltdl.), geniefsbare, ⊙. 4. m. f. k. Mexico.

micrantha DC. (= *Bellinia micrantha* R. et S.), kleinblumige, ⊙. m. f. Südamerika.

procumbens R. et P. (= *Atropa plicata* Roth, = *At. procumbens* Cav. = *Bellinia procumbens* R. et S. = *Physalis solanacea* Mart. = *Solanum procumbens* DC.).

viscosa Schrad., schmierige, ⊙. 4. m. f. k. Mexico.

Suragodra glabra Hort., v. Gelonium fasciculatum.

Sarcanthus Lindl., Fleischblume(stendel).

multiflorus Hoffg. (= *Vanda multiflora* H. Cels., non Lindl.), vielblumige, 4. w. ?Ostindien.

Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch: macranthus, oxyphyllus.

guttatus Lindl., *praemorsus* Lindl. (= *papillosus* Hort.), v. Rhynchostylis retusa et papillosa, p. 594, II.

paniculatus Lindl., *rostratus* Lindl., v. Vanda paniculata et recurva.

Sarcochilus RBr., Fleischlippe(orche).

falcatus RBr., p. 722.

nepalensis Spgl. (= *Gastrochilus calceolaris* Don), nepalsche, 4. w. Nepal.

olivaceus Lindl., olivenfarbige, 4. w. Neuholland.

praemorsus Spgl., v. Rhynchostylis papillosa, p. 594, II.

Sarcocolla Neck., *officinalis* Kunth, v. Penaea Sarcocolla, p. 605.

Sarcoglottis Presl, Fleischzüngel, XX. 1., Orchideae.

grandiflora Klotzsch, grofsblumiges, 4. w. Brasilien.

picta Kl., *α*) variegata Kl. (= *Arethusa picta* Sims, = *Neottia acaulis* Sm. = *N. picta* Sims, Ait. =

Digitized by Google

Sarcoglottis
Spirathes picta Lindl., p. 779), β) immaculata Kl. Caracas.
speciosa Presl, prächtiges, 4. w. Peru.

Sarcogonum G. Don, Kunze, (= *Polygonum* Sect. dubia Endl.), Fleischknöterich, VIII. III.
adpressum G. Don, (= *Coccoloba appressa* Meisn. = *Polygonum appressum* LaBill.), angedrückter, ♄. k. Neuholland. [1])
complexum Kunze, (= *Polygonum complexum* A. Cunn.), verwebter, ♄. k. Nördl. Neuzeeland.
Sarcophyllum carnosum Sims, (non Thbg., p. 722), v. Lebeckia sarcophylloides Nachlese.

Sarcostemma RBr., Fleischkrönchen.
aphyllum RBr. (= *viminale* RBr. var.? = *Asclepias aphylla* Thbg. = *Cynanchum aphyllum* L.), blattloses, ♄. Sch. w. Cap d. g. Hoffn.
campanulatum Decaisn. (= *Philibertia campanulata* L.), glockiges, ♄. Sch. w. Peru.
grandiflorum Decaisn. (= *Philibertia grandiflora* Hook. = *P. gracilis* D. Don, p. 615).
Swartzianum R. et S. (= *Asclepias scandens* Mill. = *A. viminalis* Sw. = *Schollia viminalis* Jacq. fil.),
viminale RBr. (= *Apocynum viminale* L. = *Cynanchum viminale* L. = *Euphorbia viminalis* L.).

Sarotes Lindl., Sarotes, V. 1., Büttneriaceae.
ledifolia Lindl., porstblätterige, ♄. t. Neuholland.

Sarothamnus Wimmer et Grab., Besenstrauch(ginster).
arboreus B. Webb. (= *Cytisus arboreus* DC. = *Genista arborea* Spgl. = *G. pendulina* Poir., nec Lam. = *Spartium arboreum* Dsf.), baumartiger, ♄. k. Nordafrika.
patens B. Webb. (= *Cytisus patens* L. = *C. pendulinus* L. fil. = *Genista tomentosa* Poir. = *Spartium patens* L.), abstehender, ♄. k. Portugal.
vulgaris Wimm. (= *scoparius* Wimm., Grab. = *Cytisus scoparius* Lk. Enum.).
Die übrigen Synon. s. p. 885.

Sarracenia T. (= *Sarrazinia* Hffg.), Sarracenie.
Catesbaei Ell. (= *flava* L. var. Croom, = *heterophylla* Ell.), Catesbaei's, 4. k. Nordamerika.
Drummondii Cerom, Drummond's, 4. k. Nordamerika.
psittacina Mchx. (= *calceolata* Nutt. = *pulchella* Croom), bunte, 4. k. Nordamerika.
Sassa Bruce, *gummifera* Gmel., v. Acacia gummifera; p. 3.

Sassafras N. E., Sassafrasbaum, IX. 1., Laurineae.
albidum N. E. (= *Evosmus albida* Nutt. = *Tetranthera albida* Spgl.), weifslicher, ♄. k. f. b. Carolina.
officinale N. E. (= *Evosmus Sassafras* Nutt. = *Laurus Sassafras* L., p. 449, = *Persea Sassafras* Spgl.), gebräuchlicher, ♄. f. b. Nordamerika.
Sassia perdicaria Molina, *S. tinctoria* Molina, v. Oxalis lobata et violacea, p. 576 et 578.

---

1) „Habitat in Novae Zeelandiae borealis littoribus arenosis, prope Bay of Islands dumos densos formans (Hügel). Nondum floruit, nec siccam vidi nisi sterilem." Endl. Hort. acad. Vindob. I. p. 273.

Digitized by Google

Satureja T., L., Benth., Saturei (Pfeffer- oder Bohnenkraut).

inodora Salzm. (non Host), geruchloses, ♄. k. Nordafrika.

intermedia C. A. Mey., mittleres, 4. ♄. f. b. Caucasus.

montana L. (= *cuneifolia* Tenore, = *obovata* Lagasca, = *Juliana* Pall., non L., = *trifida* Mch. = *Micromeria montana* Rchb.).

parviflora Presl, (non Visian.), kleinblumiges, 4. ♄. f. b. k. Sicilien.

pygmaea Sieber, (= *hyssopifolia* Auct. = *illyrica* Host, *montana β subspicata* Bernh., Benth. = *subspicata* Bartl., Visian. = *Micromeria pygmaea* Rchb.).

β) variegata Host.

spinosa L., dorniges, ♄. k. Creta.

rupestris Wulf. (= *thymifolia* Scop.).

Thymbra L. (= *S. Tragoriganum* Tausch, = *Thymus Tragoriganum* L. mant.).

virgata Visian. (= *fasciculata* Tausch, = *spicata* Visian. = *Micromeria spicata* Rchb.), ruthenförmiges, 4. ♄. f. b. k. Dalmatien.

capitata L., *Mastichina* L., v. Thymus capitatus et Mastichina, *origanoides* L., v. Cunila Mariana, *virginiana* L., v. Pycnanthemum linifolium, p. 668.

Hinsichlich der übrigen (Sect. II. p. 722) s. Micromeria p. 406 et p. 407, II.

Satyrium L., Faunstendel.

bracteatum Thbg. (= *Diplectrum bracteatum* P. = *Ophrys bracteata* L. fil. = *Orchis bracteolaris* Salisb.), deckblätteriger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

cassideum Lindl., haubiger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

cordifolium Lindl., herzblätteriger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.

coriifolium Sw. (= *cucullatum* Lodd., non Sw. = *Diplectrum coriifolium* P. = *Orchis cornuta* Houtt.).

cucullatum Sw. (= *bicorne* Thbg. = *Diplectrum cucullatum* P. = *Orchis bicornis* L.).

erectum Sw., Thbg. (= *Diplectrum erectum* P.), aufrechter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

lineatum Lindl. (= ?*bracteatum* Ker), linirter, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.

parviflorum Sw. (= *bicorne* var. Thbg. = *cucullatum* Sw. var. Spgl. = *Diplectrum parviflorum* P. = *Orchis bicornis* Ait., Jacq.).

pictum Lindl., bemalter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

striatum Thbg. (= *Diplectrum striatum* P.), gestreifter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

adnatum Sw., v. Pelexia adnata, p. 604, *albidum* L., v. Leucorchis albida, p. 356, *alpinum* P., v. Chamorchis alpina, p. 187, *anthropophorum* L., v. Aceras anthropophora, p. 9, *bifolium* Wahlbg., v. Platanthera bifolia, p. 633 et 536, II., *bracteatum* P., *diphyllum* Lk., *virescens* P., *viride* L. (= *fuscum* Huds.), v. Peristylus bracteatus, cordatus, virescens et viridis, p. 500, II., *conopseum* Wahlbg., v. Gymnadenia conopsea, *Epipogium* L., v. Epipogium Gmelini, p. 291, *flexuosum* Thbg., v. Schizodium flexuosum, *giganteum* L. fil., v. Cyrtopera gigantea p. 184, II., *grandiflorum* Thbg., v. Disa grandiflora, p. 207, II., *hircinum* L., *maculatum* Dsf. (= *parviflorum* P.), v. Himantoglossum hircinum, p. 880 et H. secundiflorum, p. 301, II., *Mo-*

Digitized by Google

Satyrium

norchis P., v. Herminium Monorchis, *nigrum* L., v. Nigritella angustifolia, p. 548, *orchioides* Sw. (= *plantagineum* L.), v. Stenorrhynchus orchioides, p. 787, *repens* L., v. Goodyera repens, *spirale* Sw., *elatum* Sw., v. Spiranthes tortilis et elata, p. 779, *triste* L. fil. (= *capense* Houtt.), v. Eulophia tristis, *rufescens* Sw., v. Monadenia rufescens, p. 415, II.

Saurauja W. (= *Sauravia* Auct. = *Leucothea* Moç., Sess. = *Palava* R. et P., non Cav.), Saurauja.

gigantea DC. (= *Scapha gigantea* Noronh. = *Ternstroemia racemosa* Don), riesenhafte, ♄. w. Java, Nepal.

macrophylla v. Houtte, grofsblätterige, ♄. w. Java.

nepalensis DC. (= *micrantha* Blume, = *Ternstroemia paniculata* Wall.).

serrata DC. (= *Davaya serrata* Moç., Sess. = *Leucothea serrata* Moç., Sess.), sägezähnige, ♄. t. Java.

spectabilis Hook., ansehnliche, ♄. w. Bolivia.

Sauromatum Schott, Endl., Eidechsenwurz, XXI. IX., Aroideae.

guttatum Schott, (= *Arum guttatum* Wall.), getüpfelte, 4. w. Ostindien.

pedatum Schott, (= *Arum clavatum* Dsf. = *A. pedatum* Fisch. msc., Lk. et Otto, p. 86). Caracas.

sessiliflorum Schott, (= *Arum sessiliflorum* Roxb.), stiellosblumige, 4. w. Ostindien.

venosum Kunth, (= *Arum venosum* Ait.), aderige, 4. w. Ostindien.

Saururus natans L., v. Aponogeton monostachys, p. 69.

Saussurea DC., Saussurea.

alpina L., *β*) pumila Fisch., *δ*) viridis DC.

amurensis Turcz., amurische, 4. f. Dahurien.

crassifolia DC. (= ? *salsa* Ledeb. = *Heterotrichum salsum* MB. = *Serratula salina* Pall. = *S. salsa* Pall.).

denticulata Ledeb., gezähnelte, 4. f. Sibirien.

discolor DC. (= *controversa* DC.), *β*) eriolepis Bunge. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.

elongata DC. (= *salsa* Ledeb.), *β*) polypodiifolia DC. (= *Heterotrichum Stelleri* MB. = *Serratula Stelleri* Stephan.).

glomerata Poir. (= *amara* var. *integrata* DC. = *laevigata* Tausch), knaulförmige, 4. f. Sibirien.

laciniata Ledeb., schlitzblätterige, 4. f. Alt. Sibirien.

liatroides Fisch. (= *pycnocephala* Ledeb. = *Lagurostemon liatroides* Fisch., Wydl. = *Serratula liatroides* Adams), prachtschartenähnliche, ♂. f. Sibirien.

macrocephala Less., grofsköpfige, 4. f. Sibirien.

macrophylla Sauter, (= ? *alpina* DC. var.), grofsblätterige, 4. f. Tyroler Alpen.

pulchella Fisch. (= *dissecta* Ledeb. = *Heterotrichum pulchellum* Fisch. = *Serratula pulchella* Sims, = *Theodora pulchella* Cassini).

pygmaea Spgl. (= *monocephala* Cass. = *Carduus pygmaeus* Jacq. = *Cirsium pygmaeum* Scop. = *Cnicus pygmaeus* L. = *Lagurostemon pygmaeus* Cass.).

rigida Ledeb., starre, 4. f. Altaisches Sibirien.

robusta Ledeb., starke, 4. f. Alt. Sibirien.

salicifolia DC. (= *multiflora* DC. = *Heterotrichum leptophyllum* MB.).

Digitized by Google

Saussurea

serrata DC. (= *Serratula alpina β cynoglossifolia* L., W.), sägezähnige, 4. f. Alt. Sibirien.

β) atriplicifolia MB.

Saussurea Salisb. v. Funkia.

Saussurea pinnatifida Mch., v. Nepeta lavandulacea, p. 545.

Sauvagesia L., Spgl., Sauvagesie.

erecta L. (= *Adima* Auct. = *geminiflora* Ging. = *peruviana* R. et S.).

fruticosa Mart., Zuccar., strauchige, ♄. w. Brasilien.

nutans Pet. Thouars, (= ?*erecta* L. var.).

salicifolia Ging., weidenblätterige, ♄. w. Brasilien.

Savastana hirta Schrk., v. Hierochloa australis.

Saxifraga T., L., Steinbrech.

I. Bergenia Mch. (= *Geryonia* Sckrk. = *Megasea* Haw.).

aemula Tausch, (? Hybride von cordifolia u. crassifolia), lieblicher, 4. f, ?

ciliata Royle (non Haw.), gefranzter, 4. k. Nordindien.

II. Diptera Borkh., Lk. (= *Ligularia* Borkh., Duval, Haw.), v. p. 206, II.

III. Gymnopera D. Don, (= *Robertsonia* Haw.).

dahurica Pall., W. (= *punctata* Pall., non L.), dahurischer, 4. f. Dahurien.

erosa Pursh, (= *caroliniana* Schl. = *gracilis* Schl. = *micranthifolia* Steud. = *Aulaxis micranthifolia* Haw. = *A. nuda* Haw. = *Rorberts. micranthifol.* Haw.).

excavata Kunze, ausgehöhlter, 4. f. Graubünden.

leucanthemifolia Lapeyr. (= *Clusii* Gouan, = *Spathularia Clusii* Haw. = *Sp. leucanthemifolia* Haw.).

umbrosa L. (non Hort.), (= *spathularis* Brot.).

?*β*) crenata Haw.

Wildiana Kunze, (= *hirsuto-Aizoon* Rchb.), Wild's, 4. f. ?

IV. Leiogyne D. Don, (= *Lobaria* Haw., pro parte et *Micropetalum* Tausch).

aspera L. (= *cherlerioides* Don, = *intermedia* Hegetschw. = *Ciliaria aspera* Haw.).

cochlearifolia Schrad., löffelkrautblätteriger, 4. f. ?

cuneata W. (= *cuneifolia* Cav., non L. = *L. cuneifolia* Haw.).

Hirculus L. (= *Hirculus hieracioides* Haw.).

β) propinquua RBr.

multiflora Ledeb., vielblumiger, 4. f. Sibirien.

sibirica L. (= *Cymbalaria* MB. = *granulata β* Stev. = *rivularis* Towns.), *β*) grandiflora Stbg.

V. Micranthes D. Don.

elongata Stbg. (= *pilosa* Haw. = *verna* Hort. = *vernalis* Hort. = *virginiensis* Don, = *Dermasea elongata* Haw.), verlängerter, 4. f. Nordamerika.

β) subspathulata Stev. (= *nivalis* Mühlbg. = *pilosa* Banks, = *vernalis* W. = *virginica* Nutt. = *virginiensis* Mchx.).

hieracifolia W. K. (= *nivalis* var. *racemosa* Towns. = *rigida* Chr. Sm. = *uliginosa* Fisch. = ? *Micranthes hirta* Haw.).

melaleuca Fisch. (= *altaica* Stephan. = *elongata β glabra* Stbg.), schwarzweifser, 4. w. Alt. Sibirien.

nivalis L. (= *Dermasea nivalis* Haw.), *γ*) tenuis Whlbg.

pensylvanica L. (= *caroliniana* Hort. = *marylandica* Hort. = *palustris* Hort.).

pyrolaefolia D. Don, (= *Leptarrhena pyrolaefolia* RBr.).

Digitized by Google

Saxifraga

VI. Saxifraga genuina.

Aizoon Jacq. (= *Cotyledon* ε L. = *rosularis* Schlchr. = *rosulenta* Ehrh. = *submutica* Hort. = *Chondrosea Aizoon* et *rosularis* Haw.), var. neglecta Tenore, (= *retusa* D. Don).

australis Moric. (= *Aizoon* Guss. = *longifolia* Lapeyr. var. Moretti, = *pyramidalis* Tenore), südlicher, 4. f. b. Neapel.

caespitosa L., Sm. (= *dubia* Schlchr. = *hirta* Don, = *hypnoides aristata* et *septifida* Haw. = *hypnoides* ϑ *villosa* Walk. Arn. = *incurvifolia* Don, = ? *Lapeyrousii* Stbg. = *palmata* Sm. = *petraea* Roth, non L. = *rupestris* Schlchr. etc.).

capitata Lapeyr. (= *ajugaefolia* β DC. = *geranioides* Geners. = *perdurans* Kit.), kopfförmiger, 4. f. Pyrenäen, Ungarn.

cartilaginea W. (= *Aizoon* L. var. Sering. = *intacta* W. var. Don, = *Chondrosea cartilaginea* Haw.), knorpeliger, 4. f. Caucasus.

ceratophylla Dryand. (= *paniculata* Hornem. = *trifurcata* Schrad.).

depressa Stbg. (= *androsacea* L. var. Spgl.), niedergedrückter, 4. f. b. k. Italien.

diapensioides Bell. (= *cassia* β Lam. = *glauca* Murr. = *Chondrosia diapensioides* Haw.).

dissimilis G. Don, verschiedenähnlicher, 4. f. Schottland.

Friederici Augusti Biasoletto, Friedrich-August's, 4. k. f. b. Montenegro.

geranioides L. (= *cuspidata* et *paniculata* Schlchr. = *quinquefida* Lam.), ? β) Candollei Tausch.

hypnoides L., α) gemmifera Sering., β) angustifolia Sering. (= *curvata* Schlchr. = *densa* Schlchr. = *densifolia* Schlchr. = *elongella* Schlchr., Sm. = *sponhemica* Gmel. = *Aitoni* Haw.), γ) condensata Gmel. (= *flavescens* Stbg. = *Gmelini* Hort. = *palmata* Lej., Panz. = *Sternbergii* W.), δ) leptophylla Sering. (= *angustifolia* Hort. = *denudata* Don, = *leptophylla* P. = *planipetala* Hort. = *platypetala* Sm. = *procumbens* Juss. herb. = *recurva* Schlchr. = *retroflexa* Hort. = *h. rhodopetala* Haw. = *Schraderi* Stbg.), ε) elongella Sering. (= *affinis* Don, = *congesta* Schlchr. = *laetevirens* Don, = *laevis* Schlchr., Don, = *latifida* Haw. = *rupestris* Schlchr. = *trifida* Schlchr.), ζ) spathulata Haw. (= *crateriformis* Hort. = *dubia* Schlchr.).

juniperina Adams, MB., wachholderähnlicher, 4. f. Caucas.

laevis MB., glatter, 4. f. Caucasus.

Lapeyrousii Don, (= *aretioides* et *mediae* var. *hybrida* DC. = *luteo-purpurea* Lap.), Lapeyrous's, 4. f. b. k. Pyrenäen.

longifolia Lapeyr., α) nutans Stbg., β) media Stbg.

muscoides Wulf. (= *varians* Sbr.), α) microphylla Gaud. (= *caespitosa* Scopol., Suter, = *pygmaea* Haw. = *pyrenaica* Vill.), β) elatior Gaud. (= *caespitosa* Stbg. = *elongella* Haw. = *muscosa* Suter, = *nervosa* Schlchr. = *Muscaria muscoides* β *elongella* Haw.), γ) crassifolia Gaud., δ) uniflora Gaud. (= *acaulis* Gaud. = *caespitosa* Lapeyr. = *Muscaria acaulis* Haw.), ζ) capitata Gaud. (= *striata* Hall. fil.), ϑ) atropur-

Digitized by Google

Saxifraga

purea Stbg. (= *ampullacea* Tenore, = *Muscaria atropurpurea* Haw.).

pedatifida Ehrh., Sm. (= *fragilis* Schrk. = *geranioides δ pedatifera* Sering. = *ladanifera* Lapeyr. = *quinquefida* var. Lam.).

sedoides L. (= *androsacea* Comoll. = *aphylla* Tenore, = *trichodes* Scopol.).

β) saginoides Fröl., ?γ) Hohenwarthii Stbg.

valdensis DC. (= *cassia β major* Don, = *compacta* Stbg. = *patens* Stbg., non Gaud. = *rupestris* Thomas), waldensischer, 4. f. b. k. Savoyen.

Vandelii Stbg. (= *Burseriana* Lapeyr. = *Burseriana β* Jacq. = *Chondrosia Vandelii* Haw.), Vandelli's, 4. Oberital. Alpen, Pyrenäen.

VII. Zahlbruckneria Rchb. (*Lobaria* Haw. pro parte).

Cymbalaria L. (= *hederacea* MB. = ?*orientalis* Jacq., W.), cymbelkrautähnlicher, ♂. 4. f. b. k. Orient.

hederacea L., p. 725.

orientalis Jacq. (= *reticulata* W. = *Lobaria orientalis* et *reticulata* Haw.), morgenländischer, ⊙. ♂. f. Orient, Caucasus.

paradoxa Stbg. (= *Lobaria paradoxa* Haw. = *Z. paradoxa* Rchb., p. 862).

Unbestimmtere: Bucklandii Hort., canescens Haw., elegans Zeyh., Schrk., florulenta Moretti, Oberitalien, furcata Lapeyr., Pyrenäen, hirta Haw., intermedia Sweet, (= *Chondrosia intermedia* Haw.), lanceolata Haw., minor Sbr., modesta Rchb., nitida Schreb., Stbg. (= *Chondrosia nitida* Haw.), nuda Haw., pulchella Don, quinquedens Haw., ranunculoides Dsf., tridens Haw., Schottl., tridentata Don, viscosa Haw.

Scabiosa T., L., R. et S. (= *Chaetaria* Neck. = *Columbaria* Thuill. = *Sclerostemma* Schott, = *Spongostemma* Rchb.).

africana L., β) incisa Mill., γ) indurata L.

aleppica Coult., aleppische, ⊙. f. Aleppo.

amoena Jacq. (= *Columbaria* L. var. α Coult. = *longepedunculata* Fisch. = *nitida* Bernh.).

atropurpurea L. (= *calyptocarpa* St. Am.), g) grandiflora Hort., non Scopol.

caucasica MB. (= *coerulea* Fisch.).

cretica L. (= *frutescens* Mill.).

Cupani Gussone, (= *maritima* L. var. Auct.), Cupani's, ⊙. ♂. f. Sicilien.

Fischeri DC. (= ?*comosa* R. et S. = *dahurica* Fisch., non W.).

Hornemanni Spgl. (= *pyrenaica* Hornem., non All.), Hornemann's, 4. f. ?

limonifolia Vahl, wegerichnelkenblätterige, ♄. k. Sicilien.

micrantha Dsf. (= *Biebersteinii* R. et S. = *sicula* MB., non L. = *ucranica* var. δ Coult.).

monspeliensis Jacq. (= *Jacquini* R. et S. = *simplex* DC. = *stellata* L. var. DC.), südfranzösische, ⊙. f. Südfrankreich, Nordafrika.

palaestina L. (= *fimbriata* Mill. = *Vahlii* Coult.).

pumila L. (= *acaulis* L. = *nudicaulis* Lam.), kleine, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

reversa Ledeb., rückwärtshaarige, 4. f. Sibirien.

stellata L. (= *rotata* MB.).

Digitized by Google

Scabiosa

suaveolens Dsf. (= *asterocephala* Thuill. = *canescens* W. K. = *incana* Schult.).

ucranica L., *β*) argentea L. (= *alba* Seopol. = *Gmelini* St. Hil. = *pilosa* R. et S.), *γ*) sicula L. (= *divaricata* Jacq. = *eburnea* Sibth., Sm. = *maritima* Wulf. = *Wulfenii* R. et S.).

Unbestimmtere: humilis Host, (= *Gemonae* Dietr.), tenuifolia W., villosa Schousb., vivipara N. E.

Hinsichtlich der übrigen siehe die Gattungen Knautia, Pterocephalus, Succisa.

Scaevola L., Spaltglocke.

anchusaefolia Benth., ochsenzungenblätterige, ♄. t. Neuh.

ciliata G. Don, (= ? *Gaudichaudiana* Chamiss.), gewimperte, ♄. t. Sandwichinseln.

glabra Hook., kahle, ♄. t. Sandwichinseln.

ivaefolia G. Don, ivablätterige, ♄. t. w. Trinidad.

microcarpa Cavan. (= *laevigata* P. = *Goodenia albida* Sm. = *G. lavigata* Curt.).

mollis Hook., weiche, ♄. t. Sandwichinseln.

Plumieri L., Vahl, (= *S. Lobelia* Vahl, W. = *Lobelia frutescens* Mill. = *L. Plumieri* L.).

suaveolens RBr. (= *Goodenia calendulacea* Andr. = *G. stricta* Sm. var.? Poir.).

Unbestimmt: Tournoa W. Enum.

Scandix T., G., Kerbel.

apiculata DC., kurzspitziger, ⊙. f. Orient.

australis L. (= *petraea* Auct. = *Pecten β* Lam. = *Chaerophyllum australe* Crtz. = *Ch. rostratum β* Lam. = *Myrrhis australis* All. = *Wylia australis* Hoffm.).

grandiflora L. (= ? *hirsuta* Biasol. = *Chaerophyllum grandiflorum* Lam. = *Wylia grandiflora* Hoffm.).

macrorhyncha C. A. Mey. (= *australis* Hort.), grofsschnäbeliger, ⊙. f. ?

pinnatifida Vent. (= *Stella* Russel, = *Chaerophyllum pinnatifidum* Poir.), *β*) soongarica Schrenk.

Unbestimmtere: aegyptiaca Hort., parviflora Retz.

aurea Roth, *hirsuta* Scopol., *nodosa* L., *procumbens* L., *temula* Roth, (= *nutans* Mch.), v. Chaerophyllum aureum, hirsutum etc., p. 185—186, *Bulbocastanum* Mch., v. Carum Bulbocastanum, p. 167, *Anthriscus* L., *Cerefolium* L., *fumarioides* W. K., v. Anthriscus vulgaris, Cerefolium etc., p. 65, *dulcis* Mühlbg., v. Osmorhiza longistylis, p. 463, II., *infesta* L. (non Jacq.), *infesta* Jacq., *trichosperma* L., v. Torilis helvetica, infesta, trichosperma, p. 813, *macrosperma* W., v. Grammosciadium meoides, p. 273, II., *odorata* L., v. Myrrhis odorata, p. 53*, *ternata* Mch., v. Cryptotaenia canadensis, p. 174, II. *Scapha gigantea* Noronh., v. Saurauja gigantea.

Scaphyglottis Poepp., Endl., Nachenlippe.

graminifolia Poepp., Endl., grasblätterige, 4. w. Peru.

pallidiflora Lindl., bleichblumige, 4. w. Trinidad.

stellata Lindl., sternförmige, 4. w. Demerara.

Scelochilus Kl., Lippenstendel, XX. 1., Orchideae.

Ottonis Kl., Otto's, 4. w. Caracas.

Scepinia Neck., *lepidophylla* Cass., v. Pteronia glomerata, p. 665.

Sceptranthes Drummondii Grah. (= *Cooperia pedunculata* Herb. = *Zephyranthes Drummondii* D. Don), p. 729.

Digitized by Google

Schaefferia Jacq., completa Sw. (= *frutescens* Jacq.).

Schanginia Ledeb., C. A. Mey., Schanginie.

linifolia C. A. Mey. (= *Chenopodium linifolium* Schult. = *Suaeda linifolia* Pall.), gleichbreitblätterige, ☉ f. Alt. Sibirien.

altissima C. A. Mey., *trigyna* * v. Suaeda altissima, trigyna.

Schaueria N. E. (J. C. Schauer, Prof. in Greifswalde, früher in Breslau, et S. Schauer in Breslau, sehr thätige Botaniker), v. Justicia Sect. XIII., p. 435 et p. 332, II.

Schedonorus P. Beauv. (pro parte), (= *Schoenodorus* Auct. = *Schoedonorus* R. et S.), Trespenschwingel, v. Bromus Sect. c. p. 193 et p. 79, II.

Schefflera digitata Forst., v. Aralia Schefflera, p. 41, II.

Schelhammeria RBr., multiflora RBr., undulata RBr., p. 729.

multiflora Hort., v. Kreysigia multiflora, p. 327, II.

Schelveria arguta N. E., v. Angelonia procumbens, p. 36, II.

Schidiomyrtus J. C. Schauer, (= *Jungia* G. = *Imbricaria* Sm. = *Mollia* Gmel.), Spaltmyrte, VIII. 1., Myrtaceae.

crenulata J. C. Sch. (= *Baeckea crenulata* DC. = *Escallonia crenulata* R. et S. = *Imbricaria crenulata* Sm. = *Jungia imbricata* G. = *Mollia imbricata* Gmel. = *Philadelphus imbricatus* Soland. = *Stereosylon crenulatum* R. et S.), gekerbte, ♄. t. k. Neuholland.

diosmaefolia J. C. Sch. (= *Baeckea diosmaefolia* Rudge, p. 110), Diosmablätterige, ♄. t. k. Neuholland.

micrantha J. C. Sch. (= *Baeckea micrantha* DC.), kleinblumige, ♄. t. k. Neuholland.

microphylla J. C. Sch. (= *Baeckea gracilis* Cunn. = *B. microphylla* Rudge, Sieb. = *Escallonia ciliata* R. et S. = *Imbricaria ciliata* Sm. = *Jungia tenella* G. = *Philadelphus tenellus* Soland. = *Stereosylon ciliatum* Poir.), kleinblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

Sieberi J. C. Sch. (= *Baeckea diosmoides* Sbr.), Sieber's, ♄. t. k. Neuholland.

Schilleria abutiloides Kunth, *catalpaefolia* Kunth, *caudata* Kunth, v. Piper abutiloides, catalpaefolium, caudatum etc., p. 628 et p. 530, II.

Schima Noronhae Reinw., v. Gordonia Wallichii, p. 272, II.

Schinus L., Mastixstrauch.

dentatus Andr., gezähnter, ♄. t. k. Sandwichinsel.

tenuifolius Gill., Hook., dünnblätteriger, ♄. t. k. Chili.

virgatus Sweet, ruthenförmiger, ♄. t. k. Lima.

Schismus marginatus P. Beauv. (= *fasciculatus* Trin. = *Electra nilida* Panz. = *Festuca barbata* Lam. = *F. calycina* L. = *F. pilosa* Hort. = *Hemisacris gonatodes* Steud. = *Koeleria calycina* DC.).

Schistanthe Kunze, Spaltblümchen, XIV. 11., Personatae-Scrofularineae (Scrophularineae-Antirrhineae).

peduncularis Kunze, langstieliges, ♄. k. t. Cap d. g. Hffn.

Schistocarpha Less., Spaltnüfschen, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

bicolor Less. (= *Perymenium discolor* Hort., non ? Schrad.), zweifarbiges, ♂. ♄. k. Mexico.

Digitized by Google

Schizanthus R. et P., Schlitzblume.
alpestris Poepp., Voralpen-S., ⊙. m. f. Chili.
candidus Lindl., weifsglänzende, ⊙. m. f. Chili (Coquimbo).
Grahamii Gill., Hook., Graham's, ⊙. m. k. f. Chili.
Hookeri Gill. (= *Cruikshanksii* Hort.), Hooker's, ⊙. m. f. Chili.
pinnatus R. et P., β) humilis Lindl., γ) porrigens Grah., δ) pinnatifidus Lindl. (= *major* Hffg.), ? ε) gracilis Benth.
retusus Hook. (= *Grahamii* var. Auct.).
Hybriden: Ewansianus Paxt., Priestii Paxt.

Schizocarpum Schrad., Schlitzkürbis, XXI. x., Cucurbitaceae.
filiforme Schrad., fadenförmiger, ⊙. m. f. Mexico.
Schizocarya Drummondii Spach, *Kunthii* Spach, *micrantha* Spach, v. Gaura Drummondii, epilobioides, parviflora, p. 256.

Schizodium Lindl., Spaltstendel, XX. I., Orchideae.
flexuosum Lindl. (= *Disa flexuosa* Sw. = *Orchis flexuosa* L. = *O. undulata* Poir. = *Satyrium flexuosum* Thbg.), gebogener, 4. w. Cap d. g. Hoffn.
Schizonotus Lindl., *Lindleyanus* Wall., *sorbifolius* Lindl., v. Spiraea Lindleyana, sorbifolia.

Schizopleura Lindl., Schlitzrippe, XVIII. II., Myrtaceae.
Dampieri Cunningh. (= *Beaufortia carinata* Cunn. = *B. Dampieri* Cunn., p. 115).
macrostemma Lindl. (= *Beaufortia macrostemma* Lindl.), grofsfadige, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).
purpurea Lindl. (= *Manglesia purpurea* Lindl.), purpurfarbige, ♄. t. Neuholland (Schwanenfluſs).

Schkuhria Roth, Schkuhrie.
virgata DC. (= *Miersia virgata* Llalav. et Lex.), ruthenförmige, ⊙. f. Mexico.
Schkuhria dichotoma Mch., v. Siegesbeckia flosculosa, p. 755.

Schlechtendalia W. (non Spgr., nec Less. et DC.), (D. F. C. v. Schlechtendal, königl. preufs. Oberlandesgerichts-Präsident † zu Paderborn 1842, Freund des unvergefslichen Willdenow, Kenner und eifriger Förderer der amabilis scientia; Dr. F. L. v. Schlechtendal, dessen Sohn, Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens zu Halle a. d. S., einer der kenntnifsreichsten u. unermüdlichsten Pflanzenforscher unserer Zeit), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
glandulosa W. (= *Adenophyllum coccineum* P. = *Boebera Cavanillesii* Spgl. = *Dysodia Cavanillesii* Lagasc. = *Tagetes punctata* Moç., Sess. = *Willdenowia glandulosa* Cav.), drüsige, ⊙. m. f. Mexico.
capillacea Moç., Sess. (= *Adenophyllum capillaceum* DC.), Mexico, scheint nicht kultiv. zu werden.
Schleichera trijuga W., v. Melicocca trijuga, p. 507.
Schlosseria Mill., v. Coccoloba uvifera, p. 209.
Schmaltzia aromatica Desv., v. Rhus aromatica, p. 686 et p. 592, II.

Schmidelia L., Schmidelie.
Cobbe DC. (= *cochinchinensis* DC. = *Allophyllus Cobbe* Sw. = *A. ternatus* Lour. = *Aporetica ternata* Forst. = *Ornithrophe asiatica* Hort. = *O. Cobbe* W. = *Pometia ternata* W. = *Rhus Cobbe* L. = *Toxicodendron Cobbe* G.), dreizählige, ♄. t. w. Ceylon, Neucaledonien, Cochinchina.

Digitized by Google

Schnella Radd., DC., Schnella, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

macrostachya Raddi, (= *Bauhinia unguiata* L., p. 115), großährige, ♄. w. Brasilien.

microstachya Raddi, (= *Bauhinia variegata* L., p. 115), kleinährige, ♄. w. Brasilien.

Schnaleinia nodiflora Steud., v. Trochiscanthes nodiflorus, p. 825.

Schoberia Ledeb., C. A. Mey., *altissima* C. A. Mey., *baccifera* C. A. Mey., *Bieberstoiniana* C. A. Mey., *Clemente* Steud., *fruticosa* C. A. Mey., *hortensis* Steud., *maritima* C. A. Mey., *microphylla* C. A. Mey., *Pallasiana* C. A. Mey., *salsa* C. A. Mey., *stigera* C. A. Mey., *spicata* C. A. Mey., *trigyna* C. A. Mey., v. Suaeda altissima, baccifera etc.

Schoenocaulon Asa Gray, Läusesamen, VI. III., Colchicaceae-(Melanthaceae)-Veratreae.

caricifolium Asa Gray, (= *Asagraea caricifolia* Kunth, = *Sabadilla caricifolia* Schltdl. = *Veratrum caricifolium* Schltdl., p. 837), rietgrasähnlicher, 4. k. Mexico.

officinale Endl. (= *Asagraea officinalis* Lindl. = *Sabadilla officinalis* Schltdl., Brandt, = *Veratrum officinale* Schltdl.), gebräuchlicher, 4. k. Mexico.

S. gracile A. Gray, (= *Helonias dubia* Mchx.), 4. Carolina, Florida, scheint nicht kultivirt zu werden.

Schoenoprasum lineare H. B. K., *longifolium* H. B. K., v. Nothoscordum Kunthii et longifolium Nachlese.

Schoenus L., Knopfgras.

mucronatus L. (= *maritimus* Lam. = *Cyperus aegyptiacus* Gmx. = *C. capitatus* Vand. = *C. macrorrhizus* Rich. = *Mariscus mucronatus* Presl, = *Scirpus Kali* Forsk.).

nigricans L. (= *Chaetospora nigricans* Kunth, = *Cyperus nigricans* Wither.).

puberulus C. A. Mey., feinhaariges, 4. k. Nepal.

II. Streblidia Lk.

ferrugineus Lk. (= *Chaetospora ferrugin.* Rchb., Kunth).

scariosus Vahl, non Thbg. (= *daustus* Berg.), v. Ficinia scariosa, p. 243, II., *stellatus* Lam., Sw., v. Dichromena leucocephala, p. 201, II.

Schollera erythrocarpa Roth, *macrocarpa* Rpth, *Oxycoccos* Roth, v. Oxycoccos erythrocarpus etc., p. 578.

Schollera debilis Rohr, v. Microtea debilis, p. 533.

Schollera graminifolia W. (= *graminea* Bartr.), v. Heteranthera graminea, p. 287, II.

Schollia Jacq. fil., *carnosa* Schrk. (= *crassifolia* Jacq.), *chinensis* Jacq., *volubilis* Jacq., v. Hoya carnosa, chinensis, viridiflora.

Scholtzia J. C. Schauer, (= *Pritzelia* Schau., non Walp.), (H. Scholtz, M. Dr. u. Botaniker in Breslau), VIII. 1., Myrtaceae.

obovata J. C. Schauer, (= *Baeckea involucrata* Endl. = *B. obovata* DC.), verkehrteiförmige, ♄. k. Neuh.

Schomburgkia Lindl., non DC. (Richard u. Robert Schomburgk, berühmt als Reisende u. Naturforscher in Guiana etc.).

crispa Lindl., krause, 4. w. Guiana.

marginata Lindl., p. 734.

multiflora Lindl., vielblumige, 4. w. Südamerika.

Digitized by Google

Schomburgkia
rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Südamerika (Sierra nevada de Santa Martha).
tibicinis Batem. (= *Epidendron tibicinis* Batem.), flötenartige, 4. w. Mexico, Guatemala.
β) grandiflora Batem.
undulata Lindl., wellenförmige, 4. w. Neugranada.

Schotia Jacq., Schotie.
diversifolia Walp. (= *latifolia* Eckl., Zeyh., non Jacq.), verschiedenblätterige, ħ. w. t. Cap d. g. Hoffn.
parvifolia Dehnh., kleinblätterige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.
simplicifolia Vahl, einfachblätterige, ħ. t. ? Cap d. g. Hffn.
speciosa Jacq. (= *afra* Thbg. = *Guajacum afrum* L. = *Theodora speciosa* Medic.).

Schouwia DC. (Dr. J. F. Schouw, Prof. in Kopenhagen), XV. 11., Cruciferae.
arabica DC. (= *Psychine arabica* Spgl. = *Subularia purpurea* Forsk. = *Thlaspi arabicum* Vahl), arabische, ☉. m. f. Arabien.

Schraderia Vahl, Schraderie.
capitata Vahl, (= *Urceolaria exotica* Gmel.), kopfförmige, ħ. w. Caribäen.
Schraderia hastata Mch., v. Salvia canariensis.

Schrankia W., Schrankie.
distachya Moç., Sess., zweiährige, 4. w. t. Mexico.
Schrankia divaricata Mch., *rugosa* Mch., *sulcata* Mch., v. Rapistrum perenne, rugosum, orientale.

Schubertia Mart. et Zuccar. (non Mirb. et Spgl.), (v. Schubert, Hofrath u. Prof. d. Naturgeschichte etc. in München, einer der geistreichsten Naturforscher), V. 11., Asclepiadeae.
Grahamii Decaisn. (= *Physianthus auricomus* Grah.), Graham's, ħ. Sch. w. Brasilien.
grandiflora Mart., grofsblumige, ħ. Sch. w. Brasilien.
graveolens Lindl., starkriechende, ħ. Sch. w. Brasilien.
Schufia arborescens Spach, v. Fuchsia arborescens.
Schultesia hederacea Roth, v. Wahlenbergia hederacea, p. 854.
Schultesia petraea Spgl., v. Eustachys petraea.

Schwabea Endl. (S. H. Schwabe, Hofrath u. Apotheker in Dessau), II. 1., Acanthaceae-Russeggereae.
modesta Endl., zierliche, ☉. m. f. w. Tropisches Afrika.

Schweiggeria Spgl., St. Hil. (= *Glossarrhen* Mart.), (A. F. Schweigger, ehem. Prof. der Naturgeschichte etc. zu Königsberg, wurde 1822 in Sicilien ermordet), V. 1., Violaceae.
floribunda St. Hil. (= *fruticosa* Spgl. = *Glossarrhen floribundus* N. E., Mart.), blüthenreiche, ħ. w. t. Brasilien.
mexicana Schltdl. (= *Gl. mexicanus* Steud.), mexicanische, ħ. t. Mexico.
pauciflora Lindl. (= *Gl. parviflorus* DC., Spgl. = *G. pauciflorus* N. E., Mart.), wenigblumige, ħ. w. t. Brasilien.

Schwenkia L., Schwenkie, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae (Scrofulariaceae).
discolor Kunze, verschiedenfarbige, ħ. Sch. w. Brasilien.
grandiflora Benth., grofsblumige, 4. ħ. Sch. w. Demerara.
hirta Kl., rauhe, ☉. f. Guinea.

Digitized by Google

Schwenkfeldia aspera W., *cinerea* Sw., s. Sabicea aspera et cinerea, p. 621, II.

Schweyckerta nymphoides C. G. Gmel., v. Limnanthemum nymphoides, p. 360, II. [1])

Scilla L., Sternzwiebel.

amoena L., b) fl. albo, c) purpureo-coerulea.

bifolia L., *β*) praecox W.

byzantina Poir., byzantinische, 4. Zw. f. Orient.

chloroleuca Kunth, (= *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., p. 568, = *O. gramineum* Poepp., non Sims).

Clusiana Endl. (= *comata* Hffg. = *peruviana* L. = *Eriophorus peruvianus* Clus. = *Hyacinthus stellatus peruvianus* Clus. = *Ornithogalum speciosum* Rafin.). Sardinien, Sicilien, Portugal, Nordafrika (nicht in Peru), var. alba, discolor Lindl. (= *bicolor* Herb.), pallida, phoenicea, violacea.

Cupaniana Gussone, (= *fistulosa* Rafin. = *Ornithogalum coeruleum* Rafin.).

fallax Steinh. (= *autumnalis* var. Poir.), trügerische, 4. Zw. f. Nordafrika.

geminiflora Kunth, (= *Ornithog. geminiflorum* p. 568).

Hohenackerii Fisch. et Mey., Hohenacker's, 4. Zw. f. Caucasus.

hyacinthoides L. (= *eriophora* Mill.).

intermedia Gussone, mittlere, 4. Zw. f. Sicilien.

italica L. (= *Bertolonii* Duby, = *hyacinthoides* Hort, = *pauciflora* Lk. = *verna* Suter, non L.).

japonica Thbg., japanische, 4. Zw. f. b. Japan.
var. rosea.

lanceolata Viviani, lanzettförmige, 4. Zw. f. b. Corsica.

lusitanica L. (= *italica β* Sm.).

orientalis Thbg. (= *bifolia* Thbg., non L.), morgenländische, 4. Zw. f. b. k. Japan.

parviflora Dsf. (= *autumnalis β* Sm. = *numidica* Poir. = *Stellaris parviflora* Steinh.), kleinblumige, 4. Zw. f. b. k. Nordafrika.

pratensis W. K. (= *italica* Host, non L.), *β*) major R. et S. (= *amethystina* Visian).

purpurea Mill., purpurfarbige, 4. Zw. f. Italien.

sibirica Andr. (= *amoena β sibirica* Sims, = *praecox* Don).

Strangwaysii Tenore, Strangways's, 4. Zw. f. Byzanz.

umbellata Ram. (= *alliifolia* Lapeyr. = *pratensis* Berger, = *verna* Lapeyr.).

verna Huds. (= *bifolia* Lightf.), *β*) major Kunth, (= *Ramburei* Boiss.).

Sect. II. Agraphis Link, (= *Limonanthe* Lk.), v. p. 732 et 885 et p. 14, II.

anthericoides Poir., *indica* Roxb., *undulata* Dsf., v. Urginia anthericoides, indica, undulata, *esculenta* Hook., Ker, v. Camassia esculenta, p. 151 et 110, II., *maritima* L., v. Sqilla maritima, *pomeridiana* DC., v. Chlorogalum Sect. III. Ornithog. pomeridianum, p. 459, II., *romana* Ker, v. Bellevalia romana, p. 117 et p. 64, II., *serotina* Schousb., Ker, v. Uropetalum serotinum, p. 831, *unifolia* L., v. Ornithogalum unifolium, p. 459, II.

---

1) Sciadopitys Sieb. et Zuccar., verticillata Sieb. et Zuccar., Conifere in Japan heimisch, scheint noch nicht eingeführt.

Digitized by Google

Scindapsus Schott, Sweet, Geigenarum, XXI. IV. (IV. I.), Aroideae.

angustifolius Hassk., schmalblätteriger, 4. ħ. w. Java.

caudatus Schott, (= *Pothos caudata* Roxb. = ? *P. pinnata* L. var. Wall. = *Monstera caudata* Schott), geschweifter, 4. ħ. w. Prince of Wales Island.

decursivus Schott, (= *Monstera decursiva* Schott, = *Pothos decursiva* Roxb.), herablaufender, 4. ħ. w. Silhet.

giganteus Schott, Sweet, (= *Monstera gigantea* Schott, = *Pothos gigantea* Roxb.), riesenhafter, 4. w. Ostindien (Prince of Wales Island).

glaucus Schott, (= *Pothos glauca* Wall., non Lk., Otto, = *P. Wallichii* Steud.), blaugrüner, 4. w. Ostindien.

officinalis Schott, Sweet, (= *Calla ovata* Hamilt. = *Monstera officinalis* Schott, = *Pothos officinalis* Roxb., p. 654).

Peepla Schott, Sweet, (= *Monstera Peepla* Schott, = *Pothos Peepla* Roxb., p. 654, = *P. Pipla* Roxb.).

pertusus Schott, Sweet, (= *Monstera pertusa* Schott, = *Pothos pertusa* Roxb., p. 654), durchbrochener, 4. ħ. Sch. w. Coromandel.

pictus Hassk., bunter, 4. ħ. w. Java.

pinnatifidus Schott, Sweet, (= *Monstera pinnatifida* Schott, = *Pothos pinnatifida* Roxb.), fiederspaltiger, 4. ħ. w. Sumatra.

pinnatus Schott, Decaisn. (= *Pothos pinnata* L., p. 654).

Sciodaphyllum P. Br., Schattenblatt.

anomalum G. Don, (= *Carolinea insignis* Hort., non Sw.).

pulchrum H. Cels. et Hort. belg. (= *Aralia pulchra* Hort.), schönes, ħ. w. ? Java.

Scirpidium aciculare N. E., *tenuis* N. E., v. Heleocharis acicularis et tenuis.

Scirpus T., L. (et *Heleogiton* Lest., Rchb.), Binse.

cyperinus Kunth, (= *thyrsiflorus* W. herb. = *Eriophorum cyperinum* L. = *Trichophorum cyperinum* P.), cypergrasähnliche, 4. f. Nordamerika.

β) S. Eriophorum Mchx.

elongatus Hamilt., D. Don, (= *Eriophorum comosum* Wall. = *E. arundinaceum* Wall. = *Scirpus comosus* Wall., non Dumort.).

macrophyllus Bess. (= *lacustris* L. var. Schult.), grofsblätterige, 4. Wa. f. Lithauen.

maritimus L. (= *capensis* Burm., Vahl, = *compactus* Hoffm. = *cyperoides* Lam. = *decumanus* W. herb. = *glaucus* Lam. = *lucidus* Less. = *macrostachys* Mchx. = *riparius* P. = *robustus* Pursh, = *salinus* Schm. = *tridentatus* Rosc.), β) tuberosus Dsf., γ) aegyptiacus Poir. (= *corymbosus* Forsk. = *macrostachys* W.).

mucronatus L. (= *glomeratus* Scopol. = *triangularis* Roxb. = *tricarinatus* P.).

articulatus L., *Bergianus* Spgl., *brunneus* Mühlbg., *capillaris* L., *leptaleus* K. etc., v. Isolepis articulata, Bergiana etc. et Sect. II. p. 425 et p. 324, II., *quadrangularis* Vahl, *quinquangularis* Vahl, v. Trichelostylis tetragona et quinquangularis.

Die übrigen bemerkenswerthern Synonyme, welche auf die betreffenden Gattungen wohin sie gehören verweisen, s. p. 733.

Sciuris trifoliata N. E., v. Galipea trifoliata, p. 343.

Digitized by Google

Sclarasa Mill., Mch., *Aethiopis* Mill., *argentea* Mill., *ceratophylla* Mill. etc., v. Salvia Aethiopis, argentea, ceratophylla etc., p. 715 seq.

Scleranthus L., Knauel.

annuus L., *β*) verticillatus Tausch, (= *collinus* Hornem.).

comosus Dumort., schopfiger, ⊙. f. Belgien.

divaricatus Dumort., ausgespreitzter, ⊙. f. Belgien.

neglectus Roch. (= *marginatus* Gussone), übersehener, ☿. ♄. f. Ungarn, Sicilien.

Scleria Berg., L., Geisselgras.

latifolia Sw. (= *Carex latifolia* Gmel.), breitblätteriges, ♃. w. Jamaica, Guiana.

Sclerobasis rigida Cass., v. Senecio rigidus, p. 745.

Sclerochaetium Rottboellii N. E., v. Lepidosperma Rottboellii, p. 350, II.

Sclerochloa P. B., II. Genuina, p, 733.

dichotoma Lk. (= *maritima* Rchb. = *Agropyrum maritimum* P. B. = *Brachypodium maritimum* R. et S. = ? *Dactylis memphitica* Spgl. = *Festuca dichotoma* Forsk. = *F. divaricata* Sbr., non Dsf. = *F. maritima* DC.).

rigida Panz. (= *patens* Presl, = *Festuca rigida* Kunth, = *F. rigens* Trin. = *Glyceria rigida* Sm. = *Megastachya pulchella* R. et S. = *M. rigida* R. et S. = *Poa pulchella* Stev. = *P. rigida* L. = *Triticum maritimum* Wulff.).

III. Sphenopus Trin., p. 734.

divaricata P. B. (= *expansa* Lk. = *Sphenop. Gouani* Trin. = *Festuca expansa* Kunth, = *F. Sphenopus* Trin. = *Poa divaricata* Gouan, = *P. expansa* Gmel.).

Sclerolepis Cass., Knorpelschüppchen, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

verticillata Cass. (= *Ethulia uniflora* Walt. = *Sparganophorus verticillatus* Mchx.), wirtelförmiges, ⊙. ♂. f. k. Carolina.

Sclerolepis Kalmii Monn., v. Pachylepis Kalmii, p. 468, II.

Sclerosciadium K., Knorpeldolde, V. 11., Umbelliferae.

humile K. (= ? *Bunium rigens* Spgl. = *Conium rigidum* Mert. = *Oenanthe nodiflora* Schousb.), niedrige, ⊙. f. Marocco.

Sclerostemma Schott, *agreste* Schott, *argenteum* Schott, *atropurpureum* Schott etc., v. Scabiosa Gramuntia, ucranica, atropurpurea etc., p. 727 seq.

Scleroxylon W., *canariense* W., v. Pleiomeris canariensis, p. 539, II., *S. Manglilla* W., *melanophleum* W. (= *venulosum* W.), v. Myrsine Manglilla, melanophleos, p. 426, II.

Scolochloa Mert. et K. (non Lk.), *arundinacea* M. et K., v. Arundo Donax, p. 86.

Scolopacium incarnatum Eckl., Zeyh., v. Erodium incarnatum.

Scolopendrium Sm., p. 734.

officinarum Sw., e) daedaleum W. (= *ramosum* Hort.).

Scolymus T., Golddistel.

hispanicus L. (= *angiospermus* G. = *congestus* Mch. = *perennis* Ger. = *vivax* Sauv. = *Myscelus microceph.* Cass.).

maculatus L. (= *annuus* L. Hort. upsal. = *gymnospermus* G. = *pectinatus* Cass.).

paniculatus Ucria, rispige, ⊙. ♂. f. Sicilien.

Ungewifs: giganteus Roem. Hort. Turic.

Digitized by Google

Scoparia L., Besenkraut.

annua Chamiss., Schltdl., jähriges, ⊙. m. f. Mexico.

flava Cham., Schltdl. (= *plebeja* Cham., Schltdl. = *Microcarpaea montevidensis* Spgl.), hellgelbes, ⊙. ♂ m. f. w. Brasilien.

Scopolia Jacq., carniolica Jacq. (= *trichotoma* Mch.), β) viridiflora Frey. (= ? *Hladnickiana* Biatz.).

Scordium spinosum Cav., v. Teucrium spinosum. *Scorodonia Arduini* Rchb., *betonicaefolia* Mch., *Botrys* Sering., *heteromalla* Mch. (= *sylvestris* Lk.), *massiliensis* Lk. (= *cordata* Mch.), *spinosa* Lk. etc., v. Teucrium Arduini, betonicum, Botrys, Scorodonia etc.

Scorpiurus L. (= *Scorpioides* Adans., Mch.), Scorpionkraut.

purpurea Dsf., purpurfarbiges, ⊙. f. Algier.

sulcata L. (= *echinata* β Lam.).

Ungewiss: pinnata Mill.

Scorpius spinosus Mch., v. Genista germanica.

Scorzonera T., L., Scorzonere.

I. Euscorzonera DC. (Genuina).

astrachanica DC. (= *pusilla* MB.), astrachanische, 4. f. Astrachan.

dalmatica Host, dalmatische, 4. f. Dalmatien.

deliciosa Gussone, wohlschmeckende, 4. f. Sicilien. [1])

divaricata Turcz., ausgespreitzte, 4. f. Mongolei.

halophila Fisch. et Mey., salzliebende, 4. f. Persien.

macrosperma Turcz., grofssaamige, 4. f. Dahurien.

tenuifolia Schrad. (= *austriaca* Balb.), dünnblätterige, 4. f. Piemont.

II. Gelasia Cass.

Juliana Hort. Berol., Julische, 4. f. Südeuropa.

villosa Scopol. (= *angustifolia* Host et ? L. = *hirsuta* L. var. Poir.).

III. Lasiospora Cass. (= *Lasiospermum* Fisch.).

eriosperma MB., β) parviflora H. Berol., non Jacq. (= *angustifolia* Hort.).

hirsuta L. mant. (= *eriosperma* Gouan, non MB. = *Julia* Vest. = *G. Jacquini* Cass. = *Geropogon calyculatus* L. = *G. hirsutus* All. = *Hieracium capillaceum* All. = *Lasiospermum hirtum* Fisch. = *Lasiospora hirsuta* Cass. = *Tragopogon calyculatus* Jacq.).

lanata MB. (= *Leontodon lanatus* L. amoen. = *Tragopogon lanatus* W. = *Troximon lanatus* P.).

latifolia DC. (Fisch. et Mey.), breitblätterige, 4. f. Persien.

veratrifolia Fenzl, germerblätterige, 4. f. b. k. Kurdistan.

laciniata L. (= *pinifolia* Gouan, = *subulata* Lam.) etc., v. Podospermum laciniatum etc., p. 639 et p. 544, II., *acaulis* W., v. Taraxacum palustre, p. 799, *elongata* W. (= *graeca* Hort.), *stylosa* P. (= *aspera* Dsf.), v. Hymenonema Tournefortii Nachl. et H. Fontanesii p. 309, II., *dichotoma* Vahl, v. Microrhynchium dichotomum, p. 408, II., *picroides* L. et *orientalis* L., v. Picridium vulgare et orientale, p. 623 et p. 523, II., *pinnatifida* Mchx., v. Pyrrhopappus carolinianus, p. 577, II., *taraxacifolia* Jacq., v. Hypochaeris Balbisii.

---

1) „Radicis saccharo varie confectae et gratissime refrigerantis magnam vim Panormitani consumunt." Endlicher Hort. acad. Vindob.

Digitized by Google

Scovitzia Auct., v. Szovitsia.

Scribaea divaricata Flor. Wetter., v. Cucubalus baccifer.

Scrophularia T., L. (= *Scrofularia* Auct.), Braunwurz.

alpestris Gay, (= *Scopolii* DC., non Hoppe), Voralpen-B., 4. f. Asturien, Pyrenäen.

aquatica L. (= *Balbisii* Hornem.), β) parviflora Benth. (= *rivularis* Moris, = ?*nepetaefolia* Presl, non Sm.), ?γ) Neesii Wirtgen.

auriculata L. (= *hispida* Dsf. = *lyrata* W. Hort. Berol. = *ebulifolia* Hffmg. et Lk. = *subverticillata* Moris, = *nepetaefolia* Sm. herb. = *trifoliata* Bové, non L. = *umbrosa* Salzm. = *glabrata* Schimp.), Südspanien, Portugal, Nordafrika, Sardinien.

caesia Sm. (= *verbenaefolia* Dsf. Hort. Par.), hechtblaue, 4. f. b. Griechenland.

canina L. (= *bicolor* Sibth. et Sm. = *chrysanthemifolia* W. = *multifida* Lam., non W. = *atropurpurea* Moretti, = *pyramidalis* Wydl. = *pubescens* Hort.).

divaricata Ledeb., ausgespreitzte, 4. f. Iberien, Caucasus.

Ewersii Ledeb., Ewers's, 4. f. Alt. Sibirien.

foetida Wydler, stinkende, 4. ?

grandidentata Tenore, grofszähnige, 4. f. Sicilien.

Hoppei K. (= *canina* Hoppe, = *juratensis* Schlchr.).

heterophylla ? W. (= *micrantha* d'Urv. = *Oliveriana* Wydl. = *Urvillaeana* Wydl.), verschiedenblätterige, 4. ♄. Griechenland, Taurus, Kurdistan, steiniges Arabien etc.

laevigata Vahl, (= *appendiculata* Jacq. hort. Schönbr. = *trifoliata* Dsf., non L.), glatte, 4. k. Barbarei.

lucida L. (= *glauca* Sibth. et Sm.), β) filicifolia Mill. (= *livida* Sibth. et Sm.), ?γ) tanacetifolia W.).

minima MB., kleinste, ♂. 4. f. Iberien, Caucasus, Armenien.

multicaulis Turcz., vielstengeliche, 4. f. Sibirien.

nodosa L., var. californica Cham., lanceolata Pursh, marylandica L., italica Mill., Skellii Spgl., umbrosa Dumort., Europa, asiat. Rufsland, Nordamerika.

orientalis L. (= *ebulifolia* MB.).

pallida Fisch., bleiche, 4. f. Iberien.

Patriniana Wydl. (= *incisa* Weinm., Bunge, = *Gmelini* Turcz. = *Stelleriana* Steud.), Patrin's, 4. f. Altai, Turcomanien.

peregrina L. (= *geminiflora* Lam. = *meridionalis* Presl, = *paniculata* Seenus, = *sexangularis* Mch.).

pyrenaica Benth. (= *vernalis* Lapeyr., non L.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

sambucifolia L. (= *mellifera* Ait. = *viridiflora* Poir.), β) hirsuta Wydl. (= *grandiflora* DC., Rchb. = *decora* Fisch. et Lallem.). Portugal, Spanien, Nordafrika.

Scorodonia L. (= *betonicaefolia* L. herb.). Insel Jersey, Westfrankreich, Spanien, Madeira.

trifoliata L. (= *sambucifolia* Fisch. ind. sem. hort. Petr.).

vernalis L. (= *cordata* W. K. = *latifolia* Host, = ?*anomala* Vest, = *Ceramanthe vernalis* Rchb.).

Zweifelhafte oder nicht hinlängl. bekannte: adscendens W. Enum., biserrata W. Enum., (glabra var.?), lancifolia Presl, Sicil. humilis Dsf., glandulifera Clarke, Thracien, oblongifolia Loisel. 4. Corsica.

nudicaulis Wydl., v. Celsia persica, p. 129, II.

Digitized by Google

Scutellaria R., L., Helmkraut (Schildkraut).
albida L. (= *orientalis* Mill., Hortul.), β) pallida MB.
altaica Fisch., Ledeb. (= *alpina* L. var. Benth.).
canescens Nutt. (= *incana* Spgl., Mühlbg. = *integrifolia* Auct. quor. = ? *pubescens* Mühlbg. = *serrata* Spgl., non Andr.), grauliches, 4. f. Nordamerika.
coerulea Moç., Sess., blaues, 4. k. Mexico.
Columnae All. (= *altissima* Hamilt. et Auct. = *pallida* Gussone, = *peregrina* Sibth., Sm. non L. = ? *Cassida racemosa* Mch.).
commutata Gussone, Benth. (= *altissima* L. spec. = *peregrina* W. K., non L.).
fruticosa Dsf., strauchiges, ♄. k. f. b. Syrien, Persien.
grandiflora Sims, (= *pulchella* Auct., non Bunge).
japonica Morr. et Decaisn., japanisches, 4. k. f. b. Japan.
incarnata Vent., p. 737. Mittelamerika.
integrifolia L. (= *caroliniana* Lam. = *hyssopifolia* L. = *polymorpha* Hamilt.).
longifolia Benth., langblätteriges, 4. k. Neuspanien.
lupulina L. (= *alpina* L. β var. Benth. = *verna* Bess.).
macrantha Fisch. (= *grandiflora* Adams, non Sims).
nervosa Pursh, (= *gracilis* Nutt. = *parviflora* Rafin. = *teucriifolia* Sm.).
orientalis L. (= *caucasica* Hamilt. = *Sieversii* Bunge). β) pectinata Hohenack.
parvula Mchx. (= *ambigua* Nutt.? = *ovata* Hüll. = *pygmaea* W. herb.).
peregrina L. (= *rubicunda* Hornem.).
pulchella Bunge, schönes, 4. f. Alt. Sibirien.
scordifolia Fisch. (= *Adamsii* Spgl.).
splendens Lk., Kl., Otto, schimmerndes, 4. ♄. k. Mexico.
tubiflora Benth., röhrenblumiges, 4. t. Mittelbrasilien.
versicolor Nutt. (= *cordifolia* Mühlbg.), buntfarbiges, 4. f. Nordamerika.
viscidula Bunge, schmieriges, 4. f. b. Nordchina.

Scutia Commers., Brongn., Scutie, V. 1., Rhamneae.
capensis Eckl., Zeyh. (= *Ceanothus capensis* DC., p. 173, = *Rhamnus capensis* Thbg.).
indica Brongn. (= *Catha zeylanica* G. Don, = *Ceanothus circumscissus* G. P. = *C. zeylanicus* Heyne, Roth, p. 173, = *Celastrus zeylanicus* Schult. = *Rhamnus circumscissus* L. = *Rh. myrtinus* Burm.), indische, ♄. w. Ostindien.
paniculata G. Don, (= *Ceanothus paniculatus* Heyne, = *Celastrus nutans* Roxb., p. 174, = *C. paniculatus* W. = *C. Rothianus* Schult.), rispige, ♄. w. Ostindien.
Scyphanthus Don, *elegans* Don, *grandiflorus* Sweet, v. Grammatocarpus volubilis et β grandiflorus, p. 273, II.
Scytalia G., *chinensis* G. (= *Litschi* Räusch.), *crinita* Räusch., *Longan* Räusch., v. Nephelium Litschi, lappaceum et Longanum, p. 433—434, II.
Scytalis Catjang E. Mey., *tenuis* E. Mey., v. Dolichos Catjang et capensis.

Scytophyllum Eckl., Zeyh., Tassenblatt, V. 1., Celastrineae.
laurifolium Eckl. Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. p. 174).
obtusum Eckl., Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. var. Schltdl. = *C. obtusus* Thbg.), stumpfes, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Scytophyllum
oleoides Eckl., Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. var. Schltdl. = *C. oleoides* Lam., p. 174, = *Cassine oleifolia* P. = *C. oleoides* Lam.).

Seaforthia RBr., Seaforthie.
gracilis Mart. (= *Areca gracilis* Blume), schlanke, ħ. w. Ostindien.
praemorsa Hort. belg., abgebissene, ħ. w. ? Ostindien.
Ptychosperma Mart. (= *Ptychosperma gracilis* LaBill.), faltensaumige, ħ. w. Neuholland.

Sebaea RBr., Sebaea.
aurea RBr. (= *minima* Jaroszl. = *Exacum aureum* L. fil. = *Gentiana aurea* Thbg.).
congesta Schrad. (= *aurea β pallens* Griseb. = *capitata* Schrad., non Schltdl.).
sulphurea Schltdl. (= *tabularis* Eckl. mpt.), schwefelgelbe, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.
guianensis Spgl. (= *jorullensis* Spgl. = *Schultesia stenophylla* Mart.), wird kaum kultivirt.
cordata RBr., *Ohlendorffiana* Eckl., v. Belmontia cordata et Ohlendorffiana, p. 64, II.

Secale T., Roggen (Korn).
arundinaceum Trautv., rohrartiger, ☉. ♂. f. ? Südl. Asiat. Rußland.
cereale L., var. aegyptiacum, aestivum, archangelicum, aristatum, de Vierland, Erzereum, multicaule, norwegicum, perenne, ruthenicum Hort. Petropol.
dalmaticum Visian., dalmatischer, ☉. ♂. f. Dalmatien.
fragile MB. (= *campestre* Schult. = *spontaneum* Fisch. Hort. Gorenk. = *sylvestre* Host, = *Triticum fragile* Host), ♂.
montanum Gussone, (= *cereale* L. var. Tria.), Berg-T., ♂. f. Sicilien.
orientale L. (= *hirtum* Lam.), *prostratum* Pall. (= *pumilum* P. = *reptans* Pall.), *pungens* P., *villosum* L., v. Triticum orientale, prostratum, squarrosum, villosum, p. 824.

Secamone RBr., Secamone.
Alpini R. et S. (= *aegyptiaca* Don, Sweet, = *Periploca Secamone* L.).
emetica RBr. (= *Cynanchum vomitorium* Lam. = *Periploca emetica* Retz).

Securidaca L. (non Milk., G. Mch.), Beiltsrauch.
sylvestris Schltdl., Wald-B., ħ. t. Mexico.
S. legitima G., Mch. (= *lutea* Mill. = *vera* Hort.), et *Securilla Securidaca* P., v. Securigera Coronilla, p. 738.

Securinega Juss., nitida W. (= *durissima* Gmel. syst.). *nitida* Lindl. (non W.), v. Lithoxylon Lindleyi, p. 365, II,

Sedum T., L., Mauerpfeffer.
aizoides S. Dyck, (non DC.), saxerlingähnlicher, 4. f. ?
albescens Haw. (= *glaucum* Sm., non W. K.).
album L. (= *teretifolium α* Lam.), *β*) micranthum Bast., *γ*) turgidum Ramond.
algidum Ledeb., kalter, 4. f. Altaisches Sibirien.
altissimum Poir. (= *dioicum* Donn, = *fruticulosum* Brot. = *Jacquini* Haw. = *nicaeense* All. = *rufescens* Tenore, = *rupestre α* Gouan, = *Sempervivum sediforme* Jacq. et var. monstrosum), *β*) ochroleucum Sm.

Digitized by Google

Sedum

amplexicaule DC. (= *carinatum* Lk. = *rostratum* Tenore, = *Sempervivum anomalum* Lagasca, = *S. tenuifolium* Sibth., Sm.), stengelumfassender, 4. f. Südeuropa, Griechenland.

Anacampseros L. (= *rotundifolium* Lam. = *Anacampseros sempervirens* Haw.).

andegavense DC. (= *atratum* Bast., non L. = *commutatum* Spgl. Hort. Hal. = *Crassula andegavensis* DC. *C. globulifolia* Moris).

anglicum Huds. (= *dasyphyllum* β DC. = *Guettardi* Vill. = *hirsutum* Bretero, = *rubens* Lightf.).

atratum L. (= *haematodes* Scopol.).

bracteatum Viviani, deckblätteriger, ⊙. f. Nordafrika.

brevifolium DC. (= *sphaericum* Lapeyr.), kurzblätteriger, 4. f. Pyrenäen, Corsica.

caespitosum DC. (= *Crassula caespitosa* Cavan. = *C. Magnolii* DC., Spgl. = *C. rubens* β DC. = *C. verticillaris* L. mant. = *Tillaea erecta* Sauv. = *T. rubra* Gouan), rasenartiger, ⊙. f. Spanien, Frankr., Taurien.

camtschaticum Fisch., kamtschatalischer, 4. f. Kamtschatka.

Cepaea L. (= *paniculatum* Lam. = *Anacampseros Cepaea* Haw.), β) galioides All. (= *verticillatum* Latour, non L.), γ) spathulatum W. K. (= *Anacampseros spathulata* Hort.), δ) tetraphyllum Sibth., Sm., ε) alsinefolium All.

dasyphyllum L. (= *glaucum* Lam., non W. K.), β) gracile DC., non C. A. Mey. (= *neapolitanum* Tenore), γ) reticulatum Schrk.

deltoideum Tenore, deltaförmiger, ⊙. f. Neapel.

dendroideum Sessé, baumähnlicher, ♄. t. Mexico.

Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. b. k. Nordw. Amerika.

elongatum Wall. (non Ledeb.), verlängerter, 4. k. Ostind.

fragile Dumort., zerbrechlicher, 4. f. Belgien.

glaucum W. K. (= *Andersonii* G. Don, = *hungaricum* Poir.).

globulifolium ? Moris, (= ? *andegavense* DC. var. Sweet), kugelblätteriger, 4. f. ? Sardinien.

gracile C. A. Mey. (non DC.), schlanker, 4. f. Caucasus.

haematodes Mill., blutfarbiger, 4. f. Louisiana.

heptapetalum Hornem. (non Poir.), siebenkroniger, ? 4. f. Rufsland.

hirsutum All. (= *globiferum* Pour. = *hispidum* Poir.), Apenninen, Corsica, Pyrenäen.

hispanicum L. (= *Guettardi* Gmel., non Vill. = *pallidum* MB.).

hybridum L., β) altaicum Hort. Petropol.

ibericum Steven, (= ? *spurium* MB. var. Spgl. = *stoloniferum* Gmel. jun.), iberischer, 4. f. Nördl. Iberien.

laxiflorum DC., lockerblumiger, ♄. k. Teneriffa.

maximum Sut., b) purpureum, c) rubens, d) fol. variegat.

miserum Lindl., magerer, ⊙. f. Mexico.

multicaule Wall., vielstengeliger, 4. k. Himalaya.

nebrodense Gaspar., nebrodischer, 4. f. Sicilien.

Notarjanni Tenore, Notarjanni's, ♂. ♄. f. b. k. Neapel.

obtusifolium C. A. Mey., stumpfblätteriger, 4. f. Caucasus.

oppositifolium Sims, (= *ciliare* Haw. = *dentatum* Hortul. = *denticulatum* Don, = *spurium* Hortul., non MB. = *Anacampseros ciliaris* Haw. = *Crassula crenata* Dsf.), b) rubrum.

Digitized by Google

Sedum

pulchellum Mchx. (= *pulchrum* DC.), schöner, 4. f. Nordamerika.

quinquefidum Haw., fünfspaltiger, 4. f. ?

reflexum γ cristatum DC. (= *cristatum* Schrad. = *crassicaule* Hortul.).

rubens L., α) decandrum DC. (= *saxatile* Pall. = *stellatum* Hahl., non L.), röthlicher, ⊙. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) pentandrum DC. (= *Crassula rubens* L.).

sarmentosum Bunge, starkwurzelnder, 4. f. b. Nordchina.

sexfidum MB. (= *glaucum* W. K. var. Auct.), sechsspaltiger, ⊙. f. Caucasus.

Sieboldii Hort. angl. (= ? *japonicum* Hort.).

spathulatum Hook., spatelförmiger, 4. f. Nordw. Amerika.

stenopetalum Pursh, schmalkroniger, 4. f. Nordamerika.

β) coerulescens Haw.

Telephium L., α) albidum Steud. (= *Anacampseros albida* Haw.), β) ochroleucum Endl. (= *vulgare* Lk. = *Anacampseros vulgaris* Haw.), γ) purpureum Lk. (= *triphyllum* Steud. = *verticillatum* Donn, = ? *atropurpureum* Hort. = *Anacampseros purpurea et triphylla* Haw.), δ) argutum (Haw.), ε) paucidens (Haw.).

tenellum MB. (= ? *turgidum* DC. var. Spgl.), zarter, ⊙. f. Caucasus.

ternatum Mchx. (= *americanum* Banks herb. = *deficiens* Donn, = *octogonum* Hortul. = *portulacoides* W. = *Anacampseros ternata* Haw.).

Torreyi G. Don, Torrey's, 4. f. Nordamerika.

viridulum Haw., weniggrüner, 4. f. Europa.

Unbestimmtere: multiflorum Hort. Dyck., mutabile Wender., procumbens Schrk., Scheuchzeri Gmel. Hort. Carlsr. Ebenso mehrere der von Haworth aufgestellten Arten ohne genauere Angabe des Vaterlandes.

Cotyledon Jacq., v. Echeveria caespitosa, p. 213, II., *divaricatum* Ait., v. Sempervivum aizoides, *elongatum* Ledeb., non Wall. (= *Ledebourii* Hort. Berol.), *Rhodiola* DC. (= *roseum* Scopol.), *altaicum* Don, *asiaticum* DC., v. Rhodiola elongata, rosea, altaica, asiatica, p. 684 et p. 590, II., *malacophyllum* Steud., *pilosum* MB., *spinosum* Thbg., v. Umbilicus malacophyllus, pubescens, spinosus.

Seetzenia RBr. (Seetzen, ein Deutscher, Reisender, Geograph und Alterthumsforscher, † 1811), X. 1., Zygophylleae.

africana RBr. (= *prostrata* Eckl., Zeyh. = *Zygophyllum ? lanatum* W. = *Z. prostratum* Thbg.), afrikanische, ♄. t. k. Südafrika.

Seguieria Löfl., L. (J. F. Seguieur aus Nismes, ein ausgezeichneter Botaniker lebte u. starb 1784 zu Verona), Aizoideae-Phytolaccaceae.

americana L. (= *aculeata* Jacq.), amerikanische, ♄. w. Brasilien.

Sekika Medik., *sarmentosa* Mch., v. Diptera sarmentosa, p. 724 et p. 207, II.

Selaginella P. B., Spring., Lk., *apus* Spring., *cuspidata* Lk., *denticulata* Lk., *helvetica* Lk., *selaginoides* Lk., *stellata* Spring., v. Lycopodium apodum, cuspidatum, denticulatum, helveticum, selaginoides et stellatum, p. 484 et p. 377, II.

Digitized by Google

Selago L., Grufskraut.

distans E. Mey., abstehendes, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

fasciculata L. mant. (= *fulvo-maculata* Lk. = *spuria* Sieb.).

glabrata Chois. (= ? *canescens* Thbg. = ? *triquetra* L. fil.), glattlicheres, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) fruticosa Thbg.

paniculata Thbg., rispiges, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

pinea Lk., kieferähnliches, ♄. k. t. Südafrika.

pterophylla Otto, flügelblätteriges, ♄. k. t. Südafrika.

rapunculoides L. (= *pulchella* Salisb.).

spuria L. (= *pallida* Salisb.).

angustifolia Thbg., v. Agathelepis angustifolia, p. 13, II., *capitata* Berg. (= *ovata* Thbg., Ait.), *lucida* Vent. (= ? *rotundifolia* Thbg.), *spicata* Lk., v. Microdon ovatum, lucidum, Linkii, p. 406, II., *lychnidea* L., v. Lyperia fragrans, p. 378, II.

Selinum L., Hoffm.

Carvifolia L. (= *angulatum* Lam. = *membranaceum* Vill. = *pseudocarvifolia* All. = *Angelica Carvifolia* Spgl. = *Carvi sulcatum* Bernh. = *Laserpitium selinoides* Scopol. = *Mylinum Carvifolia* Gaud. = *Peucedanum cuneifolium* Vill. = *Seseli Carvifolia* Mill.).

baicalense Redowsky, (= *collinum* W. K. = *terebinthinaceum* Trevir.), *podolicum* Bess., *argenteum* All. (= *peucedanoides* Dsf.), *latifolium* Mill., *palustre* L. spec., *sibiricum* Retz, *sylvestre* Jacq., *venetum* Spgl., v. Peucedanum baicalense, Chabraei β podolicum, involucratum, latifolium, montanum, selinoides, sylvestre et var. β, venetum, p. 504 et 505, II., *caucasicum* MB., v. Imperatoria caucasica, p. 315, *scabrum* Lapeyr., v. Angelica scabra Nachl. *Archangelica* Lk., *atropurpureum* Lk., v. Archangelica officinalis et atropurp., p. 72, *canadense* Mchx. etc., v. Cnidium canadense etc., p. 208, *verticillaris* Lk., v. Peucedanum verticillare, p. 610.

Sellon glutinosa Spgl., v. Gymnosperma glutinosum, p. 278, II.

Semarillaria Cururu R. et P., v. Paullinia Cururu, p. 591.

Sempervivum R., L., Hauswurz (Hauslaub).

aizoides Lam. (= ? *Anacampseros divaricata* Haw.? = *Sedum aizoides* DC. = ? *S. divaricatum* Ait.), saxerlingähnliches, ♄. k. Madeira.

caespitosum Ch. Sm. (= *barbatum* Hornem. = *ciliare* Haw. = *ciliatum* Sims, = *Simsii* Sweet).

canariense L., β) subtabulaeforme.

dichotomum L., zweizinkiges, ♂. k. Canarische Inseln.

glaucum Tenore, blaugrünes, 4. f. ?

latifolium Hffg., breitblätteriges, ♄. k. Teneriffa.

laxum Haw., lockeres, ♄. k. Canarische Inseln.

molle Visian., weiches, ♂. k. t. Nubien.

montanum L., Bergliebendes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

pulchellum C. A. Mey., schönes, ♄. k. ?

punctatum C. Sm., punktirtes, ⊙. ♂. k. Canar. Inseln.

pygmaeum C. Sm., zwergiges, 4. k. Canarische Inseln.

ruthenicum Fisch. (= ? *globiferum* L.), russisches, 4. f. Sibirien.

Seguieri DC. (= *Sedum stellatum* Poll.), Seguier's, 4. f. Oberitalien.

Digitized by Google

Sempervivum
Smithii Sims, (= *foliosum* C. Sm.).
Unbestimmt: mutabile Schltdl.
aureum C. Sm. (= *calyciforme* Haw.), v. Greenovia aurea, p. 274, II.
Senacia lanceolata Lam., *undulata* Lam., v. Pittosporum lanceolatum et P. Senacia, p. 523—524, II.
Maytenus Lam., *octogona* Poir., v. Maytenus chilensis, et octogonus, p. 501.

Senebiera Poir., Senebiera.
linoides DC. (= *Coronopus linoides* Spgl. = *Lepidium linoides* Thbg.), leinähnliche, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.
Senecillis purpurata G., v. Cineraria purpurata Nachl.

Senecio T. (et Jacobaea T.), Kreuzkraut.
I. Tephroseris Rchb. (= *Tephroserides* DC. s. Cineratiae, = *Cineraria* Auct. pro parte).
arachnoideus Sbr. (= *lanatus* Scop. = *Scopolii* Hoppe et Hornsch. = *Arnica lanigera* Tenore, = *A. floccosa* Bertol. = *Cineraria arachnoidea* Rchb.).
crispatus DC. (= *Cineraria crispata* L. fil., Jacq.), β) rivularis DC. (W. K.), γ) sudeticus DC. (K.), δ) Schkuhrii DC. (= *Cineraria integrifolia* Schk., non alior. = *C. Schkuhrii* Rchb.), ε) croceus DC. (Tratt.).
frigidus Less. (= *Cineraria atropurpurea* Ledeb. = *C. frigida* Richards.), kaltes, 4. f. Sibirien. Nördl. Amerika.
Kalmii Nutt. (= *Cineraria canadensis* L. = *C. tomentosa* Mill.), Kalm's, 4. f. Canada.
kirghisicus DC. (= *Cineraria glabrata* Ledeb.), kirghisisches, 4. f. Sibirien.
medius Sweet, (= *Cineraria media* W. K.), mittleres, 4. f. Ungarn.
II. Genuini.
anethifolius Cunn., dillblätteriges, ħ. k. Neuholland.
apargiaefolius Walp., apargienblätteriges, 4. k. Neuholl.
auratus DC. (= *Cineraria aurea* L.), goldiges, 4. f. Sibirien.
aureus L. (= *fastigiatus* Schwnz.).
calamifolius Hook., rohrblätteriges, ħ. k. Cap d. g. H.
californicus DC., californisches, ⊙. f. Californien.
calvescens Moris et Notar., kahlwerdendes, ħ. k. Insel Capri.
caucasicus DC. (= *Cineraria caucasica* MB. = *Ligularia caucasica* Den, Sweet).
crassiflorus DC. (= *Cineraria crassiflora* Lam. = *C. vestita* Spgl.), dickblumiges, 4. f. Südamerika.
crenatus Thbg., kerbiges, ħ. k. Cap d. g. Hoffn.
Cymbalaria Pursh, (= *aureus* L. var.? DC.), cymbelkrautblätteriges, 4. f. Nordamerika.
dubius Ledeb. (= *vulgaris* L. var. DC.), zweifelhaftes, ⊙. f. Sibirien.
dunensis Dumort. (= *Jacobaea* L. var.?), Dünen-K., 4. f. Belgien.
Durieui Gay, Durieu's, 4. f. b. Asturien.
echinatus DC. (= *Cacalia echinata* L. fil. = *Cineraria ramentosa* L'Her.), igelstacheliges, 4. k. Teneriffa.
erucaefolius L. (= *canescens* Bernh., Schrad. = *cinerarioides* Vivian. = *scanorensis* L. = *siculus* Jan etc.).
fragrans Fisch., wohlriechendes, 4. f. Sibirien.
Fuchsii C. C. Gmel. (= *alpestris* Gaud. = *commutatus* Hell. = *nemophilus* Dumort. = *nemorensis* Auct., non L. etc.).

Digitized by Google

Senecio

glaucus L. (= *? glaucescens* Spgl., non DC.).
Haworthii Steud. (= *vestitus* Sweet, = *Cacalia vestita* Haw.), Haworth's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
Herbichia Steud. (= *? abrotanifolius* Whlbg. carp. = *Herbichia carpatica* Zawadsky), Herbich's, 4. f. Galicien.
Jacquinianus Rchb. (= *Barrelieri* Hoppe, = *commutatus β* Spenner, = *frondosus* Tausch, = *germanicus α* Wallr. = *nemorensis* Jacq. = *? octoglossus* DC.), Jacquin's, 4. Mittel- u. Osteuropa.
inaequidens DC. (= *Lactuca capensis* Hortul.), ungleichzahniges, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
Kicksii Steud. (= *diversifolius* Dumort. = *Doria* Kicks), Kicks's, 4. f. Belgien.
miccanthus Hornem., kleinblumiges, ☉. f. ?
nemorensis L. (= *germanicus* Wall. Die übrig. Synonyme vergl. bei S. Jacquinianus).
niveus W., Less. (= *Cinerar. nivea* W. = *Doria nivea* Thbg. = *Jacobaea nivea* Thbg.), schneeweifses, ♄. t. Cap d. g. H.
obscurus Fisch., dunkles, 4. f. Sibirien.
odoratus Hornem. et Rich. (= *otiphyllus* Cunningh. = *Cacalia odorata* Dsf.), wohlriechendes, 4. k. Neuholl.
oliganthos DC. (= *Cacalia tomentosa* Thbg.), wenigblumiges, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
panduratus Less. (= *Cineraria incisa* W. = *C. pandurata* Thbg. = *Doria incisa* Thbg.), geigenförmiges, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
Petasites DC. (= *Cineraria Petasites* Sims, = *C. platanifolia* Schrk., p. 196).
praecox DC. (= *Cineraria praecox* Cav.), frühes, ♄. k. t. Mexico.
rapistroides DC. (= *Jacobaea squalida* C. A. Mey.), Rapsdotterähnliches, ☉. f. Caucasus.
reclinatus L. fil. suppl. (= *S. Chrysocoma* Meerb. = *gruminifolius* Jacq. = *Carderina* Cass. = *Chrysocoma sphacelata* Mch. = *Jacobaea reclinata* Thbg.).
solidagineus Spgl. (= *populifolius* L., non DC. = *solidaginoides* Berg.).
spicatus Sweet, ährliges, 4. f. ?
Stauntonii DC., Staunton's, 4. k. China.
Tournefortii Lapeyr. (= *nemorensis α* Gouan, = *paludosus β* Lam. = *persicaefolius* Ram.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen. [1])
umbrosus W. K. ist 4. nicht ☉.
viscosus L. (= *Obaejaca viscosa* Cass.), *β)* viscoso-sylvaticus var. intermedius Lasch, (= *viscidulus* A. Scheele), *γ)* radiatus Hort. Berol.
Vulneraria DC. (= *oliganthos* Spgl., non DC. = *pauciflorus* H. B. K., non Pursh, = *Cineraria Vulneraria* Alam.), Wollblumenähnliches, 4. k. Mexico.

III. Cremocephalum Cass. (= *Crassocephalum* Mch.).

Decaisnei DC. (= *C. flavum* Decaisn., Hochst. Steud.), Decaisne's, ☉. f. Arabien.

Sect. IV. Erechtites Rafin. p. 746, vgl. auch p. 227, II.

Sect. V. Gynura Cass. p. 746, vergl. p. 278, II.

Sect. VI. Pericallis D. Don, S. Tussilaginis Lindl. (= *Cineraria Tussilaginis* L'Her.), s. p. 607.

1) Pag. 743 fälschlich unter Sect. I. gestellt, daher hier berichtiget.

Digitized by Google

Senecio

Da die, gröfstentheils auf den Canarischen Inseln einheimischen, seit einiger Zeit auch in vielen Varietäten gezogenen, ehemals zur Gattung Cineraria gezählten und unter diesen Gattungsnamen jetzt noch allgemein in den Gärten auf- und angenommenen (daher in diesem Buche p. 195 u. 144, II. auch als Cinerarien verzeichneten) Arten von DeCandolle zur Gattung Senecio gestellt worden, so werden selbige zur Berichtigung der Synonymie hier nochmals aufgeführt als:

Sect. VII. Cinerariae hortenses (canarienses).

cruentus DC. (= *Cineraria aurita* Andr. = *C. cruenta* Mass. = *Tussilago rubra* Riedl. hrb.), ?*β*) C. hybrida W. Enum. (= *C. lactea* Jacq., non W.).

Heritieri DC. (= *Cineraria lanata* L'Her.), var. cyanophthalmos.

maderensis DC. (= *Cineraria aurita* L'Her.).

malvaefolius DC. (= ? *Cineraria bracteata* C. Sm. = *C. malvaefolia* L'Her.).

multiflorus DC. (= ? *Cineraria elatior* Bouché, = *C. multiflora* L'Her.).

populifolius DC. (= *Cacalia appendiculata* L. fil. = *Cineraria appendiculata* Poir. = *C. populifolia* L'Her.), *β*) lacteus Lindl., (= *leucantha* Vent. = *C. alba* Hortul. = *C. lactea* W., non Jacq.).

Sweetii * (= *Cineraria pulchella* Sweet, non Mey., p. 144, II.).

tussilaginoides * (Cineraria Webb), huflattichähnliches, 4. ♄. k. Teneriffa.

β) Waterhousiana Paxt.

Den p. 144, II. verzeichneten Varietäten oder Hybriden können auch noch folgende beigefügt werden: atropurpurea, Beauty of Cyston (Ivery), Beauty of Weinham, Captivation, compacta, Criterion, Cunninghamii, Emperor of Russia, Hope, Lady constable, nobilis, Nosegay, Osherii, Pet, perfecta, Wetpet etc.

cymbalariaefolius Less., v. Brachyrhynchos cymbalariaefolius, p. 871, *glabra* Clairv., *hirsutus* Clairv., *tomentosus* Clairv., v. Adenostyles glabra, Petasites, leucophylla, p. 9, II., *pinifolius* P. (= *Commersonii* Spgl.), v. Hubertia pinifolia, p. 306, II., *rigens* L., v. Othonna parviflora, p. 574, *sonchifolius* Mch. (= *amboinensis* Hort.), v. Emilia sonchifolia, p. 220, II.

Hinsichtl. der übrigen s. Ligularia, p. 462 et p. 357, II.

Senkenbergia ruderalis Flor. Wetter., v. Lepidium ruderale, p. 454.

Senna Mill., Roxb., *Absus* Roxb., *alata* Roxb., *alexandrina* Mill. (= *officinalis* G.), *arborescens* Roxb., *auriculata* Roxb., *bicapsularis* Roxb., *esculenta* Roxb. (= *purpurea* Roxb. = *Sophora* Roxb.), *italica* Mill., *obtusa* Roxb., *occidentalis* Roxb., *prostrata* Roxb., *sensitiva* Roxb., *speciosa* Roxb., *sumatrana* Roxb., *Tora* Roxb., v. Cassia Absus, alata, lanceolata, glauca, auriculata, bicapsularis, Sophora, Senna, obtusata, occidentalis, pumila, angustissima, suffruticosa, florida, Tora, p. 168—170 et p. 123—125, II.

Septas Umbella Haw., v. Petrogeton Umbella, p. 502 II.

Digitized by Google

Serapias L., Stendelwurz.

cordigera L. (= *glabra* Lapeyr. = *Lingua* Merl. (β Lam.) = *ovalis* Rich. = *Helleborine cordigera* P.).

Lingua L. (= *hirsuta* Lapeyr. = *Helleb. Lingua* P.).

longipetala Pollini, (= *lancifera* St. Amans, = *pseudocordigera* Moris, = *Helleborine longipetala* Tenor. = *H. pseudocordigera* Sebast.).

oxyglottis W. (= *cordigera* var. *longipetala* Lindl. = *Lingua* L. var. Spgl. = *Helleborine oxyglottis* P.), spitzzungige, 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

β) Helleborine leucoglottis P.

parviflora Parlatore, kleinblumige, 4. Kn. k. f. b. Sicilien.

triloba Visian., dreilappige, 4. Kn. f. b. Oberitalien, Dalmatien.

abortiva Scopol, v. Limodorum abortivum, p. 464, *atrorubens* Hoffm., *latifolia* Sm., *longifolia* L., non Scopol. (= *palustris* Scop.), *microphylla* Ehrh., *viridiflora* Hoffm. (= *sylvestris* Murray), v. Epipactis atrorubens etc., *autumnalis* Poir., v. Pterostylis cucullata, p. 665, *cordata* Sw., *ovata* All., Sw., v. Listera cordata, ovata, p. 469, *ensifolia* Roth, (= *grandiflora* Flor. dan. = *Helleborine* β L. = *longifolia* Scopol. = *nivea* Vill. = *Xyphophyllum* L. fil.), *Damasonium* Mill. (= *grandiflora* L. = *lancifolia* Ehrh. = *Lonchophyllum* L. fil. = *pallida* Whlbg.), *rubra* L., v. Cephalanthera ensifolia, pallens et rubra, p. 180, *Epipogium* L., v. Epipogium Gmelini, *falcata* Thbg., v. Pelexia falcata, p. 604, *Loeselii* Hoffm., v. Sturmia Loeselii, p. 791, *patens* Thbg., v. Penthea patens, p. 497, II., *porrifolia* W., v. Microtis porrifolia, p. 408, II, *regularis* Forst., v. Thelymithra longifolia, p. 806, *spiralis* Scop., v. Spiranthes autumnalis, p. 779.

Sergilus scoparius G., v. Baccharis scoparia, p. 109.

Serjania Plum. (= *Seriania* Auct.), Serjanie.

australis Spgl. (= *Dodonaea pinnata* Sm.), australasische, ♄. Sch. t. k. Neuholland.

Plumieriana Spgl. (= *Paullinia Seriana* L.), Plumier's, ♄. Sch. w. Westindien.

spectabilis Schum., ansehnliche, ♄. Sch. m. Südamerika.

Seridia Cass., *glomerata* Cass., *megacephala* Cass., *microcephala* Cass, *sonchifolia* Cass., *sphaerocephala* Cass., v. Centaurea glomerata, Seridis, aspera, sonchifolia, sphaerocephala, p. 176—179.

Serinia caespitosa Rafin., v. Krigia dichotoma, p. 337, II.

Seriocarpus N. E., conyzoides N. E., solidagineus N. E. etc. v. Aster Sect. XIV. p. 100.

Seriola L., Nesselsalat.

albicans Tineo, (= *alliata* Bivon. = *laevigata* L. var. γ DC. = *Rodigia alliata* G. Don, = *Hypochaeris albicans* Ucria).

glauca Tineo, (= *laevigata* β DC. = *Hypochaeris glauca* Presl).

laevigata L. (= *Agenora laevigata* Don, = *Piptopogon decipiens* Cass. = *Rodigia laevigata* Spgl.).

aethnensis L. (= *hispida* Mch. = *scabra* Hort. = *urens* All.), *cretensis* L. (= *rubescens* Tineo, = ? *urens* L.), v. Metabasis aethnensis et cretensis, p. 402, II., *apargioides* Hook., Arn., non Rchb.,

Digitized by Google

Seriola

cretensis Dsf., non L., v. Achyrophorus apargioides et oxydontus, p. 7, II., *commutata* Less., v. Rodigia commutata, p. 692, *urens* Lam., non L., v. Nemauchenes aspera, p. 432, II.

Seriphium L., Heidebeifuſs, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

cinereum L. (= *squarrosum* Forst. = *Stoebe alopecuroides* Sbr., non Less. = *St. cinerea* Thbg.), aschfarbiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

plumosum L. (= *Stoebe plumosa* Thbg.), federiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

β) cinereum Less. (= *virgatum* Steud. = *Artemisia vermiculata* Lam., non L. = *Stoebe fasciculata* Cass. = *St. virgata* Thbg.).

vermiculatum DC. (= *ambiguum* L. = *cinereum* Berg., non L. = ? *Artemisia ambigua* Thbg., non L. = *A. vermiculata* L. mant. = *Stoebe artemisioides* E. Mey.), wurmförmiger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

aethiopicum P. (= *juniperifolium* Lam.), v. Stoebe aethiopica, *ericoides* P., v. Disparago ericoides Nachlese, *reflexum* P., v. Trichogyne reflexa.

Serpicula L., repens L. (= *capensis* Räusch. = *serpyllifolia* Burm. = *Laurenbergia capensis* Gmel. syst. = *L. repens* Berg.).

Serratula Dill., L., Scharte.

glauca Ledeb. (= *Laxmanni* Fisch. = *marginata* Tauch, = *Carduus altaicus* Patr. = C. *uniflorus* Turcz. = ? *Centaurea Cardunculus* Pall.).

leucantha DC. (= *Carduus leucanthus* Cavan.), weiſsblumige, ⊙. f. Spanien.

pinnatifida Poir. (= *Carduus pinnatifidus* Cav. = *Cirsium pinnatifidum* Spgl. = *Cnicus pinnatifidus* W. = *Klasea pinnatifida* Webb), fiederspaltige, ⊙. f. Spanien.

radiata MB. (= *Gmelini* Tausch, = *heterophylla* Vill., non Dsf. = *pinnatifida* Dsf. = *Carduus radiatus* W. K.).

Unbestimmtere: dubia Scop., gracilis Hill., macrophylla Wender., sonchifolia Bess., Podol., varia Hill. Nordam.

albescens Wall., v. Haplotaxis albescens, p. 284, II., *alata* Dsf. etc., v. Jurinea alata etc., p. 433 et p. 331, II., *amara* Pall., non L. (= *Picris* MB.), v. Acroptilon Picris, p. 8, II., *anthelmintica* Roxb. etc., v. Vernonia anthelmintica etc., p. 841, *babylonica* L., *Behen* Lam. (= *cordata* Cass.), v. Centaurea babylonica et cerinthefolia, p. 176—177, *caspica* Pall., v. Karelinia caspica, p. 333, II., *Chamaepeuce* L. etc., v. Chamaepeuce mutica etc., p. 187, *conica* Lam. (= *dubia* Brot.) etc., v. Staehelina dubia etc., p. 781, *conifera* DC. Brot., v. Leuzea conifera, p. 460, *gnaphalodes* Poir., v. Helipterum gnaphaloides, *Rhaponticum* DC., *acaulis* DC., *cynaroides* DC. (= *cynarifolia* Poir.), *inermis* Poir. et *uniflora* Spgl., v. Rhaponticum scariosum, acaule etc., p. 683 et p. 589, II., *pilosa* Ait., *scariosa* L., *speciosa* Ait., *spicata* L., v. Liatris pilosa, scariosa, elegans et spicata, p. 461 et p. 356, II.

Hinsichtlich der übrigen s. Cirsium.

Serronia Jaborandi Gaudich., Guillem., v. Ottonia Anisum, p. 464, II.

Digitized by Google

Serruria RBr., Serrurie.
acrocarpa RBr., spitzfrüchtige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
Bergii RBr., (= *Leucadendron sphaerocephalum* Berg.), Bergius's, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
emarginata Sweet, (= *arenaria* Knight, non RBr. = *Protea abrotanifolia minor* Andr.).
eriocephala RBr. (= *Protea eriocephala* Lichtenst.), wollköpfige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
hirsuta RBr. (= *Protea erecta* Thbg.? = *P. phylicoides* Thbg. = *P. sphaerocephala* Houtt.), rauhhaarige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
Nivenii RBr. (= *Protea decumbens* Andr., non Thbg.).
odorata Sweet, (= *Pr. abrotanifolia odorata* Andr.).
pilosa R. et S. (= *Protea pinnata* Andr., non Cav.), behaarte, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
simplicifolia RBr. (= *Protea plumigera* Thbg.?), einfachblätterige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.
sphaerocephala RBr. (= *Protea sphaerocephala* Houtt., non L. et alior.), kugelköpfige, ♄. t. Cap d. g. Hfln.
triplicatoternata R. et. S. (= ? *congesta* RBr. = *Protea triternata* Andr., non Thbg.), dreifachdreizählige, ♄. t. Cap d. g. Hoffn.

Sesamum L., Sesam.
laciniatum W., Klein, schlitzblätteriger, ⊙. w. m. Ostindien.
?β) trifoliatum Mill.
occidentale Heer Hort. Turic., westlicher, ⊙. w. w. Guiana.
orientale L. (= *edule* Hort. = *oleiferum* Mch.).
radiatum Schum. (= *gracile* Endl. = *Sesamopteris radiata* DC. prodr.), strahliger, ⊙. w. m. Guinea.

Sesbania P. (= *Sesbana* RBr., Ait., Spgl.), Sesbanie.
aculeata P. (= *bispinosa* Spgl. = *Candira* Hamilt. = *Aeschynomene bispinosa* Jacq. = *A. cannabina* Roxb. = *A. Sesban* Jacq. Collect. = *A. spinulosa* Roxb. = *Coronilla aculeata* W. = *Emerus aculeat.* Schum.).
aegyptiaca P. (= *Aeschynomene indica* Burm. = *A. Sesban* L. = *Coronilla Sesban* W.).
affinis Schrad. (= *cannabina* Hort., non P. = *Aeschynomene cannabina* Hort.).
fusca Desv. (= *Aeschynomene fusca* Dsf. Hort. Par.), braune, ⊙. w. ?
macrocarpa Mühlbg. (= *picta* P. var. Spgl.), grofsfrüchtige, ⊙. w. m. f. Louisiana.
procumbens Wight, Arn. (= *Aeschynomene diffusa* Roxb. mus. ind. = *A. procumbens* Roxb. fl. ind.), niederliegende, ⊙. w. Ostindien.
sericea Lk. (= *Coronilla sericea* W. Enum.).
uliginosa Roxb., Sumpfliebende, ⊙. w. Ostindien.
Nicht hinlängl. bekannt: geminiflora Schrad.
platycarpa P. (= *vesicaria* Spgl. = *disperma* Pursh), v. Glottidium floridanum.

Seseli Boerh., L., Sesel.
campestre Bess. (= *arenarium* MB. = *tortuosum* Trevir. non L.).
defoliatum Ledeb., entblätterter, 4. f. Altaisch. Sibirien.
divaricatum Pursh, (= *lucidum* Fras. = *Adorium crassifolium* Rafin. = *Marathrum* Rafin. = *Musineon* Rafin.), ausgespreitzter, 4. f. Nordamerika.
globiferum Visiani, kugelförmiger, 4. ♄. f. b. k. Dalmatien.
graveolens Ledeb., starkriechender, 4. f. Sibirien.
gummiferum Sm. (= *Bubon eriocephalus* Spgl. =

Digitized by Google

Seseli

B. rigidus Spgl.), gummigebender, ♂. f. Taurien, Griechenland, Sibirien.

β) crithmifolium DC. (= *Athamanta crithmifolia* Juss. Herb.).

Hippomarathrum L., *β*) viride Endl. Hort. Vindob.

junceum Sibth., Sm. (= *glaucum* L. var. Spgl.), simsenförmiger, 4. f. Griechenland.

Lessingianum Turcz., Lessing's, 4. f. Sibirien.

montanum L., DC., *α*) laxiusculum DC. (= *montanum* L.), *β*) glaucum L., DC. (= *elatum* Güldenst. = *osseum* Crantz), *γ*) multicaule Retz, Jacq., *δ*) peucedanifolium Merat, (= *elatum* Thuill.).

Pallasii Bess. (= *crassifolium* Schrad. = ? *Peucedanum Matthioli* Spgl.).

polyphyllum Tenore, vielblätteriger, 4. f. Neapel.

puberulum DC, feinhaariger, 4. f. Türkei.

β) pallidum DC.

rigidum W. K. (= *Bubon rigidus γ* Spgl.), starrer, 4. f. Banat.

tenuifolium Ledeb., dünnblätteriger, 4. f. Alt. Sibirien.

tomentosum Visiani, filziger, 4. f. b. Dalmatien.

tortuosum L. (= *annuum* Pall., non L. = *patens* Güldenst.).

varium Trevir. (= *glaucum* MB., non L. = *tauricum* Lk.), *β*) chaerophylloides Hort.

Unbestimmtere: hispidum Hort., purpurascens Brotero, quinquefolium Hort.

alpinum MB., v. Lomatocarpum alpinum, p. 883, *aristatum* Ait. (= *ferulaefolium* Poir.), v. Ligusticum pyrenaicum, p. 462, *buchtormense* K., *Libanotis* K. et ? *athamantoides* Ledeb., v. Libanotis buchtormensis, vulgaris et sibirica, p. 461 et 356, II., *Carum* Scop. (= *Carvi* Roth), ? *pimpinelloides* L., non Spgl., v. Carum Carvi et rigidum, p. 167 et p. 122, II., *cervariaefolium* DC. et macedonicum *, v. Athamantha cervariaefolia et macedonica, p. 53, II., *Falcaria* Crantz, v. Falcaria Rivini, *foeniculifolium* Poir., v. Ptychotis coptica *β*, p. 572, II., *glabratum* W. herb., v. Rumia seselioides, p. 620, II., *nodiflorum* Scop., v. Helosciadium nodiflorum, *pimpinelloides* Spgl., v. Peucedanum Chabraei *β*, p. 504, II., *pratense* Crtz. (= *selinoides* Jacq.), v. Silaus pratensis, p. 755, *Saxifragum* Scholl. (= *dubium* Schkr. = *selinoides* Bess. = *venosum* Hoffm.), v. Cnidium venosum, p. 208, *pumilum* L., *dioicum* Vill. (= *glaucum* Lam. = *pumilum* All.), v. Trinia Kitaibelii et vulgaris, p. 822. — *Meyeri* D. Dietr., v. Soranthus Meyeri, *Turbith* L., non Tenore, v. Turbith Matthioli, *Turbith* Tenore, v. Ptychotis verticillata, p. 666 et p. 572, II.

Die übrig. zu Ptychotis gehörig. Synonyme vgl. p. 750.

Sesleria Arduin., Seslerie.

cylindrica DC. (= *argentea* Savi, = *coerulea β Pollini*, = *pallescens* Hartm.).

elongata Host, (= *nitida* Tenore, = ? *alba* Mart. = *Aira alba* Wulf. = *Phleum autumnale* Scopol.).

interrupta Visian., unterbrochenährige, 4. f. Dalmatien.

sphaerocephala Arduin. (= *Cynosurus sphaerocephalus* Wulf.), *β*) leucocephala DC.

Digitized by Google

Sesuvium L., Sesuvium.

revolutifolium Ortega, (= *Portulacastrum* β Sims, = *revolutum* P.).

sessile P. (= *parviflorum* DC. = *Portulacastrum* β P., DC. = *Trianthema americana* Gill.).

Setaria P. B., Borstenfennich, p. 750 oder als: **Pennisetum** Sect. III. p. 494, II. anzunehmen. Denen daselbst verzeichneten Arten sind noch beizufügen:

auricoma Lk. (= ?*Panicum auricomum* N. E.), goldschopfiger, ⊙. f. Brasilien.

canescens Kunth, (= *Panicum canescens* Roth), graulicher, ⊙. m. f. Ostindien.

chrysantha * (= *aurea* Hochst. = *Panicum chrysanthum* Steud.), goldblumiger, ⊙. f. Abyssinien.

Seubertia laxa Kunth, v. Triteleia laxa, p. 824.

Severinia Tenore, Severinie, XVIII. II., Hesperideae-Aurantiaceae.

buxifolia Tenore, (= *Citrus buxifolia* Hort., non Poir.), buchsbaumblätterige, ♄. k. ..... ?

Seymouria asarifolia Sweet, *Heritieri* Sweet, v. Pelargonium Sect. XV. asarifolium et dipetalum, p. 601—602 et 486, II.

Sherardia erecta Sibth., Sm. (= *muralis* Pall.), v. Galium verticillatum, p. 254, II., *foetida* Lam. (= *foetidissima* Cyrill.), v. Putoria calabrica, p. 574, II.

Shortia Grah. (Dr. Short, Prof. d. Medicin u. Botanik zu Lexington in Nordamerika), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

californica Grah., californische, ⊙. f. Californien.

Shortia californica Hort., v. Hymenoxis californica β, p. 310, II.

Shutteria Choisy, Shutterie, V. I., Convolvulaceae.

bicolor Choisy, (= *Calystegia Keriana* Sweet, = *Convolvulus bicolor* Vahl, = *C. bracteatus* Vahl, = *C. involucratus* Ker, = *C. sublobatus* L. = *C. Weinmannianus* Choisy, = *Ipomoea bicolor* Sweet, = *I. bracteata* R. et S. = *I. panduraeformis* Drege, = *I. timoriensis* Bl. = *Hewittia bicolor* Wight, Arn., Steud.), zweifarbige, ⊙. Sch. m. f. Ostindien, Südafrika.

Shuttleworthia Meissn. (= *Uwarowia* Bunge), (R. J. Shuttleworth, lebt in Bern, einer d. thätigsten Botaniker u. Förderer d. Wissenschaft, Besitzer eines d. gröfsten Herbar.), XIV. II., Verbenaceae.

pulchella Meissn. (= *Verbena pulchella* Sweet, p. 840, = ?*tenera* Spgl.), schöne, ⊙. ♂. f. k. Buenos Ayres. b) fl. albo.

sulphurea Meissn. (= *Verbena sulphurea* D. Don, p. 840). Berterii Meissn. und Diceras Meissn., scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Sibbaldia L., Sibbaldie.

adpressa Bunge, Ledeb., angedrückte, 4. ♄. f. Alt. Sibirien.

procumbens L. (= *Potentilla procumbens* Clairv.).

?β) octopetala Mill.

altaica L., *erecta* L. (hierzu auch β *polygyna* W.), *grandiflora* Pall., v. Chamaerhodos altaica, erecta, grandiflora, p. 136, II.

Sibthorpia europaea L. (= *prostrata* Salisb.).

evolvulacea L. fil., v. Dichondra repens.

Digitized by Google

Sickingia W. (Franz v. Sickingen, einer der edelsten u. heldenmüthigsten deutschen Ritter, auch Beschützer d. Gelehrten, † 1523), ?XIV. 11. (V. 1.), Personatae-Bignoniaceae (Rubiaceae Alior.).

Erythroxylon W., rothholzige, ħ. w. Neugranada. [1])
orinocensis Spgl., v. Platycarpum orinocense, p. 633.
Sickmannia radiata N. E., v. Ficinia radiata.

Sicyos L., Haargurke.

angulatus L. (= *acuta* Rafin. = *Sicyoides angulata* Mch.).
Badaroa Hook., Arn. (= *bryoniaefolia* Moris, = *Badaroa bryoniaefolia* Bertero), gichtrübenblätterige, ?⊙. Sch. f. Chili.
triquetrus Moç., Sess., dreikantige, ⊙. Sch. f. Mexico.
Garcini L., v. Bryonia Garcini, p. 135, *lobata* Mch., v. Momordica echinata, p. 414, II.

Sida L., Kunth, Sammetpappel.

acuta Burm., Cav. (= *lanceolata* Retz, = *scoparia* Lour. = *Stauntoniana* DC.).
amoena Dsf. (non Weinm.), liebliche, ħ. w. Brasilien.
arborescens Schrk., baumartige, ħ. w. Brasilien.
arguta Sw. (= *glabra* Mill.).
atropurpurea Blume, schwarzpurpurrothe, ħ. w. Java.
betulaefolia Schrk., birkenblätterige, ħ. w. Brasilien.
bicolor Cav. (= *obliqua* Moç., Sess.), zweifarbige, 4. ħ. t. Neuspanien.
carnea Moç., Sess., fleischfarbige, ħ. t. Mexico.
cordifolia L. (= *herbacea* Cav. = *rotundifolia* Cav. = *Malvinda cordifolia* Medic.).
costata Schltdl. (= ?*collina* Schltdl. var.?), gerippte, ħ. t. k. Mexico.
densiflora Hook., Arn., dichtblumige, ħ. w. Südamerika.
denticulata Fresen., gezähnelte, 4. w. Arabien.
denudata N. E., Mart., nackte, ħ. w. Brasilien.
elegans Colla, zierliche, ħ. ħ. w. Südam. (St. Martha).
emarginata W. (= *truncata* L'Her.), ausgerandete, ⊙. ħ. w. St. Domingo.
erubescens Schrk. (= *Corchorus americanus* Hortul.), rothwerdende, ħ. ħ. w. Südamerika.
fragrans L'Her., wohlriechende, ħ. w. St. Domingo.
frutescens Cavan., strauchartige, ħ. w. Mauritius.
fruticosa Mill., strauchige, ħ. w. Jamaika.
fulva St. Hil. (non Hffg.), rothgelbe, ?ħ. w. Brasilien.
geranioides DC., storchschnabelähnliche, ħ. t. Neuholl.
graveolens Roxb. (= *hirta* Rchb., non Lam.).
Grevilliana Gill., Greville's, ħ. t. Chili.
heterosperma Viviani, verschiedensamige, ħ. t. k. Afrika.
hirsutissima Mill., rauhhaarigste, ħ. w. Südamerika.
hispida Pursh, (= *betulina* Hornem.), steifhaarige, 4. k. Nordamerika (Georgia), Mexico.
interrupta Balb., unterbrochene, ħ. w. Südam. (St. Martha).
lignosa Cav., holzige, ħ. w. Domingo.
linifolia Cav. (= *viminea* Fisch., Lk. = *Malva hirsuta* Aubl.).
maderensis Lowe, madeiraische, ħ. k. Madeira.
microsperma Cav., kleinsamige, ħ. w. ?
Milleri DC. (= *angustifolia* Mill., non Juss.), Miller's, ⊙. ħ. w. Ostindien.

---

1) Ob die ächte Pflanze dieses Namens kultivirt wird, scheint noch zweifelhaft.

Digitized by Google

Sida

morifolia Cavan. (= *humilis* β W., DC. = *Lamarckia morifolia* Medic.), maulbeerbaumblätterige, ☉. w. m. f. Ostindien.

nutans L'Her. (= *calyptrata* Cav. = *Gaya nutans* Sweet), nickende, ♄. w. Peru.

occidentalis L. (= *Abutilon deflexum* Mch. = *A. occidentale* Medic. = *Gaya occidentalis* Sweet).

philippica DC. (= *chinensis* Retz, = ?*retusa* Cav., non L.), philippinische, ♄. ♄. w. Philippinen.

picta Gill., bemalte, ♄. k, t. Uraguay, Buenos Ayres.

pimpinellifolia Mill., Bibernellblätterige, ♄. ♄. w. Ostindien.

pinnata Cav., gefiederte, 4. w. Südamerika.

polystachya Arrabida, vielährige, ♄. w. Brasilien.

quaternata Schrk., vierzählige, ☉. w. Brasilien.

reclinans Kunze, (= *urens* Hort. Ultraj.), zurückneigende, ☉. m. f. ?

reticulata Schrank, netzförmige, ♄. ♄. w. Brasilien.

retrofracta DC., zurückgeknickte, ♄. ♄. w. Martinique.

rhombifolia L. (= *Napaea rhombifolia* Medic., Mch.). β) canescens Cavan., γ) submutica C. A. Mey.

Sellowiana Kl., Sellow's, ♄. ♄. w. Brasilien.

Sessei Lagasca, Sesse's, ♄. ♄. t. w. Neuspanien.

spinosa L. (= *Malachodendron corchoroides* Räusch. = *Malvinda spinosa* Medic., Mch. = *Stewartia corchoroides* Forsk.). In den meisten Tropenländern heimisch.

terminalis Cav., endständige, ♄. w. Brasilien.

ternata L. fil., Thbg. (= *triloba* Cav.), dreizählige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

ulmifolia Cav., ulmenblätterige, ♄. w. Domingo.

venusta Schltdl., liebliche, ♄. t. k. Mexico.

verruculata DC. (= *arguta* Fisch.).

vestita Steud. (= *velutina* Schrk., non W.), bekleidete, ♄. ♄. w. Brasilien.

vitellina Hffg. (= *fulva* Hffg., non St. Hil.), dottergelbe, ♄. w. Java.

Weinmanni * (= *amoena* Weinm., non Dsf.), Weinmann's, ♄. ♄. t. China.

Unbestimmtere: abutilifolia Mill. Südamerika, ambigua Tenore, corchorifolia Tenore, cuneifolia Tenore, elata Hort., hirsuta Mill., pulcherrima L'Her., Roem. Hort. Turic., sericea Mill. Westindien.

betulaefolia Hort. (= *carpinifolia* Hort. = *carpinoides* DC. = *coromandelina* Hort. = ?*tricuspis* Dsf.), v. Malva tricuspidata, p. 492 et p. 384, II., *foetida* Cav. = Bastardia foetida, p. 61, II., *digitata* Spgl., *malvaeflora* Moç., Sess., DC, v. Nuttallia digitata, malvaeflora, p. 551, *Periptera* Sims, (= *Malvaviscus* Sess. = *rubra* Tenore, = *Anoda punicea* Lagasca), v. Peripterá punicea, p. 607.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen Anoda, p. 61 et p. 37, II., Cristaria, p. 130 et p. 170, II., Lopimia, p. 477 u. Abutilon, p. 1 nebst Nachlese.

Sideranthus Fras., *integrifolius* Fras. (= *villosus* Sweet), v. Chrysopsis villosa, p. 195 et p. 148, II.

Sideritis T., Magnetkraut (Gliedkraut).

angustifolia Lagasca, (= *incana* Cav., non L. = ?*linearifolia* Lagasca).

dura Benth., hartes, 4. ♄. f. ?

Digitized by Google

Sideritis

hirsuta L. (= *hispanica* Mill. = *rotundifolia* W. herb. = *tomentosa* Mill.).

incana L. (= *virgata* Dsf.).

lanata L. (= *elegans* Murr. = *nigricans* P. Lam. = *Marrubiastrum elegans* Mch.).

libanotica LaBill. (= *pullulans* Vent. Hort. Cels.), Libanon's-G., 4. ♄. k. Syrien.

macrostachya Poir. (= *discolor* W. herb. = *canariensis* L. var. Spgl.), grofsähriges, ♄. k. Canarische Inseln.

Massoniana Benth., Masson's, ♄. k. Madeira.

oleaefolia Mill., oelbaumblätteriges, ♄. k. Creta.

pungens Benth., stechendes, 4. ♄. k. f. b. Spanien.

purpurea Talbot, Benth., purpurfarbiges, ⊙. f. Corfu, Zante.

remota D'Urvill. (= *lanata* Hochst. et Steud. = *montana* Sibth., Sm., non L.), entferntes, ⊙. f. Griechenland (Samos).

scordioides L., *α*) grandiflora Benth. (= *subspinosa* Cav.), *β*) communis Benth., *γ*) elongata Benth. (= *hyssopifolia* Auct. = *foetida* Poir. = *hirta* Roth, = *hirtella* Brotero, = *fruticulosa* Pourr.), *δ*) alpina Vill., Knowl. et Weste. (= *crenata* Lam. = *pyrenaica* Poir.), *ε*) glabrata Benth. (= *hyssopifolia* plur. Auct.), *ζ*) angustifolia Benth. (= *hyssopifolia* L.), *η*) incana Gouan, Benth. (= *pyrenaica* Endress).

sericea P., seidenhaariges, 4. ♄. f. b. k. Spanien.

sicula Ucria, (= *brutia* Tenore, = *Empedocles montana* Rafin.), sicilianisches, 4. f. Neapel, Sicilien.

syriaca L. (= *decumbens* Mch. = ?*Naviculariae Heisteri* Fabr.).

taurica MB. (= *incana* Habl. = *syriaca* Pall.), *β*) dimorpha Hort. Petropol.

Tragoriganum Lagasca, (= ?*suffruticosa* Mill.), bockduftendes, 4. ♄. k. f. b. Spanien.

Siderodendron Vahl, triflorum Vahl, (= *ferreum* Lam. = *Sideroxyloides ferreum* Jacq.).

Sideroxylon Dill., L., Eisenholz.

nitidum Blume, glänzendes, ♄. w. Java.

Nicht hinlänglich gekannte: nigricans Dum.Cours, obovatum G. fil. (non Lam.).

S. argenteum Thbg., *inerme* L. (= *atrovirens* Lam., W. Enum. = *cinereum* Lam.), v. Heeria argentea, inermis, p. 287, II., *obovatum* Lam., non G., *foetidissimum* L. (= *oppositifolium* Mill.), *lanuginosum* Mchx. (= *tenax* Walt., non ? L.), *lycioides* L. (= *laeve* Lam., Walt.), ?*nigrum* G. fil., *reclinatum* Mchx., *strigosum* W., *tenax* L. (= *chrysophylloides* Mchx. = *sericeum* Walt.), v. Bumelia cuneata, foetidissima etc., p. 137—138, *cymosum* L., v. Olinia cymosa, p. 557, *Manglilla* Lam., *melanophleum* L. (= *laurifolium* Lam. etc.), v. Myrsine Manglilla et melanophleos etc., p. 538 et p. 426, II., *salicifolium* G., v. Dipholis salicifolia Nachlese.

Sieboldia * (P. F. v. Siebold, k. holländ. Stabsarzt, berühmt als Reisender, Naturforscher etc. namentl. in Bezug auf Japan), (= *Simethis* Kunth), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

bicolor * (= *Antherieum bicolor* Dsf. = *A. ericetorum* Berger. = *A. Mattiazzi* Vandel. = *A. planifolium* Brot. = *Bulbine planifolia* R. et S. = *Phalangium*

Digitized by Google

Sieboldia
bicolor Red., DC. = *Ph. planifolium* P. = *Simethis bicolor* Kunth), zweifarbige, 4. k. f. b. Sardinien, Pyrenäen, Portugal, Nordafrika.
Sieboldia bicolor Hffg., *florida* Hffg., v. Clematis bicolor, florida, p. 203.

Siegesbeckia L., Siegesbeckie.
flosculosa L'Her. (= *dichotoma* Sckkr. = *Schkuhria dichotoma* Mch. = *Trimeranthes dichotoma* Cass.).
iberica W. (= *orientalis* MB.), iberische, ⊙. f. Caucasus, Taurien.
serrata DC. (= *cordifolia* Poepp., non H. B. K.), sägezähnige, ⊙. f. Chili.
Sieglingia decumbens Bernh., v. Triodia decumbens, p. 822.
Sieversia geoides Spgl., v. Coluria potentilloides, p. 212.

Silaus Bess., Rofskümmel.
Besseri DC. (= *alpestris* Bess. = *Peucedanum alpestre* Spgl., ?L. = *P. Silaus* MB.), Besser's, 4. f. Podolien, Sibirien.
longifolius Ledeb. (= *Angelica Fischeri* Spgl. = *Athamanta denudata* Fisch. = *Coenolophium Fischeri*, p. 876, = *Cnidium Fischeri* Spgl. = *Crithmum campestre* Güldenst. = *C. mediterraneum* MB. = *Ligusticum Fischeri* Lk. = *L. longifolium* W. = *Oreoselinum album* Hoffm. = *Peucedanum album* Hort. = *P. minus* Poir.), langblätteriger, 4. f. Sibirien.
β) divaricatus * (= *Cnidium divaricatum* Ledeb. = *Ligusticum divaricatum* DC.).
pratensis Bess. (= *Cnidium Silaus* Spgl. = *Ligusticum Silaus* Lam., Lk. = *Peucedanum pratense* Lam. = *P. Silaus* L. = *Seseli pratense* Crtz. = *S. selinoides* Jacq. = *Sium Silaus* Roth).
tenuifolius DC. (= *Matthioli* K. = *serotinus* Rchb. = *Ligusticum arenarium* Lk. = *Meum sibiricum* Spgl. = *Peucedanum Matthioli* Spgl. = *P. serotinum* P. = *P. tenuifolium* Dsf.), dünnblätteriger, 4. f. ?Ungarn.

Silene L. (et Cucubalus et Viscago Auct. pro parte), Leimkraut.
aegyptiaca L. (*β retroflexa* P.).
altaica P. (= *suffruticosa* Pall. = *Cucubalus fruticulosus* Pall.), *β*) grandiflora Hort. Petrop.
alpestris Jacq. (= *austriaca* Hort. = *viscida* Spgl. = *Cucubalus saxatilis α* Lam. = *Lychnis alpestris* L. fil.).
ambigua Camb., zweifelhaftes, ⊙. f. ?Westeuropa.
angustifolia MB. (= *petraea* Adam., Hoffm., non W. K.).
apetala W. (= *aspera* Hort.? = *nocturna* L.), kronenloses, ⊙. f. Spanien, Dalmatien.
arenarioides Dsf. (= *angustifolia* Dietr., non MB. = *?linifolia* W.), sandmierenähnliches, ⊙. f. Nordafrika.
articulata Vivian., gegliedertes, ⊙. f. Nordafrika, Portugal.
auriculata Sibth., Sm. (= *lanuginosa* Bertol.), geöhrtes, 4. f. Italien, Griechenland.
Bergeri Schott, Berger's, 4. f. Italien.
bicolor Thore, (= *portensis* Bonam. = *reticulata* Hort.).
Campanula P. (= *Cucubalus alpestris* All.).
canescens Tenore, (= *?decumbens* Bivone, = *sericea* Badarro, = *vespertina* Curt.).
capensis Otth, capisches, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Silene

caspica P. (= *fruticulosa* Dietr. = *suffruticosa* MB.).
catholica Ait., Otth, (= *glutinosa* P. = *Mussini* Hornem. = *Cucubalus catholicus* L. = *C. glutinosus* Retz, = *Viscago fusca* Mch.).
cerastoides L. (= *Clusii* Schott, = *gallica* L. var. K. = *micropetala* DC. = *rigidula* L. = *Lychnis cerastoides* Scopol.).
ciliata Pourr. (= *arvatica* Lagasca, = *Pourretii* Poir. = *stellata* Lapeyr), gewimpertes, 4. f. b. k. Creta, Pyrenäen.
β) geniculata Pourr.
coarctata Lagasca, (= *cerastoides* L. var. K.? = *disticha* W. var.? = *tridentata* Hort.), verengertes, ⊙. f. Spanien.
conifera N. E., zapfenförmiges, ⊙. f. Mesopotamien.
Coulteriana Otth, Coulter's, 4. f. Iberien, Taurien.
crassifolia L., β) angustifolia Bartl. (= *Constantia* Eckl. Zeyh.).
cretacea Fisch., kreideliebendes, 4. f. Sibirien.
cretica L. (= *parviflora* Mch.).
dianthifolia Otth, (= *Cucubalus fruticosus* Pall.), nelkenblätteriges, 4. ♄. f. Sibirien.
Dilleniana Schott, Dillen's, ⊙. f. Frankreich.
dioica Fisch. et Mey. (= ?*cylindriflora* Otth), zweihäusiges, ⊙. f. Aleppo.
disticha W. Enum. (= *hispida* Hort., Dsf. = *micropetala* Roem., Schrk. = *pilosa* Hort. = *triouspidata* Hort.), zweizeiliges, ⊙. f. ?Nordafrika, Italien.
diurniflora Kunze, (= *noctiflora capensis* Thbg.), tagblumiges, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.
Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. Nordamerika.
echinata Otth, igelstacheliges, ⊙. f. ?
effusa Otth, (= *wolgensis* Spgl. = *Cucubalus effusus* Fisch. = *C. wolgensis* W. Enum. = *S. Otites* P. var. Auct.).
Elisabethae Jan, Elisabeth's, 4. f. Oberitalien.
fimbriata Sims, (= *Cucubalus fimbriatus* MB. = *C. multifidus* Adam., Hoffm.).
flavescens W. K. (= *mollis* Hornem.).
foetida Lk. (= *fuscata* var. Brot.), stinkendes, ⊙. f. Portugal.
fruticosa L. (= *nitida* Lagasca), β) suffruticosa Dsf., γ) corsica Hort. Erford.
fuscata Lk., Brot. (= *undulatifolia* Otth, non Moris), bräunliches, ⊙. f. Portugal.
gallica L., β) sylvestris Schott, (= *Cucubalus sylvestris* α Lam.), γ anglica L. (= *arvensis* Salisb. = *diffusa* Hort., non Otth, = *Cucubalus sylvestris* β Lam.), δ) lusitanica L. (= *reflexa* Mch. = *sardoa* Moris), ε) hirsuta Presl.
Gallinyi Heuff., Galliny's, ⊙. f. Banat.
glauca Zea, blaugrünes, ⊙. f. ?
graminifolia Otth, grasblätteriges, 4. f. Altaische Alpen.
Gypsophila Dsf. (= *ramosissima* P. = *sobolifera* Schott, Hortul. = *Cucubalus congestus* W. herb.), gypskrautähnliches, 4. f. Sibirien.
hirsutissima Otth, (= *hirsuta* Lagasca, = *sabulatorum* Lk. = *hispida* Dsf. var. Spach), rauhhaarigstes, ⊙. f. Spanien, Portugal.
hispida Dsf. (= *hirsuta* Poir. = *trinervia* Sebast.).

Digitized by Google

Silene

Hoefftiana Fisch., C. A. Mey., Hoeffi's, 4. f. Caucasus.
holopetala Bunge, Ledeb., ganzkroniges. 4. f. Alt. Sibirien.
jenisea Steph. (= *baicalensis* Turcz. = *jenisseensis* W. Enum. = *viscaginoides* Otth, = *graminifolia* Otth var. Auct.), jeniseisches, 4. f. Alt. Sibirien.
inamoena Lindl., unliebliches, ⊙. f. ?
inflata Sm. (= *S. Cucubalus* Wibel, = *S. oleracea* Fic. = *S. vesicaria* Schrad. = *Behen vulgaris* Mch. = *Cucubalus Behen* L. = *C. inflatus* Salisb. = *C. venosus* Gilib. = *Lychnis Behen* Scop. = *Viscago Behen* Baumg.), *β)* linearis Sweet, (= *Cucubalus angustifolius* Mill., Schrk., Tenore, = *C. angustissimus* Balb., Nocca), *γ)* Persoonii Schott, (= *Cucubalus alpinus* Lam. = *C. Antelopum* Vest, = *C. marginatus* Kit., Schult. = *C. montanus* Vest, = *C. viridis* Lam.), *δ)* glauca Sm. (= *Willdenowii* Swt. = *Cucubalus glaucus* W.), *ε)* crassifolia (Thore), (= *Cucubalus Thorei* Dufour.), *ζ)* C. fabaria (Thore), *η)* C. rotundifolia (All.), *ϑ)* campanulata Saut. (= *Cucubalus latifolius* Mill.).
italica P., DC. (= *clavicarpa* Roch. = *sicula* Presl, = *Cucubalus italicus* Jacq. = *C. silenoides* Vill. = *Viscago clavata* Mch.).
juncea Sibth., Sm., simsenförmiges, ⊙. f. Kleinasien.
laciniata Cav. (= *splendens* Hort. = *Lychnis pulchra* W. herb.), *β)* speciosa Hort.
lanuginosa Bertol. (= *auriculata* Sibth., Sm. var. Rchb.), wolliges, 4. f. Italien.
latifolia Poir., non Hornem. (= *fistulosa* G. Don), breitblätteriges, 4. k. f. b. Barbarei.
ligulata Vivian., zungenförmiges, 4. f. Nordafrika.
Ledebourii * (= *petraea* Ledeb., Schrk., non W. K.), Ledebour's, 4. f. Sibirien.
linicola Gmel. (= *eranthema* et *linaceola* Wib. = *marginata* Schott).
livida W. (= *cuprea* Hort. = *lurida* Hort. = *nutans* L. var. *ζ* Otth, = *rubens* Vest), *β)* pelidna Rchb.
lychnidea C. A. Mey., lichtnelkenähnliches, 4. f. Caucasus.
Mandralisii Parlatore, Mandralisi's, ⊙. f. Sicilien.
Marschalli C. A. M. (= *Cucubalus mollissimus* MB., non L.), Marschall's, 4. f. Caucasus.
Menziesii Hook., Menzies's, 4. f. Nordamerika.
mexicana Moç., Sess., mexicanische's, 4. k. Mexico.
micrantha Lk. (= *cerastoides* L. var. Spgl. = *micropetala* Lagasca, non DC.).
multicaulis Gussone, vielstengeliches, 4. f. Unteritalien.
mutabilis L. (= *micropetala* Auct. = *nocturna β* Otth, = *reflexa* Ait. = *Cucubalus reflexus* L.), veränderliches, ⊙. f. Italien, Spanien.
neglecta Tenore, (= *nocturna β* Tenor. = *obtusifolia* W. var. Spach), übersehenes, ⊙. f. Neapel.
nemoralis W. K. (= *Cucubalus catholicus* Bucher, non L. = *C. floccosus* Ficin.).
noctiflora L. (= *dichotoma* Gilib. = *viscida* Mch. = *Cucubalus noctiflorus* Lam. = *Lychnis noctifl.* Schreb.).
nocturna L. (= *bicolor* Mch. = ? *setacea* Otto, = *spicata* DC. = *Cucubalus spicatus* Lam.).
Notarisii Cesati, (= *Saxifraga* Orsini), Notaris's, 4. f. Oberitalien.

Digitized by Google

Silene

nutans L., β) infracta W. K. (= *amblevana* Lej. = *Hornemanni* Steud. = *latifolia* Hornem., non Poir.).
odoratissima Bunge, Ledeb., wohlriechendstes, 4. f. Altaisches Sibirien.
Otites P. (= *Cucubalus dioicus* Gilib. = *C. Otites* L. = *C. parviflorus* Lam., non Ehrh.), β) Pseudo-Otites Bess. (= *Lychnis Otites* Scop.).
pachyphylla Hort. Berol., dick(stark)blätteriges, ⊙. f. ?
paniculata Otth, rispiges, 4. f. ?
paradoxa L. (= *Cucubalus viscosus* Huds.). Italien, England, Frankreich, p. 758
pensylvanica Mchx. (= *incarnata* Lodd.).
picta P. (= *anastomosans* Lagasca, = *Reinwardtii* Roth, = *reticulata* Hort.), bemaltes, ⊙. f. Frankreich, Spanien, Nordafrika.
pilosa Spgl. (= *mollissima* DC., non P. = *Cucubalus italicus* var. *pilosus* Hort. Wratisl. = *C. mollissimus* W. Kit. = *C. pilosus* W. Kit. = *Viscago mollissima* Baumg.).
praecox Lk., frühes, ⊙. f. ?
pygmaea Lk., zwergiges, ⊙. f. Südeuropa.
quinquevulnera L. (= *gallica* var. K. = *Corone quinquevulnera* Hffg. = *Cucubalus variegatus* Lam. = *Lychnis vulnerata* Scopol.).
regia Sims, (= *virginica* var. *illinoensis* Mchx.).
reticulata Dsf. (= *grata* Donnersm.).
rubella L. (= *inaperta* DC. = *Pseudolinum* Ram. = *segetalis* Dufour.), β) annulata Thore.
saponariaefolia Schott, (= *commutata* Guss. = *Czerei* Baumg. = *Cucubalus saponariaefolius* Bonato), seifenkrautblätteriges, 4. f. Italien, Banat, Siebenbürgen.
scabra Fisch., non Kit. (= *Fischeri* Steud.), scharfes, 4. f. Sibirien.
Scouleri Hook., Scouler's, ⊙. f. Nordamerika.
sericea All., Moris, (= *diffusa* Otth, = *pubescens* Lois. = *velutina* Pourr., Dsf. = *vespertina* Auct.). β) litorea Broter.
sessiliflora Dsf., Poir., stiellosblumiges, ⊙. f. Syrien.
Sibthorpiana Rchb. (= *dichotoma* Sibth., Sm., non Ehrh.), Sibthorp's, ♂. f. Griechenland.
sicula Cyril. (= *divaricata* Clement., non Sibth., Sm.), sicilianisches, ⊙. f. Sicilien.
spathulata MB. (= *pygmaea* Adam., Hoffm., non Lk.).
stellata Ait. (= *Cucubalus stellatus* L. = *Viscago stellata* Rchb.), sternförmiges, 4. f. Virginien, Canada.
stenopetala Ledeb., schmalkroniges, ⊙. f. Sibirien.
stylosa Bunge, Ledeb., langgriffeliges, 4. f. Alt. Sibirien.
suavis Schrad., feinriechendes, ⊙. f. Südeuropa.
tatarica P. (= *viscaginoides* Hornem., non Otth, = *Cucubalus tataricus* L. = *Viscago unilateralis* Mch.), β) secunda Steud. (= *Cucubalus secundus* Gilib.).
taurica Fisch., taurisches, 4. f. Taurien.
tenella C. A. Mey., zierliches, 4. f. Caucasus.
tricuspidata Dsf. (= *congesta* Schott), dreispitziges, ⊙. f. ?
turgida MB. (= *altaica* Otth, = *graminifolia* Bunge, non Otth, = *Cucubalus fruticulosus* Gmel. system. = *C. Saxifragus* Schang.), aufgeschwollenes, 4. ♆. f. Sibirien.
undulatifolia Moris, (= *undulaefolia* Sweet), welligblätteriges, ⊙. f. Sardinien.

Digitized by Google

Silene

velutina Pourr. (= *Salzmanni* Otth, = *suffruticosa* Dsf.), sammthaariges, 4. ♄. k. f. b. Corsica.

vespertina Retz, (= *bipartita* Dsf. = *colorata* Poir. = *decumbens* Bivone, = *distachya* Brotero, = *hispanica* Jacq. = *tubiflora* Dufour. = *Corone vespertina* Hffg.),
β) bellidifolia Jacq., non Thbg.

villosa Cambess. (non Forsk.), zottige, ⊙. f. Spanien, Portugal.

virginica L. (= *Catesbaei* Walt. = *cheiranthoides* Poir. = *coccinea* Mch. = *pensylvanica* Mchx.), virginisches, 4. f. Nordamerika.
β) minor (= *caroliniana* Walt.).

viscosa P. (= *Cucubalus viscosus* L. = *Lychnis viscosa* Scop. = *Viscago glutinosa* Baumg. = *V. viscosa* Mch.).
α) breviflora Hort. Petrop., β) longiflora Hort. Petrop.

Zawadskyi Herbich. (= *lanuginosa* Bertol. var. H. Petr.).

Aufserdem erwähnen die Pflanzenverzeichnisse der Gärten etc. noch folgende, deren Vaterland etc. nicht angegeben ist: cana Otth, 4., carnosa Mch. ⊙., costata Otth, discolor Retz, ♂. (non Sibth, Sm.), distans Otth, 4, filiformis Otth, glaberrima Hort., gypsophiloides Schrank., integrifolia Hort., grandiflora fl. pleno Hort., montana Hort., oblongifolia Otth, ⊙., pyriformis Hort. Berol., quinquenervia Hort. Berol., rugosa P., ?secundiflora Otth, (= *glauca* Pourr., Lagasca, non Zea) ⊙., semibarbata Hort. 4., serpyllifolia Hort., trifida Tenore, verticillata Otth, (= *Cucubalus caespitosus* Dsf., Poir.). 4.

angustifolia Poir., v. Tunica compressa, p. 827, *coronaria* Clairv., v. Lychnis coronaria, p. 482, *porrigens* L., *Saponaria* Fr., v. Saponaria porrigens et officinalis, p. 721, *Pumilio* Wulf., v. Hohenwarthia Pumilio, p. 303, II.

Siler alpinum Baumg. (= *trilobum* Scop.), v. Laserpitium aquilegifolium, p. 343, II., *caucasicum* Spgl., v. Agasyllis caucasica, p. 868, *lancifolium* Mch. (= *montanum* Crtz.), v. Laserpitium Siler, p. 446 et p. 343, II., *salsum* Spgl., v. Peucedanum salsum, p. 884 et p. 504, II.

Siliquaria glandulosa Forsk., v. Cleome arabica, p. 204.

Siliquastrum Adans., Medic., *cordatum* Mch., *orbiculatum* Mch., v. Cercis canadensis et Siliquastrum, p. 182.

Silphium L., Silphie.

Asteriscus L. (= *reticulatum* Mch.), β) dentatum Ell. (= *scabrum* Walt.).

connatum L. (= *scabrum* Mch.).

gummiferum Ell., gummigebende, 4. f. Nordamerika (Westl. Georgien).

integrifolium Mchx., ganzblätterige, 4. f. Nordamerika.

laciniatum L. (= *spicatum* Poir.), β) dissectum Poir.

laevigatum Pursh, glatte, 4. f. Nordamerika (Georgia).

lanceolatum Nutt. (= *reniforme* Rafin.), lanzettliche, 4. f. Nordamerika.

perfoliatum L. (= *tetragonum* Mch.), β) conjunctum W., γ) erythrocaulon Bernh., δ) Hornemanni Schrad. (= *Asteriscus* Hornem. = *connatum* Dsf. Hort. Par.), ε) petiolatum Poir.

pinnatifidum Ell., fiederspaltige, 4. f. Nordam. (Georgia).

Digitized by Google

Silphium

pumilum Mchx. (= *patulum* Banks), β) tomentosum Pursh. Radula Nutt., raspelblätterige, 4. f. Nordam. (Arkansasgeb.).
reticulatum Pursh, netzförmige, 4. f. Nordamerika.
scaberrimum Ell., schärfste, 4. f. Nordamerika.
speciosum Nutt., prächtige, 4. f. Nordam. (Arkansasgeb.).
terebinthinaceum L. (= *elatum* Pursh).
ternatum Retz, (= *ternifolium* Mchx. = *trifoliatum* Dsf. Hort. Par., Hook. bot. mag., non L.), β) atropurpureum Retz.
trichopus Rafin., rauhstielige, 4. f. Nordamerika.
trifoliatum L. (= *ternatum* Dsf. Hort. Par.).
Unbestimmtere: latifolium Hill., Vitm., rigidum Mch., vaginatum Hort.
solidaginoides L., v. Heliopsis laevis, *Tetragonotheca* G., v. Tetragonotheca helianthoides, *trilobatum* L., v. Wedelia carnosa.

Silybum Vaill. Sect. II.

marianum G. (= *maculatum* Mch.), β) pygmaeum Cass. *atriplicifolium* Fisch., v. Rhaponticum atriplicifolium, p. 683, *squarrosum* Tausch, = Alfredia cernua s. Silybum Sect. I. cernuum.

Simaba Aubl. (guianischer Name), (= *Zwingera* Schreb.).

bicolor Zuccar. (= *Zwingera bicolor* Steud.), zweifarbige, ħ. t. Mexico.
guianensis Aubl. (= *Quassia crocea* Vahl, = *Q. guianensis* Dietr. = *Zwingera amara* W. = *Z. guianensis* Räusch.).
orinocensis H. B. K. (= *Quassia orinocensis* Dietr. = = *Zwingera orinocensis* Spgl.).

Simocheilus Benth., Genst, p. 885.

depressus Benth. (= *Blaeria depressa* Lichtenst. = *B. fasciculata* Drege, = *B. glabella* var. *Bartlingiana* Kl. = *Erica embolifera* Salisb. = *E. expromta* Spgl. = *Gypsocallis expromta* G. Don, = *Octogonia glabella* var. Kl.).
multiflorus Kl. (= *Blaeria aggregata* Wendl. herb. = *Bl. multiflora* Kl. = *Bl. sessiliflora* Wendl.), vielblumiger, 4. f. Cap d. g. Hoffm.
Simsia RBr. (non P. DC.) *anethifolia* RBr., v. Stirlingia anethifolia.
Sinapidendron frutescens Lowe, v. Sinapis frutescens, p. 760, *S. salicifolium* Lowe, v. Sinapis angustifolia.

Sinapis T., L., Senf.

angustifolia DC. (= *Brassica frutescens* Soland.), schmalblätteriger, ħ. k. Madeira.
arvensis L. (= *taurica* Fisch. = *torosa* Gilib.), β) retrohirsuta Bess. (= *orientalis* Auct. germ.).
chinensis L. (= *tenella* Mch.).
laevigata L. (= *campestris* Jacq. fil. = *cernua* Poir. = *oleracea* Presl, = *virgata* Presl, = *Erucastrum oleraceum* et *virgatum* Presl).
orientalis L. (= *Sinapistrum arvense* β Spach).
β) hispida Balb.
alpina Mart. Hort. Erl. = ?, *benghalensis* Roxb., v. Nasturtium benghalense, p. 543, *bracteolata* Swt., *mesopotamica* Spgl., *nigra* L., *radicata* Dsf., *Sabularia* Sweet, v. Brassica bracteolata, mesopotamica, nigra, fruticulosa, Sabularia, p. 130—131 et 77, II.

Digitized by Google

Sinapis

erucoides L., *muralis* RBr., *tenuifolia* RBr. etc., v. Diplotaxis erucoides etc., *Eruca* Röhl., Clairv. (= *exotica* Hort.), v. Eruca sativa, *glauca* Hort. = ?, *hispanica* Lagasca, v. Diplotaxis catholica, *incana* L. (= *taurica* MB.), v. Erucastrum incanum, p. 312, *nasturtiifolia* Lam., v. Erucastrum obtusangulum.

Die übrigen Synonyme vergl. p. 761, sowie überhaupt Erucastrum, p. 312, 878 et p. 231, II. — S. cernua Thbg. (non Poir.) Japan, China, ist nach Spgl. var. v. Brassica nigra, daher p. 760 auszuschliessen und zu berichtigen.

Sinapistrum Medic., Mch., *decandrum* Mch., *giganteum* Mch., *lanatum* Mch., *pentaphyllum* Medic., *violaceum* Mch., *vissosum* Mch., v. Cleome dodecandra, gigantea, arabica, pentaphylla etc., p. 204. *Sinapistrum* Spach, *arvense* Spach et var. v. Sinapis Allionii, arvensis, Kaber, orientalis, turgida.

Sinningia N. E., Lindl., guttata Lindl. etc. (Sinning, Inspector am botan. Garten in Bonn), v. Gloxinia, Sect. II. p. 359 et p. 266, II.

calycina Hort., v. Conradia calycina, p. 157, II., *Hartwegii* Hort. angl. et belg., v. Drymonia punctata, p. 212, II.

Sipanea carnea Hort. belg., v. Pentas carnea, p. 497, II.

Siphocampylus Pohl, A. DC., G. Don, barbatus G. Don, betulaefolius Hook., G. Don etc., v. Lobelia, Sect. XI. p. 473 et p. 368, II.

Siphonanthus hastata Hort. belg., *indica* L. (= *angustifolia* W.), v. Clerodendron hastatum et Siphonanthus, p. 205.

Siphonia Rich., Kautschuckbaum.

brasiliensis H. B. K., brasilianischer, ♄. w. Brasilien.

elastica P. (= *Cahuchu* Rich. = *guianensis* Juss. = *Hevea guinaensis* Aubl. = *Jatropha elastica* L. fil.).

Sirium myrtifolium L., v. Santalum myrtifol., p. 720.

Sison L. K., Süfsdolde.

Amomum L. (= *heterophyllum* Mch. = *Cicuta Amomum* Crtz. = *Seseli Amomum* Scopol. = *Sium Amomum* Roth, = *S. aromaticum* Lam.).

Ammi L. spec. (= *capillaceus* Spgl. = *fasciculatus* Pohl, = *Haenkei* Presl), *inundatus* L., v. Helosciadium leptophyllum et inundatum, p. 389 et p. 294, II., *Ammi* L., *Ammi* Ucria, v. Ptychotis heterophylla et verticillata, p. 666 et 572, II., *canadense* L., *Thomasii* Tenore, v. Cryptotaenia canadensis et Thomasii, p. 174, II., *flexuosus* Tenore, (= *carvifolius* Bertol. = *prolifer* Brochi), v. Bunium carvifolium, p. 82, II., *Guesonianus* Balb. (= *Gussonii* Spgl.), v. Petagnia saniculaefolia, p. 502, II., *integerrimus* Spgl. et *aureus* Spgl. et *trifoliat.* Mchx., v. Zizia integerrima, aurea, cordata, *marginatus* Mchx., v. Archemora rigida, p. 42, II., *peregrinus* Spgl., v. Petroselinum peregrinum, p. 503, II., *pusillus* Mchx. (= *divaricatus* Spgl.), v. Leptocaulis divaricatus, p. 351, II., *rotundifolius* Spgl., v. Pimpinella rotundifolia, p. 624, *salsus* L. fil., v. Peucedanum salsum, p. 594, II.

Die übrigen Synonyme vergl. p. 761.

Digitized by Google

Sisymbrella aspera Spach, v. Sisymbrium asperum, p. 761, **sylvestris** Spach, v. Nasturtium sylvestre, p. 513.

Sisymbrium T., L., Rauke.

I. Genuinum.

acutangulum DC. (= *austriacum* Jacq. β K. = *contortum* Cav. = *pyrenaicum* Vill., non L. = *sinapioides* RBr. = *Erysimum pyrenaicum* Vill. = *Sinapis pyrenaica* L.).

austriacum Jacq. (= *affine* W. = *compressum* Mch.), β) taraxacifolium DC. (= *contortum* W. Enum., DC. = *multisiliquosum* Hoffm.), γ) eckartsbergense W., δ) Tillieri Bell. (= *erysimifolium* Pourr.).

binerve C. A. Mey., zweinervige, ♂. f. Caucasus.

brachypetalum C. A. Mey. (= *septulatum* Hortul.), kurzkronige, ⊙. f. Soongaria.

brassicaeforme C. A. Mey., Ledeb., kohlförmige, ♂. f. Altaisches Sibirien.

canescens Nutt. (= *brachycarpum* Richards. = *myriophyllum* W. herb. = *Sophia* Pursh, non L.).

cinereum Dsf., aschfarbige, ⊙. f. Nordafrika.

decipiens Bunge Hort. Dorp., täuschende, ♂. f. Samarkand.

halophilum C. A. Mey., salzliebende, 4. f. Alt. Sibirien.

heteromallum C. A. Mey., verschiedenwendige, ⊙. ♂. f. Altaisches Sibirien.

incanum Bernh. (= *canescens* Hook., non Nutt. = *Richardsoni* Sweet).

junceum MB. (= *strictissimum* Pall., non L. = *Brassica polymorpha* Murray, = *Cheiranthus junceus* W. K. = *C. virgatus* Patr. herb. = *Erysimum junceum* W.).

mollissimum C. A. Mey., weichste, ♂. 4 f. Alt. Sibirien.

nanum DC. (= *Cheiranthus nanus* Pall. = *Matthiola nana* Spgl.), zwergige, ⊙. f. Sibirien.

β) humile C. A. Mey.

perfoliatum C. A. Mey., durchwachsene, ⊙. ♂. f. Caucasus.

pumilum Steph. (= *Schimperi* Gay, non Boiss.). Auch in Arabien heimisch.

ramulosum Nectoux, Delil., ästige, ⊙. f. Aegypten.

strictissimum L. (= *Cheirinia strictissima* Lk.), 4. nicht ⊙. daher p. 762 zu berichtigen.

trinerve C. A. Mey., dreinervige, ?⊙. f. Caucasus.

II. Arabidopsis DC., K.

Cumingianum Fisch. et Mey. (= *chilense* Lk.).

Thalianum Gay et Monnard, (= *Arabis muralis* Salisb. = *A. ramosa* Lam. = *A. scabra* Gilib. = *Conringia Thaliana* Rchb. = *Nasturium Thalianum* Andrzy.).

III. Huegeninia Rchb. v. p. 307, II.

IV. Pachypodium Webb et Berth. (non Lindl. p. 469).

Columnae L. (= *Erysimastrum* β Lam. = *orientale* L. = *villosum* Mch. = *Walteri* Crantz).

erysimoides Dsf. (= *nitidum* Zea, = *rigidulum* Lagasca, = *Zeae* Spgl.).

pannonicum Jacq., Ait. (= *altissimum* Pall. = *Sinapeos* Retz, = *Sinapistrum* Crantz? = *tenuifolium* Geners.).

V. Kibera DC.

corniculatum Cav., hirsutum Lagasca, polyceratium L. (= *Chamaeplium polyceratium* Wallr. = *Erysimum polyceratium* Lk. = *Klukia polyceratia* Andrzy.).

rigidum MB. (= *hispidum* W. hrb. = *cornutum* et *polyceratium* Pall. = *Hesperis rigida* Stev. = *Klukia rigida* Andrzy.).

Digitized by Google

Sisymbrium

runcinatum Lagasca, supinum L. (= *Arabis supina* Lam. = *Braya supina* K. = *Chamaeplium supinum* Wallr. = *Erysimum supinum* Lk. = *Klukia supina* Andrzy.).

villosum Lagasca, (= *hirsutum* DC., non Lagasca), zottige, ⊙. f. Spanien.

VI. Descurainia Webb.

Irio L. (= *erucaefolium* Gilib. = *erysimastrum* α Lam. = *glabrum* W. = *pinnatifidum* Forsk., non DC.).

pinnatifidum DC. (= *bursifolium* Gouan, Vill. = *dentatum* All. = *Arabis dentata* Clairv. = *A. pinnatifida* Lam. = *Braya pinnatifida* K. = *Cardamine runcinata* Poir.).

VII. Velarum DC., Rchb.

officinale Scop. (= *S. officinarum Erysimum* Crtz. = *Chamaeplium officinale* Wallr. = *Erysimum officinale* L. = *E. runcinatum* Gilib. = *Klukia officinalis* Andr.).

Unbestimmtere: brachylobum Otto, (= *asperum* Hort., non L.), patens Mch. (= ? *Brassica patens* Murray). *album* Pall., v. Hutchinsia alba, p. 307, II., *Alliaria* Scopol., v. Alliaria officinalis, p. 29, *arenosum* L., *coeruleum* Gilib., v. Arabis arenosa, coerulea, p. 70, *Barbarea* Crantz etc., v. Barbarea vulgaris etc., p. 112, *clandestinum* Hort., *coronopifolium* Dsf., *palustre* Leyss., Roth (= *terrestre* Wither.), *dubium* P. (= *apetalum* Dsf. = *Sinapis* Burm.), *anceps* Wahlbg. etc., v. Nasturtium clandestinum, coronopifolium, palustre, indicum, anceps etc., p. 543 et p. 430, II., *filifolium* W., v. Leptaleum filifolium, p. 455, *gallicum* W., v. Erucastrum Pollichii, p. 312 et 231, II., *polystachyum* Hort. Berol., v. Halimolobus patula, p. 283, II., *repandum* W., v. Brassica repanda, p. 131, *repandum* Poir. (= *monense* L. = *murale* MB. *saxatile* Lam., P. = *vimineum* MB.) etc., v. Diplotaxis saxatilis etc., *subbipinnatifidum* Hornem., v. Sinapis subbipinnatifida, p. 761.

Die übrigen nöthigen Synonyme s. p. 762.

Sisyrinchium L. (= *Bermudiana* Adans. Medic. G.), Sweinsrüssel.

anceps Lam. (= *angustifolium* Mill. = *Bermudiana* α L. = *gramineum* Curt. = *Bermudiana graminifolia* Medic. = *Marica anceps* Ker).

arenarium Poepp. (= *flexuosum* Lindl. non Spgl.), Sandliebender, 4. k. Chili.

ascendens Poepp. (= ? *graminifolium* β *pumilum* Lindl.), aufsteigender, 4. k. Chili.

Bermudiana L. (= *iridioides* Curt. = *Bermudiana graminea* G. = *B. iridifolia* Medic. = *Marica Bermudiana* Ker, = *Moraea Bermudiana* Thb. = *Syorhynchium Bermudiana* Hffg.).

convolutum Nocca, (= *flavum* Hflg. = *luteum* Fisch. = *triquetrum* Hort. angl. = *Marica convoluta* Ker).

gladiatum Spgl. (= *Ixia gladiata* L. fil. = *Marica gladiata* Ker, = *Moraea gladiata* Thbg. = *Bobartia gladiata* Sweet).

grandiflorum Cav., non Dougl. (= *Moraea grandiflora* P.), grofsblumiger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

iridifolium H. B. K. (= *laxum* Lk. = *pubescens* Cham. = *Marica iridifolia* Ker).

Digitized by Google

Sisyrinchium

latifolium Ait. (= *bulbosum* Mill. = *capitatum* P. = *palmifolium* Cav. = *plicatum* Spgl. = *Gulathea vespertina* Salisb. = *Marica plicata* Ker, = *Moraea palmifolia* Jacq. = *M. plicata* Sw.), breitblätteriger, 4. Kn. w. Caribäen.

lutescens Lodd., gelblicher, 4. k. Chili.

macrocephalum Grah., grofsköpfiger, 4. k. t. Buenos Ayres.

majale Lk., Kl., Otto, Mai-S., 4. k. Valparaiso.

pedunculatum Gill. et Hook. (= ? *flavum* Miers).

striatum Sm. (= *reticulatum* Hort. = *sertiflorum* Salisb. = *spicatum* Cavan. = *Bermudiana striata* Mch. = *Marica striata* Curt. = *Moraea serrata* Jacq.).

aurantiacum Zuccag., *spathaceum* P., v. Moraea aurantiaca et spathacea, p. 418—419, II., *ixioides* Forst, *paniculatum* RBr., *pulchellum* RBr., v. Libertia ixioides, paniculata, pulchella, p. 461, *melaleucum* Eckl., v. Aristea melaleuca, p. 77.

Sitobolium Desv., Körnerfarn, XXIV. 1., Pteroideae (Polypodiaceae).

punctilobum Desv. (= *Adectum pilosiusculum* Lk. = *Aspidium punctilobum* Mchx. = *Dicksonia pilosiuscula* W. = *D. pubescens* Schk.), punktlappiger, 4. f. b. Nordamerika, (Pensylv., Virgin.).

Sitodium cauliflorum G., v. Artocarpus integrifolia, p. 85.

Sium T., L., Merk.

I. Berula K.

angustifolium L. (= *S. Berula* Gouan, = *erectum* Huds. = *incisum* P. = *nodiflorum* Flor. dan., non L. = *Apium Sium* Crantz).

II. Eusium (genuinum).

cicutaefolium Gmel. (= *lancifolium* β Ledeb.), wasserschierlingblätteriger, 4. f. Sibirien. [1])

cyminosma Hort. Petr., gewürzhafter, 4. f. ? Asiat. Rufsland.

Douglasii DC., Douglas's, 4. f. Nordamerika.

lancifolium MB. (= *latifolium ucranicum* Fisch.).

latifolium L. (= *laucifolium* Schrk., non MB. = *sulcatum* P. = *Coriandrum latifolium* Crtz. = *Drepanophyllum palustre* Hoffm.), β) longifolium Presl.

III. Sisarum.

Sisarum L. (= *brevifolium* Hort. = *podolicum* Hort.). β) Ninsi Thbg.

Amomum Roth, (= *aromaticum* Lam.), v. Sison Amomum, p. 761, *annuum* Roth, (= *tortuosum* Roth), v. Seseli annuum, p. 749, *Apium* Lam. (= *graveolens* Vest), v. Apium graveolens, p. 68, *Bulbocastanum* Spgl., *Carvi* Bernh., *verticillatum* Lam., v. Carum Bulbocastanum, Carvi et verticillatum, p. 167 et 168, *bulbosum* Thore, non Poir. (= *intermedium* DC.), *crassipes* Spgl. (= *limosum* Moris), *inundatum* Roth, *nodiflorum* L., *repens* L., v. Helosciadium bulbosum, crassipes, inundatum, nodiflorum, repens, p. 389 et 294, II., *canadense* Lam., v. Cryptotaenia canadensis, p. 174, II., *ferulaefolium* Spgl., *peucedanoides* Spgl., *virescens* Spgl., v. Bunium ferulaefolium, peucedanoides et virescens, p. 82, II., *graecum* L. non Guss. (= *siculum* L.),

1) Vergl. Falcaria dahurica, p. 242, II.

Digitized by Google

Sium

v. Kundmannia sicula, p. 337, II., *lobatum* Moon, v. Heracleum nepalense, *nudicaule* Lam., v. Peucedanum salsum, p. 504, II., *rigidius* L. et *tricuspidatum* Ell., v. Archemora rigida et tricuspidata, p. 42, II., *segetum* Lam., v. Petroselinum segetum, p. 610, *virens* Hort., v. Cnidium venosum, p. 208. Hiernach p. 763 (wo auch die übrigen Synonyme zu vergleichen sind), zu ergänzen und zu berichtigen.

Skinnera Forst., *coccinea* Mch. et *excorticata* Forst., v. Fuchsia coccinea et excorticata.

Skylakanthus Endl., Deltakrönchen, V. II., Asclepiadeae.

sibiricus Endl. (= *Asclepias sibirica* Murray, = *Cynanchum sibiricum* RBr.), sibirisches, 4. f. Sibirien.

Slateria japonica Desv., v. Ophiopogon japonicus, p. 562.

Slevogtia Rchb., *orientalis* Griseb. et *occidentalis* Griseb., v. Hippion hyssopifol. et verticillatum, p. 401.

Sloanea Plum., Sloanea.

alnifolia Mart., erlenblätterige, ħ. w. Brasilien.

dentata L. (= *grandiflora* Sm. = *Plumierii* Aubl. = *Castanea Sloanea* Mill.).

Massoni Sw. (= ? *dentata* L., Spgl.), Masson's, ħ. w. Caribäen.

Smegmadermos emarginata R. et P. (= *Smegmaria emarginata* W.), v. Quillaja Smegmadermos, p. 582, II.

Smelowskia C. A. Mey., *alpina* C. A. Mey., *brevicaulis* Steud., *cinerea* C. A. Mey., v. Hutchinsia alpina, brevicaulis, alba, p. 406 et p. 307, II., *integrifolia* C. A. Mey., v. Eutrema integrifol. Nachl.

Smilacina Dsf., Maienblümlein.

I. Genuina.

borealis Sims, (= *Convallaria borealis* Poir. = *Clintonia ciliata* Rafin. = *Dracaena borealis* Ait.).

flexicaulis Wender., hin- und hergebogenes, 4. f. ?

racemosa Dsf. (= *Convallaria racemosa* L. = *Majanthemum racemosum* Lk.).

stellata Dsf. (= *Convallaria hybrida* March. = *C. stellata* L. = *Majanthemum stellatum* Lk.).

umbellata Dsf. (= *borealis* α Ker, = *Clintonia ciliata* β) Rafin. = *Convallaria umbellata* Poir. = *C. umbellulata* Mchx. = *Majanthemum umbellatum* Lk.).

II. Majanthemum Wigg., Mch. (= *Evallaria* Neck. = *Styrandra* Rafin.).

bifolia Dsf. (= *cordifolia* Beck. = *Convallaria bifolia* L. = *C. quadrifida* Lam. = *M. bifolium* Lam. et DC. = *M. Convallaria* Roth, = *M. cordifolium* Mch. = *Sciophila convallarioides* Wibel, = *Unifolium quadrifidum* All.).

canadensis Pursh, (= *bifolia* Dsf. var. Spgl. = *Convallaria canadensis* Poir. = *Majanthemum canadense* Lk.).

Smilax T., Stechwinde.

Houstoniana Steud. (= *spinosa* Mill., non Poir.), Houston's, ħ. Sch. k. t. Vera Crux.

laurifolia L. (= *cuspidata* Poir.).

medica Chamiss., Schltdl., medicinische, ħ. Sch. k. Mexico. (Ob kultivirt?) [1])

Milleri Steud. (= *aristolochiaefolia* Mill., non W.).

1) Ist die zuerst in Europa angewendete Sarsaparille.

Digitized by Google

Smilax
officinalis H. B. K., gebräuchliche, ♄. Schft. Neugranada. (Kaum kultivirt.)
Pseudochina L. (= *canellaefolia* Mill.).
β) hederaefolia Mill.
Pseudosarsa Visian. (= *Sarsaparilla* Hort. = ? *bermudensis* Duham.), unächte, ♄. Sch. k. ?
pubera Mchx. (= *pubens* W. Enum. = *pumila* Walt.).
quadrangularis W. (= *virginiana* Mill.).
Sarsaparilla L. (= ? *glauca* Walt., Mchx.).
spinosa Poir., dornige, ♄. Sch. w. Ostindien.
β) ovata Jaum. St. Hil., Duham.

Smithia Ait., conferta Sm. (= *capitata* Desv.), geminiflora Roth, (= *sensitiva* β W. A.), p. 765.

Smyrnium T., L., Myrrendolde.
apiifolium W. (= *creticum* Mill. = ? *Anosmia Jdaea* Bernh.).
Matthioli Presl, (= *rotundifolium* Mill.), Matthioli's, 4. f. b. Sicilien, Creta.
perfoliatum Mill. (= *Dioscoridis* Spgl.), β) Kitaibelii DC. (= *perfoliatum* W. K.).
rotundifolium Mill. (= *aegyptiacum* L. = *Dodonaei* Spgl. = *perfoliatum* L. α Lam. = *ramosum* d'Urv.), rundblätterige, ♂. f. Spanien, Italien, Griechenland.
atropurpureum Lam., *barbinode* Mühlbg., v. Thapsium atropurpureum et barbinode, *cicutarium* MB., *nudicaule* MB., v. Physospermum cicutarium et nudicaule, p. 522, II., *cordatum* Walt., *trifoliatum* Mühlbg., *aureum* L., *integerrimum* L., v. Zizia cordata, aurea, integerrima, *heterophyllum* Mch., v. Sison Amomum, *nodiflorum* All., v. Trochiscanthes nodiflorus, p. 825.

Sobralia R. et P., Sobralie, XX. 1., Orchideae.
biflora R. et P., zweiblumige, 4. w. Peru.
decora ? Lindl., zierende, 4. w. Südamerika.
dichotoma R. et P., zweizinkige, 4. w. Peru.
Elisabethae Schomb., Elisabeth's, 4. w. Guiana.
fimbriata Poepp., Endl., gewimperte, 4. w. Peru.
Galeottiana v. Houtte, Galeotti's, 4. w. Südamerika.
Liliastrum Lindl. (= *Epidendrum Liliastrum* Salzm.), Lilienähnliche, 4. w. Brasilien.
macrantha ? Lindl., grofsblumige, 4. w. Südamerika.
sessilis ? Lindl., sitzende, 4. w. Südamerika.
rosea Poepp., Endl., setigera Poepp., Endl., beide in Peru heimisch, scheinen nicht kultiv. zu werden.
bletioides Hort. belg., v. Bletia hyacinthina, p. 125, *citrina* LaLlave, v. Cattleya citrina, p. 173. *Sogalgina* Cass., *balbisioides* Cass. (= *Ptilostephium balbisioides* Spgl.), *dentata* Lilja, *trilobata* Cass., v. Galinsoga balbisioides, deutata et trilobata.

Soja hispida Mch. (= *javanica* Savi, = *Dolichos Soja* L.). *Solanandra cordifolia* P., v. Galax aphylla.

Solandra Sw., Solandra.
nitida Zuccagn. (= *Datura sarmentosa* β Lam. = *Portlandia grandiflora* Hort.).
scandens W. (H. B.), klimmende, ♄. Sch. w. Südamer. (Scheint bis jetzt nicht kultivirt zu werden.)
Solandra capensis L., v. Hydrocotyle Solandra, p. 309, II., *Solandra* Murr., Poir., *aculeata* Poir. (= *spinosa* Poir.), v. Abelmoschus ficulneus, p. 1, II., *lobata* Murr., v. Lagunaea lobata, p. 443, *squamea* Poir., v. Lagunaria Patersonii, p. 341, II.

Digitized by Google

Solanoides Mch., *laevis* Mch., *pubescens* Mch., *undulata* Mch., v. Rivinia laevis, humilis, brasil.

Solanum T., Nachtschatten.

adoense Hochst., adoaischer, ⊙. m. f. Abyssinien.

aggregatum Jacq. (= *guineense* L. spec. ed. 2. = *sempervirens* L. spec. ed. 1. = *Atropa solanacea* L. mant. = *Saracha solanacea* P.).

ambiguum Dunal, zweifelhafter, ♄. Sch. w. Martinique.

amblophyllum Hook., vollblätteriger, ♄. k. Lima.

Angurium Dunal, (= *angustifolium* Mill.), Angurien-N., ♄. t. k. Vera Crux.

aquaticum Dsf. Hort. Par., Dum.Cours., wasserliebender, ♄. w. ?

arabicum Dunal, (= *armatum* Forsk.), arabischer, ⊙. f. Arab.

atriplicifolium Gill. (non Desport.), meldenblätteriger, ⊙. f. Chili.

atropurpureum Schrk. (= *atrosanguineum* Hort.), schwarzpurpurfarbiger, 4. ♄. w. Brasilien.

atrovirens Dunal, schwarzgrüner, ♄. w. Westindien.

auriculatum Ait. (= *mauritianum* Scopol.).

axilliflorum Dunal, (= *scandens* Mill.), achselblumiger, ♄. Sch. t. k. Vera Crux.

bahamense L. (= *fruticosum* Mill.).

Balbisii Dunal, (= *brancaefolium* Jacq. fil. = *decurrens* Balb. = *formosum* Weinm. = *inflatum* Hornem. = *mauritianum* W. hort. = *sisymbriifolium* Lam. = *Thouini* Gmel. Hort. Carlsr. = *viscidum* Schweig. = *viscosum* DC.).

Berterii Dsf. Hort. Par., Bertero's, ⊙. f. Chili.

bonariense L. (= *arborescens* Mch. = *baccatum* Hort. = *grandiflorum* Hort.), β) guaraniticum St. Hil.

candidum Lindl., reinweifser, ♄. ♄. k. Mexico.

capense L. (= ? *humile* Lam., non Bernh. = *Milleri* Jacq.), capischer, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

capsicastrum Lk., Dsf., beifsbeerenähnlicher, ♂. k. ?

chinense Dunal, chinesischer, ⊙. ♄. f. k. China.

ciliatum Lam. (= *capsicoides* Hort. Par. = *ciliare* W. = *sinuatifolium* Arrab. = *pentapetaloides* Hort.), gefranzter, ⊙. 4. m. f. w. Brasilien.

concavum Lindl., ausgehöhlter, ♄. Sch. k. Chili.

corymbosum Jacq. (= *corymbiferum* Gmel. system. = *cymosum* R. et P. = *parviflorum* Nocca).

cuneifolium Dunal, (= *croceum* Dunal, = *dubium* Dunal, = *jamaicense* Mill.).

cyanocarpum Blume, kornblumenblaufrüchtiger, ⊙. w. m. f. Java.

Donianum Walp. (= *bahamense* Mill., nec L.), Don's, ♄. ♄. k. Bahamische Inseln.

Dulcamara L. (= *scandens* Lam., non Alior. = *Dulcamara flexuosa* Mch. = *Lycopersicum Dulcamara* Medic.), β) rupestre Schm., γ) litorale Raab, Lk.

elaeagnifolium Cav. (= *dealbatum* Lindl. = *leprosum* Ortega, = *saponaceum* Hook.).

elegans Dunal, zierlicher, ♄. k. t. Neuholland.

eriocalyx Dunal, (= *racemosum* Mill.), wollkelchiger, ♄. t. Carthagena.

esculentum Dun., β) Melongena incurvata Mill.

ferox L. (= *hirsutum* Roxb. = *involucratum* Blume, = *lasiocarpum* Dunal, = *mammosum* Lour. = *quadriloculare* Spgl.).

Digitized by Google

Solanum

fistulosum Rich., Dun., röhriger, ☉. f. Ostindien, Mascarenas. *α*) baccis nigris (= *nigrum* Wall. ex parte, = *Rhinocerotis* Blume), *β*) baccis rubris (= *erythraeum* Dun. = *rubrum* Murr., Gmel. syst.).

flavum Kit. (= *Kitaibelii* Schult., Hort. = *ochroleucum* Bast., Dun.).

geminifolium Cham., Schltdl., paarblätteriger, ♄. k. Mexico.

giganteum Jacq. (= *niveum* Thbg., Vahl, = *papilionaceum* Hort.).

Gilo Raddi, Gilo-N., ☉. m. f. Brasilien.

glaberrimum Dunal, kahlster, 4. f. Insel Timor.

glaucescens Zuccar., blaugrünlicher, ♄ k. Mexico.

glaucophyllum Dsf., blaugrünblätteriger, ♄. t. ?

graciliflorum Dunal, schlankblumiger, ♄. w. Java.

grandiflorum R. et P., grofsblumiger, ♄. t. k. Peru.

Gula Hamilt. (= *diffusum* Roxb. = *ferox* Burm., non L.), Gula-N., ☉. w. m. f. Ostindien.

heterophyllum Lam. (= *acanthifolium* Hort.), verschiedenblätteriger, ♄. w. Guiana.

hirsutum P., Dun. (= *aegyptiacum* Lam. = *memphiticum* Gmel. syst. = *nigrum β hirsutum* Vahl, = *villosum* Lam. var. Spgl.), rauhhaariger, ☉. f. Aegypten.

hispidum P. (= *stellatum* R. et P., non Jacq.), steifhaariger, ♄. t. k. Peru.

Houstoni Dunal, (= *quercifolium* Mill.), Houston's, ♄. ♄. t. k. Vera Crux.

humile Bernh. (= *nigrum* L. var. Spgl. = *viridescens* Hort.).

Jacquini W. (= *diffusum* Roxb. = *virginianum* Jacq. = *xanthocarpum* Schrad. et Wendl.).

Jamesii Torrey, James's, ☉. f. Nordamerika (Arkansasgeb.)

jasminoides Paxt. (= *jasminiflorum* Hort. Cels.), jasminblumiger, ♄. t. ? Südamerika.

incanum L., Dun. (= *argyracanthum* Dum. Cours. = *marginatum β argyracanthum* P. = *S. Melongena* L. var. N. E. = *zeylanicum* Lam.).

indicum L. (= *canescens* Blume).

laetum Kunze, freudiggrüner, ♄. k. ?

lanatum Dunal, (= *aspero-lanatum* R. et P. = *asperum* P.), wolliger, ♄. ♄. k. t. Peru.

Linkii G. Don, non R. et S. (= *oliganthum* Lk. Enum. nec Dunal, = *laurifolium* Hort. = *ratiflorum* Steud.), Link's, ♄. w. ?

lividum Lk. in W. herb. (= *recurvum* Hffg.).

Maccai Rich., Dunal, Maccai-N., ♄. w. Cayenne.

macrantherum Moç., Sess. (= *dulcamarioides* Poir. = *macranthemum* R. et S.), grofsbeuteliger, ♄. Sch. k. t. Mexico.

macranthum Dunal, (= *marronense* Hort.), grofskrouiger, ♄. ♄. w. Brasilien.

Maglia Molina, (= *tuberosum* Poepp., non L.), Maglia-N., 4. Kn. k. Chili.

marginatum L. (= *abyssinicum* Jacq. = *argyracanthum* Auct. = *niveum* All.).

Martiusianum Steud. (= *molle* Schrk., non H. B.), Martius's, 4. w. Brasilien.

microspermum Dunal, kleinsaamiger, ☉. f. ?

Milleri Jacq. (= *subbiflorum* Ortega, = *trilobatum* Mill.).

miniatum Bernh. (= *puniceum* Gmel. = *rubrum* Lumnitz. = *incertum* Dun. var. *β*. N. E.), var. melanocerasum (non W.).

Digitized by Google

Solanum

monodynamum Visian., monodynamischer, ♄. ♄. k. t. Mexico.
nigrum L. (= *vulgatum* W.), β) atriplicifolium Desp.
nodiflorum Jacq. (= *strictum* Zuccag.). ☉. nicht ♄.
oliganthum H. B. K., Dun. (non Lk.), wenigblumiger, ♄. ♄. w. Südamerika.
oporinum W. Enum. (= *cymosum* Ortega, = *grandiflorum* Dsf. = *macrophyllum* Dun., DC. Hort. monsp.).
oxycarpum Schiede, Schltdl., spitzfrüchtiger, 4. w. Mexico.
persicum W. (= *assimile* Frivalds. = *Dulcamara* L. var. Bess.), persischer, 4. ♄. Sch. f. Persien, Rumelien, Sibirien.
pinnatum Cav., gefiederter, ☉. f. Chili.
pterocaulon Dunal, (= *alatum* Mch. = *judaicum* Bess. = *melanocerasum* W. = *nigrum* ε *virginicum* L. = *scabrum* Mill. = *virginicum* P.).
pubigerum Dunal, (= *Cervantesii* Lagasca, = *microcarpum* Brouss., Cerv.).
pulchrum Dunal, schöner, ♄. w. Brasilien.
quitense H. B K. (= *angulatum* R. et P. = *quitoense* Lam.), quitoscher, ♂. ♄. w. Quito.
Radula Vahl, (= *asperum* Rich. = *salvifolium* Lam.), raspelblätteriger, ♄. w. Südamerika.
reclinatum L'Her., non Hort. (= *laciniatum* Dun., non Ait.), zurückgebeugter, 4. ♄. k. k. Peru.
Richardi Dunal, Richard's, ♄. w. Martinique.
Rossii Knowl. et Westc., Rossi's, ♄. ♄. k. Mexico.
rubiginosum Vahl, (= ? *ochroneurum* Lk.), γ) coccineum Hort.
rubrum Mill. (= *oleraceum* Rich. var. baccis rubris), Ostindien, Californien.
sanctum L. (= *coagulans* Hochst. et Steud., non Forsk. = *coccineum* Hort. Par. = *incanum* Forsk.).
sandvicense Hook., Sandwich's-N., ♄. k. t. Sandwichsinsel.
saponaceum Dunal, (= *scabrum* R. et P. = ? *torvum* Sw.).
Schiruschuna Mill., malabarischer, ☉. w. m. f. Malabar.
Schrankii Steud. (= *uncinatum* Schrk.), Schrank's, ♄. w. Brasilien.
serpentinum Dsf. (= *Melongena* L. var. ? Dsf.), schlangenförmiger, ☉. m. f. ?
speciosum Dunal, prächtiger, ♄. ♄. w. Caribäen.
stoloniferum Schltdl., sprossender, 4. k. Mexico.
subarmatum W. Enum. (= *babamense* Hort. = *igneum* L. var.).
subinerme Jacq. (= *laurifolium* Mill. non L. fil.).
subviscidum Schrk., wenigschmieriger, ♄. w. Brasilien.
Swartzianum R. et S. (= *aureum* Sw., non H. B. K. = *lepidotum* Dun.), Swartz's, ♄. w. Brasilien.
tectum P. (= *sinuatum* W. = *villosum* Dietr.).
torvum Sw. (= *acanthifolium* Dsf. Hort. Par. = *ficifolium* Ortega, = *indicum* L. spec. = *stramonifolium* Lam., non Jacq.).
tricolor Moç., Sess., dreifarbiger, 4. k. t. Mexico.
tuberosum L. (= *esculentum* Neck. = *Parmentieri* Molina, = *Lycopersicum tuberosum* Mill.).
Tweedianum Hook., Tweedi's, 4. k. t. Benaria.
umbellatum Mill., doldiger, ♄. w. Südamerika.
unguens Weinm., klauentragender, 4. w. Brasilien.
uniflorum Dun. (= *dichotomum* Rich. = *Melongena* L. var. Spgl.).

Digitized by Google

Solanum

Vellozianum Dun. (= *Wellosianum* Hort.), Vellozo's, ♄. ♄. w. Brasilien.

Verae crucis Steud. (= *carolinianum* Mill., non L.), veracruzischer, ♄. ♄. k. t. Vera Cruz.

verbascifolium L. (= *adulterinum* Hamilt. herb. = ? *bahamense* Mill. = *bicolor* W. msp. = *crianthum* Don, = *pubescens* Roxb.).

verrucosum Schltdl., warziger, ♃. Kn. k. Mexico.

villosum Lam., Mch. (= *aegyptiacum* Forsk. = *luteum* Gmel. Flor. Bad. = *moschatum* P. = *nigrum γ* W.).

violaceum Jacq. fil., Ortega, (= *cuneatum* Mch.), violetter, ♄. t. w. Ostindien, China, Neuholland.

virgatum Lam. (= *elongatum* Hort.).

viscosum Mch., schmieriger, ☉. ♄. m. f. k. ?

Zuccagnianum Dun. (= *obtusifolium* W. herb. = *scabrum* Zuccagn. = *Willdenowii* R. et S.).

Unbestimmtere: aethiopoides Cav., Hort., africanum Dunal, aguaraquia Brot. Brasil., americanum Mill. ☉. Virgin., dictyoticum R. et S. (= *reticulatum* W. mspt.), impedians Weinm. (= ? *Jussieui* Dun.), lusitanicum Dun., memphiticum Mart. Hort. Erl. ☉., Mönchii Dunal, (= *stellatum* Mch.), rigidum Lam. ♄., sinuatum Ait. ♄., somniculosum Hort., sulcatum Räusch., Vaillantii Dun., Wildianum Wender. etc.

africanum Mill., non Dun. (= *crassifolium* Lam.), *montanum* L., *phyllanthum* Cavan., *pinnatifidum* R. et P. (= *multifidum* Poir., non R. et P.), v. Witheringia crassifolia, montana etc., p. 857, *Aquartia* Dunal, *microphyllum* Spgl., v. Aquartia aculeata et microphylla, p. 69, *amazonicum* Ker, *cornutum* Lam. (= *heterandrum* Juss.), *Fontanesianum* Dunal, *heterandrum* Pursh, *heterodoxum* Dunal, (= *Mullus* Hort.) *rostratum* Dunal, *Vespertilio* Ait., *uncinellum* Lindl., v. Nycterium amazonicum, cornutum, Fontanesianum, heterandrum, heterodoxum, rostratum, cordifolium et uncinellum, p. 551, p. 440 et Nachlese.

Hinsichtl. d. übrig. s. Lycopersicum, p. 483 et 376, II.

Solea Spgl., Ging., Solea.

concolor Ging. (= *stricta* Spgl. pugill., non syst. = *Hybanthus concolor* Spgl. = *Jonidium Sprengelianum* R. et S. = *Viola concolor* Forst. = *V. stricta* Mühlbg.).

capensis Spgl., *heterophylla* Spgl., *verticillata* Spgl., *stricta* Spgl., *verbenacea* Spgl., v. Jonidium capense, heterophyllum, polygalaefolium, strictum et verbenaceum, p. 430.

Solena revoluta D. Dietr., v. Posoqueria revol., p. 555, II.

Solenantha G., Röhrenblume, V. 1., Rhamneae.

spinosa G. Don, (= *Cryptandra spinosa* Cunningh.), dornige, ♄. t. k. Neuholland.

Solenanthus Ledeb., Röhrenkrone, V. 1., Asperifoliacaae (Borragineae).

apenninus Hohenack. (= *Cynoglossum apenninum* L.), apenninische, ♂. f. Apenninen, Sicilien.

Biebersteinii DC. (= *dubius* Hohenack. = *Cynoglossum stamineum* MB., excl. syn.), Bieberstein's, ♂. f. Taurien.

circinnatus Ledeb. (= *Echinospermum circinnat.* D. Dtch.), kreiselförmige, ♂. ♃. f. Altaisches Sibirien.

lanatus A. DC. (= *Anchusa lanata* L. = *Cynoglossum cheirifolium β* Lehm.), wollige, ♂. ♃. k. Nordafrika.

Digitized by Google

Solenopsis Presl, *Bivoneana* Presl, *canariensis* Presl, *Laurentia* Presl, (= *Salzmanniana* Presl), *minuta* Presl, v. Lobelia Sect. V. (Laurentia) tenella, canariensis, Laurentia, minuta, p. 471 et 367, II.

Solenostylis Lem., Scheidw., v. Houtte, Röhrengriffel, XIV. II., Acanthaceae.

aurantiaca Lem., Scheidw., v. Houtte, (= *Aphelandra aurantiaca* Lindl., p. 40, = *Hemisandra aurantiaca* Scheidw.).

Ghiesbreghtiana L., S., v. H. (= *Justicia Ghiesbreght.* Hort.), Ghiesbreght's, ♄. w. t. Mexico.

velutina L., S., v. H. (= *Justicia velutina* Hort.), sammethaariger, ♄. w. t. Mexico.

Solidago L., Goldruthe.

bicolor L. (= *alba* Mill. = *Aster bicolor* N. E.).

canadensis L. (= *arcuata* Tausch, = *?humilis* Mill. = *praecox* Mch. = *?virginiana* Mill.).

confertiflora DC., gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.

corymbosa Ell., doldentraubige, 4. f. Nordam. (Georgia).

elliptica Ait. (= *arguta* Ait. var. Spgl. = *latissimifolia* Mill.), β) plantaginea Dsf.

erecta Pursh, aufrechte, 4. f. Carolina.

gigantea Ait. (= *serotina* W. nec Ait.).

integrifolia Dsf. (= *sempervirens* Mchx., non L. = *speciosa* Nutt. = *petiolaris* Mühlbg.).

β) angustata (erecta Ell.).

lepida DC., schilferige, 4. f. Nordamerika.

multiflora Dsf., vielblumige, 4. f. Nordamerika.

nemoralis Ait. (= *hispida* Mühlbg.).

β) cinerascens Schweinitz.

odora Ait. (= *retrorsa* Mchx.).

paniculata DC. (= *?mexicana* H. B. K.), rispige, 4. f. b. Mexico.

patula Mühlbg. (= *asperata* Pursh, = *angulata* Schrad.).

pilosa Mill., Tausch, (= *canadensis* γ W.), haarige, 4. f. Nordamerika.

procera Ait. (= *?hirsutissima* Mill. = *?Tournefortii* Tausch).

rigida L. (= *grandiflora* Rafin.).

salicina Ell., weidenähnliche, 4. f. Nordam. (Georgia).

serotina Ait. (= *glabra* Dsf. β Endl. = *deflexa* Mch.).

tortifolia Ell. (= *odora* Mchx., non Ait.), gedrehtblätterige, 4. f. Nordamerika (Carolina, Georgia).

viminea Ait. (= *integerrima* Mill.).

Virgaurea L., β) alpestris W. K. (= *carpathica* Schrad. = *lapponica* Wither.), η) laxa Tausch.

Unbestimmtere: adscendens Hort., Cleliae DC. (= *dubia* Scop.), conferta Dsf., Poir., dubia Schult., fistulosa Mill., marylandica, Mill., petiolata Mill., pyramidalis Mch. *cordifolia* Mill., v. Aster cordifolius, p. 95, *Cymbalaria* Mch., v. Munychia Cymbalaria, Aster Sect. XII. p. 99, *glauca* Gmel., v. Senecillis glauca, p. 742, *graveolens* Lam., *viscosa* Lam., non Schrad., v. Inula graveolens et viscosa, p. 317 et 318, II., *pauciflosculosa* Mch., v. Bigelowia uniligulata, p. 68, II., *pubescens* Wall. (= *nepalensis* D. Don), v. Amphirapis pubescens, p. 33, II., *retusa* Burm., v. Nidorella foetida, p. 437, II., *viscosa* Schrad. non Lam., v. Psiadia glutinosa, p. 661. — *spuria* Forst. = Commidendrum spurium DC. wird kaum kultivirt.

Digitized by Google

Sophora

capensis, sylvatica, p. 852, *alopecuroides* L. (= *albicans* Jaum. St. Hil.), *chinensis* Lodd., *flavescens* Ait. (= *glabra* Mch. = *macrosperma* Jaum. St. Hil.), *galegoides* Pall., *pachycarpa* C. A. Mey., *sericea* Nutt., v. Radiusia alopecuroides, chinensis, flavescens, galegoides, pachycarpa, sericea, p. 582 et Nachlese, *australis* L. (= *coerulea* Mch.), *alba* Walt., *perfoliata* Walt., *tinctoria* L., *lanceolata* Walt., *villosa* Walt., v. Baptisia australis, alba, perfoliata, tinctoria, uniflora, villosa, p. 113, *biflora* Retz, *buxifolia* Retz, *cordata* Thbg., *cuneifolia* Steud., *hirsuta* Ait., *myrtillifolia* Retz, (= *biflora* L. = *rotundifolia* Berg.), *sericea* Andr., *calyptrata* Retz, (= *biflora* Houtt.), v. Podalyria argentea, buxifolia, cordata, cuneifolia, hirsuta, myrtillifolia, sericea, styracifolia, p. 638 et p. 543, ll., *galioides* Berg., *genistoides* Burm., v. Cyclopia galioides et genistoides, *japonica* L. et *pubescens* Tausch, *affinis* Torr. et Gr., v. Styphnolobium japonicum cum variet. et affine, *juncea* Schrad., v. Viminaria denudata, p. 840, *microphylla* Ait., *nitida* Sm. (= *sericea* Jaum. St. Hil., non Andr.), *tetraptera* Ait., v. Edwardsia microphylla, nitida, grandiflora, *monosperma* Sw., v. Ormosia dasycarpa, p. 586.

Hiernach p. 772 zu ergänzen und zu berichtigen.

Sophronia caespitosa Lichtenst., v. Witsenia partita, p. 858.

Sophronitis Lindl., Zierstendel.

grandiflora Lindl. (= *Cattleya coccinea* Lindl.).

Hoffmannseggiana Rchb., Hoffmannsegg's, 4. w. Brasilien.

isopetela Hffg., gleichkroniger, 4. w. Brasilien (Rio Janeiro).

nutans Hffg., nickender, 4 w. Brasilien (Rio Janeiro).

pterocarpa ? Lindl., flügelfrüchtiger, 4. w. Südamerika.

violacea Lindl., violetter, 4. w. Südamerika.

In van Houttes Établissement horticole wird noch eine S. coccinea verzeichnet.

Soranthe caliciifolia Salisb., *glanduligera* Salisb., v. Sorocephalus lanatus et imbricatus, p. 774.

Soranthus Ledeb., Häufchendolde, V. II., Umbelliferae.

Meyeri Ledeb. (= *Seseli Meyeri* D. Dtrch.), Meyer's, 4. f. Sibirien.

Sorbus T., L., Eberesche.

I. Adenorachis DC. (= *Aronia* P.).

arbutifolia * (= *Aronia pyrifolia* P. = *Crataegus pyrifolia* Lam. = *C. serrata* Poir. = *Mespilus arbutifolia* L. = *M. pumila* Schm.).

Chamaemespilus * (= *fruticosa* Crtz. = *Aronia Chamaemespilus* P. = *Crataegus Chamaemespilus* Jacq., Dsf. = *C. humilis* L. = *Lazarolus Chamaemespilus* Borkh. = *Mespilus Chamaemespilus* L.).

densiflora * (= *Aronia densiflora* Spach, excl. Syn. = *Crataegus arbutiflora* Dsf. Hort. Par. = *Pyrus densiflora* Steud.), dichtblumige, ♄ f. ?

melanocarpa * (= *Mespilus arbutifolia* β Mchx. = *Pyrus melanocarpa* W.).

pubens * (= *Aronia pubens* Spach, = *Pyrus capitata* Hort. = *P. pubens* Lindl.).

II. Genuin.

alpina * (= *Pyrus alpina* W. = *P. Aria* β DC. = *Crataegus alpina* Hort.).

Digitized by Google

Sorbus

Aria Crtz. (= *Aria nivea* Host, = *Crataegus Aria* L. = *Mespilus Aria* Scop. = *Lazarolus Aria* Borkh. = *Pyrus Aria* L.), *β*) sudetica (Tausch).

Aucuparia L. var. monstrosa Hort., subserrata Opiz.

Hostii * (= *Aria* Crtz. var.? = *Aria Hostii* Jacq. fil.), Host's, ♄. f. Oestreich. u. Steyerm. Alpen.

latifolia P. (= *Crataegus dentata* Thuill. = *C. latifolia* Poir. = *Pyrus arguta* Tausch, = *P. latifolia* Lindl. = *P. semilobata* Bechst.).

obtusata * (= *Crataegus Aria rotundifolia* Hort. = *C. obtusata* Spach, = *Pyrus obtusata* Steud.).

scandiaca Fr. (= *intermedia* P. = *Cartaegus Aria β* L. L. = *C. inermis* L. fl. Lapp. = *C. scandiaca* Wahlbg. = *C. suecica* Auct. = *Lazarolus intermedia* Borkh. = *Pyrus decipiens* Bechst. = *P. intermedia* Ehrh. = *P. suecica* Röhl.).

spuria P. (= *Aronia sorbifolia* Spach, = *Mespilus sorbifolia* Poir. = *Pyrus sorbifolia* Wats. = *P. hybrida* Mch. = *P. spuria* DC.).

vestita Lodd. (non Wall.), v. Crataegus cuspidata, p. 165, II.

Sorghum Mch., P., Durragras.

vulgare P. (= *album* Hort. = *medium* Hort. = *pyramidale* Hort. = *Andropogon Sorghum* Roth, Roxb. = *Holcus Dora* Mieg. = *H. Durra* Forsk. = *H. rubens* G. = *H. Sorghum* L.), *β*) bicolor W. (= *Andropogon bicolor* Roxb. = *Holcus bicolor* L.), *γ*) nigrum R. et S. (= *nigricans* Hort. = *Andropogon niger* Kunth, = *Holcus niger* Gmel. = *H. nigerrimus* Ard. = *H. nigricans* Auct.).

Aufserdem werden aus abyssinischen Saamen noch folgende Varietäten kultivirt: seminibus albis, seminibus albis majoribus, seminibus albis minoribus glumis nigris, seminibus griseo-fuscis, seminibus fulvis majoribus, seminibus brunneis minoribus.

arenaceum P. B., v. Pentameris curvifolia, p. 884 et Nachlese.

Soria Adans., *syriaca* Desv., v. Euclidium syriacum.

Sorindeja madagascariensis DC. (= *pinnata* Dsf. Hort. Par. excl. Synon. = *Bursera acutifolia* Sbr. hrb. mart. = *Mangifera pinnata* Lam., non L.).

Sorocea St. Hilair, Häufchenbeere, XXII. 1., Urticaceae-Artocarpeae.

Celsiana * Cels's, ♄. w. Brasilien.

Sorocephalus RBr., Häufchenkopf.

salsoloides RBr., salzkrautähnlicher, ♄. t. Cap d. g. Hffn.

verticillatus RBr., (= *Protea verticillata* Thbg.), wirtelförmiger, ♄. t. Südafrika.

Soulangia Brongn. (Soulange-Bodin, berühmter franz. Pflanzen-Cultivateur u. Gartenbesitzer), V. 1., Rhamneae. v. Phylica Sect. IV. p. 518, II., et p. 619.

Denen daselbst verzeichneten Arten ist noch beizufügen: myrtifolia Otto et Dietr., myrtenblätterige, ♄. t. k. Südamerika.

Southwellia Salisb., *angustifolia* Wight, *Balanghas* Wight, *nobilis* Salisb., *Tragacantha* Wight, *versicolor* Wight, v. Sterculia angustifolia, Balanghas, Tragacantha, versicolor.

Digitized by Google

Soymidia Adr. Juss., Soymidie, X. 1. (XVI. vi.), Hesperideae-Cedreleae.

febrifuga Adr. Juss. (= *Swietenia febrifuga* Roxb., p. 794, = *S. Soymida* Dunc.), fiebervertreibende, ♄. w. Ostindien.

Soyeria Mennier, *blattarioides* Monn., *grandiflora* Monn., *lampsanoides* Monn., *montana* Monn., *sibirica* Monn., v. Crepis blattarioides, grandiflora, lampsanoides, montana, sibirica, p. 229—230 et 167, II.

Spadostyles Benth., Kolbengriffel, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae (Sophoreae).

Benthamii Endl., Bentham's, ♄. t. Neuholland.

concolor Endl., einfarbiger, ♄. t. Neuholland.

Cunninghamii Benth. (= *Oxylobium dilatatum* Cunn.), Cunningham's, ♄. t. Neuholland.

flexilis Hort. belg. (= *Dillwynia teucrioides* Sbr. = *Pultenaea flexilis* Sm., p. 667).

Hügelii Endl., Hügel's, ♄. t. Neuholland.

juniperina Hort. belg. (= *Pultenaea juniperina* LaBill., p. 667).

ramulosa Endl., ästige, ♄. t. Neuholland.

rupestris Hort. belg., Felsen-K., ♄. t. k. Neuholland.

sericea Hort. belg. (= *Pultenaea sericea* Hort.), seidenhaariger, ♄. t. k. Neuholland.

Sieberii Benth. (= *Dillwynia cuneata* Sieb. = *Pultenaea cuchila* DC., p. 667), Sieber's, ♄. t. Neuholland.

Spaendoncea tamarindifolia Dsf., v. Cadia purpurea, p. 142.

Spallanzania Pollini, (non DC.), *agrimonoides* Pollini, v. Aremonia agrimonoides, p. 75.

Spananthe Jacq., paniculata Jacq. (= *setosa* Mch. = *Hydrocotyle Spananthe* W. = *Phellandrium ciliatum* Hrbr.).

Sparaxis Ker, Schlitzschwertel.

blanda Sweet, (= *alba* Hort. = *tricolor γ subroseo-albida* Bot. mag.).

bulbifera Ker, (= *albiflora* Eckl. = *Belemcanda bulbifera* Mch. = *Ixia bulbifera* L. = *Moraea bulbifera* Jacq.), β) monantha (LaRoche), γ) S. lacera Curt.

fimbriata Ker, (= ? *grandiflora* Ker, var. = *Ixia fimbriata* Lam.), gefranzter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fragrans Ker, (= *Gladiolus odorus* Schrk. = *Ixia fragrans* Jacq. = *I. uniflora* Jacq.).

grandiflora Ker, (= *Belemcanda aristata* Mch. = ? *B. semiflexuosa* Mch. = *Ixia aristata* Ait. = *I. bulbifera α* Thbg. = *I. bulbifera β holosericea* Vahl, = *I. sparsa* Mill. = *I. uniflora* L.).

b) striata, c) hybrida.

Griffini Sweet, (= *tricolor γ violaceo-purpurea* Bot. mag.).

Liliago Sweet, (= *grandiflora γ Liliago* Bot. reg. = *Ixia Liliago* Redouté), Lilien-S., 4. Zw. t. k. Cap d. g. H.

lutea Eckl., gelber, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

luteo-violacea Eckl., gelbvioletter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. H.

Meleagris Eckl., Fritilliariensähnlicher, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

tricolor Ker, (= *Ixia stellata tricolor* Hort. = *I. tricolor* Curt.).

versicolor Sweet, (= *Synnotia versicolor* Sweet), verschiedenfarbiger, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

violacea Eckl., violetter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Sparganophorus Vaill., G., Spargträger.
africanus Steud. (= *Struchium africanum* P. B.), afrikanischer, ⊙. m. f. Senegambien.
Vaillantii G. (= *fasciatus* Lam. = *Struchium* P. = *Ethulia nodiflora* Lam. = *E. sparganophora* L. = *E. Struchium* Sw. = *Struchium americanum* Poir. = *St. Ethulia* Mirb.).
ageratoides Lagasca, v. Coelestina ageratoides, p. 210, *obtusifolius* Lagasca, v. Ageratum conyzoides, p. 24, *verticillatus* Mchx., v. Sclerolepis verticillata, p. 646, II.

Sparmannia Thbg., Sparmannie.
abyssinica Hochst., abyssinische, ħ. t. k. Abyssinien.
africana L., *β*) acerifolia Hort., *γ*) suberosa Endl.
palmata E. Mey., Sweet.

Spartina Schreb. (= *Limnetis* P. = *Trachynotia* Mchx.), Ginstergras.
brasiliensis Raddi, brasilianisches, 4. w. Brasilien.
laevigata Lk. (= *glabra* Mühlbg. = *juncea* W. var. Spgl. = *Dactylis maritima* Walt.).
stricta Roth, (= *pungens* P. Beauv. = *Dactylis cynosuroides* Löfll., Huds. = *D. stricta* W. = *Limnetis pungens* P. = *Paspalum cynosuroides* Brotero, = *P. strictum* Brot. = *Rottboella spathacea* Tenore, = *Trachynotia stricta* DC.).

Spartium L., junceum L., *β*) odoratissimum D. Don, *γ*) acutifolium Lindl.
album Dsf. (= *dispermum* W. = *multiflorum* Ait.), *lanigerum* Dsf. (= *villosum* Poir.), *lusitanicum* Mill. (= *grandiflorum* Brot.), *nubigenum* Ait. (= *fragrans* Lam. = *supranubium* L.), *procerum* W., *spinosum* L., v. Cytisus albus, laniger, grandiflorus, fragrans, procerus, spinosus, *aphyllum* Pall., v. Eremosparton aphyllum, p. 227, II., *arborescens* Mill. v. Brya Ebenus, p. 135, *capense* L., v. Pelecynthis opposita, p. 494, II., *complicatum* Gouan, Lois., *complicatum* L., v. Adenocarpus telonensis et parvifolius, p. 18, *contaminatum* Ait., v. Indigofera juncea, *contaminatum* L., *cytisoides* L. fil., *sericeum* Ait., v. Lebeckia contaminata, cytisoides et sericea, p. 450, *creticum* Dsf., v. Anthyllis Aspalathi, p. 65, *angulatum* L. (= *parviflorum* Vent.), *monospermum* L. (= *Clusii* Spach) et *sphaerocarpum* L., v. Retama angulata, monosperma, sphaerocarpa, p. 587, II., *arboreum* Dsf., *patens* L., *scoparium* L., v. Sarothamnus arboreus, patens, vulgaris, p. 633, II, et p. 885, *sophoroides* Berg., v. Hypocalyptus obcordatus, *aetnense* Bivone, (= *trispermum* Sm.), *albicans* Cav., *decumbens* Jacq. Hort., *Gasparinii* Guss. (= *gymnopterum* Vivian.), *decumbens* Sut. (= *Halleri* Vill.), *sericeum* Vent., v. Genista aetnensis, canariensis, diffusa, Gasparinii, prostrata, clavata, sowie überhaupt hinsichtl. d. übrigen Genista, p. 349 et p. 257, II.

Spatalla RBr., Salisb., Spatalla.
abietina RBr. (= *Protea abietina* Lichtenst.), tannenähnliche, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.
polystachya RBr., vielährige, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.
propinquua RBr., verwandte, ħ. t. Cap d. g. Hoffn.
Spathestigma glutinosum Hook., Arn., v. Pterostigma grandiflorum, p. 571, II.

Digitized by Google

Spathicarpa Wilson, Hook., Scheidenfrucht, ? XXI. IX., Aroideae.

hastifolia Wils., Hook., spontonblätterige, 4. w. Chili.

Spathiphyllum Schott, Scheidenblatt, XXI. IV., Aroideae.

lanceolatum Schott, (= *Dracontium lanceaefolium* Jacq.), lanzettförmiges, 4. w. Caracas.

sagittaefolium Schott, (= *Arum sagittaefolium* Rodsch. = *Dracontium sagittaefolium* Mey. = *Pothos sagittaefolia* Rudge), pfeilblätteriges, 4. w. Guiana.

Spatium chinense Lour., v. Aponogeton monostachys, p. 69.

Spathodea P. B., Scheidenbignonie.

adenophylla DC. (= *Bignonia adenophylla* Wall., p. 122).

? amoena A. DC. (= *Bignonia amoena* Wall. = *B. amara* Loud.), liebliche, ♄. w. Wird in Calcutta und auf Mauritius kultivirt, wahrscheinlich auf Madagascar wild.

? bracteosa DC. (= *Bignonia alba* Aubl.), deckblätterige, ♄. Sch. w. Cayenne.

campanulata P. B., glockenblumige, ♄. w. Mittägl. Afrika.

gigantea Blum., riesenhafte, ♄. w. Java.

laurifolia H. B. K., lorbeerblätterige, ♄. Sch. w. Neuandalusien.

Rheedii Spgl. (= *longiflora* Vent. = *Bignonia longiflora* W. = *B. spathacea* L.).

serrulata DC. (= *Bignonia serrulata* Wall., p. 122).

speciosa Brongn. (= *Bignonia fraxinifolia* Hort. Par.), prächtige, ♄. w. ?

stipulata Wall., G. Don, (= *Bignonia stipulata* Roxb.), zwischenblätterige, ♄. w. Ostindien.

uncata Spgl. (= *Bignonia uncata* Andr., Sims).

tulipifera G. Don, (= *Bignonia tulipifera* Schum.), tulpentragende, ♄. w. Guinea.

vernicosa Cham., firnifsgebende, ♄. w. Brasilien.

Beide letztere scheinen bis jetzt nicht kult. zu werden.

indica P. (= *pentandra* Hook.), v. Calosanthes indica, p. 109, II., *montana* Spgl., v. Zeyheria montana, *Roxburghii* Spgl., v. Heterophragma Roxburghii, Nachlese, *uncinata* Spgl., v. Macfadyena uncinata, p. 379, II.

Spathoglottis Blume, Scheidenzüngel, XX. I., Orchideae.

Fortuna Lindl., Fortune's, 4. w. China.

ixioides Lindl. (= *Cymbidium ixioides* Don prodr.), ixienähnliches, 4. w. Ostindien.

plicata Blume, Lindl. (= *Bletia angustata* Gaudich.), faltiges, 4. w. Java.

pubescens Lindl., weichhaariges, 4. w. Ostindien.

trivalvis Lindl., dreiklappiges, 4. w. Ostindien.

Spathularia Haw., *Clusii* Haw. (= *leucanthemifolia* Haw.), *stellaris* Haw., v. Saxifraga leucanthemifolia et stellaris, p. 724.

Specklinia Lindl., Specklinie.

acuminata Lindl. (= *Dendrobium acuminatum* H. B. K.), zugespitzte, 4. w. Südamerika.

emarginata Lindl. (= *Cymbidium corniculatum* Spgl. = *Dendrobium corniculatum* Sw. = *Epidendrum corniculatum* Sw. = *E. monophyllum* Hook. = *Liparis monophylla* Spgl.), ausgerandete, 4. w. Jamaika.

Digitized by Google

Specklinia
floribunda Lindl. (= *Dendrobium ophioglossoides* Sbr. hrb. mart.), blüthenreiche, 4. w. Martinique, Südam.
Lanceola Lindl. (= *lanceolata* Hort. = *Dendrobium Lanceola* Sw. = *Epidendrum Lanceola* Sw. = *Pleurothallis Lanceola* Spgl.), lanzettliche, 4. w. Jamaika.
linearis Lindl. (= *Humboldtia purpurea* R. et S. = *Stelis purpurea* R. et P.), gleichbreite, 4. w. Mexico, Peru.
pusilla Lindl. (= *Dendrobium pusillum* H. B. K.), kleinste, 4. w. Peru.
scariosa Lindl. (= *Dendrobium scariosum* LaLlav.), trockenhäutige, 4. w. Südamerika.
sertularioides Lindl. (= *Dendrobium sertularioides* Sw. *Epidendrum sertularioides* Sw. = *Pleurothallis sertularioides* Spgl.), sertulariaähnliche, 4. w. Jamaika.

Specularia Heist., A. DC., Venusspiegel.
cordata * (= *Speculum* var. β A. DC. = *Campanula cordata* Visian. = *Prismatocarpus cordatus* Rchb.), herzblätteriger, ⊙. f. Dalmatien.
ghilanensis A. DC. (= *Campanula ghilanensis* Pall.), ghilanischer, ⊙. f. Persien.

Spennera Mart. (Dr. F. C. L. Spenner, ehemal. Prof. der Botanik zu Freiburg im Breisgau, † 1841), X. 1., Lythrariae-Melastomeae.
annua Mart. (= *Melastoma annua* Schrk.), jährige, ⊙. w. Brasilien.
aquatica Mart. (= *Aciotis aquatica* Don, p. 12, = *Melastoma aquatica* Aubl. = *Rhexia aquatica* Sw.), wasserliebende, ⊙. ♄. Wa. w. Südamerika.
Spergella glabra Rchb., *nodosa* Rchb., *saginoides* Rchb., *subulata* Rchb., v. Sagina glabra, nodosa, Linnaei, et subulata, p. 622, II. [1])

Spergula L. (pro parte), Spark.
arvensis L. (= *geniculata* P. = *refracta* Dethar. = *viscosa* Dethard.).
pentandra L. (= *Alsine marginata* Schreb. = *A. pentandra* Crtz. = *Arenaria pentandra* Wallr. = *Spergularia pentandra* G. Don).
viscosa Lagasca, (= *arvensis* L. var. Spgl.), schmieriger, ⊙. f. Spanien.
Sect. II. *Spergella* Rchb. p. 776, v. Sagina p. 622, II.

Spergularia P., Presl, (= *Alsine* Wahlb., M. et K. Sect. I. p. 38, = *Arenaria* Auct. (pro parte) = *Lepigonum* Fries, Fisch. et Mey. = *Stipularia* Haw. = *Spergula* Camb., Bartl., Meisn., Godr.), Spärklein, X. III. (IV.), Caryophyllaceae-Paronychieae (Portulaceae-Paronychieae alior.).
canadensis P. (= *Alsine canadensis* (P.) p. 38, = *Arenaria rubra* β Mch.).
capensis (Fisch. et Mey.), capisches, ⊙. f. Cap d. g. H.
glandulosa * (= *Arenaria* (*Alsine*) *glandulosa* Jacq., p. 38, = *Lepigonum glandulosum* Fisch. et Mey.).
macrorrhiza * (= *Arenaria macrorrhiza* Req., Loisel. = *A. marina* var. δ Steud. = *Spergula macrorrhiza* Godr.), grofswurzeliges, ⊙. ♂. f. Südfrankr., Corsica.
macrotheca (Fisch. et Mey.), (= *Arenaria glandulosa* β *macrotheca* Steud. = *A. macrotheca* Hornem.), grofsbüchsiges, ⊙. f. Californien, Chili.

1) S. macrocarpa Rchb. (= *Spergula saginoides* Pollini), Südl. Tyrol, Oberitalien, würde also auch zu Sagina zu stellen sein.

Digitized by Google

Spergularia
marina (Sm.), (= *Alsine marina* K., Rchb., p. 38, = *Arenaria marina* Sm. = *A. media* Wither. = *A. rubra* β L. Huds. = *Lepigonum marinum* Fr. = *Spergula marina* Bartl. = *Stipularia marina* Haw.).
media P. (= *salina* Presl, = *Arenaria marginata* DC. = *A. marina* β Sm. = *A. maritima* L. flor. Lappon. = *A. pubescens* Steud. = *A. rubra* γ Huds. = *Alsine marginata* Rchb. = *A. marina* M. et K. = *A. media* Crtz. = *Spergula media* Bartl. = *Stipularia media* et *pubescens* Haw.), mittleres, ⊙. f. Europa.
molluginea * (= *Alsine molluginea* Balb., Lagasc., p. 38, = *Arenaria molluginea* Sering. = *Lepigonum mollugineum* Bartl.), weichlingähnliches, ⊙. f. Neuspanien.
purpurea (P.) p. 38.
rubra P. (= *Alsine rubra* Whlbg., p. 38, = *L. rubrum* Fr. = *Stipularia rubra* Haw. = *Spergula rubra* Godr. = *Sp. purpurea* Bernh.).
salsuginea (Fisch. et Mey.), (= *Arenaria salsuginea* Bunge), salzliebendes, ⊙. ♂. f. Sibirien.
β) leiospermum Fisch. et Mey.
segetalis * (*Alsine* seg. L. p. 38), (= *Arenaria segetalis* Lam. = *Alsine unilateralis* Mch. = *Lepigonum segetale* Fisch. et Mey. = *Spergula segetalis* Vill., Godr.).
sperguloides (Fisch. et Mey.), (= ? *Holosteum sperguloides* Lehm.), sparkähnliches, ⊙. f. *Sibirien.*
succulenta (Delil. p. 38), (= *Arenaria* succul. Sering.).
villosa Fisch. et Mey. (= *Alsine* (*Arenaria*) *villosa* Ledeb., p. 39).

Spermacoce Dill., G. F. W. Mey., Zahnwirbel.
hispida L. (= *hirta* Rottl. = *rigida* Salisb.).
longifolia Aubl., langblätteriger, ♄. w. Guiana.
reclinata N. E. (= *diversifolia* H. B. K. sec. Spgl.), zurückgebeugter, ⊙. k. t. Mexico.
suffrutescens Jacq. (= *suffruticosa* Spgl. = *tetragona* Hort. Berol.).
tenuior L. (= *assurgens* Spgl. = *dichotoma* W. herb. = *lanceolata* Hort. = *parviflora* Salisb.).
affinis Pohl, *cornifolia* Fisch., *gracillima* Pohl, *pumila* Pohl, *stricta* L., *tenuis* Pohl, *vaginata* W., *verticillata* Sw. (= *hyssopifolia* P. = *mucronata* N. E. = *stellata* W.), v. Borreria affinis, cornifolia, gracillima, pumila, stricta, tenuis, vaginata, verticillata, p. 74, II., *adscendens* Fisch. (= *Fischeri* Lk.), *hirta* Sw., *stylosa* Lk. (= *crassifolia* Hort.), *villosa* Sw. (= *hirta* Jacq.), v. Mitracarpum Fischeri, hirtum etc., p. 412, II., *exserta* Roxb. (= *sumatrensis* Retz, = *teres* Roxb.), v. Knoxia corymbosa, p. 438 et p. 336, II., *hexandra* Rich. (= *hirsuta* W.), v. Richardsonia scabra, p. 690 et p. 595, II.
Die übrigen Synonyme s. p. 776.

Spermadictyon Roxb., azureum Lindl. (= *scabrum* Spgl. = *Hamiltonia Dulina* Hamilt. = *H. scabra* Don, = *H. suaveolens* var. *azurea* Wall. = *Nonatelia filamentosa* Hamilt.).

Spermaxyrum LaBill., strictum DC. (= *Olax stricta* RBr.).
Spermolepis divaricata Rafin., v. Leptocaulis divaricatus, p. 351, II.

Digitized by Google

Sphacele Benth., Ziestsalbei.
calycina Benth., grofskelchige, 4. ♄. f. b. Californien.
campanulata Benth. (= *Dracocephalum chamaedryoides* Balb. = *Phytoxis acidissima* Molin. = ? *Rosmarinus chilensis* Molina).
Lindleyi Benth. (= *Stachys Salviae* Lindl.).
speciosa St. Hil., prächtige, ♄. w. Brasilien.

Sphaeralcea Juss., St. Hil. (= *Sphaeroma* Schltdl.), Kugeleibisch, XVI. VIII., Malvaceae.
abutiloides Spach, A. Juss. (= *Malva abutiloides* L., p. 490, = *Phymosia abutiloides* Desv.).
angustifolia St. Hil., Spach, (= *Malva angustifolia* Cav. = *Sphaeroma angustifolium* Schltdl.).
elegans G. Don, Sweet, (= *Malva elegans* Cav. = *abutiloides* L. fil.).
floribunda Walp. (= *Malva floribunda* Steud. = *Sphaeroma floribundum* Schltdl.), blüthenreiche, ♄. t. k. Mexico.
lactea Spach, (= *Malva lactea* Ait. = *vitifolia* Cav.).
miniata Spach, (= *Malva miniata* Cav.).
?β) Creeana (Hook.).
Munroana Spach, (= *Malva Munroana* Dougl.), b) major.
obtusiloba Spach, (= *Malva obtusiloba* Hook.).
rosea Don, Sweet, (= *Malva rosea* Moç., Sess. = *umbellata* Cav. var. Spgl. = *Sphaeroma roseum* Schltdl.), rosafarbige, ♄. t. k. Mexico.
umbellata A. Juss. (= *Malva umbellata* Cav. = *Sphaeroma umbellatum* Schltdl.), doldige, ♄. t. k. Neuspanien.

Sphaeranthus L., Klumpenblümchen.
amaranthoides L. (= *zeylanicus* Heyne), amaranthähnliches, 4. w. Ostindien.
microcephalus W. (= *africanus* Wall. et ? L. = *globosus* Wall. = *indicus* L. = *laevigatus* Wall.), kleinköpfiges, 4. w. Ostindien, Java.
suaveolens DC. (= *indicus* Lam. G. = *Polycephalus suaveolens* Forsk.), feinriechendes, 4. w. Aegypten.

Sphaerocarpus racemosus Rich., v. Laguncularia racemosa Nachlese.

Sphaerolobium Sm., Kugelfüfschen.
acuminatum Benth., zugespitztes, ♄. t. Neuholland.
alatum Benth., geflügeltes, ♄. t. Neuholland.
fornicatum Benth., schuppenklappiges, ♄. t. Neuholland.
grandiflorum Benth., grofsbluminges, ♄. t. Neuholland.

Sphaeroma Schltdl., *angustifolium* Schltdl. etc., v. Sphaeralcea angustifolia etc.

Spaeromorphaea DC. (= *Sphaeropsis* Auct.), Kugelbeifufs, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
centipeda DC. (= *Artemisia minima* L. = *Centipeda orbicularis* Lour. = *Cotula minima* L.), kleinster, ☉. f. China.

Sphaerophysa DC., Kugelhülse.
caspica DC. (= *Colutea caspica* MB. = *Phaca salsula* MB.).
salsula DC. (= *Colutea davurica* Spgl. = *Phaca salsula* Pall.), salzliebende, 4. f. Dahurien.

Sphaerospora imbricata et *triphylla* Sweet, v. Gladiolus imbricatus.

Digitized by Google

Sphaerostigma Sering., Vergl. p. 777.

hirtum Fisch et Mey. (= *micranthum* Walp. = *minimum* * [1]) = *Oenothera micrantha* Hornem. = *O. hirta* Lk. Enum. = *Holostigma micranthum* Spach).

minutiflorum Fisch. et Mey. (= *contortum* Walp. = *Oenothera contorta* Lehm.).

Sphaerotele Presl, Kugelamarylle, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

coccinea Lk., Kl., scharlachfarbige, 4. Zw. w. Peru. [2])

peruviana Presl, (= ? *Amaryllis cyrtanthoides* Sims), peruanische, 4. Zw. w. Peru. [3])

Sphallerocarpus Bess., Klitschkümmel, V. II., Umbelliferae.

Cyminum Bess. (= *Chaerophyllum Cyminum* Fisch. = *Ch. gracile* Bess., p. 186, = *Myrrhis gracilis* Spgl.), schlanker, ♂. f. Dahurien, Vollhynien.

Sphenandra Benth., Schleuderbeutel, XIV. II., Personatae-Scrofulariaceae.

viscosa Benth. (= *Buchnera viscosa* Ait. = *Manulea coerulea* Thbg. = *M. rotata* Desr.), schmieriger, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Sphenantha Schrad., Schleuderblume, ? XXI. x., Cucurbitaceae.

scandens Schrad., klimmende, ⊙. Sch. m. f. Mexico.

Sphenogyne RBr., Schleudernarbe.

calendulaeflora DC., ringelrosenblätterige, ⊙. f. Cap d. g. H.

chrysanthemoides Less., wucherblumenähnliche, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

dentata RBr. (= *Arctotis* L., non Thbg. = *A. pectinata* Thbg. = *A. piligera* Berg. = *Ursinia dentata* Poir. = *U. piligera* Poir.).

foeniculacea Less. (= *Arctotis foeniculacea* Jacq. = *Ursinia foeniculacea* Poir.).

microcephala DC., kleinköpfige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

versicolor DC. (= *speciosa* Hort.), buntfarbige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

Sphenopus Trin., divaricatus Rchb. (= *Gouanii* Trin.), v. Sclerochloa Sect. III. p. 734 et 646, II.

Sphenotoma RBr., Swt., Schleuderstrauch.

dracophylloides Hort. Hamburg., drachenblattähnlicher, ♄. t. Neuholland.

squarrosum G. Don, (= *Dracophyllum squarrosum* RBr. = *Epacris squarrosa* Spgl.), sparriger, ♄. t. Neuholl.

Spielmannia Medic., africana W. (= *decurrens* Mch. = *S. Jasminum* Medic. = *Lantana africana* L. = *L. capensis* Thbg. = *L. crispa* Thbg.), p. 477.

Spigelia L., Spigelie.

candida v. Houtte, reinweifse, 4. t. ? Mexico.

Humboldtiana Cham., Schltdl., Humboldt's, 4. t. k. Mexico, Cumana, Montevideo.

Spilanthes Jacq., Fleckblume.

brasiliensis Spgl., brasilianische, ⊙. m. f. Brasilien.

exasperata Jacq. (= *radicans* Jacq., non Schrad. = *Isocarpha* spec. Cass.?).

intermedia DC. (= *Mutisii* H. B. K. var. P. = *Acmella intermedia* Rich.), mittlere, ⊙. m. f. Südamerika.

---

1) Oenothera minima Pursh ist als Synonym p. 556 auszuschliefsen und zu streichen.

2) Vergl. Stenomesson coccineum.

3) Vergl. Stenomesson curvidentatum.

Digitized by Google

Spilanthes

leucocephala Hort. Berol., ? Rchb., weifsköpfige, ⊙. m. f. Südamerika (Caracas).

leucophaea Hort. Berol., weifsbraune, ⊙. m. f. Südamerika.

mauritiana DC. (= *Acmella mauritiana* Rich., P., p. 13).

Mutisii H. B. K. (= *Acmella Mutisii* Cass. = *A. ? occidentalis* P. = *Anthemis americana* Mutis, L. fil. = *A. occidentalis* W. = *A. oppositifolia* Lam. = *Heliopsis dubia* Dun.), Mutis's, ⊙. m. f. Südamerika.

oleracea L. (= *Bidens fervida* Lam. = *B. oleracea* Cav.).

β) fusca Dsf., P. (= *Bidens fusca* Lam.).

radicans Schrad., starkwurzelnde, 4. w. ?

repens Mchx. (= *Acmella repens* P., p. 13, = *Anthemis repens* Walt.), ⊙. 4.

tenella H. B. K. (= *debilis* H. B. K. var. Spgl.), zarte, ⊙. m. f. Caracas.

urens Jacq. (= *repens* Spgl. = *Bidens angustifolia* Lam. = *Cotula Spilanthus* W.), brennende, 4. w. Südam.

Spinacia T., Spinat.

tetrandra Stev., viermänniger, ⊙. f. Armenien.

Spinifex L., Stachelgras, Ill. II., Gramineae.

squarrosus L. (= *Stipa Spinifex* L.), sparriges, 4. w. Ostindien.

Spiraea T., L., Spierstaude.

angustifolia Otto et Dietr. (= *lancifolia* Hortul., non Hffg.), schmalblätterige, ħ. f. ?

angustiloba Turcz. (= *digitata* W. var.? = *lobata β* Steud.), schmallappige, 4. f. Dahurien.

ariaefolia Sm. (= *discolor* Pursh).

belgica Dumort., belgische, ħ. f. Belgien.

callosa Thbg. (= *japonica* L. fil. = *stellata* Wall.), schwielige, ħ. k. f. b. Japan.

β) glauca Wall.

canescens Don, grauliche, ħ. k. f. b. Nepal.

corymbosa Rafin., non Roxb. (= *ceanothifolia* Hornem. = *betulaefolia* Wats., non Pall. = *crataegifolia* Lk.).

cuneifolia Wall., keilblätterige, ħ. t. k. Ostindien.

dasyantha Bunge, rauchblumige, ħ. f. b. China.

decumbens K. (= *flexuosa* Rchb., non Cambess. = *inflexa* Hort.).

digitata W. (= *argunensis* Ledeb. = *palmata* Pall., non L.).

Douglasii Hook., Douglas's, ħ. f. Nordwestl. Amerika.

Filipendula L., *β)* pubescens DC., *γ)* angustifolia Mill.

fissa Lindl., gespaltene, ħ. t. Neugranada.

flabellata Bertol., Guss. (= *chamaedrifolia* Tenore, = *hypericifolia γ* DC.), fächerförmige, ħ. f. Unteritalien.

hypericifolia L. (= *foliosa* Poir. = *picoviensis* Bess. = *crenata* L. var. ?).

incisa Thbg., eingeschnittene, ħ. f. b. k. Japan.

lanceolata Poir. (= *cantoniensis* Lour.), lanzettliche, ħ. k. t. Mascarenas, China.

laxiflora Lindl., lockerblumige, ħ. t. Ostindien (? Westindien).

Lindleyana Wall. (= *Schizotus Lindleyanus* Wall.), Lindley's, ħ. k. f. b. Himalayagebirge.

lobata Jacq., Murr. (= *palmata* L. fil., non Pall. nec Thbg.).

Menziesii Hook., Menzies's, ħ. f. Nordwestl. Amerika.

opulifolia L., *β)* mollis Walp. (= *capitata* Pursh, = *ribifolia* Nutt.), *γ)* pauciflora Nutt. (= *monogyna* Torrey), *δ)* ferruginea Nutt.

Digitized by Google

Spiraea

prunifolia Sieb. et Zuccar. (= *crenata* var. Thbg.), pflaumenblätterige, ħ. ħ. k. f. b. Corea, Nördl. China.
b) fl. pleno. (In den japanischen Gärten häufig kultivirt, auch verwildert.)

quinqueloba Baumg., fünflappige, 4. f. Siebenbürgen.

Reevesiana Lindl. (= *corymbosa* Roxb., non Rafin.), Reeves's, ħ. ħ. k. f. b. China, Nordindien.

salicifolia L., var. rubicunda Hort.

Schrenkiana C. A. Mey., Schrenk's, ħ. f. Soongaria.

Thunbergii Sieb. et Zuccar. (= *crenata* Thbg., non L.), Thunberg's, ħ. k. f. b. Japan.

Ulmaria L., *β)* denudata Presl, *γ)* glauca Schultz, var. fol. variegatis Hort.

Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch folgende (ohne nähere Angabe des Vaterlandes) erwähnt: canadensis Hort., cuneifolia Wender., lancifolia Hffg., nana Hort., oblongata Wender., ovata Hort., venusta Hort.

japonica Hort. belg., v. Hoteja japonica, p. 305, *japonica* Cambess., v. Keria japonica, p. 437.
Spiralepis D. Don, *declinata* D. Don, *modesta* D. Don, v. Helichrysum declinatum et gnaphaloides, *glomerata* D. Don, *squarrosa* D. Don, v. Leontonyx glomeratus et squarrosus, p. 453.
Spiranthera Hook. (non St. Hil.), *elegans* Hook., v. Pronaya elegans, p. 657 et p. 561, II.

Spiranthes Rich., Wendelähre.

africana Lindl. (= *Habenaria spiralis* Rich. = *Satyrium spirale* Pet. Th.), afrikanische, 4. Kn. w. Mascarenas, Madagascar.

diuretica Lindl. (= *Nuil* Rich. = *Ophrys unilateralis* Poir.).

grandiflora Lindl. (= *Neottia grandiflora* Hook.), grofsblumige, 4. Kn. w. Brasilien.

Lindleyana Lk., Kl., Otto, Lindley's, 4. Kn. w. Südamerika (La Guayra).

quadridentata Lindl. (= *Neottia quadridentata* W. = *Ophrys peruviana* Aubl. = *O. quinquelobata* Poir.), vierzähnige, 4. w. Westindien.

variegata Kl., bunte, 4. w. Südamerika (La Guayra).

In van Houtte's Établissement horticole wird noch S. aurantiaca und diaphana kultivirt, deren Vaterland mir unbekannt ist.

argentea Hort. Cels., v. Anoectochilus setaceus, p. 61, *Llaveana* Lindl., v. Neottia micrantha, p. 432, II., *picta* Lindl., v. Sarcoglottis picta, p. 632, II.

Spirodela Schleiden, polyrrhiza Schleid. = Lemna polyrrhiza L. (et orbicularis Kit.), p. 452.

Spironema Lindl. (non Hochst.), Drehfaden, VI. 1., Commelynaceae.

fragrans Lindl., wohlduftender, 4. t. w. Mexico.
Spitzelia aegyptiaca Schultz Bipont., *coronopifolia* Schulz Bipont., v. Picris pilosa et coronopifolia, p. 523 et 524, II.
Spixia Schrk. (non Leand.) *violacea* Schrk., v. Amphorephis intermedia, p. 49.

Spondias L., Mombinpflaume.

acida Blume, säuerliche, ħ. w. Java.

axillaris Roxb., achselständige, ħ. w. t. Nepal.
elliptica Rottl., *simplicifolia* Rottl. (= *Mangifera*

Digitized by Google

Spondias
axillaris Desv.), v. Buchanania latifolia et angustifolia, p. 136.

Sponia Commers., Decaisn., Sponie, V. II. (XXIII. 1.), Urticaceae-Ulmaceae.
canescens Decaisn. (= *Celtis alhicans* W. herb. = *C. canescens* H. B. K., p. 129, II.).
crassifolia G. Don, (= *Celtis cordata* Dsf. = *C. cordifolia* Duham. = *C. crassifolia* Lam., p. 175, = *C. orientalis* Hort.).
? Lima Decaisn. (= *Celtis Lima* Sw., p. 175).
micrantha Decaisn. (= *Celtis micrantha* Sw., p. 175, = *Rhamnus micranthus* L.).
orientalis G. Don, (= *Celtis orientalis* L., non Mill. et Hort., p. 175).
pumila G. Don, (= *Celtis pumila* Pursh, p. 175, = ? *C. tenuifolia* Lam. = *C. trinervia* Lam.).
? sinensis Decaisn. (= *Celtis sinensis* P., p. 175).
Willdenowiana G. Don, (= *Celtis sinensis* W. herb. = *C. Willdenowiana* Schult.), Willdenow's, ħ. f. China.
occidentalis G. Don, v. Celtis occidentalis, p. 175 et p. 129, II.

Sporobolus RBr., Strausshalm.
II. Vilfa Adans., P. B., Trin.
compressus Kunth, P. B. (= *Agrostis compressa* Torrey, = *A. Torreyana* Schult. = *Colpodium compressum* Trin.), platthalmiger, 4. f. Nordamerika.
diandrus RBr. (= *orientalis* Kunth, = *Agrostis orientalis* N. E. = *A. tennacissima* L. fil., non Jacq.), 4. nicht ⊙. wie p. 779 angegeben ist.
dispar (P. B.), (= *Agrostis dispar* Mchx. = *Cornucopiae dispar* Walt. = *Trichodium elatum* Pursh), ungleicher, 4. f. Carolina.
junceus Kunth, (= *Agrostis juncea* Mchx. = *Bennetia* Rafin. = *Colpodium junceum* Trin. = *Heleochloa juncea* P. B.), simsenförmiger, 4. f. Nordamerika.
minutiflorus Lk. (= *Agrostis minutiflora* Dsf. etc., p. 779). Brasilien.
pungens Kunth, (P. B.), (= *Agrostis pungens* Schreb. = *Podosaemum pungens* Lk. = *Uniola pungens* P. B.).
spicatus Kunth, (P. B.), (= *Agrostis spicata* Vahl, non Thbg. = *A. virginica* Forsk.), ähriger, 4. k. w. Aegypten, Arabien, Senegal.
trichodes (H. B. K.), (= *Agrostis trichodes* R. et S. = *Aira trichodes* Spgl.), haarähnlicher, ⊙. f. Peru.
virginicus Kunth, (P. B.), (= *Agrostis virginica* L. = *Podosaem. virginic.* Lk.).

Sprekelia Heister[1]), (Baron v. Sprekelsen, ehemal. Secretair d. freien Stadt Hamburg), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
formosissima Herb. (= *S. Heisteri* Trew, = *Amaryllis formosissima* L., p. 44, = *Iris suecica* Hort.), (The Jacobea Lyli Anglor.). Wurde schon 1593 in Europa eingeführt.
glauca Lem., blaugrüne, 4. Zw. w. Südamerika.
stenopetala Lem., schmalkronige, 4. Zw. w. Südamerika.

---

1) Kaum als Gattung, höchstens nur als Unterabtheilung von Amaryllis anzusehen.

Digitized by Google

Sprengelia Sm., Sprengelie.

propinquua Cunn.. verwandte, ♄. t. Van Diemens Land.

Squilla Steinh., Meerzwiebel, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

maritima Steinh. (= *Ornithogalum maritimum* Lam. Brot., p. 568, = *O. Squilla* Ker, = *Scilla maritima* L. = *Stellaris Scilla* Mch. = *Urginia Scilla* Steinh.), gebräuchliche, 4. Zw. k. Süd- u. Westeuropa.

Stachys L., Ziest, Rofspolei.

affinis Fresen. (= *orientalis* Forsk. = *palaestina* Vahl, non L. = *pauciflora* Benth.), ähnelnder, 4. ♄. k. Aegypten, Arabien.

alpina L., *β*) intermedia Ait. (= ?*cretica* L. spec. = *orientalis* L.), *γ*) sibirica Lk. Enum. (= *curviflora* et *urticaefolia* Tausch).

arenaria Vahl, (= *congesta* d'Urv. = *diffusa* Schweig. = *iberica* MB. = *prostrata* Lag. = *purpurea* Poir. = *rubra* Don, = *scordifolia* W.). Süd-, West- u. Osteuropa, Kleinasien, Nordafrika.

arvensis L. (= *brasiliensis* Hort. = *Trixago arvensis* Hffg., Lk. = *T. colorata* Presl, = *T. cordifolia* Mch.). Europa, Nordafrika, Mittelasien.

aspera Mchx. (= *arvensis* Walt. = *hispida* Pursh).

baicalensis Fisch., baicalischer, 4. f. Sibirien.

Bridgesii Benth., Lindl., Bridges's, 4. k. t. *Mittägl. Chili.*

cardinalis Kunze, (= *coccinea* plur. Hort., non Jacq. = *coccinea grandiflora* Hort.), cardinalrothe, 4. k. f. b. ?

circinnata L'Her. (= *latifolia* Ait. = *velutina* W.).

Drummondii Benth., Drummond's, ⊙. f. Mexico.

eriantha Benth., wollblumiger, ⊙. f. Mexico.

fragilis Visian., zerbrechlicher, 4. f. Dalmatien.

germanica L. (= *Eriostomum germanicum* et *lusitanicum* Hffg., Lk.), *β*) polystachya Ten. (= *E. polystach.* Presl), *γ*) dasyantha Rafin., *δ*) excelsa Hort. — *acutifolia* Bory, Lk., *alba* Mill., Latour, *argentea* Tausch, *biennis* Roth, *cinerea* Hortul., *cretica* Sibth., Sm. (L. ex parte), *elongata* Hort., *heterophylla* Mch., *intermedia* Hortul., non Ait., *lanata* Crtz., *lusitanica* Steud., *nova* Sadler, *orientalis* Hortul., non L., *pannonica* Lang, *sibirica* Hortul., *spectabilis* Choisy, *tomentosa* Gater., *verbascifolia* Hortul., gehören nach Bentham als Synonyme zu St. germanica oder scheinen ihm zum Theil nur geringfügige Varietäten zu sein.

heraclea All. (= *barbata* Lapeyr. = *intermedia* Tenore, = *phlomoides* W. Enum.), *β*) obliqua W. K. (= *orientalis* Vahl).

hirta L. (= *divaricata* Vivian. = *inscripta* Rchb.).

italica Mill., Jan, (= *altissima* Hort. Par. = *salviaefolia* Tenore, = *Eriostomon salviaefolium* Presl), italienischer, Italien, Istrien, Syrien.

β) pungens Russel, (= *Sideritis hirsuta* Sbr.).

lanatum Jacq. (= *Eriostomon lanatum* Hffg.).

maritima L. (= *betonicaefolia* P.).

marrubiifolia Vivian. (= *arvensis β purpurea* Poir. = *Poiretii* Tenore), andornblätteriger, ⊙. f. Corsica, Nordafrika.

menthaefolia Visiani, (= *grandiflora* Host), münzenblätteriger, 4. f. Dalmatien.

mucronata Sbr., stachelspitziger, 4. ♄. k. f. b. Creta.

Digitized by Google

Stachys

palustris L. (= *affinis* Bunge, = *angustifolia* Gilib., non MB. = *austriaca* * = *segetum* Hagen).
β) ambigua Sm., Rchb. (= *palustri-sylvatica* Schiede).

pubescens Tenore, (= *Balbisii* Lk. = *decumbens* W. Enum. = *procumbens* W. herb.), weichhaariger, 4. f. Lucanien, Dalmatien, Spanien.

ramosissima Roch., ästigster, 4. f. ? Ungarn.

recta L. (= *Betonica* Crtz. = *bufonia* Thuill., = *decumbens* Rchb. = *procumbens* Lam. = *Sideritis* Vill. = *sylvestris* Forsk.).

sericea Wall. (= *persica* Gmel. jun.), seidenhaariger, 4. f. b. k. Caucasus, Persien, Mittelasien.

splendens Wall., schimmernder, 4. t.-w. Ostindien.

subcrenata Visiani, (= *recta* β Bertol.), wenigkerbiger, 4. f. Dalmatien.

sylvatica L. (= *cordatofolia* Gilib. = *glaucescens* W. herb.), β) canariensis Jacq.

tenuifolia Fisch. (non Pall.), dünnblätteriger, 4. f. Asiatisches Rufsland.

Tournefortii Poir., Tournefort's, 4. f. b. k. Creta.

truncata Kunze, abgestutzter, ⊙. f. Chili.

Alopecuros Benth., *Betonica* Benth., non Scopol., *densiflora* Benth., *discolor* Benth., *grandiflora* Benth., *integrifolia* Vahl, *longifolia* Benth., v. Betonica Alopecurus, officinalis cum variet., hirsuta et incana, nivea, grandiflora, heraclea, orientalis, p. 120 et p. 67, II., *decemdentata* Forster, v. Leucas decemdentata, p. 354, II., *speciosa* Hook., v. Gardoquia elliptica, p. 254, II. Die übrig. Synonyme s. p. 781.

Stachytarpheta Vahl, Dichtähre.

aristata Vahl, (= *Verbena aristata* Vahl), grannige, ♄. w. Südamerika.

ciliata Kunze, (= *jamaicensis* Hort.), gefranzte, ♂. ♄. w. Jamaika.

crassifolia Schrad., dickblätterige, ♄. w. Brasilien.

dichotoma Vahl, (= *Verbena dichotoma* R. et P. = *V. jamaicensis* L.), zweizinkige, ♄. w. Mexico, Peru.

elatior Schrad. (= *palustris* Jacq. fil.), höhere, ⊙. m. w. Brasilien, Guiana.

gibberosa Rchb. (= *jamaicensis* Vahl var.?), höckerige, ♂ w. ?

hirsuta Jacq. fil., rauhhaarige, 4. w. Brasilien.

hirsutissima Lk. (= ? *hirta* H. B. K.).

mutabilis Vahl, (= *rosea* Hort. = *Cymburus mutabilis* Salisb. = *Verbena mutabilis* Jacq.), β) Zuccagni R. et S. (= *Zapania mutabilis* Zuccagni).

quadrangula N. E., Mart., vierkantige, ♄. w. Brasilien.

squamosa Vahl, (= *Verbena squamosa* Jacq.), schuppige, 4. w. ?

urticaefolia Sims, (= *Cymburus urticaefolius* Salisb. = *Zapania urticaefolia* Poir.), nesselblätterige, ♂. 4. w. Südamerika. [1])

Stadmannia trijuga Spgl. etc., v. Melicocca trijuga etc., p. 607.

Staehelina L., Staehelina.

apiculata LaBill. (= *Lobelii* DC. = *syriaca* Spgl. = *Serratula apiculata* Poir.), kurzspitzige, ♄. k. Libanus.

---

1) Stachyurus Sieb., Zuccar., ? Pittosporeae, japonicus Sieb., Zuccar., wird bis jetzt kaum kultivirt.

Digitized by Google

Staehelina

dubia L. (= *rosmarinifolia* Cass. = *Serratula conica* Lam. = *S. dubia* Brot.).

fruticosa L. (= *Centaurea fruticosa* L. = *Hirtellina lanceolata* Cass. = *Serratula fruticosa* L.), strauchige, ♄. k. Creta.

alpina Schrk., v. Saussurea alpina, p. 734, *elegans* Walt., v. Liatris elegans, p. 461.

Stalagmites Murray, *Cambogia* P. (= *cambogioides* Murr. = *ovalifolia* Don), *dulcis* Cambess., *pictorius* G. Don, v. Xanthochymus ovalifolius, dulcis, pictorius, p. 859.

Stanhopea Hook., Lindl., Stanhopea.

aurantiaca Lodd., orangefarbige, 4. w. Südamerika (La Guayra).

aurea Lodd., goldfarbige, 4. w. Guatemala.

Bucephalus Lindl. (= *Anguloa grandiflora* H. B. K., p. 60, = *Epidendrum grandiflorum* H. B. K. pl. aeq.), stierköpfige, 4. w. Quito, Guayaquil.

Devoniensis Lindl. (= *maculosa* Hort. angl. = *Anguloa Hernandesii* Kunth, = *Maxillaria lyncea* Lindl.), Devonshirische, 4. w. Mexico.

eburnea Lindl. (= *grandiflora* Lindl. = *Ceratochilus grandiflorus* Lodd.), var. gracilis, odorata, punctata Hort. Brasilien, Trinidad.

graveolens Lindl., starkriechende, 4. w. Peru, Guatemala. var. alba, major Hort.

guttata ? Lindl., getüpfelte, 4. w. Südamerika.

Harrisoniae Lodd., Harrison's, 4. w. Brasilien.

inodora Lindl., geruchlose, 4. w. Mexico.

insignis Frost, Hook. (= *Anguloa grandiflora* Hort. = *Ceratochilus insignis* Lindl.), var. major, punctata, speciosa. Brasilien. Quito.

Lindleyi Zuccar., Lindley's, 4. w. Mexico.

Martiana Batem., Martius's, 4. w. Guatemala, Mexico. *β)* bicolor Lindl.

oculata Lindl. (= *Lindleyi* Batem., non Zuccar. = *Ceratochilus oculatus* Lodd.), var. Barkeri Lindl., minor Hort.

Ruckerii Lindl., Rucker's, 4. w. Mexico.

saccata Batem., sackförmige, 4. w. Guatemala.

venusta Lodd. (= *Wardii* var. ? Lindl.), liebliche, 4. w. Brasilien.

Wardii Lodd., Ward's, 4. w. Mittelamerika.

In van Houttes Établissement horticole werden noch kultivirt: calceolata, contracta, ecornuta, odoratissima, punctatissima, uncinata.

Stanleya Nutt., Stanleya.

gracilis DC. (= *Cleome laevigata* Soland.), schlanke, ☉. f. Nordamerika.

Stapelia L., Stapelie [1]), p. 782.

Sect. I. Stapletonia Endl.

cactiformis Hook., fackeldistelähnliche, 4. ♄. t. w. Südafrika (Namaqualand). (? Sect. III. Podanthes.)

rufescens Salm Dyck, (= *fissirostris* Hort., non Jacq.), fuchsröthliche, 4. ♄. t. w. Cap d. g. Hoffn.

acuminata Mass., ambigua Mass., Asterias Mass., comata Jacq., concinna Mass., deflexa Jacq., *β)* obscura Endl.

---

1) Revidirt nach Decaisne in DeCandolle prodromus S. n. r. v. Vol. VIII. p. 658 u. f.

Digitized by Google

Stapelia

(= *Duvalia deflexa* G. Don), fissirostris Jacq., glandulifiora Mass., grandiflora Mass., hamata Jacq., hirsuta L., juvencula Jacq., lucida DC., multiflora DC., patula W. Enum. (= *sororia* Jacq. var.), pulvinata Mass., reflexa Haw. (= *deflexa* Jacq. et Hortul.), rufa Mass., sororia Mass., spectabilis Haw. (= *grandiflora* Sims, excl. Synon.).

Sect. II. Gonostemon Haw.

divaricata Mass., pallida Wendl., pilifera L. suppl., stricta Sims.

Sect. III. Podanthes Haw.

ciliata Thbg., irrorata Mass., pulchella Mass., pulchra Haw. (= *variegata* Hort. = *verrucosa* Hort., non Mass.), var. β Simsii * (= *verrucosa pulchella* Hort., non Mass.), pulchella Mass., roriflua Jacq., verrucosa Mass.

Sect. IV. Tridentea Haw.

depressa Jacq., gemmiflora Mass., hircosa Jacq. (= *moschata* Haw.), paniculata W. Enum. suppl., rugosa Jacq., Simsii R. et S. (= *vetula* Sims, non Mass.), stygia Haw., vetula Mass.

Sect. V. Tromotriche Haw.

Tigridia Decaisn. (= *revoluta* Sims, non Mass.), tigerstreifige, 4. ♄. t. w. Cap d. g. Hoffn.

fusca Jacq. (= *glauca* β Haw.), glauca Jacq., obliqua W. Enum. suppl., pruinosa Mass., revoluta Mass.

Sect. VI. Caruncularia Haw., G. Don.

laevis Decaisn. (= *pedunculata* Sims, non Mass. = *Caruncularia Simsii* Sweet), glatte, 4. ♄. t. w. Cap der guten Hoffnung.

Jacquini (Sweet), (= *pedunculata* Jacq.), Jacquin's, 4. ♄. t. w. Cap d. g. Hoffn.

aperta Mass., pedunculata Mass., ramosa Mass., serrulata Jacq. (= *Obesia serrulata* Haw.).

Sect. VII. Orbea Haw.

atropurpurea Salm Dyck, schwarzpurpurfarbige, 4. ♄. t. w. Cap d. g. Hoffn.

dejecta Salm Dyck, herabgeworfene, 4. ♄. t. w. Cap der guten Hoffnung.

anguina Jacq., bisulca Donn, (= *trisulca* Jacq.), bufonia Jacq., clypeata Jacq., conspurcata W. Enum. suppl., clypeata Jacq., Curtisii R. et S. (= *variegata* Curt.), inodora Haw., lepida Jacq. (= *Podanthes lepida* Haw.), maculosa Jacq., marginata W. Enum. suppl., marmorata Jacq., mixta Mass., mutabilis Jacq. (= *rufa* Mass.), normalis Jacq. (= *bufonia* Bot. mag., Lk. Enum.), orbicularis Andr., Donn, picta Donn, (= *variegata* Jacq.), planiflora Jacq., β) obscura Endl., quinquenervis R. et S. (Haw.), retusa Haw., variegata L., Wendlandiana R. et S. (= *rugosa* Wendl., non Jacq.), Woodfordiana Haw.

Sect. VIII. Obesia Haw.

decora Mass., geminata Mass.

Sect. IX. Duvalia Haw.

concolor Salm Dyck, einfarbige, 4. ♄. t. w. Cap d. g. H.

caespitosa Mass., compacta Haw., elegans Mass., hirtella Jacq., Jacquiniana R. et S. (= *radiata* Jacq.), mastoides Jacq., radiata Sims, reclinata Mass., replicata Jacq., tuberculata Haw.

Digitized by Google

Stapelia

Sect. X. Pectinaria.

articulata Mass., mammillaris L. mant.

Weniger genau gekannte Arten:

canescens Haw., caudata Thbg., cordata Haw., crassa Donn, flavicomata Haw., glomerata Haw., hirtella Haw., ?Jacq., hispidula Hornem., laevigata Haw., lanifera Haw., Massoni Haw., melliflua Blanco (Philippinen), ophiuncula Haw., quadrangula Blanco (Philippinen), stellaris Haw.

arida Mass., *incarnata* L. suppl. etc., v. Piaranthus aridus, incarnatus etc., p. 523, II., *barbata* W., *campanulata* W., *crispa* Hortul., *guttata* Mass. (= *lentiginosa* Sims), *humilis* Mass., *ocellata* Jacq., *reticulata* Mass., *tubata* Jacq. et *duodecimfida* Jacq., *venusta* Mass., v. Huernia barbata, campanulata etc., *chinensis* Lour., v. Hoya carnosa, *europaea* Guss. (= *Gussoneana* Jacq. fil.), v. Apteranthes Gussoneana, p. 40, II., *umbellata* Roxb., v. Bucerosia umbellata, p. 80, II.

Staphylea L. (= *Staphylodendrum* Scopol.), Pimpernufs.

Bumalda DC. (= *Bumalda trifolia* Thbg.), japanische, ħ. k. Japan.

occidentalis Sw. (= *Turpinia occidentalis* Sweet), westindische, ħ. w. Westindien.

Starkea W. (= *Starkia* Juss.) *pinnata Natt.*, v. Aplopappus spinulosus, p. 68, *umbellata* W., v. Liabum Brownei, p. 460.

Statice L. (= *Limonium* Adans., Mill., Mch.), Wegerichnelke.

I. Genuina.

acerosa MB. (= *Echinus* W. spec. non L.).

aegyptiaca P. (= *tripteris* Hort. Par.), aegyptische, 4. k. Aegypten.

angustifolia Tausch, (= *Limonium* L. var.), schmalblätterige, 4. f. Oestr. Litorale.

aristata Sibth., Sm. (= *?echioides* W. Enum.), begrannte, 4. ħ. k. Cypern, Creta.

auriculaefolia Vahl, (non Poir. nec Guss.).

β) ramosa Endl.

bellidifolia DC., non Sm. (= *cordata* Sauvr. = *S. Limonium* γ *bellidifolium* Gouan), maſsliebenblätterige, 4. f. Südfrankreich, Ungarn.

bicolor Bunge, zweifarbige, 4. f. b. Nordchina.

coralloides Tausch, corallenähnliche, 4. f. Sibirien.

cordata L. (= *maritima* β Lam. = *obtusa* Dum.Cours.).

decipiens Ledeb. (= *reticulata* Sievers, non L.), täuschende 4. f. Altaisches Sibirien.

echioides L. (= *aspera* Lam. = *sibirica* Dum.Cours.).

eximia Schrenk, ausgezeichnete, 4. f. Caucasus.

flexuosa L. (= *rosea* Pall.).

Fortunei Hort. angl., Fortune's, ħ. k. ?China.

furfuracea Rchb. (= *cancellata* Bernh. = *?pruinosa* Forsk. = *pubescens* DC. var. Spgl. = *rorida* Auct. fl. Dalmat.), kleiige, 4. ħ. f. b. k. Spanien, Dalmatien.

glauca Less., blaugrüne, 4. f. Sibirien.

globulariaefolia Dsf. (= *ramosissima* Poir.).

glomerata Tausch, (= *spathulata* Auct. fl. Sardin.), knaulförmige, 4. f. b. Sardinien.

intermedia Gussone, mittlere, 4. f. Sicilien.

Digitized by Google

Statice

lanceolata Lk., Hffg., lanzettliche, ♄. k. Portugal.

latifolia Sm. (= *coriaria* Pall. MB. = *coriacea* Hort.). b) fol. variegat., *β*) caspica Endl.

Limonium L. (= *maritima* Lam. = *Limonium vulgare* Mill., Mch.), *β*) humile Mill., *γ*) narbonnense Mill., *δ*) limonioides Bernh.

macrophylla Lk. (= *platyphylla* Hort.).

macrorrhiza Ledeb., grofswurzelige, 4. f. Alt. Sibirien.

monopetala L. (= *scabra* Hort. = *suffruticosa* Hort. = *Limoniastrum articulatum* Mch. = *L. siculum* Mill.), *β*) angustifolia Hort. Par., *γ*) denudata Hort. (= *grandiflora* Hort.).

mucronata L. (= *crispa* Dum.Cours. = *speciosa* Hort. non L.).

pruinosa L. (= *aphylla* Forsk.).

pubigera Dsf., wenighaarige, ♄. k. ?

purpurea L. (= *peregrina* Berg.).

reticulata L. (= *divaricata* Cav. = *echioides* Hort. = *oleaefolia* Host), *β*) dictyophora Tausch.

rosea Sm., rosafarbige, ♄. t. k. Südafrika.

rupicola Badaro, (= *acutifolia* Rchb. = *minuta* Moretti, non L.), Felsen-W., 4. f. Oberitalien.

rytidophylla Lindl. (= *Dicksonii* Hook. = *grandiflora* Hort.), runzelblätterige, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Sibthorpiana Steud. (= *bellidifolia* Sibth., Sm.), Sibthorp's, 4. f. b. k. Griechenland.

spathulata Dsf. (= *cordata* Poir. = *glauca* P.).

squamata Poir., Dsf., schuppige, ♄. k. Aegypten.

tatarica L. (= *trigona* Pall. = *trigonoides* H. Par. = *Limonium latifolium* Mch. = *L. tataricum* Mill.). ?*β*) rubella Gmel.

Thouini Vivian., Hornem. (= *alata* W. = *sinuata β* L. = *Limonium africanum* Mill.), Thouin's, ♂. 4. k. Aegypten.

tubiflora Delil, röhrenblüthige, 4. k. Aegypten.

virgata W. (= *echioides* Hort. = *reticulata γ* W. spec.).

Willdenowiana Poir. (= *auriculaefolia* Poir., non Vahl, = *auriculae-ursifolia* Pourr. = *ocymifolia* Poir. = *oleaefolia* Scop. = *spathulata* W., non Dsf.).

Unbestimmtere: alba Hort., atrorubra Hort. (wahrscheinlich zur Gattung Armeria gehörig), auriculata Hort., cordifolia Hort., dentata Hort., echinata Hort. Gorenk., Maurocenia Dum.Cours., molinensis Hort., primulifolia Hort Prag, rosea Hort., Reinwardtii Hort., sanguinea Hort.

II. Taxanthema RBr.

australis Spgl. (RBr.), (= *S. taxanthema* Schult.), neuholländische, 4. ♄. k. t. Neuholland.

ulliacea Cav., *alpina* Steud. (= *montana* Mill.), *Armeria* L. et Auct., *denticulata* Bertol. (= *canescens* Hook.), *fasciculata* Vent., *grandiflora* Hort., *hirta* Steud. (= *littoralis* W., non Lk.), *humilis* Steud. (= *caespitosa β* Poir.), *juniperifolia* Vahl, (= *caespitosa* Cav.), *Pseudo-armeria* Murray, (= *cephalotes* Ait.), *littoralis* Steud. (= *Armeria* Brotero), *maritima* Mill. (= *pubescens* Sm. = *caespitosa* Poir. = *linearifolia α* Loisel.), *pinifolia* Brot. (= *capillifolia* Poir.), *plantaginea* All. (= *Pseudo-armeria* Brot. = *cephalotes* Schousb.), *pungens*

Digitized by Google

Statice

Brotero, *splendens* Lag., v. Armeria alliacea, alpina, denticulata, fasciculata, grandiflora, hirta, humilis, juniperifolia, latifolia, littoralis, maritima etc., p. 79 et p. 45, II.

Stauntonia DC., (G. Staunton, engl. Naturforscher, Begleiter des Lord Macartnei nach China), XXII. x. (VI. III.), Menispermeae.

angustifolia Steud. (= *Holboellia angustifolia* Wall.), schmalblätterige, ♄. Sch. w. Ostindien.

chinensis DC., chinesische, ♄. Sch. t. China.

latifolia Steud. (= *Holboellia latifolia* Wall.), schmalblätterige, ♄. Sch. w. Ostindien.

Stauropharagma Fisch. et Mey., Kreuzmaske, XIV. II., Personatae-Verbascae.

natolicum Fisch. et Mey., natolische, ♂. k. f. Natolien. *Staurospermum verticillatum* Thonn., v. Mitracarpum senegalense, p. 412, II.

Steegia Lavatera DC., v. Lavatera trimestris, p. 450.

Steenhammara Lilja, (= *Steenhammera* Rchb., Turcz.) *dahurica* Turcz., *maritima* Rchb. etc., v. Mertensia dahurica, maritima etc., p. 399 et 400, II.

Steffensia Kunth, *acutifolia* Kunth, *aduncа* Kunth, *ampla* Kunth etc., v. Piper acutifolium, aduncum, amplum, etc., p. 628 et p. 530, II.

Stegania Patersonii RBr., Lk., v. Lomaria Patersonii, p. 475.

Steganotropis conjugata Lehm., v. Centrosema conjugatum, p. 132, II.

Stegosia cochinchinensis Lour., v. Rottboellia exaltata, p. 701.

Steinheilia Decaisne, (A. Steinheil, Pharmaceut, botanisirte früher um Algier, † 1839 auf der Ueberfahrt nach Caracas), V. II., Asclepiadeae.

radians Decaisne, (= *Asclepias radians* Forsk. = *Cynanchum radians* Lam.), strahlende, 4. t. Glückl. Arabien. *Steironema* Rafin., *ciliata* Rafin., *longifolia* Rafin., v. Lysimachia ciliata, longifolia, p. 485—486.

Stelis Sw., Stelis.

angustifolia H. B. K. (= *polystachya* W. var.), schmalblätterige, 4. w. Neugranada.

ciliata Lk., Kl., Otto, gefranzte, 4. w. Mexico.

concinna Lindl., nette, 4. w. Peru.

grandiflora Lindl., grofsblumige, 4. w. Guiana.

macrostachya ? Lindl., grofsährige, 4. w. Südamerika.

micrantha Sw. (= *parviflora* P. = *Dendrobium et Epidendrum micranthum* Sw. = *Humboldtia parviflora* R. et P.).

minutiflora Rchb. (= *Pleurothallis minutiflora* Hffg.), winzigblumige, 4. w. Brasilien (Rio Janeiro).

picta ? Lindl. (Hort. Cels.), bemalte, 4. w. Südamerika.

polystachya W. (= *floribunda* H. B. K. = *Humboldtia polystachya* R. et P.), vielährige, 4. w. Südamerika. *lanceolata* W., *pulchella* H. B. K., v. Pleurothallis lanceolata et pulchella, p. 540, II., *purpurea* W., P., v. Specklinia linearis.

Stellaria L., Godron, Sternmiere.

brachypetala Bunge, Ledeb., kurzkronige, 4. f. Alt. Sibirien.

cerastoides L. (= *elegans* Sering. = *glaucosa* Turcz.

Digitized by Google

Stellaria
= *multicaulis* W. = *Cerastium elegans* Fisch. = *C. stellarioides* Hartm. = *C. trigynum* Vill.).
cuspidata W., feinspitzige, 4. t. k. Quito.
florida Fisch., blüthenreiche, 4. f. Kamtschatka.
Laxmanni Fisch., 4. nicht ⊙.
peduncularis Bunge, Ledeb. (= *Edwardsii* Cham., Schltdl.), langstielige, 4. f. Altaisches Sibirien.
pentagyna Gaud. (= *aquatica* Scop. = *Cerastium aquaticum* L. = *Malachium aquaticum* Fr.), fünfmännige, 4. f. Europa.
Reichenbachii Wierzb., Reichenbach's, 4. f. Banat.
Saxifraga Bertol. (= *Cerastium latifolium* Vitm.), steinbrechartige, 4. f. Apenninen.
velutina Sering. (= mollis Fisch.).
biflora L., v. Alsine biflora, p. 38, *viscida* MB. (= *anomala* Rchb. = *dubia* DC. = *subulosa* Fisch.), nach Godron richtiger Cerastium anomalum.
Hinsichtlich der übrigen s. Larbrea, p. 342, II. *Stellaria* Hall., Wigg., *autumnalis* Wigg., *intermedia* Wigg., *verna* Wigg., v. Callitriche autumnalis etc. *Stellaris* Steinh., *parviflora* Steinh., v. Scilla parviflora, p. 644.

Stellera Turcz., non L. (Steller, bereiste als Naturforscher Sibirien, Kamtschatka, †), V. II., Contortae-Gentianeae.
cyanea Turcz. (= *Anagallidium tetrapetalum* Griseb. = *Swertia tetrapetala* Pall.), kornblumenblaue, ⊙. f. Ostsibirien, Kamtschatka.
Stemmacantha cynaroides Cassin., *ficifolia* Turcz., v. Rhaponticum cynaroides, atriplicifol., p. 683.

Stemodia L., Spaltfädler.
bartsioides Benth., Bartsiaähnlicher, 4. ♄. t. k. Mexico.
durantifolia Sw. (= *verticillaris* Lk., p. 786, = *Capraria durantifolia* L. = *Conobea verticillaris* Spgl. = *C. viscosa* Schrk.).
Ehrenbergiana Schltdl. (= *durantifolia* Hort.), Ehrenberg's, ♂. t. k. Mexico.
hyptoides Cham., Schltdl., Hyptisähnlicher, 4. w. Brasilien.
lanata R. et P. (= *Erinus tomentosus* Mill. = *Herpestis tomentosa* Cham., Schltdl.), wolliger, 4. t. Mexico.
lobelioides Lehm. (= *Gratiola tetragona* Hook. = *G. Hookeri* Walp.)
parviflora RBr. in Ait. Kew. (= *arenaria* H. B. K. = *Erinus verticillatus* Mill. = *Conobea ovata* Hort. = *C. pumila* Spgl. = *Capraria humilis* Soland.).
senegalensis Dsf., senegalscher, ⊙. w. m. f. Senegambien.
muraria Roxb., v. Lindenbergia urticaefolia, p. 882, *minuta* G. Don, v. Vandellia scabra.

Stemona Lour., Stemona, VIII. 1., Roxburghiaceae.
tuberosa Lour. (= *Roxburghia Stemona* Steud. = *R. viridiflora* Hort.), knollige, 4. ♄. Kn. w. China, Ostind.

Stenactis Cassin., Schmalstrahl.
annua Cass. (= *dubia* Cass. = *Aster annuus* L. = *Diplopappus dubius* Cass. = *Erigeron annuum* Richt. = *Phalacroloma annuum* Dumort. = *Pulicaria annua* G. = *P. bellidifolia* Wallr.).
strigosa DC. (= *Doronicum ramosum* Walt.? = *Erigeron australe* Hornem. = *Erigeron strigosum* Muhlbg.), striegeliger, ♂. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Stenactis

verna N. E. (= *Aster vernus* L. = *Doronicum laevifolium* Walt.? = *Erigeron nudicaule* Mchx.), Frühlings-S., 4. f. Carolina, Georgien.

alpina Cass., v. Erigeron alpinum, *Beyrichii* Fisch. et Mey., v. Phalacroloma Beyrichii, p. 507, II., *delphinifolia* Cass., v. Polyactidium delphinifolium, p. 641 et 546, II.

Stenanthium A. Gray, Schmalkrönchen, VI. III. (XXII. I.), Melanthaceae-Veratreae.

angustifolium A. Gray, (= *Helonias graminea* Bot. mag. = *Veratrum angustifolium* Pursh, = *Xerophyllum gramineum* Nutt., p. 837), schmalblätteriges, 4. f. l. Nordamerika.

Stenocarpus RBr., Schmalbalgkapsler.

Cunninghamii RBr., Cunningham's, ħ. ħ. k. t. Neuholl.

Forsteri RBr. (= *Cybele umbellifera* Knight. et Salisb. = *Embothrium umbellatum* L. fil. = *E. umbelliferum* Forst.), Forster's, ħ. ħ. k. t. Neucaledonien.

salignus RBr. (= *Hakea rubricaulis* Hort. Cels., Colla).

Stenochilus RBr., Dünnlippler.

incanus Lindl., weifsgrauer, ħ. t. Neuholland.

racemosus Endl., traubiger, ħ. t. Neuholland.

Stenocoelium athamantoides Ledeb., *divaricatum* Turcz., v. Rumia athamantoides *et seselioides*, p. 619 et 620 II.

Stenomesson Herb., Dünnschwertel(röhre).

aurantiacum Herb. (= *Chrysiphiala aurantiaca* Schult. = *Pancratium aurantiacum* H. B. K.), orangenfarbiger, 4 Zw. w. Quito.

coccineum Herb. (= *croceum* Hort. = *Chrysiphiala crocea* Loud. = *C. coccinea* Schult. = *Pancratium coccineum* R. et P. = *P. croceum* Red., Savign. = *P. limense* Mus. Par.), scharlachfarbiger, 4. Zw. w. Peru.

curvidentatum Herb. (= *Chrysiphiala curvidentata* Herb. p. 124, = *Sphaerotele peruviana* Auct. = *Pancratium Herbertianum* Spgl. = *P. curvidentatum* Hort.).

β) pauciflorum Sweet, (= *Chrysiphiala pauciflora* Lindl., p. 194).

flavum Herb. (= *Chrysiphiala flava* Ker, Lindl., p. 194, = *Pancratium flavum* R. et P.).

Hartwegii Lindl., Hartweg's, 4, Zw. w. Centralamerika. (An der Hacienda del Ixo bei dem Aufsteigen zum Antisana.)

rubrum Herb. (= *Pancratium rubrum* Pav.), rother, 4. Zw. w. Peru.

vitellinum Lindl. (= *Chrysiphiala vitellina* Ker), dottergelber, 4. Zw. w. Lima.

latifolium Herb., v. Chrysiphiala latifolia, p. 142, II.

Stenorrhynchus Rich., Schmalschnabel.

flavum Rich. (= *Neottia flava* Sw. = *Serapias flava* Sw.), hellgelber, 4. w. Jamaica.

lanceolatum Rich. (= *Limodorum lanceolatum* Aubl. = *Neottia lanceolata* W.), lanzettlicher, 4. w. Westindien.

Stenosiphon Spach, Schmalröhre, VIII. I., Onagrariae.

linifolius * (= *virgatus* Spach, = *Gaura linifolia* Nutt.), leinblätterige, ♂. Nordamerika, Texas.

Stenospermum Sweet, *capitatum* Sweet etc., v. Kunzea capitata etc., p. 337, II.

Digitized by Google

Stenosolenium Turcz., Schlankröhre, V. 1., Asperifoliaceae (Borragineae).

saxatile Turcz. (= *Anchusa saxatilis* Pall. = *Lycopsis saxatilis* Turcz. = *Onosma saxatile* Lehm.), Gestein's, ♂. f. Sibirien, Dahurien, Nordchina.

Stenostomon G. fil., DC., Schmalschlund, V. 1., Rubiaceae.

lucidum G. fil. (= *Guettarda lucida* P. = *Laugeria lucida* Sw. = *Sturmia lucida* L. fil.), spiegelnder, ♄. w. Caribäen.

tomentosum DC. (= *Guettarda tomentosa* P. = *Laugeria tomentosa* Sw.), filziger, ♄. w. Jamaika.

Stenotaphrum Trin., Schmallolch, III. II., Gramineae.

glabrum Trin. (= *americanum* Schrk. = *sarmentosum* N. E. = *Ischaemum secundum* Walt. = *Rottboellia dimidiata* Thbg., L. fil. = *R. stolonifera* Poir. = *R. tripsacoides* Lam.), kahler, 4. w. Südasien, Südafrika, Südl. Amerika.

β) complanatum Schrk. (= *Panicum dimidiatum* L. = *Rottboellia complanata* Sw.).

Stenotheca Monn., *mariana* Monn., *venosa* Monn., v. Hieracium marianum, venosum, p. 879.

Stephananthus junceus Lehm., v. Baccharis juncea, p. 57, II.

Stephania cleomoides W., v. Steriphoma paradoxum.

Stephanocarpus Lk., Kunth, Kronenfrüchtchen.

Ehrenbergii Lk., Kunth, Ehrenberg's, ⊙. f. Aegypten.

Stephanocarpus monspeliensis Spach, v. Cistus monspeliensis, p. 201.

Stephanocoma atriplicifolium Turcz., v. Rhaponticum atriplicifolium, p. 683.

Stephanotis Pet. Thouars, Krönchenblume, V. 1. (II.), Asclepiadeae.

acuminata A. Brongn., zugespitzte, ♄. Sch. w. Madagascar.

floribunda A. Brongn., blüthenreiche, ♄. Sch. w. Madagasc.

grandiflora Decaisne, (= *Lisianthus grandifl.* Bréon), grofsblumige, ♄. Sch. w. Madagascar.

Thouarsii A. Brongn., Thouars's, ♄. Sch. w. Madagascar.

Isaura Decaisn. (= *Isaura Allicia* Commers. = *Ceropegia Stephanotis* Poir.), Madagascar, scheint nicht kultivirt zu werden.

Sterculia L., Stinkmalve(baum).

acuminata P. B. (= *Cola acuminata* Schott, Endl.).

Blumei G. Don, (= *lanceolata* Blume, non Cavan.), Blume's, ♄. w. Java.

Chicha St. Hil. (= *Chichaea* Presl), Chicha-St., ♄. w. Brasilien.

colorata Roxb. (= *Erythropsis Roxburghiana* Schott, Endl.).

heterophylla P. B., non Cunningh. (= *Cola heterophylla* Schott, Endl.), verschiedenblätterige, ♄. w. Tropisches Afrika (Oware).

inops Schott, brasilianische, ♄. w. Brasilien.

macrophylla Vent. (= *cordata* Blume, = *Hildegardia macrophylla* Schott, Endl.), grofsblätterige, ♄. w. Ostind.

nitida Vent. (= *Cola nitida* Schott et Endl.), glänzende, ♄. w. Tropisches Afrika.

nobilis Sm. (= *Balanghas* Ait. ed. 2. = *monosperma* Vent. = *Southwellia nobilis* Salisb.).

platanifolia L. fil. (= *Firmiana chinensis* Medic. = *F. platanifolia* Schott et Endl. = *Hibiscus simplex* L.).

Digitized by Google

Sterculia

rubiginosa Vent. (= *Balanghas* L. = *? urceolata* Sm.), rostfarbige, ħ. w. Ostindien.

urens Roxb. (= *Cavallium urens* Schott et Endl.).

Stereospermum Cham., Hartsaame, XIX. 11., Bignoniaceae.

chelonoides DC. (= *Bignonia chelonides* L. fil.), schildblumenähnlicher, ħ. w. Ostindien.

Stereoxylon R. et P., *resinosum* R. et P., *rubrum* R. et P. etc., v. Escallonia resinosa, rubra etc. — *crenulatum* R. et S., *ciliatum* Poir., v. Schidiomyrtus crenulata et microphylla, p. 640, II.

Sterigma DC., Sterigma.

helichrysifolium DC. (= *Cheiranthus aureus* W. herb. = *C. lanatus* Gmel.), strohblumenähnliches, ♂. 4. k. f. b. Armenien, Persien.

Steriphoma Spgl., Kapperling, VI. 1., Capparideae.

paradoxum Endl. (= *cleomoides* Spgl. = *Capparis paradoxa* Jacq. Hort. Schönbr. = *Stephania cleomoides* W.), wunderbarer, ħ. w. Caracas.

Sternbergia W. K., Sternbergie.

aetnensis Schult. (= *colchiciflora* Gussone, non W. K.), aetnaische, 4. Zw. f. Sicilien.

citrina Ker, (= *Amaryllis citrina* Sibth., Sm. = *Oporanthus citrinus* Herb.), citronengelbe, 4. Zw. f. Griechenl.

americana Hffg., v. Haylockia pusilla.

Stevia Cavan., Stevie.

breviaristata Hook., Arn., kurzgrannige, 4. k. Mexico.

conferta DC., gedrängtblumige, 4. k. Mexico.

α) capitata Schltdl., *β*) corymbosa Schltdl., *γ*) ramosa Schltdl.

connata Lagasca, (= *glabrata* Moç., Sess.).

dissoluta Schltdl., aufgelöfste, 4. ħ. k. Mexico.

Eupatoria W. (= *hyssopifolia* Cav. = *punctata* P. = *Ageratum punctatum* Ortega, non Jacq. = *Mustelia Eupatoria* Spgl.).

glandulifera Schltdl. (= *latifolia* Benth. = *trachelioides* Hook.), drüsentragende, 4. ħ. k. Mexico.

hirsuta DC., rauhhaarige, 4. k. Mexico.

Karwinskyana Stend. (= *lanceolata* Walp., non Lag.), Karwinsky's, 4. k. Mexico.

leucantha Schltdl., weifsblumige, 4. k. Mexico.

lucida Lagasca, (= *hymenopappa* Moç. = *? Ageratum viscosum* Ortega).

origanoides H. B. K., dostenähnliche, 4. k. Mexico.

ovata Lagasca, (= *paniculata* Hort. Par., non Lag.).

paniculata Lagasca, (= *hyssopifolia* Sims, non Cav.).

purpurea P. (= *St. Eupatoria* Bot. reg. = *?stricta* Hornem.).

pyrolaefolia Schltdl., Wintergrünblätterige, 4. ħ. k. Mexico.

salicifolia Cavan. (= *sempervirens* Tenore, = *Ageratum viscosum* Ortega).

tomentosa H. B. K. (= *mollis* Schrad. = *nepetaefolia* Berland., non H. B. K.).

trachelioides H. B. K., halskrautähnliche, 4. k. Mexico.

viminea Schrad. (= *longifolia* Moç.).

viscida H. B. K. (= *villosa* Moç., Sess. = *viscosa* Hort. = *Ageratum purpureum* Moç., Sess.).

callosa Nutt., *pedata* Cav., v. Florestina callosa et pedata, p. 245, II.

Stewartia Auct. v. Stuartia, p. 791.

Digitized by Google

Stiftia Mikan, Stiftie, p. 789.

chrysantha Mikan, (= *insignis* Fisch. = *Augusta grandiflora* Leand. = *Mocinia matisioides* DC. = *Plazia brasiliensis* Spgl.), goldfarbige, ♄. w. t. Brasilien.

parviflora Don, (= *Augusta parviflora* Leand. = *Plazia parviflora* Spgl.), kleinblumige, ♄. w. t. Brasilien.

Stigmarota africana Lour., v. Flacourtia Ramontchii.

Stigmatophyllum A. Juss., A. St. Hil. (= *Stigmaphyllum* Lindl.), Narbenblatt.

ciliatum Juss. (= *Banisteria ciliata* Lam. = *B. nitida* Arrab.), gefranztes, ♄. ♄. Sch. w. Brasilien.

Gayanum Juss., Gay's, ♄. ♄. Sch. w. Brasilien.

heterophyllum Hook., verschiedenblätteriges, ♄. ♄. Sch. w. Tucuman.

jatrophaefolium A. St. Hil. et A. Juss., brechnußblätteriges, ♄. ♄. Sch. w. Brasilien.

Stilago Bunius L., v. Antidesma Bunius, p. 40, II.

Stilbe L., Stilbe, IV. 1., Globulariaceae-Stilbineae.

ericoides Thbg. (= *Lühea ericoides* Schm. = *Selago ericoides* L.), heideähnliche, ♄. k. t. Cap d. g. Hffn.

Pinastra L. (= *vestita* Berg. = *Selago Pinastra* L.), kieferähnliche, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Stilligia Gard., L., Stillingie.

fruticosa Mchx. (= *frutescens* Bosc), strauchige, ♄. ♄. f. Nordamerika.

Stilpnophytum Less., Glanzkraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

linifolium Less. (= *Tanacetum linifolium* Thbg.), flachsblätteriges, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Stipa L., Pfriemengras.

I. Genuina.

altaica Trin., Ledeb., altaisches, 4. f. Altaisch. Sibirien.

barbata Dsf., bartiges, 4. f. Nordafrika.

capillata L. (= *erecta* Hort. Madrit. = *juncea β* Lam.).

Lagascae R. et S. (= *juncea β* Dsf. = *pubescens* Lagasc.).

splendens Trin. (= *Agrostis longiaristata* Hrbr. ross. = *Lasiagrostis splendens* Kunth).

II. St. Calamagrostis Whlbg. v. Lasiagrostis Calamagrostis, p. 343, II.

canadensis Poir. (= *juncea* Mchx., non L., *ovata* Trin. (= *panicoides* Lam. = *setacea* Mchx., Rich.), v. Oryzopsis parviflora et setacea, p. 462, II.

Stipularia Haw., non P. B., *capensis* Haw., *marina* Haw. etc., v. Spergularia capensis etc.

Stirlingia Endl. (= *Simsia* RBr.), Stirlingie, IV. 1., Proteaceae.

anethifolia Endl. (= *Simsia anethifolia* RBr.), dillblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

latifolia Steud. (= *Simsia latifolia* RBr.), breitblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

simplex Lindl., einfache, ♄. t. k. Neuholland.

tenuifolia Steud. (= *Simsia tenuifolia* RBr.), dünnblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

Stiza crioloba E. Mey., v. Lebeckia pungens, p. 347, II.

Stizolobium bulbosum Spgl., v. Pachyrrhizus angulatus, p. 580.

Stizolophus balsamitaefolius Cass., *coronopifolius* Cass., v. Centaurea Balsamita et coronopifolia, p. 176—177.

Digitized by Google

Stobaea Thbg., Stobaea.

fruticosa Bartl., strauchige, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

heterophylla Thbg., verschiedenblätterige, 4. ♄. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) radiata DC.

glomerata Spgl., v. Platycarpha glomerata Nachlese, *pinnata* Thbg., v. Berkheya pinnata Nachlese.

Stoebe L., Stoebe.

incana Thbg. (= *aethiopica* Sieb., non L.), weifsgraue, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

alopecuroides Sieb., non Less. (= *cinerea* Thbg.), *artemisioides* E. Mey., *plumosa* Thbg., *virgata* Thbg. (= *fasciculata* Cass.), v. Seriphium cinereum, vermiculatum, plumosum et var. β, p. 659, II., *ericoides* Berg., v. Disparago seriphioides Nachlese, *reflexa* Thbg., v. Trichogyne reflexa, ?*subulata* Sm. (= *cinerea* Sbr., non Thbg. = *mucida* E. Mey.), v. Elytropappus ambiguus, p. 220, II.

Stoechas Mill., *dentata* Mill., *officinarum* Mdl., *pedunculata* Mill., v. Lavandula dentata, Stoechas, pedunculata, p. 449 et p. 346, II.

Stramonium T., Scop., Mch., G., *arboreum* Mch., *fastuosum* Mch., *foetidum* Scop., AH. (= *spinosum* Lam. = *vulgatum* G.) etc., v. Datura arborea, fastuosa, Stramonium etc.

Stratiotes alismoides L., v. Damasonium indicum, *nymphoides* W., v. Hydrocleis Humboldtii, p. 308, II.

Stravadium acutangulum Juss., Loud. (= *coccineum* DC. = *rubrum* P.), *racemosum* Sweet, v. Barringtonia acutangula et racemosa, p. 60—61, II.

Streblocarpus oblongifolius Arn., v. Niebuhria oblongifolia, p. 436, II.

Streblorrhiza speciosa Endl., v. Clianthus pictus, p. 150, II.

Strelitzia Banks, Ait., Strelitzie.

glauca Rich., blaugrüne, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

humilis Lk. (= *pumila* Hort.).

lanceolata Hort., lanzettblätterige, 4. w. Cap d. g. H.

macrophylla Hort., grofsblätterige, 4. w. Cap d. g. H.

Principis Andr. (= *angustifolia* Dryandr. var. Spgl.), fürstliche, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

teretifolia Barrow, stielrundblätterige, 4. w. Cap d. g. H.

Letztere scheint nicht kultivirt zu werden.

Strepsia usneoides Nutt., v. Tillandsia usneoides, p. 811.

Streptachne Calamagrostis Dumort., v. Lasiagrostis Calamagrostis, p. 343, II.

Streptocarpus Lindl., Drehfrucht, XIV. m., Gesneriaceae-Cyrtandreae.

Hilsenbergii RBr., Hilsenberg's, ♂. 4. w. Madagascar.

Rexii Lindl. (= *Didymocarpus Rexii* Bowie, Hook. = *Henckelia Rexii* *), Rex's, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Streptopus Mch., Drehfufs, Sarmentaceae-Smilaceae (Melanthaceae, Liliaceae Alior.).

Sect. I. Genuin.

amplexifolius DC. (= *amplexicaulis* Poir. = *distortus* Bess. = *Uvularia amplexicaulis* Mill. = *U. amplexifolia* L. = *U. distorta* Hort.).

β) distortus Mchx.

Digitized by Google

Streptopus

Sect. II. Hexorima Rafin. (= *Hexorima* Auct.).

candidus Wall. (= *simplex* Don), reinweifser, 4. k. Nepal.

roseus Mchx. (= *Hexor. dichotoma* Rafin. = *Uvularia rosea* P.).

chinensis Sm., *pedunculatis* Sm., v. Disporum fulvum et Pitsutum, p. 208, II., *lanuginosus* Mchx., v. Prosartes lanuginosa, p. 561, II.

Strobilanthes Blume, Zapfenblümchen, XIV. 11., Acanthaceae.

glabrata N. E. (= *Ruellia glabrata* Wall.), kahles, ♄. w. Ostindien.

Sabiniana N. E. (= *Ruellia Sabiniana* Wall.).

Strobilocarpus Kl., Zapfenfrüchtler, IV. 1., Santalaceae.

diversifolius Kl., verschiedenblätteriger, ♄. ♄. k. Cap d. g. Hoffn. (Kaum kultivirt?)

Strobilorhachis Kl., Zapfenspindel, ? ?

glabra Kl., kahle, ♄. w. ?

Strophanthus DC., Drehblüthler.

divergens Grah. (= *dichotomus β chinensis* Ker, = *divaricatus* Hook., Arn. = *Emericia divaricata* R. et S. = *Nerium chinense* Hunter, = *Pergularia divaricata* Lour. = *Periploca divaricata* Spgl.).

Wallichii A. DC. (= *dichotomus* Wall. = *dichot. γ coromandelianus* Ker), Wallich's, ♄. w. Ostindien.

Strophiostoma Turcz. v. Myosotis Sect. III. p. 425, II.

Strophostyles Ell., *helvola* Ell., v. Phaseolus helvolus, p. 613.

Struchium RBr., Juss., *americanum* Poir., v. Sparganophorus Vaillantii, p. 774.

Strumaria Jacq., Kropflilie, p. 790.

Sect. I. Genuina.

angustifolia Jacq., linguaefolia Jacq., rubella Jacq., truncata Jacq., undulata Jacq.

Sect. II. Imhofia Herb. (Baron Imhof, ein unbekannter deutscher Botaniker †).

Burchelliana Herb., Burchell's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

β) viridescens Herb.

crispa Ker, (Herb.), (= *Amaryllis cinnamomea* Mill., L'Her. = *A. crispa* Jacq.), filifolia Jacq. (Herb.), (= *Crinum tenellum* L. fil. = *Leucojum strumosum* Soland.), gemmata Ker, Sims, (Herb.), marginata Herb. (= *Amaryllis marginata* Jacq. = *Brunsvigia marginata* Ker, p. 135).

spiralis Ker, *stellaris* Ker, v. Hessea spiralis (= *breviflora* Herb.) et stellaris, p. 297, II.

Struthiola L., Straufsstrauch.

argentea Lehm., silberfarbiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

erecta L. (= *glabra* L. = *juniperina* Retz, = *pendula* Salisb. = *subulata* Lam. = *tetragona* Retz, = *Nectandra tetrandra* Berg. = *Passerina dodecandra* L. = *P. filiformis* Mill. = *P. tetragona* L.).

glauca Lodd., blaugrüner, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

imbricata Andr. (= *lateriflora* Hornem. = *striata* Lam. = *sulcata* Schm.).

longiflora Lam. (= *virgata* L. var.? Wickstr.), langblumiger, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.

stricta Donn, (= *erecta* Curt, non L.), steifer, ♄. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Digitized by Google

Struthiola

virgata L. (= *ciliata* Andr. = *erecta* β Thbg. = *incana* Lodd. = *tuberculosa* et *villosa* Vahl herb. = *Passerina Zeyheri* Spgl.).

Unbestimmtere: laxa Hort., oppositifolia Hort. angl., superba Hort. angl.

Strychnodaphne puberula N. E., v. Ocotea puberula, p. 443, 11.

Strychnos L., Krähenaugenbaum.

colubrina L., p. 791.

potatorum L. (= *Tsiankotta* Retz. = *Caniram Tsiankotta* Pet. Thouars).

spinosa Lam. (= *Caniram Vontac* Pet. Th.).

triplinervia Mart. (= *Gardenia trinervis* Vellozo), dreifachnerviger, ħ. w. Brasilien.

Stuartia L., Stuartie, p. 791.

Malachodendron L. (= *marylandica* Andr. = *virginica* Mchx., Cav.).

monadelpha Sieb., Zuccar., einmännige, ħ. k. f. b. Japan. (Ob eingeführt?)

corchoroides Forsk., v. Sida spinosa, p. 793 et p. 663, 11., *dentata* Hort. =?, *pentagyna* L'Her., v. Malachodendrum ovatum, p. 489.

Stubendorfia Schrenk, Stubendorfie, XV. 1., Cruciferae-Isatideae.

orientalis Schrenk, orientalische, ⊙ ♂. f. Asiat. Rußland.

Sturmia Rchb. (= *Liparis* Rich., Lindl.), Sturmie.

elata (Lindl.), (= *L. bituberculata* Lindl. = *Cymbidium bituberculatum* Hook. = *C. veratrifolium* Wall.).

elegans (Lindl.), zierliche, 2. w. Ostindien.

foliosa (Lindl.), (= *L. reflexa* Lindl. = *Cymbidium reflexum* RBr.).

gregaria (Lindl.), (= *L. disticha* Lindl. = *Malaxis* Pet. Th. = *Stelis micrantha* Sbr. herb. maur., non Sw.), heerdige, 4. w. Mascarenas, Zeylon.

Sturmia Hoppe, *minima* Hoppe, v. Mibora verna, p. 404, 11.

Sturmia lucida G. fil., v. Senostomum lucidum, p. 705, 11.

Stylandra pumila Natt., v. Podostigma pubescens, Nachtrag.

Stylidium Sw., Säulenblümchen.

bellidifolium Sonder, maßliebenblätteriges, 4. ħ. t. Neuh.

Brunonianum Benth., Brunon's, 4. ħ. t. Neuholland.

bulbiferum Benth. (= *recurvum* Grah.), zwiebeltragendes, 4. ħ. Kn. t. Neuholland.

carnosum Benth., fleischiges, 4. ħ. t. Neuholland.

ciliatum Lindl., gewimpertes, 4. ħ. t. Neuholland.

coccineum v. Houtte, scharlachfarbiges, 4. ħ. t. Neuh.

Drummondii Grah., Drummond's, 4. ħ. t. Neuholland.

fruticosum RBr. (= *glandulosum* Salish.).

glaucum RBr. (= ?*Candollea glauca* LaBill.), blaugrünes, 4. ħ. t. Neuholland.

graminifolium Sw. (= ?*canaliculatum* Poir. = *lineare* Sieb., non Sw. = *serrulatum* Rich. = *Candollea serrulata* LaBill. = *Ventenatia major* Sm.).

latifolium v. Houtte, breitblätteriges, 4. ħ. t. Neuholland.

Lehmannianum Sonder, Lehmann's, 4. ħ. t. Neuholland.

lineare Sw. (= ?*planifolium* Poir. = *Ventenatia minor* Sm.).

Digitized by Google

Stylidium

longifolium Rich. (= *pilosum* Poir. = *Candollea pilosa* LaBill.), langblätteriges, 4. ♄. t. Neuholland.

paniculatum Sonder, rispiges, 4. ♄. t. Neuholland.

spathulatum RBr., spatelblätteriges, 4. ♄. t. Neuholland.

spicatum v. Houtte, ährliges, 4. ♄. t. Neuholland.

stipitatum Benth. (= *Coleostylis umbellulata* Sonder), kurzstieliges, 4. ♄. t. Neuholland.

violaceum RBr., violettes, 4. ♄. t. Neuholland.

Stylidium (= *Stylis* Poir.) *chinense* Lour., v. Marlea begoniaefolia, p. 497.

Stylimnus maritimus Rafin., v. Pluchea marylandica, p. 541, II.

Stylisma Rafin., Säulenwinde, V. 1., Convolvulaceae.

evolvuloides Choisy, (= *Convolvulus patens* Desr. = *C. trichosanthes* Mchx.), faltenblumenähnliche, ☉. 4. f. Nordamerika.

Stylocoryna Cav., Spgl., Säulenröthe, V. 1., Rubiaceae.

Webera Rich. (= *Canthium corymbosum* P. = *Cupia corymbosa* DC. = *Gardenia Pavetta* Roxb. = *Pavetta Wightiana* Wall. = *Polyozus maderaspatanus* DC. = *Rondeletia asiatica* L. = *Tarenna zeylanica* G. = *Webera cerifera* Moon, = *W. corymbosa* W., p. 856, = *W. zeylanica* Dav. Dsf.), traubendoldige, ♄. w. Ostindien.

Stylophorum Nutt., Spgl., *cambricum* Spgl., *crassifolium* Steud., *heterophyllum* Steud., v. Meconopsis cambrica etc., p. 551.

Stylurus Knight et Salisb., non Rafin., *buxifolia* Kn. et Salisb. (= *collinum* Kn. et Salisb.), v. Grevillea buxifolia.

Stypandra RBr., Stielaffodile.

imbricata RBr. (= *Arthropodium imbricatum* Spgl.), ziegeldachförmige, 4. k. t. Neuholland.

grandiflora Lindl., grofsblumige, 4. k. t. Neuholland, (Schwanenfluſs).

scabra RBr. (= *Arthropodium scabrum* Spgl.), scharfe, 4. k. t. Neuholland.

Styphelia Sm., Starrstrauch.

angustifolia DC., schmalblätteriger, ♄. t. Neuholland.

reflexa Rudge, non Spgl., zurückgebogener, ♄. t. Neuh.

tenuifolia Lindl., dünnblätteriger, ♄. t. Neuh. (Schwanenfl.).

Aufser diesen u. d. p. 792 verzeichneten wird in den Gärten noch eine St. laxiflora kultivirt.

abietina LaBill., *Oxycedrus* LaBill., v. Cyathodes abietina et Oxycedrus, p. 177, II., *acuminata* Spgl., *affinis* Spgl., *amplexicaulis* Rudge, *appressa* Spgl., *collina* LaBill., *cuspidata* Spgl., *ericoides* Sm., *fastigiata* Spgl., *imbricata* Spgl., *juniperina* Spgl. etc., v. Leucopogon acuminatus, affinis, amplexicaulis etc., p. 459 et p. 355, II., *elliptica* Sm., *glauca* LaBill., *scoparia* Sm., v. Monotoca elliptica, lineata et scoparia, p. 529, *cordata* LaBill., *divaricata* Spgl., *ovalifolia* Spgl. etc., v. Acrotriche cordata etc., p. 17, *denticulata* Spgl., *humifusa* P. (= *serrulata* LaBill.), v. Astroloma denticulat. et humifus., p. 104, *daphnoides* Sm., *strigosa* Sm., v. Lissanthe daphnoides et strigosa, p. 490, *pinifolia* Spgl., v. Stenanthera pinifolia, p. 787.

Digitized by Google

Styphnolobium Schott, Sauerhülsler, X. 14. Legum. Rosal. Papilionaceae-Sophoreae.

affine Walpers, (= *Sophora affinis* Torr. et Gr.), ähnelnder, ħ. f. Nordamerika (Arkansasgebiet).

japonicum Schott, (= *Sophora japonica* L., mant., p. 772, = *S. sinica* Hort.), ♃) pubescens * (= *Sophora pubescens* Tausch).

Styrandra bifolia Rafin., *canadensis* Rafin., v. Smilacina bifolia, canadensis, Sect. II. p. 764.

Styrax T. Storax.

Benzoin Dryand. (= *Benzoin officinale* Hayne, = *Laurus Benzoin* Houtt., non L. nec W.), Benzoingebender, ħ. w. Sumatra, Java.

ferrugineum Pohl, rostfarbiger, ħ. w. Brasilien.

laevigatum Ait. (= *americanum* Lam., Rich. = *glabrum* Cav., Mchx., non Sw. = *laeve* Walt.).

Suaeda Pall., (Vielkelch), Steppenmelde.

altissima Pall. (= *Chenopodium altissimum* L. = *Ch. filiforme* Mch. = *Cochliospermum altissimum* Lag. = *Lerchea altissima* Medic. = *Salsola altissima* L. = *Schanginia altissima* C. A. Mey., p. 729, = *Schoberia altissima* C. A. Mey.).

baccifera Pall. (= *Enchylaena Borysthenis* Spgl. = *Salsola baccifera* Schrad. = *Schoberia baccifera* C. A. Mey.), beerentragende, ☉. f. Am Borysthenes.

Biebersteiniana * (= *Chenopod. Biebersteinianum Schult.* = *Ch. crassifolium* MB. = *Ch. villosum* Spgl. = *Schoberia Biebersteiniana* C. A. Mey., p. 730).

Clemente * (= *Chenopodium Clemente* Spgl. = *Cochliospermum Clemente* Lagasca, p. 209, = *Schoberia Clemente* Steud.).

crassifolia * (= *Chenopodium crassifolium* Dsf. = *Cochliospermum Cavanillesii* Lag., p. 209, = *Salsola sativa* Cav.).

dendroides * (= *Chenopodium fruticosum* MB. = *Ch. microphyllum* MB. = *Salsola fruticosa* MB. = *Schoberia dendroides* C. A. Mey.), baumähnliche, ħ. f. Caucasus.

filiformis Dumort. (= *Chenopodium filiforme* Dumort., non Mch. = *Schoberia Dumortieri* Steud.), fadenförmige, ☉. f. Belgien.

fruticosa Forst. (= *Chenopod. fruticosum* Mch., Schrad. = *Lerchea fruticosa* Mch. = *L. obtusifolia* Hall. = *Salsola fruticosa* L. = *Schoberia fruticosa* C. A. Mey.).

hortensis Forsk. (= *Chenopodium hortense* Schult. = *Salsola divergens* Poir. = *S. hortensis* Dsf. = ? *S. trigyna* Cav. = *Schoberia hortensis* Steud.).

maritima Moq. Tand., Dumort. (= *chenopodioides* Pall. = *Chenopod. marit.* L. = *Salsola marit.* MB. = *Schoberia maritima* C. A. Mey., p. 730).

microphylla Pall. (= *Chenopod. parvifolium* Schult. = *Schoberia microphylla* C. A. Mey., p. 730).

Pallasiana * (= *crassifolia* Pall. = *Chenopod. Pallasianum* Schult. = *Schoberia Pallasiana* C. A. Mey., p. 730).

physophora Pall. (= *Enchylaena physophora* Spgl. = *Salsola physophora* Schrad. = *Schoberia physophora* C. A. Mey.), blasentragende, ħ. f. Gegend des caspischen Meeres.

prostrata Pall. (= *Chenopod. prost.* Schult. = *Schoberia prostrata* C. A. Mey.), gestreckte, ☉. f. Mittelasien.

Digitized by Google

Suaeda.
salsa Pall. (= *Chenopodium maritimum β* MB. = *Ch. salsum* Schult. = *Cochliospermum salsum* Lag. = *Lerchea salsa* Medic. = *Salsola salsa* L.).
sētigera Moq. Tand. (= *Chenopod. setigerum* DC. = *Salsola sativa* Cav. = *S. setigera* Lag. = *Schoberia setigera* C. A. Mey., p. 730).
spicata * (= *Chenopod. spicat.* Schult. = *Salsola salsa* Cav. = *S. spicata* W. = *S. strobilifera* Hort. = *Schoberia spicata* C. A. Mey., p. 730).
albida Pall., v. Kochia hirsuta, p. 438, *hyssopifolia* Pall. (= *triandra* Donnersm.), *muricata* Pall., *sedoides* Pall. (= *sedifolia* Pall.), v. Echinopsilon lanatum, muricatum, sedoides, p. 204, II., *linifolia* Pall., v. Schanginia linifolia, p. 640, II.
Suarda ligustrifolia Nocca, v. Eugenia laruensis. *Subularia purpurea* Forsk., v. Schouwia arabica, p. 643, II.

Succisa Vaill. (= *Scabiosa* pro parte Auct.), Schuppenkopf.
I. Cephalaria Schrad., R. et S., Coult. (= *Cerionanthes* Schott, = *Lepicephalus* Lag. = *Picnomum* Wallr.).
attenuata (R. et S.), (= *trifida* Spgl. = *Scabiosa attenuata* L. = *S. trifida* Thbg. = *S. Verbenaca* Lam.).
centauroides Spgl. (= *Ceph. centauroides* Coult. = *C. laevigata* Schrad. = *Scabiosa centauroides* L.).
α) communis (Coult.), (= *S. centauroides* Lam.).
β) corniculata (Coult., R. et S.), (= *S. cornic.* W. K.).
γ) uralensis (DC.), (= *S. uralensis* Murray).
δ) cretacea (DC., R. et S.), (= *Scabiosa cretacea* MB. = *S. coriacea* W. Enum.).
graeca R. et S. (= *Scabiosa decurrens* et *flava* Sibth., Sm.).
joppica Spgl. (= *Scabiosa joppensis* Rchb.).
leucantha Mch., Spgl. (= *Scabiosa albescens* W. Enum. = *S. leucantha* L. = *S. leucocephala* Auct. = *S. mediterranea* Viviani).
procera (Fisch., Lallem.), p. 886.
tatarica Spgl., β) gigantea (Coult.), (= *Scabiosa altissima* Mill. = *S. gigantea* Ledeb.).
Vaillantii (Schott), (= *lancifolia* Mch. = *Scabiosa syriaca β* L. = *S. Vaillantii* MB.).
II. Genuina.
australis Schott, (= *Scabiosa australis* Wulf. = *S. repens* Brignol. = *Lepicephal. inflexus* Kluck), b) albiflora, β) pseudo-australis (R. et S.), (= *S. Triumfetti* Moretti).
pratensis Mch. (= *vulgaris* Presl, = *Astrocephal. Succisa* Wallr. = *Scabiosa Succisa* L.).
Sulitra Medic., *herbacea* Medic. (= *pubescens* Mch.), *perennans* Medic., v. Lessertia annua et peren., p. 457. *Suprago* G., *sphaerocephala* Cass., *spicata* G., v. Liatris sphaeroidea et spicata, p. 461.

Sutera Roth, (Dr. Suter, Verfass. einer Flora d. Schweiz †), XIV. II., Personatae-Scrofulariaceae.
glandulosa Roth, (= *dissecta* Walp. = *Capraria dissecta* Delil.), drüsige, ♂. ☉. w. m. f. Ostindien, Nubien, Aegypten.
foetida Roth, *oppositifolia* Roth, v. Chaenostoma foetidum, p. 134, II., *hispidum* Nachl., *multifida* Walp., v. Conobea multifida Nachlese.

Digitized by Google

Sutera pubescens Hort., v. Lessertia perennans.
Suteria calycina Lindl., v. Trevirania calycina.

Swainsonia Salisb., Swainsonie.
albiflora G. Don, (= *galegifolia* β *albiflora* Lindl.), weiſsblumige, ♄. t. Neusüdwallis.
galegifolia RBr. (= *Colutea galegifolia* Sims, = *Indigofera coccinea* Broegelm. = *Loxidium galegifolium* Vent. = *Vicia galegifolia* Andr.), var. rubra Hort.

Swartzia W., Swartzie.
triphylla W. (= *Possiria arborescens* Aubl. = *P. triphylla* Poir., Gmel. = *Rittera triphylla* Sw.), dreiblätterige, ♄. w. Guiana, Brasilien.

Swertia L., Swertie.
punctata Baumg., punktirte, ♃. f. Siebenbügen.
americana Spgl. (= *corniculata* Mchx. = *deflexa* Sm. = *Michauxiana* R. et S.), *corniculata* L., v. Halenia deflexa et sibirica, p. 282, II., *carinthiaca* Wulf., *rotata* L. (= *sulcata* Rottb.), v. Pleurogyne carinthiaca et rotata, p. 540, II., *difformis* L., v. Sabbatia paniculata, p. 709 et 621, II., *lutea* Vest, v. Gentiana lutea, *parnassifolia* LaBill., v. Villarsia parnassifolia, p. 848.

Swietenia L., Swietenie.
humilis Zuccar., niedrige, ♄. t. w. Mexico.
trilocularis Roxb., dreifächerige, ♄. w. Ostindien.
febrifuga Roxb. (= *Soymida* Dunc.), v. *Soymidia febrifuga*, p. 686, II.

Symphoricarpus Dill. (= *Symphoria* P., Pursh), Ballbeere.
glaucescens H. B. K., blaugrünliche, ♄. k. Mexico.
imberbis Tausch, unbartige, ♄. ♄. f. ?
microphyllus H. B. K. (= *Anisanthus microphyllus* W.), kleinblätterige, ♄. k. Mexico.
montanus H. B. K. (= *Symphoria mexicana* Lodd.).
racemosus Mchx. (= *leucocarpus* Hort.), ? β) elongatus Presl, γ) heterophyllus Presl, δ) glaucus Hort. Vind., ε) puniceus Sims.
vulgaris Mchx. (= *conglomeratus* P. = *orbiculatus* Mch. = *parviflorus* Dsf.).

Symphyomyrtus Schauer, Bandmyrte, XII. 1., Myrtaceae.
Lehmanni Schauer, (= *Eucalyptus Lehmanni* Hort.), Lehmann's, ♄. k. t. Neuholland.

Symphytum T., Schwarzwurz (Beinwell).
Donii DC. (= *caucasicum* D. Don, non MB.), Don's, ♃. f. ? Caucasus.
mediterraneum K., mittelländische, ♃. f. Südeuropa.
officinale L., α) ochroleucum DC. (= *album* Auct. = *bohemicum* Schm.), β) purpureum P. (= *patens* Sibth. = *roseum* Hort.),[1] b) carmosinum Hort. angl. (= *coccineum* Hort.), γ) lanceolatum Weinm.
orientale L., β) angustior DC.
tauricum W. (= ? *borragineum* Tausch, = *bullatum* Hornem. = *orientale* Pall., non MB.).
Nicht hinlänglich bekannte Arten: coeruleum Hort. angl., echinatum Ledeb., intermedium Fisch., laeve Bess. Cat. hort. Crem. Podol., racemosum Stephan.
regium Gmel., v. Mattia umbellata, p. 389, II.

---

1) Auch nach Fries eigne Art.

Digitized by Google

Synandra amoena Schrad., v. Solenostylis (= *Aphelandra*) aurantiaca.

Synaphea RBr., Synaphea, IV. 1., Proteaceae.
brachystachya Lindl., kurzährige, ♄. t. Neuholland.
dilatata RBr. (= *Conospermum reticulatum* Sm.), verbreiterte, ♄. t. Neuholland.
pinnata Lindl., gefiederte, ♄. t. Neuholland.

Syncarpia Tenore, Bandfrucht, XII. 1. (XVIII. 11.), Myrtaceae.
laurifolia Tenore, (= *Kamptzia albens* N. E. = *Metrosideros glomulifera* Sm. = *Pittosporum hirtum* Hort. Taurin. = *Tristania albens* Cunn. = *T. arborescens* Hort. Kew.), lorbeerblätterige, ♄. t. k. Neuholland.

Syndesmanthus Kl., Benth., Bandblümchen(heide).
articulatus Kl. (= *Blairia articulata* L., p. 124, = *Erica articulata* Thbg. = *E. eriocephala* Lam. = *E. paleacea* Salisb.).
fasciculatus Kl. (= *Blairia fasciculata* W., p. 124, = *Erica fasciculata* Thbg.).
paucifolius DC. (= *Blairia flosculosa* et *pauciflora* G. Don, = *B. paucifolia* Wendl. = *Erica flosculosa* Salisb. = *Macrolinum paucifolium* Kl.), wenigblätterige, ♄. t. k. Cap d. g. Hoffn.
scabra Kl. (= *Blairia scabra* W., p. 124, = *Erica exilis* Salisb. = *E. scabra* Thbg.).

Syndesmon Hffg., *thalictroides* Hffg., *tuberosum* Hffg., v. Thalictrum anemonoides et tuberosum.

Syngonium Schott, Endl., Syngonium, XXI. IX., Aroideae.
auritum Schott, (= *Caladium auritum* Vent., p. 143, = *Arum auritum* L.), geöhrtes, 4. w. Westindien.

Synoum A. Juss., Synoum, VIII. 1. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.
glandulosum A. Juss. (= *Trichilia glandulosa* Sm., p. 816, = *octandra* Soland.), drüsiges, ♄. t. Neuholland.

Syrenia Andrz., angustifolia Rchb. (= *Ehrharti* Andrz.), cuspidata Rchb. (= *Bieberstenii* Andrz.) etc., v. Erysimum Sect. II. p. 313 et p. 232, II.

Syringa L., Flieder, Lilac.
chinensis W. (= *dubia* P., DC. = *speciosa* Hort. = *rothomagensis* A. Rich. = *Lilac Varina* Dum.Cours. *Lilacum rothomagense* Renault).
Emodi Wall. (= *indica* Royle), himalayaischer, k. f. b. Himalaya.
persica L. (= *Lilac minor* Mch. = *L. persica* Lam.). e) pterifolia Hort., f) babylonica Plukn.
villosa Vahl, (= *Ligustrum sinense* Lour.), zottiger, ♄. k. f. b. China.
β) ovalifolia DC. (= *chinensis* Turcz. = *pubescens* Turcz.).
vulgaris L., *β*) marlyensis DC. (= *purpurea* Hort. = *tatarica* Hort. = *Lilac Marly* Gall. = *L. media* Dum.Cours.), *γ*) albiflora cum variet. Opiz.
Aufser den p. 795 aufgezählten Varietäten noch folgende: Charles X., Colmariensis, coccinea, Prince Notger, virginalis (= *alba major*), fol. variegatis, fol. aureovariegatis, spectabilis.

Syspone sagittalis Griseb., v. Genista sagittalis.

Digitized by Google

Syzigium G., DC., Gewürzmyrte, XII. 1., Myrtaceae.
caryophyllatum G. (= *Calyptranthes caryophyllata* P. = ? *Eugenia contracta* Poir. = *E. corymbosa* Lam. = *Myrtus caryophyllata* L.), ächte, ħ. w. Zeylon.
Jambolanum DC. (= *caryophyllifolium* DC. = *Calyptranthes caryophyllata* Sw. = *C. Jambolana* W. = *Eugenia caryophyllifolia* Lam. = *E. corticosa* Lour. = *E. Jambolana* Lam. = *E. jambolifera* Roxb. = *E. obtusifolia* Roxb. = *Myrtus corticosa* Spgl. = *M. Cumini* L.), Jambolanische, ħ. w. Ostindien.
obovatum DC. (= *Calyptranthes Pollicina* Willem. = *Eugenia obovata* Poir. = *Myrtus obovata* Spgl.), verkehrteiförmige, ħ. w. Mauritius.

Tabacus viscidus Mch., v. Nicotiana glutinosa.

Tabebuja Gomez, (= *Couralia* Splitg.), (Tabebuja, einheimischer brasilianischer Name), XIV. 11., Bignoniaceae.
fluviatilis DC. (= *Bignonia fluviatilis* Aubl., p. 122, = *aquatilis* E. Mey. = *Couralia fluviatilis* Splitg. = *Tecoma aquatilis* DC. = *Zeyheria fluviatilis* Miq.), flufsliebende, ħ. ħ. w. Guiana.
latifolia DC. (= ? *Bignonia latifolia* Rich., p. 122, = ? *Delostoma latifolium* Splitg.), breitblätterige, ħ. Sch. w. Cayenne.
triphylla DC. (= *Bignonia triphylla* L. ? Mill., p. 123, = *Tecoma triphylla* Mart.), dreiblätterige, ħ. ħ. w. Insel St. Thomas, Vera Crux.
uliginosa DC. (= *Bignonia obtusifolia* Lam. = *B. Tabebuja* Vell. = *B. uliginosa* Gomez), sumpfliebende, ħ. ħ. w. Brasilien (Rio Janeiro).

Tabernaemontana Plum., L., Tabernaemontane.
amygdalifolia Jacq. (= *Cestrum nervosum* Mill.).
coriacea Lk., R. et S. (= ? *macrophylla* Poir.), lederartige, ħ. w. Brasilien.
coronaria W. (= *divaricata* RBr. = *Nerium coronarium* Ait., Jacq. = *N. divaricatum* L., non Lour.).
crispa Roxb., Hamilt.
Noronhiana Boj. (= *Pandaca* Pet. Th.), Noronha's, ħ. w. Madagascar.
persicariaefolia Jacq. (= *nervosa* Dsf.).
recurva Roxb. (= *gratissima* Lindl.), zurückgekrümmte, ħ. w. Ostindien.
rostrata Wall., geschnäbelte, ħ. w. Ostindien.
divaricata G. Don, v. Nerium divaricatum, p. 546, *echinata* Aubl., *Hystrix* Steud., *muricata* Lk., v. Peschiera echinata, Hystrix, muricata, p. 501, II., *odorata* Vahl, v. Malouetia odorata, p. 383, II.

Taeca Forst. (malayischer Name), Aroideae-Taccaceae Rchb., Asparagineae s. Sarmentaceae Lk., Tacceae Presl, Blume, p. 796.
cristata Jack., kammförmige, 4. w. Ostindien.
montana Schult. (= *palmata* Blume), bergliebende, 4. w. Ostindien, Java.
integrifolia Ker, v. Ataccia integrifolia, p. 53, II.
Tachia cordifolia Mart., G. Don, *longifolia* Mart., G. Don, v. Leianthus cordifolius et longifolius, p. 348, II.

Digitized by Google

Tachigalia Aubl. (= *Tachia* P.), Tachigalia.
emarginata G. Don, (= *Cubaea emarginata* Spgl.), ausgerandete, ħ. w. Brasilien.
floribunda Steud. (= *Dolichonemia speciosa* N. E. = *Moldenhaueria floribunda* Schrad.), blüthenreiche, ħ. w. Brasilien.
paniculata Aubl. (= *Cubaea paniculata* W.), rispige, ħ. w. Guiana.

Tacsonia Juss., Tacsonie.
mixta P. (= *Passiflora mixta* L. fil.), bunte, ħ. Sch. w. Südamerika.
β) longiflora P. (= *Tacso* P. = *Passiflora longiflora* Cav. = *P. Tacso* Cavan.).
pinnatistipula Juss. (= *Passiflora tiliaefolia* Molina, = *P. tomentosa* Cavan.).
Taeniostema micranthum Spach, v. Helianthemum glomeratum, p. 382 et p. 288, II.
Taetsia ferrea Medic., v. Cordyline ferrea, p. 160, II.

Tagetes T., Studentenblume (Sammetblume).
coronopifolia W. (= *clandestina* Lag. = *faeniculacea* Dsf., non Poepp.).
dianthiflora H. B. K., nelkenblumige, ⊙. m. f. Peru.
lunulata Ortega, (= ? *tenuifolia* Cav.), mondförmige, ⊙. m. f. Mexico.
multiflora H. B. K. (= *filifolia* Lagasca), vielblumige, ⊙. m. f. Quito.
multiseta DC. (= *subulata* Llav. et Lex.), vielborstige, ⊙. m. f. Mexico.
patula L., f) bicolor Hort.
Feuillei Bertero, Colla, v. Rancagua Feuillei, p. 582, II.

Talauma Juss., Talauma, p. 779 et p. 886.
macrocarpa Zuccar., grofsfrüchtige, ħ. t. Mexico.
mutabilis Blume, veränderliche, ħ. w. Java.
Plumierii DC. (= *coerulea* Jaume St. Hil. = *Anona dodecapetala* Lam. = *Magnolia fatiscens* Rich. = *M. Plumierii* Sw.).
pumila Blume, (= *Gwillimia indica* Rottl. = *Magnolia pumila* Andr., non Spgl., p. 488). China, Java.

Taliera Blume, Mart. (einheimischer Name).
sylvestris Blume, wilde, ħ. w. Java, Malabar.
Tali Mart. (= *bengalensis* Spgl., p. 797, = *Corypha Taliera* Roxb.).

Talinum Adans., Talinum.
crassifolium W. (= *paniculatum* Mch. = *Portulaca crassifolia* Jacq.), *β*) fruticosum W. (= *Portulaca fruticosa* Murr. = *P. paniculata* L.).
Moritzianum Kl., Moritz's, ⊙. ħ. w. Caracas.
patens W. (= *paniculatum* G. = *Portulaca paniculata* Jacq. = *P. patens* L. = *Rulingia patens* Ehrh.).
reflexum Cav. (= ? *dichotomum* R. et P. = *patens* *β* (L.) = *Portulaca reflexa* Haw.), zurückgebogenes, ħ. w. Südamerika.
teretifolium Pursh, (= *ciliatum* Lindl., non R. et P. = *trichotomum* Dsf. = *Phemaranthus teretifolius* Rafin.), stielrundblätteriges, 4. k. Pensylvanien, Texas.
triangulare W. (= *Portulaca racemosa* L. = *P. triangularis* Jacq. = *Rulingia triangul.* Ehrh.), dreikantiges, ħ. w. Antillen.
acaule Spgl., *adscendens* Hort. (= *lineare* Hflg.), *ciliatum* R. et P. etc., v. Calandrinia acaulis, pilo-

Digitized by Google

Talinum
sinecula, siliata etc., p. 145 et 705, II., *monandrum* R. et P., v. Monocosmia corrigioloides, p. 416, II., *Anacampseros* W., *arachnoides* Ait. (= *retusum* W. Enum.), *filamentosum* Ait., *lanceolatum* Lk., *polyphyllum* Lk., ? *rubens* Hort., v. Anacampseros rotundifolia, arachnoides, filamentosa, lanceolata, polyphylla, rufescens, varians, p. 51 et p. 34, II.
Tamara alba et *rubra* Roxb., v. Nelumbrum speciosum et Tamara, p. 544, II.

Tamaryx L., Tamariske.
articulata Vahl, (= ? *chinensis* Lour. = *orientalis* Forsk. = *Thuja aphylla* L.).
canariensis W. (= *gallica* var. Ehbg.), canarische, ♄. ♄. k. Canarische Inseln.
elegans Spach, (= *indica* Hort. Par.), zierliche, ♄. ♄. k. f. b. Südeuropa.
indica W. (= *epacroides* Sm. = *gallica indica* Ehrbg.).
ramosissima Ledeb. (= *gallica* Sievers), ästigste, ♄. f. Altaisches Sibirien.

Tamonea Aubl., Tamonea.
curassavica P. (= *spinosa* Sw. = *verbenacea* Spgl. = *Ghinia spinosa* W. = *G. verbenaca* Sw. = *Verbena curassavica* L. = *Zapania curassavica* Lam.).
mutica P. (= *spicata* Aubl. = *Ghinia mutica* W. = *Leptocarpos chamaedryfol.* W. herb.).

Tanacetum T., L., Wurmkraut (Rainfarrn).
annuum L. (= *Balsamita annua* DC.), jähriges, ⊙. f. Südeuropa.
Audiberti DC., Moris, Audibert's, ♃. f. Corsica, Sardinien.
canescens DC. (= *incanum* Fich. et Mey.), grauliches, ♃. f. Asiat. Rufsland, Persien.
cinereum DC. (= *Brochia cinerea* Visian. = *Cotula cinerea* Delil. = *Grangea cinerea* Loud.), aschfarbiges, ⊙. ♄. f. k. Arabien, Aegypten.
fruticulosum Ledeb. (= *tomentosum* Sievers, = *Artemisia Athanasia* Bess.).
macrophyllum Fisch., grofsblätteriges, ♃. f. ? Sibirien.
millefoliatum Fisch. et Mey. (= ? *Achillea abrotanifolia* L. = *A. myriophylla* W. Enum., p. 10), tausendblätteriges, ♃. f. Persien.
pauciflorum Richards., p. 798, (= *Artemisia matricarioides* Less. = *Cotula matricarioides* Bong.), ⊙. nicht ♃. Sibirien, Kamtschatka, nördlichstes Amerika.
purpureum D. Don, (= ? *longifolium* Wall.).
tenuifolium Jacq., dünnblätteriges, ♄. k. Himalaya.
Balsamita L., *myriophyllum* W. (= *setaceum* Tausch), v. Pyrethrum Tanacetum, p. 576, II., *chrysanthemoides* G., *grandiflorum* Poir., non Thbg., *virgatum* Lois., v. Plagius ageratoides etc., p. 534, II., *crithmifolium* L., v. Metagnanthus parviflorus, p. 402, II., *frutescens* L., v. Hippia frutescens, *linifolium* Thbg. etc., v. Stilpnophytum linifolium etc., *vestitum* Thbg., v. Saintmorysia (= *Morysia*) fasciculata, p. 532.
Die übrigen Synonyme s. p. 798.
Tanaecium pinnatum W., v. Kigelia pinnata Nachl.

Tanghinia A. Pet. Thouars, venenifera A. Pet. Thouars, Poir. (= *veneniflua* G. Don, = *Cerbera Tanghinia* Hook. = *C. venenifera* Steud.), p. 798.

Digitized by Google

Tanghinia lactaria G. Don, *laurifolia* G. Don, *Odallam* G. Don, v. Cerbera lactaria etc., p. 182. *Taonabo* Aubl., *dentata* Aubl., *punctata* Aubl., v. Ternströmia dentata, punctata, p. 801.

Tapeinotes DC. (= *Tapina* Mart., non *Tapinia* Aubl.), Tapina, XIV. II., Gesneriaceae.

barbata DC. (Mart.), (= *Gesneria barbata* N. E.) bärtige, 4. w. Brasilien.

Tapogomea Aubl., *axillaris* Poir., *elata* Poir., *purpurea* Aubl., *tomentosa* Aubl., *violacea* Aubl., v. Cephaelis axillaris, elata etc., p. 180.

Taraxacum Hall. (= *Leontodon* Auct.), Löwenzahn.

alpestre DC. (= *Leontodon alpestris* Tausch), Voralpen-L., 4. f. Sudeten.

apenninum DC. (= *Leontodon alpinus* Guss., non Jacq. = *L. apenninus* Tenore), apenninischer, 4. f. Apenninen.

collinum DC. (= *Leontodon salinus* Ledeb.?), Hügelliebender, 4. f. Daburien.

eriopodum DC. (= *Leontodon eriopodum* Wall. = *L. eriopus* Don?).

montanum DC. (= *Dubaea sonchoides* DC. = *Lasiopus sonchoides* Don, = *L. montanus* C. A. Mey.). Caucasus.

officinale Wigg., Vill. (= *commune* Dum. Cours. = *dens leonis* Dsf. = *T. Leontodon* Dum. = *officinarum* Roth, = *vulgare* Mirb. = *Leontodon Taraxacum* L.).

palustre DC. (= *lanceolatum* Poir. = *L. dentatus* Tausch, = *L. erectus* Schrk. = *L. lividus* W. K. = *L. palustris* Sm. = *L. parviflorus* Tausch, = *L. pinnatifidus* Tausch. = *L. Raji* Gouan, = *L. salinus* Poll.).

β) leptocephalum Rchb., γ) tenuifolium (Hoppe), δ) Scorzonera Roth, (= *Scorzonera Taraxaci* Roth).

Stevenii DC. (= *L. alpinus* Stev. = *L. Stevenii* Spgl.), Steven's, 4. f. Caucasus, altaisches Sibirien.

Tarchonanthus ellipticus Thbg., v. Brachylaena elliptica Nachlese, *ericoides* L. fil. (= *senecioides* Steud.), v. Eriocephalus glaber, p. 229, II.

Tarenna zeylanica G., v. Stylocoryne Webera.

Tasmannia RBr., (Tasman (Abel) ein holländ. Schiffscapitain, Entdecker von van Diemens Land u. anderer Inseln), XIII. VI., Magnoliaceae-Illicieae.

aromatica RBr. (= *Winterana lanceolata* Poir.), gewürzhafte, ħ. t. Van Diemens Insel.

In den Pflanzenverzeichnissen der belgischen Gärten wird noch eine T. minor erwähnt.

Tauscheria lasiocarpa Fisch. var. marginata Hort. Lips.

Taxodium juniperoides Rich. (= *capense* Loud. = *Cupressus juniperoides* L. = *Schubertia capensis* Spgl. = *Pachylepis juniperoides* Brongn.), v. Widdringtonia juniperoides, ?*pinnatum* Knight = ?

Taxus T., Eibenbaum.

baccata L., var. fastigiata variegata Knight, adpressa Knight, erecta nova Knight, foliis argenteo-variegatis Knight; die übrigen Variet. s. p. 799.

canadensis W., var. major Knight.

globosa Schltdl., kugelförmiger, ħ. k. Mexico.

Harringtonia Knight, (= *japonica, macrophylla* Hort.),[1] Harrington's, ħ. k. f. b. Japan.

Inukaja Knight, Inukaja-E., ħ. k. f. b. Japan.

1) Vergl. Podocarpus macrophyllus Sweet p. 698 et p. 543, II.

Digitized by Google

Taxus

Nicht hinlängl. bekannt: **bariensis** Knight, **coriacea** Hort. **chinensis** Roxb. etc., s. Podocarpus p. 638 et 543, II. **Lambertiana** Wall., v. Pinus Pindrow, p. 626 et p. 528. II.

Tecoma Juss., Trompetenbignonie.

Sect. I. Eutecoma Endl. et Tecomaria ibid. (Tecomaria Fenzl).

? **aesculifolia** DC. (= **Bignonia aesculifolia** H. B. K. p. 122).

Aesculus DC. (= **Bignonia Aesculus** Dsf), rofskastanienähnliche, ħ. w. Brasilien.

capensis Lindl. (= **Bignonia capensis** Thbg.).

chrysantha DC. (= **Bignonia chrysantha** Jacq., p. 122).

heterotricha DC., verschiedenhaarige, ħ. w. Caracas.

grandiflora Sweet, DC. (= **Bignonia grandiflora** Thbg. = **B. chinensis** Lam. = **Campsis adrepens** Lour. = **Incarvillea grandiflora** Spgl., non Hort.), grofsblumige, ħ. Sch. k. f. b. Japan, China.

leucoxylon Mart. (= **Bignonia leucoxylon** L., p. 122).

a) flore roseo, b) fl. albo.

radicans Juss. (= **Bignonia radicans** L.), β) coccinea P. (= **minor** Hort.), γ) flammea (= **major** Hort.).

? **serratifolia** G. Don, (= **Bignonia serratifolia** Vahl, p. 122).

stans Juss. (= **Bignonia frutescens** Mill. = **B. stans** L.), Westindien, Südamerika.

β) apiifolia DC. (et Hortul.), (= **incisa** Sweet, = **Bignonia incisa** Colv.), γ) velutina DC.

venusta Lemaire, (= **Bignonia venusta** Ker, p. 123).

Sect. II. Pandorea Endl.

australis RBr. (= **Pandorea** Juss. = **Bignonia Pandorana** Andr. = **B. Pandorae** Sims, = **B. Pandorea** Vent. = **B. australis** Ait.).

? β) meonantha Sweet, G. Don, (= **Bignonia meonantha** Lk. = **B. Pandorea minor** Hort. angl.).

diversifolia G. Don, verschiedenblätterige, ħ. Sch. k. t. Neuh.

floribunda A. Cunn., blüthenreiche, ħ. Sch. k. t. Neuholland (Moreton-bay).

jasminoides Lindl. (= **Bignonia jasminoides** A. Cunn.), jasminähnliche, ħ. Sch. k. t. Neuholland (Moreton-bay).

Oxleyi A. Cunn., Oxley's, ħ. Sch. k. t. Neucambria.

aquatilis DC., **triphylla** Mart. herb., **uliginosa** Mart., v. Tabebuja fluviatilis, triphylla, uliginosa, p. 716, II., **splendida** Spgl., v. Virgularia splendida.

Tectaria Cavan., coriacea Lk. (= **T. Calahuala** Cav.), v. Aspidium Sect. VII. p. 50, II.

Tectona grandis L. (= **T. Theca** Lour. = **Theca ternifolia** Hamilt.).

Teesdalia petraea Rchb., v. Hornungia petraea, p. 305, II.

Teleianthera RBr., Endl., Drüsenamaranth, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.

I. Bucholzia Mart.

ficoidea (Mart.), (= **Alternanthera ficoidea** RBr., p. 40, = **Gomphrena ficoidea** L. = **Illecebrum ficoideum** W. = **Paronychia ficoidea** Dsf.).

frutescens Endl. (Mart.), (= **Alternanthera frutescens** RBr., p. 40, = **Achyranthes halimifolia** Lam. = **Illecebrum alsinefolium** Scop. = **I. frutescens** L'Her. = **I. limense** Jacq. = **Paronychia frutescens** Dsf.).

Digitized by Google

Teleianthera
polygonoides (Mart.), (= *Achyranthes polygonoides* Lam. = *Alternanthera polygon.* RBr., p. 40, = *Gomphrena polygon.* L. = *Illecebrum polygon.* Mill.).

II. Brandesia Mart.

elongata (Mart.), (= ? *Alternanthera sericea* H. B. K. p. 40, = *Gomphrena elongata* W.), verlängerter, 4. ♄. w. Columbia.

porrigens Endl. (Mart.), (= *Achyranthes porrigens* Jacq., p. 11, = *Celosia elongata* Spgl. = *C. peruviana* Zucc. = *Gomphrena elongata* Fisch. = *G. fruticosa* Hort. = *G. nova* Hort. Par.).

III. Mogiphanes Mart., p. 527.

brasiliensis Endl. (Mart.), (= *M. Jacquini* Schrad. = *Gomphrena brasiliensis* Jacq. = *Philoxerus brasiliensis* RBr.), brasilianischer, 4. w. Brasilien.

flavescens (Mart.), (= *Alternanthera flavescens* H. B. K. = *Gomphrena brachiata* W. herb. = *Illecebrum flavescens* Spgl.), gelblicher, 4. w. Neugranada.

straminea (Mart.), (= *Gomphrena brasiliensis* L. = *G. patula* Wendl.), strohfarbiger, ⊙. ♂. w. Brasilien.

virgata (Schrad.).

Telekia Baumg., cordifolia DC. (= *speciosa* Baumg.) et speciosissima DC., v. Buphthalmum Sect. IV.

Telephium Imperati L. (= *alternifolium* Mch. = *repens* Lam.).

Teline candida Medic., v. Genista candicans.

Telmatophace gibba Schleid. (= *Lemna gibba* p. 452).

β) trichorrhiza (L.).

Telopea RBr., Telopea.

speciosissima RBr. (= *Embothrium speciosissimum* Sm. = *E. speciosum* Cav. = *Hylogyne speciosa* Knight et Salisb.).

truncata RBr. (= *Embothrium truncatum* LaBill. = *Hylogyne australis* Knight et Salisb.), abgestutzte, ♄. ♄. t. Van Diemens Land.

Teloxis Moq. Tand., Grannenmelde.

aristata Moq. Tand. (= *Chenopodium aristatum* L.), sibirische, ⊙. f. Sibirien.

Tenoria Bert., *Berteri* Colla, (= *calyculata* Bertero), v. Trixis frutescens.

Tenoria Spgl., *arborescens* Spgl., v. Heteromorpha arborescens, p. 297, II., *canescens* Loud., *coriacea* Spgl., v. Bupleurum plantagineum, coriaceum etc., p. 139.

Tephrosia P., Aschenwicke.

capensis P. (= *stricta* Eckl., Zeyh. = *Galega capensis* Thbg.), capische, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

cinerea P. (= *Galega cinerea* L.), graue, ⊙. w. m. f. Jamaica, Domingo.

Colutea P. (= *incana* Grah. = *Galega Colutea* Burm. = *G. incana* Roxb. = *G. villosa* Hamilt.), blasenstrauchähnliche, ♄. w. Ostindien.

coronillaefolia DC. (= *cinerea* P. var. Spgl. = *reflexa* DC. var. ? Spgl. = *Bristonia coronillaefolia* Desv. = *Galega coronillaefolia* Dsf.), coronillablätterige, ♄. w. Mascarenas.

frutescens DC. (= *Galega frutescens* Mill.), strauchartige, ♄. w. Campeche.

Digitized by Google

Tephrosia

hispidula Pursh, (= *gracilis* Nutt. = *Galega hispidula* Mchx.), steifhaarige, ♃. f. Nordam. (Virgin., Georgia).

β) ambigua Curt.

hypargyraea DC. (= *heterophylla* Fisch.).

leptostachya DC. (= ? *lineata* Schum. = *purpurea* Lk. = ? *uniflora* P.), schlankährige, ⊙. w. Senegal.

mimosoides P. (= *Barclayana* Sweet, = *Dalbergia Barclayi* Hook. = *Galega mimosoides* W.), sinnpflanzenähnliche, ♄. w. Ostindien.

pallens P. (= *Galega humilis* Thbg. = *G. pallens* Ait.).

purpurea P. (= *galegioides* Grah. = *lanceaefolia* Lk. = *lanceolata*, *lobata*, *stricta*, *Taylorii et tinctoria* Grah. = *Galega coerulea* Rottl. = *G. Colonila* Hamilt. = *G. lanceaefolia* Roxb. = *G. purpurea* L. = *G. sericea* Hamilt. = *G. tinctoria* Lam.).

reflexa DC. (= *Reineria reflexa* Mch.), zurückgebogene, ♄. w. ?

stricta P. (= *Galega pulchella* Scopol. = *G. stricta* Ait. = *Indigofera angustifolia* Curt. = *I. foliosa* E. Mey. = *I. stricta* L. fil.).

filiformis P. et *longifolia* P., v. Sweetia filiformis et longifolia, p. 794.

Teramnus P. Br., Laubenbohne.

hedysaroides Spgl. (= *Glycine hedys.* W. = *G. pentandra* Spgl., non Roxb.), hahnenkopfähnliche, ♄. w. Guinea.

labialis et *parviflorus* Spgl., v. Glycine labialis, p. 267, II.

Terminalia L., Catappenbaum.

Bellirica Roxb. (= ? *Chebula* W., non Retz, Roxb. = *punctata* Roth, = *Myrobalanus Bellirica* G.).

Catappa L. (= *eglandulosa* Roxb. = *intermedia* Bert. = ? *moluccana* Lam. = *myrobalana* Roth, = *subcordata* H. B. K. = *Juglans Catappa* Lour.), Ost- und Westindien.

Chebula Roxb. (= *T. myrobalanus citrina* Koen. = *reticulata* Roth).

glabrata Forst. (= ? *moluccana* Lam.), glatter, ♄. w. Freundschaftsinseln.

Ternstroemia L., Ternströmie.

japonica Sieb. et Zuccar., japanische, ♄. k. t. Japan.

lineata DC. (= *elliptica* Sw. = *meridionalis* Moc., Sess.), linirte, ♄. ♄. t. Mexico.

japonica Thbg., v. Cleyera japonica, p. 205.

Teta viridiflora Roxb., v. Peliosanthes Teta, p. 604.

Tetracarpum pinnatum Mch., v. Schkuhria abrotanoides, p. 730.

Tetracellium Turcz., *ellipsoideum* Turcz. et *globosum* Turcz., v. Tetrapoma barbareaefolium, p. 802 et Nasturtium Camelinae, p. 543.

Tetracera L., Vierhorn.

japurensis Mart. et Zuccar., japurisches, ♄. Sch. w. Brasilien.

juncea Hort. angl., simsentörmiges, ♄. Sch. t. Neuholland.

rotundifolia Sm., rundblätteriges, ♄. Sch. t. Guiana, Brasilien.

lutea Spgl., v. Diporidium arborescum, p. 206, II.

Tetradenia N. E. (non Benth.), *obovata* N. E., *zeylanica* N. E., v. Litsaea obovata et zeylanica, p. 366, II.

Tetradiclis Steven, Tetradiclis, IV. I., Rutaceae-Zygophylleae Auct., (Crassulaceae-Anatropeae Fenzl).

Eversmanni Bunge, (= *salsa* Claus., non Stev.), Eversmann's, ⊙. f. Am caspischen Meere.

salsa Steven, (= *Anatropa tenella* Ehrbg. = *Peplis alternifolia* Fisch. Hort. Gorenk.), salzliebende, ⊙. f. Gegend des caspischen Meeres, Syrien, Aegypten.

Tetradium Lour., *amarissimum* Poir., v. Brucea sumatrana, p. 124, *trichotomum* Lour. = Brucea trichotoma Spgl. (Cochinchina), wird kaum kultiv.

Tetragonia L., Viereckfrucht.

expansa Murray, Ait. (= *cornuta* G., Mch. = *halimifolia* Forst. = *japonica* Thbg. = *Demidovia tetragonoides* Pall.).

hirsuta L. fil., rauhhaarige, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

β) villosa Poir.

purpurea Otto, purpurfarbige, ⊙. f. ?

Tetragonolobus R., Scopol., Spargelerbse.

purpureus Mch. (= *edulis* Lk. = *Lotus Tetragonolobus* L.).

Requieni Fisch. et Mey., Requien's, ♂. f. Südfrankreich.

Tetrahit Mch., *Ladanum* Mch. etc., v. Galeopsis Ladanum etc.

Tetrahitum hirtum Hffg., v. Stachys hirta.

Tetramerium odoratissimum G. fil. (= *occidentale* N. E., Mart.), v. Faramea odoratissima, p. 242, II., *paniculatum* Spgl., v. Coffea paniculata, p. 153, II.

Tetranema Benth., Vierfaden, XIV. II., Personatae-Scrofularineae (Antirrhineae).

mexicanum Benth. (= *Pentstemon mexicanus* Hort.), mexicanischer, ♃. t. k. Mexico.

hirsutum Hort., v. Achimenes hirsuta, p. 6.

Tetranema nutans G. Don, Sweet, v. Desmodium nutans Nachlese.

Tetranthera Jacq., Vierfächerbeutel.

Cervantesii N. E. (= *Laurus aestivalis* Sessé, Lagasca, = *Litsaea Cervantesii* H. B. K. = *Ocotea ramentacea* Mart. herb.).

geniculata N. E. (= *aestivalis* Spgl. = *Benzoin geniculatum* G. Don, = *Evosmus geniculata* Nutt. = *Laurus aestivalis* et *axillaris* Lam. = *L. geniculata* Walt, Mchx., p. 449, = *L. glomerata* Lam.).

japonica Spgl. (= *Fiwa japonica* Gmel., System. = *Litsaea japonica* Juss. = *L. Thunbergii* Siebold, = *Tomex japonica* Thbg.), japanischer, ♄. k. Japan.

laurifolia Jacq. (= *sebifera* Spgl. = *Berrya chinensis* Klein, = *Litsaea chinensis* Lam. = *L. hexantha* Juss. = *L. obtusa* Blume, = *L. tetranthera* W. = *Tomex tetranthera* W.).

monopetala Roxb. (= *macrophylla* Wall. = *Litsaea monopetala* P. = *Tomex monopetala* Hffg.), einkroniger, ♄. w. Ostindien.

Roxburghii N. E. (= *apetala* Roxb. = *citrifolia* Juss. = *Daradmeda* Hamilt. = *Panshia* Hamilt. = *sebifera* Heyne, = *Litsaea apetala* P. = *L. citrifolia* Juss. = *L. sebifera* P. = *Tomex sebifera* W.), Roxburgh's, ♄. w. Ostindien.

albida Spgl., v. Sassafras albidum, p. 633, II., *dealbata* RBr., *obovata* Hamilt. (= *Cutpala* Don), *zeylanica* N. E. (= *pulcherima* C. Wall.), v. Lit-

Digitized by Google

Tetranthera
saea dealbata, obovata, zeylanica, p. 366, II., *trinervia* Spgl. (ex parte), v. Daphnidium Myrrha, p. 191, II.

Tetrapoma Krusianum Fisch. et Mey., Turcz., v. p. 886.

Tetrarrhena RBr., Schafgras, VI. 1., Gramineae.
distichophylla RBr. (= *Ehrharta distichophylla* LaBill.), zweireihigblätteriges, 4. k. Neuholland.

Tetratheca Sm., Vierbüchse.
affinis Endl., ähnelnde, ♄. t. Neuholland.
hirsuta Lindl. (= *Tremandra Hügelii* Hort.), rauhhaarige, ♄. t. Neuholland.
setigera Endl., borstentragende, ♄. t. Neuholland.

Tetrazygia Rich., DC., Tetrazygie, X. (VIII.) 1., Melastomaceae.
discolor DC. (= *Melastoma acuminatum* Vahl, = *M. argyratum* Presl, = ? *M. cinnamomifolium* Jacq. = *M. discolor* L. = *M. elaeagnoides* Sieb. Flor. trin.), verschiedenfarbige, ♄. w. Westindien.
Tetrorrhiza Adans., *cruciata* Delarb., v. Gentiana cruciata.

Teucrium T., L., Gamander.
angustissimum Schreb. (= *angustifolium* Steud. = *capitatum* L. var. Poir. = *Chulilia* Cav. = *Polium* var. ζ Benth.).
Arduini L. mant. (= *Scorodonia Arduini* Rchb. = *Scutellaria cretica* L.), Südeuropa, Griechenland etc.
Botrys L. (= *botryoides* Hort.).
campanulatum L. (= *diversiflorum* Mch.).
capitatum L. (= *Belium* Schreb. = *corymbiferum* Dsf. = *lavandulatum* Pourr. = *Polium* L. var. Benth. = *Polium capitatum*, *erectum*, *serratum et smyrnaeum* Mill.).
Cavanillesii Bertero, (= *bicolor* Sm. = *heterophyllum* Cavan., non L'Her. = *orchideum* Lindl.), Cavanilles's, ♄. k. Chili.
Chamaedrys L. (= *multiflorum* Hort., non L. = *officinale* Lam. = *Pseudo chamaedrys* Wender.).
chilense Dsf., chilesischer, ♄. k. Chili.
cubense L. (= *chamaedryfolium* Mill. = *laevigatum* Vahl).
euganeum Visiani, euganeischer, 4. f. Oberitalien.
flavum L. (= *Chamaedrys flava* Mch.), β) purpureum Benth. (= *lucidum* Sibth., Sm., non L. = *regium* Hortul.). Griechenland, Smyrna.
fruticans L. (= *tomentosum* Mch. = *Polium latifolium* Mill.).
inflatum Sw. (= *palustre* H. B. K. = *vesicarium* Mill. = *villosum* Forst.).
lusitanicum Lam., non Schreb. (= *Salviastrum* Hffg., Lk. = *Scorodonia lancifolia* Mch.), portugiesischer, 4. ♄. k. Portugal.
Marum L. (= *maritimum* Lam.), β) myrtifolium Dsf.
Polium L. Als Abarten werden von Bentham dazu gestellt: aureum Schreb., aegyptiacum P., flavescens Schreb., valentinum Schreb. (= *Polium fruticosum* Mill.), pycnophyllum Schreb., cylindricum Schreb., capitatum L., Achaemis Schreb. (= *Polium integerrimum* Mill.), β) vulgare Benth., hierzu lusitanicum Schreb., non Lam. (= *album* Poir.), Pseudo hyssopus Schreb. (= *lanigerum* Lagasca) etc.

Digitized by Google

Teucrium

pyrenaicum L. (= *reptans* Poir. = ? *rotundifol.* Schreb.).
scordioides Schreb. (= *lanuginosum* Hffg., Lk.).
spinosum L. (= *mucronatum* L.).

Chamaepitys L., *Laxmanni* L., *salicifolium* L., v. Ajuga Chamaepitys, Laxmanni, salicifolia, p. 26, 27 et p. 17, II., *sibiricum* L., v. Nepeta ucranica.

Thalictrum T., Wiesenraute.

angustifolium L. (= *angustissimum* Crtz. = *Bauhini* Spgl. = *Bauhinianum* Wallr. = *nigricans* Gaud.). *α*) stenophyllum K. (= *angustifolium* DC.), *β*) heterophyllum K. (= *nigricans* DC., non Jacq. = *Morisoni* Gmel.), *γ*) laserpitiifolium W. Enum. (= *lucidum* DC.).
altaense Fisch, altaische, 4. f. Altaisches Sibirien.
baicalense Turcz., baicalische, 4. f. Sibirien.
calabricum Spgl. (= *purpureum* Tenore).
Cornuti L. (= *revolutum* DC.), *β*) corynellum DC. (= ? *confertum* Mch. = *pubescens* Pursh).
dasycarpum Fisch., Mey. et Lallem. (= *Cornuti β* Hort. Petropol.), rauchfrüchtige, 4. f. Nordamerika.
dioicum L. (= *laevigatum* Mchx.).
dunense Dumort., Dünen-W., 4. f. Belgien.
flavum L. (= *pratense* L. fl. lappon. = *nigricans* Jacq. = *anonymon* Wallr. = *heterophyllum* Lej.), *β*) vaginatum Dsf., *γ*) latifolium Tausch, *δ*) angulosum Dsf.
floribundum Schrad., blüthenreiche, 4. f. ? Sibirien.
foetidum L. (= *saxatile* Vill. = *styloideum* L. fil.).
gracile C. A. Mey., schlanke, 4. f. Altaisch. Sibirien.
isopyroides C. A. Mey., Ledeb., doltockenähnliche, 4. f. Alaisches Sibirien.
Kochii Fr., Koch's, 4. f. Schweden.
Leyii Löhr, Ley's, 4. f. Eifel.
rugosum Ait. (= ? *crenatum* Dsf. = *discolor* W.).
sibiricum L. (= *acuminatum* Spgl. = *parvifolium* Mch.). *β*) ruthenicum Schrad.
strictum Ledeb. (= *exaltatum* C. A. Mey.), steife, 4. f. Altaisches Sibirien.
vulgare Fr. Schultz, gemeine, 4. f. Europa, Sibirien. *α*) minus L. (= *Jacquinianum* K. = *majus* Jacq. = *montanum* Wallr.), *β*) roridum K. (= *glaucescens* W.), *γ*) glandulosum K. (= *pubescens* Schlchr. = *montanum glandulosum* Wallr.), *δ*) strictum K. (= *sylvaticum* K. = *minus* Poll. = *saxatile* DC.), *ε*) dumosum K. (= *ambiguum* Schlchr. = *elatum* Gaud. = *majus* Sm.), *ζ*) nutans Dsf., *η*) flexuosum Rchb. (= *collinum* Wallr.), *ϑ*) trispermum Fisch., *ι*) capillare Rchb.
Unbestimmtere: altissimum Wender., apiculatum Tausch, Sweet, cinereum Dsf., dichotomum Hort., divaricatum Hornem., W., glaucifolium Wender., glaucophyllum Wender., Schweiggeri Spgl.

Thapsia T., Thapsie.

altissima Mill., höchste, 4. f. Apulien.
Asclepium L. (= *Apulia* Mill.).
maxima Mill. (= *villosa* L. var. ? DC.), gröfste, 4. f. b. Span.
villosa L. (= *decussata* Lagasca).

foetida L., *meoides* Guss., v. Elaeoselinum foetidum et meoides, p. 218, II., *gummifera* Spgl., v. Laserpitium gummiferum, p. 343, II., *Laserpitii* Spgl., v. Prangos ferulacea, p. 558, II.

Hinsichtlich der übrigen s. Thapsium.

Digitized by Google

Thapsium Nutt. (= *Thaspium* Auct.), Thapsium, V. in, Umbelliferae.
barbinode Nutt. (= *Ligusticum barbinode* Mchx. = *Sison trifoliatum* W. Enum. ex parte, = *Smyrnium barbinode* Mühlbg. = *Thapsia trifoliata* Mill., p. 806), bartknotige, 4. f. Nordamerika.
cordatum Torr. et A. Gr. (= *Sison trifoliatum* Mchx. = *Smyrnium cordatum* Walt. = *Sm. trifoliatum* Mühlbg. = *Thapsia trifoliata* L. = *Zizia cordata* K.), herzförmige, 4. f. Nordamerika.
β) atropurpureum Nutt. (= *Cnidium atropurpureum* Spgl. = *Smyrnium atropurpureum* Lam.).
Thaumaria cretica Gaudich., v. Parietaria cretica, p. 586.

Thea L., Theestrauch.
assamica Hort. angl., assamischer, ħ. t. Ostindien.
Thecanthes punicea Wickstr., v. Pimelea punicea, p. 525, II.
Theka Lam., *ternifolia* Hamilt., v. Tectona grandis, p. 800.
Thelysia grandiflora Salisb., v. Iris alata, p. 421.

Theobroma L., Cacaobaum.
angustifolia Moç., Sess. (= ? *speciosa* W. herb.), schmalblätteriger, ħ. t. w. Mexico, Brasilien.
caribaea Sweet, caribäische, ħ. w. Westindien.
guianensis W. (= *Cacao guianensis* Aubl.).
augusta L., v. Abroma augusta, p. 1.
Theodora speciosa Medic., *stipulata* Eckl., Zeyh., v. Schotia speciosa et stipulata, p. 731.
Theodorea amara Cass., v. Saussurea amara, p. 723.

Theophrasta L., Theophrasta.
Jussieui Lindl. (= *americana* Juss., Dsf., Sw., non L. = *Henrici* Hamilt.).
latifolia W., breitblätterige, ħ. w. Südamerika.
pinnata Jacq. (= *Browneа erecta* Hort.), gefiederte, ħ. w. Caracas.
macrophylla L., v. Claviga macrophylla, p. 202, *serrata* Hffg. (= *serratifolia* Hort.), v. Brexia spinosa, p. 131.

Thermopsis RBr. (= *Thermia* Nutt., Spgl.), Fuchsbohne.
corgonensis DC. (= *alpina* Ledeb. = *Thermia alpina* Spgl.).
rhombifolia DC. (= *fabacea* DC. var. Hook. = *Cytisus rhombifol.* Pursh, = *Thermia rhombifol.* Nutt.), rautenförmigblätterige, 4. f. Nordamerika.

Thesium L., Leinblatt.
Bergeri Zuccar., Berger's, 4. f. b. Griechenland.
ebracteatum Hayne, (= *comosum* Roth).
macranthum Fenzl, grofsblumiges, 4. k. Mesopotamien.
montanum Ehrh. (= *bavarum* Schrk.).
multicaule Ledeb., vielstengeliges, 4. f. Alt. Sibirien.
pratense Ehrh. (= *brevicolle* Presl, = *decumbens* Gmel. fl. Bad. = *Linophyllum* L., Sm., var. Spgl.).

Thevetia L., Juss., Thevetie, V. x., Contortae-Apocyneae.
Ahovai A. DC. (= *Cerbera Ahovai* L., p. 172).
cuneifolia A. DC. (= *Cerbera cuneifolia* H. B. K.), keilblätterige, ħ. ħ. w. t. Mexico.
nereifolia Juss. (= *Cerbera Thevetia* L.), oleanderblätterige, ħ. ħ. w. Westindien.

Digitized by Google

Thibaudia R. et P. (Thibaud de Chanvalon, franz. Botaniker), X. r., Ericaeeae-Vaccinieae.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ħ. t. Neugranada.
coriacea Blume, *lucida* Blume, *setigera* Wall., *Sprengelii* Wall., v. Agapetes coriacea, lucida, setigera, p. 12, II. et Sprengelii Nachlese, *serrata* Wall., v. Gaylassacia serrata, p. 256, II.
Thibaudia nervosa Colla, v. Bletia florida.

Thisantha Eckl., Zeyh., Dickblümchen, V. IV., Corniculatae-Crassulaceae.

glabra Eckl., Zeyh. (= *Crassula glabra* Haw. = *C. glomerata* β Ait., W.), kahles, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.
glomerata Eckl., Zeyh. (= *Crassula glomerata* L. = *C. scleranthoides* Burm.), knaulförmiges, ⊙. m. f. Cap der guten Hoffnung.
strigosa Eckl., Zeyh. (= *Crassula strigosa* L.), striegeliches, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

Thlaspi Dill., T., Täschelkraut.

alpinum Jacq. (= *minimum* Arduin. = *montanum* γ DC.). β) sylvium Gaud.
altaicum Fisch. et Mey., altaisches, ♂. 4. f. Alt. Sibirien.
annuum C. Koch, jähriges, ⊙. f. Asiat. Rufsland.
arvense L. (= *baicalense* DC.).
ceratocarpum Murr., L. fil. (= *cornutum* Clairv. = *Capsella ceratocarpa* Mch.).
cochleariforme DC., löffelkrautähnliches, 4. f. Sibirien, Dahurien.
collinum MB. (= *arvense* L. var. Spgl. = *nemorosum* Adam., Hoffm.).
hastulatum Stev. (= *Hutchinsia hastulata* DC. = *Lepidium chalepense Gmelinianum* Fisch. = *Noccaea hastul.* Steud.), spontonförmiges, 4. f. Sibir., Caucasus, Persien.
latifolium MB. (= *macrophyllum* Hoffm. = *Pterotobium Biebersteinii* Andrz.).
orbiculatum Stev. (= ? *Fischerianum* Bess.), kreisförmiges, ⊙. f. Europa, Caucasus.
rotundifolium Gaud., K. (= *Hutchinsia rotundif.* DC. = *Iberis rotundif.* L. = *Lepidium rotundif.* All. = *Noccaea rotundif.* Mch., Rchb.).
stylosum * (Tenore), (= *Hutchinsia stylosa* DC. = *Iberis styl.* Tenore, = *Noccaea styl.* Rchb.).
strictum Sweet, steifes, ⊙. f. Persien.
arabicum Vahl, (non MB., nec Desv.), v. Schouwia arabica, p. 643, II., *africanum* Burm., *campestre* L., *Cardamines* Poir. etc., v. Lepidium africanum, campestre, etc., p. 454 et 350, II. Zu ergänz. p. 807. *Thlaspidium semperflorens* Andrz., v. Iberis semperflorens, *Thlaspidium* Medic., *hieracifolium* Medic., *saccatum* Medic. etc., v. Biscutella apula, auriculata etc., *Thlaspidium sativum* Spach, v. Lepidium sativ.

Thomasia Gay., Thomasie.

canescens Lindl., grauliche, ħ. t. k. Neuholland.
diffusa G. Don, (= ? *prostrata* Hort.), weitschweifige. ħ. t. k. Neuholland.
glutinosa Lindl., klebrige, ħ. t. k. Neuholland.
grandiflora Lindl., grofsblumige, ħ. t. k. Neuholland.
paniculata Lindl., rispige, ħ. t. k. Neuholland.
pauciflora Lindl., wenigblumige, ħ. t. k. Neuholland.
stipulacea Lindl. (= *macrocarpa* Hügel), zwischenblätterige, ħ. t. k. Südwestl. Neuholland.

Digitized by Google

Thomasinia Auct., v. Tommasinia.
Thrasya H. B. K., *cultrata* N. E., v. Panicum monostachyum, p. 474, II.

Thrinax L. fil., Schilfpalme.
argentea Lodd. (= *Palma argentea* Jacq. fragment.), silberfarbige, ħ. w. Antillen.
barbadensis Lodd. (= *parviflora* Maycock fl. Barbad., non Sw.), barbadische, ħ. w. Barbados.
multiflora Hort. angl. et belg., vielblumige, ħ. w. Westindien.
parviflora Sw. (= *Corypha palmacea* P. Br.).
Pumilio Lodd. (= *pumila* Fulchiron), niedrige, ħ. w. Jamaika.
pygmaea Hort. angl. et belg., zwergige, ħ. ħ. w. ? Westind.
radiata Lodd. (= *aurata*, *aurantia*, *elegans* et *gracilis* Hort.), strahlige, ħ. w. Antillen, Trinidad.
stellata Hort. angl. et belg., sternförmige, ħ. ħ. w. ? Westind.

Thrincia Roth, Thrincie.
glabra Schlchr., kahle, 4. f. Schweiz, östreich. Litorale.
hirta Roth, (= *pilocalyx* Lagasca, = *Apargia hirta* Scop. = *Colobium hirtum* Roth, = *Hedypnois hirta* Sm. = *Hyoseris hirta* G. = *Leontodon hirtus* L.), β) nudicalyx Lagasca, (= *psilocalyx* Rchb.), γ) Leysseri Wallr. (= *taraxacoides* β Gaud.).
maroccana P. (= *hispida* Roth var. K. = *mauritanica* Spgl. = *Hyoseris hispida* Schousb.).

Thuja L., Lebensbaum.
Doniana Hook. (= ? *Dacrydium plumosum* Don), Don's, ħ. k. Neuzeeland.
excelsa Bongard, (= *Cupressus americana* Trautv.), hoher, ħ. f. Insel Sitcha.
lineata Daf., Poir., linirter, ħ. f. k. ?
β) lavandulaefolia Dsf.
nepalensis Lodd., nepalscher, ħ. f. b. k. Nepal.
occidentalis L., var. ovata Hort. Vindob.
orientalis L., α) expansa Endl., β) pyramidalis Tenore, γ) stricta Hort., δ) tatarica Pinet. Woburn., ε) Wareana Hort. angl.
Hybride: hybrida Knight.
cupressoides L., v. Widdringtonia cupressoides.

Thunbergia L., Thunbergie.
alata Hook. Hybriden u. Varietäten: albiflora Hort., (= *leucantha* Hort.), aurantiaca Hort. et aurantiaca superba Hort., Barkeriana Hort., Fryeri Lindl., flava Hffg.
chrysops Hook., goldfarbige, 4. ħ. Sch. w. Sierra Leone.
? fastuosa v. Houtte, prächtige, ħ. Sch. w. ?
Hawtayneana Wall. (= *coerulea* Wight, = *Meyenia Hawtayneana* N. E.).
Saltiana Steud. (= *angulata* RBr., non Hook.), Salt's, ħ. Sch. w. Abyssinien.
coccinea Roxb., Wall., v. Hexacentris coccinea, p. 298, II.
Thunbergia capensis Montin, v. Gardenia Thunbergia.
Thylacantha campestris Mart., v. Angelonia salicariaefolia, p. 869.
Thymbra ciliata Dsf., *hirsuta* P. (= *hirsutissima* Vent.), v. Thymus ciliatus et hirsutissimus, *spicata* Pall, non L., v. Ziziphora taurica, p. 864.
Thymelaea Adans., Scop., Mch., *alpina* Mch., *Cneorum* All. etc., v. Daphne alpina, Cneorum etc., *arvensis* Lam., *dioica* All., *Tartonraira* All., v. Passerina annua, dioica, Tartonraira.

Digitized by Google

Thymelina sericea Hffg., *simplex* Hffg., v. Gnidia sericea et imberbis.

Thymus T., Thymian.

bracteosus Visiani, deckblätteriger, ♄. f. Dalmatien.

capitatus Hffg. et Lk. (= *creticus* Brot. = *Marinesci* Tenore, = *Satureja capitata* L.), kopfförmiger, ♄. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

ciliatus Benth., non Lam. (= *Thymbra ciliata* Dsf.), gewimperter, ♄. k. Nordafrika, Canarische Inseln.

citriodorus Gmel., Lk., non Schreb. (= ? *elatus* Schrad.).

hirsutissimus Poir. (= *Thymbra hirsuta* P. = *T. hirsutissima* Vent.), rauhhaarigster, ♄. k. Kleinasien.

pannonicus All. (= *austriacus* Bernh. = *lanuginosus* Mill. = *hirsutus* plur. Auct. = *piligerus* Opiz).

β) Marschallianus W.

pulchellus C. A. Mey., schöner, ♄. f. Caucasus.

Serpyllum L., arenarius Bernh., decumbens Bernh., sylvestris Auct., non Schreb., effusus Host var.

striatus Vahl, (= *acicularis* Guss., non W. K. = ? *hirtus* W. Enum. = *Zygis* Sibth., Sm., non L.), gestreifter, ♄. k. f. b. Südeuropa, Griechenland.

tenuifolius Mill. (= *vulgaris* L. var. Benth.), dünnblätteriger, ♄. f. b. k. Südspanien.

tomentosus W. (= ? *elongatus* Lk. = *marifolius* Pourr., non W.).

Willdenowii Boiss. (= *hirtus* W. Enum.), Willdenow's, ♃. k. f. b. Gibraltar.

Unbestimmtere: aegyptiacus Benth., splendens Hort. *alpinus* L., *Calamintha* Scop. (= *Moschatella* Polli. = *umbrosus* Spgl.), *carolinianus* Mchx. (= *grandiflorus* Sims), *grandiflorus* Scopol., *graveolens* MB. (= *canus* Stev. = *exiguus* Sibth., Sm.), *Herba barona* Loisel. (= *affinis* Sieb. = ? *lucidus* Guss.), *Nepeta* Sm. (= *Brauneanus* Hoppe, = *diffusus* Hortul.) et var. athonicus Bernh., *patavinus* Jacq. (= *suaveolens* Sibth., Sm.), *rotundifolius* Poir. (= *melissoides* Bernh.), *purpurascens* Poir., v. Calamintha alpina, officinalis, caroliniana, etc., p. 144, Sect. I. et II., *lucidus* Ehrh., v. Ziziphora clinopodioides, *origanifolius* Visiani, v. Calamintha thymifolia, p. 104, II.

Hinsichtl. d. übrigen Synonyme s. Micromeria, p. 809 et 406—407, II.

Thysanocarpos Hook., Franzennüfschen.

curvipes Hook. (= *runcinatus* G. Don).

pusillus Hook., niedriges, ♃. f. Californien.

Thysanothus RBr., Wimperkrone.

divaricatus RBr., ausgespreitzte, ♃. Kn. t. k. Neuholland.

hispidulus RBr. (= *Chlamysporum hispidulum* Salisb.), steifhaarige, ♃. Kn. t. k. Neuholland.

multiflorus RBr. (= *Chlamysporum junceum* Salisb.), vielblumige, ♃. Kn. t. k. Neuholland.

Ob anceps Lindl., asper Lindl., Manglesianus Kunth, pauciflorus RBr. (= *Chlamysp. pauciß.* Salisb.), triandrus RBr. (= *Chlamysp. triand.* Salisb.), sämmtlich Neuholländer, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Thysselinum Adans., Hoffm., Mch., *angustifolium* Rchb. (= *palustre* Hoffm. = *Plinii* Spgl. = *sylvestre* Rchb.), *cantabrigense* Hoffm., *involucratum* Mch., v. Peucedanum sylvestre et var. *β* et selinoides, p. 505, II.

Digitized by Google

T. davuricum Spgl., v. Callisace dahurica, p. 148, *grandiflorum* Mch., v. Pleurospermum austriacum, p. 635, *nigrum* Mch., v. Ligusticum pyrenaicum, p. 482, *lucidum* Mch. = ?

Tiarella L., Spitzhütchen.

pentandra Torr. (= *Oreanthus bracteatus* Raf.), fünfmänniges, 4. f. Nordamerika.

trifoliata L., dreiblätteriges, 4. f. Asien, Nordamerika.

unifoliata Hook., einblätteriges, 4. f. Nordamerika.

biternata Vent., v. Hoteja biternata, p. 205, II., *bracteata* Torrey, *colorans* Grah., *Menziesii* Pursh, v. Heuchera bracteata, glabra, Menziesii, p. 298, II. *Tiaridium* Lehm., *indicum* Lehm. (= *anisophyllum* G. Don), *monostachyum* G. Don, *velutinum* Lehm., v. Heliophytum indicum, monostachyum, velutinum, p. 292, II.

Ticorea Aubl. (einheimischer Name), X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

foetida Aubl. (= *Ozophyllum foetidum* Martin, Räusch. = *O. trifoliatum* W.), stinkende, ħ. w. Guiana.

jasminiflora St. Hil. (= *Galipea multiflora* Schult. = *Sciuris multiflora* N. E., Mart.), jasminblumige, ħ. w. Brasilien.

Tigridia Juss., Tigerblume, (Pfauenschwertel).

lutea Lk., Kl., Otto, gelbe, 4. Zw. k. Chili.

Pavonia Juss., P. (= *grandiflora* Salisb. = *Ferraria Pavonia* L. = *F. Tigridia* Sims, = *Moraea Pavonia* Thbg.), β) conchiflora Sweet.

In van Houttes Etablissement horticole wird noch eine T. augusta, coccinea, coelestis (= *exaltata*) kultivirt.

Tilia T., Linde.

alba W. K. (= *argentea* Dsf., DC. = *pannonica* Jacq. = ?*petiolaris* DC. = *rotundifolia* Vent. = *tomentosa* Mch.), α) depressa Hort. Vindob., β) oblonga Hort. Vindob., γ) virescens Spach, (= ?*argenteo-nigra* A. Braun, Döll.).

flava Wolny, hellgelbe, ħ. f. Banat.

flavescens A. Braun, gelbliche, ħ. f. ?

floribunda A. Braun, (= *laxiflora* Hort. Carlsr.), blüthenreiche, ħ. f. ?

grandifolia Ehrh. (= *effinis* Opiz, = *communis* γ Spenn. = *cordifolia* Bess. = *corymbosa* Ortm. = *europaea* β. δ. ε. L. = *mollis* Spach, Ortm. = *pauciflora* Hayne, = *platyphylla* Scopol. etc.), α) vulgaris Spach, β) pluriflora Spach, γ) longepedunculata Spach, δ) bracteosa Spach, ε) leptolepis Spach, ζ) brevipes Spach. — Nach der Gestalt der Früchte: oxycarpa Rchb., sphaerocarpa Rchb., turbinata Rchb. — corylifolia Host, flaccida Host, intermedia Host, non DC., laciniata Host, latebracteata Host, mutabilis Host, obliqua Host, praecox Host, pyramidalis Host, spectabilis Host, vitifolia Host, gehören nach Koch und Endlicher als Varietäten (oder zum Theil Hybriden) auch hierher.

heterophylla Vent. (= *alba* Mchx., non W. K. = *americana* Du Roi, = *macrophylla* Hort.).

laxiflora Mchx. (= *glabra* var. Loud. = *pubescens* Ait. = *americana* Walt., Wangenh. = *carolineana* Mill.). β) leptophylla Vent. (= *missisippensis* Dsf.).

neglecta Spach, übersehene, ħ. f. Nordamerika.

Digitized by Google

Tilia

nigra Borkh., Spach, (= *americana* L., Ait. = *canadensis* Mchx. = *caroliniana* Wangenh. = *hollandica* DuRoi, = *glabra* Vent.), *β*) vestita Doell.

parvifolia Ehrh. (= *sylvestris* Dsf.), var. cordifolia Spach, major et rotundifolia Spach.

praecox A. Braun, non ? Host, (= *corallina* Hort. Carlsr.), frühzeitige, ♄. f. ?

rubra DC. (= *europaea* var. *rubra* Loud. = *grandifolia* *β* Sm. et plur. Auct.).

truncata Spach, (= *pubescens* var. Vent.), abgestutzte, ♄. f. Carolina, Georgia.

Tillaea Michel., Tillaea.

Drummondii Torr. et A. Gr., Drummond's, ☉. f. Texas, Louisiana.

peduncularis Sm. (= *Bulliardia bonariensis* DC. = *Crassula bonariensis* Cambes.), gestielte, ☉. f. Brasilien, Bonarien.

rubescens H. B. K. (= *connata* R. et P. = *diffusa* W. herb.).

aquatica L., *prostrata* Schkhr., *Vaillantii* W., v. Bulliardia aquatica (= *Linnaei* Spgl.) et var. *β* prostrata (= *Schkuhrii* Spgl.), et Vaillantii, p. 137, *erecta* Sauv. (= *rubra* Gouan), v. Sedum caespitosum, p. 651, II., *hexandra* Lapier., v. Elatine hexandra (= *tripetala* L.), *pharnaceoides* Hochst., v. Crassula pharnaceoides, p. 165, II.

Tillandsia L., Thbg., Tillandsie.

aloides Cham., Schltdl., aloeähnliche, 4. w. Mexico.

aloifolia Hook. (= *flexuosa* *β* Lindl. = *tenuifolia* Jacq., non Sw.).

dianthoides Rossi, (= *aeranthus* Dsf. = ?*subulata* Arrabida, = *Amalia aerisiniola* Hort. hispan.? = *Pourretia aeranthus* Loisel.), nelkenähnliche, 4. w. Brasilien.

filiformis Lodd., fadenförmige, 4. w. ?

floribunda H. B. K. (= *coarctata* W.), blüthenreiche, 4. w. Peru.

Karwinskyana Schult., Karwinsky's, 4. w. Mexico.

rubida Lindl., röthliche, 4. w. Brasilien.

vitellina Kl., dottergelbe, 4. w. Brasilien.

Unbestimmtere: acutifolia Hort. angl., discolor Hort., farinosa Hort. (Billberg. spec.?), obscura Lodd., splendens Hort., tortuosa Lodd.

exsudans Dsf., v. Bromelia exsudans, p. 132, *zonata* Hort., *bicolor* Hort., v. Billbergia zebrina et bicolor, p. 123 et 69, II., *psittacina* Hook., v. Vriesia psittacina.

Tinantia Scheidw., Tinantie, Ill. z., Commelynaceae.

fugax Scheidw. (= *Commelyna rosea* Schltdl.), flüchtige, ☉. m. f. Mexico.

Tinus occidentalis L., v. Clethra tinifolia, p. 205, *Tinus laurifolius* Medic., Borkh., v. Viburnum Tinus. *Tithymalus* Neck., Mch., Haw., *acutifolius* Lam., *antiquorum* Mch. etc., v. Euphorbia Pithyusa, antiquorum etc.

Tithonia Dsf., Aurorablume.

excelsa DC. (= *Helianthus excelsus* W. = *H. giganteus* Cav., non L. = *H. trinervis* Hort.).

pachycephala DC., dickköpfige, 4. k. Mexico.

tubaeformis Cass. (= *helianthoides* Weinm. = *Helianthus tubaeformis* Ortega).

Digitized by Google

Tittmannia ovata Rchb., *viscosa* Rchb., v. Vandellia crustacea et hirsuta.

Tium Medic., *hians* Mch. et *lineare* Mch., v. Oxytropis deflexa et Astragalus sulcatus.

Tococa D. Don, p. 812.

Aubletii D. Don, (= *guianensis* Aubl. = *Melastoma physiphora* Vahl, = *M. Tococa* Desr.).

lanata D. Don, (= *Melastoma lanata* Hort. Cels.).

Toddalia Juss., Toddalie.

aculeata P. (= *asiatica* Lam.).

paniculata Lam. (= *inermis* P. = *Scopolia inermis* Sm. = *S. paniculata* Spgl. = *Vepris obovata* G. Don).

Tofieldia Huds., Tofieldie.

calyculata Whlbg. (= *allemannica* Bluff et Fingerh. = *alpina* Sm. = *anthericoides* Schrk. = *palustris* DC. Sthg.). β) rubescens Hoppe, (= *rubra* Braune), γ) capitata Hoppe, δ) racemosa Hoppe, (= *collina* Schult. = *Hebelia collina* Gmel.).

pubens Dryandr., Sm. (= *pubescens* P.).

Tolmiea Menziesii Torr., A. Gray., v. Heuchera Menziesii, p. 298, II.

Tollatia Endl., Tollatie, XIX. II., Compositae-Corymbif.

chrysanthemoides Endl. (= *Oxyura chrysanthemoides* DC. p. 580, non Hort.).

Tolpis Adans., G., Tolpis.

I. Drepania Juss., Dsf.

barbata G. (= *prolifera* Mch. = *Crepis barbata* L., non Mill. = *C. boetica* Mill.), b) pallida (Dsf.).

II. Polychaetia Tausch, (= *Schmidtia* Mch.).

altissima P. (= *sexaristata* Bivon. = *virgata* Bertol. = *Crepis alt.* Balb. = *C. ambigua* Balb. = *C. virgata* Dsf. = *Schmidtia ambigua* Cass.).

crinita Lowe, (= ? *Schmidtia quercifolia* Rchb.).

fruticosa Schrk. (= *Asthionia fruticosa* Don, = *Hieracium fruticosum* L.).

pectinata DC. (= *Crepis pect.* Lowe, = ? *Schmidtia anethifol.* Rchb.), kammförmige, ☉. ♄. f. k. Madeira.

Tomex japonica Thbg., v. Tetranthera *japonica*.

Tommasinia Bertol. (Tommasini, Magistratspräsident zu Triest), V. II., Umbelliferae.

verticillaris Bertol., wirtelförmige, 4. f. Südl. Schweiz, Oberitalien.

Tonsella (= *Tontelea*) *pyriformis* Sweet, *prinoides* Roxb., v. Salacia pyriformis et prinoides, p. 623, II.

Tordylium T., Zirmet (Drehkraut).

Hasselquistiae DC., Hasselquist's, ☉. m. f. Brasilien.

officinale L. (= *microspermum* Tenore, = *Condylocarpus officinalis* K.).

Unbestimmt: sulcatum Dsf.

absinthifolium P., v. Zosimia absinthifolia, p. 865, *aegyptiacum* L., *cordatum* Poir., v. Hasselquistia aegyt. et cordat., *cyrenaicum* Spgl., v. Helosciadium nodiflorum, *peregrinum* L., v. Ulospermum dichotomum, p. 830, *segetum* Hort. Par., v. Torilis helvetica, p. 813, *silfolium* Scopol. (= ? *austriacum* Hort.), v. Heracleum austriacum.

Torenia L., Torenie.

asiatica L. (= *hians* et *vagans* Roxb.).

edentula Griff. (= *pedunculatis* Benth.), zahnlose, ☉. 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Torenia

hirsuta Lam. (= *cordifolia* Benth., non Roxb.), rauhhaarige, ⊙. 4. w. Ostindien.

plantaginea Benth. (= *Craterostigma plantagineum* Hochst. = *Dunalia acaulis* RBr.), wegetrittähnliche, 4. w. Abyss.

crustacea Cham., Schltdl. (= *alba* Hamilt. = *flaccida* RBr. = *lucida* Hamilt. = *varians* Roxb.), *diffusa* Roxb., *hirta* Chamiss., Schltdtl., v. Vandellia crustacea, pedunculata scabra, *obtusifolia* Sm., v. Mimulus glabratus, p. 410, II.

Torilis Adans., G., Klettenkörbel.

Anthriscus G. Gmel. (= *rubella* Mch.).

helvetica Gmel. (= *divaricata* Mch. = *infesta* Hoffm. = *radiata* Mch. = *Caucalis arvensis* Huds. = *C. helvetica* Jacq. = *C. infesta* Curt. = *C. segetum* Thuill. = *Scandix infesta* L., non Jacq.).

β) purpurea Tenore.

microcarpa Bess. (= *ucranica* Spgl.), kleinfrüchtiger, ⊙. f. Ucraine, Podolien.

crinita Spgl., v. Daucus crinitus, *macrocarpa* G. (= *tumida* Mch.), v. Chaerophyllum nodosum.

Tormentilla erecta L. (= *officinalis* Curt. = *tuberosa* Regn.), *humifusa* G. Don, *reptans* L. v. Potentilla Tormentilla, humifusa, nemoralis, p. 651 et p. 556—557, II.

Torresia latifolia B. P., v. Centotheca lappacea, p. 179.

Tortula aspera Roxb., v. Streptium asperum, p. 790.

Tosagris agrostidea P. B., v. Mühlenbergia capillaris, p. 533.

Tournefortia L., DC. (et Messerschmidia L., p. 521), Tournefortie.

Sect. I. Mallota A. DC.

argentea L. (= ?*velutina* Sm., non H. B. K.).

Sect. II. Arguzia Amman., DC. (= *Messerschm. spec.* L., R. et S.).

Arguzia RBr., R. et S. (= *M. Argunia* G. = *M. Arguzia* L. fil. suppl.), *α)* latifolia DC., *β)* angustior DC. (= *M. rosmarinifolia* W.).

Sect. III. Pittonia H. B. K., DC.

microphylla Desv. (= *lucida* Dsf. Hort. Par.), kleinblätterige, ♄. Sch. w. Westindien.

tomentosa Mill. (= *M. tomentosa* G. Don), filzige, ♄. Sch. w. Südamerika.

bicolor Sw., cymosa L., foetidissima L. (= *corymbosa* W. = *dichotoma* Flor. mexic. ined. = *foetida* P. = *macrophylla* Lam.), gnaphaloides RBr. (= *Heliotropium gnaphaloides* Jacq.), heliotropioides Hook., hirsutissima L., non Blanco, (= *corymbosa* Sw. fl. trin. exsic. = *Messerschm. hirsutiss.* G. Don, = *Cordia pellita* W. = *Ehretia cymosa* W.), laurifolia Vent. (= ? *laurifolia* R. et S.), mutabilis Vent., scabra Lam., scandens W. Enum. (= *peruviana* Poir. = *volubilis* R. et P., non L. = *M. scandens* R. et S.), suffruticosa L. (= *incana* Lam.), volubilis L. (= *M. volubilis* R. et S.).

Sect. IV. Tetrandra DC. et A. DC., Wallichii DC., tetrandra Blume, Java, Ostind., werden nicht kult.

Sect. V. Messerschmidia DC., L.

fruticosa Ker. (= *T. Messersch.* Sw. = *Messersch. fr.* L. fil.).

β) angustifolia R. et S. (= *M. fruticosa β* P.).

Nur d. Namen nach bekannt: angulosa Dsf. Cat. hort. Par.

Digitized by Google

Toxomita fructipendula Poir., v. Marialva fructipendula, p. 387, II.

Toxicodendron Mill., G., non Thbg., *altissimum* Mill., *crenatum* Mill., *glabrum* Mill., *pubescens* Mill. (= *serratum* Mill., *vulgare* Mill. (= *volubile* Mill.) etc., v. Rhus succedaneum, suaveolens, glabrum, Toxicodendron et radicans etc., p. 687—688, p. 693, II.

Cobbe G., v. Schmidelia Cobbe, p. 641, II.

Toxellia pratensis Savi, (= *utriculata* Savi), v. Alopecurus utriculatus, p. 37.

Toxzia L., Tozzie, XIV. 11., Personatae-Scrofulariaceae-Rhinantheae.

alpina L., Alpenbewohnende, 4. f. Europäische Alpen.

Trachelium L., Halskraut.

angustifolium Schousb., schmalblätteriges, ☉. ♂. f. k. Nordafrika.

tenuifolium L. fil., v. Merciera tenuifol., p. 399, II.

Trachyandra Kunth, Rauhaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

blepharophora Kunth, (= *Anthericum blepharophorum* R. et S. = *A. ciliatum* Jacq. Schönbr.), doppelfranzige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

canaliculata Kunth, (= *Anthericum canaliculatum* Ait. = *Bulbine canaliculata* Spgl., p. 137), β) rufa K. (= *Anther. rufum* Bot. mag. et reg.).

?ciliata Kunth, (= *Anthericum ciliatum* L. suppl. = *Bulbine ciliata* Lk., p. 137).

divaricata Kunth, (= *Anther. divaricatum* Jacq., p. 63).

elongata Kunth, (= *Anther. elongatum* W. = *A. filiforme* Thbg.), verlängerte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

?falcata Kunth, (= *Anther. falc.* Thbg., L. suppl. p. 63).

flexifolia Kunth, (= *Anther. flexifol.* L. suppl. p. 63).

hirsuta Kunth, (= *Anther. hirsutum* Thbg., p. 63).

hispida Kunth, (= *Anther. hispidum* L. = *Arthropodium hispid.* Spgl.), steifhaarige, 4. k. t. Cap d. g. Hffn.

β) majus (R. et S.), (= *Anther. hispidum* Jacq.).

Jacquini Kunth, (= *Anther. flexifolium* Jacq., non L. suppl. = *A. Jacquinianum* R. et S.), Jacquin's, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

longifolia Kunth, (= *Anther. longifolium* Jacq., p. 64).

revoluta Kunth, (= *Anther. revol.* L., Ait., Kew., p. 64).

?scabra Kunth, (= *Anther. scabrum* L. suppl. = *Bulbine scabra* R. et S., p. 137).

vespertina Kunth, (= *Anther. vesperi.* Jacq., p. 64).

Trachylobium Hayne, Rauhblatt, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

Gaertnerianum Hayne, (= *Hymenaea verrucosa* G. = *Tanrouiou* Juss.), Gärtner's, ♄. w. Madagascar.

Hornemannianum Hayne, (= *Hym. verrucosa* Hornem.), Hornemann's, ♄. w. Brasilien.

Trachymene Rudge, Runzel(Rau)dolde.

compressa Spgl. (= *Axorella compressa* LaBill. = *Fischera compressa* Spgl.), platte, 4. t. k. Neuholland.

ovalis DC. (= *conferta* Gaudich. = *ovata* Spgl., non Rudge), eiförmige, ♄. t. k. Neuholland.

Zweifelhaft: gigantea Hort. angl.

incisa Rudge, v. Hügelia incisa Nachlese.

Trachypogon N. E., *avenaceus* N. E., v. Sorghum halepense, p. 773, *Schoenanthus* N. E., v. Cymbopogon Schoenanthus.

Digitized by Google

Trachys **mucronata** P., v. Cenchrus muricatus, p. 129, II.

Trachyspermum Lk., *copticum* Lk., v. Ptychotis coptica, p. 571, II.

Trachystemon D. Don, (= *Psilostemon* DC.), Raulfaden, V. a., Asperifoliaceae (Borragineae).

creticum D. et G. Don, (= *Borrago cretica* W., p. 128, = *Psilostemon creticum* DC.).

orientale D. Don, (= *Borrago orientalis* L., p. 128, = *B. cordifolia* Mch. = *Nordmannia orientalis* Hort. = *cordata*, *cordifolia* Hort. = *Psilostemon orientale* DC.), morgenländischer, 4. k. Orient (Byzanz).

Tradescantia L., Tradescantie.

albiflora Hort. Berol., weißblumige, 4. k. ?

caricifolia Hook., seggenblätterige, 4. k. Texas.

ciliata Hort. Berol. (= *virginica* L. var.?), gefranzte, 4. f. ? Nordamerika.

cirrhifera Mart., wickelrankige, 4. t. k. Mexico.

commelynoides R. et S., commelynenähnliche, 4. t. k. Mexico.

crassifolia Cavan., β) Fischeri Weinm.

crassiuscula Lk. (= *Crassula* Lk. et Otto, = *Selloviі* Pohl). ? β) crassipes Hort.

discolor L'Her. (= *spathacea* Sw. = *Ephemerum bicolor* Mch.).

elata Lodd., hohe, 4. f. Nordamerika.

erecta Jacq. (= *bifida* Roth, = *malabarica* Auct. = *recta* Räusch. = *undulata* Vahl, = *Commelyna grandiflora* Herbar. = *Ephemerum racemosum* Mch.).

Humboldtiana R. et S. (= *speciosa* H. B. K., non L.), Humboldt's, 4. t. k. Mexico.

Karwinskyana R. et S., Karwinsky's, 4. t. k. Mexico.

Martensiana Kunth, (= *Commelyna multiflora* Martens et Galeotti), Martens's, 4. t. k. Mexico.

pilosa Lehm. (= ? *pilosissima* Fraser, = *virginica* L. var. Redouté), behaarte, 4. f. Nordamerika.

apicata Know. et Weste., ährige, 4. t. k. Mexico.

tumida Lindl., angeschwollene, 4. t. k. Mexico.

venustula Kunth, (= *Karwinskyana* Hort. Berol.), liebliche, 4. t. k. Mexico.

zebrina Hort., zebrastreifige, 4. w. Südamerika.

Unbestimmtere: punctata, splendens, thyrsoea Brotero. *axillaris* L., *cristata* Jacq. etc., v. Cyanotis axillaris etc., p. 241 et p. 177, II., *divaricata* Vahl, v. Dichorisandra Aubletiana, p. 290, II., *Callisia* Sw., v. Callisia repens, p. 148, *marginata* Bouché, non Blume, *zanonia* Sw., v. Campelia Bouchéana et zanonia, p. 156 et p. 114, II.

Tragacantha Adans., Mill., *argentea* Mill., *glabra* Mill., *massiliensis* Mill., v. Astragalus barba Jovis, tumidus, Tragacantha, p. 104—108.

Tragia corniculata Vahl, (= *Mierostachys corniculata* Juss. = *Cnemidostachys Vahlii* Spgl.).

Tragium aromaticum Spgl. etc., v. Pimpinella aromatica etc. Sect. II. p. 526.

Tragopogon T., Bocksbart.

floccosus W. K. (= *canus* W. = *heterospermus* Schweigg.).

graminifolius DC. (= *caucasicus* Szow., Fisch. et Mey.), grasblätteriger, ♂. f. Caucasus.

hirsutus Godron, (= *Geropogon hirsutus* L., non All.), rauhhaariger, ♂. f. Südfrankreich.

Digitized by Google

Tragopogon
humilis Fisch., Sweet, niedriger, ♂. f. Caucasus.
phaenopappus Fisch. (= *coloratus* C. A. Mey.).
pratensis L., γ) sinuatus Avé Lallem.

Tragopyrum MB., Bockweizen.
grandiflorum MB. (= *Polygonum grandiflorum* W.), grofsblumiger, ♄. f. b. k. Armenien.
laetevirens Ledeb., freudiggrüner, ♄. f. Alt. Sibirien.
pungens MB. (= *Polygonum fruticosum* var. *spinosum* Pall.), stechender, ♄. f. Sibirien.
Tragoselinum dissectum Mch., *magnum* Mch. etc., v. Pimpinella magna etc.
Trattinickia P., non W., *angustifolia* P. etc., v. Marchantia angustifolia etc., p. 497.

Traunsteinera Rchb. (Jos. Traunsteiner, Apotheker u. Botaniker zu Kitzbühl in Tyrol), XX. r., Orchideae.
globosa Rchb. (= *Orchis globosa* L. = *O. Halleri* Crtz. = *Nigritella globosa* Rchb., p. 548), kugelblumige, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa.

Tremandra RBr., Tremandra, VIII. r., Polygalaceae-Tremandreae.
diffusa RBr., weitschweifige, ♄. t. Neuholland.
verticillata Hort. belg., wirtelblätterige, ♄. t. Neuholland.
floribunda Hort. = ? Tetrathec. species, = Hügelii Hort., v. Tetratheca hirsuta.
Trentepohlia integrifolia Roth, *pinnata* Roth, v. Heliophila amplexicaulis, pendula.

Trevesia Visiani, (Familie Treves dei Bonfilji in Padua, Gönner der Botanik), V. (VIk) r., Araliaceae.
palmata Visiani, (= *Aralia dubia* Spgl. = *A. palmata* Spgl. = *Gilibertia palmata* DC., p. 263, = *Gastonia palmata* Roxb., Lindl. = *Hedera palmata* Wall.).

Trevirania * (non W., nec Roth), (Dr. G. R. Treviranus zu Bremen u. Dr. L. C. Treviranus, Prof. der Botanik u. Director des botan. Gartens in Bonn, ausgezeichnete u. kenntnifsreiche Naturforscher), V. r., Rubiaceae.
calycina * (= *Cephaelis calycina* Lindl. = *Suteria calycina* DC.), grofskelchige, ♄. ♄. w. Brasilien.
Trevirania coccinea W. (= *pulchella* Mart.), *grandiflora* Schiede, *heterophylla* Mart., v. Achimenes coccinea etc., p. 6, 11., *Trevirania Gratioloe* Roth, v. Hornemannia bicolor.
Triadenia Spach, *microphylla* Spach, (= *Sieberi* Spach), *Webbii* Spach, v. Hypericum aegyptiacum (= *creticum* Hort.) et Webbii.
Triadenia (= *Triadenum* Rafin.) *purpurascens* Rafin., v. Elodea virginica, p. 219, 11.

Triaenodendron Endl., Dreizinkbaum, X. r., Leguminosae-Caesalpinieae.
caspicum Endl. (= *Gleditschia caspica* Dsf.), caspischer, ♄. f. Gegend das caspischen Meeres.

Trianthema Sauv., Dreiblümchen.
decandrum L. (= ? *diffusa* Mill. = *glinoides* P. = *Zaleja decandra* Burm.).
monogynum L. (= *T. Portulacastrum* Sauv. = *procumbens* Mill.).
pentandrum L. (= *Roccama arabica* Gmel. syst. = *R. digyna* Forsk.), fünfmänniges, ☉. ♄. m. f. w. Arabien, Ostindien.
β) obcordatum Roxb.

Digitized by Google

Trianthema
polyandrum Blume, (= *Pyripema polyandra* Fenzl), vielmänniges, 4. w. Brasilien.

Trias Lindl., Triangelorche.
ovata Lindl., eiförmige, 4. f. Ostindien.

Tribrachia Lindl., Dreiähre.
hirta Lindl. (= *Bulbophyllum hirtum* Lindl. = *Stelis hirta* Sm.), rauhe, 4. w. Ostindien.
odoratissima Lindl. (= *Bulbophyllum odoratissimum* Lindl. = *Stelis caudata* Don, = *St. odoratissima* Sm.), wohlriechendste, 4. w. Ostindien.
pendula Lindl. (= *Bulbophyllum pend.* Pet. Th. = *B. recurvum* Lk., Otto).
purpurea Lindl. (= *Anisopetalum Careyanum* Hook. = *Bulbophyllum Careyanum* Spgl. = *Pleurothallis purpurea* D. Don), purpurfarbige, 4. w. Nepal.
reptans Lindl. (= *Bulbophyllum reptans* Lindl.), kriechende, 4. w. Nepal.

Tribulus L., Bürzeldorn.
albidus Friwaldsky, weifslicher, ☉. f. Rumelien.
terrestris L., *β)* bicornutus Fisch. et Mey. Caucasus.

Trichasma Walp., Haarklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
calycinum Walp. (= *Argyrolobium calycinum* Jaub. et Spach, = *Chasmone calycina* E. Mey. = *Cytisus calycinus* MB. = *C. nanus* W. Enum. = *C. pauciflorus* W.), grofskelchiger, 4. ♄. f. Caucasus, Persien.
ciliatum Walp. (= *Argyrolobium Andrewsianum* Steud. = *Chasmone Andrewsiana* E. Mey. = *Cytisus tomentosus* Andr. = *Dichilus ciliatus* Spgl. fil. = *Goodia lotifolia* Hortul., non Salisb. = *G. polysperma* DC.), gefranzter, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Trichera arvensis Schrad. (= *hirsuta* R. et S.), *ciliata* R. et S. (= ? *leucantha* Schrad.), *hybrida* R. et S. (= *bidens* Schult. = *mutabilis* Schrad.) etc., v. Knautia arvensis, ciliata etc., p. 438 et 335, II.
Trichilia elegans Juss., *odorata* Andr., v. Moschoxylon elegans et odoratum, p. 421, II., *T. glandulosa* Sm. (= *octandra* Soland), v. Synoum glandul., p. 715, II.

Trichinium RBr., Haaramaranth, V. II., Aizoideae-Amaranthaceae.
alopecuroideum Lindl., fuchsschwanzähnlicher, ☉. m. f. Neuholland.

Trichocline Cassin., Haarhülle, XIX. II., Compositae-Eupatorineae-Mutisiaceae.
incana Cass. (= *Arnica incana* P. = *Bichenia sinuata* Gill. et Don, = *Doronicum incanum* Lam.), weifsgraue, 4. w. Brasilien.
Tweedii DC. (= *humilis* Hook., Arn.), Tweedi's, 4. w. Montevideo.

Trichogyne Less., Haargriffel, XIX. V. (II.), Compositae-Corymbiferae.
cauliflora DC. (= *Chrysocoma spicata* Forsk. = *Gnaphalium aegyptiacum* P. = *G. Ammophila* Wall. = *G. cauliflorum* Dsf. = *G. Chrysocoma* Poir. = *G. Röppelii* Fresen. = *Iflogu Fontanesii* Cass.), stengelblumiger, ☉. f. Nordafrika, Ostindien.
laricifolia Less. (= *Artemisia ambigua* L. = *Seriphium laricifolium* Lam. = *Stoebe laricifolia* E. Meyer), lerchenblätteriger, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Digitized by Google

Trichogyne

reflexa Less. (= *Gnaphalium repens* Houtt., non L. = *Seriphium reflexum* P. = *Stoebe reflexa* L. fil.), zurückgebogener, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

Tricholaena Schrad., Haarfennich.

fragilis A. Braun, zerbrechlicher, ⊙. m. f. Abyssinien.

micrantha Schrad. (= *Agrostis plumosa* Tenore, = *Panicum saccharoides* Trin. = *P. Teneriffae* RBr. = *P. villosum* Presl, = *Saccharum Teneriffae* L.).

β) rosea N. E., γ) tensa N. E.

Trichonema Ker, Haarschwertel.

chloroleucum Ker, (= *ochroleucum* Ker, = *Ixia chloroleuca* Jacq. = *I. crocea* Thbg. = *I. ochroleuca* Vahl).

Columnae Tenore, Rchb. (= *Ixia Columnae* Schult. = *I. minima* Tenore, Hort. = *Romulea Columnae* Sebast., Mauri).

cruciatum Ker, (= *longifolium* Salisb. = *Ixia cruciata* Jacq. = *I. fugax* Hornem. = *I. quadrangula* Laroch. = *I. rosea* Banks).

ornithogaloides Dietr. (= *chloroleucum* Ker, var. Spgl. = *Ixia ornithogaloides* Lichtst.), vogelmilchähnlicher, ♃. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

recurvifolium Ker, (= *recurvum* Spgl. = *Ixia recurva* DC., Red., non Vahl).

Trichophyllum Nutt., *lanatum* Nutt., *oppositifolium* Nutt., v. Bahia lanata, oppositifolia, p. 58, II.

Trichorrhiza teretifolia Lindl., v. Cymbidium triste, p. 180, II.

Trichosporum Don, *grandiflorum* Don, *radicans* Don, *volubile* N. E., v. Aeschynanthus grandiflorus, radicans, volubilis, p. 11—12, II.

Tricondylus ferrugineus Kngt. et Salisb., *myricaefolius* Kngt. et Salisb., *silaifolius* Kngt. et Salisb., *tinctorius* Kngt. et Salisb., v. Lomatia ferruginea, longifolia, silaifolia, tinctoria, p. 475 et 370, II.

Tricuspis caroliniana P. B. (= *noveboracensis* P. B. = *quinquefida* R. et S.), v. Uralepis cuprea.

Tridactylites annua Haw., v. Saxifraga tridactylites.

Tridens quinquefida Schult., v. Uralepis cuprea.

Trifolium T., Klee, (Dreiblatt).

adscendens Hornem., aufsteigender, ♃. f. Georgien.

albiceps Ehrbg., weifsköpfiger, ⊙. f. Aegypten.

altissimum Dougl., höchster, ♃. f. Nordamerika.

ambiguum MB. (= *Vaillantii* MB.), zweifelhafter, ♃. f. Taurien, Caucasus.

anomalum Schrk. (= *repens* L. var. DC.).

capillatum Dumort., haarförmiger, ♃. f. Belgien.

Cherleri L. (= *incanum* Presl, = *involucratum* Lam. = *obvallatum* Mch.).

chilense Hook. (= *Lupinaster chilensis* Presl), chilesischer, ♃. k. Chili.

circumdatum Kunze, (= *Lupinaster circumdat.* Presl), kreisförmiger, ⊙. f. Chili.

coarctatum Rchb., verschmälerter, ♃. f. Galabrien.

conicum P., Savi, (= *Kitaibelianum* Sering. = *scabrum* Schreb. = *tenuiflorum* Tenore), kegelförmiger, ⊙. f. Mittel- und Südeuropa.

diffusum Ehrh. (= *ciliosum* Thuill. = *circumcissum* P. = *purpurascens* P.).

echinatum MB. (= *supinum* Savi).

Trifolium

elegans Savi, (= ? *ambiguum* MB. = *formosum* Savi, = *hybridum* Poll. = *Vaillantii* Poir. = *Amoria elegans* Presl).
fabaceum Lindl., bohnenähnlicher, ⊙. f. Californien.
fimbriatum Lindl. (= *heterodon* Torr. et A. Gr. var. = ? *Wormskioldii* Lehm.).
formosum d'Urvill., schöner, ♃. f. Griechenland.
fucatum Lindl. (= *physopetalum* Fisch. et Mey.), geschmückter, ⊙. f. Californien.
heterodon Torr. et A. Gray., verschiedenzahniger, ♃. f. Nordamerika.
β) atropurpureum Nutt., γ) calocephalum Nutt.
isthmocarpum Brot. (= ? *elegans* Savi, = *rubicundum* Vivian. = *Amoria isthmocarpa* Presl), buchtfrüchtiger, ⊙. f. Portugal.
latinum Sebast. (= ? *dalmaticum* Visiani).
leucanthum MB. (= *malacanthum* Lk. = *obscurum* Gussone, = *stellatum* Pall. = *variabile* Guss.).
Macraei Hook. (= *albopurpureum* Torr. et A. Gray), Macraei's, ⊙. f. Chili, Californien.
marsicum Tenore, (= *squarrosum* β *elatum* Tenore), marsischer, ⊙. f. Neapel.
macrocephalum Poir. (= *megacephalum* Nutt. = *Pentaphyllum macrocephalum* Spgl. = *Lupinaster macrocephala* Pursh.).
Michelianum Savi, (= *hybridum* var. Auct. = *nigrescens* Vivian. = *Vaillantii* Lois. = *Amoria Micheliana* Presl).
neglectum Fisch., Mey. et Lallem., übersehener, ♃. f. Tiflis.
nidificum Griseb., nestähnlicher, ⊙. f. Rumelien.
Oliverianum Sering. (= *libanoticum* Ehrbg. = *radiosum* Wahlbg.), Olivier's, ⊙. f. Orient.
physanthum Hook., Arn., blasenblumiger, ♃. k. Chili.
platycephalum Bisch., breitköpfiger, ⊙. f. Nordamerika (Arkansasgebiet).
plumosum Dougl., federiger, ♃. f. Nordamerika.
polyphyllum C. A. Mey., vielblätteriger, ♃. f. Caucasus.
reclinatum W. K. (= *Waldsteinianum* Sweet).
repens L., c) maculatum (= fol. atropurp.), b) luxurians Hort. Par.
rubens L., b) flore albo.
speciosum W. (= *Billardieri* Spgl. = *comosum* LaBill. = *Gussoni* Tineo, = *plicatum* Presl, = *Amarenus speciosus* Presl).
spumosum L. (= *apulum* Hortul. = *folliculatum* Lam. = *Mistyllus spumosus* Presl).
suaveolens W. (= *formosum* Curt., non d'Urv.).
succinctum Visiani, dalmatischer, ⊙. f. Dalmatien.
Tenoreanum Boiss. et Sprunn. (= *Bocconi* β *longiflorum* Bory et Chaub. = *tenuifolium* Tenore, = *stramineum* Gussone), Tenore's, ⊙. f. Griechenland, Neapel, Sicilien.
trichocephalum MB. (= ? *armenium* W. var. = *canescens* Bot. mag.).
tumens Stev., MB. (= ? *alatum* Bivone, = *Galearia tumens* Presl), angeschwollener, ♃. f. Iberien, Sicilien.
variegatum Nutt. (= *melananthum* Hook., Arn. = ? *microcephalum* β *glabrum* Hook.), bunter, ♂. f. Nordamer.
versicolor Steud., verschiedenfarbiger, ♃. k. Chili.
Wormskioldii Lehm. (= *tridentatum* Hort. Berol. = *Lupinaster Wormskioldii* Presl).

Digitized by Google

Trifolium

Unbestimmtere: affine Presl, non Lej. ⊙, albidum Retz, anomalum Schrk. (? repens L. var. DC.), decipiens Hornem. ⊙., intertextum Wender., patulum Tausch, (medium L. var.?).

Trigonella L., Kuhhornklee.

azurea C. A. Mey. (= *Trifolium coeruleseens* MB.), azurblauer, ⊙. f. Caucasus.

calliceras Fisch. (= *oxyrhyncha* Fisch. = *Lotus medicaginoides* Retz).

coerulea Sering. (= *Melilotus coerul.* Desr., Lam., p. 507).
β) connata C. A. Mey. (= *Melilotus connata* Bernh.).
γ) Besseriana Sering. (= *Melilotus procumbens* Bess.).

ensifera Trautv. (= *prostrata* Hort. Par.), schwerthülsiger, ⊙. f. ?

orthoceras Karel. et Kiril., geradhülsiger, ⊙. f. Soongaria.

spicata Sibth. et Sm. (= *uncinata* Sering. = *Melilotus hamosa* Lk. = *M. uncinata* Poir.), ährige, ⊙. f. Griechenland, Iberien.

tomentosa Thbg., filzige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

torta Sm. (= ? *crassifolia* Hornem. = *hamosa* Delil. = *incisa* Hornem.), gedrehte, ⊙. f. Aegypten.
americana Nutt., v. Hosackia Purshiana, *indica* L., v. Westonia humifusa, *glomerata* Hort., v. Medicago glomerata, p. 503.

Hinsichtlich der übrigen vergl. Medicago, p. 392, II.

Trillium L., Dreiblatt.

erectum L. (= *foetidum* Salisb. = *atropurpureum* Hort. = *purpureum* Ell. = *rhomboideum* Mchx.), aufrechtes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

grandiflorum Salisb., Pursh, (= *erythrocarpum* Curt. = *rhomboideum γ grandiflorum* Mchx.).

pendulum W. (= *cernuum* Bigel., Bartr. = *erectum β album* Pursh, = *rhomboideum β album* Mchx).

recurvatum Beck., zurückgekrümmtes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

stylosum Nutt. (= *Delostyles cernua* Rafin.), langgriffeliges, 4. Kn. f. b. k. Carolina, Virginien.

viride Beck, grünes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

Unbestimmtere: roseum Hort., tinctorium Rafin.
Trimeranthes dichotoma Cass., v. Siegesbeckia flosculosa, p. 755.
Trimorphaea Cass., *acris* Dumort. (= *vulgaris* Cass.), v. Erigeron acre.

Trinia Hoffm., Trinie.

hispida Hoffm. (= *Hoffmanni β* MB. = *dioica* Urvill. = *dioica rossica* Fisch.), steifhaarige, ♂. 4. f. Rufsland, Griechenland.

Hoffmanni MB. (= *glaberrima* var. Hoffm. = *Rumia leiogona* C. A. Mey.).

Kitaibelii MB. (= *glauca* Hoffm. = *Pimpinella dichotoma* Spgl. = *P. glauca* Hoffm. = *Seseli pumilum* L. spec.), Ungarn, Taurien, Südrufsland, Volhynien.
β) ramosissima Fisch., Ledeb.

vulgaris DC. (= *elatior* Gaud. = *glaberrima* Hoffm. = *glauca* Dumort. = *Apium glaucum* et *pumilum* et *Tragoselinum* Crtz. = *Cicutaria dioica* Mch. = *Meum Dalechampii* Tenore, = *Pastinaca glauca* Scopl. etc.).
α) Henningii Hoffm. (= *Pimpinella dioica* Bess. = *P. glauca* L. spec. = *P. multicaulis* Poir.), *β)* Jac-

Digitized by Google

Trinia
quini DC. (= *Pimpinella dioica* L. mant. = *P. glauca* Spgl. = *Seseli glaucum* Lam. = *S. pumilum* Spgl.).
Triodia cuprea Jacq., v. Uralepis cuprea.
Triodica chinensis Lour., v. Stillingia sebifera, p. 789.
Trionum annuum Medic. (= *cordifolium* Mch. = *diffusum* Mch.), v. Hibiscus Trionum cum var.

Triopteris L., Dreiflügler.
ovata Cavan., eiförmiger, ♄. Sch. w. Domingo.

Triosteum L., angustifolium L. (= *minus* Mchx.), perfoliatum L. (= *majus* Mchx.).
Triphora pendula Nutt., v. Pogonia pendula, p. 639.
Triphylloides angustifolia Mch., *clypeata* Mch. etc., v. Trifolium angustifolium, clypeatum etc.
Triphysaria versicolor Fisch. et Mey., v. Orthocarpus (Sect. I.) erianthus, p. 461, II.

Tripinnaria P., Dreifieder, XIV. II., Bignoniaceae-Crescentieae.
africana Spgl. (= *Crescentia pinnata* Jacq. = *Tanaecium pinnatum* W.), afrikanische, ♄. Mozambique, Mascarenas.
Triplachne nitens N. E., v. Agrostis nitens, p. 25 et p. 26, II.
Tripladenia Cunninghamii G. Don, v. Kreysigia multiflora, p. 336, II.
Triplocentron apulum Cass., *melitense* Cass., *sulphureum* Webb, v. Centaurea apula etc., p. 176.

Tripolium N. E., angustum Lindl., vulgare N. E. etc., v. Aster Sect. XV. p. 100.
Tripterella alba Schult., *bicolor* Schult., *coerulea* Mühlbg., *dasyantha* Schult., v. Burmannia alba, bicolor, biflora, dasyantha, p. 140 et 83, II.

Tripteris Less., Dreiflügelchen.
arborescens Less. (= *Calendula arborescens* Jacq., p. 146, = *C. muricata* Thbg. = *C. rigida* Ait.).
pallescens DC. (= ? *Calendula oppositifolia* Ait.), bleiches, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.
sinuata DC. (= *oppositifolia* E. Mey.), buchtiges, ♄. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Triptilion R. et P., cordifolium Lagasca, (= *maritimum* Poepp. = *Nassauvia cordifol.* Don), spinosum R. et P. (= *laciniatum* W. = *N. spinosa* Don).

Trisetum P., Kunth, Alopecuros R. et S., alpestre P. B., flavescens P. B. (= *pratense* P.) etc., v. Avena Sect. IV. p. 107 et p. 55, II.
hispidum Trin., *phleoides* Trin., v. Koeleria hispida et phleoides, p. 439 et 336, II., *lobatum* Trin. (= *pensylvanicum* Trin.), v. Reboulea gracilis, p. 586, II., *macilentum* Trin., v. Avelinia Michelii, p. 55, II., *nudum* P., v. Pentameris Thouarsii, p. 884, *pungens* P. B. = ?

Tristania RBr., Tristanie.
macrophylla A. Cunn., grofsblätterige, ♄. t. k. Neuholl.
nereifolia RBr. (= *salicifolia* Lk. = *Crowea neriifolia* Hort. angl. = *Melaleuca neriifolia* Sims, = *M. salicifolia* Andr.).
salicina A. Cunn., weidenähnliche, ♄. ♄. t. k. Neuholland.
suaveolens Sm. (= *Melaleuca suaveolens* G.), gutriechende, ♄. f. k. Neuholland.

Digitized by Google

Tristania

subverticillata Wendl., fastquirlästige, ħ. t. k. Neuholl.
umbrosa A. Cunn., schattenliebende, ħ. t. k. Neuholland.
albens (albicans) Cunningh. (= arborescens Hort. Kew.), v. Syncarpia laurifolia, p. 715, II., corymbosa Hort., v. Jambosa australis, p. 228, II., arborescens Hort. (= ? excelsa Hort. Berol.), depressa Ledd., robusta Hort., v. Lophostemon arborescens, depressum et robustum, p. 371, II.

Triteleja Dougl., Hook., Lindl., Narbenanmodille.
bivalvis Lindl., zweiklappige, 4. Zw. k. t. Chili.
Qb aurea Lindl., Montevideo, pedunculatis Benth., Lindl. Californien, porrifolia Poepp. et Endl. Chili, kultivirt werden, ist mir unbekannt.

Triticum T., Weizen.

I. Agropyrum G., P. B., R. et S., Quecke.
acutum DC. (= junceum L. var. = littoreum Schum.).
β) affine Dethard.
cristatum Schreb. (= Avena aristata Host, = Bromus aristatus L.).
β) intermedium MB., ? δ) muricatum Fisch., Lk.
dasyphyllum Schrenk, rauhblätterige, 4. f. Soongaria.
glaucum Dsf. (= intermedium Host, = rigidum Schlchr., non Schrad.), β) puberulum.
Gmelini Trin., Schrad., Gmelin's, 4. f. Sibirien.
junceum L. (= farctum Vivian. = rodosum Stev. = Bromus truncatus Scopol. = Festuca juncea Mch.).
littorale Host, Ufer-Q., 4. f. Oestreich. Litorale.
β) muticum.
orientale MB. (= Secale orientale L.).
β) spicis minoribus Hort. Petropol.
pectinatum MB. (= A. pectiniforme R. et S.).
Richardsonii Schrad. (= trachycaulon Lk. = Cryptopyrum Richardsonii Hort. Prag.).
rigidum Schrad. (= elongatum Host, = giganteum Retz, = junceum β giganteum Roth, = pilosum Scenus).
strictum Dethard. (= acutum δ M. et K.).
strigosum Spgl., Kunth, (= rupestre Lk., Fisch. = Brachypod. strigosum Schult. = Bromus strigosus MB.), striegeliche, 4. f. Taurien.
violaceum Hornem., Fr., violette, 4. f. Grönland, Schweden.

II. Spelta Weizen.
bicorne Forsk. (= Crithodium aegyptiacum Trin.), zweihörniger, ⊙. f. Aegypten.
dicoccum Schrk., Schübl., var. glabrum album aristatum, glabrum album Lentagos Hort. Petsopol. etc.
β) tricoccum Schübl., var. Bauhini, flavescens, glabrum.
durum Dsf., β) villosum Host, var. nigricans et nigrum.
polonicum L. (= glaucum Mch., non Dsf. = laevissimum Hall.).
turgidum L. (= Linnaeanum Lagasca, = polonicum γ P. = vulgare γ turgidum Spgl.), Varietäten: glabrum albidum de Taganrog Hort. Petropol., ramosum Hort. Petropol., astracanicum Hort. Petropol., chinense Hort. Petropol., velutinum rufescens Hort. Petropol. (Blé de St. Helene), grossum (Blé gros Turquet Hort. et Oecon.) etc.
venulosum Sering. (= monococcum L. var. Trin.).

Digitized by Google

Triticum

villosum P. B., non Host, (= *caudatum* P. = *Agropyrum caudatum* R. B. = *A. villosum* Lk. = *Hordeum ciliatum* Lam. = *Secale villosum* L.).

vulgare Vill. (= *sativum* Lam. = *cereale* Schrk.), var. β) hybernum L. (= *compactum* Host, = *erinaceum* Hort.).

Unbestimmtere: benghalense Host, cinereum Hort. Gorenk., compressum Hort. Madrit., flabellatum Tausch, (= *ciliatum* Hort., non DC.), ichyostachyum Seidl, ☉, molle Fisch. Hort. Gorenk, ☉, poliens Tausch, (= *ciliatum* Hort.), simplex Hort. Vindob.

Tritomanthe Lk. (= *Tritoma* Ker), *Burchellii* Herb. etc., v. Kniphofia Burchellii etc., p. 335—336, II. *Tritonia crispa* Ker, *crocata* Ker etc., v. Montbretia crispa, crocata etc., p. 417, II.

Triumfetta Plum., Triumfetta.

Lappula L. (= *Plumieri* G. = *Bartramia Lapp.* Lam.).

nepaulensis G. Don, (= *annua* D. Don, non L.), nepalsche, ☉. w. m. f. Nepal.

oblongata Lk. (= *glandulosa* Heyne, = *? trichoclada* DC. var. Spgl.), längliche, ☉. w. m. f. Nepal.

petiolaris Lindl. (= *rhomboidea* Lindl., non Jacq.), gestielte, ♄. w. Peru.

rhomboidea Jacq. (= *rhombifolia* Sw.).

trichoclada DC. (= *triclada* Lk.).

Trixago Lk., Stev., Giftkraut.

I. Eufragia Griseb.

latifolia Rchb. (Griseb.), (= *Bartsia latifolia* Sibth., Sm. = *B. purpurea* Duby, = *Euphrasia latifolia* L. = *T. purpurea* Stev.).

viscosa Rchb. (Griseb.), (= *Bartsia viscosa* L. = *Lasiopera viscosa* Lk., Hffg. = *Rhinanthus viscosus* Lam.).

II. Eutrixago.

apula Stev. (= *rhinanthina* Griseb. = *Alectorolophus Trixago* MB. = *Bartsia Trixago* L. = *Bellardia Trixago* All. = *Lasiopera rhinanthina* Lk. et Hffg. = *Rhinanthus maximus* W., non Lam. = *R. Trixago* L. — *Bartsia maxima* P. = *B. rhinanthoides* Hochst. = *B. bicolor* DC. = *B. capensis* Spgl. = *B. versicolor* P. = *Rhinanthus capensis* L. = *R. versicolor* W.). Auch auf den canar. Inseln, in Abyssinien, Südafrika, Südbrasilien u. Westasien heimisch.

scordifolia Rchb., v. Odontites Holliana, p. 448, II. *T. arvensis* Mch. (= *scordifolia* Mch.), v. Stachys arv.

Trixis RBr., Trixis.

corymbosa Don, (= *Perdicium corymbosum* Mey., Sess.), doldentraubige, ♄. t. k. Mexico.

divaricata Spgl. (= *auriculata* Hook. = *salicifolia* Don, = *Cacalia flexuosa* W. = *Castra regia* Arrabid.), ausgespreizte, ♄. w. Brasilien, Quito.

Ehrenbergii Kunze, Ehrenberg's, ♄. t. k. Mexico.

frutescens RBr. (= *Inula Trixis* L. = *Perdicium radiale* L. = *Prenanthes fruticosa* W. hrb. = *Tenorea Berterii* Colla, = *T. calyculata* Bert.), strauchige, ♄. w. Südamerika.

Lessingii DC. (= *brasiliensis* Less., non DC. = *Perdicium brasiliense* Quoruns.), Lessing's, ♄. w. Brasilien.

senecioides Hook., v. Leuchaeria senecioides, p. 355 II. *Trochera* Rich., *calycina* P. B., v. Ehrharta calycina.

Digitized by Google

Trochetia DC., Trochetie, XVI. v., Büttneriaceae.
grandiflora Lindl., grofsblumige, ♄. w. Mauritius.
Trochocarpa disticha Spgl., *thymifolia* Spgl., v. Decaspora disticha et thymifolia, p. 183, II.
Trochocerie Poepp. et Endl., *aurantiaca* Poepp. et Endl., *pterocarpa* Poepp. et Endl., v. Macrorhynchium aurantiacum et pterocarpum, p. 487.

Trollius L., Trollblume.
acaulis Lindl., stengellose, 4. k. Cashmire, Nepal.
altaicus C. A. Mey. (= *caucasicus* Ledeb.), altaische, 4. f. Altaisches Sibirien.
americanus Mühlbg. (= *laxus* Salisb. = *pentapetalus* Banks herb. = *Gaissenia verna* Raf.).
dahuricus Turcz., dahurische, 4. f. Dahurien.
europaeus L. (= *connivens* Mch. = *globosus* Lam. = *montanus* Salisb.), β) medius Wender., ε) napellifolius Roep. (= *aconitifolius* Hort.).
patulus Salisb. (= *caucasicus* Stev. = *Helleborus ranunculinus* Sm., MB.).
pumilus D. Don, niedrige, 4. k. f. b. Nepal.
sonchetieus C. Koch, sonchetische, 4. f. Asiatisches Rufsland (Sonchetia).
Gartenvarietäten (oder Hybriden): atrebatensis v. Houtte, aureus Tausch, (= *caucasicus* Hort.), bicolor Hffg., emarginatus G. Don, *grandiflorus* Tausch, (= *caucasicus* Hort.), hybridus Hort.
lilacinus Bunge, v. Hegemone lilacina, p. 287, II.

Tropaeolum L., Capuzinerkresse.
aduncum Sm. (= *peregrinum* Jacq., non L. = *chilense* et *canariense* Hort.).
azureum Miers, azurblaue, 4. Sch. Kn. t. Chili.
bicolor R. et P., zweifarbige, ⊙. Sch. f. Peru.
brachyceras Hook. (= ? *minimum* Miers, = *Chymocarpus br.* *, p. 195), kurzspornige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
b) grandiflorum Rein., Walp., c) sulphureum Walp.
crenatiflorum Hook., kerbblumige, 4. Sch. Kn. t. Peru.
elegans G. Don, zierliche, 4. Sch. Kn. t. Chili.
Hayneanum Bernh., Hayne's, ⊙. Sch. f. Peru.
Jarattii Paxt., Youell, (= *tricolorum grandiflorum* Hort.), Jaratti's, 4. Sch. Kn. t. Chili (St. Jago).
leptophyllum G. Don, schlankblätterige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
Lobbianum Hook., Lobb's, 4. ♄. Sch. Kn. t. Columbia.
majus L., β) hybridum L. (= *quinquelobum* Berg.).
minus L., var. trimaculatum Hort.
Moritzianum Lk., Kl., Otto, Moritz's, ⊙. ♂. Sch. m. f. t. Caracas.
Hybriden: Moritziano-majus Hort. Berol., grandiflorum Hort.
orthoceras Gardn., geradsporige (hornige), 4. Sch. w. Brasilien.
pinnatum Ait., gefiederte, ⊙. m. f. Peru.
polyphyllum Cavan. (= ? *prostratum* Miers), vielblätterige, 4. Sch. t. Chili (Bolivia).
β) myriophyllum Poepp.
speciosum Endl., prächtige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
tenellum G. Don, zarte, 4. Sch. t. Chili.
tricolorum Lindl., Sweet, (= ? *coccineum* Miers, = ? *subincrassatum* Steud.), dreifarbige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
Var. oder Hybrid. mit T. brachyceras: grandiflorum Hort., splendens Hort., tricolori-brachyceras Walp.

Digitized by Google

Tropaeolum

tuberosum R. et P., knollige, 4. Sch. Kn. t. k. Peru.
violaeflorum Dietr. (= *azureum* var. ? *obscurum* v. Houtte), veilchenblumige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
pentaphyllum Lam., v. Chymocarpus pentaph., p. 195.

Trophianthus Scheidw., Gürtelorche, XX. 1., Orchideae.

zonatus Scheidw., geschmückte, 4. w. Brasilien.

Trophis L., aspera Retz, (= *cochinchinensis* Poir. = *Streblus asper* Lour.).

Troximon G., Bocksalat.

aurantiacum Hook., orangefarbiger, 4. f. Nordamerika.

Trymalium Fenzl, Trymalium, V. 1., Rhamneae.

Billardieri Fenzl, (= *spathulatum* Sweet, = *Ceanothus spathulata* LaBill. = *Pomaderris spath.* Brongn., p. 647).
globulosum Fenzl, (= *Ceanothus globulosa* LaBill. = *Pomaderris globulosa* Brongn., G. Don, p. 647).
ledifolium Fenzl, porstblätteriges, ħ. t. k. Neuholland.
odoratissimum Fenzl, (= *elegans* Hort. = ? *fragrans* Hort. Kew.).
Wendlandianum G. Don, v. Pomaderris Wendlandiana, p. 647 et p. 553, II.

Trymenium Lindl. v. Odontoglossum Sect. II. p. 444, II.

Tryphane Fenzl, *caespitosa* Rchb., *Gerardi* Rchb., *verna* Rchb., *recurva* Rchb. etc., v. Alsine caespitosa, recurva, verna etc., p. 38—39.
Tsiana speciosa Gmel., v. Costus speciosus.

Tsutsusi Kämpf., G. Don, v. Rhododendron Sect. V. p. 686 et p. 591, II.

Tuberaria annua Spach, *perennis* Spach, v. Helianthemum guttatum et Tuberaria.

Tulbaghia L., Tulbaghie.

alliacea L. (= *capensis* L. = *inodora* G.).
cernua Lallem., übergebogene, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hffn.
Ludwigiana Harv., Hook., Ludwig's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.
Heisteri Fabric., v. Agapanthus umbellatus, p. 22.

Tulipa Gesn., T., Tulpe.

apula Gussone, apulische, 4. Zw. f. Apulien.
Celsiana Redouté, (= *australis* Lk. = *Breyniana* Curt., non L. = *sylvestris* β MB. = *transtagana* Brot.).
β) pumila Tausch.
Clusiana Vent. (= *Cypriana* Hort. = *praecox* Cav., non Tenore, = *hispanica* W. hrb. = *rubro-alba* Brot.).
gallica Delaun., Loisel., französische, 4. Zw. f. Südfrankr.
Gesneriana L. (= *hortensis* Mch.). Var.: foliosa, polyantha, monstrosa (= *laciniata* = *Dracontia* Redout.), luteo-rubra, campsopetala Delaun. — Aglajana, albida (= *Gloria alborum*), Alexandri (= *Violet Alexander*), alexandrina, augusta (= *Grand Monarque*), Buonaparteana, Burnardiana (= *Burnards agitator*), Canningiana, Charlotteana, coccinea, Collingwoodii, Crevеae, Daphneana (= *Rose Daphne*), Daweyana, Duckettiana, Fredericiana, fulgens (= *Rose brillante*), fulminea, Georgii, Hilliana, Hollandiana, Jenkinsonii, imperialis, iridiflora, Juno, Lampsoniana, lancastriensis, Leopoldi, Ludoviana (= *Louis XVI.*), Mariae Majestatis, marginata, (= *Davys Trafulgar*), Migueli, Penelopea, platyantha, Platonia, Polyphemi, principessae, puella (= *pucelle d'Orléans*), purpureo-rosea, regia, retusa, sanguifera, semplonienſis, Strongia, Titiana, versicolor, Victoriana, virginea, Wineckeliana etc. etc.

Digitized by Google

Tulipa

maculata Roth, (= ? *Breyniana* Trutt., Hort. = ? *hispanica* W. = *sylvestris* L. var. ? Schrad.), gefleckte, ♃. Zw. f. Spanien.

maleolens Reboul, var. floribus rubro-purpureis, stramineis, cupreis et pallido glaucis intermixtis Sweet.

media Ag. (= *acuminata* Hort.).

Oculus Solis St. Amans, (= *acutiflora* Poir. = *agenensis* DC.), β) praecox Strangways.

praecox Tenore, (= *Oculus solis* Bot. reg.), α) Tenorii Reboul, β) Raddii Reboul, γ) Foxiana Reboul, δ) persica Lindl.

serotina Reboul, spätblühende, ♃. Zw. f. *Toscana*.

Sibthorpiana Sm., Sibthorp's, ♃. Zw. f. Griechenland.

strangulata Reboul, (= *scabriscapa* Strangways), α) princeps Reb., β) Bonarotiana Reboul, (= *vario-picta* Reboul), γ) neglecta Reboul.

suaveolens Roth, β) pubescens W.

tricolor Ledeb., Fisch. (= *biflora* Hort. = *patens* Ag. = *sylvestris* Laxm., non L.).

turcica Roth, (= *acuminata* Vahl, = *cornuta* Redouté, = *pumila* Mch. = *stenopetala* Delaun. et Hort. = *sylvestris* β W.).

altaica Auct., non Pall., *biflora* Pall., L. fil., *heteropetala* Ledeb., v. Orithyja nutans et uniflora, biflora, oxypetala, p. 457, II.

Tullia pycnanthemoides Leavenworth, v. Pycnanthemum Tullia, p. 575, II.

Tunica Scopol. (pro parte), Fisch. et Mey., Steinnelke.

brachypetala Jaub. et Spach, kurzkronige, ♂. k. Cappadocien, Südl. Persien.

prolifera Scop. (= *Dianthus prolifer* L. = *Kohlrauschia prolif.* Kunth), β) diminuta (L.).

Saxifraga Scop., K. (= *Dianthus Saxifraga* L. = *Gypsophila Saxifraga* L. = *G. scabra* Schult. = *G. rigida* Rchb. = *Imperata filiformis* Mch.).

stricta Fisch. et Mey. (= *Dianthus recticaulis* Ledeb. = *Gypsophila stricta* Bunge).

velutina Fisch. et Mey. (= *Dianthus velutinus* Guss.), sammthaarige, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

Tupa G. Don, Sweet, acuminata DC. fil. etc., v. Lobelia Sect. XII. p. 473 et p. 368, II.

Tupistra Ker, Tupistra, Smilaceae-Aspidistreae.

aurantiaca Wall., orangefarbige, ♃. w. Ostindien.

Turbith Tausch, Turbithdolde, V. II., Umbelliferae.

Matthioli Tausch, (= *Athamantha Matthioli* Wulf. = *A. Turbith* Brotero, = *Libanothis filifolia* Röhl. = *L. rupestris* Scopol. = *Seseli Turbith* L.), Matthioli's, ♃. f. b. Krain, Friaul.

Turczaninowia DC. (N. v. Turczaninow, kaiserlich russ. Botaniker u. Reisender).

fastigiata DC. (= *Aster fastigiatus* Fisch., non Ledeb.), v. Aster Sect. XVI. p. 100.

Turgosea Haw. (= *Turgosia* Loud.), v. Pyrgosea, p. 577, II.

Turnera Plum., Turnera.

cuneiformis Juss. (= *obtusifolia* Sm.), β) odorata Vahl, non Rich.

rosea St. Hil., rosafarbige, ♄. w. Brasilien.

trioniflora Sims, eibischblumige, ♃. ♄. w. Südamerika.

Digitized by Google

Turnera
ulmifolia L., ulmenblättrige, ☘ ♄ w. Südamerika.
β) angustifolia Curt.
cistoides Hort., non L., *rugosa* W. (= *villosa* Räusch.), v. Piriqueta cistoides et villosa, p. 532.

Turpinia Vent. (P. J. F. Turpin, Botaniker u. berühmter Pflanzenmaler in Paris, † 1840), V. III., Sapindaceae-Staphyleaceae.
paniculata Vent. (= *Dalrymplea dominguensis* Spgl.), rispige, ♄ w. Domingo, Mexico.
pomifera DC. (= *Dalrymplea pomifera* Roxb.), äpfeltragende, ♄ w. Ostindien.
occidentalis Sweet, v. Staphylea occidentalis, p. 700.
Turpinia P., *montevidensis* Spgl., *punctata* P., v. Poiretia psoraleoides etc., p. 545, II.
Turpinia aromatica Rafin., *suaveolens* Rafin., v. Rhus aromaticum et suaveol., p. 686—687 et 592—593, II.

Turraea L., Turraea.
lobata Lindl., gelappte, ♄ w. Sierra Leone.
quercifolia G. Don, eichenblätterige, ♄ w. Sierra Leone.
pinnata Wall., v. Munronia Wallichii Nachlese.
Turrita major Wallr., v. Arabis Turrita, p. 71.

Turritis Dill., Thurmkraut.
Grahamii Lehm. (= *patula* Grah., nec Ehrh. = ? *Arabis declinata* Schrad. = *A. Hollboelliana* Horst. Hafn.).
retrofracta Hook. (= *Arabis retrofracta* Grah.), zurückgeknicktes, ☉. f. Nordamerika.
arvensis RBr., v. Moricandia arvensis, p. 531.
Hinsichtlich der übrigen s. Arabis.

Tussacia Rchb., non W., nec Rafin. (F. R. de Tussac, franz. Botan. u. Reisender), XIV. II., Gesneriaceae.
sanguinea * (= *Alloplectus sanguineus* Mart. = *Besleria sanguinea* P. = *Thalbergaria sanguinea* Tuss., Juss. = *Vireya sanguinolenta* Rafin.), blutfarbige, ♄ w. Südam.
Tussaca secunda Rafin., v. Goodyera repens.

Tussilago T., Farfara L. (= *vulgaris* Lam.).
alpina L. etc., v. Homogyne alpina etc., p. 304, II., *albicans* Sw., *nutans* L. (= *lyrata* P.), *pumila* Sw. (= *sinuata* P.), v. Leria albicans, nutans, pumila, p. 457, *japonica* L. (= *Sieboldii* Hort.), v. Ligularia Kämpferi, p. 357, II., *Anandria* L. (= *Gmelini* Turcz. = *lyrata* W., non P.), v. Anandria Bellidiastrum, p. 52, *lobata* Hort. s. Nardosmia palmata, p. 609, sowie hinsichtlich der übrigen Petasites u. Sect. II., Nardosmia p. 609 et p. 502, II.
Tweedia Hook. et Arn., *coerulea* Don, Sweet, (= *versicolor* Hook.), *floribunda* Hort. (= *rosea, pubescens* Hort.), v. Oxypetalum coeruleum et solanoides, p. 467, II. et Nachlese.

Tylanthus Reisseck., acerosus Endl., ericoides Endl., v. Phylica Sect. V. p. 518, II.
Tylomium Presl, *assurgens* Sweet, *robustum* Presl, v. Lobelia (Sect. XII. Tupa) assurgens etc., p. 473.

Tylophora RBr., Schwielenträger.
asthmatica Wight et Arn. (= *Asclepias asthmatica* Roxb., p. 87, = *A. vomitoria* Koen. = *Cynanchum vomitor.* Lam. = *C. Ipecacuana* W. = *C. indicum* Burm. = *C. viridiflorum* Sims), brustheilende, ♄ Sch. w. Ostindien, Molucken, Madagascar.
α) pubescens Decaisn., β) glabra Decaisn.

Digitized by Google

Tylophora
barbata RBr. (= *Hoya barbata* Spgl.).
exilis Colebr. (= *Gymnema pubigerum* Hort. b. Calc. = *Pergularia exilis* Spgl.).
laevigata Decaisn. (= *Cynanchum capense* Sbr. = *C. indicum* Lam. = *C. laevigatum* Vahl, = *C. mauritianum* Hort. Maurit. = *Periploca mauritiana* Poir.), glattester, ħ. Sch. w. Mauritius.
laevis Decaisn. (= *Cynanchum parviflorum* Hort.), glatter, ħ. Sch. w. Vaterland unbekannt.
lutescens Decaisn. (= *flavescens* Hort. = *Echites purpurea* Hort.), gelbliche, ħ. Sch. w. ?
Nicht hinlänglich bekannt: grandiflora RBr. (= *Hoya grandiflora* Spgl.).

Typha T., Rohrkolbe.
daenatica Ehrh., Sweet, aegyptische, 2. Wa. f. Aegypten.
latifolia L. (= *major* Curt.), minima Funk., Hoppe, (= *elliptica* Gmel.), β) nana Lallem., minor Sm. (= *intermedia* Schlchr. = *media* DC.).

Typhonium Schott, Endl., Kolbenarum, XXI. IX., Aroideae.
cuspidatum Decaisne, (= *Arum cuspidatum* Blume, = *A. divaricatum* Auct.), feinspitziger, 4. Kn. w. Ostindien.
divaricatum Decaisne, Bl. (= *Arum divaricatum* L., p. 85, = *A. diversifolium* Blume, = *A. orixense* RBr.). Tropisches Asien, Neuholland, Japan.
flagelliforme Blume, (= *Arum flagellif.* Lodd., p. 85).
minutum Schott, (= *Arum minutum* W., p. 85, = *A. mucronatum* Spgl.).
trilobatum Schott, (= *Arum trilobatum* L., p. 86, = *A. orixense* Roxb.).

Tylonia natans G. Don, v. Hydrocera triflora, p. 308, II.

Ucriana W., *racemosa* Schum., v. Oxyanthus hirsutus, p. 466.

Ulex L., Hecksaame (Stechginster).
australis Clemente, B. Webb, (= *provincialis* Loisel. = *Stauracanthus aphyllus* W. Enum.), südlicher, ħ. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.
baeticus Boiss., spanischer, ħ. f. b. k. Spanien.
Boivini B. Webb, (= *genistoides* Salzm., non Brot.), Boivin's, ħ. f. b. k. Spanien, Nordafrika.
europaeus L. (= *compositus* Mch. = *grandiflorus* Pourr. = *vernalis* Thore).
genistoides Brotero, (= *mitis* Hort. = *Stauracanthus aphyllus* Lk., p. 786), blattloser, ħ. k. f. b. Portugal.
hibernicus G. Don, (= *strictus* Mackay).
nanus Sm. (= *autumnalis* Thore, = *minor* Roth, = *parviflorus* Pourr.).

Ulloa parasitica P. (= *aurantiaca* Hort.), v. Juannulloa parasitica, p. 330, II.
Ulmaria palustris Mch., v. Spiraea Ulmaria, p. 779.

Ulmus T., Ulme, Rüster, (Rusten).
campestris L. Var.: asplenifolia Hort., tiliaefolia Host, viminalis Hort., virens Hort.
β) minor Mill. (= *angustifolia* Wrede).
carpinifolia Gled. (= *campestris* L. var. Auct. = *nana* Borkh. = *nitens* Mch.).
corylacea Dumort., haselnufsähnliche, ħ. f. Belgien.

Digitized by Google

Ulmus

fulva Mchx. (= *americana γ pendula* Ait. = *pendula* W. Enum. = *rubra* Mchx fil.).

glabra Mill. (= *montana* Host, = *?nuda* Ehrh.). Var.: Hostii Hort. Vindob.

major Sm. (= *?excelsa* Borkh. = *hollandica* Mill. = *suberosa* L. var. Spgl.).

a) anglica Engl. Bot., b) pendula Hort.

montana Bauh., Sm. (= *corylifolia* Host, = *excelsa* Borkh.). Var.: cinerea Hort., cucullata Hort., Hayneana Hort. Vindob., longifolia Hort., rotundifolia Hort., tortuosa Host.

scabra Mill. (= *effusa* Borkh., non W. = *hollandica* Pall. = *latifolia* Mch. = *suberosa latifolia* Dum.Cours.), scharfe, ħ. f. Europa.

sparsa Dumort., zerstreutstehende, ħ. f. Belgien.

suberosa Ehrh. (= *campestris* L. var. Auct. = *sativa* DuRoi, = *tetrandra* Schkuhr.), var. fungosa Hort.

viscosa Dsf. (= *?glutinosa* W.), schmierige, ħ. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: betuloides Hort., ontariensis Hort., striata Bosc, Dsf. Nordam., tomentosa Dsf.

Ulricia pyramidalis Jacq., v. Horminum caulescens.

Umbilicus DC., Nabelkraut.

erectus DC. (= *luteus* B. Webb et Berthel. = *Cotyledon lut.* Huds. = *C. tuberosa* H. Par.).

hispidus DC. (= *Cotyledon hispid.* Lam. = *C. Muizonia* Ortega, = *C. viscosa* Vahl), steifhaariges, ⊙. f. Spanien, canarische Inseln, Barbarei.

horizontalis DC. (= *Cotyledon horiz.* Guss., Tenore), horizontaler, 4. f. b. k. Sicilien, Neapel.

Lievenii G. Don, (= *Cotyledon Liev.* Ledeb., C. A. Mey.).

mexicanus Schltdl., mexicanisches, 4. t. k. Mexico.

pendulinus DC. (= *Cotyledon rupestris* Salisb. = *C. umbilicata* Lam. = *C. Umbilicus a* L.).

β) C. peltata (Wendl.).

sedoides DC. (= *Cotyledon sediformis* Lapeyr.), mauerpfefferähnliches, ⊙. 4. f. b. Pyrenäen.

strictus Schltdl. (= *mexicanus* Hort. Petropol., non Schltdl.), steifes, 4. t. k. Mexico.

thyrsiflorus DC. (= *Oreostachys thyrsiflora* Fisch.), straußblumiges, ⊙. f. Sibirien.

Umsema (= *Unisema* Rafin.), *mucronata* Desv., *obtusifolia* Desv., v. Pontederia angustifol. et cordata.

Unedo edulis Hffg., v. Arbutus Unedo.

Uniola L., Spitzgras.

latifolia Mchx. (= *paniculata* Hort., non L.).

stricta Torrey, (= *? Ceratochloa unioloides* Dsf.), steifes, 4. f. Nordamerika.

lappacea Trin., v. Centotheca lappacea, p. 179, *pungens* P. B., v. Sporobolus pungens, p. 780.

Unona L., Unona.

discolor Vahl, (= *biglandulosa* Blume, = *chinensis* DC. = *U. Lessertiana* Dun. = *moniliformis* Roxb. = *Desmos chinensis* Lour. = *Uvaria monilifera* G. = *U. uncata* Vahl), verschiedenfarbige, ħ. t. w. China, Java, Ostindien.

odorata Dun. (= *virgata* Blume, = *Uvaria od.* Lam.). *longifolia* Don, = Guatteria longifolia Wall., W. A., scheint nicht kultivirt zu werden.

Digitized by Google

Uralepis Kunth, (= *Uralepsis* Nutt.), Schuppengras, III. 11., Gramineae.

cuprea Kunth, (= *Eragrostis tricuspis* Trin. = *Festuca quadridens* Poir. = *Poa quinquefida* Pursh, = *P. sesleriodes* Mchx. = *Tricuspis carolinianus* P. B. = *T. acceboracensis* P. B. = *Tridens quinquefida* Schult. = *Triodia cuprea* Jacq. fil.), kupferfarbiges, ♃. f. Nordamerika.

Urananthus Griseb., Benth., Schweifblümchen, VI. 11., Contortae-Gentianeae.

pallidus Liebmann, bleiches, ♃. k. t. Mexico.

chironioides Benth., *glaucifolius* Benth., *Rosselianus* Benth., v. Eustoma chironioides etc., p. 239, II.

Urania Schreb., *madagascariensis* Räusch. (= *speciosa* W. = *Ravenalia* Rich.), v. Ravenalia madagascariensis, p. 586, II.

Uraria Desv., Urarie.

cercifolia Desv. (= *Hedysarum cercifolium* Steudl.), judasbaumblätterige, ♄. w. Ostindien.

hamosa Wall. (= *desmodioides* Grah. = *Hedysarum hamosum* Roxb.), hackenförmige, ♄. w. Ostindien.

lagopodioides DC. (= *retusa* Wall. = *Doodia lagopodioides* Wall.).

Lagopus DC. (= *arborea* G. Don, = *Desmodium arboreum* Sweet, = *Hedysarum arboreum* Hamilt.).

Uraspermum Nutt., *hirsutum* Bigel. etc., v. *Osmorhiza* brevistylis etc., p. 463, II.

Urceolaria exotica Gmel., v. Schradera capitata, p. 463, II.

Urceolina Rchb. (= *Urceolaria* Herb.), pendula Herb. (= *fulva* Herb. = *Collania urceolata* R. et S. = *Crinum urceolatum* R. et P.).

Urena L., Urena.

sinuata L. (= *aculeata* Mill.), α) ? morifolia DC. (= *muricata* DC. = *Lappago* Sm.), β) heterophylla Sm.

Urginea Steinh., N. E., Endl., Urginea, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

anthericoides Kunth, (= *Ornithogalum anther.* Lk. = *Scilla anther.* Poir.), zaunlilienähnliche, ♃. Zw. k. Numidien.

fugax Steinh. (= *Anthericum fugax* Moris, = *A. sardoum* Mill.), flüchtige, ♃. Zw. f. Sardinien.

indica Kunth, (= *Scilla indica* Roxb., p. 732).

undulata Steinh., Kunth, (= *Scilla undulata* Dsf.), wellenförmige, ♃. Zw. f. Sardinien, Corsica, Nordafrika.

exuviata Steinh., *filifolia* Steinh., *fragrans* Steinh., v. Ornithogalum exuviatum etc., p. 457—459, II., *japonica* Hort. Par., v. Barnardia japonica, p. 60, II., *Scilla* Steinh., v. Squilla maritima, p. 696.

Uropetalum Ker, longiflorum Lindl., serotinum Ker, β) fulvum Sweet, (= *Hyacinthus fulvus* Cavan.), viride Ker, (= *Dipcadi filamentosum* Medic. = *D. viride* Mch. = *Lachenal. viridis* W. = *Zuccagnia viridis* Thbg.), p. 831.

Ursinia G., Ursinie.

speciosa DC., prächtige, ⊙. m. f. Cap d. g. Hoffn.

Urtica T., Nessel.

balearica L. (= *cordifolia* Mch. = *pilulifera* L. var. Spgl.).

caravellana Schrk. (= ? *corylifolia* Juss. = *latifolia* Rich.).

cubensis Kl., cubaische, ⊙. ? ♃. w. Cuba.

Digitized by Google

Urtica
gracilis Ait. (= *chamaedryoides* Host. Berol., non Pursh, = ? *leptostachys* P. = ? *procera* Mühlbg. = *Drogrustia ovata* Gaudich.).
grandidentata Moris, großzähnige, ♃. f. ? Sardinien.
Ildefonsiana Steud. (= *scabrella* Hornem., Schrk. = *Ildefonsia* Mart.), Ildefonsia-N., ♄. w. Brasilien.
Linkiana *. (= *ferocissima* Sweet, = *horrida* Lk. En., non H. B. K.).
mexicana Hort. Berol., mexicanische, ⊙. f. Mexico.
oblongata K., längliche, ⊙. f. Untersteyermark.
reticulata Sw. (= *multiflora* Poir.).
sylvatica Blume, Wald-N., ♄. ♄. w. Java.
tenacissima Roxb., zäheste, ♃. w. Sumatra.
Unbestimmtere: biloba Hort., rubricaulis Hornem. *microphylla* Sw., *serpyllacea* H. B. K., v. Pilea muscosa et serpyllifolia, p. 524, II.

Utricularia L., Wasserschlauch.
Bremii Heer, Brem's, ♃. Wa. f. Europa.
intermedia Hayne, (= *media* Schum. = *vulgaris minor* L., Ehrh.).
pulchella C. B. Lehm., schöner, ♃. Wa. f. Mitteldeutschl.

Uvaria L., Zapfenbeere.
Gärtneri DC. fil. (= *trifoliata* G.).
lutea Roxb. (= *coriacea* Vahl, = *montana* Don, = *Guatteria acutiflora* Wall.).
velutina DC. (= *villosa* Roxb. = *Guatteria vel.* DC. fil.).
ventricosa Roxb., bauchige, ♄. w. Ostindien.
japonica L., v. Kadsura japonica, p. 332, II.
Uvularia calcarata Wall. etc., v. Disporum calcaratum etc., p. 269 et 208, II., *distorta* Hort. (= *amplexifol.* L., v. Streptopus amplexifol., *lanuginosa* P., v. Prosartes lanuginosa, p. 561, II., *rosea* P., v. Streptopus Sect. II. Hexorima, p. 709, II.

Vaccaria Dodon., Medic., pyramidata Medic., G., M. et S. (= *parviflora* Mch. = *vulgaris* Host, = *sessiliflora* Sweet, = *Saponaria Vaccaria* L. = *L. rubra* Lam. = *S. segetalis* Neck. = *S. ampliesima* Mill. = *S. pentagona* Hort.).

Vaccinium L., Heidelbeere.
album L. (= *stamineum* Andr. = ? *Vitis idaea alba* Mch. = *Xylosteum ciliatum* β Pursh), weiße, ♄. f. Nordamerika.
crassifolium Andr. (= *carnosum* P. = *Andromeda luridifolia* Ker).
dumosum Andr. (= *frondosum* Mchx. = *hirtellum* Ait.).
β) Watsoni Sweet, (= *humile* Wats.).
floridanum Nutt. (= *Picrococcus floridanus* Nutt.), floridanische, ♄. f. Florida.
fuscatum Ait. (= *corymbosum* Hook., non L. = *formosum* Andr. = *marianum* Wats. = *virgatum* Wats., non Ait.).
minutiflorum Wats. (= *multiflorum* DC.).
prunifolium Lodd., pflaumenblätterige, ♄. f. Nordamer.
salicifolium Steud. (= *salicinum* Lodd., non Chamiss.), weidenblätterige, ♄. f. Nordamerika.
Unbestimmtere: gilvum Meerb., lucidum Hort. angl., nigrum Dsf., rugosum Hort. angl., salvifolium Hort. angl., sibiricum Hort., tomentosum Hort. angl.

Digitized by Google

Vachelia Wight et Arn., Vachelie, XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimosaceae.

Farnesiana W. et Arn. (= *Acacia Farnesiana* W., p. 2, = *A. indica* Desv. = *Farnesia odora* Gasparini, = *Mimosa Farnesiana* L. = *M. indica* Poir. = *M. scorpioides* Forsk.), Farnesische, h. w. Ost- u. Westindien.

Vahlia Thbg. (Vahl, Prof. d. Botanik zu Kopenhagen, † 1804), V. I. Rubiaceae.

Oldenlandiae DC. (= *oldenlandioides* Roxb. = *Cyrilla indica* Koen. = *C. oldenlandioides* Koen. = *Heuchera dichotoma* Murr. = *Oldenlandia biflora* Roth, = *O. dichotoma* Spgl. = *O. pentandra* Retz, non *DC.* = *Russelia oldenlandioides* Roxb.), Oldenland's, ⊙. w. Ostindien.

Vahlodea Fr. (Dr. Vahl zu Kopenhagen, Sohn d. verstorbenen Prof. Vahl), III. II., Gramineae.

atropurpurea Fr. (= *Aira atropurpurea* Wahlbg. = *A. alpina* Vahl, = *Avena atropurpurea* Lk., p. 107), dunkelrothe, 4. f. Lappland, Norwegen.

Vaillantia T., filiformis Ait. (= *Galium filiforme* R. et S.), muralis L. (= *quadriflora* Mch.).

Valeriana T., Baldrian.

alpestris Steven, Bunge, (= *montana* MB.), Voralpen-B., 4. f. Caucasus, Sibirien.

Napus Lindl., rübenähnlicher, 4. k. t. Mexico.

Phu L. (= *hortensis* Lam.).

rupestris Pall. (= *sibirica* W.), *ruthenica* W. (= *sibirica* L.), *villosa* Thbg., v. Patrinia rupestris, sibirica et villosa, p. 591 et p. 481, II.

Valerianella T., Rapunzel.

corniculata C. A. Mey., gehörnte, ⊙. f. Caucasus.

coronata Dufr. (= *campanulata* Bivone), *β)* discoidea Lois. (= *sicula* Gussone, = *Fedia discoidea* Vahl, = *F. sicula* Vahl).

hirsutissima Lk., rauhhaarigste, ⊙. f. Griechenland.

mixta Dufr. (= *Fedia microcarpa* Lois. = *F. minuta* Spgl. = *F. mixta* Vahl).

congesta Lindl. (= *parviflora* Dougl.), v. Plectritis congesta, p. 539, II., *exscapa* (Steven), DC., v. Hohenackeria bupleurifolia.

Vallesia cymbaefolia Ortega, (= *glabra* Lk. = *Rauwolfia glabra* Cavan.).

Vallota Salisb., Herb., purpurea Herb. (= *Amaryllis elata* Jacq. = *A. purpurea* Ait. = *A. speciosa* L'Her. = *Crinum speciosum* L. = *Cyrtanthus purpureus* Herb. = *Hippeastrum purpureum* Hort.).

α) major Hort., *β)* minor Herb.

In van Houttes Établissement horticole wird auch eine V. pyrochroa kultivirt.

Vancouveria Morr. et Decaisne, (Vancouver, franz. Naturforscher etc.), VI. I., Berberideae.

hexandra Morr. et Decaisne, (= *Caulophyllum gracile* Dougl. = *Epimedium hexandrum* Hook.), sechsmännige, 4. f. Nordamerika.

Vanda RBr., Vanda.

costata Lindl., gerippte, 4. w. Ceylon.

cristata Lindl., kammförmige, 4. w. Ostindien.

furva Lindl. (= *Cymbidium furvum* W. = *Epidendrum furvum* L.), 4. w. Ostindien.

Digitized by Google

Vanda

gigantea Lindl., riesenhafte, ♄. w. Ostindien.
lissochiloides Lindl., glattstendelähnliche, 4. w. Molucken.
paniculata Lindl. (= *Aerides paniculata* Ker, = *Sarcanthus paniculatus* Lindl.), rispige, 4. w. China.
peduncularis Lindl., langstielige, 4. w. Ceylon.
recurva Hook. (= *Sarcanthus rostratus* Lindl.), zurückgekrümmte, 4. w. China.
In den belg. Gärten wird noch eine papillosa kultivirt.
teretifolia Lindl., v. Sarcanthus teretifolius, p. 721, *trichorrhiza* Hook., v. Cymbidium triste, p. 189, II.

Vandellia L. mant., Vandellie.

crustacea Benth. (= *alba* Benth. = *varians* G. Don, = *Antirrhinum hexandrum* Forsk. = *Capraria crustacea* L. mant. = *Gratiola aspera* Roth, = *G. lucida* Vahl, = *Hornemannia ovata* Lk. = *Morgania lucida* Spgl. = *Tittmannia ovata* Rchb., p. 811, = *Torenia alba* Hamilt. = *T. crustacea* Cham., Schltdl. = *T. flaccida* RBr. = *T. lucida* Hamilt. = *T. varians* Roxb.), krustirte, ☉. m. f. Südasien, tropisches Neuholland, Madagascar, Mascarenas, tropisches Amerika.
diffusa L. mant. (= *Bonnaya origanifolia* Spgl. = *Gratiola origanifolia* Vahl).
erecta Benth. (= *Tittmannia erecta* Benth.), aufrechte, ☉. m. f. Ostindien.
hirsuta Hamilt., Benth. (= ? *multiflora* Blanco, = *Gratiola viscosa* Hornem. = *Hornemannia viscosa* W. Enum. = *Tittmannia ovata* Benth., non Rchb. = *T. viscosa* Rchb., p. 812), rauhhaarige, ☉. m. f. Ostind., Philippinen.
multiflora G. Don, (= *Tittmannia trichotoma* Benth. = *Torenia multiflora* Roxb.), vielblumige, ☉. m. f. Ostind.
pedunculata Benth. (= *Roxburghii* G. Don, = *cordifolia* G. Don, = *Bonnaya cordifolia* Spgl. = *Gratiola cordifolia* Vahl, = *Tittmannia grandiflora* Benth. (ex parte) = *Torenia diffusa* Roxb., excl. syn., p. 813), stielgblumige, ☉. m. f. Ostindien.
β) parviflora Benth.
scabra Benth. (= *Bonnaya Vahlii* G. Don, = *Columnea minuta* Roxb. = *Gratiola pusilla* W. = *Stemodia minuta* G. Don, = *Tittmannia pusilla* Benth. = *T. sulcata* Benth. = *Torenia hirta* Cham. et Schltdl.), schärfliche, ☉. m. f. Ostindien.

Vandesia edulis Salisb., v. Alstroemeria Salsilla, p. 40.

Vangueria Juss., edulis Vahl, (= *Commersonii* Dsf. = *cymosa* G. fil. = *madagascariensis* Gmel.), spinosa Roxb. (= *Meynia spinosa* Lk.).

Vanilla Adans, Mill., Sw., Vanille.

aromatica Sw. (= *V. Epidendrum* Mirb. = *V. mexicana* Mill. = *Epidendrum Vanilla* L.).
claviculata Sw. (= *Epidendrum claviculatum* Sw.), keulförmige, ♄. Sch. w. Westindien.
Palmarum Lindl. (= *Epidendrum Vanilla* Flor. Flumin.), palmenbewohnende, ♄. Sch. w. Guiana.
planifolia Andrews, (= *sativa* Schiede, = *sylvestris* Schiede).
Pompona Schiede, (= *grandiflora* Lindl. = *Baynilla pompona* Hispano-Mexicanorum), Pompona-V., ♄. Sch. w. Mexico, Columbien, Guiana.
Makoy kultivirt noch eine V. acutifolia.

Digitized by Google

Vasconcellia Hort. Par., non Mart., **Vasconcellie**, ? XXII. ax., Cucurbitaceae-Papayaceae.

Bonplandiana Hort. Par., Bonpland's, ♄. w. Brasilien. [1])

Vavanga chinensis Rohr, (= *edulis* Vahl), v. Vangueria edulis, p. 836.

Velarum DC., Rchb., v. Sisymbrium Sect. VII., p. 762 et 673, II.

Velezia rigida L. ♄. Südfrankr., Span., Kleinasien, p. 837.

Velleya Sm. (= *Velleia* Auct.), lyrata RBr. (= *dichotoma* Auct. = *spathulata* Juss., non RBr.).

Vellozia Vandell. (= *Vellosia* Auct.), (Vellozo, portugiesischer Botaniker), VI. 1., Bromeliaceae-Velloziеae.

aloefolia Mart. (= ?*candida* Mikan), aloeblätterige, 4. w. Brasilien.

candida Mikan, (= *tortia* Spgl.), weifsglänzende, 4. w. Brasilien.

tubiflora H. B. K. (= *Radia tubiflora* Rich., Kunth), röhrenblumige, 4. ♄. w. Südamerika.

Veltheimia Gled., viridifolia Jacq. (= *capensis* Red. = *undulata* Mch. = *Aletris capensis* L.).

Venana madagascariensis Lam., v. Brexia madagasc.

Venidium perfoliatum Less. (= *Arctotis spathulata* Thbg. = *Osteospermum perfoliatum* L. fil., p. 573).

Ventenata avenacea Koel. (= *bromoides* Koel.), v. Gaudinia tenuis, p. 255, II.

Ventenatia Cav., *humifusa* Cav., v. *Astroloma* humif., p. 104, *procumbens* Cav., v. Melichrus rotatus, p. 507.

Vepris obovata G. Don, v. Toddalia paniculata, p. 812.

Veratrum T., Germer (Wedewurz).

Eschscholtzii A. Gray, (= *Lobelianum* β R. et S. = *parviflorum* Bongard, non Mchx.), Eschscholtz's, 4. f. Nordwestliches Amerika.

Lobelianum Bernh. (= *album* β *viride* Lapeyr. = *album viridiflorum* Wimm. et Grab.).

angustifolium Pursh, v. Stenanthium angustifolium, p. 704, II., *caricifolium* Schltdl., *officinale* Schltdl., v. Schoenocaulon caricifol. et officinale, p. 642, II., *virginicum* Ait., v. Zygadenus virginicus.

Verbascum T., Königskerze.

Sect. I. Genuin.

aethiopicum Ehrenb., aethiopische, ♂. f. Aethiopien, Syrien.

Blattaria L. (= *Claytoni* Mchx.), Hybriden: Bastardii R. et S., ramosissimum Poir.

Boerhaavii L. mant. (= *majale* DC. = ? *rotundifol.* Tenore).

brevidens Benth. (= *phlomoides* d'Urv.), kurzzähnige, ♂. f. Samos.

candelabrum Kar. et Kiril., armleuchterförmige, ♂. 4. f. Altai.

Chaixii Vill. (= *austriacum* Schott, = *gallicum* W. = *dentatum* Lapeyr. = *orientale* MB. = *monspessulanum* P. = *banaticum* Schrad. = *alpinum* Turr. = *ovatum* Schrad. = *urticaefolium* Lam. = *virens* Host), Chaix's, ♂. f. Mittel-, Süd-, West- u. Osteuropa, Südrufsland, Armenien.

crassifolium Hffg. et Lk., dickblätterige, ♂. f. Portugal.

---

1) Die Gattung Vasconcellia Mart., zu der Familie der Bignoniaceae gehörig, hat DeCandolle Arrabidaea (A. de Arrabida, Bischof zu Rio Janeiro und Herausgeber der Flora Fluminensis) genannt und im prodr. s. n. r. v. Vol. IX. 21 Arten derselben, in Brasilien heimisch, beschrieben, von welchen bis jetzt keine kultivirt zu werden scheint.

Digitized by Google

Verbascum

densiflorum Bertol., dichtblumige, ♂. f. Italien.
gnaphalodes MB. (= *Stevenii* Hort. Vindob.).
Hohenackeri F. et Mey, b) flore albo.
hyoserifolium Schrad., hyoserisblätterige, ♂. f. Orient.
Lychnitis L., β) album Mch. (= *Moenchii* Schultz), γ) Weldenii Moretti, δ) lychniti-pulverulentum Noull., ε) lychniti-phoeniceum Wiegm. (= *versiflor.* Schrad.).
montanum Schrad. (= *compactum* Hort. = *crassifolium* Schlchr., DC. = *grandiflorum* β Poir.).
mucronatum Lam. (= *candidissimum* DC. = *auriculatum* Sibth., Sm.).
nigrum L. Var. u. Hybrid.: Alopecurus Thuill., lanatum Schrad., thyrsoideum Host, nigro-Lychnitis Schiede, Schottianum Schrad., mixtum Ram., nigro-austriacum Rchb., ruderale Pfeiff. etc.
olympicum Boiss., olympische, ♂. f. Griechenland.
phlomoides L. (= *rugulosum* W. Enum.), Var.: album, australe Schrad., condensatum Schrad., macranthum Hffg., Lk., nemorosum Schrad., sannitieum Tenore, thapsoides Vill.
phoeniceum L. (= *ferrugineum* Andr. = *cisalpinum* Birol. = *triste* Sm.), β) cupreum Sims, γ) puniceum Schrad.
pulverulentum Vill. (= *floccosum* W. K. = *haemorrhoidale* Ait. = *heterophyllum* Moretti, = *pulvinatum* Thuill.).
rubiginosum W. K. (= *caucasicum* Fisch.), β) tauricum Hook., γ) ferrugineum Mill.
simplex LaBill. (= *garganicum* Tenore, = *leptostachyum* DC. = *syriacum* Schrad.), einfache, ♃. k. Syrien, Calabrien, Südfrankreich.
sinuatum L. (= *scabrum* Presl), Hybrid.: sinuato-pulverulentum Noull. (= *hybridum* Brot.), sinuato-Thapsus Noull., longiracemosum Chaub.
soongaricum Schrenk. (= *palystachyum* Karel. et Kiril.), soongarische, ♂. f. Soongaria.
Thapsus L. (= *alatum* Lam. = *densiflorum* Pollin. = *neglectum* Guss. = *Schraderi* Mey.), Var. u. Hybrid.: Thapso-sinuatum Noull. (= *calyculatum* Chaub.), Thapso-Lychnitis Mert et K. (= *spurium* K. = *semialbum* Chaub.), Thapso-nigrum Schiede, (= *collinum* Schrad. = *seminigrum* Fr. = *ambiguum* Lej. = ? *simplex* Hffg., Lk. = *dubium* R. et S.).
thapsiforme Schrad. (= *Thapsus* Mey., K. = *bicolle* Murr. = *cuspidatum* Schrad. = *Kicksianum* Dumort., Hybrid.: thapsiformi-Lychnitis Schiede, (= *ramigerum* Schrad.), thapsiformi-nigrum Schiede, (= *adulterinum* K.), nothum K., interjectum, denudatum et flagriforme Pfund. ? β) macrurum Tenore.
viminale Guss. (= *argyrostachyon* Tenore), gertenartige, ♂. f. Neapel.
virgatum With. (= *blattarioides* Lam. = *crystallostemon* Weinm. = *Celsiae* Boiss. = *glabrum* W. Enum. = *Celsia viscosa* Wight).

Zweifelhafte oder nicht hinlänglich bekannte Arten: cordatum Dsf., glabrum de l'Arbr., Hornemanni Bess., novae Hollandiae Roem. Hort. Turic., peregrinum Fisch., slavonicum Kit., sulcatum Dsf., tauricum Hort., vernale Hort., versicolor Wender. etc.

Arcturus L., *lyratum* Lam., v. Celsia Arcturus, cretica, p. 175.

Digitized by Google

Verbascum

II. Janthe Griseb.

bugulaefolium Lam. (Griseb.), (= *V. Osbeckii* L.).

Verbena T., L., Eisenkraut.

americana Mill., amerikanisches, ⊙. f. Panama.

angustifolia Mchx. (= *rugosa* Mühlbg.).

aspera Gill. et Hook., rauhes, ♄. k. t. Chili.

Aubletia L. (= *grandiflora* Mchx. = *longiflora* Lam. = *Billardiera explanata* Mch. = *Buchnera canadensis* L. mant. = *Glandularia carolinensis* Gmel. syst. = *Obletia* Rozier).

hiserrata H. B. K. (= *caroliniana* L. var.? Spgl., p. 886).

bonariensis L. (= *corymbosa* Hort. Berol. nec *R. et S.* (= *trichotoma* Mch.), β) litoralis H. B. K.

caroliniana L. (= *carnea* Medic.).

chamaedryfolia Juss. (= *chamaedryoides* Hffg. = *Melindres* Gill. = *melissoides* Sweet, = *veronicaefolia* Sm. = *Erinus peruvianus* L.), var. scarlatina Hortul.

cuneiformis R. et P. (= *cunsifolia* P.), keilförmiges, ♃. k. t. Peru.

gracilis Dsf., non Chamiss. (= *remota* Benth.), schlankes, ⊙. f. Mexico.

junosa Gill. et Hook., simsenförmiges, ♃. ♄. k. t. Chili.

laciniosa Schrad., schlitziges, ♃. f. k. ?

Lucaeana Walp. (= *strigosa* Hook.), Lucae's, ♃. f. Nordamerika.

rugosa D. Don, Sweet, non Mill., Houst. (= *Doniana* Steud.).

scoparia Gill. et Hook., besenförmiges, ♄. k. t. Chili.

simplex Lehm. (= *? angustifolia* Mchx. var.), einfaches, ♃. f. Nordamerika.

stricta Vent. (= *alopecuroides* Hortul. = *rigens* Mchx.).

venosa Gill. et Hook. (= *scaberrima* Cham.).

Hybriden und Varietäten:

Abdel Kader, Adonis, alba maculata, Alexandrina, Amanda, Annette, Array, Barkesii, Beauty supreme, belle Pompadour, bicolor, bijou, Blue Queen, Buistii, Burleyana, carnea, cedo-Nulli, coelestina, Comte de Paris, cordata, Défiance, delicata, De Mayi, Duchesse d'Orléans, Elfordiensis, Enchantress, Emma, excelsa, Favorite, Garland, géant, Gladiator, Goliath, Hendersonii, Howardiana, Hudibras, Hylandsii, ignea, Impératrice Josephine, incomparable, Ingrani superba, insignis major, Iveryana, Jeanne d'Arc, Julia Grisi, Lilac perfection, Louis Philippe, Lucassi, Lucrèçe, Mac Nabiana, maculata variegata, magnifica, Mars, maxima, Mulberry, mirabilis, Minerva, Nec plus ultra, Nelsonii, Nivenii coerulea, odoratissima, Parthoni (= *fragrans*), Phoenix, picta, Princesse Hélène et royal, punicea, purpurea, Queen, Queen Hélène, ramosa, Rébecca, Reine Victoria, Rose d'amour, rosea elegans et odorata, ruby, Sabini, speciosissima, splendida superba, Stedmanni, Stewartiana, striata, superb lilac, superba, Taglioni, teucrioides atrosanguinea et coelestina et Princesse Alice, Thompsoniana, Tom Pouce, tricolor alba, triumphans, Van Geertii, Van Gendtii, Vesta, violacea, Vulcain, Westingii, Wonder of scarlet, Zeuxis etc.

angustifolia Mill., non Mchx. (= *indica* Jacq.), *cajennensis* Endl., *jamaicensis* L., *pilosiuscula* Endl., *Salisburii* Endl., v. Stachytarpheta angustifolia, ca-

Digitized by Google

Verbena

jennensis, jamaicensis, mutabilis, pilosiuscula et urticaefolia, p. 781 et 697, II., *?dentata* Visian. etc., v. Aloysia chamaedryfolia etc., p. 27, II., *pulchella* Sweet, *sulphurea* D. Don, v. Shuttleworthia pulchella, sulphurea, p. 661, II., *nodiflora* L. etc., v. Lippia nodiflora etc., p. 364, II., *curassavica* L., v. Famonea curassavica, p. 797.

Verbesina L., Verbesine.

crocata Less. (= *Bidens crocata* Cav. = *Platypteris crocata* H. B. K., p. 634, = *Spilanthes crocata* Sims).

Drummondii Lindl., Drummond's, 4. k. Texas.

gigantea Jacq. (= *pinnatifida* Sw., non Cav.).

Karwinskyi Mart., Karwinsky's 4. k. t. Mexico.

Phaetusa Cass. (= *Phaetusa americana* G. = *P. borealis* Spgl. = *Siegesbeckia occidentalis* L.), nordamerikanische, 4. f. Nordamerika.

Siegesbeckia Mchx. (= *occidentalis* Walt. = *Siegesbeckia trinervata* Mch.).

sinuata Ell. (= *laciniata* Nutt. = *Siegesbeckia laciniata* Poir.), buchtige, 4. k. Carolina.

triplinervia Visiani, dreifachnervige, 4. ♄. k. t. Mexico.

Acmella L., v. Spilanthes Acmella, *alba* L., *prostrata* L., v. Eclipta erecta, prostrata, *asteroides* L., v. Amellus Lychnitis, *dichotoma* Murray, (= *lanceolata* Poir., *Lavenia* Roxb., non L., v. Blainvillea rhomboidea et latifolia, p. 71, II., *ovata* Hort. Par., v. Heliopsis buphthalmoides, *sativa* Roxb., v. Guizotia oleifera.

Vermifuga corymbosa R. et P. v. Flaveria Contrayerba.

Vermontea decandra Commers., v. Blackwellia paniculata, p. 124.

Vernonia Schreb., Vernonie.

fasciculata Mchx., Ell., non Blum (= *altissima* Less. = *?praealta* DC., non W.), büschelförmige, 4. f. Nordam.

firmula Mart., härtliche, ♄. w. Brasilien.

noveboracensis W. (= *Baldwini* James, = *praealta* W. Auct. = *Serratula altissima* Mill. = *S. noveboruc.* L.).

profuga Notar., windende, ♄. Sch. w. Südamerika.

scorpioides P. (= *centriflora* Lk., Otto, = *V. tournefortioides* Less., non H. B. K. = *Conyza scorpioides* Lam. = *Lepidoploa scorpioides* Cass.).

tournefortioides H. B. K. (= *?subrepanda* P. = *Stachelina solidaginoides* W. herb., p. 886).

chinensis Less., v. Scheuchleria patula, p. 729, *montevidensis* Hort., v. Pycnocephalum spathulaefolium, p. 575, II.

Veronica T., L., Ehrenpreis.

acutiflora Benth., non Lapeyr. (= *angustifolia* A. Cunn.), spitzblumiger, ♄. k. Nördl. Neuzeeland.

agrestis L. (= *nitidula* Rchb. = *pulchella* Bast. = *versicolor* Fr.). Europa, Caucasus, Mittelasien, Mauritius, Nordamerika. Var.: calycida et polita Fr. (= *didyma* Tenore), opaca Fr. (= *?obscura* Dumort.), nach Bentham.

Allionii Vill. (= *officinalis β* L. = *pyrenaica* All. = *repens* All.), Allioni's, 4. f. Alpen d. Dauphiné, Savoyens etc.

amoena Stev. (= *graeca* Sprunner, = *pedunculoris* Bory et Chaub., non MB.).

Baumgartenii R. et S. (= *pauciflora* Kit. = *petraea* Baumg.).

Digitized by Google

Veronica

ceratocarpa C. A. Mey., p. 886.
ciliata Fisch. (= *macrocarpa* Turcz., non Vahl), gefranzter, 4. f. Baical. Sibirien.
densiflora Ledeb. (= *Paederota humilis* W. Walp.), dichtblumiger, 4. ♄. f. Altai.
diffusa Hook. fil., weitschweifiger, ♄. k. Neuzeeland.
diosmaefolia A. Cunn., göttergeruchblätteriger, ♄. k. Neuzeel.
euphrasiaefolia Lk. (= *thymifolia* W. herb.), augentrostblätteriger, 4. f. Persien.
exaltata Mauud, höchster, 4. f. Sibirien.
filiformis Sm., Vahl, fadenförmiger, ⊙. f. Caucasus, Kleinas.
formosa RBr. (= *diosmaefolia* Kn. et Westc., non Cunn.).
gentianoides Vahl, (= *olympica* Pall.), *β*) pallida Hornem., *γ*) gentianifolia Sweet.
incisa Soland. Var.: laciniata Soland., sublaciniata G. Don.
laeta Karel. et Kiril., freudigblauer, 4. f. Asiat. Rufsland (Alatau).
ligustrifolia A. Cunn. (= ? *salicifolia* Vahl, non Forst.), ligusterblätteriger, ♄. k. Neuzeeland.
longifolia L. (= *huxuriana* Ledeb.), *β*) pubernla Benth. (= *maritima* L. = *elata* Dsf. = *excelsa* Dsf.). Varietät. u. Hybriden nach Bentham: media Schrad., villosa Schrad., glabra Ehrh., arguta Schrad., nitida Ehrh., crenulata Hoffm., complicata Hoffm., grossa, acuta, ambigua et rigens Mart., confusa et longiflora R. et S., ruthenica R. et S., persicifolia et polystachya Lk. Enum., carnea DC., oxyphylla Steven, condensata, comosa et dentosa Hort., azurea Schott etc.
macrocarpa Vahl, grofsfrüchtiger, ♄. k. Neuzeeland.
macrostemon Bunge, grofsfadiger, 4. f. Altai.
melissaefolia Dsf., Poir. (= *Vestiana* R. et S.), melissenblätteriger, 4. f. Phrygien.
β) maxima Steven.
minuta C. A. Mey., winziger, 4. f. Westcaucasus.
multifida L., non Jacq. (= *tenuifolia* Stev.), vieltheiliger, 4. f. Mittel- u. Ostasien, Nordpersien, Taurien, Caucasus.
nivea Lindl., schneeweifser, 4. k. Van Diemens Land.
orientalis Mill., Soland. (= *heterophylla* Salisb. = *taurica* Stev.).
officinalis L. (= *Mülleriana* Vest, = *spadana* Lej.), *β*) minor Benth. (= *hirsuta* Hopk. = *seligera* D. Don, = *acutiflora* Lapeyr.).
paniculata L. (= *altaica* Fisch. = ? *brevifolia* MB. = *amethystina* W. Enum. = *ramosa* Pall. = *serrulata* Pall. = *virgata* Lk. = *foliosa* W. K. = *leucantha* Helm, = *spuria* L. spec.), rispiger, 4. f. Südosteuropa, asiat. Rufsland, Nordchina, Japan.
β) angustifolia Fisch., Benth. (= *Hostii* Moretti, = *ticinensis* Pollini, = *linariaefolia* Pall. = *cartilaginea* Ledeb.).
peregrina L. (= *caroliniana* Walt. = *carnosula* Lam. = *chilensis* H. B. K. = *laevis* Lam. = *marylandica* L. = *pallescens* Gat. = *romana* L. = *subserrata* Rchb. = *xalapensis* H. B. K.).
panormitana Tineo, panormitanischer, 4. f. Sicilien.
polycarpa Hort. Berol., vielfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.
repens Clairv., DC., non All., kriechender, 4. f. Corsica.
salicifolia Forst., weidenblätteriger, ♄. k. Neuzeeland.
speciosa R. Cunning., prächtiger, ♄. k. t. Neuzeeland.

Digitized by Google

Veronica

spicata L. Als Variet. u. Hybrid. gehören nach Bentham hierzu folgende: Clusii Schott, menthaefolia Schott, squamosa Presl, nitens Host, (= *crassifolia* Wierzb.), Barrelieri Schott, australis Schrad. (= *paludosa* Lej.), alternifolia Lej. (= *media* Lej.), brevifolia Lk. (= *brachyphylla* R. et S.), orchidea Crantz, (= *hybrida* MB. = *crassifolia* Kit. = *Crantzii* Schm. = *arguta* Moretti), longibracteata Lk., praetutiana Moretti, pallens Host etc.

stolonifera Lehm. (= ?*calycina* RBr. var. Bentham). Neuholland, (angebl. Nordamerika), p. 844.

tubiflora Fisch. et Mey. (= *Leptandra Meyeri* G. Don), = *Paederota tubiflora* Walp.).

umbrosa MB., schattenliebender, 4. f. Caucasus.

virginica L. (= *Eustachya alba* et *purpurea* Rafin. = *Callistachya virginica* Rafin. = *Leptandra virginica* Nutt. = *Paederota virginica* Walp. = *Veronicastrum album* Mch.), β) angustifolia Steud. (= *Leptandra angustifol.* Lehm.), γ) diversifolia Steud. (= *purpurea* Steud. = *Veronicastrum diversifolium* Mch.).

Unbestimmtere: adscendens Don, 4., aquatica Bernh. ⊙., candida Lodd., cuspidata W. 4., depressa Kit. ⊙. Ungarn, Koeleri R. et S. (= *nova* Koel.), Koenitzeri Hort. Jenens., praealta Lodd. 4., rosea Dsf. (= *atlantica* P.) ♄. Atlas, stricta Lodd., upsaliensis Hort. (= *paniculat.* var.), Waldsteiniana etc.

Lindleyana Wall., v. Picrorhiza Kurroa Nachlese.

Verticordia DC., Verticordie, XII. 1., Myrtaceae-Chamaelaucieae.

acerosa Lindl., nadelähnliche, ♄. t. Neuholland.

Fontanesii DC. (= *Chamaelaucium plumosum* Dsf. = *Diplachne Baueri* RBr.), Desfontaine's, ♄. t. Neuholl.

glaucescens Hort. angl. et belg., blaugrünliche, ♄. t. Neuh.

grandiflora Endl. (= *helianthe* Lindl.), grofsblumige, ♄. t. Neuholland.

insignis Endl., ausgezeichnete, ♄. t. Neuholland.

Lehmanni Schauer, Lehmann's, ♄. t. Neuholland.

Die Arten dieser Gattung sind gröfstentheils in unsere Gärten noch nicht eingeführt.

Vesalea Mart. et Galeotti, (Vesalius, bekannter u. berühmter Arzt und Anatom des XVI. Jahrh.), IV. 1., Caprifoliaceae.

floribunda Mart. et Galeott. (= *Abelia floribunda* Hort.), blüthenreiche, ♄. t. Mexico.

Vesicaria Lam., Blasenschötchen.

arctica Richards. (= *sudetica* Gill. = *Alyssum arcticum* Hornem.).

corymbosa Griseb., doldentraubiges, ♂. f. Rumelien.

digitata C. A. Mey., fingerförmiges, ⊙. f. Caucasus.

fruticulosa Desv. (= ?*cretica* Poir.), strauchiges, ♄. f. b. k. Archipelagus.

grandiflora Hook., b) pallida Hort.

reticulata Lam. (= *denticulata* Sm. = *Alyssum Vesicaria* L.).

incana Desv., v. Berteroa incana.

Veslingia Visian. (Vesling, alter bekannter Arzt und Anatom), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

scabra Visian., scharfe, 4. k. t. Nubien etc.

Digitized by Google

Veslingia Fabr., *cauliflora* Mch. (= *Heisteri* Fabr.), v. Aizoon canariense, p. 26.

Vestia lycioides W. (= *foetida* Hffg. = *Cantua foetida* P. = *C. ligustrifolia* Juss. = *Cestrum grandiflorum* Hort. = *Periphragmus foetidus* R. et P.).

Vexillaria arborea Hffg, v. Clitoria arborea, p. 150, II., *brasiliana* Hffg., v. Centrosema brasilianum, p. 132, II., *triquetra* Hffg., v. Platysema triquetrum, p. 538, II.

Vialia Visian. (Felix Vial, Prof. d. Botanik zu Padua, 1687—1718), XVI. 11. (X. v.), Büttneriaceae.

macrophylla Visian. (= *Hermannia macrophylla* Hort. = *Melhania macrophylla* Vis.), grofsblätterige, ♄. t. ?

Vibo Medic., *spinosa* Mch., v. Emex spinosa.

Viborgia capitata Mch., *hirsuta* Mch., *purpurea* Mch., *supina* Mch., v. Cytisus capitatus, biflorus, purpureus, supinus.

Viburnum T., L. (et *Opulus* et *Tinus* T.), Schneeball.

cotinifolium D. Don, (= *polycarpum* Wall.).

dubium Steud. (= *fragrans* Lois., non Bunge), zweifelhafter, ♄. k. f. b. ?

ellipticum Hook., elliptischer, ♄. f. Nordamerika.

fragrans Bunge, wohlriechender, ♄. k. f. b. Nordchina.

japonicum Spgl. (= *Cornus japonica* Thbg.), japanischer, ♄. k. Japan.

laevigatum Ait. (= *cassinoides* Mill. = *lanceolatum* Hill.).

nudum L., *α*) Claytoni Walp., *β*) angustifolium Walp. (= ?*nitidum* Ait. = *pyracanthifolium* Schwein.), *γ*) cassinoides L., nec Mchx. (= *nudum* Hook. = *pyrifolium* Pursh, = *squamatum* W. Enum.).

obovatum Walt. (= *cassinoides* Mill., non L. = *laevigatum* Ait.), verkehrteiförmiger, ♄. f. Nordamerika.

β) punicifolium Dsf.

odoratissimum Ker, (= *chinense* Zeyh., Colla, = *Coffea monosperma* Hook., Arn.).

Opulus L., d) xanthocarpum Hort. Vindob.

rugosum P. (= *latifolium* Hort. = *rigidum* Vent. = *strictum* Lk. = *Tinus δ strictum* Ait., non Sweet).

Unbestimmtere: Avona Hort. Cels., oleaefolium Tausch.

Vicia T., Wicke.

I. Euvicia.

alpestris Steven, (= *polyphylla* Dsf. var. Spgl.), Voralpen-W., ♃. Sch. f. Taurien.

bithynica L. (= *angulosa* Gater. = *minuta* Mch. = *Arachus* Medic. = *Lathyrus bithynicus* Lam. = *L. tumidus* W. = *L. turgidus* Lam.), bithynische, ⊙. Sch. f. Südeuropa.

Bobartii Edw. Forst. (= *angustifolia* Sm., non Roth, = *angustifol. β acuta* P. = *lathyroides* Dicks., non L. = *sativa γ* Sm.), Bobart's, ⊙. Sch. f. England.

calcarata Dsf. (= *angustifolia* Mch. = *monantha* Retz, = *Orobus viciaeformis* Lagasca).

canadensis Zucc. (= *globosa* Retz), canadische, ⊙. Sch. f. Canada.

cornigera Chaub., hörnertragende, ⊙. Sch. f. Frankreich.

dentata Fisch., non Gill. (= *Fischeri* Steud.).

dubia Schult. (= *Lathyrus italicus* Hort.).

dumetorum L. (= *patula* Mch. = *tetragona* Hort. Par.).

gigantea Bunge, riesenhafte, ♃. Sch. f. Nordchina.

lilacina Ledeb., lilafarbige, ♃. Sch. f. Altaisch. Sibirien.

Digitized by Google

Vicia
lutea L., β) pallidiflora Sering. (= *hirta* Balb.), γ) muricata Sering.
megalotropis Ledeb., grofskielige, 4. Sch. Alt. Sibirien.
narbonensis L. (= *latifolia* Mch.), β) serratifolia Jacq. (= *monadelpha* Roth).
nodosa Fisch., knotige, ⊙. Sch. f. ?
punctata Schlchr., punktirte, ⊙. Sch. f. Schweiz.
purpurea Steven, (= *polyphylla* Dsf. var. Spgl.), purpurfarbige, 4. Sch. f. Ostcaucasus.
sardoa Moris, sardinische, ⊙. Sch. f. Sardinien.
sativa L. Var.: Winter Fave or Wetch, seminibus griseis, alba (white seeded thare), α) obovata Sering. (= *helvetica* Hort. = *nemoralis* P.), β) segetalis Thuill. (= *luganensis* Schlchr.), γ) glabra Schlchr., δ) pygmaea Sering. (= *lathyroides* Thomas), ε) cordata Wulf.
triflora Tenore, dreiblumige, ⊙. Sch. f. Italien.
villosa Roth, β) glabrescens Hort. Petropol.
II. Faba T.
Faba L. (= *F. vulgaris* Mill. = *F. major* Dsf. = *F. sativa* Auct.). Var.: a) atropurpurea, b) atrovioiacea, c) gilva, d) minima, e) rubra, f) viridis.
Unbestimmtere: bactra Zucc. ⊙., bohemica Räusch., glauca Hort. Liverp., ? non Presl, Terronii Tenore, tetragona Dsf., Thouini Mart., virginica Mart.
fruticosa W. (= *tomentosa* Hort.), v. Coursetia tomentosa, p. 164, II.

Victoria Schomb., Lindl., (zu Ehren d. Königin Victoria von England, erl. Beschützerin der Wissenschaften u. Künste, so benannt), XIII. 1., Nymphaeaceae.
regia Schomb., Lindl. (= *Euryale amazonica* Poepp.), königliche, 4. Wa. w. Südamerika.
Crutziana d'Orbigny, ebenfalls in Guiana heimisch, wird bis jetzt kaum kultivirt.

Vieusseuxia Delarb., Vieusseuxie.
aristata Delarb. (= *Iris tricuspis* Thbg.), grannige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
iridioides Red., non Lk. (= *Iris curtipendula* DC. = *Moraea Candolleana* Spgl.), schwertelähnliche, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
tripetaloides DC. (= *Iris mutila* Lichtst. = *I. tripetala* L. fil. = *Moraea tripetala* Ker), dreikronenblättrige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
iridioides Lk., v. Dietes iridioides. Hinsichtlich der übrigen s. Moraea, p. 530 et p. 418, II.

Vigna Savi, Vigna.
villosa Savi, zottige, ⊙. Sch. f. Chili.
capensis Walp., *Catjang* Walp., v. Dolichos capensis, Catjang.
Vignea acuta Rchb. etc., v. Carex acuta etc.

Vilfa Adans., Trin., v. Sporobolus Sect. II. p. 779 et 665, II.
Villanova bipinnatifida Ortega, v. Parthenium Hysterophorus.

Villarezia R. et P., Villarezie, V. 1., Celastrineae.
grandiflora Hort. belg., grofsblumige, ♄. w. Südamerika.

Villarsia Vent., Griseb., parnassiifolia RBr. (= ? *chilensis* Lodd. bot. Cab. = *reniformis* Hort. Par. = *Menyanthes exaltata* Sims, = *Samolus parnassiifolius* LaBill.).
β) reniformis RBr.
Hinsichtl. d. übrigen s. Limnanthemum, p. 360, II.

Digitized by Google

Vinca L., Sinngrün.

Sect. I. Catharanthus G. Don, (= *Lochnera* Rchb.).

lancea Boj. (= *madagascariensis* Hort. Cels.), lanzettliche, 4. w. Madagascar.

rosea L. (= *Pervinca rosea* Mch.) cum var. p. 849.

Sect. II. Cupa Vleea A. DC.

pusilla Murray, L. fil. (= *parviflora* Retz).

Sect. III. Pervinca A. DC.

herbacea W. K. (= *minor* Sm.).

media Hffg., Lk. (= *acutiflora* Bertol. = *major* Brot.), mittleres, 4. ħ. k. Portugal.

minor L. (= *Pervinca m.* Scop.), var. intermedia Tausch.

Vincetoxicum Mch. (= *Cynanchi* Sect. RBr.), Schwalbenwurz, V. m., Asclepiadeae.

acuminatum Decaisne, zugespitzte, 4. f. ħ. Japan.

atratum Morr. et Decaisne, schwärzliche, 4. f. Nordchina.

canescens Decaisne, (= *Asclepias cretica* Clus. = *A. canescens* W. = *Cynanchum glaucum* Wall. = *Vincetoxicum luteum* Sieber), grauliche, 4. f. Osteuropa, Kleinasien, Nepal, Cashmire.

japonicum Morr. et Decaisne, japanische, 4. Sch. f. b. Japan.

medium Decaisne, (= *luteum* Hffg. et Lk. = *Asclepias lutea* Mill. = *A. fuscata* W. Enum. Suppl. = *Cynanchum fuscatum* Lk.), mittlere, 4. Sch. f. Süd-, West- und Osteuropa.

nigrum Mch. (= *Asclepias nigra* L. = *Cynanchum nigrum* RBr.).

officinale Mch. (= *vulgare* R. et S. = *Asclepias alba* Mill., Lam. = *A. Vincetoxicum* L. = *A. ovata* Hort. = *Cynanchum Vincetoxicum* P., RBr.).

a) angustifolium, b) latifolium.

purpurascens Morr. et Decaisne, purpurfarbige, 4. Sch. f. b. Japan.

sibiricum Decaisne, (= *Asclepias sibirica* L. = *Cynanchum sibiricum* RBr.), sibirische, 4. f. Sibirien, Dahurien, Nordchina.

Viola T., Veilchen.

affinis Lecont. (= *cucullata* Ait. = *papilionacea* β DC. = *sororia* Auct. americ.), ähnelndes, 4. f. Nordamer.

altaica Pall., Ker, (= *calcarata* L. var. Gay. = *chrysantha* Fisch. = *grandiflora* Sievers, = *Pallasii* Fisch. = *speciosa* Schrad. = *Mnemion grandiflorum* Spach), (Pensées anglaises, Grandes Pensées, in vielen jährlich immer wieder neu erzeugten buntfarbigen Varietäten mit abwechselnden Blumistennamen versehen).

arborescens L., non Hortul. (= *longicicola* Pourr. = *suberosa* Dsf. = *tuberosa* Auct.).

Billetii J. W. Schultz, (= *pumila* et *pratensis* Mutel), Billet's, 4. f. Frankreich.

blanda W. (= *amoena* Leconte, non Symes, = *clandestina* Pursh, = *Lecontiana* G. Don, = *obliqua* Pursh, = *pallens* Forst.).

calcarata L. (= *alpina* Tenore, non Jacq. = *Bertolonii* Pio, = *decumbens* Mch. = *gracilis* Bivone, = *grandiflora* Hegetschw. = *heterophylla* Bertol. = *hispida* Lapeyr.).

chinensis G. Don, (= *primulaefolia* Lour.), chinesisches, ⊙. f. China.

cucullata Ait. (= ? *cordata* Walt. = *obliqua* Pio, = *reaupinata* Mch. = ? *asarifolia* Schweinitz, non Pursh).

β) sororia W.

Digitized by Google

Viola

dactyloides R. et S. (= *digitata* W., non Pursh, = *palmata* Patrin, non L.).

Dehnhardtii Tenore, Dehnhardt's, 4. f. Neapel.

?*fennica* Fisch., Sweet, finnisches, 4. f. Sibirien.

flabellifolia Lodd. (= *atropurpurea* Rafin. = *pedata bicolor* Pursh, = *pedata flabellata* Sweet), fächerförmiges, 4. f. Nordamerika.

Gmeliniana R. et S. (= *fusiformis* Sm. = *lanceolata sibirica* W.), β) Fischeri Swt. (= *suavis* Fisch., non MB.).

hirta L. (= *hirsuta* R. et S. = *parvula* Opiz), β) carnea, γ) variegata, δ) ambigua W. K., ε) campestris MB., ζ) umbrosa Hoppe.

imberbis Ledeb., unbärtiges, 4. f. Altaisch. Sibirien.

intermedia Lej., mittleres, 4. f. Belgien.

modesta Fenzl, zierliches, ⊙. f. Syrien.

α) grandiflora, β) parviflora.

Mühlenbergii Torrey, (= *asarifolia* Mühlbg., non Pursh, = *conspersa* Rchb. = *debilis* Pursh, = *labradorica* Schrk. = *punctata* Lewis, = *uliginosa* Mühlbg., Schwein., non Schrad.), Mühlenberg's, 4. f. Nordamerika.

multifida W. (= *dissecta* Ledeb. = *pinnata α sibirica* W.).

odorata L., i) fol. variegatis, β) arbuscula * (= *arborescens* Hortul., (non L.) fl. pleno), γ) suavis MB. (= *Stevenii* Bess. = *parmensis* Hortul.), b) fl. pleno, p. 850.

ovata Nutt. (= *ciliata* W. = *fimbriatula* Sm. = *primulaefolia* Pursh, non L. = *sagittata β ovata* Torr., A. Gr.).

palmata L. (= *heterophylla* Lecont., non Bertol. = ?*ranunculifolia* Juss.), b) pygmaea Hort., β) triloba Lewis.

Patrinii DC. (= *primulaefolia* Hamilt. = *prunellaefolia* Fisch. = *Notoniana* Wall.), Patrin's, 4. f. Sibirien, Nordchina, Nepal.

primulaefolia L. (= ?*cordata* Walt. = *Gronovii* W. herb. = *ovata* Rafin.), β) acuta Bigel.

prionantha Bunge, (= *caespitosa* D. Don, = *Patrinii β* et *γ* DC. = *primulaefolia* Hamilt.).

rothomagensis Dsf. (= *hispida* Lam. = *parvula* Tineo, = *tricolor* L. var. DC., K. = *Mnemion hirsutum* Spach).

sagittata Ait. (= *sagittaefolia* Salisb.).

Schultzii Billot, (= *turfosa* Kirschl.), Schultz's, 4. f. Elsafs.

striata Ait. (= *debilis* Mchx., non Pursh, = *Lewisiana* DC. = *ochroleuca* Schweinitz, = *repens* Schweinitz).

tricolor L. (= *hortensis* Hortul.), var. iridescens Hort. etc.

villosa Walt. (= *barbata* Mühlbg. = *palmata* L. var.), zottiges, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: Bruneaunii Hort., calycantha Hort., lobata striatiflora Hort.

Virea Adans., G., *hastilis* G., v. Leontodon hastile, *scabra* Scopol., v. Helminthia asplenioides, p. 293, II.

Vireya sanguinolenta Rafin., v. Tussacia sanguinea, p. 747, II.

Virgilia argentea Poir., v. Ammodendron Sieversii, p. 86?, *lutea* Mchx., v. Cladrastis tinctoria, p. 148, II.

Virgilia heliades L'Her. (= *grandiflora* Fras.), v. Gaillardia pulchella.

Virgularia R. et P., Virgularie, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae (Scrofulariaceae).

splendida Mart. (= *Esterhazya splendida* Mik. var. β *vulgaris* DC. = *Gerardia gratioloides* Cham., Schltdl.), schimmernde, ♄. w. t. Brasilien.

Virola sebifera Aubl., v. Myristica sebifera, p. 537.

Digitized by Google

Viscaria Riv., Röhl., v. Lychnis Sect. I. et IV. p. 428 et 376, II. *cristata* Hort. = ?

Visiania DC. (R. v. Visiani, Prof. u. Director d. botan. Gartens in Padua), II. z., Oleaceae.

grandiflora DC. (= *Olea grandiflora* Wall. = *Phillyrea grandiflora* Wall.), grofsblumige, ħ. t. Nepal, Ostindien.

paniculata DC. (= *Olea clavata* G. Don, = *Phillyrea paniculata* Roxb. = *P. terminalis* Heyne), rispige, ħ. t. China.

robusta DC. (= *Phillyrea robusta* Roxb. = *P. terminalis* Roxb.), starke, ħ. t. w. Ostindien.

Vitex L., Keuschbaum (Müller).

Agnus castus L. (= *verticillata* Lam.), β) *latifolia Mill.*, *non* Lam. = ? *integra* Medic.).

Doniana Sweet, (= *umbrosa* Don), Don's, ħ. w. Sierra Leone.

incisa Lam. (= *chinensis* Mill.).

Leucoxylon L. fil. (= *Wallrothia Leucoxylon* Roth, p. 655).

trifolia L. (= *integerrima* Mill.).

Nicht hinlänglich bekannt: sinuata Medic.

Viticella dolteoides Mch., v. Clematis Viticella, p. 204.

Vitis T., L., Weinstock.

aestivalis Mchx. (= *intermedia* Mühlbg. = *Labrusca* Walt. = ? *palmata* Vahl, = *vinifera americana* Marsh. = *vulpina* W., Jacq. Hort. Schönbr.).

cordifolia Mchx. (= *incisa* Jacq. = *vulpina* Walt.), herzblätterigen, ħ. Sch. f. Nordamerika.

Labrusca L. (= *taurina* Walt.), β) alba Hort. Vindob.

orientalis Clement., morgenländischer, ħ. f. Spanien.

β) *dapsilis* Clem. γ) *patiens* Clem.

vinifera L., var. d) apyrena, e) alexandrina.

Vitis idaea alba Mch. etc., v. Vaccinium album etc.

Vitmannia Turra, non Vahl, *viscosa* Turra, v. Oxybaphus viscosus, p. 578, *Vitmannia africana* Wight et Arn., v. Noltea africana, p. 438, II.

Viviania psychotrioides Colla, v. Melanopsidium nigrum, p. 394, II.

Vochysia Juss., *excelsa* Lam. (= *Vochy guianensis* Aubl. = *Cucullaria excelsa* W.).

Voglia Medic., non Lam., *paniculata* Hornem. (= *sagittata* Medic.), v. Neslia paniculata, p. 546.

Voigtia tomentosa Roth, v. Andryala Rothia, p. 58.

Volkameria fragrans Hort. (= *japonica* Hort. = *odoratissima* Fisch.), *japonica* Thbg., *Kämpferi* Jacq., *laurifolia* Hort., *ligustrina* Jacq., *multiflora* Burm., *tomentosa* Vent., v. Clerodendron fragrans, Kämpferi, squamatum, viscosum, ligustrinum, phlomoides, tomentosum, p. 205 et p. 149, II.

Volutarella Cass., *bicolor* Cass., *Lippii* Cass., *cruciformis* Cass., v. Centaurea Sect. Amberboa, crupinoides, Lippii et. cruciformis, p. 175.

Volutella aphylla Forsk., v. Cassyta filiformis, p. 171.

Vouapa Aubl., Vouapa.

phaseolocarpa Hayne, (= *Macrolobium phaseolocarpum* Steud.), bohnenfrüchtige, ħ. w. Brasilien.

Vriesia Lindl. (van Vriese, Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens in Amsterdam), VI. 1., Bromeliaceae.

psittacina Lindl. (= *Tillandsia psittacina* Hook., p. 811), papageifarbige, 4. w. Brasilien.

Vulneraria Lam., Scop., *Anthyllis* Scop. (= *heterophylla* Mch.), *argentea* Lam. etc., v. Anthyllis Vulneraria, barba jovis etc., p. 65—66.

Digitized by Google

Vulpia C. C. Gmel., Vulpie.

cynosuroides Parlatore, (= *delicatula* Lk. = *Festuca cynosuroides* Dsf. = *F. delicatula* Lagasca).

ciliata Lk. (= *Myuros* Rchb. = *pilosa* Gmel. = *Bromus barbatus* Savi, = *Festuca alopecuroides* Tenore, = *F. barbata* Gaud. = *F. ciliata* Danth. = *F. Myuros* L. spec., Gouan).

Fontanesii Parlatore, (= *Festuca madritensis* Dsf. excl. Synon.), Desfontaine's, ⊙. f. Süd- u. Westeuropa.

incrassata Trin., Parlat. (= *Festuca incrassata* Salzm. = *F. stipoides* Desf. = *F. clavata* Mch. = *Bromus stipoides* L.), verdickte, ⊙. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

Myurus Gmel. (= *pseudomyurus* Rchb. = *Bromus bohemicus* Schm. = *Festuca monandra* Ell. = *F. Myurus* Auct., non L. spec. = *F. pseudomyurus* Willem.), *β*) sciuroides Rchb. (= *bromoides* Auct. = *Festuca bromoides* Auct. = *F. sciuroides* Roth).

setacea Parlat. (= *Festuca sicula* Guss.), borstenförmige, ⊙. f. Sicilien.

sicula Lk. (= *Festuca sicula* Presl), sicilianische, ⊙. f. Sicilien.

tenuis Parlat. (= *Bromus sabulosus* Gussone, = *B. sardous* Spgl. = *B. tenuis* Tineo, = *Brachypodium tenue* Tineo, = *Festuca incrassata* Bertol., non Salzm.), dünne, ⊙ f. Mittel- und Süditalien.

Michelii Rchb., v. Avelinia Michelii, p. 55, II.

Wachendorfia L., Herberti Sweet, (= *Hibberti* Loud. = *paniculata β* Bot. mag.), hirsuta Thbg. (= *villosa* Andr.).

Wahlenbergia Schrad., Wahlenbergie.

claviculata E. Mey. (= *exilis* A. DC. = *Lobelia paniculata* L.), keulenförmige, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

gracilis A. DC. (= *capillaris* G. Don, = *Campanula capillaris* Lodd. = *C. gracilis* Forst. = *C. polymorpha* Soland. = *C. vincaeflora* Vent.).

lobelioides DC. (= *pendula* Schrad. = *Campanula inconspicua* Banks. = *C. juncea* Hort. = *C. juncifolia* Hort. = *C. lobelioides* L. = *C. parviflora* Salisb. = *Lobelia Broussonetii* Bory, = *L. canariensis* Hort. Par. = *L. juncifolia* Hort. = *Roellia cernua* Brouss.).

nutabunda A. DC. (= *Camp. nutabunda* Guss., Tenore), italienische, ⊙. f. Unteritalien, Sardinien.

repens Schrad. (= *procumbens* DC. fil.).

striata DC., gestreifte, ⊙. f. Cap d. g. Hoffn.

graminifolia DC. fil., *Kitaibelii* A. DC., *tenuifolia* A. DC., v. Edrajanthus graminifolius etc.

Waitzia Wendl. 1810, (= *Morna* Lindl., p. 53, = *Viraya* Gaudich), (Waitz, Landkammerrath in Altenburg), XIX. 11., Compositae-Helichryseae.

aurea Steetz, (= *Morna nitida* Lindl.), goldfarbige, 4. ♄. t. Neuholland.

corymbosa Wendl., traubendoldige, ⊙. m. f. Neuholland. *α*) Wendlandiana Steetz, *β*) Benthamiana Steetz, (= *Leptorhynchus suaveolens* Benth. = *Morna nivea* Lindl. = *Helichrysum decumbens* Portenschl.).

Steetziana Lehm., Steetz's, ⊙. m. f. Neuholland.

Waitzia Rchb., *aequimaculata* Rchb. etc., v. Montbretia aequimaculata, etc., p. 417, II.

Digitized by Google

Waldsteinia W., Waldsteinie.
lobata Torr. et A. Gray, (= *Dalibarda lobata* Baldw.), gelappte, 4. f. Nordamerika.
Doniana Tratt., *fragarioides* Tratt., *sibirica* Tratt., v. Comaropsis Doniana etc., p. 213 et 155, II.

Walkeria Schreb., serrata W. (= *zeylonensis* Hort. = *Gomphia angustifolia* Vahl, = *Meesia serrata* G.).

Wallenia Sw. (Wallenius, schwedischer Naturforscher), IV. I., Myrsineaceae.
angulata Jacq., kantige, ♄. w. Ostindien.
laurifolia Sw. (= *Petesioides laurifolium* Jacq.), lorbeerblätterige, ♄. w. Westindien.
Wallichia caryotoides Roxb., v. Harina caryotoides, p. 284, II., *Khoossana* Lodd. v. Nachlese.

Wallrothia Spgl., non Roth, (Dr. Wallroth, Hofrath u. Kreisphysikus zu Nordhausen), V. II., Umbelliferae.
tenuifolia DC. (= *splendens* Spgl.), dünnblätterige, 4. f. Pyrenäen.
tuberosa Spgl., v. Bunium alpinum, p. 82, II.

Walpersia Reiſseck, (Dr. Walpers in Berlin, Herausgeber d. Repertor. botan. system. etc.).
spicata Endl. v. Phylica Sect. IV. p. 518, II.

Waltheria indica L. (= *americana* L. = *angustifolia* L. = *arborescens* Cavan. = *corchorifolia* P. = *erioclada* DC. = *ferruginea* St. Hill. = *gracilis* St. Hil. = *lanata* St. Hil. = *microphylla* Cav. = *obtusa* et *pedunculata* W. herb.).
Warneria canadensis Mill., v. Hydrastis canadensis.

Watsonia Ker, Watsonie.
aletroides Ker, (= *Jacquini* P. = *tubulosa* P.).
brevifolia Ker, (= *hyacinthoides* P.).
humilis Ker, (= *laccata* P. = *Meriana* Ker var. Spgl.).
tigrina Eckl., tigerstreifige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
plantaginea Ker etc., v. Micranthus alopecuroides etc., p. 405, II.

Webbia DC. (P. B. Webb, bereiste Spanien und die canarischen Inseln in botanischer Hinsicht), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
pinifolia DC. (= *Conyza canescens* Thbg. = *C. pinifolia* Lam. = *Vernonia pinifolia* Less.), kieferblätterige, 4. ♄. k. Cap d. g. Hoffn.
Webbia floribunda Spach, *heterophylla* Spach, (= *canariensis* Berth.), v. Hypericum floribundum et canariense.
Webera coriacea Wall., v. Ixora coriacea, p. 327, II., *cymosa* W., v. Canthium didymum Nachlese, *corymbosa* W. (= *cerifera* Moon), v. Stylocorina Webera, p. 711, II.

Wedelia Jacq., Wedelie.
frutescens Jacq., non Spgl. (= *Polymnia Wedelia* L., non Mill.), strauchige, ♄. w. Carthagena.
reticulata DC. (= *frutescens* Spgl. = *Jacquini* Rich.), netzförmige, ♄. w. Porto Rico.

Weigeltia A. DC. (Weigelt, ein armer Arzt u. Botaniker aus dem sächs. Erzgebirge, bereiste Surinam u. starb daselbst 1828, ein fleiſsiger Pflanzensammler), IV. I., Myrsinaceae.
myrianthos A. DC. (= *Wallenia myrianthos* Rchb. = *Salvador. surinam.* Spgl. fil.), tausendblumige, ♄. w. Surinam, Guiana, Brasilien.

Digitized by Google

Weinmannia fraxinea Sm., v. Pterophylla fraxinea, p. 570, II.

Weldenia Schult. fil. (Frhr. v. Welden, k. k. östreich. General, eifriger u. kenntnifsreicher Botaniker), VI. 1., ? Bromeliaceae.

candida Schult. fil., weifsglänzende, 4. w. Mexico.

Wellingtonia Meisn., v. Meliosma Nachlese.

Welwitschia Rchb., *densifolia* Rchb. etc., v. Gilia Sect. I. p. 262, II.

Wendlandia Bartl., non W. (J. C. Wendland † und H. L. Wendland, beide Gartenmeister zu Herrenhausen bei Hannover, kenntnifsr. Botaniker und Gärtner).

paniculata DC. (= *Rondeletia paniculata* Roxb., p. 693).

Wensea pyramidata Wendl., v. Pogostemum plectranthoides, p. 639.

Werneria rigida H. B. K. (= *frigida* DC. = ? *Arnica peruviana* P. = ? *Doronicum peruvianum* Lam.).

Westonia Spgl. (= *Goetzea* Rchb.), Westonia, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

humifusa Spgl. (= *Cleome prostrata* Hort. = *Dillwynia trifoliata* Roth, = *Glycine humifusa* W. = *G. leptocarpa* Grah. = *G. Harpelema* Jacq. fil. = *Hosackia indica* Grah. = *Lotus indicus* Desv. = *Rothia trifoliata* P. = *Trigonella indica* L.), niedergestreckte, ☉. w. m. f. Ostindien.

Westringia Sm., Westringie.

brevifolia Benth., kurzblätterige, ♄. k. t. Van Diemens Land.

rosmariniformis Sm. (= *rosmarinacea* Andr. = *Cunila frutescens* Don, = *C. fruticosa* W.).

Whitfieldia Hook. (Whitfield, engl. Naturforscher u. Reisender), XIV. II., Acanthaceae.

lateritia Hook., blafsmennigrothe, ♄. w. Sierra Leone.

Wiborgia Roth, non Thbg., Wiborgie.

brachystephana * (= *Galinsogea brachystephana* Hort. Berol.), kurzkronige, ☉. f. ? Südamerika.

Wiborgia obcordata Thbg., *floribunda* E. Mey., *sericea* Thbg., v. Loethainia floribunda, obcordata, sericea, p. 883 et p. 369, II.

Wickstroemia fruticosa Schrad., v. Gordonia semiserrata, p. 272, II.

Widdringtonia Endl., Widdringtonie, XXI. X., Coniferae-Cupressineae.

cupressoides Endl. (= *Pachylepis cupressoides* Brongn. = *Thuja cupressoides* L. mant. = *T. aphylla* Burm. = *Cupressus africana* Mill.), cypressenähnliche, ♄. k. Cap d. g. Hoffn.

juniperoides * (= *Cupressus juniperoides* L. = *Taxodium capense* Loud. = *T. juniperoides* Rich, p. 799, = *Pachylepis juniperoides* Brongn. = *Schubertia capensis* Spgl.).

Wierzebickia Rchb., *laricifolia* Rchb., *striata* Rchb., v. Alsine laricifolia, recurva, p. 39.

Willdenowia Cav., non Thbg., *glandulosa* Cav., v. Schlechtendalia glandulosa, p. 641, II.

Willemetia africana Brongn., v. Noltea africana, p. 438, II.

Willemetia arenaria Maerkl., v. Kochia arenaria, p. 138, *eriophora* Moq. Tand. etc., v. Echinopsilon *eriophorum* etc., p. 214, II.

Digitized by Google

Windsoria poaeformis Nutt., v. Uralepis cuprea, p. 750, II.
Winterana lanceolata Poir., v. Tasmannia aromatica, p. 719, II.

Wistaria Loud. Torr. (Wisteria Nutt.).
Backhousiana Hort. angl. (= *Glycine Backhousiana* Hort.), Backhous's, ♄. Sch. k. f. b. ? Japan, China.
brachybotrys Sieb. et Zuccar., kurztraubige, ♄. Sch. k. f. b. Japan.
frutescens DC. (= *speciosa* Nutt. = *Apios frutescens* Pursh, = *Glycine frutescens* L. = *Thyrsanthus frutescens* Ell.) b) fl. pleno, β) macrostachya Nutt.
japonica Sieb. et Zucc., japanische, ♄. Sch. k. f. b. Japan.
Aufserdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch eine W. atrosanguinea mit abfallenden Blättern u. eine rosea von Ceylon erwähnt.

Withania Pauquy, Withanie, V. r., Solanaceae.
aristata Pauquy, (= *Atropa aristata* Poir. = *Physalis aristata* Ait., p. 620).
frutescens Pauquy, (= *suberosa* Pauquy, = ? *Atropa erecta* Zucc.? = *A frutescens* L. = *Physalis suberosa* Cav.), strauchige, ♄. k. Spanien.

Witsenia L., maura Thbg. (= *tomentosa* Salisb.), ramosa Vahl, (= *fruticosa* Ker, = *Aristea fruticosa* P. = *Ixia fruticosa* L. fil.).
Wittelsbachia insignis Mart. et Zuccar., v. Cochlospermum insigne, p. 151, II.

Wollastonia biflora DC. (= *Acmella biflora* Spgl. = *Adenostemma biflorum* Less. = *Verbesina biflora* L., *Wedelia biflora* DC.), p. 858.
Woodsia incisa Hook. et Grev., *mexicana* RBr., *Perriniana* Hook. et Grev., v. Physematium incisum etc, p. 521, II.

Woodwardia virginica Sw. (= *Doodia* Presl).

Wrigthia RBr., Wrigthie.
coccinea Sims, (= *Nerium coccineum* Roxb.).
mollissima Wall., weichste, ♄. w. t. Nepal, Ostindien.

Wulffia Neck., DC., Wulffie.
stenoglossa DC. (= *Chakiatella stenoglossa* Cass. = *Chylodia sarmentosa* Rich. = *Coreopsis baccata* L. fil. = *Helianthus sarmentosus* Rich. = *Pascalia baccata* Spgl. = *Verbesina membranifolia* Poir. = *V. oppositifolia* Poir.), schmalzungige, 4. w. Cayenne.

Wydleria DC. (Dr. Wydler, Prof. in Bern, früher in Genf, reiste in den Antillen), V. II., Umbelliferae.
chilensis, Fisch. et Trautv. (= *Apium chilense* H. Par.), chilesische, ♄. k. Chili.

Xanthium T., macrocarpum DC. (= *brasilicum* Arrabida, = *echinatum* Murr. = *italicum* Moretti = *orientale* L. var.?). β) maculatum Rafin. (= *occidentale* Bertol. = *orientale* Cav.), γ) canadense Mill. (= *americanum* Walt. = *cuneatum* Mill.).

Xanthogalum Lallem., Gelbmilchdolde, V. II., Umbelliferae.
purpurascens Lallem., purpurfarbige, 4. f. Iberien.

Xanthorrhiza apiifolia L'Her. (= *simplicissima* Pursh).

Xanthorrhoea hastilis Sm. (= *resinosa* P.).

Digitized by Google

Xanthosia Rudge, Gelbfilzdolde.

rotundifolia DC. (= *Cruciella candida* Leschen. = *Leucolaena rotundifolia* Benth.).

tridentata DC. (= *Leucolaena tridentata* DC.), dreizähnige, ♄. t. Neuholland.

Xanthosoma Schott, Endl., Gelbzehrwurz, XXI. IX., Aroideae.

?belophyllum Kunth, (= *Caladium belophyllum* W. = *C. acuminatum* Dietr.), spitzblätterige, 4. w. ?

edule Schott, (= *Caladium edule* Mey.), genießbare, 4. w. Essequebo.

Jacquini Schott, (= *Arum xanthorrhizon* Jacq. = *Caladium xanthorrh.* W., p. 143), Jacquin's, 4. ♄. w. Antillen.

lividum Endl. (= ?*violaceum* Hort. Cels. = *Caladium livide-vaginatum* Hort.), schlagblaue, 4. w. Südamer.

sagittifolium Schott, (= *Arum sagittif.* L. = *Caladium sagittaefolium* Vent., p. 143).

variegatum Schott, bunte, 4. w. ?

Xanthoxylon Sm., Zahnweh(Gelb)holz.

Clava Herculis L. (= *caribaeum* Lam. = *carolinianum* G.).

Lamarckianum Cham., Schltdl. (= *triphyllum* G. Don, = *Evodia triphylla* DC. = *Fagara triphylla* Lam., non Roxb.), Lamarck's, ♄. w. Philippinen.

Roxburghianum Cham., Schltdl. (= *triphyllum* Wight, = *Evodia triphylla* DC. ex parte, = *Fagara triphylla* Roxb.), Roxburgh's, ♄. w. Ostindien.

Nicht hinlänglich bekannt: rufescens Dsf.

Xenopoma obovatum W., v. Micromeria obov., p. 407 II.

Xeranthemum L., Papier-(Stroh-)blume.

cylindraceum Sm. (= *annuum* Scopol., non L. = *cylindricum* Spgl. = *sesamoides* Gay, = *Chardinia cylindrica* Desv. = *Xeroloma foetidum* Cass.).

inapertum W. (= *annuum* L. = *erectum* Presl, = *foetidum* Mch. = *incomptum* Cass.).

Xerobius lanatus Cass., v. Egletes bellidifolia.

Xerobotrys cordifolia, *glauca*, *tomentosa* Nutt., v. Arctostaphylos cordifol., glauc. et toment., p. 73.

Ximenia lanceolata DC. v. Gyminosma pedunculata.

Xiphidium Loeffl., Schwertelsimse.

albidum Lam. (= *album* W. = *laevigatum* W. herb. = *floribundum* α Sw.).

rubrum D. Don, (= *Ornithogalum rubrum* R. et P.), rothe, 4. w. Peru. Ob kultivirt?

Xiphium Mill., Schrk., *gramineum* Schrk., *Güldenstädtii* Schrk. etc., v. Iris graminea Güldenst. etc.

Xiphocarpus candidus Presl, v. Tephrosia cand., p. 800.

Xiphotheca axillaris Eckl., Zeyh., *sericea* Eckl., Zeyh., *tomentosa* Eckl., Zeyh., *villosa* Eckl., Zeyh., v. Priestleya axillaris etc., p. 655.

Xylia Benth., Holzschote, XVI. VII. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

dolabriformis Benth. (= *Acacia xylocarpa* W., p. 6, = *Inga dolabriformis* et *lignosa* Grah. = *I. xylocarpa* DC. = *Mimosa Acle* Blanco, = *M. xylocarpa* Roxb.), beilförmige, ♄. w. Ostindien, Philippinen.

Xylobium Lindl., Holzorche.

?foveatum v. Houtte, grubige, 4. w. Südamerika.

Houttei Hort. belg., van Houtte's, 4. w. Südamerika.

lineare v. Houtte, gleichbreite, 4. w. Südamerika.

Digitized by Google

Xylomelum Sm., Holzkapsel.
occidentale RBr., westliche, ħ. t. - West. Neuholland.
pyriforme Sm. (= *salicinum* Cunningh.).
Xylon leoninum Mch. (= *strictum* Medic.), *religiosum* Medic., v. Gossypium hirsut. et relig.

Xylopia frutescens Aubl. (= *muricata* Arrab., non L. = *ovata* Poir.).
Xylopleurum Nuttallii Spach, v. Oenothera speciosa, p. 555.
Xyphidium cordidum Salisb., v. Iris lusitanica, p. 422.

Xyris L., Schwertelgras.
americana Vahl, (= *coerulea* Lam. = *Jupicai* Rich., non Mchx.).
operculata LaBill. (= *anceps* β Lam.).
Purshii Sweet, (= *indica* Pursh), Pursh's, 4. k. Nordam.
Xystidium Trin., *barbatum* Presl, v. Peretis latifolia, p. 606.

Youngia Cass., mauritiana DC. (= *lyrata* Cass. = *Prenanthes japonica* Hort., non L.).
β) integrifolia Cass.

Yucca L., Palmenlilie.
angustifolia Pursh, Nutt., var. fol. albo-marginatis.
arcuata Haw. (= *armata* Haw., Auct.).
concava Haw., Nordamerika, p. 861.
crinifera Hort. belg., haartragende, ħ. t. ? Südamerika.
glaucescens Haw. (= *angustifolia* Hort. angl.).
graminifolia Zuccar., Karw., grasblätterige, 4. t. k. Mexico.
Hartwegii Hort. angl. et belg., Hartweg's, 4. t. Mexico.
laetevirens Karw., freudiggrüne, 4. t. k. Mexico.
pitcairnifolia Karw., pitcairnienblätterige, 4. t. k. Mexico.
recurva Salisb. (= *recurvifolia* Pursh).
spinosa H. B. K. (= *horrida* Humb.), dornige, ħ. t. k. Neuspanien.
stenophylla Steud. (= *angustifolia* Karw., non Pursh), schmalblätterige, 4. t. k. Mexico.
In van Houttes Etablissement horticole wird noch eine Y. Mensiesii u. spiralis (= *Dracaena dioscoreoides* = *D. elephantipes*) kultivirt.
acrotricha Schiede, *longifolia* Karw., *serratifolia* Karw., v. Dasylirion acrotriche, longifolia et serratifolia, p. 191, II.

Zahlbruckneria Rchb. v. Saxifraga Sect. VII. p. 638, II.

Zalacca Reinw., Blume, Zalaccapalme, VI. 1., Palmae.
assamica Lodd., assamische, ħ. w. Ostindien, (Nepal).
Blumeana Mart. (= *edulis* Blume, = *Calamus Rotang* η L. spec. = *C. Zalacca* G., p. 143), Blume's, ħ. w. Ostindien.
Rumphii Lodd., Rumph's, ħ. w. Ostindien.
Wallichiana Mart. (= *edulis* Mart., Wall. = *Calamus Zalacca* Roxb.), Wallich's, ħ. w. Malacca, Pegu, Sumatra.
Zaluzianskya villosa Schm., v. Nycterinia africana, p. 440, II.

Zamia L., Miq., Keulpalme.
caribaea Lodd., caribäische, ħ. w. Westindien.
concinna v. Houtte, nette, ħ. w. ? Westindien.
debilis Ait. (= ? *pumila* Poir. = *pranifera* Lodd.).

Digitized by Google

Zamia

Fischeri Miq. (= *tenuifolia* Fisch.), Fischer's, ♄. w. Westindien.

integrifolia Ait. (= *pumila* Hort.).

Kicksii Miq., Kicks's, ♄. w. Cuba.

Leiboldii Miq., Leibold's, ♄. w. Mexico.

Loddigesii Miq. (= *caracasana* et *serrulata* Lodd.), Loddiges's, ♄. w. Westindien.

macrophylla Lodd., grofsblätterige, ♄. w. Mexico.

Maeleni Miq., Maelenische, ♄. w. Mexico. [1])

mexicana Lodd. (= *Ceratozamia mexicana* Ad. Brongn.), mexicanische, ♄. w. Mexico.

muricata H. B. K., W., weichstachelige, ♄. w. Neugranada, Mexico.

β) angustifolia Miq., γ) obtusifolia Miq. (= *latifolia* Lodd.).

Ottonis Miq., Otto's, ♄. w. Cuba.

pumila L. (= *debilis* Lodd.), Westindien, Florida, Carolina. [2])

pygmaea Sims, (= *praemorsa* Hort.).

tenuis W. (= *dentata* Voigt).

angustifolia Jacq., furfuracea Ait., latifolia Lodd. Westindien, media Jacq. s. p. 862. Alle übrigen daselbst verzeichneten s. Encephalartos, p. 220—221, II.

spiralis Salish., v. Macrozamia spiralis, p. 380, II.

Zappania lantanoides Lam. (= *odorata* P.) etc., v. Lippia asperifolia, p. 364, II.

Zarabellia rhomboidea Cass., v. Melampodium divaricatum, p. 505.

Zea L., Mais.

hirta Bonaf., rauher, ⊙. f. Californien.

Mays L. (= *vulgaris* Mill.). Var.: alba Mill., altissima Gmel., americana Mill., cinerea Hort., cryptosperma Bonaf., erythrolepis Bonaf., guasquinensis Bonaf., graeca Hort., hirta Bonaf., maxima Hort., mexicana Hort., minima Bonaf., minor Gmel., noveboracensis Bonaf., pensylvanica Bonaf., praecox P., Bonaf. (= *aestiva* Hort.), rostrata Jacq. fil., Bonaf., rubra Bonaf., versicolor Bonaf.

Zehneria suavis Endl., v. Pilogyne suavis, p. 623.

Zelkova Spach, Zelkowaulme, V. 11., Ulmaceae.

crenata Spach, (= *Planera carpinifolia* Wats. = *P. crenata* Mchx. = *P. Richardi* Mchx., p. 631, = *Rhamnus carpinifolius* Pall. = *Ulmus crenata* Hort. Par. = *U. nemoralis* Ait. = *U. polygama* Rich.), kerbblätterige, ♄. f. Südcaucasus, Nordamerika.

Zenobia D. Don, speciosa D. Don, β) dealbata D. Don, (= *Andromeda dealbata* Lindl. = *A. pulverulenta* Bartr.). [3])

Zeocriton commune P. B. etc., v. Hordeum zeocriton etc.

Zephyra D. Don, Zephyrlilie, VI. 1., Liliaceae-Asphodeleae.

elegans D. Don, zierliche, 4. t. Peru.

Zephyranthes Herb., Zephyrblume (Schwertel).

candida Herb. (= *nivea* D. Dietr.).

---

1) Nach Miquel

2) „Species in cal[illegible] Dion edule Lindl. s. Nachlese.

3) Die von D. [illegible] variis frequens, variis nominibus militans" Miq. spaltenen und von [illegible] G. Don aufgestellten, von Andromeda gespaltenen und von [illegible] Candolle angenommenen Gattungen, werden als solche von [illegible] und Lindley nicht anerkannt.

Zephyranthes

grandiflora Lindl. (= *Amaryllis Lindleyana* Schult.).
β) carinata Herb. (= *Amaryllis carinata* Spgl.).
lilacina Liebm. (= *grandiflora* Hort.), lilafarbige, 4. Zw. k. Mexico.
lutea Herb. (= *Amaryllis lutea* Pav., non L. = *A. luteschus* Herb.), gelbe, 4. Zw. w. t. Peru.
pumila D. Dietr. (= *Amaryllis pumila* Spin.), niedrige, 4. Zw. k. t. ?
rosea Lindl. (= *carnea* D. Dietr. = *Amaryllis carnea* Schult.).
sessilis Herb., sitzende, 4. Zw. k. Mexico.
α) *verecunda* Herb. (= *Amaryllis verecunda* Schult.), β) striata Herb. (= *Amaryllis striatula* Schult. = *A. minuta* H. B.), γ) Ackermanniana Herb.
Zetocapnia geminiflora Lk. et Otto, v. Bravoa geminiflora, p. 131.

Zexmenia Llav., Anagramm v. Ximenesia.
monocephala * (= *Lipochaeta monocephala* DC. = *Verbesina fruticosa* Hort. Par. olim.).
tagetiflora D. Don, (= *Lipochaeta tagetiflora* DC.).

Zeyheria Mart. (J. M. Zeyher, grofsherzogl. badisch. geh. Hofrath u. Gartendirector zu Schwetzingen bei Heidelberg, † 1843), XIV. 11., Bignoniaceae.
montana Mart. (= *Bignonia Digitalis* Velloz. = *Spathodea montana* Spgl.), bergliebende, ħ. w., *Brasilien.*
Z. fluviatilis Miq., v. Tabebuja fluviat., p. 716, II.

Zichya Hügel, Benth. (Gräfl. ungarische Familie v. Zichy, Gönner u. Beförd. der Gartenkunst etc.).
coccinea Benth. etc. v. Kennedya Sect. II. p. 436, 881 et p. 334, II.

Zieria Sm., Zierie.
arborescens Sims, baumartige, ħ. ħ. k. t. Neuholland.
lanceolata RBr. (= *Smithii* Andr. = *trifoliata* Bonpl.).

Zingiber G., Ingwer.
Cassumunar Roxb. (= *Cliffordiae* Andr. = *luridum* Salisb. = *purpureum* Roscoe, = ? *xantorrhizon* Hort. Hafn. = ? *Amomum Cassumunar* Targ. Tozz. = *C. Roxburghii* Colla).
flavescens Lk., gelblicher, 4. w. Ostindien.
Zerumbet Rosc. (= *spurium* Koen. = *Amomum Zerumbet* L.).
minus G., v. Amomum Cardamomum, p. 48, ? *sylvestre* G., v. Hellenia alba, p. 293, II.

Zinnia L., Zinnie.
ambigua Hort. Berol., zweifelhafte, ☉. m. f. ? Hybride.

Zizania miliacea Mchx. (= *aquatica* W. = *Reimaria diffusa* Spgl.), 4. nicht ☉.
clavulosa Mchx. (= ? *aquatica* L. = *palustris* L.) et *fluitans* Mchx., v. Hydropyrum esculentum et fluitans.

Zizia K., Zizie.
integerrima DC. (= *Sison integerrimus* Spgl. = *Smyrnium integerrimum* L., p. 765).
Z. cordata K., v. Thapsium cordatum, p. 726, II.

Ziziphora L., Zizikraut.
capitata L. (= *compacta* Friv.).
clinopodioides Lam. (= *capitata* et *tenuior* Falk. = *Cunila* Dsf. = *Cunila capitata* L. = ? *Thymus lucidus* Ehrh. = *Th. punctatus* W.), 4. ħ. p. 864.
β) media Lk., Benth. (= *serpyllacea* Bot. mag.).

Digitized by Google

Ziziphora
serpyllacea MB. (= *clinopod.* var. Benth. = *Mussini* Adams, = *odoratissima* Lodd. = *Thymus lucidus* Hort.).
tenuior L. (= *spicata* Cerv. = *serpyllacea* Tenore), dünnes, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Südrufsland.
tenuior Flor. Alt. excl. Syn., *taurica* MB., v. Faldermannia parviflora et taurica, p. 242, II.

Zizyphus T., Judendorn.
Jujuba Lam. (= *mauritiana* Wall. = *Sororia* Schult. = *trinervia* α Roth, = *Rhamnus Jujuba* L.).
Lotus Lam. (= *sativa* G. = *sylvestris* Mill. = *Rhamnus Lotus* L.).
Napeca W., non Lam. (= *ferruginea* Heyne, = *Rhamnus Napeca* L.).
rotundifolia Lam. (= *microphylla* Roxb. = *nummularia* Wight et Arn. = *pygmaea* Herb. madrit.).
Spina Christi Lam. (= *africana* Mill. = *Napeca* Lam., non W.).
vulgaris Lam. (= *Jujuba* Mill. = ? *nitida* Roxb. = *officinarum* Medic. = *sativa* Duh., Dsf.).
xylopyrus W. (= *Caracutta* Roxb. = *elliptica* Roxb. = *orbicularis* Schult. = *rotundifol.* Roth, = ? *ruminata* Wall. = *Rhamnus xylopyrus* Retz), holzfrüchtiger, ħ. w. Ostindien.
Nicht hinlängl. bekannt: incanus Brotero, Cabo verde.
incurva Bot. mag., nec Roxb. (= *virgata* D. Dietr.), *Paliurus* W., v. Paliurus virgatus et australis, p. 581 et p. 472, II.

Zoegea L., Zoegea.
aristata DC. (= *calendulacea* Auct.), grannige, ☉. f. Orient.

Zollikoferia DC., non N. E. (Zollikofer, Arzt u. Botaniker in St. Gallen), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
chondrilloides DC. (= *Leontodon mucronatum* Forsk. = *Scorzonera resedifolia* L. = *Sonchus Bocconi* Jan, = *S. chondrilloides* Dsf., p. 771).
pumila DC. (= *Picridium cernuum* Dufour, = *Podospermum pumilum* Loud. = *Scorzonera glandulosa* Pourr. = *S. pumila* Cav. = *Sonchus scorzoneraeformis* Spgl.), kleine, ♂. 4. f. k. Spanien, ? Arabien.
Zollikofera hieracioides N. E., v. Willemetia apargioides, p. 857.

Zornia J. F. Gmel., Mchx., Zornie.
capensis P. (= *heterophylla* Sm.).
ceylanica Spgl. (= *conjugata* Sm. = *zeylonensis* P.).
tetraphylla Mchx. (= *bracteata* Gmel.).
Zornia Mch., *canescens* Mch., *peltata* Mch., v. Lallemantia canescens, peltata, p. 881, *nutans* Mch. etc., v. Dracocephalum nutans etc.

Zostera marina L. (= *maritima* G. = *oceanica* Web.).

Zozimia Hoffm. (= *Zosimia* Auct.), p. 865.
absinthifolia DC. (= *orientalis* Hoffm.).
Zuccarinia Spgl., non Blume, *ornata* Spgl., v. Jackia ornata, p. 327, II.

Zygadenus L. C. Rich., Mchx. (= *Zigadenus* Auct.), Jochblümchen.
glaberrimus L. C. Rich. (= *Helonias glaberrima* Lk. En.), kahles, 4. f. Nordamerika.
? β) *bracteatus* Schult. fil. (= *Helonias bracteat.* Sims).

Digitized by Google

Zygadenus

hybridus Endl. (= *Melanthium hybridum* R. et S.), [illegible]

virginicus Endl. (= *Helonias virginica* Sims, = *Leimanthium virgin.* W. = *Melanthium polygamum* Desr.), virginisches, 4. f. Nordamerika.

glaucus Nutt. (= *commutatus* R. et S.), *sibiricus* Endl., v. Anticlea glauca et sibirica, p. 40, II.

Zygomenes axillaris Salisb., v. Cyanotis axillaris.

Zygomeris flava Roc., Sess., v. Annia Zygomeris, p. 47.

Zygopetalum Hook., Jochstendel.

africanum Hook., afrikanischer 4. w. Sierra Leone.

conchaceum Hffg. (= *cochleare* Lodd., *non Lindl.*), muschelähnlicher, 4. w. Brasilien.

crinitum Lindl., b) coeruleum, c) roseum.

Mackai Hook., b) minus, c) pallidum, d) striatum.

maxillare Lodd., Lindl., b) purpureum.

mandibulare Hffg. (= *maxillare* Cels, nec Hort. angl.), kieferähnlicher, 4. w. Brasilien.

pubescens Hffg., weichhaariger, 4. w. Brasilien.

velutinum Hffg., sammthaariger, 4. w. Brasilien.

Zygophyllum L., Doppelblatt.

Fabago L. (= *Fabago alata* Mch. = *F. major* D. Don), bohnenähnliches, 4. f. Caucasus, Sibirien, Orient, Nordafrika.

latifolium Fisch., Mey. et Lallem., breitblätteriges, 4. f. Soongaria.

Lichtensteinianum N. E., Lichtenstein's, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

sessilifolium L., β) fulvum Mill., Hffg.

spathulatum D. Don, spatelförmiges, ħ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

prostratum Thbg. (= *? lanatum* W.), v. Seetzenia africana, p. 652, II., *fruticulosum* DC., v. Roeperia fruticulosa Nachlese.

Zyrphelis amoena Cass. (= *taxifolia* N. E.), v. Mairia taxifolia, p. 381, II.

Berichtigungen.

Seite 6 lies: Aceratium Ganitri statt A. Genitri.
- 37 - Annesorrhiza Cham., Schltdt., Aniswurz statt Zahlwurz. Dabei als Synonyme zwei Mal Oenanthe statt Oenothera.
- 161 - Coriandrum melphitense statt C. mephitense.
- 240 ist die Bemerkung wegen Araucaria Bidwilli Hook. zu streichen, da diese Species eine echte Araucaria ist.
- 371 lies: Lophostemon depressum Schott statt L. depressa.
- 691 - Sphaeromorphaea statt Spaeromorphaea.
- 758 - Veronica panormitana statt V. ponormitana.

Dresden, gedruckt bei Carl Reinming.

Digitized by Google

In der **Arnoldischen Buchhandlung** in Dresden und Leipzig sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

G. Heynhold,
NOMENCLATOR BOTANICUS HORTENSIS,
oder
alphabetische und synonymische Aufzählung der in den Gärten Europa's kultivirten Gewächse, nebst Angabe ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer Dauer und Kultur;
nebst einer Vorrede
von
Dr. L. Reichenbach.
Lang 8. geh. 4 Thlr.

G. Heynhold,
das natürliche Pflanzensystem.
Ein Versuch, die gegenseitigen Verwandschaften der Pflanzen aufzufinden, durch Andeutung ihrer Bildungsstufen, Uebergänge, Ausnahmen, mit Berücksichtigung der arzneilichen und überhaupt anwendbaren Gewächse, nebst einer historischen Einleitung.
Gemeinfaßlich dargestellt und zunächst für angehende Apotheker, Aerzte etc. bearbeitet.
Mit einer Vorrede
von
Dr. H. Ficinus.
gr. 8. 1 Thlr.

Flora der Gegend um Dresden.
Erste Abtheilung: **Phanerogamie,**
enthaltend die Pflanzen, deren Frucht auf eine vorausgegangene deutliche Blüthe folgt
von
Dr. H. Ficinus und G. Heynhold.
Dritte vermehrte Auflage.
Nebst einer geognostischen Karte der Umgegend von Dresden.
8. carton. 2 Thlr. 15 Ngr.

Zweite Abtheilung: **Kryptogamen,**
von
Dr. H. Ficinus und C. Schubert.
Mit 3 Kupfertafeln.
8. carton. 2 Thlr. 15 Ngr.

Tr. J. Seidel,
die RHODORACEAE oder RHODODENDREAE,
eine Anleitung zur Cultur dieser Pflanzenfamilie,
nebst einer systematischen Beschreibung der Gattungen und Arten derselben,
von
G. Heynhold.
Zweite Ausgabe.
8. broch. ⅓ Thlr.

Ausführliche Anweisung
zur richtigen Pflege und Behandlung
grosser Orangerieen,
aus eigenen langjährigen Erfahrungen niedergeschrieben
von
C. A. Seidel.
8. broch. ⅓ Thlr.

C. A. Roßmäßler (Prof.),
das Wichtigste
vom inneren Bau und Leben der Gewächse,
für den praktischen Landwirth faßlich dargestellt.
Mit 4 Steindrucktafeln.
gr. 8. broch. 1½ Thlr.

Digitized by Google

Dr. H. G. L. Reichenbach,

der deutsche Botaniker

Erster Band:

Das Herbarienbuch.

8. broch. 2½ Thlr.

Dieses Buch enthält auf 35 enggedruckten Bogen: 1) Erklärung des ganzen natürlichen Pflanzen-Systems, 2) systematische Aufzählung aller bis jetzt bekannten, auch der neuesten Pflanzengattungen und Untergattungen, 3) Auflösung der Synonymen, wie dieselbe noch nirgends gegeben worden ist, und 4) ausführliches Register über alle Gattungen und Untergattungen. Dieses Werk bedarf, bei dem gänzlichen Mangel eines ähnlichen und bei seiner Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit für Anfänger und für Meister in der Botanik keiner weiteren Empfehlung.

Hiersu erschienen durch Besorgung desselben Verfassers:

Herbarien-Etiquetten.

Uebersicht aller natürlichen Pflanzenfamilien, Zünfte und Gruppen Jussieu's und aller neueren Autoren mit fortlaufender Nummerirung aller Gattungen. Zur gröfsten Zeitersparnifs für Herbarien-Besitzer zusammengestellt.

7 gr. Bogen auf starkem Papier. ¼ Thlr.

In der That dürften beide Werke in ihrer praktischen Anwendung thätigen Botanikern Jahre ihres Lebens ersparen und wurden, nachdem der Verfasser durch deren Gebrauch gleiche Erfahrungen gemacht hatte, auf den Wunsch seiner Freunde zum Nutzen Anderer gedruckt.

Dr. H. G. L. Reichenbach,

FLORA SAXONICA.

Die Flora von Sachsen,

ein botanisches Excursionsbuch

für das Königreich Sachsen, das Grofsherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen, die Fürstlich Schwarzburgischen und Reufsischen Lande, die Herzogthümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen die Provinz Sachsen und die Preufsische Lausitz.

Nebst

Schlüssel zum erleichterten Bestimmen der Gattungen nach Linné's Sexualsystem.

Zweite Ausgabe

mit vollständigem Register der deutschen und lateinischen Namen und ihrer Synonymen.

8. cart. 2½ Thlr.

Für die Besitzer der ersten Auflage dient:

Register zur Flora von Sachsen,

enthaltend die deutschen und lateinischen Namen der Gattungen und Arten nebst Synonymen,

von

Dr. H. G. L. Reichenbach.

8. broch. ⅛ Thlr.

Dr. H. G. L. Reichenbach,

Handbuch

des natürlichen Pflanzensystems

nach allen seinen Classen, Ordnungen und Familien,

nebst naturgemäfser Gruppirung der Gattungen;

oder

Stamm und Verzweigung des Gewächsreichs;

enthaltend

eine vollständige Charakteristik und Ausführung der natürlichen Verwandschaften der Pflanzen in ihrer Richtung aus der Metamorphose und geographischen Verbreitung, wie die fortgebildete Zeit deren Anschauung fordert.

4. broch. 3 Thlr. 22½ Ngr.

Digitized by Google

Dr. G. H. L. Reichenbach,

Amoenitates botanicae Dresdenses.

Specimen primum
observationes in myosotidis genus continens.
gr. 8. ⅓ Thlr.

Gäa von Sachsen

oder

physikalisch-geographische und geognostische Skizze

für das Königreich Sachsen, das Grofsherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, die Grofsherzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen Meiningen, die Fürstlich Schwarzburgischen und Reufsischen Lande, die Herzogthümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen, die Provinz Sachsen und die Preufsische Lausitz, bearbeitet von

Dr. B. Cotta, Dr. H. B. Geinitz, A. v. Gutbier, C. F. Naumann, Dr. L. Reichenbach und *M. A. Schiffner.*

8. broch. 1¼ Thlr.

Dieses Werk dient als Einleitung zu Reichenbach's Flora von Sachsen, weshalb wir es den Besitzern derselben empfehlen.

Mittheilungen

über

Flora, Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden.

Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von

C. Tr. Schramm.

Erstes bis drittes Heft.

gr. 8. geh. 1½ Thlr.

Dr. B. Cotta,

Professor der Geognosie in Freiberg,

Grundrifs der Geognosie und Geologie.

Zweite Auflage.

Mit einer Titelskizze, 76 eingedruckten Holzschnitten und einer besonderen Beilage.

gr. 8. gut gebunden. 3 Thlr. 15 Ngr.

Anleitung

zum Studium der Thier- und Pflanzenwelt.

Ein Leitfaden

für

Lehrer an höheren Lehranstalten und zur belehrenden Unterhaltung für gebildete Leser

von

E. A. Rofsmäfsler.

Erster Theil: Das Thierreich.

(Als dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage von des Verfassers „systematischer Uebersicht des Thierreichs.")

Erste Lieferung.

gr. 8. broch. 1 Thlr.

J. J. Berzelius,

Lehrbuch der Chemie.

Fünfte umgearbeitete Original-Auflage.

Erster bis vierter Band.

Mit eingedruckten Holzschnitten, 2 Kupfertafeln und einem besonderen Abdruck der Atomgewichtstafeln.

gr. 8. broch. Prän.-Preis 20 Thlr.

Diese neue Auflage eines classischen Werkes, deren erste drei Bände die unorganische Chemie vollständig enthalten, schreitet ihrer Vollendung rasch entgegen.

Dr. A. Sonnenburg,

Arithmonomia naturalis

seu de numeris in rerum natura tentamen e mineralogia, botanice et zoologia illustratum cum tabula aenea.

4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Digitized by Google

Dr. C. F. Naumann,

Anfangsgründe der Krystallographie.

Mit 25 Steindrucktafeln.

gr. 8. broch. 2½ Thlr.

Dr. H. B. Geinitz,

Grundriss der Versteinerungskunde.

Mit 28 Steindrucktafeln und 1 Tabelle.

Lexikonformat. gut geb. 8 Thlr.

Ueber das Studium der Botanik,

als eine der nützlichsten und angenehmsten Beschäftigungen für alle Stände.

12. 7½ Ngr.

C. F. Peschel,

Lehrbuch der Physik,

nach dem gegenwärtigen Stundpuncte dieser Wissenschaft bearbeitet, zum Gebrauche bei Vorlesungen auf höheren Gymnasien und mit besonderer Berücksichtigung von Militärbildungsanstalten.

Erste Abtheilung:

Physik der wägbaren Stoffe.

Mit 5 Steindrucktafeln und 15 Tabellen.

gr. 8. broch. 2 Thlr.

Zweite Abtheilung:

Physik unwägbarer Stoffe.

Mit 8 Steindrucktafeln und 10 Tabellen.

gr. 8. broch. 4 Thlr.

Das Ganze mit 13 Steindrucktafeln und 25 Tabellen kostet elegant gebunden 6 Thaler.

C. F. Mäser,

die Lyra am Spaten,

vermischte Gedichte.

gr. 8. broch. 1 Thlr.

F. B. Reichel,

Standorte

der

seltneren und ausgezeichneten Pflanzen der Umgegend von Dresden.

16. broch. 7½ Ngr.

Ueber den Quincunx

als Grundgesetz der Blattstellung vieler Pflanzen,

von

Prof. Dr. C. Fr. Naumann.

Mit einer Steindrucktafel.

gr. 8. broch. 20 Ngr.

Allgemeine deutsche

naturhistorische Zeitung.

Im Auftrage der Gesellschaft Isis in Dresden und in Verbindung mit den Herren H. B. Geinitz, B. Gössel, A. F. Günther, v. Kiesewetter, E. Lösche, F. Reichenbach, H. E. Richter und E. A. Roßmäßler

herausgegeben

von

C. Tr. Sachse.

Mit eingedruckten Holzschnitten und 10 Steindrucktafeln.

Erster Jahrgang in 6 Heften. gr. 8. broch. 2 Thlr. 24 Ngr. geb. 3 Thlr.

Zweiter Jahrgang in 6 Heften. gr. 8. broch. 3 Thlr.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google